

A D R I A N I
S P I G E L I I
B R V X E L L E N S I S
O P E R A

Omnia quæ extant.

*Elenchum librorum vide statim post Dedicationem, & in Prefatione
ad Lectorem quid in iis à nobis est præstitum.*

ADRIANI
SPIGELII

BRUXELLENSIS

OPERA

Quamvis perierint

Adrianus Spigelius flos philosophiae
et mathematicae



NOBILISSIMIS, AMPLISSIMISQVE

VIRIS,

PETRO HASSELAER,

Curatori Societatis Indiæ Orientalis, & antehac in Collegio
Præfectorum Rei Maritimæ delegato, Militiæ Urbis Tribuno;

ANDREÆ BICKER, I. V. D.

bis ad Ser^{mos} Polonorum Suecorumque Reges, & nunc ad
Ser^{man} Suecorum Reginam Legato, Societatis Indiæ Orientalis
Curatori; in Collegio, tum Illustrissimorum Potentissimorum-
que Hollandiæ, ac West-Frisiæ Ordinum, tum Præfectorum
Rei Maritimæ, delegato, Tribuno Urbis Militiæ;

GERBRANDO NICOLAI F.

PANCRACTIO, antehac Curatori Societatis Indiæ Orientalis;

GUILIELMO BACKER,

DE CORNELIIS, eadem antehac dignitate perfuncto;

PRUDENTISSIMIS

AMSTELÆDAMENSIS

REIPUBLICÆ

CONSVLIBVS,

Salutem plurimam, & perpetuam

Felicitatem optat vovetque

IOHANNES BLAEV.



NOBILISSIMI, AMPLISSIMI, PRY-

DENTISSIMIQUE CONSVLES,

Artes necessitas genuit, usus
commendat, amoremque con-
ciliat. Vnde & cæ præferuntur aliis, quibus ca-
rere difficilius mortalium vita potest; quæque
non

#6420.

non ad oblectationem meram, sed conservationem generis humani sunt comparatæ. Ex his omnium calculo facile primas Medicina obtinet; sive hominem spectes, quem curat; sive sanitatem, in corporis bonis exoptatissimum. Ea cum in multas se partes diffuderit, unam habet dignitate, necessitate, usibusque eximiam, ANATOMICEN. Quæ in sectione corporis, ad stuporem admirandi, occupata, & singula ejus artificia membratim oculis ingerens, totiusque Naturæ compendium docte & ingeniose resolvens ac examinans, valde dignitatem ejus in illustri ponit. Quid, quod infinitam Creatoris Dei potentiam, sapientiam, bonitatem, quavis etiam minima particula liquido ostendat? Potentiam, formando; sapientiam, ordinando; bonitatem, conservando singula, ineffabili conspiratione soluta, & libertate nexa. Necessitatem artis suadet & evincit, quod sine hac læsis affectisque partibus adhiberi medela nequeat. Vsum, tum hæc ipsa; tum notitia, quam nobis nostri, & cujus imago sumus, Dei vivi exhibet. Effecit utraque, ut plurimi se in hac cum cura exercuerint, tum veteres, tum recentiores. Veteres multa latuere. nempe ut invenirent sequentia secula, quo desidiâ ingeniis torporemque excuterent, & gloriam ab hominibus Deus, gratiam homines à posteris consequerentur. Recentiores inter familiam ducit SPIGELIUS. Cujus opera quan-

quantum rei Anatomicæ accesserit, quælibet in hoc Opere pagina loquitur. Quo vero perfectius, &, quanta fieri potuit industria, auguste ederetur, adjecimus ab ASELIO, HARVEJO, & WALÆO, postmodo in hac scientia atque arte observata. Huic tamen labori nostro, Vos, VIRI MAGNIFICI, verum dabitis splendorem, si Augustissimis Vestris Nominibus inscriptum, qua orbis patet, & admiratio Vestri longe lateque penetravit, favore prosequi non dedigne mini. Quem spondere mihi videor, quoties cogito Vestram in tuendis civibus sollicitudinem, in fovendis exteris benignitatem, in promovendis omnium fortunis studium; denique in universa Republica Vestra conservanda prudentiam, in augenda justitiam, in ornanda liberalitatem. Quæ quantum indies crescit, (crescat autem, & floreat ut Cedrus Libani) tantum Deus Opt. Max. Vobis sapientis consilii porro etiam magis magisque suggerat tam stupendæ moli regundæ. Ita precor, ita voveo. Amstelædami è Typographejo meo VIII Kal. Maji.

C I O I O C XLV.

Continentur

T O M O P R I M O

ADRIANI SPIGELII *Bruxellensis*, De Fabrica Humani Corporis, libri decem.

IVLII CASSERII *Placentini*, Tabulæ Anatomicae, cum DANIELIS BVCRETII *Vratislaviensis*, Supplemento.

ADRIANI SPIGELII, De Formato Fœtu, liber singularis.

IVLII CASSERII, Tabulæ de Formato Fœtu.

GASPARIS ASELLII *Cremonensis*, De Lactibus, sive Lacteis venis, Dissertatio.

GVILIELMI HARVEII *Angli*, De Motu Cordis & Sanguinis in animalibus, Exercitatio Anatomica.

IOHANNIS WALÆI *Leidenfis*, Epistolæ duæ; de motu Chyli & Sanguinis.

T O M O S E C V N D O

ADRIANI SPIGELII *Bruxellensis*,

De Semitertiana, lib. I V.

De Arthritide, liber.

De Lumbrico lato, liber.

Isagoges in Rem Herbariam, libri II.

ANTONII VANDER LINDEN *Nerdeni*, De monstrosis Vermibus, Observatio rara; pag. 92.

I O H A N T O N I D E S

V A N D E R L I N D E N

Medicinæ Professor

LECTORI SALVTEM.



Uoties, quod vivimus, seculum considero, ea mihi venisse tempora videntur, qua dum sua detestatur, exoptata olim à magno illo salutis humanae praesidis artis interprete Galeno videmus libro II. Methodi medendi cap. V. εἰ μὴ γὰρ, inquit, μεγάλη τις ἡρόσις καὶ δαίμονια μεταβολὴ τῆς ἀνθρωπείων περὶμάτων, οἷον πάντα τὰ καλὰ καὶ συγκέρχῃ, καὶ διέφθαρῃ, μὲν ἐνός ἀλήθειαν περὶ δόξων, ἀλλὰ τὸ δόξαν μόνον. Nisi magna quaedam & divina quasi virgula humanarum rerum fiat conversio, nihil boni superest, sed perturbata & corrupta sunt omnia, dum nemo ad veritatem, omnes ad id, quod cuique videtur, totum convertunt studium. Etenim eo licet nondum pervenisse artes, quibus in solatium mortalitatis indigemus, ut nihil posteritati, quod addat, reliquum existimem: tantum tamen abesse censeo, ut jure quis de confusione earum aut corruptione conquiri hodie possit, ut obstupescere potius omnes credam, quandocunque intentius culmen istud perfectionis intuentur, ad quod ascenderunt. Non dicam longum fore, si quis ire per omnes & demonstrare velit, quantum singula lucis pro obscuritate, pro confusione ordinis, pro tadio facilitatis, denique integritatis pro corruptela acceperint: tantum negabo possibile esse, ut quis omnia, quae nova, quaeque memorabilia in artibus tum ingenuis tum mechanicis intra annos non usque adeo multos fuere reperta, plene recenscat. Nobis, quod rem presentem attinet, in sola Anatomica & paucis id ostendisse sufficiet. Anatomica ars est, quae corpora animantium rite dissecandi rationem docet, quod ea (Celsi verbis utor) quae natura ante clausisset, eorumque posituram, colorem, figuram, magnitudinem, ordinem, duriciem, molliciem, laevorem, contactum; processus deinde singulorum & recessus; & siue quid inferitur alteri, siue quid partem alterius in se recipit, cognoscamus. In qua cognitione nuda qui subsistunt, neque aut ad sui notitiam pergunt, quod curare discant, ut sit mens sana in corpore sano; aut erigunt se ad Conditoris sui potentiam, sapientiam, bonitatem agnoscendam, admirandam, predicandam, na illi fiede magis & crudeliter lacerasse cadavera, quam rite dissecuisse dicendi sunt! Rite dissecare apud Homerum, est omnia καὶ μοῖραν ἱερὰν ἀνδρῶν καὶ θεῶν, uti oportet scienter ac dextre dividere. Nam & olim laniare in sacrificiis pro lubitu animalia apud Gentes ipsas non licebat; & ne fieret, caruisse apud populum suum Deus videtur, cum & macrandi modum illis praescripsit, & partes offerendas definivit. Quemadmodum vero vel hinc duntaxat vetustissimum esse cum cura secandi atque inspiciendi animalia morem constat; ita nec dubium videtur ab his ad humana cadavera transitum fuisse, postquam

*

com-

compererunt *Medicis* etiam in interioribus partibus & dolores & morborum varia genera nasci, quibus nemo adhibere remedia posset, qui ignoraret: non vero, cum dolor intus (*Celsi* rursus verba sunt) incidit, scire quid doleat, eum, qui qua parte quodque viscus intestinumve sit, non cognoverit. Et cum per vulnus alicujus viscera patefacta sunt, eum qui sanæ cujusquam colorem partis ignoret, nescire quid integrum, quid corruptum sit. Ita ne succurrere quidem posse corruptis, aptiusque extrinsecus imponi remedia, compertis interiorum & sedibus & figuris, cognitaque eorum magnitudine: similesque omnia, quæ posita sunt, rationes habere. Quando autem & qui incidere corpora mortuorum primum, eorumque viscera atque intestina scrutari coeperint, ne mentiri quidem ausa antiquitas fuit. Verisimile est, *Anatomicam* apud *Egyptios* cum plerisque artium natam, ad alias deinde gentes propagatam, apud *Græcos* tamen aliquanto magis, quam in cæteris nationibus excultam fuisse. Inter hos enim multos ex sapientia professoribus peritos ejus fuisse testantur *Aristoteles*, *Galenus*, & *Ruffus Ephesus*. Clarissimos vero ex his *Empedoclem*, *Alcmaonem Crotoniatam* & *Democritum*. Hujus autem (ut quidam crediderunt, inquit *Celsus*) discipulus *Hippocrates Crous*, vir & arte & facundia insignis, uti primus quidem ex omnibus memoria dignis ab studio sapientiæ medicinam separasse putatur, ita eum credibile est *Anatomicam* hujus gratia studiosius instituisse, plurimosque sectatores habuisse. Eos *Galenus* in priscos & juniores distinguit, & ab illis negligentius *Anatomicam* explicatam, plurimum vero ab his illustratam asserit. Quos ipse omnes insecutus & præstantissimos præceptores & acre ingenium nactus rudem adhuc & imperfectam illam ita exornavit atque perfecit, ut merito quam antecessoribus præripuit, præferre unus posteris palmam dicatur. Id certe effecit, ut alii ex his aut primam putarent gloriam sua vel ex *Galeno*, tamquam è fonte rivus, elicere, vel ad ejus emulationem omnia componere; aut istam assequendi desperatione multis annis nihil alii adjicere aut emendare conarentur. Unde factum fortassis, ut apud *Arabes*, medicina studiosissimos & in ea tradenda augendaque ad invidiam usque *Græcorum* amulos, vix umbram tamen perfectæ *Anatomies* extitisse *Averrhoes* candide profiteatur: quin hæc ipsa protinus evanuerit, cum omnis eruditionis eclipsin universus orbis densissima barbariei interjectu passus fuit. Ex qua hanc aliter *Anatomica* quoque emerfit, ac solent quæ, tenebris obruta, illuminari primum incipiunt. Ea enim quemadmodum confusa initio atque indistincta horridaque, sensim accedente majore luce non disjuncta distinctaque solum, sed & ordinatiora pulchrioraque apparent: ita *Anatomica* ante sesquiseculum præter propter sub *Mundino* primum in Italia resurgens, rudis quadam & indigesta moles fuit, donec ei formam *Iacobus Carpus* amplissimis commentariis donaret. Quæ deinceps excoli paulo subtilius ab *Nicolao Massa* cepit, & certatim mox à *Iacobo Sylvio* & *Andrea Vesalio* expoliri: dum uterque lectis, quæ non ita pridem è tenebris eruta fuerant, *Galen*i de re anatomica scriptis, totis in ea animis incubuerunt, ille interpretando, hic examinando omnia clariora atque hoc effectum reddentes, ut & *Galen*i industriam plures in-

AD LECTOREM.

dies admirarentur & suam diligentiam alii post alios imitarentur. His enim auctoribus cum, pristino integritatis prisca nitore recuperato, pulcherrima artis speciem Anatomica induisset, & simul laudem utilitatis meruisset, incredibile quot ea, non mediocres viros in sui amorem pertraxerit. Qui exemplum quisque sibi boni patrisfamilias ob oculos ponentes ampliora, quae acceperant, facere, maioraque ad posteros transmittere sategerunt. Hinc, prout cuiusque ingenium tulit, variis viis ad promovendam rem anatomicam itum est. Alii enim, quibus & commoditas & copia secandorum cadaverum atque in rem presentem veniendi major erat, totos se observationibus dederunt, ut aut novis illam & antecessorum diligentiam elapsis inventis ditarent; aut amplificarent raris quibusdam & dissimilibus naturae lufibus; aut denique reperta semel & bene tradita iis, quae saepius & eodem semper modo se offerebant, confirmarent. Alii, qui aut valetudinis tenerioris aut animi imbecillioris fetore vel fœditate rei praecepta absterrebantur, vel robusti satis & prompti destituebantur necessariis, huc potius studia sua contulerunt, ut instituto inventorum examine, aut quae laborare difficultatibus & obscurata controversiis videbantur, discussa caligine in apertum producerent; aut omnino etiam, praeclaris quibusdam questionibus in medium prolatis, vocarent in dubium quae vel ob auctorum reverentiam vel consensum plurimum, vel inquirendi tadium aliquanto facilius credita pro veris passim ratisque admittebantur. Alii rursus utrumque laborem conjungentes simul animum ad investigandum quod delectare novitate posset & prodesse notitia, simul ad elucidandum magis à majoribus accepta, eaque vel meliore & ad sectiones instituendas aut naturam ipsam accommodatiore ordine, vel utiliore & ad praxin medicam manu ducente descriptionis formula ornandum admoventur. Denique alii integrum artis systema condendo; alii enixius uni alicui parti incumbendo, plurimum tamen adjutum anatomicam nec sine fructu & industria laude iverunt. Non est quod ad istos mihi statutos ordines cunctos revocem, qui scriptis apud nos incluserunt, cum & in manibus illa sint, & passim in recentiorum libris fideliter satis memorentur ea, quibus & praeceperunt aliis & aeternam meritum suorum memoriam fecerunt. Quis enim nescit quantum admirando Gabrielis Fallopii, Vesalii in Patavino Gymnasio successoris, Observationum operi debeamus? quantum eruditus Bartholomæi Eustachii de Renibus ceterisque opusculis? quantum Iulii Cæsaris Arantii accurata Vteri in gravidis & Fœtus humani historia? Quis Constantino Varolio acceptum non refert ab inferis cerebrum secandi ordinem novum illum, quique nova multa & vetera omnia longe clarius oculis exhibet? Eidem Coli valvulam Riolanus attribuit, cujus inventæ gloriam sibi Bauhinus vindicaverat: etsi alii eam Salomoni Alberti censeant deberi. Sed quid est, cur non uterque eodem tempore deprehendere illam potuerint, & proferre in lucem, & participare laudem? Venarum valvulas si non reperit (video enim dubitari;) perfecisse tamen Hieronymus Fabricius ab Aquapendente videtur quicquid ad earum notitiam spectat. Stapedem, inter auditus ossa tertium, Ioannes Philippus Ingrassias; vesiculas seminarias Gulielmus Rondeletius; meatum autem, per quem pregnantibus semen in cervi-

cem uteri, majoris voluptatis gratia & ad lenienda gestationis fastidia emittitur, facundissimus Fernelius notavit primus. Magna (fatendum est) magnis istis viris gratia debentur. At vero quantas meruisse Realdum Columbum, Casparum Bauhinum, Andream Laurentium, Iohannem Riolanum filium, & qui omnes secutus, numnon affecutus? est, Casparum Bartholinum putamus? qui non contenti in una aliqua artis parte singulare quid & aeo dignum elaborasse, in tota excellere voluerunt, atque universam corporis humani fabricam fusioribus alii, alii pressioribus, omnes plenius commentariis proponere. Qui omnes etsi ad perfectionis fastigium protulisse Anatomicam poterant videri, & ademisse posteris novi aliquid inveniendi gloriam, id ut fecerint tantum abest, ut viam potius straverint ad plura alia investiganda. Neque enim exhauriri natura thesauri queunt, & tanta ejus in fabricando Hominis corpore solertia est, ut Galenus eam licet magni viri diligenter & assidue scrutentur, non omnem tamen inventuros vere dixerit, sed semper aliquid in occulto mansurum, ventura quod etas querat. Cujus rei & clarissima nobis & felicissima testimonia exhibent hodie qui animos se ad contemplandum erectos, & simul manus ad penetrandum dexteras habere ingeniosissimis inventis, inventorumque mirissimis demonstrationibus demonstrant. Omitto nunc novam iterum & admirandam illam methodum, qua cerebri totiusque capitis admiranda longe quam antea subtilius perquirere & cognoscere exactius docuit vir magni ob multas virtutes & raras ingenii dotes estimandus D. Franciscus Sylvius, Medicus Amstelredamensis; quam nuper una cum quibusdam aliis suis rarioribus observationibus Clar. Bartholini Institutionibus Anatomicis, velut auro gemulas, inseri à Doctiss. Thoma Bartholino Auct. F. passus est. Non dicam de foramine è dextro in sinistrum cordis ventricululum sanguinis isthac transitui pervio per Cæciliium Folium reperto, an magis asserto? Nihil quoque de novo Pancreatis ductu Patavii primum à D. Ioh. Georgio Wirfung observato, Amstelredami auctem ejusdem D. Francisci Sylvii cura accuratius ad virum expresso & per Cl. D. Vopiscum Fortunatum Plempium, amatum mihi & estimatum, rumpantur ut ilia Codro, Virum cum eruditissimis de Fundamentis medicina commentariis nuper exhibito. Istos, inquam, ut taceam, possuntne majores aliqui produci testes supra hos, quorum nunc vere nobiles sapientis ingenii fætus & conjunctim edimus, & simul aternitati consecratos volumus? Expectas forte, Lector, ut quod dixi, probem. Sed quare me tibi vis præjudicium facere? Adi singulos ipse, lege, cense. Fallor, nisi de Adriani Spigellii, Clarissimi Viri, decem de Humani corporis Fabrica libris verissimum invenias, quod ad te D. Daniel Bucretius Vratislaviensis scripsit, cum primum eos Venetiis ante annos septemdecim promulgaret. Opus esse, cum infinitis observationibus, tum methodo succincta, præclaris partium usibus, & dissectorum historiis mirifice exornatum. Ad hæc cum rari admodum sint, quibus refectionum studium placeat, nisi Medicinæ, cujus fundamentum est, gratia: totum opus sic institutum esse, ut perpetuo ad artis usum referatur. Hinc tot præcepta Chirurgis in suis operationibus notanda; tot difficilium Hippocratis locorum explicationes; viarum, per quas

quas morborum transmutationes fiunt, tum consensus partium, demonstrationes: plurima insuper ab aliis aut non attacta, aut perperam descripta *passim* occurrere. Et quæ vulgo in musculorum doctrina confusio est, circa venarum arteriarumque usum obscuritas, circa viscerum actiones difficultas; hic elegantem ordinem, claram lucem, miram facilitatem habere. Cujus laudis participem eundem D. Buretrium qui fecerit, nihil equidem auctori detrahit. Cum nemini non possit non videri in partem illius vocasse, quem plurimum in vita dilectum sibi præ ceteris in testamento nominaverat ad opus istud concinnandum postremaque manu perficiendum. Quique illud tam fideliter atque industrie est executus, ut nihil in ordine, operisve forma aut stili elegantia magnopere desideretur. Qui insuper Historiam tabulis, non tantum septuaginta sex à Julio Casserio Placentino, ob egregiam in dissecando dexteritatem celeberrimo Viro, confectis et viginti aliis, quæ desiderabantur, à se additis, omnibus elegantissimis, sed et tabulas notis, et has è regione explicationibus exornavit. In libellis de Formato Fœtu et Arthritide etsi secundas auctoris curas non immerito quis requirat, bene tamen de Socero et publico meritis est Liberalis Crema, qui eos in lucem dedit et alterum tabulis Casserii quoque fecit absolutiorem. Cetera Spigelii, quia ipso viro fuere edita, talia sunt, ut et egregie nobis ingenii vigorem, eruditionis varietatem, judicii promptitudinem, felicitatem denique ejus in praxi depingant; et simul dulce desiderium relinquunt Operis Epistolarum anatomicarum in libro de Semiteretiana promissi, itemque Commentarii in Psellum de Lapidibus, et Chirurgicorum: de quibus etsi serio inquisitum fuit per Cl. D. Iohannem Rhodium (qui, ut est ingenio mire benigno ac facili ad aliorum conatus promovendos, id nobis bonoris dedit;) nihil tamen reperiri potuit, quod utiliter in publicum exeat, nisi una Hymenis pictura, quam in hac editione primi damus. Fruamur igitur istis, quæ et invitare nos ad legendum materierum novitate queunt, et non sine magno fructu lecta dimittent. Nam ea tractant, quæ vel nemo alius, vel non ita plene, perspicue, docte. Unum illud, quod in Lumbrico lato huiusmodi est, integri scilicet descriptionem, supplere potes ex lib. II. c. XLII. Observationum Magni Viri D. Nicolai Tulpii, Senatoris, Archiatri et Anatomici Amstelredamensis gravissimi, felicissimi, facundissimi. Alterum, quod in Vteri observatione suspectum et Spigelii de ea judicio dubium est, huic plenam fidem facit ex Charissimi Parentis mei p. m. Antonii vander Linden, Medici olim Amstelredamensis, Observationibus excerpta similis Monstri historia et ad virum expressa imago. Redeo ad Anatomicam. In ea nobis Scriptores tres supersunt, quos Spigelii operibus interficere non sine gravi causa visum est, qui ea persequerentur quæ post Spigelium demum cognita Anatomiam passim illustrarent, limitarent, corrigerent, magno ad medendum usu. Non probat Galenus commentarium anatomicum, nisi novi aliquid contineat. Quomodo igitur istos non probemus tantum, sed admiremur etiam, qui in interioris naturæ sacrarium admisi inde nobis retulerunt, quæ universa antiquitas aut nescivit penitus, aut nisi per spississimam nubem non vidit. Quam intricata semper quæstio fuerit, multorumque animos torserit, Eadem mesenterii venæ ad-

A D L E C T O R E M.

revehantne simul hepatis chylum & ab eo sanguinem intestinis revehant, an non? ex Laurentio, aliisque constat. Eam tandem Gaspar Afellius, Vir eruditissimus, non opinionibus in natura male fundatis, sed experimentis decidit irrefragabilibus, ostenso novo vasorum in mesenterio genere, quod chylum ab intestinis suctum per *ductum* ad jecur distribuat, quemadmodum reliqua mesaraica per *ductum* ex eodem sanguinem ad intestina deferunt. Quod Venarum lactearum inventum, si quis animum advertat, plurimas in arte nostra utilitates supeditare tum ad cognoscendum, tum ad curandum morbos veteribus ignotos, nec posteris satis perspectos, potest. Uti & alterum illud Guilielmi Harveji, celeberrimi Viri, de Motu cordis & Sanguinis in corpore circulatione. Qua in re si cui non satisfacit numquam satis laudatum Harveji scriptum, is adeat avi nostri Phœnicis Cl. D. Iohannis Walæi Epistolam duas ad Thomam Bartholinum, quas ex nova Auctoris cura emendatas plurimumque auctas isti in commentarium subjunximus. Ita enim erudite novam illam de Motu sanguinis sententiam proponunt, tradunt methodice, adstruunt nervose, denique argumentis ab experientia simul & ratione depromptis, & contra omnes etiam objectiones immotis probant, ita plene omnes illius motus circumstantias, incompertas antea, deducunt, ut neque scriptionem quis accuratorem, neque firmiorem demonstrationem cupiat, nisi qui Solem sibi postulat ostendi. Taceo inventam ab illo noviter veram chyli concoctionem, expulsionemque ejus è ventriculo, quam non minimam lucem, morbis allaturam auguror, imo jam persentio. Quod reliquum est, Lector optime, magnopere laborandum mihi apud te non existimo in exponenda ratione cur novæ hujus operis editioni, angustissimis typis & primigeniis Casserii tabulis adornandæ, operam aliquam impendere & extare in eo memoriam mei voluerim; tum quod vitio verti aut posse aut deberi sciam nemini, qui diligentiam suam vel publicæ utilitatis studium in alienis quoque scriptis probare umquam posteritati studuit; tum quod omnium, quæ isthoc volumine continentur, eam esse & dignitatem & utilitatem satis jam innui, ut erubescere non debeam propter laborem male collocatum. Quem etsi eum esse satis intelligentem, qui nihilo plus splendoris dare istis queat, quam quævis inerrans Soli: attamen nec supervacaneum nec sterilem inveniet, quisquis antecedentes editiones cum hac postrema conferre non gravabitur. Indices in subsidium memorie & temporis compendium duplo ferme numerosiores damus & in paucos contractos & iis ne decipiaris, correctissimos. De erratis, quæ nobis à Typographia absensibus, irrepsérunt, opera non est monere. Nam & nemo non oculatissimus corrector dormitat quandoque, & sunt ea tam minuta aut evidèntia, ut sistere lectionem nequeant. Nunc te dimitto, benivole Lector, cum prece, ut nobis & labori huic favéas, & valeas. Dabam Franckera Frisorum, 14 Idus Febr. 1710.

IN ANATOMIAM

Clarissimi viri

ADRIANI SPIGELII,

Patavini Professoris.



Orrida mortalis spectacula cernite scenæ,
Frustraque, queis miserè dilaceratur Homo.
Vita Salusque istis habitant in partibus, & qua
Vita hominum, sese mors quoque parte locat.
Adspice, qui temet nescis, ferale cadaver,
Nexaque centenis ossibus ossa stupe.

Illatæ sunt fulcra domus, tabulata trabesque.

Hæc sunt ingenii stamina dura tui.

Exuviae tantæque rigent velamina molis.

Et quæ cuncta tegit molliter ossa, cutis.

Carnea compages sequitur, motusque magister

Musculus & facili pondera lege movet.

Currunt innumeris venarum flumina rivis,

Et membris præbent pabula læta suis.

Viscera visceribus famulantur & ordine pulchro

Officium varia quodlibet arte facit.

Summa tenet Ratio, tunicis secura cerebri,

Et quia sideribus proxima, sola sapit.

Palpitat æterno Cor implacabile motu,

Et media prudens se regione locat.

Est, quæ bile tumet statio, quæ nutrit amores,

Est, ubi ren falsas ejaculatur aquas.

Fecundos matrona sinus ostendit. & illa

Humani generis capsula prima patet.

Quæ reges Priamosque habuit, Brutosque Ducesque,

Et quos fullo suos dixerit esse lares.

Singula miramur. stomachi jecorisque labores.

Et distincta suis viscera mille locis.

Hæc supplex Natura vide, fabrumque potentem

Suspice & artifices hic venerare manus.

Pingite pictores tabulas, & pascite vestris,

Deliciis domini, lumina imaginibus.

Hæc mundum sanant tabulæ. diversa Creator,

(Vera loquor, gentes) SPIGELIUSQUE facit.

Totum hominem Deus hos ipsos compegit in artus.

Totum hominem nostro destruit ille bono,

Et tantum dissolvit opus. ne spernite, quavis

In tabula cerni se cupit ipse Deus.

Has ubi scæva, dolens, lævis conspexit ocellis,

Credidit Impietas, se Ratione regi.

C. BARLÆVS.



J. falk. sc.

Quem terris Bryxella dedit, Patavique Lycaum
 Obstupuit grandi Palladis ore loqui;
 Talis erat Veneto radians SPIGELIUS auro
 Talis erat, virum quem vult ipsa Salus
 Exuvias late nostris clarescit & extis
 Materies fame fulgida secius Homo est.

Hinc Italus Belgae dedimus. novus iste Machaon
 Luxit in Ausonio Fax peregrina solo
 Non querimus, Patres Veneti nunc redditis illum
 Inter scripta sibi frustra superstes agit
 Emeruere Duces servato cive triumphum
 Hic in dissecto cive disertus orat

C. Barleus

A D R I A N I
S P I G E L I I

BRUXELLENSIS

ANATOMICA,

OPERVM OMNIVM

TOMVS I.



AMSTERDAMI,

Apud IOHANNEM BLAEV,

c l o I o c x l v.

ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS

D E

H V M A N I
C O R P O R I S
F A B R I C A,

Libri Decem.

DANIEL BVCRETIVS

Vratislaviensis Philosoph. & Medic. D.

BENEVOLO LECTORI S.



Offero Tibi, Benigne Lector, Adriani Spigelii Clarissimi Viri, decem de Humani Corporis Fabrica Libros, quos mihi vita discessurus, ut in ordinem redigerem, commisit. Opus est, cum infinitis observationibus, tum methodo succincta, præclaris partium usibus, & dissectorum historiis mirifice exornatum. Adhæc, cum rari admodum sint, quibus resectionum studium placeat, nisi Medicinæ, cujus fundamentum est, gratia: totum opus sic institutum est, ut perpetuo ad Artis usum referatur. Hinc tot præcepta Chirurgis in suis operationibus notanda; tot difficilium Hippocratis locorum explicationes; viarum, per quas morborum transmutationes fiunt, tum consensus partium, demonstrationes. Accedunt plurima ab aliis aut non attacta, aut perperam descripta; sed imprimis nova Cerebrum dissecandi ratio, ad investigandos Capitis affectus maxime necessaria. Nec enim certe locum hic habet illud tritum Comici, *Nullum est jam dictum, quod non dictum sit prius*. Latuere multa majores nostros, quæ superior ætas edocuit, multaque nunc quoque abstrusa oculos fugiunt, quæ tempus in apricum produceret. Quanta vulgo in musculorum doctrina confusio; circa venarum, arteriarumque usum obscuritas; circa viscerum actiones difficultas? Hic tamen nullus dubito, quin elegantem ordinem, claram lucem, miram facilitatem invenias. Ne quid tamen desiderari posset, quod ad operis perfectionem faciat, ex Musæo ejusdem, Iulii Casserii Placentini, celeberrimi Dissectoris Tabulas Anatomicas, omnes novas, nec antehac visas, addidimus. Quæ sane quanti præstent aliorum adhuc editis, id nullo negotio edocebit, quod quæ in aliis singula fere tantum sunt commendatione digna, in his universa reperiuntur. Elegancia ad vivum accedens: multitudo necessaria; perfectio absoluta; magnitudo perspicua: artificium admirabile. Scio plurimis, nec iis indoctis, divitula has videri ab ipsis sectionibus: at recte rem æstimantibus videre licet, & iis, quibus nunquam Anatomias cernere contigit, in Authorum obscura alias lectione, facem esse: iis vero, quibus tam felices esse datum fuit, ut nonnunquam intuerentur, in tanta rerum varietate in fluxæ memoriæ subsidium cedere. Tuum est, benigne Lector, benevolo hæc suscipere animo, primisque nostris conatibus, vel Atheniensium monitu, quibus lege cautum erat, ne primi ingenii foetus exploderentur, favere. Venetiis, Anno MDCXXVII.

INDEX CAPITVM

In Libris decem de

FABRICA HVMANI

Corporis contentorum.

LIBER I

Externarum partium Appellationes, Figuram, Magnitudinem, & mutuam inter se Proportionem exponit.

- CAP. I. Externarum Capitis partium appellationes succincte explicat, Pag. 1
 II. De appellatione externarum Thoracis partium, 7
 III. De appellationibus partium externarum infimi Ventris, 7
 IV. De appellationibus partium externarum, quæ generationi sunt dicatæ, 9
 V. De appellationibus Manus, & partium in ea contentarum, 10
 VI. De appellationibus Pedis, & partium in eo contentarum, 12
 VII. De humani corporis figura, & magnitudine: tum quo pacto hæc secundum ætatē, sexum, regiones, & morbos differat, 13
 VIII. De Figura, & Magnitudine Capitis, partiumque in eo contentarum, 16
 IX. De Figura, & Magnitudine Thoracis, ac Mammillarum, 17
 X. De proportionē Infimi Ventris, & Puendorum utriusque sexus, 18
 XI. De mutua Artuum inter se proportionē, 20

LIBER II,

Qui ossium historiam proponit.

- I. Ossis naturam, usum, & differentias explicat, 21
 II. De partibus ossium, ubi nomina, quorum frequens in ossium historia mentio fit, simul explicantur, 24
 III. De ossium inter se structura, ac connexu, 26
 IV. De nutrimento, quo ossa aluntur, & per quas vias ad ipsa deducatur, 29
 V. An ossium aliquod sit principium, quemadmodum Venarum, Arteriarum, & Nervorum, tum quale illud sit, investigatur, 31
 VI. Brevis omnium totius corporis ossium divisio, & enumeratio instituitur, 31
 VII. Agit de Cranio in univ. sum, suturaeque Capitis proponit, 32

- VIII. De ossibus Capitis, sive Calvaria propriis agit, 34
 IX. Describit tria oscula auditui inservientia, 37
 X. De osse Cuneiformi, & Spongioso, 37
 XI. Agit de osse Iugali, 39
 XII. Ossium Faciei, sive Maxillæ superioris, & inferioris, descriptionem tradit, 39
 XIII. Dentium numerum, historiamque proponit, 42
 XIV. Ossis hyoidis historiam tradit, 44
 XV. Describit Claviculas, 45
 XVI. Sterni, sive ossis pectoris historiam proponit, 46
 XVII. Scapularum historiam explicat, 47
 XVIII. Quæ de spina in univ. sum dici possunt, persequitur, 48
 XIX. De vertebri Cervicis, 49
 XX. De Thoracis, ac Lumborum vertebri, 50
 XXI. De osse sacro, 52
 XXII. De osse coccygis, 52
 XXIII. De Costis, 53
 XXIV. De osse Innominato, 54
 XXV. De osse Humeri, 57
 XXVI. De ulna, & Radio, 58
 XXVII. De ossibus extremae Manus, & Sesamoides appellatis, 59
 XXVIII. De osse Femoris, & Patella, 61
 XXIX. De Tibiæ utroque osse, 62
 XXX. De ossibus Pedis extremi, 63
 XXXI. De Vnguibus, 66

LIBER III,

Qui de Cartilaginibus, & Ligamentis agit.

- I. Cartilaginis naturam, usum, & differentias proponit, 68
 II. De Cartilaginibus supremi ventris, sive Capitis, 70
 III. De Cartilaginibus mediis, infimique Ventris, 71
 IV. De Ligamentis agit, quorum naturā, usum, & differentias breviter persequitur, 72
 V. De ligamentis, quæ in capite, thorace, ac imo ventre occurrunt, 74
 VI. De

INDEX CAPITVM.

- VI. De ligamenti Artuum, ac primo Manus, 75
VII. De ligamenti Cruris uniuersi, 76

LIBER IV,

Qui Musculorum historiam persequitur.

- I. Quid sit Musculus, & que ejus actio, 78
- II. Que sit musculi constructio, & quibus ex partibus constet, 81
- III. Enumerantur omnes musculorum differentie, quæ alicujus sunt momenti, 85
- IV. Que difficultates sese in musculorum historia offerant, & quibus modis tollantur. 88
- V. Frontis, palpebrarum, oculorum, nasi, buccarum, labiorum, maxilla inferioris, & aurium musculos proponit, 89
- VI. Persequitur historiam musculorum lingua, ossis hyoidis, faucium, & laryngis, 95
- VII. De musculis Caput, & Cervicem moventibus, 97
- VIII. De musculis Thoracis, 100
- IX. De musculo Subclauio, 106
- X. De infimi Ventris, & primum, de musculis abdominis appellatis, 107
- XI. De musculis Lumborum, 114
- XII. De musculis Testium, Vesicæ, Ani, & Penis, 115
- XIII. De musculis Scapula, 116
- XIV. De musculis ossis Humeri, 117
- XV. De musculis ossis Cubiti, 119
- XVI. De musculis Radii, 120
- XVII. De musculis Carpi, vel potius toti manui dicatis, 121
- XVIII. De musculo, cujus latus tendo mediae rotulae subnascitur, quem Palmarem vocant, 122
- XIX. De musculis manus digitos flectentibus, 122
- XX. De musculis manus digitos extendentibus, 124
- XXI. De musculis manus digitos oblique ad latera trahentibus, 125
- XXII. De musculis Femoris, 126
- XXIII. De musculis Tibiæ, 128
- XXIV. De musculis Tarsi sive Pedis, 129
- XXV. De musculo, cujus latus tendo, mediae plantae subnascitur, & Plantaris propterea vocatur, 131
- XXVI. De musculis pedis digitos flectentibus, 131
- XXVII. De musculis pedis digitos extendentibus, 132
- XXVIII. De musculis pedis digitos ad latera oblique moventibus, 132

- XXIX. Brevis omnium totius corporis musculorum enumeratio, memoria gratia, instituitur, 133

LIBER V,

Quo Venarum natura, earumque per uniuersum corpus series describitur.

- I. Venarum naturam, actionem, & usum explicat, 138
- II. Differentias venarum breuiter enumerat, 141
- III. Disputationem Medicorum & Philosophorum de principio Venarum continet: tum Auctoris sententiam in medium adducit, & probat, 142
- IV. Cur duæ venæ, Portæ nempe dictæ, & Cava facta sit, tum que ipsarum inter se differentia sit, & connexio, 146
- V. Ramos, sive propagines venæ portæ rectat, & Hippocratis aphorismum huc maxime facientem explicat, 148
- VI. Superiorem, sive Ascendentem Venæ cavæ truncum, tum ramos per caput dispersos, recitat, 153
- VII. Axillaris Venæ per brachium distributæ seriem proponit, 157
- VIII. Inferiorem, sive descendentem venæ Cavæ truncum explicat, 159
- IX. Iliaci rami exterioris per crus diffeminatæ propagines, & ramos enumerat, 162
- X. Sanguinis definitio proponitur, & declaratur, 164
- XI. Animalium quædam sanguinea, quædam exsanguia esse, & quamobrem, 166
- XII. Sanguinem heterogeneum esse probatur, inde quibus ex partibus constet, & quæ harum causæ sint, investigatur, 167
- XIII. Differentias sanguinis persequitur, 168

LIBER VI,

Qui Arteriarum naturam, earumque per uniuersum corpus distributionem persequitur.

- I. Arteriarum naturam, actionem, & usum cum differentiis explicat, 171
- II. Superiorem, sive Ascendentem Arteriæ magnæ truncum, & propagines per caput distributæ, proponit, 174
- III. Axillaris Arteriæ per brachium digestæ seriem enarrat, 176
- IV. Inferiorem, sive descendentem Arteriæ magnæ truncum, ejusque per medium ac infimum ventrem propagationem proponit, 177
- V. Iliaci

INDEX CAPITVM.

- v. Iliaci rami per crus propagati soboles, 183
vi. Vene arterialis, & Arteriae venalis historiam complectitur, 184

LIBER VII,

Qui universam Nervorum historiam complectitur.

- i. Nervorum naturam, actionem, & differentias explicat, 185
ii. De Nervis Cerebri, 188
iii. De nervis spinalis medulla proprie sic dictae, & primo quidem vertebrarum cervicis, 193
iv. De nervis medulla vertebrarum Thoracis, 196
v. De nervis medulla vertebrarum Lumborum, 197
vi. De nervis medulla ossis Sacri, 198
vii. De nervis per Brachia distributis, ibid.
viii. De nervis per Crura digestis, 200

LIBER VIII,

Qui historiam infimi ventris continet.

- i. De Cute, 202
ii. De Pinguedine, 210
iii. De membrana carnosae, 213
iv. De Peritoneo, ibid.
v. De situ, tam naturali, quam eo qui praeter naturam est, omnium quae in imo ventre continentur, viscerum, 216
vi. De Omento, 219
vii. De Gula, 223
viii. De Ventriculo, 224
ix. De intestinis, 227
x. De Mesenterio, 232
xi. De Pancreate, 234
xii. De Hepate, ibid.
xiii. De Vesicula biliaria, 237
xiv. De Liene, 239
xv. De Renibus, & his succenturiatis glandulis, itemque canalibus urinae transitum concedentibus, 243
xvi. De Vesica urinaria, 245
xvii. De partibus genitalibus in mare & primum quidem de iis, quae seminis generationi interviunt, 247
xviii. De iis partibus, quae virilis seminis excretioni sunt dicatae, 249
xix. De partibus genitalibus in foemina, & primo quidem de Pudendo muliebri, 254
xx. De Utero, 257
xxi. De testibus, ipsisque annexis vasibus praeparantibus, deferentibus, & cecis, 260
xxii. Traditur actio & usus singularum partium, quae ad genitalia mulierum referuntur, 261

- xxiii. Exponit differentias, quae in partibus genitalibus gravidae, & ejus quae utero non gerit, observantur, 263

LIBER IX,

Qui medii ventris historiam complectitur.

- i. De quatuor communibus medii ventris integumentis, 265
ii. De mammis utriusque sexus, 266
iii. De Pleura, sive costas succingente membrana, 268
iv. De Mediastino, sive membranis cavitatem thoracis intersepientibus, 269
v. De Pericardio, & humore in ipso contento, 270
vi. De Corde, ejusque partibus externis, 271
vii. De Cordis partibus internis, Ventriculis inquam, & Ventrulis, 273
viii. De actione, & usu Cordis, partiumque ipsius, 275
ix. De unione vasorum cordis in fœtu, quae in nato perit, ubi modus simul aperitur, quo non ipsa solum perditur, sed & vasa umbilicalia in editis cavitatem suam amittunt, 279
x. De Pulmonibus, & eorum aspera Arteria, 280

LIBER X,

Qui supremi ventris historiam continet.

- i. De capillis, & quatuor communibus summi ventris integumentis, 285
ii. De Pericranio, 287
iii. De duabus cerebrum obcingentibus membranis, 288
iv. Cerebri, quatenus id in Veteri sectione se offert, historiam nectit, 290
v. Cerebelli, ejusque partium juxta Veterum dissectionem, enarratio, 292
vi. Spinalis medulle, secundum Veterum placita, descriptio, 293
vii. Cerebri eam dissecandi rationem, quam Recentiores invenerunt, primum proponit, mox partium ejus beneficio inventarum, aut aliter comparentium, historiam nectit, 294
viii. De Actione & usu Cerebri, 296
ix. De oculo interno, sive visus instrumento, 299
x. De aure interna, sive organo Auditus, 301
xi. De naso interno, sive olfactus instrumento, 303
xii. De gustus, tactusque instrumentis, ibid.

A D R I A N I S P I G E L I I

B R V X E L L E N S I S ,

D E

H V M A N I C O R P O R I S

F A B R I C A ,

L I B E R P R I M V S ,

Externarum partium Appellationes, Figuram, Magnitudinem,
& mutuam inter se Proportionem exponens.

C A P V T I.

Externarum Capitis partium appellationes succincte explicat.

Ex iis nu-
mers, quos
marginis ad-
scripsimus,
pro demon-
stratione
eorum quæ
in historia
traduntur,
primus Li-
brum desi-
gnat, secun-
dus Tabu-
lam, tertius
Figuram.



Humani Corporis fabricam tradituri, initium ab externarum partium historia desumendum duximus, sapientissimi Platonis præceptum sequentes, qui omnem, quæ à recta ratione de aliqua re suscipitur tractationem, ab iis exordium petere iussit, quæ tum oculis, tum animo manifestiora essent. At hæ partes ex cæteris nec ita abstrusæ latent, ut quisquam sit cuius oculos subterfugiant: nec ita difficiles explicatu, quin vel rudis quisque animo suo comprehendere valeat. Accedit, quod hæc prævia tractatio, ad reliquorum quæ nobis postmodum dicenda sunt, & majoris momenti erunt, & mentem

requirunt solertiolem, perfectam absolutamque cognitionem immensum quantum utilitatis afferat. Quemadmodum enim, qui vastam orbis terrarum descriptionem tradituri sunt, ut regionum, urbiumque immensam multitudinem promptius edoceant, rudia primum lineamenta ducunt, quibus amplum quendam situm crassa minerva representant, ut montes postea, oppida, fluminaque tradentes, quo sese referant, citra negotium inveniant. Sic in tam difficili corporis nostri fabrica, in qua tanta partium varietas, tantaque multitudo sese offert, ut vix hominis unius ætas ad ediscendum sufficiens esse videatur, si primum rudem quandam veluti tabulam menti adumbratam in externis partibus exhibuerimus, ad quas interiorum postea situm referamus, plurimum operæ pretium fecisse merito videbimur. Est igitur externarum partium tractatio, non utilis tantum cuiusvis, qui operam suam locare dissectionum studio voluerit; sed prorsus etiam necessaria, nisi animo semper anceps dubiusque hæere cupiat, ejus instar, qui in vasta montium congerie, aut sylvarum inviis viis errabundus, quo pedem figat, hinc inde ambiguus cursitet. Tractatio autem hæc, etsi prima fronte levis admodum esse videatur, non tamen levis in ea sese offert difficultas, quod nomina illa, quibus externæ partes veniunt, infinita pæne sint, tum quod partes ipsæ plurimæ existunt, tum quia autores varietate vocum supra modum delectati fuisse videntur. Ut tamen huic medeamur malo, & aliquod memoriæ subsidium conferamus in medium, methodo utemur, quæ obscura omnia dilucidet, ignota cuncta aperiat, difficultia quæque planissima reddat. Exordiemur autem à generali totius corporis divisione, quæ etsi diversa à scriptoribus vulgo tradatur, unam tamen illam servandam censuimus, quam Galenus ubique locorum secutus est, sed imprimis 7 de us. part. 21, universum corpus, in ventres & artus, sive extrema, dirimendo. Vocatur VENTER insignis aliqua corporis cavitas, in qua viscus aliquod primarium reconditum est: ARTVS vero, extremæ partes, trunco corporis ramorum instar adnatæ, cujusmodi sunt Manus ac Pedes. Hos Græci κεῖρα, illos ποῖδες appellant, non tamen sine insigni vocis ambiguitate. Vsurpatur

Ratio ordinis.

*Difficultas
huiusmodi
trac-
tionis.*

*Generalis to-
tius corporis
divisio.*

A

enim

2
 κεφαλή
 αὐτοῦ ἐστὶν

enim κεφαλὴ nonnunquam strictiote significato pro abdomine, sive infimo ventre, quomodo Hippocrates sumpsisse videtur, cum 2 aphor. 53, ὁ κοῖται, inquit, πῶς κεφαλὴν ὑγρὴν ἔχει, νέει μὲν ἔντες, βέλπον ἀπαλλάσσει τὴν ξηρὴν ἔχοντων, quibus alvus est humida, dum quidem juvenes sunt, melius degunt, quam hi, qui siccas habent. Interdum adhuc strictius sumitur, & Ventriculum significat, unde τὸ σῆμα τῆς κεφαλῆς dicitur, quod apud Latinos orificium Ventriculi appellatur. Sic & Pollux accepisse videtur, dum ὡς, inquit, τῇ κεφαλῇ συνδεδεμένη ὁ σῆμα, hoc est, ventriculo gula adaptatur. Strictissime tandem, auctore Philotheo, ad lib. 1 aphor. 15, pro quavis cavitate parva, quæ in profundo sita est, sumitur, sive cibum suscipiat, sive non, quemadmodum κεφαλὴν ἔχει κεφαλῆς, καὶ τῆς καρδίας, cerebri cordisque ventriculi dicuntur. Hinc apud Aristotelem 1 hist. animal. 17, ἡ κεφαλὴ ἔχει μὲν τῆς κεφαλῆς, hoc quidem tres ventriculos habet. Nos hoc loco κεφαλῆς vocabulo cum Galeno insignem aliquam cavitatem intelligimus, quæ viscus aliquod principale complectitur, cumque tria sint, totidem quoque Ventres constituimus, ex quibus primus & superior est Caput; medius, Thorax; infimus, Abdomen, improprie sic dictum. CAPUT ergo primus venter est, quæ voce ampliore propinque significatione, totum id appello, quod primæ colli vertebræ imponitur. Pressa enim significatione Medici nonnunquam capite pro cerebro utuntur, dum hoc læso, caput affectum esse dicunt. Interdum etiam angustiore adhuc, pro capillatâ tantum parte, quæ ratione sumpsit Hippocrates dum κεφαλῇ τῶν κεφαλῶν, de vulneribus capitis, librum inscripsit: intelligit enim tantum ea vulnera, quæ calvariæ insiguntur, quo pacto & nostræ ætatis Chirurgi hanc vocem accipiunt, faciei vulnera, à capitis vulneribus distinguentes. Dicitur autem Caput, vel, quia sensus ab eo initium capiant, quæ notatio Varro ad Ciceronem placet: vel, quia cerebrum capit, partium omnium nobilissimam. Græcis κεφαλῇ, quasi dicas, κέφαλον aut κέφαλον, quod putamen, vel testam significat. Dividi solet in duas partes, in capillatam, & glabram. Capillatâ, τελεωτὴς Aristoteli 1 hist. animal. 7, & κρανίον, Latinis Calvaria, & Cranium, vocatur, quod iterum in quatuor minores dirimitur, in anticam scilicet, posticam, & laterales partes, quas inter Vertex, tanquam centrum in medio, constitutus est, hujus divisionis author. Pars enim quæ à vertice ad anteriora & frontem tendit, Synciput: quæ huic contraria est, à vertice ad posteriora & cervicem excurrens, Occiput dicitur: hinc ab eodem vertice ad latera utrinque & aures, Tempora, sive, ut quibusdam placet, Tempora, pertingunt. Synciput ergo, quasi summum caput vocatum, Aristoteli βρεῖγμα dicitur, Homero βρεῖγμα, quod irrigare significat, eo quod humidissima capitis pars & mollissima in infantibus videatur, cum neque ossa sit, sed membranosa: neque corroborari queat, sed tenera maneat, donec, Plinio tradente, primus sermo eruperit. Occiput, ὀπίον, ὡς, ὡς, quod fibrosa ea pars sit, & nervosa, principio nervorum illic existente. Tempora, quod ætatis tempus indicant, in Viris quidem canitie, in Fœminis calvitie: Græcis κροῦρον, ὡς κεφάλῳ, quod eo loci ad tactum pulsus sit evidens. Duo sunt, utrinque ad latera syncipitis, inter oculos & aures, ubi caput paulo compressius est, posita. Media hinc inter has partes Vertex est, veluti centrum calvariæ, circa quem pili quasi in gyrum vertuntur, à quo & nomen accepit teste Quintiliano, lib. 8 institut. Aristoteli, & Introductori κεροφῇ dicitur, ὡς κερόν, quasi dicas κεροφῇ, quod ea pars capitis crinibus maxime tegatur. Sunt nonnulli, quibus geminus est, non ossis tamen, sed capillorum tantum æquamento, & hi δικεροφῇ, bivertices dicuntur. Cæterum pili, qui calvariam contegunt, speciali voce Latinis Capilli, ad aliorum discrimen appellantur, quasi dicas, capitis pili, sed Pollux κρόσιος, ὡς τὸ κρόσιον, quod tonderi consueverint. Inter hos linea quæ ad frontem à vertice excurrit, in dextram sinistramque partem capillitium dirimens, potissimum vero in mulieribus, Aristoteli λίσσιμα, καὶ λίσσιμα τὸ τελεωτὴν dicitur. Doctissimus Gaza, Discrimen, ὡς æquamentum capillorum vertit. In his notanda est crispitudo, & rectitudo, itemque color, ex quibus de temperamento hominis judicium fiat.

Alterâ pars capitis glabra, & capillis privata, calvæ subiecta est, & in faciem atque aures dividitur. FACIES, Græcis πρόσωπον, ὡς τὸ πρόσωπον ὅτι ὁρᾷ, καὶ φωνὴν εἰς τὸ πρόσωπον, quod solus homo inter cætera animantia erectus sit, vocemque anteverfus emittat, ut docet Aristoteles, 3 de part. anim. 1. Propterea & πρόσωπον τὸ μόνον τῶν ἀνθρώπων

ζώων

ζῶον αὐθιγῶντι ἐνομαζέσθαι, eodem teste, 1 histor. anim. 8, cum uni homini facies concessa sit, reliquis animantibus cunctis, Rostrum. Vocatur autem *Facies* totum id, quod à capillorum terminis in syncipite exordiens, ad mentum usque excurrit. In hac præclarum quoddam divinæ sapientiæ elucescit specimen, venerandaque majestas, quæ vel crudeles quosque animos ad mansuetudinem, vel indomitos ad amorem ducat. Quin imo in eo faciei decor speciesque olim honore fuit, ut primæva ætate honores & opes, pro faciei cuiusque dignitate distributas fuisse prodiderit Lucretius lib. 5:

Et pecudes, & agros, diviserat atque dedere,

Pro facie cuiusque, & viribus, ingenioque.

Nam facies multum valuit. —

Est enim speculūm animi, morum index, & sedes mentis, unde & *Vultus* dicitur, quod voluntatem detegat. Partes habet plures, frontem, nasum, oculos, genas, labia, os, & mentum, de quibus singulis nunc ordine dicendum.

Partes faciei.

FRONS ergo, Latinis à ferendo dicta est, quod animi mores præ se ferre soleat, Frons.

Græci à situ *μετωπῶν* vocant, quasi dicas, partem post oculos sitam, *μετὰ τὸς ὀφθαλμούς*. Superius, syncipite; inferius, superciliis & glabella; ad latera, temporibus utrinque coercetur. Hujus cutis, quæ sola in homine mobilis est, *αὐτὸς μέλιωσις* vocatur, at latino nomine caret. In hac lineæ apparent, ex quibus contracta fronte *Rugæ* generantur, *ρυτίδες*, & *ἀμυγροί* nuncupantur. Has Physiognomi observant, qui & propterea Metoscopi appellati, cum naturæ, fortunæque hominis signa, & indicia esse profiteantur. Sunt autem hæ lineæ duplices; aliæ enim in longum, aliæ vero in latum extenduntur, & illarum iterum septem sunt, singulæ singulis Planetis dedicatæ. Nec tamen omnes in omnibus conspicuæ sunt, sed quadam interdum abfunt. Vt plurimum comparent, quas Mercurio, Veneri, & Iovi tribuunt, suntque omnes evidentiores si supercilium tollatur, quod paulo altius cogitantibus evenire solet, & tunc *Ἰσοκυρίων* vocatur, ac si diceres, superintensorium, quemadmodum si quis rectas cum transversis ruget, quod irascentibus accidit, *νέφθη*, & *νεφέλη*, hoc est, nubes appellatur. ad hoc allusit Poëta, dum canit,

Deme supercilio nubem. —

Ex inferiore parte frontem excipiunt *SPERCILIA*, quæ & propterea eleganter hirsutas frontis extremitates cognominat Ruffus. Pili sunt oblonga serie, in frontis & oculorum confinio extensi, ut sudores ab illa defluentes excipiant, ab his depellant. Græcis *ὀφρύες* dicuntur non nota etymologia; Latinis à situ supercilia, quod supra palpebras locata, quæ antiquitus *Cilia*, ab officio oculos celandi, vocabantur. Pars ergo ipsorum, quæ nasum respicit, *ὀφρύων κεφαλὴ* *Superciliorum caput*: quæ ad tempora, *ὀφρύων ἔξω*, *Superciliorum cauda* vocatur. Vt autem palpebræ duæ sunt, ita & supercilia duo, quorum interstitium *μεσσηριον*, quasi medium supercilium à Græcis; à Latinis, quod pilorum expers sit, *Glabella* dicitur, quamvis nonnunquam hirsutum quoque reperitur, protensis ad nasum, & coeuntibus invicem superciliis, quod signum Aristoteles 1 hist. animal. 9, *σπινθηρῆ*, austeri & acerbi hominis esse tradit, & tunc *σπινθηρῆ* vocatur.

Supercilia.

NASVS postea sub glabella succedit inspiciendus, quem ab officio Græci *ῥίνα*, *ῥιζή* *Nasus*. *ῥῖνον*, & *μυκτῆρα*, ac *μυκτῆρα*, à muco, cerebri excremento, quod per ipsum fluit, appellant. Dividitur in partem superiorem, quæ ossea est, ac immobilis: & in inferiorem, quæ cartilaginea, mobilisque. Vtraque iterum in duo latera dispescitur, & inter ipsa in partem mediam, quæ acuminata est, & *ῥιζή*, *ῥίζα*, ac *dorsum* dicitur, cujus summitas, *ῥιζή*, *Colatorium*, ab usu suo vocatur, quia mucus per ipsam tanquam per cribrum colatur, quamvis, ut ostendemus inferius, id non nisi præter naturam fiat. Os enim *ῥιζοειδές*, sive spongiosum, odoribus potius, quam excrementorum purgationi dicatum est à Natura. Foramina duo, quæ inferius patent, *ῥίνας* Aristoteli, *ῥιζοειδές* Dioscoridi, seu *Columna* appellata, cui superiore parte *interseptum osseum*, *διεφραγμα* Aristoteli cognominatum, jungitur. Partes vero mobiles, quæ inferius sunt, *ῥιζοειδές* Polluci, Latinis *Nares*. *Alæ*, & *narium pinnæ* vocantur. Extrema autem nasi rotunditas protuberans, *σφαλερον*, *Ala*. *ῥιζοειδές*, & *globulus*: at pili in narium antro crescentes, *ῥιζοειδές*, & *Vibrissæ*, quod *ῥιζοειδές* caput vibretur, concutiatque.

Nasus.

Nasi divisiō.

Spina nasi.

Nares.

Columna.

Ala.

Nasi globulus.

Vibrissæ.

^a OCVLVS EXTERNVS, sic dictus ad differentiam interni, qui ad aliam tractationem pertinet, sub superciliis, & à latere radicis narium collocatus est, duabus partibus constans; una, quæ pro integumento interni oculi servit; altera vero, quæ ad ipsum quidem oculum internum pertinet, at quatenus nobis sine dissectione in conspectum se profert, suo quasi jure ad externum referri videtur. Prior illa, ^b PALPEBRÆ vocatur, à palpitando, quod inter loquendum frequenter palpitent, & à nobis moveantur, Græcis βλέφαραι, ὡς δὲ τὸ βλέπειν à videndo, quod iis apertis homo videat: vel certe, quia sunt βλέπειν φάρις, hoc est, *Visus tunice*, & opercula, unde nec male, & eleganter profecto à Poëta, ἑμμελίωφυλλα, *Oculi folia*, dicuntur. Sunt autem palpebræ in utroque oculo binæ, quarum quæ superior est, oculum à superiore parte operiens, καὶ λῆς: altera, quæ inferior, & ab infima parte contegens, καὶ λον, καὶ ἀνάσσειον Polluci vocatur. Hæ cum ad oculi tutelam, maxime dormientibus, claudantur, si in somno conniveant, ut alibi aliquid cernatur, indicia Medicis præbere solent exitialium febrium, indubitataque mortis. sic enim hoc signum Hippocrætes prognostic. interpretatur, nisi forte à superpurgatione, aut magno alvi profluvio, vel etiam alia externa causa contigerit, tum enim minus malum portendit: alias summam omnium naturalium, vitaliumque facultatum imbecillitatem significat. In quibusdam tamen naturale esse, apertis dormire oculis, observavimus. Quare cavendum est, ne præcipiti nimium judicio hic forte labamur; sed qualis valenti conditio fuerit, prius investigemus. Caterum pili qui utriusque palpebræ extremitates cingunt, καὶ τῶν βλέφαρων, ^c βλεφαρίδες dicuntur: Latinis quibusdam, inter quos est & doctissimus Theodorus Gaza, *Cilia*, sed male vocantur, id quod recte summus vir Scaliger jam ante observavit, & monuit: Plinius, & Lucretius *palpebras* vocant. Cartilagine autem semilunares, quæ palpebrarum extremitates firmant, & inversis ipsis visui se offerunt; clausis, invicem junguntur, καὶ ἐπὶ, *palpebrarum crepidines*, & Antiquis *Cilia* quoque dicebantur. Harum fines sese invicem secantes, utrinque oculorum angulos constituunt, τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ὠθῆς, quorum qui ad nasum est, ^d Major angulus; qui ad tempora, ^e Minor, & est, & nuncupatur. Græci tamen majorem peculiari voce, & proprie ἐγκαιθὴν appellant, quam vocem postea Vesalius ad carunculam eo loci positam traduxit. Hefychio pulchre καὶ γὰρ dicitur, *fontis*, quod lachrymæ inde quasi scaturire videantur. Est enim illic ^f Foramen in inferioris palpebrae tarso, magnitudine quidem exiguum, sed profunditate summum, ex quo lachrymæ emanant. Hoc si acriorum humorum fluxu tentetur, five lachrymæ illi sint, five pus ab inflammatione vicinarum partium affluens, affectum parit, quem Medici nostri *Fistulam lachrymalis*, Græci αἰγύλασσι vocant. Si quis exactius foramen id videre desideret, bovis modo macerati oculum intueatur, in eo enim insigne admodum esse consuevit. Est etiam in fœminis majus, quam in maribus, & in iis, qui lachrymis delectantur, quam qui ab ipsis abstinant. Tandem inter ossa, & utramque palpebram, exiguæ quædam cavitate reperiuntur, semicirculares, quarum superior, ^g Cavum oculi, καὶ λον; inferior, ^h subcavum, καὶ τὸ καὶ λον dicitur. Vtraque cavitas, sed præcipue inferior, in cachexia, & hydropo intumescere consuevit, maxime vero, si à longo mensium, aut hæmorrhoidum profluvio nascantur. Idem in longis vigiliis, & incipientibus ophthalmiis contingit. Menstruo autem fluxu laborantibus, tumor fit lividus: at lue venerea pressis, pallidus, cum insigni splendore, qui mihi semper Gallici morbi certissimum signum dedit.

Oculus. Palpebris sic visis, visorium deinde organum inspiciendum est, quod Oculus appellatur, ab occultando. Græci à munere suo ὀφθαλμῶν, quasi ὠπὸς θάλαμον, *visus cubiculum*: & ἑμμελίω, ὡς δὲ τὸ ἐπιδεῖν, à videndo vocant. In hujus medio niger circulus, lucidusque admodum est, speculi instar, speculi etiam officio fungens, quod imagines repræsentet oppositas, ⁱ Pupilla dictus, Aristoteli κόρη, Ruffo γλῶττι. Hunc ambit alius, magnitudine quidem priorum superans, sed claritate victus, quem Græci ἑρῶα vocant, à similitudine, qua cælestem arcum, varietate, & pulchritudine colorum refert, unde & Romani quoque hanc vocem retinentes, ^k Iridem appellarunt. Colores Iridi Aristoteles. 1. histor. animal. 2. 6. tres tantum constituit, glaucum, nigrum, & medium inter hos duos. Generantur autem hi. aut multitudine, aut paucitate, aut situ quodam certi humoris. Solus tamen ferè Homo inter cætera animalia, diversi coloris oculos obtinet, nec ratione tantum

Palpebra.

Oculorum anguli.

Foramen in inferioris palpebrae tarso.

Cavum oculi.

Subcavum.

Observatio.

Oculus.

Pupilla.

Iris.

Colores Iridis.

tantum individuorum, sed & integrarum nationum. *Niger* enim fere est *Æthiopi-*
bus color : *cæsius* Belgis, & Septentrionalibus : *subrus*, Italis, vicinisque gentibus.
Fuerunt autem ex antiquioribus Græcis, qui *σφοδρῶς* vocavere; posteriores tamen extre-
mitatem tantum ipsius, quæ inter Iridem proprie dictum, & album est, hac voce di-
gnantur. Est autem ^a *Album oculi*, τὸ λεκόν, totum id, quod, extra dictas partes, albi colo-
ris existit, & à cornea tunica constituitur. Offa vero, vel impendunt, vel subiecta oculi-
lis, ὑποόπτα, καὶ ὑποφθαλμοὶ vocantur. Latine si velis reddere, non male *Subocularia* dixeris.

Album oculi.

Sequuntur nunc duæ aliæ partes, quas Arist. 1 histor. animal. 11, *σιαρύνους* vocat, ὅτι σινοῦσι
περιαρύνειν, quod motu concutiantur, facitque unam earum anteriorem, quam *ῥέσιον*
vocat : alteram posteriorem, quam *ῥήσιον*. Partes sunt, quæ utrinque auribus, naso,
oculisque subsunt, & ad mentum usque protenduntur. Latinis, ut puto, recte *GENÆ*
dicuntur, γενῶν τὸ γέννησθαι, quod hæ partes barbam in viris producant, unde, nec inepte
fortassis, *Barbitium* in his appellarentur, si cui nomina fingere placuerit. Est autem
duplex *Gena*, superior, & inferior, ἡ ἀνω καὶ ἡ κάτω ῥήσις Aristoteli, dict. loc. *Superiorem* (quæ
b, i. i. h. & ^b *MAXILLA SUPERIOR*) constituunt sub oculis, internasum & aures, duæ illæ ro-
tundæ faciei eminentiæ, soli homini concessæ, quæ pudoris sedes esse consueverunt.
rubescunt enim primum omnium pudore affectis. latine dicuntur *Malæ* à similitudi-
ne (ut quibusdam placet) qua malum, sive pomum, non rotunditate solum sua, sed
et colore subrubro referunt, quamobrem & Græcis *μήλας* vocantur. Cicero tamen, in
Orat. malam à maxilla dictam fuisse ostendit, abjectis mediis literis, quomodo voces
sæpe contrahuntur; non usus causa; sed aurium. Sic ex axilla, ala: ex taxillo, talus fa-
ctus est. Polluce teste, *γνάθῃ* etiam dicuntur, unde mutuavit nomen *Parasitus* ille apud
Terentium. Hippocrates, lib. de morb. mulier. eleganter κύκλους ἑπεσώπων, circulos faci-
eiei nominat. Solet autem hæc pars in Peripneumoniacis inflammari, aut maxime ru-
bere, quod fit, quia sanguinis copia affluens, propter tenuitatem ipsius cutis, quæ hoc
in loco summa est, imprimis transparet, tum etiam, quia vasa ibi majora sunt paulum,
& pinguedo nulla subiecta, quo fit, ut humoris abundantis, vel concurrentis eo color
facillime transpareat. ^c *Inferior* autem pars, quæ laxior est, & aëre inflata tumet, pro-
prie *γνάθῃ* dicitur, *Bucca* Latinis. In hac in nonnullis ridentibus rima, in aliis ruga, in
quibusdam fovea comparet, quam Martialis *Gelasium*, τὸ πῦ γελᾶν appellat.

Gena.

Maxilla su-
perior.

Obliquo.

Bucca.

Gelasium.

Labia.

Sub naso, & genis continentur ^d *LABIA*, quæ & *LABRA* Ciceroni, Aristoteli *χεῖλας*,
τὸ πῦ χεῖν λέγον, quod vocem fundant. Opercula sunt oris, dentium deformitatem te-
gentia, numeroque duo. *Superius*, ἀνώχελον dicitur; *inferius*, κατώχελον. Extremitates
ipsorum rubeæ, *περὶ χεῖλον*: sin committantur invicem, *περὶ στήμιον* dicuntur. Ipsum autem
foramen, quod apertura sua producant, τὸ στόμα, *Os* cognominatur.

Aperto ore, aut sublati labiis occurrunt in maxillæ utriusque circuitu ^e *DEN-*
TES, Græcis ὀδόντες, quasi ἔδοντες, ab ἔδω, quod est, comedo, dicti. Latinis etiam *Den-*
tes, quasi edentes. Horum numerus diversus est, non quidem ratione sexus, ut male cen-
suit Aristoteles, (cum viderim fœminarum dentes superasse numerum dentium ma-
rium) sed ratione ipsorum individuorum, cum in aliis plures, in aliis sint pauciores: ma-
gna tamen pars triginta duos obtinet, ut utrique maxillæ sedecim competant. Ex qui-
bus quatuor sunt Incisores, qui medium locum occupant; duo Canini, utrinque unus,
ad incisorem latus; & quinque Molares. *Incisores*, πικρῆς, τὸ πῦ πικρῆν, dicti sunt, ab offi-
cio, quia cibum acie sua tenui, (à qua & ἔξῃς, acuti appellantur) secant: à loco vo-
cantur *πρωτοὶ*, *primores*, ab Hippocrate. *Canini*, κυνέδοντες, quia reliquis sunt longio-
res, & respondent dentibus duobus acutis admodumque exsertis canum. *Molares*,
μύλας, quia incisum cibum, veluti molæ, conterunt, & in minutissimas partes redigunt.
Sed cum hi postremi non semper, aut omnibus omnes crescant, aut non omni tempo-
re: sed sæpe in matura ætate exferantur primum & nascantur, quemadmodum ultimi
molarium, qui propterea quoque σωφρονιστῆρες ab Hippocrate sunt appellati, quod plerum-
que oriantur ubi Homo jam sapientiæ annos attigit, fit, ut maxima sit de numero den-
tium apud authores discrepantia. Cæterum *margines* illi maxillarum, in quibus seria-
tim continentur, Græcis *φάγνια* dicuntur: at *alveoli*, quos singulos singuli habent, βύττια.
Intervalla autem quæ dentes à se discernunt invicem, *ἀρμυῖα* vocantur. Caro dentium,
quæ circa *φάγνια* est, dura atque immobilis, dentes ceu vallum cingens, *Gingiva* Latinis,

Dentes.

Incisores.

Canini.

Molares.

Gingiva.

ἔλον Græcis, ὁπὸ τῷ αἰλῶν, ab involvendo, quasi involucrum dentium. Hinc ἰσχυλὶς medicis, tumor in gingivis natus vocatur. Inter superius labrum & nasum pars quædam occurrit, in qua primum barba erumpere solet, quæ ^a μύσας dicitur, ὁπὸ τῷ μυήσῃσιν à muco, qui ex naribus eo destillat. à situ aliis ἀσπόμενον, quasi sub naribus collocatum diceretur. Cavitas quæ in hoc sub ipsa nasi columna insculpta est, & in duas partes mystacem dirimit ^b φάλαρον dicitur, quod amoris illecebra in eo contineatur. Barba hic primum prodiens, si pili adhuc sint molliores, ^c προσωγώνιον, hoc est, anterior barba, quia ante inferiorem exeat: adauctis vero, rigidioribusque factis, ^d μύσκιες, Latinis quoque *Mystaces* græcam vocem retinentibus, dicitur.

Maxilla inferior.

Sub labro humiliore ^e Maxilla INFERIOR est, γένειον, & *Mentum*, ab eminendo dictum. Eminet enim à gula, & pars est faciei infima, in orbicularem acutiem definens. Circa hoc pili nascuntur, qui primum erumpentes ^f χνῶς, *Lanugo*: adulti, ^g ὑπὸ τῷ πώγων, *Barba*, dicuntur. Pili vero à lateribus, sub temporibus & genis prodeuntes, ἰσλῶν vocantur, quod instar vermis luli appellati se involvant, primamque lanuginem constituent.

Aures.

Temporibus ^d *Aures* adsunt, sic dictæ, quod sonos vocesque accipiant, & quasi haurire videantur, cum sint instrumentum auditus. Proprie tamen aures totum organum significat, interna externaque aure constans. Græcis ὠς vocatur: at ὠπρον, extremam tantum aures partem, quæ in capitis lateribus prominet, & de qua hic agendum est.

Auricula.

Latini Græcos imitari *Auriculam* dixerunt, quamvis hanc vocem male nonnulli pro parva aure acceperint. Hujus ^e superior pars, cartilaginosa, nomine caret græco, teste Aristotele, ^f *hist. animal.* 11, Gaza tamen interpres, latine *Pinnam* vocavit. ^g Inferior, quæ carnea est, λῶβῶν eidem, ^h ὅθεν τὸ λῶβῶν, quod abscindere significat, & deturpare. Solet enim hæc pars turpiter flagitiosis abscindi ad manifestanda scelera. Gaza *Fibræ* reddidit. Cæterum extremus pinne ambitus & circumferentia, à tortuositate sua ἑλὶξ, ⁱ *Helix*, vocatur: interior & priori respondens, ^j ἀνθελίξ.

Pinna.

Cavitas autem ipsa, quam circa consistit, ^k χελύχη, ^l *Concha*, à similitudine, quod conchiliorum in morem anfractuosa fit, & tortuose cava. Iuxta hanc eminentia quædam est versus tempora, quam ^m *τετράγωνον* vocant, sive *Hircum*. Est enim pars hæc pilis hirsuta, & in plerisque densam hirci barbulam imitatur. Huic opposita pars ⁿ ἀντιτετράγωνον dicitur. Foramen autem inter hæc, ^o *Meatus auditorius*, ὅπου τὸ ἀκουστικόν, in quo sordes colliguntur, Hippocrati ῥύπος ἐν τῷ ὠτί cominatus. Latini veteres *Cerumina* vocarunt, forte à colore, & substantiæ consistentia, qua utraque ceram flavam refert.

Collum.

Sub capite tandem occurrit pars quædam oblonga & rotunda, figuræ cylindraceæ, ad humeros usque protensa, quæ etsi inter medium & supremum ventrem sit media, ad caput tamen rectius, quam thoracem referri posse videtur. Dicitur autem ^p *Collum*, quod præcipue torquibus coli, ornarique consuevit. quibusdam etiam *Cervix* vocatur, quamquam non desint alii, qui cervicem posteriorem tantum colli partem nominare velint. Græci τετράγωνον vocant. Galenus tamen, lib. de ossibus, ^q *αὐχένα* quoque appellat, & cum τετράγωνον confundit. Musæus similiter promiscue uti videtur, cum παρὰ τῷ αὐχένι inquit, ^r *ὁδομον*, ^s *ὁδομον* τὸ αὐχένα καὶ οὐκ, ^t *virginis benevolentem collum* & ^u *coloratum exosculatus*. Sic Aristoteles quoque ^v *hist. animal.* 11, cum ^w *αὐχένα* definit esse, τὸ μετὰ τὸν περὶ τὸν ὤφθαλμον, quod inter faciem, & thoracem est. Dividitur in partem anteriorem, & posteriorem. ^x *Anterior*, ἀνθελίξ dicitur, ὁπὸ τῷ θηρίῳ ἀνθελίξ, quod pili ibi efflorescant, Aristoteli λάρυγγ. In hac cernitur caput asperæ arteriæ scuto suo prominens, vulgo, ^y *Pomum Adami* dictum; aliis ^z *Nodus gutturis*; Aristoteli, loco citato. ^{aa} *ὄφθαλμος*. At in infima, & vicina thoraci parte cavitas est, acuto angulo pectori incumbens, ^{ab} *Inguhum*, λανκάνια, & λανκάνια dicta. ^{ac} *Homerus* tamen vocem hanc non tantum pro ista cavitate accepit, sed & illis duabus, quæ sub imo collo, & thoracis summo, utrinque juxta clavículas sunt. Hinc Plinius, ^{ad} *hist. natur.* Vni, inquit, homini duo sunt Iuguli, dexter, & sinister. ^{ae} *Posterior colli pars*, ab occipitio ad scapulas usque excurrens, ἀνθελίξ proprie, Aristoteli ἰσχυλὶς, quod supra humeros sit sita. Sunt autem ὠμὸν, seu ^{af} *Humeri*, partes illæ ad latera colli positæ, quæ initium præbent toti manui, & constituuntur ab eminentia, quam caput brachii efficit, dum lato scapularum ossi conjungitur. His pars est contraria sub brachii articulo cava, ^{ag} *μαχαλὴ*, & ^{ah} *μαχαλὶς* dicta, Latinis *Axilla*, & per syncopen, *Ala*.

Collis partes.

Anterior.

Inguhum.

Posterior.

CAPVT II.

De appellatione externarum Thoracis partium..

MEDIVS venter, qui cordis partiumque vitali facultati destinatarum domicilium est, collum excipit. Hic Latinis Medicis, Thorax vulgo, græca voce appellari consuevit, quantumvis *Θώραξ* apud Græcos non parva ambiguitate laboret. Aristoteles enim pro toto corporis trunco, medio infimoque ventre constante accipit, cum 1 hist. animal. 7, corpus in summas partes dirimit, & τὸ πρὸς ἀνθρώπῳ, inquit, μετὰ τοὺς αὐτοῦ

κύττω, *Θώραξ* καλεῖται, quod à collo ad pudenda usque pertendit, Thorax vocatur. Eadem significatione Aristotele antiquior Hippocrates, libro de arte, & doctissimus Plato in Timæo, sumpsere. Non mirum ergo si lecur in thorace situm nonnunquam apud hos Autores legamus, quos nonnulli præcipiti nimis iudicio ignorantie in rebus Anatomicis accusarunt. Galenus tamen propria semper acceptione usus est, quem merito Recentiores sequuntur, qui Thoracem eam tantum partem vocant, quæ collo subiecta, utrinque costis clauditur. Sic Aristoteles & ipse nonnunquam accepisse videtur, ut 1 hist. animal. 13, ubi, *μὲν*, inquit, τὸ *Θώρακα* ἐν τοῖς περὶ τοὺς ῥαφῆς, ἢ πρὸς τὴν ῥίζαν ὑμφαλῶν

Venter infra Thoracem parte priore situs est, cujus radix umbilicus. Dicitur autem *Θώραξ*, πρὸς τὸν *Θορῶν*, quod cor continet, viscus perpetim saliens. Constat tribus partibus; anteriore, lateralis, & posteriore. ^a Anterior, à colli cavitate prope claviculas incipiens, ad molles usque partes extenditur, & *πῆθῶς*, *Pectus* dicitur. ^b Medium pectoris, quod à jugulo in cartilagine mucronatam definit, *στένον* communiter, quasi *σπείον*, quod ibi pectus solidum sit, osseumque, dicitur. Latini *Sternum* vocant, quandoquidem in medio costarum sternitur. Ad hujus latera, rotunda duo corpora carnosaque eminent, utrique quidem sexui communes, sequiori tamen & fœminino majores. Græci ^c *τήλαι* vocant generali nomine, & *μαστῆς* specialiore, fœminarum mammas, quasi *μαστῆς*, manfos, siquidem alimentum infantibus suppeditant. Latini, in Viris, *Mammillas*; in Mulieribus, ^d *Mammæ*; in cæteris Animalibus, *Vbera* appellant. Harum moles dum præsertim lacte turget, *ὑδραμα*, *Vber* dicitur: at pars, quæ in centro eminet veluti apex, *θήλη*, *Papilla*:

circuitus vero obfusus hanc ambiens, *φῶς* Latinis *Areola*, à similitudine.

Posterior pars pectori opposita, quæ à cervice ad costarum finem, & lumborum usque principium porrigitur, *ὑδρὸν*, ^e *Dorsum*, & *Tergum* dicitur, *μυτῶφρον* etiam, quod post *φρένες*, hoc est, diaphragma posita. Hujus partes sunt *Scapula*, *ὠμοπλάται*, & *Spina*, *ῥάχης*. ^f *Scapula* vocantur eminentiæ illæ duæ superiores à lato scapularum osse prognatæ: at ^g *Spina*, acuta illa protuberantia, quæ per totam dorfi longitudinem excurrens, tergum in dextram sinistramque partem dispescit.

^h *Laterales* tandem partes inter anteriorem posterioremque continentur, & *πλευρᾶι*, *Lateræ*. *Lateræ* vocantur. Initium suum ducunt sub ala, & cum costis terminantur. Laterum ergo unum quidem dexterum est, alterum sinistrum; sed cum ex costis consistant, carne alternatim conspatis, spatia illa intermedia quæ carnea sunt, *Intercoſtalia* dici meruerunt.

CAPVT III.

De appellatione partium externarum infimi Ventris.

IERTIVS VENTER, qui naturales partes, nutritioni generationique dicatas complectitur, sub honore infimo loco situs est, substantia carnea & mollis. Circumscribitur cartilagine mucronata, lateribus duobus, lumbis, & ossibus pubis. Aristoteles 1 hist. animal. 13, vocat proprie *μᾶστος*, alii improprie *σπινδέρων*. Latini *Ventrem* appellant, abutentes vocabulo in pressiore significato, quod evitare volens Celsus, rectius

inum Ventrem dixit, ad discrimen capitis & thoracis, ventrium superiorum. Sunt qui *Abdomen* cognominant, sed præterquam quod admodum improprie, elegantioribus quoque adversantur, qui hanc vocem porcis potius, quam hominibus tribuendam censent.

Diviso imi
ventris.Anterior
pars.

consent. Dividitur in partem anteriorem, & posteriorem; illa, à cartilagine ensiformi incipiens, ad ossa pubis usque extenditur, Galeno *Πηγάριον* dicta: hæc, ab extremis costis ad ossis sacri extrema pertingit, & quibusdam *διάζωμα* appellatur. ^a Anterior rursus in tres ^{a, 1. 1.} regiones, *supremam, mediam, & infimam* secatur, quas Galenus 2 aphorism. 35, ex Hippocrate, & Aristotele *Ψαυχόνδριον* vocat, πὲρ πῆ τ' ἑμφαλον, & τὸ ἥπρον. ^b Superior ergo pars ^{b, 1. u. t.} à mucronata cartilagine ac costarum finibus, ad umbilicum fere terminatur. ^c Media, ^{c, 1. u.} supra infraque umbilicum, trium circiter aut quatuor digitorum spatium complectitur, & quia hunc in media veluti centrum coërcet, Vmbilicalis dicitur. ^d Infima, ab hac ^{d, 1. u.} inchoans, ad pubis ossa terminatur. Singula harum partium ab Anatomicis iterum in alios subdividuntur, in duas, inquam, laterales & mediam, quarum appellationes nunc breviter persequemur.

Suprema ergo regionis latera, proprie ^e *Ψαυχόνδρια* dicuntur, quasi *subcartilaginea*, si ^{e, 1. u.} quidem *ὑπὸ τῶν χονδρίων*, sub cartilaginibus costarum spuriarum sunt sita. Celsus, lib. 4. cap. 8, Latinis proprie *Præcordia* dici scribit, quamvis Plinius lib. 11 nat. hist. cap. 37, hac voce diaphragma intellexerit. Inter hæc pars media, ^f *Πηγάριον*, quasi *Superventrale* ^{f, 1. u.} vocatur, in qua occurrit cavitas quædam, Polluci *σφαγή* dicta, antiquis ^g *καρδία* Cor, unde ^{g, 1. u.} dolores circa illam partem fientes, *καρδιαλγίαι*, ἢ *καρδιωγμοί*, cordis dolores appellantur, alii *πενκάρδιον* dixerunt, quasi dicas, *Præcordium*, aut *Anticordium*, alii *στυμὰς κοιλίας*, os *ventriculi* nuncupant, quia sub eo ventriculi os superius lateat, & hæc est regio, cui solemus remedia adhibere pro stomachi malis.

Regio umbilicalis.

Porro ^h regio umbilicalis (in qua umbilicus situs, & corporis totius, & abdominis ^{h, 1. u.} centrum,) Græcis appellatur, πὲρ πῆ τ' ἑμφαλον, quæ circa umbilicum consistunt. ἑμφαλον, ⁱ *ἑμφαλον*, à respirando dictus est. Respirare enim per eum animal, dum utero concluditur adhuc, Antiqui credebant. Media ejus pars *μεσσηφάλιον*, & *ἀνερμφάλιον* dicitur: cavum autem *σφυραμὸν* appellatur. Cutis rugosa, quæ circa umbilicum est. *ρρυαίς*, ^j *Vetula*, quod in modum frontis vetulæ rugosa sit in homine. In cane enim, & aliis animalibus nullæ comparent rugæ, sed durus tantum & glaber nodus. Tota hæc regio umbilicalis, in nobis sanis, nonnihil monticuli instar, in medio ventris protuberat, & in non admodum pinguibus cadaveribus maxime conspicua est. Lateralibus partibus caret, etsi Laurentius lib. 6, hist. anat. cap. 2, ipsi assignarit, & nominibus quoque insignirit.

Infima regio.

^k *Infima regio*, quæ Hippocrati *ἥπρον*, aliis *Ψαυχόνδριον*, in tres partes dispescitur. *Mediam* Aristoteles lib. 1 hist. anim. 3, ⁱ *ἥπρον* vocat, quod Gaza vertit *sumen*, & *abdomen*: ^k *Laterales* partes usque ad hypochondria sese extendentes, *λαγώνες*, quod libidinis, quam *λαγχναίαι* vocant, ibi sit sedes. Hippocrates *κένεαιες* appellat, quod inter coxendicis ossa & costas consistentes, molles sint, & vacuæ esse videantur. Latini *Iliæ* dicunt, eo quod ^l *ilium* intestinum sub ipsis lateat. Alii *χολάδες* vocant, *ἑμφαλὸν τὸ δὲ χολὰς πὰς χολάδας*, hoc est, πὲρ πῆ *εἰλεξ*. Intestinatorum enim, præcipue tenuiorum maximam in se partem continent. Sub ^m *ἥπρον* continetur ¹ *Pubes*, quam *Πιστεον* dicunt, *ἑμφαλὸν τὸ σῶμα*, quod in libidine hæ partes ^{1, 1. u.} concutiantur. Alii *ἥπρον*, Latini Pubem, quæ tamen voces, & pilos qui pudendis excrescunt, & locum in quo crescunt, & ætatem denique qua crescere incipiunt, videlicet decimumquartum in maribus, & duodecimum in fœminis, significant. Quamprimum enim semini & mensibus via patet; pili quoque in pube puerorum, & virginum erumpunt, rariore reddita cute ab aucto calore. Hanc ad dexteram sinistramque partem circumstant ⁿ *βυβόνες*, *Inguina* appellati.

Situs partium
in infimo
ventre.

Cæterum hæ partes, & earum appellationes, tanto diligentius observandæ sunt, quanto frequentior earum apud Medicos mentio occurrit, tum in applicandis ventri remediis, tum in investigandis locis affectis. In *dextro* enim *hypochondrio* lecur fere totum situm est, cum parte quadam ventriculi: In *sinistro* lien totus: In *medio loco* ventriculi magna portio, cujus tamen plurima quoque pars in sinistro continetur hypochondrio. *Sub umbilicali regione* intestinum jejunum totum collocatum est: *sub iliis*, utrinque, intestinum ilium, & in *dextro* quidem, coli, ilei, & cæci portiones, quæ sibi invicem annectuntur; in *sinistro* vero, portio magna coli, & recti intestini. Sub *ἥπρον* continetur Vesica, rectumque intestinum; in fœminis quoque uterus.

Lombi.

Posterior infimi ventris pars, ⁿ *L V M B O S* continet, sive *εσφύς*, qui initium ducunt à ^{n, 1. u.} flexu

flexu dorsi, & ad usque nates pertingunt. Horum pars utrinque carnea ψεία, ὡς τὸ τῆ ψαύου, à palpando dicitur, Latinis eadem de causa Pulpa. Ad horum dextrum latus Ren dexter; ad lævum, sinister situs est. Est & altera pars sub lumbis, carnosā, utrinque coxendicum innominatis ossibus apposita, quam γλῆδες Græci appellant, & γλῆσα, ^a Clunes, ac Nates Latini, ab innitendo, opinor, quod sedentes ipsis innituntur. Sic Aristoteles quoque 4 histor. animal. 10, ἰσχα apud Græcos, πῶς τὸ ἰσχιν τὰς καθημέρας eadem etymologia dicta esse, & propterea etiam solum hominem ἰσχα habere, existimat. Quamvis enim & alia quædam animalia sedere nobis videantur, ut propterea doctissimus Homerus ἰσχα tri-
buit Apro, Iliad. θ. dum canit,

ἀπὶ πηγε καὶ πίπτε ἰσχατὶ γλῆδες π.

Et Leoni, Iliad. 5.

ἄρῃ δ' ὁ πηδερῆς πὶ καὶ ἰσχα ἀμφότρωθεν
μαστῖναι.

Solus tamen Homo ex omnibus commodè sedet, cui carnosæ & magni contingere, & pro subternaculo pulvinarique, tomento replero, inserviunt, ut citra molestiam sedendo, cogitationibus rerum divinarum animum rectius applicare possit. hinc Philosophus 4 de part. 10, Simiam ἰσχα habere, & ἰσχα pernegat: rationem addens, οὐδὲ τὸ πῶς μορφῶν ἰππευφίλων, καὶ μηδὲ ἰσχα τὸν αἰσθητικὸν ἀνθρώπου, ὡς μὲν ἐν πτερυγίοις, ὡς δὲ ἐν ἰσχα, hoc est, simia quod forma ambigua sit, ut & in neutro. & utroque genere sit constituenda, ideo nec caudam habet, nec nates. Ut bipes enim, cauda vacat: ut quadrupes, nati-
bus. ^b Fissura, quæ nates dirimit, διχάλα Herophilo dicitur, in qua foramen advertitur, ubi est exitus intestini recti, & excrementorum duriorum, quod ^c Podicem, & Anum à rugis anilibus, quas habet, appellant.

C A P V T I V.

De appellationibus partium externarum, quæ generationi sunt dicata.



GENITALES PARTES, μέλα σφηηκὰ, αἰδοῖα appellata, quod iis im-
portuno tempore & loco detectis, pudore afficiamur. Latinis Pudenda, eadem ratione, & Naturalia vocantur. Variant hæ partes pro sexus
diversitate, & aliæ maribus data sunt, aliæ foeminis. De utrisque hic
agemus, initio ab illis accepto. Genitalia ergo marium commodè in duas
dividuntur partes, in eam quæ uterum ingreditur, & illam quæ extra,

facci instar propendens, remanet. Hanc ^d Scrotum, & Scortum vocant, quod coriacei
sacculi similitudinem referat. Scortea enim Veteribus dicebantur, quæcunque ex
aluta, aut pelle fiebant. Vulgus marsupium, & bursam virilem vocat: Græcis ἰσχιν, & ἰσχα, Aristoteli etiam ἰσχα dicitur. In hoc continentur partes, quæ femini genitali conficiendo
destinata dicuntur, ὄρχας, quos à numero quidam διδύμους, quasi gemellos, & à figura
κωάρους, Fabas appellant. Latini Testes, quod testimonium præbeant virilitatis. Altera
pars longa & carnosā, ^e Penis dicitur, à pendendo: Græcis πύλον, à figura, quasi clavus:

καύλον, caulis: σπυργώδες νέρων, Nervus fistularis: στήμα, à stando: & πύλον, penis. Vulgo
etiam Mentula, quod rigida hæc pars, viro mentem eripiat, vel à feriis ad jocosa & Ve-
nerea avertat. Pars vero, quæ inter anum & penis initium interjacet, in sexu masculino
ὑποστήμα, quod sub pene sit sita; in utroque sexu, latiore significato, περισταύλον Perineum
dicitur, quo loci incisio fieri consuevit à Lithotomis. Cæterum penis rursus duas ha-
bet partes, unam, quæ semper cute tecta est, & dura, ac veluti nervosa, totiusque nomine
gaudet: alteram, quæ carnosā est, sphaerica, & in complexu Venereo à cute denudatur,
alias cute tecta, βάλλανον dicitur, sive ^f Glans à similitudine. Nonnulli Cerasum eadem de
causa vocant. Cutis autem illa πύλη Galeno, & ἀκροστιχία quibusdam, ^g Præputium Latinis
dicitur, estque illa, quæ Iudæis absconditur, unde Recutiti vocantur, olim sanctissimi
fœderis, nunc impiæ incredulitatis signum est. Ligamentum quod præputium, ex
inferna parte glandis alligat, κωδέρμιον, Vinculum carinum, & κώων, Camis, dicitur. Vulgus
καλάνον, frenum appellat. Circulus qui glandis extrema cingit, στέφανον, ^h Corona: foramen
autem in medio glandis, urinæ & seminis exitui destinatum, ὑρήθρα, Meatus urinarius
vocatur.

Genitalia
fœminarum.

Labia vulvæ.

Rima magna.

Nymphæ.

Clitoris.

Externum
uteri osculum.Caruncula
myrtiformis.

Hymen.

FOEMINARVM GENITALIA pluribus adhuc partibus constant, quam marium. Vocantur Galeno αἰδοῖον γυναικείον, Pudendum muliebre. A Poëtis Latinis Cumus; communiter Vulva, quod propter longam fissuram, qua labia genitalium disparantur, valvas æmuletur. Occurrunt in his primum, ^a Labia vulvæ, κρήνη Hippocrati dicta, quæ sunt duo oblonga & mollia corpora, substantiæ carnosæ, & spongiosæ. In horum medio rima est magna, quam ῥίσμα, seu Fissuram magnam appellant, quia revera longe major est altera rima, quæ uteri exterius osculum constituit. Diductis sic labiis, in conspectum veniunt duo alia corpora. ^b Nymphæ dicta, νύμφαι, vel quia primæ sponsum admittant; vel, quia nympharum officio fungantur, ut enim illæ rivis, & scaturientibus præfunt aquis: sic hæ urinæ rivulo præfectæ videntur. Ab aliis Περύγια, & Περυγιάδα, sive Alæ dicuntur. Sunt autem duæ productiones, fungosæ carne constantes, utrinque una, in principio fere inter se junctæ, & sub utroque vulvæ labio latentes, ubique fere contiguæ, ad finem commissuræ ossium pubis ascendunt, ubi junctæ, Clitoridem veluti præputium quoddam integunt. In harum apice ^c Clitoris est, κλειδοῖς dicta, ab obsceno verbo κλειδοῖς, quod, his partibus lascive contrectatis, semen effundere significat. Nonnullis Recentioribus Penis, aut Mentula muliebris dicitur. Est enim processus exiguus, in anteriore & elata pubis parte, ubi nymphæ conveniunt, respondens in pluribus peni virili, puta in situ, substantia, spirituum repletionem, & erectionem. Diductis postea nonnihil nymphis, alia rima conspicitur, quæ ^d externum cervicis uteri osculum constituit, supra quam aliud ^e foramen cernitur, quod ex implantatione colli vesicæ urinariæ prodit. In illa autem majore rima, conspiciendæ veniunt quatuor caruncule, quas myrtiformes appellant, quod myrti baccas referant. Harum anterior, urinarum meatus foramen, quod in hanc uteri partem definit, obteggit: altera huic opposita posterior est, duæ reliquæ sunt laterales. Servantur hæ carunculæ usque ad interitum, nec minus in vetulis, quam juvenibus cernuntur: in iis tamen, quæ utero non gestarunt, integriores sunt. Has carunculas conjungit membrana quædam, in medio perforata, ὕμην, sive Hymen dicta, apud omnes scriptores decantatissima, quæ virginitalis signum vulgo habetur, & revera quando adest certissimum esse solet, de qua tamen re inferius, ubi historiam uteri aggrediemur, pluribus acturi sumus.

CAPUT V.

De appellatione Manus, & partium in ea contentarum.

Artus.

Manus.

Amplexus
voci manus.

EX PEDITIS hætenus appellationibus earum partium, quæ in tribus ventribus citra dissectionem conspectui se offerunt, reliquum est, ut ad Artus nunc accedamus. Appellamus ARTVS, sive χῶλας, partes nostri corporis, ex trunco ramorum instar exstantes, suntque manus, & pedes, χεῖρες, καὶ πόδες. ^f χεῖρ, sive MANVS vocatur, quicquid inter summum humerum, & extremos digitorum apices continetur. Hac enim significatione olim sumebatur, qua usus est doctissimus juxta atque antiquissimus scriptor Homerus, & post eum Hippocrates, qui propterea discriminis gratia, non χεῖρας simpliciter, sed χεῖρες ἀκραῖας vocavit, quam Latini, & nos hodie manum dicimus. Hanc Galenus lib. de inæquali intemp. cap. 2, in tres præcipuas partes dividit, in βραχίονα, in πῦχυν, & τὸ ἀκρόχαραν, id est, in brachium, cubitum, & extremam manum. Contracta enim & composita voce ἀκρόχαραν vocat, quam ab Hippocrate ἀκραῖαν χεῖρα appellari diximus. Has partes Poëta non ineleganter versu complexus est, dum sic canit,

— laudat digitoque manusque,

Brachiaque; & nudos media post parte lacertos.

Humerus.

Cubitus.

Manus.

Aristoteles vero i hist. animal. 15, Manum, sive τὴν χεῖρα appellat βραχίονα, quem Latini secuti sunt, vocantes Brachium, quicquid ab humero dependet. Hujus partes constituit ὤμων, ἄγκυονα, ὠλέκρονον, πῦχυν, & χεῖρ. ^g ὤμων, sive Humerus, pars illa est, quæ a summo humero ad proximum usque articulum cubitive flexuram pertingit. ^h ἄγκυονα flexura est cubiti, seu incurvatio brachii: hujus contrarium est ⁱ ὠλέκρονον, nempe exterior cubiti protuberantia, sive gibbositas. πῦχυν, Latinis ^k Vlna & cubitus dicitur, estque pars, quæ a brachio, sive humero, usque ad manum extremam, seu summam, se extendit. ^l χεῖρ, ^m Manus quoque

quoque Latinis dicta, a cubito, sive ulna extrema incipit, & in aciem digitorum terminatur. Porro manus interior pars, quæ cava est, dicitur ^a *ἡνίαξ* Græcis, *Vola* Latinis, ^b *ἐνὶ τῷ βάλαξ*, à projiciendo. Pars huic contraria, quæ prona est ^b *ἐνὶ ἡνίαξ* & *Dorsum manus*. At *Palma* fit ex manu expansa, ut *Pugnis*, ex contracta. In vola notandæ sunt *Lineæ*, & *Monticuli* à Chiromantis sic appellati. Linearum principalis est, quam *Vitæ* appellant, propterea, quod ex ejus longitudine aut brevitate, longam aut brevem vitam conjicere liceat. Hujus meminit Aristoteles, 10 Problem. 48, ubi *πύλω, cæsuram* vocat. Quærens enim, cur illi qui per totam manum cæsuram habent, longioris vitæ sint; respondet, quia articulis carentia brevioris sunt vitæ, ut pisces. Ergo quæ articulata sunt, longiori vitæ usura fruuntur. At 1 de histor. animal. cap. 15, *ἄρθρα, articulos* vocat, quorum unum aut duos per totam volam currentes, longævis assignat: brevioris vero vitæ hominibus, duos quidem; at non per totam longitudinem protensos. Si tamen numerum linearum quæsieris, non duas, sed tres ut plurimum invenies; *unam*, quæ fit à flexu pollicis, & *linea vitæ* dicitur: *alteram*, quæ à quatuor digitorum flexu conficitur, & vocatur ^d *Cerebri linea: tertiam*, quæ à trium tantum digitorum flexu constituitur, & appellatur ^e *Mensalis*, quod cum dicta figuram trapeziam, sive mensalem referat. *Monticuli* sunt eminentiæ quædam in vola manuum, quorum septem Chiromantæ faciunt, singulos singulis planetis dedicantes. Sic igitur ^f *Pollicis* tuberculum, Veneri dedicare solent: *indicis*, Iovi; *mediis*, Saturno; *annularis*, Soli; *minimi*, Mercurio: *Triangulum* in vola manus, Marti: *Hypobhenar* tandem, Lunæ.

Caterum *ἀκροχειον*, sive *Manus extrema* in tres partes subdividitur, in *καρπὸν*, *μεσοκαρπὸν*, & *δαιτύλην*. ^Ε *Καρπὸν*, Latini *Brachiale* vocant, quandoque *Carpum* Græca voce, estque ea manus pars, quæ cubiti flexuræ proxima est, sive quæ palmam cubito jungit. ^Β *μεσοκαρπὸν*, *postbrachiale*, elegantioribus Latinis *Palma*, i.e. pars est, quæ inter brachiale, & digitorum principium consistit. *δαιτύλοι* sunt ipsi *Digiti*, qui numero sunt quinque. Ex his duo, qui extremi sunt, nomen à magnitudine acceperunt, cæteri à situ, vel officio. Præter ergo, ^Γ *Magnus* vocatur, quod omnium sit maximus crassissimusque, cuius cum robur respondeat magnitudini, *Pollex* dicitur, quod cæteris quatuor æquipolleat. Græci eleganter, ut pleraque omnia, *ἀνύχες* vocarunt, quasi *promanum*, ut qui totius manus munere fungi queat, & sit infans omnium reliquorum digitorum. Non desunt tamen, qui *ἀνύχες* dictum velint, quod cæteris oppositus sit, & ex adverso situs. Alter extremus, dicitur ^Δ *Minimus*, & *Auricularis*, opinor, quia ad aures expurgandas eo communiter utimur. Pollici proximus, ^Ε *δευκτικός* *δαιτύλον*, ¹ *Demonstratorius* Ildoro, ab usu, à quo apud Græcos, omnes in universum digiti nomen suum sortiti, ut dicantur *δαιτύλοι*, *ἀπὸ τοῦ τὸ δεικνύειν* ab indicando. Hoc enim digito fere præ aliis utimur in demonstrando. Vnde Poëta,

— pulchrum est digito monstrari, & dicier, Hic est.

Latinis *Index* dicitur. Alius hujus ufus est, fed minus conveniens honesto viro, à quo Introductorio *λεχάνος* dicitur, *λεχάνος* πὶ λάρχαν, quod lambere significat, quia quidam inciviliter comedentes sine cochleari, pultem hoc digito lambunt, & nutrices infantibus hoc digito pultem præbent. *Medium* appellant, quod hunc sequitur, à loco. Græci similiter *μίανον*. nonnulli, ut Poëtæ, *impudicum* vocant, & *Objectionum*. Cynædis enim olim monstrabatur à prædiconibus, quo saepe alludit Martialis in suis carminibus. Huic addit quartus, propterea quæ Græcis *ἑστῆσιμος* dictus, Latinis *Annularis*, quia in eo annulos ut plurimum gestamus. Dicitur enim *ιατρικός*, *medicus*, quod Medici Ægyptii, qui primum Anatomiam docere aggressi sunt, summo hunc honore prosequendum, & annulo dignandum censuerint, ut quem ipsa Natura principali membro jungere voluerit, quod ait Appon apud Gellium, lib. 10. Noct. Atticæ. cap. 10. Erat enim inter ipsos fabula, nervum quandam à corde ad hunc immediate transmitti.

Digitum porro singulae partes, quae inter articulos sunt, ab Aristotele, ^o φάλαγγας dicuntur; Gazza reddit *Internodia*. Protuberantiae autem manus in pugnum contrahētes, & articuli ipsi, *κνήστια*, *Nodi* Gazza. Pollicem unum condylo flecti, ceteros binas, tradit Philoſophus. Reperto tamen *κνήστιας* fuisse triplici nomine donatos, & *κνήστιας*, *αεσκησθίας*, ac *μεσκησθίας* dici. ^o *κνήστια* vocatur medius nodus digitorum in pugnum contrahentorum. ^o *αεσκησθία*, ille qui ungui est vicinior. ^o *μεσκησθία*, qui metacarpo.

Latini quibus exprimant, non habent peculiares voces, promiscue tamen omnes nodos, internodia, vel articulos vocant.

Femur.

Tandem extremitates digitorum unguibus munitæ sunt, quos Græci ὄνυχες vocant. Horum iactia ab antiquis *ρίζωνες* unguium radices dicuntur. ab aliis sic vocantur margines, ex quibus erumpunt. Circa has semilunula quædam candicans est, ἀνάλω, exortus appellata, quod circa unguis exortum, & principium consistat. Reliqua pars ἀόρημα dicitur, ab albore. Cæterum puncta illa alba, quæ nonnunquam in superficie videre est, νεφέλια nubes, à similitudine vocantur. at unguium in summo extremitates, ἀκρογυῖαι.

CAPUT VI.

De appellatione Pedis, & partium in eo contentarum.

Crus.



Dorsio cruris.

Femur.

Femur.
Coxendix.

Perineum.

Tibia.

Genu.

Patella.

Poples.

Malleoli.

Es tandem restat, Græcis πῆς dictus, Aristoteli 1 hist. animal. 15, πῆ, Gazæ Crus. Latinis recentioribus, qui nomine proprio carent, ad discrimen minoris, *Magnus pes*. Est autem totum id, quod à clunibus originem ducens, sese usque ad digitorum extremos unguis extendit. Dividitur ab Aristotele citato loco, & à Galeno, libr. de inæqual. intemp. 2, in tres partes, in *μηρὸν femur*, *κνήμιν tibia*, & *πίδα parvum pedem*. Prima pars *FEMUR*, *μηρὸς*, *πὸ τῷ μεγέθει*, à dividendo, quia truncum bifariam dividere videtur, Hesiode *μηρὸν* dicitur. Cellus *Coxam* appellasse videtur, quem & alii recentiores Aristotelis Interpretes sequuti sunt. Hoc vel ideo diligentius observandum est, ne perperam eos intelligamus, dum vocibus coxæ ac femoris promiscue utuntur, & nunc os femoris, Coxam, nunc è contrario os coxæ, Femur appellant. Pars interna femoris, *πρόσμηρον* dicitur, *Femen*: at protuberantia exterior circa articulum, *ἰσχίον*, *Coxendix*: spatium autem inter duo femora ad nates interjacent, *πυλιν*. Sic enim Galenus, comm. 4, de fract. interpretatur, scribens, apud Hippocratem *πυλιν* significare, *ἵππον τὸ μέσθ' ὅτων βυθῶντων ἰσχυρὸν σκέλης*, totum id quod inter utriusque cruris inguina est; & subjungens docet, *τὸ μέσον ἐν τῇ πυλινῇ*, medium quod est in hoc spatio, *πείλαιον*, *Perineum* vocari. Pollux in plurali *πυλινῶν* vocat, Latini *interfemina*.

Altera pars *TIBIA* est, *κνήμη* dicta, quæ vox ambigua significatione, modo totam illam partem denotat, quæ inter femur, & parvum pedem sita est, ossibus geminis sustentata, & de qua nunc sermo habetur: modo peculiariter illud os, quod ex his maximum est. Eodem pacto & Tibia Latinis promiscue accipitur, quemadmodum & *πῆς*, jam utrumque os cubiti, jam eorum longissimum significat. Cellus, *Crus*, à *currendo* vocat. Hujus *pars anterior* Aristoteli 1 hist. animal. 15, *ἄνω κνήμιον* est, Latinis absque nomine mansit, ut nonnulli græcam vocem vertentes, *Anterioribale*, vel *Protibiale* vocarint. Gaza tamen *Cream* antiquissimo nomine appellat. *Posterior* *ὑποκνήμιον*, quasi tibiæ venter, Latinis *Sura* dicitur, unde Plinius, Sura, inquit, soli homini data est, quippe carnosâ tibiæ pars. Et hæc illa est, propter quam Momus Iovem reprehendit, quod tibiæ in parte posteriore offendiculis minus obnoxiam carnosâ munimento ornasset. Notare tamen debebat Momus, oculos duos parte priore sitos esse, quibus quæ ante nos sita sunt propius, in posteriore nullos esse. *Exterior*, *ὑποκνήμιον*: *interior*, *προκνήμιον*, & *γόνυ* vocatur, *Genu*. Hujus pars anterior, quæ extenditur, five potius os ipsum quo genu integitur, Hippocrati *ἡμυλιν*, Aristoteli *μύλη*, Mola, Celso *Patella*, Mola *genu*, & *Rotula*. At posterior pars, qua flectitur, & curvatur, *ἵγυς*, Latinis *Poples*. Hinc Vena poplitea celebris, quæ sub hac parte ad pedem per tibiā excurrit. In inferiore tandem parte, qua tibia cum pede conjungitur, duæ sunt eminentiæ laterales duræ ac ossæ, quarum altera interior vocatur, altera exterior, suntque processus ossium tibiæ, & fibulæ. Aristoteles *σφυρὰ* vocat, alii *σφυρά*, quos sequuti Latini *Malleolos* dixerunt, quia malleum instrumentum fabre referunt, cum ab utroque latere capitula in hoc loco protuberant. Medici vulgo *Talos* vocant, ut cum in suppressis mensibus venas tali aperire jubent: sed errant. ut jam olim quoque Galenus monuit, ante cujus tempora hic error exortus ad nostra usque dimanavit. Nec enim hi processus talum constituunt, sed sub his

sub his talus, five astragalus latet, tactui, & oculis, ob ligamenta & tendines nequam se offerens. De his tradunt Physiognomi, invidios eos esse, quibus multum exant: segnes autem & pigros, quibus subdident, atque hoc verissimum esse signum ac infallibile produnt.

Tertia pars sequitur, ^a *Parvus pes*, qui à tibia incipiens, in extremis digitorum apicibus definit & terminatur. Vocatur Aristoteli *πῶς*, ut Latinis quoque *Pes*. Platoni *πῶς* *ἄκρῳ* *Pes extremus* dicitur, quemadmodum Hippocrati modo *ἄκρῳ* *χρῶς* dicebatur, cui respondet similisque est in pluribus pes parvus. Dividitur enim similiter in tres partes, in *πῶς*, *μέσῳ*, & *δακτύλῳ*, quemadmodum manus in *καρπῶν*, *μέσῳ*, & *δακτύλῳ*, quæ partes singulæ singulis respondent.

^b *Πῶς* prima pars est, Aristoteli *πῶς*, *Calcaneus*, Polluci *πῶς*. Hinc forte nomen habent Perniones, tumores hoc loco exorti temporibus frigidis. Vocatur & *πῶς* communiter. ^c *Μέσῳ*, vel *μέσῳ*, altera pars, post calcem, ubi prima ossium articulationis incipit, quæ plantam constituunt, Aristoteli *αὐάνυμα* est, à quo tamen in duas secatur partes, ^d *superiorem*, quam *νέκρωδες* vocat, *nerosum*: & ^e *inferiorem*, *παρακαλῶδες*, *carneum*. Illam Rufus *ἐπὶ*, *Dorsum* pedis Latini: hanc *ῥίζον* *τῆς* *πῶς*, *Concavum* pedis, *Introduktorius* vocat. Quibus hæc pars interior, non cava, sed ita pleniufcula est, ut solum toto attingat vestigio, *Plantæ* vocantur, & Aristotele volente, versuti sunt ac fraudulentii. Tertia pars *Digito* quinque complectitur, qui digitis manuum respondent, quorum quidem nomina sunt, ^f *Pollex*, *pollicis proximus*, *medius*, *medio proximus*, *minimus*. Omnium vero extremitates unguibus munitæ, quas *ὄνυχες* Græci vocant, & plicaturam habent, Aristoteli *καμάτω* dictam, ubi scribit, pedum digitos *μονοδάκτυλος* esse. Cæterum constant ex tribus ossibus, totidemque articulis necuntur, ut ex historia ossium patebit: una tamen curvatura est, quæ cæteris manifestior paulo, & propter quam fortasse Philosophus *μονοδάκτυλος* appellavit.

CAPUT VII.

De humani corporis figura, & magnitudine: tum quo pacto hac secundum ætatem, sexum, regiones, & morbos differat.



VIDIMVS hæcenus ea, quæ ad partium externarum appellationes spectare videbantur, à quibus antequam discedamus, quæ tum totius corporis figura sit, ac magnitudo, tum singularum etiam partium invicem proportio, & qua ratione juxta ætates, sexum, regiones, ac morbos differat, intueamur. Multæ enim sunt, & extra, & intra corpus figurarum species, si Hippocrati, libr. de veteri Medicina, credimus, quæ inter sese quod ad affectiones pertinet, tum ægroto, tum sano, maximopere differunt, quæ omnia (eodem præcipiente) nosse oportet quomodo discrepant, quo causas singulorum cognitas probe observes.

Quænam autem sit *Figura* totius corporis, quadratane, an circularis, aut neutra, merito dubitari potest. Nam qui hominem *εὐσθενον*, & ad naturæ leges conformatum *πῶς* *ἐγγωνον* appellant, five quadratum, illi quadratam jam figuram humano corpori assignare videntur. Qui vero, quod umbilicum videant medium esse corporis, ac veluti centrum, à quo ad extremitates fursum deorsumque, æquales ducuntur lineæ, circularem figuram tribuunt, sub rotunda comprehendere videntur. At enim, cum illi truncum tantum corporis intelligant, hi vero male conclusionem inducant: relinquuntur, neutri opinioni subscribendum esse. Nec enim certe simplex figura est, sed ex variis externarum partium figuris composita: neque nomen ullius figuræ est, quod huic commodè tribuas, nisi forte humanam figuram dicere volueris, quin imo hæc ipsa quoque determinari nequit potest, cum ad arbitrium voluntatemque cuiuslibet, singulis quasi temporum momentis mirifice varietur, cuiusmodi mutationes *αἰσθησιμὰς* appellavere, & eos qui se in varias hoc pacto figuras commutant, *αἰσθησιμὰς* Veteres dixerunt. Recte ergo concluditur, certam figuram humano corpori tribui non posse, sed veluti Promethea in omnes esse omnibus momentis variabilem. Cæte-

Figura humani corporis.

Figuram
corporis mien-
tibus quan-
tum fere
referat.

rum has figuras, cum in aliis plurimis artibus, tum vero in medica ad unguem nosse ita refert, ut plane necessarium sit, non tantum ad perfecte cognoscendos morbos, sed & eorumdem eventus prudenter prædicendos, & feliciter curandos. *Ad cognoscendos* quidem morbos, quod luxata ossa fractave non aliter fere pateant, quam quia figurari illa membra, ad quæ pertinent, ut decet, non possint. *Ad prædicendum* vero quantum valeat expressit satis Hippocrates in Prognosticis, ubi figuram hominis sani decumbentis describit, & ex ægrorum decubitu quid sperandum metuendumve sit docet. *In curatione* autem luxationum, & fracturarum, qui medias figuras ignoraverit partium omnium, omnium doctissimorum consensu frustra laborat. Atque hæc de figura.

Magnitudo
humani cor-
poris.

Magnitudinem quod spectat, ea triplex est, pro triplici genere dimensionum, longitudine nempe, latitudine, & profunditate. Hæc autem, vel in debite proportionati mediocritate consistunt, vel ab ipsa declinant in excessum aut defectum, qui rursus vel major, vel minor esse potest. Sed ut animo perfecte comprehendantur, ante omnia explicare oportet, quæ magnitudo homini esse soleat, si omnibus numeris Naturæ legibus sit satisfactum, ut corpus habeamus, ad quod veluti ad Polycleti quandam statuum cætera omnia expendantur. Sic enim nullo negotio intellexerimus, qui longus aut brevis, qui crassus aut gracilis, qui latus aut angustus sit vocandus. Tale autem hic in Europa nostra æstimabitur, quod in *longitudine* quidem sex pedes Geometricos conficit, in *latitudine* autem & *crassitie*, unum tantum cum tertia parte: ab hac proportionem qui jam declinant Improportionati dicuntur. Quamquam non ita strictis terminis hic ipse excessus defectusve debeat definiri, quin illi qui parum duntaxat ab illa exacta regula discedant, adhuc proportionatorum in album referantur. *Longus* ergo hac ratione erit, qui septem, aut paulo minus, pedes constituat in longitudine: cæterum latitudine, & crassitie conformis optime proportionato corpori fuerit. *Parvus* contra, qui à sex pedibus deficiat in longitudine, in cæteris dimensionibus corpori proportionato respondeat. *Crassi* similiter sunt, quibus cum longitudine debita sit, ut sex quidem pedes comprehendat; tamen diameter latitudinis plus, quam unum conficiat: aut ambitus etiam, seu circumferentia thoracis, vel infimi ventris, plures quam tres pedes contineat, cum in proportionato corpore tres exacte æquet, adeoque æqualis sit dimidiæ longitudini totius corporis. Ediverſo si hos nondum attingant, *Graciles* dicuntur, cujusmodi Hippocrates in Epidemicis *φινωδεις* appellat, & tali admodum obnoxios statuit. Cæterum magnitudo hæc, etsi à nobis sic definita sit, quod ut plurimum talis esse soleat: usque adeo tamen inæqualis est, ut penes ætatem, sexum, regiones, & morbos, maxime differat.

Magnitudo
proportiona-
ti corporis.

Longus qui
dicatur.

Parvus.

Crassus.

Gracilis.

Differentia
magnitudi-
nis corporis
secundum
1.
Ætatem.

Quæstio.

Iuxta ætatem sane, cum alia sit magnitudo infanti, alia puero, alia adolescenti, alia juveni, atque homini jam consistentis ætatis, alia denique senescenti, & decrepito. *Infans* enim parvus est, & brevis, major puer, adhuc major *adolescens*: *juvenis* vero, aut qui *consistentem jam ætatem attingit*, non modo longior, sed & corpulentior est, quibus non secus atque arborum quam plurimis accidit, quæ dum tenellæ adhuc sunt, in altum assurgunt graciles, mox ubi longitudinem debitam nactæ fuerint, in truncum abeunt crassiores. De *decrepitis* restat dubitatio, verumne sit, quod à quibusdam statutum esse video, eorum corpora decreſcere, cum ad senilem ætatem provehantur, eoſque breviores seipsis fieri. At ego breviores fieri pernego, graciliores fieri lubens largior. Ossa enim, secundum quæ longitudo corporis exporrigitur, cum partes sint duræ ac solidæ, nec ætatis diuturnitate, nec morbi ullius sævitia unquam imminuuntur. At caro, ut ab aliis pluribus causis, sic ab ætate facile depascitur, consumiturque. Quod si breviores esse videantur seipsis juvenibus, seniores facti, id ideo accidere credendum est, quod articuli omnes, tum à musculis à caloris inopia tensis, tum à ligamentis siccatis & occalescentibus incurvantur. Atque hæc causa est, quam propter divinus olim Hippocrates, 2 aphor. 52, juventutem in corporis longitudine degere, liberale & non indecorum pronunciarit: at senectutem, inutile, & deterius. Cum enim proceri antea essent, in se curvantur, faciliusque sic flexura turpis advertitur, difficilisque toleratur.

Sexum.

Sed & varietas magnitudinis secundum *Sexum* advertitur. In humano enim genere, foemina fere masculo minor est, cum in cæteris animalibus sit major. Hoc in omnibus infectis

infectis videre est, ut in pulice, musca: sed & in sanguineis plerisque, ut in vipera & serpentibus. Causa est, quod fœminæ in brutis, vel fœtus, vel ova, in ventre gestare debeant uno tempore complura, unde corpus majusculum requirebatur: fœmina autem in humano genere cum singulos gerat fœtus, nec perpetuo ventrem plenum habeat, minorem quam mas staturam nacta est. Quin & cum mulier ad pariendos, & educandos tantum liberos nata sit, ad quæ officia magnitudo corporis nulla requirebatur, Vir expressam DEI conditoris imaginem referens, ad orbis imperium, cæterorumque animalium dominium conditus est, quare magnitudine tum animi, tum corporis merito præcellere debuit. Illud etiam prætereundum non est, inter fœminas Virgines graciles fere esse, quia post congressum crassiores evadunt, venis universi corporis in complexu venero à calore exagitato dilatatis, id quod spatio vel unius diei post coitum statim advertere licet.

Quanta vero magnitudinis varietas sit penes *Regiones*, perquam bene nos docuit Hippocrates, in libro de aëre, aquis, & locis. Summatim enim colligens, quæ multis dixerat, longe, subjicit, pulchriora, & majora omnia in Asia, quam Europa nascuntur, idque ob temporum anni temperiem fieri credendum est. *Asia* enim in medio Solis exortu ad auroram sita, à frigiditate, & caliditate omni excedente remotior est. *Europæi* forma, & magnitudine corporis perquam inter se differunt, idque propter temporum maximas, & frequentissimas mutationes. Sic *Dani*, *Batavi*, & *Germani*, ut plurimum magni sunt, ac pulchri: *Angli* item & *Scoti*, *Galli*, & *Hispani* contra, magna ex parte breves; at *Itali* & *Græci* mediocris staturæ. *Veneri* etiam proceri, & eleganti staturæ dignitate eminent, id quod Patritii Nobilesque docent, qui aborigines sunt, reliquum vulgus, quod ex omnibus orbis partibus confluit, promiscuum est. Hoc loco de *Pygmæis* dicendum erat, qui dicti, à statura, qua ulnam non excedunt. Verum ego Poëtarum fabulas esse crediderim, pro quibus tamen Aristoteles minime haberi vult, sed veram esse historiam 8 hist. animal. 12, asseverat. Ego quo minus hoc statuum, tum autoritate primum doctissimi Strabonis 1 Geograph. coactus sum, tum potissimum nunc moveor, quod nostro tempore, quo nulla mundi pars est, quam nautarum industria non perlustrarit, nihil tamen unquam simile aut visum est, aut auditum. Accedit, quod Franciscus Alvarez Lusitanus, qui ea ipsa loca peragravit, circa quæ Aristoteles *Pygmæos* esse scribit, nempe per quæ Nilus in *Ægyptum* fluit, nullibi tamen tam parvam gentem à se conspectam tradidit, sed populum esse mediocris staturæ, & *Æthiopes* tradit.

Tandem & *Morbi* corporis magnitudinem variant, cum visi sint, quos febris quartana in gigantæam molem erexit: nec credo quisquam est, qui ignoret historiam Antonii Antverpiensis, qui nostra adhuc ætate vixit, & cum pusillus admodumque debilis in lucem prodissset, illico puer ex morbo in maximum gigantem evasit. Hujusmodi tales à Græcis *ὀφθαλμοί* vocantur, in quibus latet vitium, quod prodigiosum augmentum, cum immatura morte accersit. Fuit enim Salamine Euthemini filius, qui in tres cubitos intra triennium adolevit. Sed homo incessu tardus, sensu hebes; puber postea factus, subita membrorum contractione absumptus est, ut narrat Plinius. Eodem modo, nec adhuc pubertatem attingens Cornelii Taciti, nobilis historici, Equitisque Romani filius, diem suum misere obiit. E diverso & *Nanos* fieri nonnunquam ex morbis compertum est, quoties superiores partes ad justum augmentum perveniunt: brachia vero, & crura, tenera & parva manent, quemadmodum in luxationibus non restitutus solet accidere.

Ab his antequam discedamus, operæpretium est inquirere, verumne sit, quod à nonnullis creditur, Veterum corpora nostris multo majora fuisse, sensimque homines decrefcere. Habemus enim Homeri locum, aliorumque Vatum, qui de breviori hac statura conqueruntur, ad quem allusit Juvenalis Poëta, Satyra 15, cum inquit,

Nam genus hoc viris jam decrefcerebat Homero,
Terra malos homines nunc educat, atque pusillos.

Et profecto, si qua fides historiis est, corpus *Orestis*, quod oraculi jussu ex terra effossum, septem cubitorum fuisse creditur, qui apud Romanos pedes conficiunt, teste A. Gellio, duodecim cum quadrante. Quin imo in *Creta* quoque, Plinio scribente, terræ motu

3.
Regiones.

Pygmæis.

4.
Morbo.

An nostra
ætas homines
propter minores
fuerit.

motu rupto monte inventum est corpus quadraginta septem cubitorum, id quod alii Orionis, alii Oeti fuisse existimarunt. In hac re, ut antea statui, sic puto nunc credendum esse, determinatam humano generi magnitudinem exacte non esse, sed ipsam pro ætate, morbo, sexu, & imprimis regione plurimum differre. Quamobrem crediderim Græcos olim majores fuisse, sed coloniis in Græciam ductis, cum aliis commixtos esse, & sic minores sibiipfis postea visos fuisse. Nam & ego memini, in Batavio longiores multo fuisse homines, ac procerioris stature, quam nunc sunt, quod ob continua hæc bella, quæ Batavi gerunt, plurimæ quasi coloniæ ductæ, maximeque gens illa cum exteris commixta fuerit. Cæterum, quæ de Orestis corpore referuntur, & præsertim de illo in Creta reperto, aut fabulosa illa sunt, aut si quid veritatis in se continent, monstruosa giganteaque, nec non rara admodum fuerunt. Quod si quis Plinium etiam objiciat, qui experientia edoctus, filios parentibus breviores semper esse invenit, illi contra nostram opponimus, quæ nos docuit, contrarium sæpe verum esse, adeoque atavorum avorumque longitudinem in nepotes migrare; filios etiam sæpe parentibus proceriores esse.

CAPUT VIII.

De Figura, & Magnitudine Capitis, partiumque in eo contentarum.



Figura, & magnitudo capitis.

ED accedamus nunc ad singularum partium figuram, & magnitudinem: deinde quam invicem proportionem habeant intueamur. Capiemus autem merito à Capite initium, quod in summo loco positum, & nobilissimum est, & maxime oculis nostris obvium.

Caput Longit.
Læta.
Læta.
Acuminat.
Rotundum.

Capitis pro-
portio variat.
penes
1.
Regionem.

2.
Vultum.

Collum figura.
Longitudo.

CAPUT ergo cum naturalem figuram obtinet, Galeno teste, Sphæram refert, sed oblongam, depresso utrinque modice juxta tempora lateribus. Cum autem magnitudinem legitimam observat, sextam totius corporis partem, longitudine sua, quæ ab extremo mento, ad summum usque verticem est, conficit. Ut vero & partes ipsius inter se consentiant, quatuor æquales lineas requirit. Prima est, quam faciei lineam vocabimus, & ab imo mento ad supremam frontem pertingit. Altera est, quam occipitis dicemus, & à vertice, usque ad colli primam frontem pertingit. Tertia est frontis, ab uno temporum ad alterum excurrentis. Quarta denique, ab ima aure, (quo loco processus sunt mamillares,) ad fyncipitis elatiorem partem perducta. Hæ quatuor lineæ si æquales invicem sint, Caput proportionatum vocetur; sin ad inæqualitatem quandam declinaverint, tantum à justa, & naturali constitutione abesse, quantum ad hanc acceperint propius, dicantur. Si enim ex his lineis, ea quæ faciei est, longior fuerit, Caput Longum dicetur: sin brevior, brevius. Si frontis linea longior cæteris, caput Latum erit: si occipiti, caput Acuminatum. Si omnes æquales, Rotundum, & Naturale; si omnes inæquales erunt, aut quædam, & plures, oriatur illa capitis forma, quam φεῖον vocant Hippocrates, & Galenus. Sunt igitur capita quædam longa, quædam lata, alia acuminata, alia rotunda, alia φεῖον. Talia autem sunt, vel ratione regionum, vel victus, aut aliorum accidentium. Et ratione quidem regionum; olim longa capita habebant Macrocephali propterea dicti, qui teste Hippocrate, libr. de aëre, aquis, & locis, fasciis infantum capita nimium stringebant. Lata hodie, ut audio, habent Moscovitæ, quod infantibus arte faciem explanent, ad omnia flecti in tenera ætate aptissimam. Rotundam habent Antverpienses: magna ex parte Bruxellenses etiam puellæ, nisi quod acuminatus his sit mentum. Alta capita, & acuminata habent Genuenses fere, & Belgæ, à fasciis similiter, quibus infantes nimium stringunt. Germani fere breve caput obtinent, quod dorso semper in cunis incumbant. Ratione Victus, olim meminit Hippocrates quoque capitum oblongorum, quæ dicit talia fieri τὸν τῶν διαίτων, à ratione victus, qua utebantur admodum tenui, unde temporalibus musculis exsiccatis, cava fiebant tempora, sicque longiora videbantur, proportionata capitis latitudine decedente.

COLLUM, si quis naturalem ejus figuram desideret, teres est: sed magnitudinem non ubique observat æqualem. Nam quod ad Longitudinem, anterior ejus pars, quæ à mento ad jugulum pertingit, quatuor Geometricas uncias continet: posterior, à fine occipiti,

occipiti, ad primam usque thoracis vertebram, tres: at *laterales partes*, ab aure infima, ad summum usque humerum, fere septem uncias conficiunt. *Latitudo colli*, five Diameter, quatuor unciarum est: at *Peripheria*, five circumferentia, pedis unius. Ex his facile intelligitur, quod collum *tenuis aut crassum* dicantur apud Hippocratem, in quo elegans locus est 6 epid. sect. 1, ubi de iis, qui *φολοὶ* sunt, five caput habent acutum differens: siquidem, inquit, validam obtineant cervicem, robusti erunt, cum alias, tum præcipue in ossibus. Prudentissime vero divinus Vir ut cætera id addidit, cum quales sunt colli vertebræ, tales & thoracis, & lumborum, & ossis sacri, merito esse consueverint. Quibus igitur colli vertebræ crassæ, iis quoque & lumborum, & thoracis crassæ esse debent, reliquaque ossa omnia, nisi natura monstrofi aliquid parere cupierit. Rursum cum cætera partes omnes ossium magnitudini respondeant, ita ut muscoli magni sint, quo magnis ossibus movendo esse possint: & venæ magnæ, atque arteriæ, & nervi denique ut magnis musculis alimentum sufficiens, calorem debitum, & animalem spiritum abundantem transportent: profecto recte concluditur, eos qui validam cervicem obtinent, robustos esse, quia musculos magnos validosque acceperunt. Meminit autem Hippocrates potius colli, quam alterius partis, ex qua robur colligatur, quod collum ex iis sit, quæ maxime visui se offerunt; signa autem semper manifestissima esse debeant. Hinc patet clara expositio alterius loci, quæ apud eundem Hippocratem habetur, sexta epidem. sect. sexta, ubi Ossium, inquit, naturam ex capite colligere oportet, deinde nervorum, & venarum, & carniū, & aliorum humorum, & supernorum, & infernorum. Oportet enim hanc sententiam de proportionatis intelligere, & in quibus omnia sibi respondent. Magnum enim caput, magnam cervicem requirit, ut tuto sustentetur. Cervix magna, magnum thoracem, & hic reliquas partes majores desiderat: ita ut capitis magnitudinem, aut parvitatem, cætera partes omnes sequantur, siquidem natura proportionis leges observet.

CAP V T I X.

De Figura, & Magnitudine Thoracis, ac Mammillarum.



THORAX, five Medius venter, figuram ovalem obtinet. Parte enim superiore, qua cervicem tangit, angustior est: inferiore, qua infimum ventrem, latior: antè vero in pectore, & posterius circa dorsum, depressior. Magnitudinis autem ipsius hæc est ratio, si naturalis sit. *Pectus*, quod à jugulo incipit, & in mucronata cartilagine terminatur, octo uncias Geometricas conficit. *Dorsum*, à prima thoracis vertebra, ad duodecimæ finem, five ad primæ lumborum initium pertinens, pedem Geometricum, unciamque unam obtinet: ita ut pectus dorso quinque unciis sit brevius. *Latera*, à claviculis ad extremum thoracis excurrunt, ubi mendosæ costæ finiunt, unciasque novem cum dimidia habent. *Peripheria* autem thoracis, duorum pedum Geometricorum est, duarumque unciarum. Si spiritum reddas, una uncia angustatur: si accipias, duas dilataris. Hæc proportio naturalis est: mutari tamen sæpe solet, tum à natura ipsa, tum à causis internis; quandoque etiam ab arte, & extrinsecus incidentibus. A natura quidem, cum mala conformatio sit in utero: à causis internis, cum à destillatione sit gibbositas: ab arte denique, cum infantibus pectus nimium fasciis constringitur. Sunt enim cum alia recens natorum ossa, tum imprimis costæ thoracis admodum teneræ, & flexibiles, ut ipsis quamcunque velis figuram facillime largiaris. Quanto autem sanitatis ac vitæ dispendio pleræque matres infantum suorum pectora angustent, imprimis Anglia edocebit, regio quæ perversam hanc fasciandi rationem ut plurimum sequitur, quo fit ut maxima hominum pars, tabe & destillationibus ibi conficiatur. Ineptum etiam est, & ultra fidem perniciosum illud studium, quod fere Virgines adhibent, ut junceæ videantur, loris, & mortifero artificio pectus in angustias cogentes, ignaræ, se angustando thoracem, januam tabi, marcorique aperire. Quibus enim strictior est thorax, ii sanguinis sputo, & destillationibus, partiumque in thorace contentarum inflammationibus necessario redduntur opportuni, cum pulmones talibus maxime incaleſcant. Nam cum reliquum corpus proportionem suam, debitamque magnitudinem

Latitudo.

Peripheria.

Collum, tenuis
& crassum.Thoracis
figura.

Magnitudo.

A quibus causis
mutetur
proportio Tho-
racis.Quam perni-
ciosum sit vi-
cis stringere
pectus
& thoracem.

rudinem retineat; thorax autem angustior fiat, plus sanguinis circa pectus colligitur, quam aut idem digerere, aut à sese possit propellere, unde in cavitatibus illis stabulans (præsertim vero Venæ arteriosæ, & Arteriæ venosæ) in multorum morborum causam degenerat. Accedit, thoracem ipsum compressum multo imbecilliores fieri, unde sanguis calidior eo affluens, vel ibi hærens, acrior redditus, facillime vasa erodit, neque se defendere natura jam amplius potest. Hinc non immerito tales falsè ridentur à Terentio in Eunuchis, dum sic inquit:

Haud similis virgo est virginum nostrarum: quas matres student,

Demissis humeris esse, victo pectore, ut graciles fient.

Si qua est habitior paulo, pugilem esse ajunt; deducunt cibum,

Tametsi bona est natura, reddunt curvatura juncenas.

Mihi ergo earum gentium consuetudo cum primis arridet, (quam & Veneriis observari cernimus) quæ latum potius, quam angustum pectus; crassum, quam tenue exoptat, & propterea infantum thoracem, levi fascia involvit magis, quam stringit.

Mammarum
magnitudo.

In pectore fixæ sunt *Mammæ*, quæ ratione sexus, & ætatis, maxime differunt, item ratione morborum, aliorumque accidentium corporis. In *Viris* enim non attolluntur, quod glandulas vix habeant: in *Mulieribus* globi instar decenter prominent. *Virginibus* etiam, antequam ad pubertatem accedant, vix præter papillas aliquid comparet; at vero cum aptæ conceptui fiunt, sensim excrefcunt. *Vetulis* & *extenuatis*, oblongæ fiunt, turpiterque dependent, absumptis cum pinguedine glandulis, solaque cute restante: *pinguibus* contra turgent, & quandoque in insignem molem ascendunt. *Mulieribus* etiam *ventre* gerentibus, incrementa sumente foetu, & cum hoc utero, sensim augentur, ut partus tempore instantis satis tumidæ videantur. Quamobrem qui *mammarum decentem magnitudinem* scire voluerit, *Virgines* aspiciat adultæ ætatis, & quæ corpus habeant staturæ decentis. his enim attolli in eam solent magnitudinem, ut manu sua commode undique tegantur. Ab hac quæ discedunt, majores, vel minores dicuntur, prout ad excessum, vel defectum declinent. Atque hæc Medico prudenti diligenter consideranda sunt, vel ideo, ut judicium accuratum de nutrice bona ferat, cum monente Moschione, mediocres mammæ in bona nutrice semper eligendæ sint. *Grandes enim*, lac copiosum non generant, eodem auctore: *parvæ* autem frigiditatem denotant, & steriles scæminas, ut vitari debeant tales ab iis, qui conjugium liberorum procreandorum gratia suscipiunt.

Quæ nutrice
eigena.

Papillarum
magnitudo.

Papillæ, ipsum quasi centrum mammarum constituunt, admodumque & ipsæ variant. *Virginibus* enim leviter prominent, & fragæ instar rubent: *lactantibus*, ob suctionem infantis exseruntur, & livent: *effætis*, oblongæ fiunt, nigricantque. Has jubet inspicere Hippocrates 6 epidem. sect. 5, si de uteri affectibus judicare velimus. Si enim papillæ, & quod in iis rubet, pallefcant, morbosum est, inquit, *δυσχολον*, sive conceptaculum, & uterus.

C A P V T X.

De proportionibus Infimi ventris, & Pudendorum utriusque sexus.

Vmbilicus
centrum uni-
versæ.
Magna
magnitudo
infimi ventris.



INFIMVS VENTER, qui naturalem debitamque servat proportionem, *Vmbilicum* habet in ipso medio veluti centrum, æqualiter ab omnibus extremis distantem. Eadem enim *longitudo* est, & quidem sex unciarum, ab ipso ad usque mucronatam cartilaginem sursum; ad pubis ossa deorsum; ad lumborum, atque ossium ilium extrema, versus latera. *Peripheria* autem, seu totus ambitus, duos Geometricos pedes cum duabus uncias, adeoque uncias viginti sex efficit: *at diameter*, quæ ab umbilico ad dorsum ducitur, præter propter novem, vel decem. Cæterum hæc proportio magnitudinis diversimode variatur à causis, tum naturaliter, tum præter naturam incidentibus. *Secundum naturam* quidem, ut à cibo, & potu, à foetu in utero contento, à nimia pinguedine. *A causis præter naturæ* institutum accidentibus, ut flatibus, in tympanitide; aqua, in ascite; tumore, in lienis affectibus. Contra quandoque venter attenuatur in inedia, in alvi fluxibus diuturnis, aut vehementibus, in quibus ita decrefcit sæpenumero, ut tumorem illum

A quibus cau-
si proportio
variatur.

Nota.

illum circa umbilicum, de quo diximus, Venter deperdat, & ad dorsum veluti retractus videatur, id quod sapissime consuevit fieri à superpurgationibus, longis item diarrhæis, & dysenteria. Atque in talibus caute omnino agendum est cum purgantibus, quandoquidem facillime lædantur, & exsolvantur. Liberius validissima quæque offeruntur, si vel morbus, aut natura ægri requirat, iis, qui ventrem mediocriter protuberantem habent. Et huc respexisse puto admirabilem Hippocratem, cum libr. de veteri Medic. circa finem, Medico prudenti cognoscendas, & considerandas esse inquit, *κοιλίας μακρὰς, & στρογγύλας*, ventres longos, & teretes. Ex figurarum enim inspectione cognoscimus prompte, qui apti sint ad helleborum, & alia generosiora purgantia assumenda. Quibus enim partes in abdomine contentæ fortes sunt, beneque constitutæ, tuto purgari possunt; quibus contra tenues, periculose medicamenta accipiunt. Et hoc illud quoque est, quod aphorismo trigésimo quinto secundæ sectionis legimus, melius esse in omni morbo, partes circa umbilicum & pectinem crassitudinem habere: at vehementem tenuitatem & eliquationem pravam esse. Periculosam enim vel ad infirmas purgationes existere. *Mulieres* quæ amplo valde sunt ventre, admodumque protuberante, ut venter ad coxas dilabatur, ineptæ sunt ad conceptionem. His enim uteri os à pinguedine omenti, ex § aphor. 46, comprimitur, & steriles fiunt, nec priusquam attenuentur, concipiunt. *Parvus venter* ab Aristotele in physiogn. inter primaria loca, ex quibus sapientiæ decor in homine apparet, refertur. Apud alios *venter cavus, & exsuctus*, invidum denotat, & sordidum: *rotundus*, sive potius teres, sobrius: *longus*, segnem & voracem: *prominens*, somniculosum, pigrum, & stupidum: quibus autem *umbilicus* admodum *protuberat*, inter salacissimos referuntur.

Pudendorum virilium proportio.

Magna mentula.

Observeo.

PUDENDORVM quoque in utroque sexu proportio tenenda est, ut de sterilitate, vel fecunditate iudicium sit clarum. Atque ut à *Virili* initium ducam, ubi id erectum est, in homine ætatis adultæ, sex uncias obtinet in *longitudine*, quatuor in *ambitu*, seu peripheria. *Major mentula*, vulvam potius replet magnitudine, quam uterum fecundo semine. Est etiam ineptior ad Venerem, quam neque animose aggreditur, nec diu sustinet, victis pondere musculis, qui rigidam hastam tenent. *Parva* contra, & salacior est, & fecundior, quia titillando cervicem uteri, magis prolecat foeminarum semen, & diutissime pugnam perfert. Est & aliud incommodum, quod longa mentula secum trahit, cum foeminas uterinæ suffocationi obnoxias reddat, quod ligamenta uteri, cervicem nimium in coitu elongando, admodum laxet.

Pudendorum muliebrium proportio. Observeo.

PVDENDI MULIEBRIS proportionem, plerumque ab ore licet desumere. Quibus enim os, & oculi magni sunt, iis quoque amplum est pudendum: observatumque est à me multiplici experientia, omnibus crassis, & pinguibus, mammaeque, & ventrem amplum habentibus, amplas quoque esse vulvas. Contra, quibus mammae depressæ, aut parvæ, os quoque parvum, mentumque acutum, & labia parva sunt, strictam esse, & angustioiorem vulvam. Quibus stricta ergo sunt genitalia, viros quidem delectant magis; at parienti facilius quibus sunt ampla. Cæterum narrat Confalvus Oviedus in historia Indica, Vrabenses foeminas vulvam habere angustissimam, ut ægerime viros admittant, quod ipsis tamen puto arte potius, quam naturæ beneficio contingit, cum sciam duabus maxime rebus incumbere, parvis puta mammis, nec pendentibus, & angusto pudendo. Nec mirum id cuiquam videatur, cum in hisce quoque regionibus familiare id admodum sit scortis nostris, ut arte pessariisque adstringentibus, cervicem uterinam sibi reddant angustioiorem. Has matronæ nonnunquam etiam honestæ imitantur, cum mariti ex lupanari redeunt, de conjugum laxis genitalibus conqueruntur, quas strictas alibi invenerint, ignaræ in quæ pericula se conjiciant, cum menstruo sanguini primum viam, deinde foetui januam claudant, & seipsas demum in mortem præcipitent, quod sæpe cum mortuo, ob angustiam exitus, foetu, simul ipsæ misere animam expirare cogantur. Et hæc pericula maxime evenisse iis vidimus, quæ cum alias strictam haberent vulvam, in gratiam mariti angustioiorem arte reddiderunt: sed miseræ, inepti & temerarii consilii infelices pœnas capite tandem luerunt, & voluptatem mariti improbam, tristi amaritudine condierunt.

CAPVT XL

De mutua Artuum inter se proportionem.

Proportio
artuum.

ESTANT ARTVS, five Manus, & Pedes, quæ hanc inter se *proportionem* habent, ut quibus longi sunt pedes, iis quoque brachia, five manus sint longiores. Dextræ tamen partis artus, five manus sint, five pedes, sinistris semper robustiores sunt, & crassiores, quod solet contingere ob exercitia, & motum corporis, quæ magis dextra, quam sinistra parte perficiuntur. Hinc contra fit, ut iis sinistra partes crassiores sint, qui læva utuntur, & ambidextri sunt. *Præter naturam* tamen hæ partes quoque crassiores fieri possunt, ut in tumoribus: vel tenuiores, si impediatur alimenti sufficiens affluxus, ut in luxatis non restitutis sæpe contingit, maxime si ipsis adhuc pueris aut adolescentibus hoc malum eveniat. Pedes ergo & brachia in corpore proportionato æqualia sunt: hoc est, tanta est longitudo ab osse pubis, ad calcanei usque extremum, quanta ab ala usque ad medii digiti extremum apicem. At quanta pedum longitudo est, tanta quoque trunci esse solet, five superiorum partium, ut Aristoteles loquitur, hoc est, distantia inter ossa pubis, & capitis supremum verticem. Quamobrem *crus proportionati corporis*, tres continebit pedes, cum totum corpus sex conficiat, ut superius dictum est. Si consueta mensura efferre libeat, triginta sex uncias Geometricas dicemus. Ab hac mensura qui deficient, aut excedent, breviora, aut longiora crura habebunt.

Observatio. Notandum autem corollarii loco hic est, observatum à me multiplici esse experientia, eos qui longos habent pedes, ut plurimum albo esse fluentiore. Observandumque propterea id diligentius est, ut cautiore simus in præscribendis purgantibus, nec validiora talibus offeramus, quos facile in pericula conjicere possumus.

FINIS LIBRI PRIMI.



ADRI-

ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS,
DE HUMANI CORPORIS FABRICA.

LIBER SECVNDVS,

Qui Ossium historiam proponit.

CAPVT I.

Ossis naturam, usum, & differentias explicat.



ACTENVS externas humani corporis partes persequuti sumus, earumque appellationes, figuram, ac magnitudinem exposuimus, ut confusa primum ac communi quadam omnium partium habita cognitione, distinctiorem postea, ac definitam animo facilius comprehendamus. Cum ergo jam de iis partibus nobis agendum sit, quæ citra dissectionem in conspectum non veniunt, ut methodo progrediamur, initium ab ossibus sumendum duximus. Quemadmodum enim totius corporis, omniumque partium basis ipsa sunt, ita quoque solidæ in anatomicis eruditionis primum ac maxime

Ordinis ratio.

præcipuum fundamentum merito ab omnibus sapientibus habentur. Quod si pro aliis scientiis facilius capeffendis, locorum atque imaginum beneficio, subsidium fluxæ memoriæ quærimus; mihi certe in hoc dissectionum studio maxime enitendum videtur, ut in tanta partium varietate, aliquod auxilium eidem inveniamus. Nec vero melius meo invenietur iudicio Ossibus, quæ pro locis artificiosis, quam aptissime nobis servire queunt, cum plerasque dissecandas partes, aut annexas sibi habeant, aut certe intra sese coërceant, ut nihil promptius sit addiscere, unde incipiant, quo tendant, ubi definant, qua figura, ac magnitudine singulæ partes sint præditæ, quam illi, qui perfectam ossium cognitionem fideliter animo suo complexus fuerit. Nam quod in tentoriis præstant pali, in ædibus parietes, id nimirum in animalibus ossium substantia est. Ad horum enim imitationem, Galeno docente, 1. de Anat. admin. 2. cætera quæque in animante effingi mutarique solent, ut si calvaria quidem rotunda sit, cerebrum quoque necessario tale fiat; & si oblonga, talem quoque figuram huic ipsi animali cerebrum induat. Iam vero si maxillæ parvæ, faciesque tota existat rotundior, necessario quoque ipsorum musculi protinus parvi erunt: aut si longæ, longa statim ejusmodi animali tota erit facies, ejusque musculi tales comparebunt. Quamobrem profecto non solum ad apprehendendam cæterarum partium naturam, sed etiam ad retinendam felicius, absolutam ossium doctrinam cæteris omnibus præmittere, necessarium videtur. Antequam tamen ad singulorum historiam accingamur, nonnulla in genere de ossibus considerabimus, imprimis quid ipsum Os sit, quos usus præster, & quas habeat differentias. Os ergo, Græcis ὀστέον, & contracte ὀστὴν dicitur, unde & Latini suam fortasse Os mutuarunt vocem. Dicitur autem ὀστέον, quasi ὀσπεον, ab adjuncto proprio, quod firmissima sunt ac durissima in nostro corpore substantia: vel ὀστέον ἵκεον, ab officio opinor, quia (ut eleganter Hippocrates noster) τῷ σώματι στέον, καὶ ὀστέον, καὶ τὸ πᾶσι τοῖς μελεῖν, toti corpori stabilitatem, rectitudinem, & formam exhibent. Est autem * Os, si definitionem ejus quæras, pars nostri corporis simplex, omnium durissima ac ficcissima, ad stabilimentum cæterarum partium creata. Dico os esse partem simplicem, intelligendo incompositam, & similem, five, ut Aristoteles 1. histor. animal. 1. loquitur, ἀπλοῦς, & ἁπλοῦς. Corpus enim nostrum ex partibus constat duplicibus, quarum aliæ sunt similes ac simplices, aliæ dissimiles & compositæ. Simples vocamus, os, nervum, venam, arteriam, cartilaginem, membranam, & denique cutim, non quidem quod revera tales sint (constant enim ex materia & forma, tum ex quatuor elementis, imo vero ex fibris

Ossium cognitio maxime utilis, & necessaria est.

Os.

Ossis definitio.

Partes corporis duplices.

Similes partes
videtur com-
plices dici-
toreque.

Vfus offium.
Primarius, &
maxime gene-
ralis.

Particulares.

1.

2.

3.

Differentia
offium.

A tempera-
mento.

& propria substantia invicem intertextis) sed quia simplices ad sensum apparent, neque in alias ita facile dividi possunt, quemadmodum quæ dissimilares vocantur. Quamcunque enim in simplicibus partem divellas, eandem semper invenies cum reliquis, ut quæcunque frustula ossis, & sint, & dici ossa possint, omnes item nervi cufusvis particulæ, nervi merito cognominentur. Hæc causa est, cur ab Anatomicis similes partes appellata fuerint, quamquam mea opinione, rectius fortassis confimiles dicerentur, si Græcæ vocis ὁμοειπεῖς proprietatem tueri velis, quæ partem sibi similem significat. Nam si accuratius rem omnem lustremus, simile profecto à similari plurimum differt, tantum puta, quantum denominativum quoddamque à re unde denominationem hausit. Sic differt angulus ab angulari, annulus ab annulari. Dicitur etiam Os simplex à nobis, ne erremus ob æquivocationem vocis ossis, intelligentes simul ea, quæ offibus jungi solent, ut cartilagines sunt, & ligamenta, ac periostrium, quo pacto Medici communiter sumunt, cum inquirunt, ossa ex suo loco excidisse. Os ergo à nobis definitur, quod simplex est substantia, & ab aliis omnibus libera, ac nuda. hanc dicimus esse durissimam ac siccissimam, ad differentiam earum partium simplicium, quæ in nostro corpore reperiuntur, & duræ sunt ac siccæ, sed non æque duræ ac ossa, quæ omnium sunt durissima. Cæterum cum cartilagines quoque nonnunquam duræ admodum fiant, imo temporis progressu etiam in ossa degenerent, propterea in definitione, usum finemque ossium addidimus, qua ipsa à cæteris similaribus partibus quam maxime separantur, dicentes, ossa stabilimentum, ac fundamentum omnibus partibus largiri. Hic enim ossium usus primarius est, maximeque generalis, quem & propterea Galenus sæpe inculcat, sed imprimis 1 de anat. Admin. 1, quem locum modo in medium adduximus. Non tamen hic usus ita universalis est, atque communis omnibus, quin multa in corpore reperiuntur ossa, quibus hæc sustinendi corpus provincia minime competere videatur, cum nec dentes, nec jugale os quicquam sustineant, sed illi potius cibis incidendis, hoc temporali musculo muniendo sit præfectum. Quamobrem præter generalem hunc usum, alii quoque erunt, iique particulares, quorum & mentionem diversis in locis idem Galenus injicit. Ac primus quidem est, ut sint firmamenti loco ac tutelæ subiectis partibus, quo pacto cranium cerebro inservit, os jugale temporali musculo; costæ, partibus vitali facultati destinatis; vertebrae, spinali medullæ. Alter usus est, adjuvare melioremve reddere actionem alicujus organi. sic patella in genu ambulationem, ossa sesamoidea in digitis manuum apprehensionem perficiunt, dum scilicet hos articulos firmant, ne in motu extra suam sedem labantur. Tertius est apprehensio, quem usum præstant dentes, tum qui cibum incidunt, ut incisorii; tum qui frangunt, velut canini; aut comminuunt, tanquam molares. Est autem maxima ossium differentia inter se, quas ut omnes investigemus, ea quæ singulis partibus compositionem quandam habentibus accidere solent, ordine intueamur. Primoque Temperamentum ipsum, quod etsi omnibus ossibus citra discrimen frigidum, & siccum contigit, unde omnia quoque dura sunt, ac firma: alia tamen aliis multo sunt sicciora durioraque, nec tantum ratione ætatis, sed & sexus, & morborum, & ossium denique inter se in homine adulto. Ratione enim ætatis, puerorum ossa mollia admodum & humida sunt, si conferas cum ossibus senioris: quin imo pleraque cartilagines potius, aut membranæ, quam ossa vera videri queunt, donec progressu tandem ætatis solidiora & sicciora, ab interno calore indurata, fiant. Signo esse possunt primum in lucem editi infantes, qui hac de causa pedibus insistere nequeunt, sed vacillant. Hoc monstrabit idem lallans, nequiesque proferre articulata verba eorundem lingua, donec hyoidis os, quod basis instar, linguæ & musculus ejus substernitur, siccatum firmitusque redditum fuerit. Siccissima è diverso sunt ossa decrepitorum, in quibus cartilagines quoque in ossium naturam perquam multæ sæpe degenerant. Virorum quoque ossa duriora esse fœminarum ossibus summus naturæ genius Aristoteles, 2 de part. animal. 9, prodidit. In calidis autem morbis, ardentibusque febribus, sic exsiccati ut fere lapidescant, experientia demonstrat. Sed enim, & in homine adulto si invicem conferantur, durissima quædam inveniuntur esse; ut ossa temporum petrosa, quæ à nimia duritie petris simili cognomentum acceperunt; & tria auditus officula, os item fœmoris, tibiæ, humeri, cubiti & radii: quædam contra molliora, ut ossa digitorum: quædam respectively mollissima, cujusmodi

cujusmodi sunt vertebræ, ossa carpi, tarsi, & denique omnes epiphyses. Nonnulla extrinsecus obducuntur durissima crusta, intus vero mollem laxamque substantiam coërent, quemadmodum cranium duplici lamina investitum: plurima contra simplicem tantum habent substantiam, ut os fœmoris, aliaque duriora. Ratione *figure*, A figura. magna est differentia ossium. Alia enim triangulum referunt, ut scapulæ ossa: alia quadrangulum, ut duo ossa syncipitis: nonnulla pentagonum, ut os occipitis. Cubi formam refert, os cyboides: naviculæ, os naviculare dictum: clavis antiquæ, ossa claviculæ. Stapedis, mallei, & incudis, tria auditui inservientia officula, quibus & propterea hæc nomina imposita. Sunt & alia, quæ quod sesamæ semen referant, sesamoidea sunt appellata. Fibula quoque denominationem accepit ab acu fibulæ rectæ antiquorum, quam repræsentat tibix junctæ. Reperiuntur etiam ossa quæ curva sunt, ut costarum ossa: item quæ v Græcorum referunt, ut os illud quod lingux radici præfigitur, proptereaque *ὑπογλωττιδης* dictum. Nonnulla multarum figurarum sunt, ut os quod communiter cuneiforme à situ inter alia ossa, sed *πολύμορφον* multiforme, à figurarum multitudine, quas habet, nuncupatur. Multa quoque sunt ossa, quæ figuræ carent, qualem quidem recensere liceat inter Geometricas, aut aliarum rerum formas: figuram tamen habent propriam, ut os fœmoris, humeri, cubiti, quia habent figuram quæ soli fœmori, humero, aut cubito competit, non alteri ossi. Nec tamen figura in toto osse semper spectatur, sed etiam in partibus, unde factum est, ut sæpe à partis figura totum os nomen mutuarit, quemadmodum secunda vertebra ab Hippocrate *dens* dicta, quia processum habet, qui denti quoquo pacto assimilari queat. Sic processus, sinus, & cervices quædam sua nomina habent. Processus enim qui stylium refert, *στυλοειδης*, qui acui similis, *βελωνοειδης*, dicitur. Illi qui sub auditorio meatu sunt, à similitudine quam habent cum mammillis *μαστωειδης*, mammillares dicuntur. Processus ossis cuneiformis, quod vesperilionum alis assimilentur, *ἰσχυροειδης*, aliformes nominantur. Ratione *meatum* etiam ossium multiplex differentia nascitur. Quædam enim insignem cavitatem habent medulla plenam, ut os fœmoris, tibix, humeri: quædam vero sinus tantum quosdam, cavernulasque obtinent, spongiæ aut pumicis instar, cujusmodi sunt in majorum quidem numero, os sacrum, corpora vertebrarum, sternum, talus, os calcis, & denique ossa verticis, quæ inter duas laminas substantiam spongiformem continent; inter minores vero, ossa carpi, & tarsi. Nullum enim os, quod parvum est, inquit Galenus 11 de us. part. 18, medulla præditum est, nec ullam habet effatu dignam cavitatem, sed quædam tantum cavernulas exiles, & angustas, idque in eum finem sic institutum est, ne si parva ossa ampliter cava forent, debilitate animali noceant; si magna, solida gravitate sua incommodent. Nonnulla habent foramina quædam, eaque vel magna, ut os occipitis, ubi spinalis transit medulla, & vertebræ, item ossa pubis, quæ insignia foramina habent: vel parva, uti capitis pleraque ossa, in primis quod cribriforme dictum, ob copiam foraminum quibus cribrum exprimit: alia contra foraminibus carent. Si *superficiem* consideremus, alia ossa A superficie. lævia sunt, ut os frontis, & duo verticis; alia aspera, ut fœmoris, humeri, os occipitii, quæ asperitates à Natura sunt conditæ, vel ob musculorum firmiorem exortum & inflectionem, vel eorundem tutiorem progressum. In *magnitudine* quoque notatu A magnitudine. dignum reperitur discrimen. Sunt enim quædam ossa maxima, ut os fœmoris, quod omnium in corpore maximum est, deinde tibix os, & humeri: quædam sunt mediocria, ut ossa radii, & cubiti: quædam parva, ut digitorum, carpi, tarsi que ossa: nonnulla minima, ut quæ sesamoidea appellantur, & tria officula auditus. Sunt quoque alia longa admodum, at gracilia, cujusmodi est fibula, & costæ: quædam contra lata atque ampla, ut ossa innominata dicta, & sacrum, scapularum quoque ossa triangula, frontis, syncipitis, & occipitii: quædam vero sunt crassa, ut astragalus, & calcis. Ratione *numeri*, tot sunt ossa, quot commode partium muneribus satisfaciendo erant, adeoque nec plura, nec pauciora. Quamvis profecto Natura benignissima unicuique potius os, quam plura extruxisset, quod unitas continuatæ plurimum ad partium robur momenti adferat, sed motus corporis impedit, qui multitudinem exposcit. Quo nomine ipsa quoque cum plura pro uno in aliqua parte constituit, summa semper providentia cavit, ne temere quicquam crearet, sed vel ad motum illius partibus com-

tis commodum, vel ad tutum vasorum transitum respiceret. Huc pertinere videtur, quod quarundam partium ossa in prima generatione plura sunt, quæ postea in unum os ætate crescente coalescunt. Sic maxillæ inferioris ossa duo sunt in infante, tempore procedente in unum abeunt. Occipitis tria sunt ossa, nonnunquam plura, quæ postea unum efficiunt. Sic sternum in senibus ex uno osse constat, in adultis ex tribus, in pueris qui pubertatem nondum egressi ex quatuor, in modo natis ex octo. Ex his autem ossibus, quædam cito coeunt, quemadmodum sunt occipitis, & maxillæ inferioris, quæ in primo septennio coalescunt; alia tardius, ut ossa capitis, quæ non nisi in ultimo senio uniuntur, primumque fere obliteratur sagittalis futura, hinc lambdoides, post hanc coronalis, extremum denique squamosæ, quæ temporum ossa cranio jungunt. Senibus enim diuturnitate, & siccitate non secus atque appendices futuræ sic abolentur & connascuntur, ut vix vestigium aliquod remaneat: postremæ tamen semper sunt temporales, nec unquam observatæ fuerunt obliteratæ reliquis remanentibus.

A situ. In situ quoque ossa admodum variant: sed cum situs, & sedem ossis, & connexionem ejusdem cum altero indicet, Natura quidem provida, sedem cuique eam largita est, quam exposcebat, ut instituto muneri promptius satisfaceret. Alia ergo ossa sunt superiora, alia inferiora, alia antica, alia postica. Nexus vero diversus est valde, prout inservire debebat motui evidentiori aut obscuro, vel etiam robur & stabilitatem partibus communicare. Ratione sensus nonnulla, sed oppido quam levis occurrit differentia. Soli enim dentes tactu præditi, reliqua sensu destituta videntur, si quidem os citra periostrium consideres, à quo mutuare sensum ossa consueverunt. Quanquam profecto nec ipsi etiam dentes per se sensum habeant, sed eum potius acceptum referant membranæ, quæ internam dentium concavitatem succingit. Ut enim cætera ossa omnia foris membranam quandam obtinent qua vestiuntur, quæ propterea *periosteum* dicta est, ita dentes intrinsecus undique tenui quadam pellicula, quæ tactum exquisitissimum ipsis largitur, circumvolvuntur. Tandem ratione temporis suæ generationis ossa differunt. Sunt enim quædam quæ una in utero cum homine generantur, quemadmodum ossa capitis, femoris, tibiæ, cubiti, radii, & pleraque alia: quædam edito in lucem foetu nascuntur, cujusmodi sunt ossa carpi, & pedii omnia. Dentis quoque jam nato accedunt, ex quibus quidam celerius, quidam tardius prodeunt, nonnulli etiam in senio, ut sunt illi, quos *opisthion* sapientiæ dentes Hippocrates vocavit, quod tum demum homini erumpant, cum jam sapientiæ ætatem attigerit. Ex iis etiam quæ in utero prodeunt, nonnulla perfectæ absolutaque in lucem veniunt, ut tria ossicula auditui inservientia, cætera omnia imperfecta nascuntur, quod vel processus ipsis, vel sinus, aut aliquid aliud desit.

C A P V T II.

De partibus ossium, ubi nomina, quorum frequens in ossium historia mentio fit, simul explicantur.



AMETSI ossa, ut supra jam à nobis determinatum est, simplices sint partes, nec propriam propterea figuram requirant, ut quæ organicis duntaxat competit: ob usum tamen, quem vel ad motum corporis, vel ad fulcimentum molliorum membrorum conferunt, diversas partes, formamque peculiarem acceperunt. Nisi enim certa ossium inter se fieret articulatio & commissura, profecto motus omnis animalis necessario periret: neque si nullibi aut protuberarent, aut in se subsiderent, quidquam aut nasci ex ipsis, aut inseri iisdem potuisset. Quamobrem provida Parens sic ossa condidit, ut modo collum ritu extuberarent, modo vallium instar subsiderent. Cæterum cum protuberantiæ ejusmodi aut cavitates variæ sint, ac propterea diversas fortitæ fuerint appellationes, in præsentiarum de ipsis agendum duximus, ut ossium quæ sequetur dehinc particularis historia, in qua laxissime earum mentio nobis facienda est, ab illis tenebris, quæ ignoratis his vocabulis affundi solent, libera præstetur. Ossia autem in quibus eminentiæ hæ aut cavitates reperiuntur, non unius semper sunt generis, sed quædam partes ossis præcipuæ, quædam verò partes tantum adnatæ.

Voco

Voco nunc *partem præcipuam*, quæ os est à Natura primario constructum, durissimumque adeo, & in medio adnatarum partium consistit: *Adnatam* vero illam, quam Natura offi primario, quasi ipsa sui oblita, os brevius factum, necessario elonget, adjunxit. Illa, vulgo communi appellatione Os dicitur; hæc apud Græcos propriam accepit denominationem, & *Ἀρσφύς* vocatur; Latini autem cum multa habeant nomina, quibus exprimant, rectissime ab elegantioribus *Appendix* vocatur, quo pacto & nos semper in sequentibus appellabimus. Horum naturam qui velit intelligere, vituli, agni, alteriusve junioris animalis os grandiusculum, puta fœmur, aut humerum, à carnibus liberum, (prius tamen bene coctum,) durior contractet manu, protinusque partem ossis, quæ appendix est, discedere experietur. Sunt autem epiphyfes ossa quidem ut cætera, minus tamen quam præcipua, duræ, propterea quod ita solidam substantiam naturæ non sint, sed potius cavernulis plurimis, spongiæ pumicivæ in modum intus plenæ. Accedit quod nec cavitatem, ut cætera tam amplam acceperint, quin potius cavitatem reliqui & præcipui ossis medulla plenam, obstruant, ut Galenus idcirco non sit veritus scribere, appendices omnes opercula esse ossium medullam continentium. Profectioribus tamen calore aucto, & accedente motu ita indurantur, ut parum à reliquo osse differant. At enim Natura in efformandis his appendicibus, mea quidem sententia, singulare suæ providentiæ exemplum reliquit. Nam cum ossa integra, ex primario, adeoque duro, sicco, & solido osse, consistere haudquaquam possent, quod animali fuissent ponderi, sicque motum, cui destinata erant, impedissent potius, quam eidem aliquid tulissent adjumenti: neque tamen ex ejusmodi quoque molli & rariore, quales sunt epiphyfes, quod tum muneri suo minime satisfecissent, & singulis momentis fracturis opportuna periculis hanc mortalium vitam cumulassent: Natura solertissima ingeniosum commenta est inventum, & mediam quidem ossis partem, duram solidamque, extremas vero molliores rarioreque fabricata est. Hac ratione provida prudensque Parens, quod imminere grave discrimen facillimo negotio avertit, cum ita comparatum sit, (quemadmodum vel in scipione, cui quis innititur, id videre est) ut semper in medio rupturæ periculum fiat maximum. Quare ut hoc evitaretur, aut medium durius, aut crassius faciendum erat. Sed crassius cum commode non posset, ingeniose durius effecit. Omnibus ergo grandioribus ossibus epiphyfes affixit, nec tamen hoc solo nomine: sed etiam ut gratia articulationis molliores ossium extremitates fierent, & muscoli, qui (ut carnei) molles sunt, tutius ab iis originem ducerent, inque eas infererentur. Quin nec opportuna articulatio tam duras ferebat partes, cum durum duro junctum in motu facillime atteratur: neque durum molli tuto conjungitur, cum hoc facile vincatur. Et hæc causa est, cur præter magna ossa, minora quoque suas habeant epiphyfes. Ossibus ergo omnibus, quæ articulari inter se ad motum evidentem debebant, epiphyfes adnatæ sunt: non tamen lævi, planaue superficie, cum facile sic divellerentur, sed quibusdam asperitatibus cum ossis alterius sinibus commissis. quæ sane unio in tenera ætate, junioribusque, admodum infirma est, proptereaque citra coctionem, aut putredinem, facillime ab ossibus separabilis. Ossa autem, sive appendices sint, & epiphyfes, sive ossa primaria præcipuaque, superficiem habebunt, aut æqualem ubique, & nullibi asperam: vel inæqualem, & alicubi protuberantem, aut æqualem ubique, & exsculptam, sinuosamque. *Protuberantia ossis*, Græcis *ἀρσφύς* dicitur, Latinis *Processus*, estque ea ossis pars, quæ ex ipso extra superficiem eminet, ac quasi protuberat. Tales processus in singulis fere ossibus reperiuntur, præcipue tamen in ^a vertebra, cum nulla sit, quæ non pluribus donetur; & in ^b maxilla inferiore, quæ utrinque duos insignes processus obtinet. *Sinus* autem est insculpta quædam offi cavitas, qualis est in ^c Coxendicis osse, in ^d scapula, aliisque insignis. Vterque autem processus, & sinus multiplex est: sed imprimis processus, cum alius acutus sit & tenuis, alius vero rotundus, & sphericus. *Acutus*, Græcis *τετραγώνος*, & *ἀνχύλιος*, *Collum*, & *Cervix* dicitur, estque protuberantia quædam acuta, & longiuscula. Differt tamen collum, quod aliud quidem simpliciter acutum sit, & à latiore basi in angustiorrem verticem abeat, *κράνιον* dictum à Græcis, à Latinis *cervix* aut *processus acutus*, cum jus quoque plures sunt species, prout vel *stylum* refert, & dicitur ^e *στυλοειδής* aut *χρησφοειδής*: vel *mammis*, ^f *μαστιγιδής*; vel *anchorum*, ^g *ἀγκυροειδής*; vel *rostrum corvinum*, *κροκοειδής*: Aliud collum,

Appendix.

Vfus appendicis.

ἀρσφύς, Processus.

Sinus.

Processus acutus, τετραγώνος, ἀνχύλιος, Cervix.

κράνιον.

κεφαλή.
Caput.

κείνυλοι.

Sinus.

κεύλη.
Acetabulum.

γλήφα.

ἴναι.
ἄφρονες.
χρῆλαι.

collum, sive cervix ubi acutum aliquantisper mansit, in latam extremitatem definit, quæ vel caput constituit articuli, ut ^a cervix fœmoris, qui ossi coxendicis articulatur; vel sinum, quemadmodum ^b scapulæ cervix. At processus qui rotundo eminent tubere, *Capita* vocantur, κεφαλή, ἢ κεφάλαια, suntque processus, qui alterius ossis cavum articulationis gratia ingrediuntur. Hæc capita, aut oblonga sunt, & prominentia, ut est ^c fœmoris caput; vel depressa, ut ^d digitorum capita. Illa à Græcis κεφάλαια, nomine generis: hæc κείνυλοι dicuntur. Sic enim Galenus has voces accepisse videtur, cum i de motu musculorum, κεφαλῶ cum κεύλη, κείνυλον autem cum γλήφῃ & sinu confert, Latini non habent proprias voces, quibus has Græcorum exprimant. *Sinus* autem cavitas est caput excipiens; & cum caput duplex sit, (ut dictum,) sinus quoque bifariam commode dividitur. Altior enim profundiorque, qui κεφαλῶ, seu caput eminentius fuscipit, κεύλη, Latinis *Acetabulum* dicitur, qualis est, cujus jam sæpe mentionem injecimus, coxendicis sinus, qui fœmoris caput excipit. Depressior vero ac superficialior, qui capiti respondet depressiori, sive κείνυλοι, γλήφῃ ab ocularis sinus forma, quæ palpebris clausis apparet, cognominatur. Tales invenire licet in ossibus tarsi, ubi pedii ossibus junguntur, quemadmodum & in carpi ossibus, ubi postbrachiali copulantur. Quamobrem κεύλη, sinus erit insignis admodum & conspicuus: γλήφῃ autem adeo obscurus, ut ambiguum merito videatur, si vere sinuum numero debeat ascribi. Cæterum in summitate sinuum processus quidam occurrunt, labiorum instar, qui in profundis maxime sunt conspicui, & Græcis ἴναι, ἄφρονες, & χρῆλαι, Latinis *Labra*, & *Supercilia* appellantur. Atque hæc sunt illa vocabula, quibus ossium partes ab Authoribus inscribuntur, quæ tanto diligentius memorix mandanda sunt propterea, quod particularis ossium historia, his non optime prius intellectis, necessario obscura atque difficilis valde videatur.

C A P V T III.

De ossium inter se structura ac connexu.



ATVRA solers omnium parens, Hominem sapientiæ studio, & earum rerum, quas toto mundi complexu coërcuit, contemplationi addixit. Quare non ex uno osse continuo fabricari debuit, ne Homo omnium dominator, immobilis trunci instar, in uno perpetuo loco affirmatus hæreret, sicque varietatem tantarum rerum ubique diffusam ex oculis conspectuque amitteret. Plura ergo fecit ossa, ex quibus constaret, & ut commode invicem moverentur, non temere, sed ut cætera omnia, divino artificio, singularique solertia, inter se copulavit. Hujusmodi ossium compaginem, Græci σκελῆν vocant, quasi reficcatum aridumque (intellige σάμνα,) καὶ τὸ σκελετικόν, quod ficare significat: cæterum mutuam illam connexionem ἄρθρον sive *Articulum*, quemadmodum Hippocrates libro de locis in homine indicavit, dum οὕτω γὰρ, inquit, ὅσα πλεῖστα ἐαυτὰ συνβάλλουσιν, πλεῖστα ἄρθρα πείουσιν, hoc est, quæcunque ossa invicem committuntur, ea omnia articulos efficiunt. Quamquam id vocabuli ambiguitate non careat maxima, quam explicare nunc decrevimus, quod plurimam lucem in authorum lectione studiosis adferre possit. Significatione enim generali, ἄρθρον appellant Græci, extremitatem ossium inter se connexorum, sive caput sit, sive sinus, quemadmodum in diarthrosi: sive etiam asperum aliquid, ut in suturis. Magis strictè, pro capite tantum sumitur, ut testis est Galenus, in proœmio libr. de oss. ad Tyrones, cum inquit, Hippocratem extremam partem alterius ossium sibi invicem cohærentium, ἄρθρον vocare, non tamen quamvis, sed quæ orbiculata est, & in cavum proxime inferitur. Hoc pacto in libr. de articulis ab initio scribitur; Humeri articulum uno modo prolabi, in alam videlicet, novi. Sæpe pro ipsa conjunctione ossium, ut dixi, accipitur, quomodo & Galenus in proœmio dicti libri de ossibus ad Tyrones, definit, naturalem esse ossium σύνταξιν, & constructionem. Interdum tamen pressiore significatione, non quamlibet, sed eam tantum notat, quæ motus edit manifestos. Sic Hippocrati, libr. de arte, ἄρθρα vocantur, ἐν οἷσιν αἱ συνέσεις τῶν κινημένων ἐξέων ἐγκυκλίεσθαι, in quibus ossium, quæ moventur, commissuræ vertuntur. A medicis etiam locus circa articulos ossium, ἄρθρον vocatur, ut cum vocant ἄρθρον ἀλγήμενον, dolores articulorum, qui tamen non in ipsis articulis sunt,

Articulus.

ἔστιν ἀμφοτέρωθεν.

1.

2.

3.

4.

5.

a, 2. 10. 1.
b, 1. 7. 13.
c, D.e, 2. 10. 1.
d, 2. 10. 1.
11. 10.

culis sunt, sed potius in partibus articulos circumfistentibus, puta in tendinibus, carnis, nervis, & membranis. hincque Arthritis nomen accepit, & arthritici dolores. Cæterum ut omnes ossium compositiones in medium afferamus, (ipsas potius ex structuræ varietate, quam ab usu, & motu evidentiore, ut plerique Anatomici petentes)

Compositio
ossium du-
plex.

alias dicimus continuas esse, alias contiguas. Græci dicunt alias κατὰ σύμφυτον, per coalescentiam fieri, alias κατ' ἄρθρον, per articulationem. In quibusdam enim ossium nexibus ita junguntur invicem, ut prorsus sensum eorum compositio effugiat, & potius unum os continuum, quam duo, videatur, quemadmodum in structura eorum, quæ κατὰ σύμφυτον dicuntur juncta esse: in quibusdam laxiore modo committuntur, & duo separata ossa remanent, sequè invicem contingunt tantum, ut sic facile evidens structura conspectui se offerat. κατὰ σύμφυτον ergo copulari dicuntur ossa duo, quæ continua sunt, & ita inter se nexa, ut in unum coalescant ac ita connascantur, ut sine alterius partis

I.
κατὰ σύμφυτον.

ruptura, separari à se invicem non queant. Quemadmodum autem duplex est unio; prima, quæ per se fieri dicitur, cum duæ partes divisæ nullo intercedente medio cœunt, quemadmodum vulnera quæ per primam intentionem curari dicuntur: altera, quæ per accidens, interveniente aliquo heterogeneo, quemadmodum illa, quæ per secundam intentionem consolidantur, ubi aut per carnem, aut cicatricem labia vulneris inter se junguntur: eodem modo etiam ossa inter se, modo nullo interveniente medio coalescunt, quæ vera & legitima, modo aliquo medio intercedente, quæ minus propria symphysis vocatur. Priorem illam speciem observare tibi licet in maxilla inferiore, quæ ex duobus ossibus per σιγχοῦνθρων junctis, in unicum os degenerat, cartilagine illa, quæ utrumque intervenit, ita ossescente, ut ne vestigium quidem ejus postea relinquantur. Cum ergo in prima hominis nativitate, ossa duo maxillæ per os

Symphysis quæ
medio caret.

σῑμφυτον improprie dictam juncta fuerint, per legitimam deinde copulantur, ubi cartilago abolita fuerit. Sic ergo in ossibus fœtus ex utero egressi, innumeras cernere licebit appendices, per σιγχοῦνθρων, & σιγχοῦνθων unitas, quæ postea vinculo intermedio evanescente, ac in ossilem naturam abeunte, primaria symphyseos specie cæteris agglutinantur. Sic vertebræ quoque singulæ, ex tribus ossiculis infantibus constant, cartilagine sibi junctis, quæ paulo post in unum continuumque os facessunt. Sic ossa innominata, sic sternum se habet. Sed advertenda hic diligenter causa est, quam huic

diversitati symphyseos Galenus libr. de ossibus, assignavit. Mollia enim, inquit, & spongiosa ossa facile coalescunt, & ita connascuntur, ut unum evadant: at quæ dura sunt, & solida, ac densa, quo coeant, medio aliquo indigent. Quæ enim multum natura à se invicem distant, ut durum, & molle, ea uniri, nisi per medium, non possunt. Molle quidem cum molli facile connascitur: at durum cum duro coire, nisi quid interveniat, quod utrumque liget, non potest. Quare quæ sicciora, & densiora sunt ossa, alterius interventu coalescunt. Sed cum medium illud triplex sit, cartilago nempe, nervus, & caro, tres quoque vulgo symphyseos species ponuntur, σιγχοῦνθρων, σιγχοῦνθων, & σιγχοῦνθων. Ego tamen relinquens σιγχοῦνθων, quod nullum os alteri per nervum proprie dictum jungatur, alias duas species pono, quas propriis magis vocabulis insignio, σιγχοῦνθων, & σιγχοῦνθων, cum ipsi etiam Veteres, per σιγχοῦνθων, ligamentum, & tendinem intellexerint: impropriis tamen potius, quam certis, & definitis

vocibus uti in hoc negotio voluerint. His addo postea aliam quoque differentiam, de qua ante me nullus verba adhuc fecit, σιγχοῦνθων: adeo ut pro ratione medii quintuplicis, quinque etiam species constituam, σιγχοῦνθων inquam, σιγχοῦνθων, σιγχοῦνθων, σιγχοῦνθων, & σιγχοῦνθων. Est autem σιγχοῦνθων unio ossis continua, facta intercedente cartilagine, & utrumque os colligante. Sic ossa inferioris maxillæ in pueris, sic pubis ossa in adultis junguntur. In medio enim pectine, cartilago est, quæ utrumque os unit, & disse-

canti per longitudinem pubis ossa, evidentissime apparet. σιγχοῦνθων, sive concarnatio, ea unio est, quæ fit per carnem. Hoc pacto generatim loquendo, omnes articuli musculis obducti committuntur. Cum enim ab uno plerumque osse originem trahentes, alteri inferantur, ligamenti cujusdam vicem subire creduntur, quo utrumque copuletur, & neatur. Dicitur hæc unio σιγχοῦνθων, quia musculi, quorum ope fit, à plerisque Veteribus, ut Hippocr. lib. de artic. & potissimum Aristot. carnis nomine appellantur. Vnde & de musculis loquens, 2 de part. animal. 9, (quos tamen nunquam hac voce

Quinque
species sym-
physeos quæ
medium ha-
bet.

σιγχοῦνθων

σιγχοῦνθων

expressit) Caro, inquit, circa ossa consistit, vinculis fibrarum modo tenuibus adhaerens, cuius causa ossium genus habetur. *συνδεσμοειδής* est, cum ligamento accedente fit nexus. Hoc autem, modo latum est, & totum articulum involvit, ab uno osse enascens, & alteri implantatum, quale fere articulos omnes conjungit, utque illud est, quod os fœmoris cum coxendice, os humeri cum scapula ligat: modo rotundum, & teres, validissimum tendinem referens, & tantum maximis ossibus, & quæ facile excidere possent ex suo sinu, appositum, ut utrique fœmoris capiti, tum illi, quod superius coxendicis cavitati præponitur, tum illi duplici, quod tibiæ jungitur. Nonnulla ergo ossa duplici *συνδεσμοειδής* uniuntur, ut fœmoris articuli, qui rotundum & teres ligamentum habent: nonnulla tantum simplici, ut digiti. *συνέων* vocant illam unionis speciem, quæ per tendinem fit. Sic patella fœmori, & tibiæ; sic officula sesamoidea appellata, digitorum ossibus nectuntur, quod tendo hæc interceptans ad ossa alligat. Vltima tandem species est *συνέμειρος*, quæ fit ope membranæ, qua ratione in recens natis ossa syncypitis cum osse frontis junguntur.

Κατ' ἀρθερον, five per articulum componuntur, quæ contigua sunt, cumque vel laxa sit, vel stricta hæc compositio, & laxa iterum, vel motum habeat evidentem, vel motu evidenti, aut etiam omni careat, hinc sequitur, tres alias oriri differentias, quarum illa, quæ stricta est & compacta, *συνάρθρωσις*, Coarticulatio dicitur; altera, quæ laxa, & conspiciunt motum partibus largitur, *ἀνάρθρωσις*, five Perarticulatio vocatur; tertia, quæ laxa quidem, sed motum, aut nullum, aut certe non evidentem habet, *ἠδνήσας* Neutra, cum Galeno de ossibus ad Tyrones, cap. 13, vocari potest, quia ratione compositionis *ἀνάρθρωσις* est similis; cæterum propter impeditum motum *συνάρθρωσις*. Hæc fortassis *ἀνάρθρωσις* spuria, si cui nomina libeat fingere, non incommode appellabitur. *ἀνάρθρωσις* ergo tres species sunt, *ἐνάρθρωσις*, *ἀρθρωδία*, & *γίγλινος*. *Enarthrosis* est, qua cavitas profunda rotundum & eminens caput excipit: five, ut propriis vocabulis utar, qua *ῥαφὶς κεφαλῆς* articulus suscipit, qualis articulatio est ossis fœmoris cum Ischio. *Arthrodia*, qua caput depressum, cum sinu leviter cavo jungitur, ut est articulatio capitis cum prima vertebra, radii cum humero, & digitorum inter se. In qua articulatione maxima sane latitudo conspicitur, quæ in majori minorique capitis rotunditate, aut sinus profunditate sita est.

3. Ginglymus. *Ginglymus* tandem est, quando os idem est, quod excipit, & quod excipitur, fitque unus ossis gibba, alterius cava subeunt: & rursus unus ossis sinus, alterius gibba admittunt, non secus ac ofiorum fenestrarumque cardines, qui Græcis *γίγγλυμοι* dicti, huic tertiæ articuli speciei nomen invenerunt. hæc ratione cubitus cum humero, & vertebrae inter se copulantur. Cæterum hæc vocabula *ἐνάρθρωσις*, *ἀρθρωδία*, & *γίγγλινος* etsi prisca illis, & antiquis Anatomiae Patribus in usu non fuerint, neque cognita fatis, non dubitavit tamen Galenus ad usum primus, doctrinæ gratia revocare, cum in quavis methodo aut disciplina, in qua inopia verborum obscuritati occasionem parit, vocabula pro arbitrio cuiusvis fingere liceat, dummodo proposito convenient, & recto iudicio inveniantur. *Neutrius species* similiter tres sunt, iisdemque appellationibus donatæ. Prima est *Enarthrosis*, quæ rotundum caput, & sinum profundum obtrinet, motu tamen caret, qualis est ossis tali cum naviculari. Altera *Arthrodia*, quæ caput depressum, & sinum superficialiter cavum habet, quemadmodum ossa pedii cum tarso, & tarso ossa inter se. Tertia *Ginglymus*, in quo ossis unus cavum alterius gibbum, aut contra, suscipit. Hæc articulationis specie, officula auditui inferientia conjuncta sunt, quæ etsi mutuo se excipiant, motum tamen evidentem nullum habent. *Synarthrosis* quoque *tripartita* est, & in *ῥαφίῳ*, *ἀρμυρίῳ*, & *ῥήμφωσι* dividitur. *ῥαφὶς* seu *Sutura*, est compositio quædam, ad rerum confuturam, vel compactarum similitudinem facta. Confutis similes sunt futuræ vulgo dictæ nobiliores, & propriæ, coronalis, inquam, sagittalis, & lambdoides, quæ ossa frontis, verticis, & occipitii jungunt: Compactis vero assimilantur, futuræ temporum, squamosæ appellatæ. Sciendum tamen, ne æquivocatione quis hic decipiatur, apud Authores etiam melioris notæ, futuram aliquando pro altera synarthroseos specie, quæ Harmonia dicitur, accipi, ut cum multas capitis Harmonias futuras appellant. Est autem *Harmonia* compositio, in qua ossa quæ se invicem contingunt, usque adeo sibi æqualiter incumbunt, ut neutrum in alterum aliquid asperitatis immittat, sed prorsus æquilinea sint, ad quem modum maxillæ superiores,

Species Neutrius.

1. Enarthrosis.

2. Arthrodia.

3. Ginglymus.

Species Synarthrosis.

1. Sutura.

2. Harmonia.

rioris, & nasi ossa ple aque junguntur, os sphæroides, cribrosum, & cætera. Raro tamen exquisita harmonia reperitur, sed semper fere ossa extremitatibus suis aliquid aspredinis habent. quæ caula est, ut harmonia inter futuras quoque relata sit à periti-
 ribus, & veluti improprie dicta futura constituta. *Gomphosis*, tertia synarthroseos spe-
 cies, *ῥόμφη*, id est, clavo, denominationem habet. In hac os ossi clavi ritu infi-
 gitur, quomodo dentes maxillarum præsepulis impinguntur, qui ut omnes, ita soli in
 universo sceletro hanc articulandi rationem observant. Atque hi quidem modi sunt, qui-
 bus inter se ossium compositiones fiunt: cæterum cum illa articulatio omnium sit no-
 bilissima, quæ motui inservit, Natura quoque perfectiorem eam cæteris condidit, ma-
 gisque compositam. Præter enim ossa, quæ ad eam constituendam concurrunt, alia
 quoque accedunt, cuiusmodi sunt, ligamenta, & humor quidam unctuosus, crassus,
 albus, ac pituitosus. *Ligamentum*, Græcis *συνδεσμός* dicitur, quod colligat copuletque
 inter se ossa articulum facientia, estque bipartitum, cum modo latum sit, modo rotun-
 dum ac teres, quemadmodum tum antea dictum est, tum libro sequenti fasius dicetur.
Humor albian, tenax, ac glutinosus, in spatio quo ossium extremitates sibi articulan-
 tur, continetur, vulgoque articularum humor dicitur. Variat quantitas ejus pro arti-
 culi magnitudine, cum majores plus, quam minores contineant. Augetur tamen etiam,
 aut diminuitur, pro causarum præter naturam corpori accidentium diversitate. Nam
 pituitoso humore suppetente copiosior est, itemque si articuli debilitati fuerint, ut
 alimentum suum neque concoquere queant, nec residua expellere. *Deficit* quoque post
 longas febres, exercitia vehementia, & inedia plurium dierum. *Copiosior est* juniori-
 bus, quam senibus, quibus exsiccatur. Interdum quoque, pravis humoribus in corpore
 scatentibus, malignam qualitatem induit, & sævos dolores excitat. Cæterum quocun-
 que modo præter naturam se habeat, motum articuli lædit, maxime tamen si penitus
 absit, ut notavimus sæpius, cum tumore circa articulos oborto, apertoque abscessu,
 humor hic efflueret. Chirurghi enim imperiti, purulentam materiam esse existimantes,
 summa adnitebantur opera studioque, ut prorsus evacuarent: sed una cum humore
 hoc, motum parti adimebant, immobilem articulum relinquentes, sicque intempe-
 stivo & imprudenti officio, ægrotis admodum officiebant.

3. Gomphosis.

Alia quæ ad articulationem laxam concurrunt.

1. Ligamentum.

2. Humor articularis.

CAP V T I V.

De nutrimento quo ossa aluntur, & per quas vias ad ipsa deducatur.



ET SI jam ad particularem ossium historiam pedem movere fas erat, quod ea omnia, que in universum de ossibus dici poterant, persecuti esse videamur: libuit tamen in gratiam curiosi ingenii duo addere, quæ tamen nec sua prorsus utilitate carebunt. Investigabimus primo, quodnam sit ossium alimentum, & per quas vias ad ossa perveniat: deinde, cum omnium Anatomicorum consensu, venæ, arteriæ, & nervi, originem certam ab uno quodam principio ac primo habeant, dubitabimus, an simile quid in ossibus reperiri: quibus sic præmissis, ad pressiora viam parabimus. Ac de nutrimento quidem quale illud sit, si Aristotelem sequamur, dubitatione nulla animus fluctuabit. Passim enim, ut 2 de partibus animal. 3, 4. de partibus. 2, 2. de gener. 4, 3. de gener. 1, & 2. de somno 3, sanguinem esse animalibus sanguineis alimentum ultimum omnium partium: ex sanguibus vero, id quod vice sanguinis habetur analogum, pronunciat. Imo determinatius loquens, de ipsis ossibus affirmat, 2 de partibus animal. 6, eaque sanguine necessario ali attestatur, quod omnes partes eo nutrantur, ex quo facta sunt, at omnes ex sanguine constant; quare etiam omnibus ex sanguine alimentum petendum est. Obstat tamen autoritas primo Hippocratis, libr. de alimento, ubi medullam ossium nutrimentum inquit: deinde Galeni, qui 11 de usu part. capit. 18, Demonstravimus, inquit, medullam proprium esse ossibus alimentum, & ossibus cavitate carentibus tale quiddam in eorum cavernulis contineri, neminem quoque mirari oportere, si medulla sit crassior eo succo, qui in cavernulis continetur, quamquam ejusdem usus gratia hic exstiterit. Quin alibi, ut 3 de natur. facult. cap. ultimo, qualis, inquit, est car-
 nibus sanguis, talis ossibus medulla est. Cæterum in hac controversia, quæ apud Me-

Sanguis ex Aristotele alimentum ossis.

Medulla ossis alimentum ex Hipp. & Gale.

Medullam
non esse ali-
mentum ossis
medullatur.

2.

3.

Sanguinem
esse ali-
mentum
probat.

Clypeus.

Medullam
non esse ali-
mentum
probat.

Explicit
locus
Aristotelis.

dicos satis celebris est, & habemus quæ contra Galenum dicamus, & alia, quæ pro Aristotele in medium afferamus. Multa enim sunt argumenta plurimæque rationes, quæ convincere videntur, medullam nullo pacto ossium alimentum esse. Mirum enim primum videtur, cur Natura medullam ossibus pro nutrimento assignare voluerit, cum ad alendum ea sit ineptissima, ut quæ temperamentum prorsus contrarium ossibus sit nacta, calidum puta atque humidum, illis contra frigidis & siccis existentibus. Præterea medulla pinguedo quædam est, unde & pinguis in pinguibus, sevo autem similis est in iis animalibus, quibus sanguis sevo similis per coctionem evadit. at pinguedo, 2 de part. animal. excrementum est utile, non alimentum corporis. Quin imo, si medulla ossium proprium nutrimentum constituitur, omnia ossa medullam continebunt necessario. at omnia ossa non habent, ut parva, teste vel ipso Galeno libr. de ossibus ad Tyron. Quin, si medulla potius, quam sanguis alimentum aptum statuatur ossium, profecto absurdum sequeretur admodum grave, sanguine multo frigidior, & ficciorem medullam esse, quod à nullo tamen concessum unquam videtur. Et hæc sunt quæ movent, ut à Galeno discadamus: cur Aristoteli autem contra favcamus, maxime ista impellunt. Nullum est animal, quod ossa habens, sanguine careat: neque ullum, quod, sanguine carens, os habeat. Attamen quæ ossibus prædita sunt, non omnia medullam habere videntur, quemadmodum Leo: ex quo consequi videtur, ossa necessario nutriri sanguine, & non medulla. Si quis obijciat Realdum Columbū, qui lib. 1 anat. cap. 19, ossa Leonis solida esse negat, sed medullam intus continere scribit, quod Florentiæ ossa Leonum viderit amplis cavitatibus prædita: si quis etiam opponat Epicurum, qui apud Athenæum 8 dipnosoph. Aristotelis 3 histor. anim. 7, nimis curiosas ac eumentas observationes (sic vocat) deridet, negatque Leonis ossa ita solida esse ac dura, ut collis invicem, non secus atque ex lapidibus, ignis prosiliat. Huic respondeo, non bene concludere argumentum Columbi, ossa leonum medullosa esse, quod amplis cavitatibus sint prædita, cum sinus ossium, non ad medullam continendam, sed ad evitandum pondus ossium inutile primario conditi sint. Nec sequitur velideo quoque, quod etiam modica medulla in ampla cavitate contineatur, quemadmodum in vervecum ossibus, proportionem cavitatis, parum medullæ coërcetur. Et hæc causa est cur Aristoteles quoque 3 histor. animal. 20, & 2 de part. animal. 6, vere affirmer, medullam non nisi in ossibus conclusam esse, non tamen propterea omnia ossa medullam intra se continere, sed ea tantum, quæ cava habentur, tamen ne ipsa quidem omnia contineant. Causam subiungit: Ossia enim Leonis, partim nullam, partim admodum exiguum habent, quamobrem & nullam omnino medullam Leones habere nonnulli existimarunt. Si quis autem querat, cum medulla ossium alimentum non sit, quem usum præbeat, is hanc responsum à me ferat, ossa ob perpetuum motum, & quod natura sua sicca essent, requirere, ut assiduo humectentur, cui usui præstando medulla perquam apta est. Sed restat explicandus locus, qui apud Aristotelem habetur 2 de part. anim. 6, quod contrarius videatur dictis, tum à nobis, tum ab ipso etiam Philosopho, aliis, iisque pluribus in locis. Ossium enim ibi inquit, naturam inesse animalibus necesse est, & ut medullam quoque habeant, quæ pro alimento contineatur, ex quo ossa consistant, necesse est. Videtur hic locus manifestissime statuere, medullam ossium nutrimentum esse: sed facile satisfieri huic difficultati potest, si quis græca tantum verba inspexerit, quæ male hic ab Interprete versa, sic sonant: ἀναγκαῖον τοῖς ὀστέων καὶ μυελοῖς, ἐμπιλαμενα τοῖς ὀστέων καὶ τοῖς μυελοῖς, ἐξ ἧς γίνεται τὸ ὄστος. Reddidit Interpretis passivè, ἐμπιλαμεναντοῖς τὸ τοῖς ὀστέων, cum hoc verbum passivum non sit, sed medium, & propterea active vertendum erat hoc pacto: Necesse est quibusdam inesse & medullam, quæ contineat alimentum, ex quo ossa generentur. Quodnam autem sit alimentum illud, statim subiungit, ὅτι ἡ τοῖς ὀστέων αἷμα, ἐκ τῆς πύλης τοῦ ὄστος, quod autem omnibus partibus alimentum sit sanguis, jam ante dictum est. Quasi diceret, quodnam sit alimentum illud, facillime erit ex aliis, quæ à me dicta jam sunt & tradita, colligere, cum semper statuerim docuerimque, sanguinem omnium partium ultimum esse alimentum. Cum ergo sanguis ossa alat, quæritur per quas vias ad ossa deferatur? Per venas, quæ sibi foramina in ipsis etiam durissimis ossibus efformarunt, per quæ transeant, & alimentum deducant, uti videre est in calvaria, femore, & tibia. Solent etiam vasa in ipsis cavitatibus ossium majoribus undique

undique medulla stipari & sustineri, ad quod Philosophus alludit, cum inquit, medullam esse, non quidem alimentum, sed alimentum in se continere.

CAPUT V.

An ossium aliquod sit principium, quemadmodum venarum, arteriarum, & nervorum, tum quale illud sit, investigatur.

RECEPTUM est ab omnibus fere dissectionum Professoribus, Vasa appellata principium aliquod primum habere, à quo oriuntur. Hinc lecur venarum, Cor, arteriarum; Cerebrum, nervorum fere origo statuitur. Ratio quæ in hanc opinionem ipsos induxit videtur fuisse omnium vasorum continuitas, & quod nulla vena seorsim esset, sed omnes partes viderentur unius. Hæc causa si alicujus momenti est, ut certe esse ab omnibus creditur, recte dubitare meritoque videmur, sitne ossium quoque principium aliquod, cum ossa alia aliis nexa, & omnia inter se apta videantur, unamque continuam seriem venarum in morem constituere: imo os nullum sit, quod seorsim ipsum per se subsistat, ut loquitur Aristot. 3 histor. animal. 7. Accedit & ratio, quæ id concludere firmiter videtur. Cum enim ossa motus gratia invicem coarticulata sint, motus autem omnis fiat à mobili in quiescente, recte videtur sequi, unum os alterum motum semper sustentare. at cum quiescens illud in alio quiescat, tandem ad aliquod primum quiescens pervenire necesse est. Hoc ut inveniatur, accipiendum ab initio est, illud statui merito ossium principium, quod longitudinem ac rectitudinem totius hominis contineat, & à quo veluti ex trunco rami, reliqua ossa exoriantur. At hæc conditiones non alteri, quam spinæ dorsi competunt, unde recte etiam ipsa ossium principium esse statuere convenit.

CAPUT VI.

In quo brevis omnium totius corporis ossium divisio, & enumeratio instituitur.

CVM jam recta nobis ad particularem ossium historiam eundum sit, præmittere eorum omnium numerum placuit. Sed cum is admodum ratione ætatis differat, aliisque sit in recens natis, quam homine perfectam ætatem adepto, nos eum afferemus, qui in adulto reperitur, ossaque describemus, qualiter se in perfectis habeant. Nam ea, in quibus differentia sunt infantium ossa, ex iis quæ de formato fœtu scriptimus, satis patebunt, ubi diligenter totum hoc negotium complexi sumus. Univerſa ergo ossium compago, quadripartito à nobis dividitur, in caput puta, thoracem, infimum ventrem, & artus. CAPUT vocatur, totum id quod supra colli vertebrae situm est, & bifariam iterum, in Cranium, sive calvariam; & Faciem, sive maxillas dispecisci potest. *Calvaria* est, quicquid supera parte cerebrum tegit, & ipsum vicissim capillis tectum est, quibus decidentibus calvities oritur, à qua nomen ipsa calvaria accepit. Græcis *κεφαλή* dicitur quasi *κεφάλαιον*, galea, à figura & usu: *ῥαχίς* autem & *σπονδυλίων*, si inverse consideretur. Constat hæc in adultis communiter ex quatuordecim ossibus, quorum alia sunt propria ipsi, alia communia cranio cum maxilla superiore. *Propria* sunt, os frontis, duo sincipitis, occipitis unum, & temporum duo: sex deinde auditui dicata ossicula, in qualibet aure tria, malleus, incus, & stapes. *Communia* similiter duo sunt, cuneiforme, & spongiosum. *Maxilla duplex* est, superior, & inferior. *Superior*, præter communia duo dicta, utrinque sex propria obtinet. *Inferior* ex uno osse constat. Vtrique infixi sunt *Dentes*, quorum in homine adulto trigintaduo sunt, in qualibet puta maxilla sedecim, ex quibus quatuor incisorii, duo canini, & decem molares. **THORAX** dividitur in partem anteriorem, laterales, & posteriorem. *Anterior*, duas clavículas, & os pectoris, ex tribus constans ossibus in adulto homine, complectitur: *laterales*, costas, utrinque duodecim: *posterior*, scapulas duas, & duodecim vertebrae. Thoraci adjungenda est *Cervix*, quæ septem Vertebrae complectitur, & os hyoides dictum, quod

Capitis ossa recensentur.

Calvaria ossa.

Maxillarum ossa.

Thoracis ossa.

Infimi ven-
tris ossa.

Artuum ossa.
1.
Manus.

2.
Pedis.

quod ad linguæ radicem in summitate laryngis situm est, & maxima ex parte undecim ex ossibus componitur. **INFIMVS VENTER** Antica parte duo pubis ossa habet; ad latera ossa ilium, & coxendicis; postica sede lumborum quinque vertebrae, sex ossa ossis sacri, & quatuor coccygis. **ARTVS**, in manus, & pedes dividuntur. **MANVS** iterum in humerum, cubitum, & extremam manum. *Humeri* os unum est. *Cubitus* duo habet, *Radium*, & *Ulnam*. *Manus extrema*, *Carpum*, *Metacarpium*, & *Digitos* continet. *Carpus* octo constat ossibus, duplici serie distinctis. *Metacarpium* quatuor ossa habet. *Digitus* quinque sunt, & singuli tria tenent, ut sic quindecim sint omnium. Præter hæc ossa duodecim quoque sunt alia minima, quæ cum sesami semen referant, sesamoidea sunt appellata. **PES** quoque trifariam dividitur, in fœmur, tibiam, & pedem extremum. *Fœmur*, unum os est. *Tibia* duo habet, tibiam & fibulam. *Pes extremus*, in tarsum, metatarsum, & digitos dispescitur. *Tarsus*, septem habet ossa: *Metatarsus*, quinque: *Digitus*, quatuordecim. Ad hæc referri debent duodecim sesamoidea, & *Patella*, quæ fœmori, & tibie antepositur. Atque hæc est omnium ossium enumeratio, quæ si in unam redigantur summam, **CAPVT**, quinquaginta novem habebit: **THORAX**, sexaginta unum: **INFIMVS VENTER**, viginti unum: **MANVS una**, quadraginta duo; **PES**, rotidem, adeoque ambæ manus & pedes, centum sexaginta octo: **ET TOTVM CORPVS HV-MANVM**, trecenta & novem.

C A P V T VII.

Agit de Cranio in universum, Suturaeque capitis proponit.



Calvaria
ipsum.

Suturarum
usus.
1.

2.

3.

Observatio.

Substantia
cranii.

CEREBRVM viscerum omnium nobilissimum, cum in excelsio corporis loco collocandum esset, qui externis injuriis maxime expositus est, provida in singulis Natura, osseo tegumento tanquam valle quadam circumsepsit, ut contra irruentes calamitates liberum foret, atque optime munitum. Non tamen ex uno solidoque osse construxit, sed ex pluribus, quæ certo quodam articulationis genere conjunxit inter se, quale in universo reliquo corpore reperire non licet. Cum enim *Calvaria* non tantum propugnaculi cuiusdam munereungeretur, quod habet proprium quasi officium ab aliis ossibus: sed firmamenti etiam cuiusdam; atque stabilimenti, quod ipsi cum cæteris commune est: ne cerebrum partium omnium nobilissimum subito concideret, ventriculosque, & cavitates suas obstrueret, firmandum omnino erat. Id quod Natura commodissime fecit, fibras quasdam membranæ duræ, quæ cerebrum involvit tegiturque, per capitis suturas trajiciendo, ut cerebrum, quod perquam prompte mollietiei gratia concideret, suspensum veluti, & affirmatum teneretur. Verendum enim profecto foret, si magna illa cerebri moles sustentaculis his, quibus veluti in æquilibrio perpetuo detinetur, careret, ne in validis illis motibus (quales eveniunt in saltationibus) ubi cerebrum concutitur, aut in se periculose ipsum concideret, aut vero allisum ad cranium, plurimum damni pateretur. Accedit ad hunc usum alius, non minus nobilis, quod cum in summo excelsioque corporis loco collocandum foret, in quo vapores in summa effumantes perpetuo suscipit, cranio exitus præpararetur, per quem fumi illi exspirarent, quos singulari invento Natura per suturas depellit. Hinc illud est, quod vulgo videmus, eos qui futuris omnimode carent, continuo capitis dolore affici, facillimeque ab internis causis oblædi. Contingit enim fere ipsis, quod illi, qui, ut Galenus narrat, doloris gratia fasciis circa caput constrictus erat, in eum uti dolorem incidant, ut fere inflammationis periculum incurrant, etsi levibus à causis tententur. Non desunt qui & alium assignent usum, ut una scilicet parte læsa, altera servaretur incolumis, & fractura cum osse finiretur, nec ultra serperet. Sed nos sæpissime experientia, rationem hanc admodum esse frivolum edocti sumus, cum ictus pluries per ipsas etiam suturas penetrasse viderimus. Osergo quod cerebrum tegit, * *Calvaria* dicitur, Græcis *negvlos*, à quo Latini suam vocem *Cranium* mutuarunt, quasi *negvlos*, Galea, quod militaris galeæ formam referat, & usum præfret. *Substantia* hujus ratione ætatis plurimum variat. In nuper enim natis membranea potius est, quam ossea, præsertim circa suturas, maximeque coronalem, ubi ad aliquot usque annos tantam molli-

ciem

a, 2, 4.

ciem retinet, ut manuum compressioni promptissime cedat. *Crassities* etiam non eadem semper est, cum senum cranium, quam juvenum multo sit crassius; & marium, quam foeminarum. Quin imo & regionum diversitas varietatem parit, si quidem verum est, ut credimus, quod Oviæ in Indica historia testatur, Indis cranium esse adeo crassum, ut aciem gladii quoque acutioris eludat. Sed nec in uno eodemque homine æqualem ubique crassitiam retinet, cum in aliis atque aliis locis crassius sit, quemadmodum in singulorum Cranii ossium historia fufius id dicemus. *Figura* ejus sphaerica est, & quidem oblonga, qualem cerebrum ipsum, cujus gratia est conditum, efflagitat. *Superficies* autem tam intima, quam extima sede lævis est: intima quidem, ne duram membranam, extima vero, ne pericranium læderet. Illa tamen ^a inæqualitates quasdam habet, quæ cerebri valorem referunt vestigia: hæc vero processus nonnullos, pro exortu quorundam musculorum. Constat autem ex duobus ossibus, tenuibus quidem, sed duris admodum, ^b uno interiore, ^c altero exteriori, quæ inter ^d substantia quædam pumici non absimilis, & plena sanguine medullaque continetur, cujusmodi quoque in aliis ossibus cernitur, veluti sunt illa carpi, & tarfi. Vocantur hæc ossa ab Anatomicis duæ *Calvaria lamina*, quarum quæ exterior est, crassior, & durior: quæ interior, tenuior molliorque existit. Et hæc ratio est, cur sæpe in capitis validioribus ictibus, extima remanente illæsa salvaque, intima rumpatur. Viris autem, quam mulieribus utraque est crassior: senibus etiam, quam juvenibus. Et hæc est illa celebris Hippocratis *διπλῆ*, quam ipse describens libr. de vulner. capit. spongiæ similem pronunciat, & os ipsum in se carunculas multas humidas habere affirmat. Cranium ergo cum ex diversis ossibus constet suturarum beneficio invicem connexis, antequam ea omnia membratim intueamur, suturarum natura, & singulæ species explicandæ sunt. Est autem *Sutura*, ut supra quoque dictum est, certa quædam ossium capitis compositio, rerum filo consutarum referens imaginem. Dico esse *compositionem*, ex quo ipfius genus intelligatur, nempe quod non sit *ἑνωσις* & unio, sed articulatio quædam καὶ ἀσθρον facta. Hujus formam accuratius explicant verba ultima, cum & ipsa futura ab hac similitudine consutorum pannorum nomen repperit. Cæterum non convenit aliis hæc species articuli, nisi solis capitis ossibus, quæ verum subiectum suturarum sunt; competit autem usque adeo, ut quemadmodum solis his propriæ sunt, ita etiam omnibus capitibus insint, raroque admodum inveniatur caput suturarum expers, neque illud nisi in senibus fortasse, in quibus cum ætate ob siccitatem sensum obliterantur, & appendicum more coalescant, *primoque* fere occipitis futuræ id usu evenit, *deinde* sagittali, *hinc* coronali, *ultimo* omnium temporalibus, seu squamosis. Insunt etiam *utrique* sexui numero pari, nec verum est quod tradit Aristoteles 2 de part. cap. 7, maribus esse plures, pauciores foeminis, cum experientia repugnet, quamvis ratione admodum probabili Philosophus niti prima fronte videatur. In infantibus quoque reperiuntur omnes, sed rectam potius lineam, & harmoniam, quam futuram referunt. Cum ergo omnibus capitibus adsint, recte, mea sententia, vulgo ab Anatomicis in *proprias* & *communes* dispeſcuntur. *Proprias* vocant, quæ soli cranio competunt; *Communes*, quæ ad cranium pariter, os cuneiforme, atque maxillam superiorem pertinent. *Proprie iterum*, vel *veræ* sunt, vel *mendosæ*; & veræ numero tres, mendosæ quinque. Id tamen habent peculiare inter se, quod veræ simplices sint, mendosæ autem duplices. Dico simplices, quod conjuge destituantur, & una tantum sit: verbi gratia, una solum est coronalis, una sagittalis, una lambdoides; at mendosæ conjuges suas habent, quarum una dextrum, altera sinistram capitis latus occupat, quemadmodum in utroque latere sunt squamosæ agglutinationes. *Prima* ergo verarum *σφαιραία* dicitur, *Coronalis*, vel quod coronæ instar capitis anticam partem cingat; vel quia coronæ olim puellarum eo loci gestabantur. *Alteræ* *λambδοειδής*, à λ majusculo Græcorum, cui similis, quemadmodum eadem ratione *ὀψιλονοειδής* ab inverso *ο* quod refert, cognominatur. *Occipitis futura*, à situ dici posset, aut si omnino græcæ notationi insistere velimus, *Lambdiformis* non male vocaretur; sed vulgo græca fere vox in usu est, & lambdoides appellatur. has inter duas, media est, quæ *σφαλαία*, *Sagittalis*, à figura sagittæ dicitur. *Coronalis* ergo semicirculum refert, transversum ab uno temporum ad alterum diductum, qua frontis ossa ossibus syncipitis necantur. *Lambdoides* est, quæ occipitis basi, &

utrinque processibus mammillaribus duobus cruribus insitens, verticem in occipitii summitate ponit. ^a *Sagittalis* tandem quæ inter has media, verticem lambdoidis, cum centro coronalis conjungit. Vocantur hæ futuræ veræ, quod futurarum, id est, pannorum filo confutorum imaginem vere exprimant, mendosis contra lineam tantum referentibus. Non tamen in utraque lamina sub forma futuræ apparent, sed in exteriore tantum, sive superiore. nam in ^b intima, harmonia potius necuntur, quæ causa esse solet, quam propter interior futuram, quam exterior, multo celerius aboleatur, pereatque. In nonnullis capitibus strictiores quoque sunt, in aliis laxiores; in nonnullis grandiores, in aliis exiliores.

Mendosarum autem ^c *par primum* omnium maximum est, maximeque conspicuum, & insignis, squamosas combinationes referens, à quibus etiam nomen accepit, ut *λειτουργία* *μεσοκολλήματα* à Græcis, squamiformes agglutinationes à nostris dicantur, cum per hanc verticis ossa & temporum inter se jungantur, ex crasso osse in exacte acutam lineam squamarum ritu desinentia, ita ut externa illa, hæc interna parte attenuentur. Initium ducunt à latere posteriore basis processuum mammillarum, & circulari ductu, quem toto progressu observant, ad basim capitis feruntur, totum latus cranii conficiunt. ^d *Alterum par*, in latere capitis consistit, totoque ductu, anteriori & superiori parti paris primi, seu squamosarum agglutinationum socium est, à cujus summitate initium accipiens, oblique deorsum ad originem primæ communis protrahitur. ^e *Tertium*, in basi posterioris sedis capitis est, quod initium suum cum principio crurum lambdiformis futuræ continuum habet, in basi processuum mammillarum, juxta quorum latera posteriora toto ductu oblique fertur, usque ad basim capitis, qua capitula sunt, quibus cum prima vertebra connectitur. ^f *Quartum*, prope processus vespertilionum alis similes in capitis media prope basi inferius, rectam quasi lineam transversam exprimit, utrinque contermina duabus illis rimis asperis, quæ à sphænoïdis, & temporum finibus conficiuntur. ^g *Quintum*, in anteriore internæ calvariæ parte transversim ad ossis cribrosi, sive spongoidis angulos inferiores, harmoniam potius, quam futuram refert, cum una recta linea esse videatur, etsi duæ revera sint, à duobus lateribus cuneiformis ossis, qua frontis ossi junguntur, effectæ. *Communium quinque sunt*, ^h *Prima*, in supercillii exteriore sede obliqua, quæ frontis ossis processum anteriorem, cum primo maxillæ superioris osse conjungit. ⁱ *Secunda*, in oculi sede externa & laterali, à fine fere secundæ propriæ mendosæ deorsum recta ducitur, ad foramen usque in cavis temporum existente, & communis est cuneiformi, cum maxillæ superioris osse primo. ^k *Tertia*, in elatiore oculi orbitæ parte, & narium summitate sita est, oblique à radice illius ad summitatem hujus perducta. Iungit frontis laminam, quæ partem orbitæ superiorem efformat, & processum anteriorem, cum maxillæ superioris ossibus, secundo, tertio, quarto, & quinto. ^l *Quarta*, obliqua est, in ipso ossis jugalis medio, quæ processum primum ossis temporalis, cum primo maxillæ superioris osse connectit. ^m *Quinta*, inter processus pterygoïdes sita, antrosum ducitur, cuneiformi ossi cum septo narium communis.

CAPUT VIII.

De ossibus capitis, sive Calvaria propriis agit.

Os frontis.

Figura.



Connectio.

Substantia.

RANIVM ergo, ut dictum, sex ossibus constat propriis, uno frontis, & occipitis, duobus syncipitis, totidemque temporum, quæ omnia inter se futurarum beneficio connectuntur. Primum OS FRONTIS est, *ὡς καὶ ἐν μέτωπον ὄσιν*, quod in anteriore parte situm, totam frontem, & oculorum orbitæ elatiorem partem constituit. *Figuram* habet circularem fere, ⁿ patellam non incommode profundiusculam exprimens, nisi juxta oculorum sedem, à rotunditate in rectam lineam abiret. Habet enim cavitatem insignem admodum, qua cerebri anteriorem convexam partem excipit. *Connectitur* superius, ^o ope futuræ coronalis duobus syncipitis ossibus, ^p inferius, ossibus maxillæ superioris, & cuneiformi; ^q à lateribus, duobus processibus ossis cuneiformis alas vespertilionum imitantibus. *Substantiam* inter verticis ossa & occipitis, mediam habet, nam ut

nam ut illa tenuissima sunt, ita hoc crassissimum. Non tamen æquabilem præ se fert ubique crassitiem, sed ad elatiorem oculorum sedis regionem tenuissimum est: tenue etiam ubi temporalibus ossibus committitur: in cæteris autem partibus, ubi frontem excipit, crassius est, quam verticis ossa, duplicique lamina substantiam pumici similem complectitur, tenuius tamen fit sensim, ubi hinc ad verticis ossa, quibus committi debet, declinat. Est autem *unicum* os in adultis, quamvis in pueris geminum sit, in quæ dividitur à sagittali futura ad nasum usque excurrente. In fœminis etiam adultis similiter id observari semper, Aristoteles tradidit: sed experientiam refragantem habet. In hoc osse observanda est ^a *Caverna satis ampla*, inter utramque laminam ad nasi radicem consistens, interdum una, nonnunquam (& magna id quidem ex parte,) gemina, utrinque tum ad superciliorum sedem sublimiorem sita, à qua foramina duo ad narium cavitatem expanduntur. Hanc membranula viridis succingit, materiam in se continens viscidam, & cerebri substantiæ non valde abfimilem. Voci inservire, ut canora magis sit, vulgo traditur: sed ego existimem, ad odores hauriendos facere, cum ibi aër excipiat odor prægnans, conserveturque paulum, ne præterlabatur tam subito nares. Exemplum si vis similis rei, auriculam inspicere, quam Natura quoque ad latera capitis veluti aliquod velum expandit, ut fugientem sono refertum aërem detineat, leviterque remoretur. ^b *Foramina* habet duo in sede superciliorum media, in oculi orbitam desinentia, per quæ ramus primus nervi tertiæ cerebri conjugationis in musculum frontis egreditur. ^c *Processus* quoque constituit quatuor, quorum majores, duo ad majorem oculi angulum: minores ad minorem consistunt.

^d *SYNCIPITIS OSSA*, aliis *ossa verticis* dicta, quod Vertex horum centrum sit, locus inter frontem, & occiput medius. Græcis *σύνκιπτον ὀστέον*, ἀπὸ τῆς βερέχων τῆς ἐγκέφαλον dicuntur, quod cerebrum ibi semper sit madidum. *Numero* duo sunt, quadrilateræ figuræ, sed altera parte longioris, ut Euclides loquitur, cum quatuor constent lineis, quarum laterales transversis longiores sunt, non tamen plana, sed concava ipsa sunt, ob capitis sphaericam figuram, cui accommodantur. *Committuntur* ^e anterioribus lineis, ossi frontis, futura coronali: ^f posterioribus, ossi occipiti, futura lambdiformi: ^g intermis lateribus, sibi invicem, sagittali: at ^h exterioribus, ossibus temporum, ob quarum conjunctionem, in ⁱ squamas degenerant. *Maxima* sunt, omnium consensu, inter ossa cranii: sed & tenuissima quoque, ac infirmissima, cum omnium tardissime in pueris indurescant & ossium naturam induant, imo Plinio teste, non ante sermonis usum. Crassa tamen sunt æqualiter, nisi ubi in squamas attenuantur. *Superficiem* habent ^k extrinsecus lævissimam: ^l interior asperiusculam, ob vestigia, quæ venæ ^m iugulares per cerebri meninges dispersæ imprimunt. Et hæc Chirurgis sedulo notanda sunt, ne, ubi terebra cranium aperiendum erit, imperite venas cum vitæ periculo vulnerent, sed caute agendo eas illæsas conferrent.

ⁿ *OCCIPITIS OS*, τὸ κατὰ ἰσθμὸν ὀστέον, ἀπὸ τῆς ἰσθμίδος ὀνόματι Galeno appellatum, quod ibi fibræ nervæ oriuntur, ab Arabibus memoriæ dicatum est, & posticam capitis partem claudit. *Figura* pentagonum fere exprimit: ^o primum enim, & secundum latus sunt, quibus verticis ossibus jungitur, ope futuræ lambdoideæ: ^p tertium, & quartum, quibus ossibus temporum additamentis lambdoideis, sive futura tertia mendosa: ^q quintum, quo cuneiformi. Vnicum est *numero* in adultis, quamquam in recens natis tripartitum sit. *Substantiam* habet duram, adeoque crassam, ut omnium calvariæ ossium crassissimum perhibeatur: inæqualis tamen est crassities illa, cum in superiore parte admodum crassum sit, duplicemque habeat testam: inferiore, qua basin cranii accedit, tenuissimum, & unica simplicique lamina donatum. ^r *Externa superficies* lævis est, præterquam ubi sinus quosdam habet semicirculares, quorum ^s duo superiores insignes sunt admodum, pro musculis, tum iis qui caput extendunt, tum qui scapulam dorso admovent, quos Cucullares vocabimus: ^t duo vero inferiores parvi, circulos fere conficientes, pro musculis rectis caput extendentibus exsculpti. ^u *Interior* impense inæqualis est, idque ob sinus multiplices ipsi insculptos, ^v quorum duo transversî per totum os excurrunt ad latera ossium temporalium, qui propter sinus, primum & secundum crassæ cerebri membranæ conditi sunt. ^w Vnus inter hos rectus per totum caput usque ad nasi verticem distrahitur, pro sinu tertio ejusdem membranæ. Duo alii rotundi

sunt super hos, alique duo infra, ^a quorum illi minores, cerebri prominentias, quod bipartitum est; ^b hi majores multo, cerebelli protuberantias, excipiunt. ^c Capita, sive appendices duas habet, ad basim sitas, qui primæ colli vertebræ articulantur, & capitis motui, flexioni extensionique dicato, inserviunt. Quod spectat *foramina*, ^d unum habet maximum, rotundum pæne, in basi sua inter prædicta capitula situm, per quod ex cranio spinalis medulla ad dorsum descendit. ^e Duo alia huic adjacent, (secundum inquam, & tertium) inter dicta capita & styloidem processum sita, oblonga, & satis ampla, per quæ ab inferioribus, venæ jugularis internæ ramus major, arteriæ carotidis minor, ascendentes, cranium intrant: sextum autem par nervorum totum descendit, & ex calvaria prodit. His vicina sunt, sub ipsis quasi capitulis posita ^f duo alia, (quartum, & quintum,) quæ rotunda, vix sextam partem amplitudinis prioris obtinent, per quæ nervorum septimum par transitum habet.

Temporum ossa.

Figura.

Connexio.

Substantia.

Sinus duo.

Foramina.

Processus.

^g TEMPORVM OSSA, τῶν κεφαλῆς ἐστὶν ὅσα, ad latera ossium verticis situm suum sunt nacta. Minima sunt ex omnibus calvariæ ossibus, utrinque unum, multiplicem figuram referentia nam in superiore parte semicirculum fere effingunt: at inferiore, ob asperas inæqualitates, modo processibus extuberantia, modo foraminibus subsidentia, scopulos horridasque rupes. ^h Elatiore parte; qua circularia sunt, *jununtur* ossium verticis exterioribus lateribus futura squamosa: ⁱ anterius, maxillæ superioris ossi primo processu suo primo: ^k posterius ossi occipitis, futura tertia mendosa. *Substantiam* habent duram admodum: ^l parte tamen superiore, & circulari, tenuem valde, & duplici illa lamina, quam cætera calvariæ ossa habere diximus, destitutam: ^m inferiore vero, quæ ad basim cranii est, eo usque duram, ut lapideam duritiem vel æmuletur, vel æquet, unde, & totum propterea os apud Græcos λιθοειδές, lapidiforme dictum est, apud Latinos, Petrosum. *Sinus* habent duos: ⁿ primus, inter processum mammillarem, & alterum jugale os constituens situs est, amplius, rotundus, longusque satis, qui ex lato foramine in angustius intro tendi, cartilagineque incrustatus, ^o τῆς ἀκρωτίας, sive *meatus Auditorius* dicitur, per quem soni ad interiorem aurem deferuntur. ^p Secundus, primo adjacet, in basi cranii, sub processu primo, jugale os efformante, situs, transversus & oblongus, cartilagineque contactus, qui capitulum maxillæ inferioris excipit. *Foraminibus* etiam pluribus donantur. ^q Primum est in calvariæ interna sede, in processu petroso, figuræ ovalis, longo ductu in os penetrans usque ad labyrinthum, quod viam præbet nervo auditorio, sive quintæ conjugationi. ^r Alterum, satis amplum, inæquale, & oblique antrorsum ductum, sub appendice styloide situm, per quod arteriæ carotidis major ramus, ad ossis cuneiformis foramen quintum fertur, indeque cerebrum petit. ^s Tertium, inter occipitis & temporis os, quibus commune est, magnum, & inæquale, pro ingressu venæ jugularis, & arteriæ carotidis: at egressu nervi sexti paris. ^t Quartum, inter processum mammillarem, & appendicem styloidem situm, in canalem oblongum terminatur, & arteriam carotidem immittit. ^u Quintum, retro processum mammillarem, ad latus transversum futuræ lambdiformis, per quod ramus primus venæ jugularis externæ cranium ingredientis, transit. Hoc modo in uno, modo in utroque latere deesse solet.

Processus quatuor sunt. ^v Primus, à meatu auditorio, vel anteriore sede sinus capitis maxillæ inferioris, ex lata basi antrorsum fertur, & cum processu ossis primi maxillæ superioris concurrens, futura obliqua necitur, os jugale, de quo postea, constituens. ^w Alter, ex lata basi, in posteriore temporalium ossium sede, & capitis fundo, in obtusum verticem desinit, vaccinam exprimens mammillam ob longitudinem, unde ^x μαστειδής, mammillaris dicitur. ^y Tertius, acutus, longus, inter sinum secundum, & dictum modo processum situs, ^z ενδοειδής dicitur, & ^{aa} γναθιοειδής, quod styli quo scribimus formam referat. ^{bb} Quartus est internus, durissimus, quem os petrosum vocant, in quo triplex illa internæ auris cavitas, de qua postea libro ultimo dicemus, continetur.

CAPVT IX.

Describit tria ossicula auditui inservientia.



N prima auris cavitate, quam Concham vocant dissectionum periti, tria reperiuntur ossicula, miro artificio efformata à Natura, quorum historia etsi ad eam tractationem pertinere videatur, quæ auditus organis dicabitur: tamen, ne omisisse quicquam in hac ossium enumeratione credamur, paucis de ipsis agere decrevimus hoc loco. Cæterum *ignota* hæc *Veteribus* fuisse nemini mirum videatur, cum & ipsa per se minutissima sint ut facile visum effugiant, & in illo durissimo osse, quod à petræ similitudine nomen habet, abscondita lateant. *Recentiorum* tamen *industria*, qui omnes humani corporis partes summa diligentia rimati sunt, eruta & in lucem producta fuerunt. Qua in re prima palma merito debetur *Ioanni Carpo Bononiensi*, qui princeps Incudem, & Malleolum dicta ossicula in conspectum protulit: altera *Ioanni Philippo Ingrassia*, viro undequaue eruditissimo, qui tertii, (cognomento *stapedis*) inventionem sibi ipsi iure ascribit. Sunt autem numero tria, quæ nomen potius à figura, quam usu acceperunt, cum Malleus, Incus, & Stapes dicantur. *Substantiam* habent durissimam juxta ac densissimam, non minus tamen cavam pro continenda medulla. *Magnitudo* autem recens natis infantibus eadem reperitur, nullaue in re differentiam est cernere, nisi in duritie, propterea quod veluti cætera ossa omnia infantibus molliora sunt, ita hæc quoque ossicula perfectam duritiem, abundante adhuc illa humiditate naturali, nondum acceperunt. *Periosio* quoque carent, tametsi alia ossa, vel intus, ut dentes: vel foris, ut reliqua omnia, obtineant. Id quod solerti admodum Natura consilio effecit, ne scilicet ad soni receptionem inepta fierent, cum insonora fiant dura corpora, si molli substantia tegantur, ut puta si quis campanæ pannum imposuerit.

*Capitulum
Incudis, &
Mallei.
Ingrassia in-
ventor stape-
dis.*

MALLEUS ergo, qui primum ossiculum est, ad tympanum, five membranam primæ cavitati subtenfam, situm habet, ad finem meatus auditorii. Hic ^a capitulo constat crassiusculo, & oblongo, tenui angustæque inhærens cervici, quod uti cum incude secundo ossiculo articuletur, sinum lævem obtinet. *Processus* habet duos ex cervice erumpentes, quorum ^b superiori, minori, & curvo, chorda tympano subtenfa adhæret: ^c inferiori, membranula toto ductu incumbit.

Malleus.

Processus.

ALTERUM est, **INCUS**, malleo adjacens, capitulo, & duobus cruribus donatum. ^d Caput enim crassiusculum habet, in cujus vertice levis *cavitas*, quæ malleoli tuberculum excipit: *crura* vero duo habet, ^e alterum quidem longius tenuiusque, stapedis vertici alligatum: ^f alterum vero, crassius, brevius, & latiusculum, quod squamoso temporum ossi innititur.

Incus.

Caput.

Crura.

TERTIUM, **STAPES**, à forma stapedis nostratis, quam eleganter exprimit, in media quasi parte primæ cavitatis situm est, ad fenestellam ovalem. Constat ex ^g curvo arcu in duo minutissima crura desinente, quæ ^h basi transversæ insunt. In summa sui parte ⁱ *capitulum* habet minutissimum, & rotundum, & arcum quasi medium, cui longius incudis crus, five *processus*, insitit. *Basis* fenestræ ovali, & membranæ illam claudenti apponitur. *Cavitas* autem, quæ in petroso osse occurrit, ubi de auditus organis verba faciemus, describetur à nobis, nunc sufficiat ossiculorum historiam tradidisse.

Stapes.

Capitulum.

Basis.

CAPVT X.

De osse Cuneiformi, & Spongioso.



Ossa quæ Calvariæ propria sunt vidimus: nunc reliqua duo, quæ cum maxilla superiore communia habet, cuneiforme puta & spongiosum, intueamur. **CUNEIFORME**, nomen habet à situ suo, non forma, cum cunei instar cæteris ossibus calvariæ, imo omnibus pæne capitibus & maxillæ superioris, in medio interpositum sit. Vnde factum ut eandem appellationem apud Græcos quoque retinuerit, quibus *σφλουονδης* vocatur: quia tamen ex diversis constat ossibus, & variam propterea formam

Os cuneiforme.

refert, *πλῆθος* etiam, seu *multiforme* dicitur, quamvis ipsæ etiam partes postea à propria figura peculiaria nomina sint sortitæ. *Iungitur* anteriori ossi frontis sutura mendosa quinta: posterius, occipitis additamento sutura quarta: ad latera longo ductu comes est temporum ossi petroso, à quo tamen rima alpera disparatur. Superius maxillæ superioris primum os, quartum, & sextum attingit: inferius per aliformes processus, palati ossa. Hoc ut varium est, ita *substantiam* quoque nactum *variam* & inæqualem. nam ad latera & temporum cava, tenue, sed admodum densum & solidum est: in medio autem, ubi capitis basin constituit, crassum, imo omnium capitis ossium crassissimum, non tamen solidum, sed cavitatem conficiens similem duabus cavitatibus, quas in superciliorum elatiore sede, ad nasi verticem, & frontis basin effingi diximus, ne caput temere aggravet. *Processibus* donatur, & in interna calvaria parte & in externa. In interna quidem ^a *duobus* anteriore sede positus, ex lata basi in acutum mucronem desinentibus, ^a *& aliis* ^b *duobus* posteriore regione sitis, quadratis pæne, ad latera in plerisque extuberantibus, qui cum ossis crassam partem cingant, ephippio non absimilem, *Sella turcica* à forma dicuntur. *Extra calvariam* similiter duplex processus est, ^c *anterior* quidem utriusque unus, ad latera foraminum in narium amplitudinem dehiscientium, qui à forma vesperilionum alis simili, *σπερμαδῆς* dicti, *processus aliformes*: ^d *posterior* similiter duo, à dictis ^d *nati*, ^e *duobus* apicibus versus styloidem processum extuberantes, quorum anterior obtusus & parvus, posterior longus & acutus est. Sunt etiam *Sinus* plures huic ossi. ^f *In selle* quidem medio quadratus, latusque, glandulam pituitariam dictam continens, cui à cerebro mucosa excrementa destillantia transmittuntur, à quo postea quatuor alii deducuntur, oblongi, qui pituitam ad inferiores partes à glandula derivant. ^g *Duo* ^g *anteriores*, ad secundum foramen in oculi sedis radice positum, per quod nervi motorii oculi ingrediuntur orbitam, excurrunt, & pituitam ad oculi pinguedinem, musculorum humectandorum gratia ferunt, ne scilicet in nimio continuoque motu exsiccentur, à qua postea per glandulam in majori oculi angulo positam ad nares transmittitur: ^h *Duo posteriores*, ad inæquale, & alperum foramen, quantum sphænoideis, extenduntur, per quod pituita ori & palato potissimum influit. ⁱ *Est* ⁱ *sinus insignis* in processibus aliformibus, qui sedem tutam præstat musculis in ore latitantibus. Hic profundus est longusque. *Foramina* plura obtinuit, quorum ^k *primum* juxta processus anteriores sellam constituentes circulare est, pro nervorum opticorum in orbitam ingressu. ^l *Secundum*, huic subjacens ibidem, quod ex inferiore parte rotundum, mox sursum abit, longamque ^m rimam efformat, quæ nervos secundi paris oculorum motui dicatos, tum tertium nervorum cerebri par transmittit. Per idem foramen insignis quidam ramus arteriæ carotidis ad oculos abit; tandem pituita, & humiditates cerebri in glandula collectæ, unde lacrymæ fiunt. Per elatiorem autem sedem Vena ex oculi sede crassæ cerebri membranæ distribuitur. ⁿ *Tertium* ad latus prædicti externum, parvum, sed exacte rotundum, per quod quarti nervorum paris ramus primus, ad temporales, & in ore latitantes musculos porrigitur. ^o *Quartum*, in externo latere orbitæ oculi, quod oblongum est maximumque, rimam potius, quam foramen exprimens, cum anterior latius sit, posterius circa oculi radicem tenuius. Per hoc ramus quartus tertii paris, & primus quarti nervorum cerebri, in temporales musculos distribuuntur, & pituita oculi orbitam per secundum foramen ingressa, ad fauces elabitur. ^p *Quintum*, longum & asperum, sub finem sinus posterioris sellæ turcicæ, per quod arteriæ carotidis major ramus in caput ascendit. ^q *Sextum*, ad hujus externum latus, longum, ellipsin figuram, sive ovalem referens, quartum nervorum cerebri par transmittens. ^r *Septimum*, à posteriore prædicti sede situm, exiguum admodum, & exacte rotundum, pro venæ jugularis internæ ramo secundo & minore, qui in crassæ meningis substantiam ingreditur, & cuius vestigia in sincipitis ossibus apparent.

Alterum commune calvaria os, ab aliis qui cribro conferebant, (ob foramina nullo ordine disposita, quibus cribri ritu perforatum est) *σπινθηρ*, CRIBRIFORME & CRIBROSYM dicitur: aliis, qui spongiæ comparare maluerunt, quod foramina dicta anfractuosa, non directa cernerent, *σπινθηρ*, & os *Spongiosum* appellatur. Os hoc unum non est, sed multiplex, diversæ substantiæ, formæ, & situs. ^s *Prima pars*, os est, quadratum altera parte longius referens, à quo totum postea nomen accepit, in anteriore, sed interna

interna calvaria parte situm, cribri in modum tortuosis foraminibus perforatum, & tenuissima membrana similiter perforata obtectum, per quæ odores ad cerebrum penetrant. His obstructis à pituita huc effusa, Gravedo oritur, hyberni temporis in locis frigidioribus commune admodum malum. ^a Altera est, processus in hujus medio, longus & triangularis, apicem acutum in supremirate habens substantiæ solidæ, qui totam primam partem in duas distinguit, & à forma cristæ galli quam refert, *Crista* communiter appellatur. Huic è directo opponitur inferiori in sede ^b pars tertia quæ os tenue est, sed durum tamen, sursum ad olfactus foramina, deorsum ad nares tendens, & sic totam narium amplitudinem ac odoratus organa bifariam, in dextram sinistramque partem distinguit. *Quarta*, spongix similis est, multis cavernulis prædita, unde & totum os spongiosum dictum.

Hujus ossis ut partes diversæ sunt, ita quoque usus varii. *Prima* pars, aëri odore imprægnato ad cerebrum aspiranti viam concedit, quæ ut tutior sit, anfractuosa facta est, ne cerebrum qualitate aëris nimium frigida lædatur, sed prius ab osse attemperetur. In catarrhis quoque, pituitæ & cerebri excrementis viam largitur, quamvis id non secundum naturam fiat, cum provida Parens odoribus potius quam cerebri inquinamenti illam viam destinavit. Copia enim magna, obstructis præsertim legitimis viis, ipsa sibi viam parit, & quacunq; datur exitus novum iter adornat. *Secunda*, seu galli cristæ, falcis subternitur, & sinui tertio duræ meningis tutam sedem, cui connascitur, donat. *Tertia*, nasum distinguit, ut cum cæteris sensibus duplicia organa odoratus habeat. *Ultima* tandem, sensum destillantia cerebri excrementa suscipit colligitque, ne ruentia impetuose & continue ex naribus, fœde sapientissimi animalis vitam contaminent.

CAPUT XL

Agit de osse Jugali.



O S JUGALE, Græcis *συνζυγίδες ὀστέον* dicitur, quod jugi instar, maxillæ superioris lateribus utrinque affirmetur. Os unum non est, sed ex duobus constat, nec tamen, ut reliqua Calvaria ossa, propriam circumscriptionem obtinet, ut separari à cæteris queat: sed aliis continuum, cum ossa ex quibus conflatur, aliorum sint processus, mediante futura sibi connexi. Altera enim pars & ^c posterior, processus est ossis temporum juxta meatum auditorium anteriore sede situs: ^a altera vero antica, processus maxillæ superioris ossis primi, minorem oculi angulum constituentis. Hæc duæ apophyses, quarum illa anteriora, hæc posteriora petit, in medio ^e futura obliqua connectuntur, & os Jugale efformant. Ex quo, vel nemine monente, statim situs hujus ossis se prodit & manifestus est, nempe ad latus utrumque faciei, inter meatum auditorium, & primum maxillæ os. Latum alias est, sed subtile: durum tamen, ac fere solidum, nisi cavernulas contineret medulliferas, pro sui nutritione. Firmamentum, & quasi propugnaculum præbet tendini temporalis muscoli, quem complectitur, ut tuto ad processum ^f inferioris maxillæ, cui inseritur, properet. Stabilimentum etiam aliorum musculorum est, maxime tertii paris maxillæ inferioris, quod *μικροσφη* vocatur, quod ad manducationem imprimis conferat.

CAPUT XL

Ossium Faciei, seu Maxillæ superioris, & inferioris, descriptionem tradit.



F ACIEM bifariam dividimus, in maxillam superiorem, & inferiorem. SUPERIOR MAXILLA, *ἡ ἀνωσπύς* à nobis vocatur, quidquid præter enarrata ossa in crânio superiore continetur, adeoque illa faciei pars ossæ, quæ inferiorem oculorum sedem & latera, nasi partem ossæam, malas, & palatum, dentium denique superiorum seriem constituit. Substantia est ossæ, non tamen exacte duræ solidæque, sed quæ pumicis in modum cavernulis medulla plenis conficitur: inæqualis etiam, cum alibi partes tenuiores, alibi crassiores obtineat, & sic modo durior, modo mollior sit. Quocirca, & solere

Coniectio.

Sutura propria maxilla superioris.

& solers Natura non ex uno osse, sed ex diversis condidit, ne scilicet, cum inter se substantiæ ratione differentiam requirerent, importune continua essent. *Conjunctæ* autem tum inter se, tum cum aliis conterminis ossibus capitis, puta calvariæ, & sphæroidis, harmonia potius, quam futura, si externam faciem respicias: futura autem, quam harmonia, si internam. Has enim compages si accurate consideres, forissecus harmoniæ videbuntur, & quandam lineam efformare: at si effringantur, mutuum quandam intus contextum referunt futuris non absimilem. Sunt autem duplices, aliæ communes calvariæ cum ossibus maxillæ superioris, quarum quinque sunt, jam superius enarratæ, ubi de futuris egimus: aliæ propriæ maxillæ ossibus, novem numero, de quibus nunc dicendum. nam harum beneficio ut ossa determinantur, ita quoque earum descriptio tradenda est.

1. ^a *Prima* ergo in oculi orbita initium ducens in media fede inferioris partis, oblique ac fere circulari progressu deorsum ad latus externum ossis malæ protrahitur, indeque
2. per temporum cava. ^b *Secunda*, in ipsa orbita est, & latere ejus interno, anteriore
3. fede, circularis, & oblonga, quæ totum secundum maxillæ superioris os ambit. ^c *Tertia*, in eadem orbita est, inque eodem latere, sed fede inferiore, ab ossis cuneiformis futura communi secunda rectâ ad faciei anteriora ducitur, & in dicta secunda futura terminatur. ^d *Quarta*, in nasi dorso est, à superciliorum interstitio per nasi longitudinem ossicam totam delata, quintum os bifariam dividens. ^e *Quinta*, ad nasi latus exterius quartæ toto ductu socia est & comes, à futura communi tertia, rectâ deorsum secundum ossis quinti longitudinem protensa ad usque nasi partem cartilagineam. ^f *Sexta*,
6. in palato est, per cujus partem posteriorem transversim ducitur. ^g *Septima*, in eodem est, sed secundum longitudinem ejus totam excurrent, à posterioribus antrosum.
7. *Octava*, in interna faciei fede est, in ipsa narium amplitudine, septo cum quinto osse communis. *Nona*, eidem septo cum quarto, & sexto maxillæ communis est. Ex his futuris quædam simplices sunt, ut quarta, sexta, septima, octava, & nona: quædam duplices, in utroque latere occurrentes, ut reliquæ, puta prima, secunda, tertia, & quinta. Atque hæc sunt futuræ, quæ ossa maxillæ superioris dividunt, quorum numerus est apud Autores variet, aliis undecim, aliis duodecim ponentibus: nos tamen cum doctissimis Anatomicis duodecim statuimus, adeo ut sex sint paria ossium in inversum.

Ossa maxillæ superioris.

1. ^h *Primum*, quod externum oculi angulum efformat, & rotundam illam extuberantiam, Hippocrati *κύκλον προσώπια*, faciei circulum appellatam, durum satis ac solidum. Superius jungitur ossis frontis processui externo in cauda supercilii, futura communi prima; inferius, cum quarto maxillæ futura prima propria; posterius sphæroidi, futura communi secunda; & tandem processu suo, cum processu ossis temporum ad latera capitis, ubi os jugale conficit futura communi quarta.

2. ⁱ *Secundum*, in oculi majore, & interno angulo consistit, estque ossium maxillæ superioris minimum, rotundum, tenuis squamæ instar, cui caruncula lachrymalis innititur, quam propter ^k foramen etiam inferiore ex parte habet satis insignis, in nasi amplitudinem dehiscens, ut mucum excrementaque cerebri, ad pinguedinem oculi transmissa, per nares expurget. Per hoc idem ramus tertius tertii nervorum cerebri paris in narium amplitudinem, ad tunicam hanc succingentem, transmittitur. Iungitur clatior sede ossi frontis futura communi tertia; depresso & anteriore, cum quarto maxillæ; posteriore, cum sequente.

3. ^l *Tertium* par, substantiæ quidem solidæ ac duræ est, æque tamen ac secundum tenue, nisi quod amplius intus sinibus aëre plenis scateat. Figuram exprimit quadranguli altera parte longioris. Nectitur quatuor ossibus; superius, ossi frontis futura communi tertia; inferius, quarto maxillæ futura propria tertia; anterieus, secundo maxillæ futura propria secunda; posterius, cuneiformi, communi tertia.

4. ^m *Quartum* omnium maximum est, & crassissimum, non tamen æque densum, sed intus refertum cavernulis infinitis medulliferis, maximam faciei partem constitutens, maximeque genam superiorem, qua causâ à Galeno 11 Vñ part. 19, os malæ nuncupatur. Hoc superiores dentes omnes complectitur, mystacem constituit, narium foramina, denique omnia fere quæ ad superiorem faciei partem pertinere videntur, quocirca

quocirca & pluribus (quam ullum ex maxillæ) ossibus committitur. Superiùs quidem juxta nasum, ossi frontis, sed brevi ductu, futura communi tertia; inferiùs, cum cuneiformi futura communi secunda; anteriùs, cum secundo in oculi angulo interno futura propria secunda; posteriùs, cum tertio futura propria tertia, & tandem cum suo compari futura propria septima. *Foramina* quoque habet notatu dignissima. ^a *Primum*, duo circa orbitæ oculi sedem inferiorem, quorum alterum in ipsa orbita est, alterum foris, per quod ramus secundus, tertii nervorum cerebri paris, ad faciei mûculos excurrit.

^b *Dein*, unum in palati anteriore parte, retro duos medios incisivos, in ipsa divisione ossis palati, sive futura propria septima, per quod ex palato in narium amplitudinem venula atque arteriola una cum tunica palatum succingente transmittitur.

^c *Quintum* est formæ quadrangulæ, oblongum, durum, mediocriter crassum, cum suo pari nasi ossicam partem constituens. Superiùs annectitur frontis processui interno portiuncula futura communis tertiæ; inferiùs, futuram quidem non habet, sed asperum admodum & inæquale existit, & cum cartilaginibus nasi committitur; anteriùs cum suo conjuge, futura quarta propria; posteriùs, cum quarto futura quinta.

^d *Sextum*, cum suo pari palatum efformat, & narium amplitudinis posteriorem partem, anteriùs semicirculûm, posteriùs rectam fere lineam exprimit. Ex his jam patet, quot & quæ ossa sint, ex quibus oculi orbita conficitur. Alia enim ad frontem, alia ad sphænoideis os pertinent, alia ad maxillam superiorem. Ad frontis os unum pertinet, quod superiorem oculi partem constituit: ad cuneiforme unum, in externo latere, posteriore sede, positum. Quatuor ad maxillam superiorem, sicut os primum, secundum, tertium, & portio quarti. Primum exterius latus cum dicto sphænoideis efficit: sed hoc anteriorem, illud posteriorem partem. Secundum, & tertium, interius latus: quartum, inferiorem partem. Ex quo fit, ut tota orbita ex sex ossibus consletur, quorum figura & substantia qualis sit, ex dictis satis manifestum est.

Altera faciei pars, MAXILLA INFERIOR est, quæ homini inter cætera animalia, sola simia excepta, brevissima est, ut cui manus obtigere, quarum beneficio cibum ori apportat, ne brutorum instar hunc assumpturus caput terræ inclinet. Est etiam soli homini rotunda, ut majestas illa divinitatis faciei impressa, splendidius eluceat, & pulchritudine sit commendabilior. Habet tandem & hoc peculiare, quod cum cæteris animantibus plerisque omnibus ex duobus ossibus per symphyfin junctis, conslet, homini (siquidem ad ætatem justam pervenerit) simplex sit, & ex unico consletur. Dico, cum ad justam ætatem succreverit, quod infantibus bifida sit, & cartilagine copiosa in medio mento jungatur: at in adultis ita coalescat, ut nullo modo, ne coctione quidem separari queat, quæ aliorum animantium maxillam facillimo negotio dividit. *Mobilis* est ciborum gratia, qui motu ejus ad masticandum indigent, tum in accipiendo, tum in mandendo cibo. Quocirca & cum superiore ejusmodi articulo commissa est, qui ad motum evidentem aptissimus esse possit, ut postea dicetur, quod in officio communi societate æqua utraque maxilla conspiret. *Dura* quoque propterea est, non tamen ita, ut ubique solida sit, cum pondere suo incommodare posset: verum finibus cavernulisque medulliferis referta. *Crassa* est, dentium recipiendorum gratia, quem usum ipsa quasi Natura docere videtur, cum edentulis maxillam attenuat. Nam dum dentium seriẽm senibus ætas longa abstulerit, crassities quoque maxillæ adimitur, atque aboletur. *Figura* arcum pulchre refert, nisi quod posteriore sede attollatur, & bicornis duos utrinque *Processus* altos exigat, quorum ^e *anterior*, ὀρθὴν à Græcis dictus, ex lata basi, in tenuissimum exacteque angustum verticem protuberat, os jugale subit, tendinque validissimo muscoli primi maxillæ inferioris, sive temporalis, sedem accommodat. ^f *Posterior*, cervicis insigni erectum ^g capitulum transversum & longum efformat, quod in sinum secundum ossi temporum insculptum adaptatur, cartilagine incrassatum. Interponitur autem inter caput & sinum alia quoque præter hanc cartilago, lævis atque mollis, quæ non tantum ligamenti officio fungitur, ut processum in sinu suo contineat: sed etiam motum lubricum admodum reddit, adeo, ut aptissimus & validissimus fiat articulus, qui non ambulationi, non apprehensioni, sed vitæ usui maxime necessario institutus erat. *Foramina* habet ^h *duo*, utrinque unum in superficie interna ad processuum dictorum fundamenta & origines, quæ per os postea

ad anteriora penetrant longissimo ductu, & in externæ superficiæ foraminibus desinunt. Per hæc tertius ramus quarti nervorum cerebri paris, cum venula & arteria ad dentium cavitates perfertur. Ductus autem hic à quovis facillime potest investigari in

maxilla ficcata, si quis foraminibus æneum filum indiderit. ^a Duo alia in exteriore superficie parte anteriore comparent, per quæ vasa modo dicta ad musculos, labium, & cutim illic locorum collocatam deferuntur. Sunt etiam *asperitates* quædam in maxilla occurrentes diligenter notandæ musculorum gratia, cum vel caput ibi, vel tendo inferatur. ^b Prima est in anteriore ossis & exteriore parte, qua mento subest, ubi utrinque ad latera extuberat, pro capitibus tertii paris labiorum, quod deprimens inferioris labii vocabimus. ^c Altera, in eadem anteriore parte, sed sede interna levior asperitas, ubi inseritur tendo secundi paris maxillam deprimentis. ^d Tertia tandem, in latere interno, sed postrema parte, sub capitulo maxillæ, juxta sinum per quem nervus ingreditur cum cæteris vasis, ut efformet sedem tutam tendini quinti paris proprii, quem maxillæ adductorem vocabimus.

Cavitates. Præter hæc jam enarrata foramina, notandæ veniunt *Cavitates* utriusque maxillæ marginis, quas vulgo dentium alveolos, & præsepiola Anatomici periti vocare consueverunt. Dentium enim continendorum gratia factæ sunt, quibus numero & figura sic exacte respondent, ut neque hanc, neque illum proprium habeant, sed dentibus correspondentem. Tot enim cava sunt, quot dentes, cum quilibet primum erumpens, sibi proprium ac peculiare condat præsepiolum; concidens etiam secum una alveolum suum perdat, ita ut ne vestigium quidem maneat reliquum, donec (si forte) novus subeat, qui propriam postea sedem domiciliumque (ut ita dicam) sibi omnibus modis respondens præparet, & efformet. Hoc autem formam dentis in cunctis sic æmulatur, adeoque exacte undique cingit, & adhæret, ut neque laxius vacillantem, neque angustius infirmum reddat, sed æqua intervalli proportionem denti adaptetur.

CAPUT XIII.

Dentium numerum, historiamque proponit.

Dentes:

Articulatio
dentium.

ENTES ergo sic siti sunt, nempe in alveolis marginum utriusque maxillæ, sive, ut Galenus loquitur, lib. de off. ad Tyr. ἐν τοῖς τοῖς Φαλκίον Βόλκοις. Articulantur autem certo, nec alteri ossi communi nexu, quem ῥευσσῶν Græci, quasi dicas Conclavationem, appellant, quod instar clavorum maxillis sint inserti, quanquam pro diverso quo adaptantur modo, diversas etiam alias articulationum species conficere videantur.

Observatio.

Nam *ratione nervi*, qui ipsis inlitus, malis affirmat, stabilitatemque largitur, synneurosin efficere parent; *ratione gingivarum*, quibus veluti obvallantur, fissuracolin generare putantur. Notandum tamen hoc diligenter, observatum à me esse, dentium (præsertim incisorum caninorumque) radices quibus alveolis infiguntur, nonnunquam curva acutie latius præsepiolis suis infigi, quo fit ut plurimum roboris ipsa articulatio nanciscatur, sed admodum periculose ipsi postea dentes evellantur, cum cedere nequeant, nisi pars quædam una de ipso alveolo auferatur, quod tamen sine gravissimis symptomatibus fieri vix potest. *Substantiam* duram habent solidamque, imo ossium fere omnium durissimam, cum diutissime flammam incremabiles sustineant. Hæc durities stabilimenti loco inservit, ne inter mandendum atterantur, quanquam ne sic quidem satis firmi sint, cum semper ex continuo usu illis aliquid decedat, quod satis manifeste in illis apparet, quibus dens aliquis excidit, cum oppositus semper reliquis eminere videatur, cujus rei causa non est alia, quam quia ut cæteri, conjuge destitutus, non atteratur.

Figura.

Figuram autem singuli acceperunt clavi, cum omnes parte qua eminent extra alveolos, nonnihil lati ac rotundi: posterius qua infiguntur, longi & acuti sint. Non tamen omnes eandem figuram obtinent, & hanc quam diximus, sed ratione usus sui admodum discrepant, ut postea dicturi sumus, dum singularum specierum enumerationem historiamque instituimus.

Cavitates.

Cavitatem quoque habent singuli intus, eamque satinsignem conspicuamque, non quidem ubique, sed juxta radicem, substantia quadam membranulam æmulante succinctam, quam etiam dissectionum professores membra-

nam

nam indigetant, & cujus ratione dentes ipsi exquisitissimum sensum obtinuerunt, quod perioestii vicem subeat. Differt tamen magnitudo hujus cavitatis, tum ratione dentium ipsorum, qui majores sunt, minoresve: tum ratione ætatis, cum in puerulis ad septimum usque annum, ampla satis sit cavitas, tenui quadam squama apum favis simili circumsepata, atque albo quodam humore, velut muco, oppleta: at in adultis, rescicato hoc, tota cavitas in angustum sinum coeat. *Vasa* habent omnis generis, venas, arterias, & nervos, à quibus tum nutrimentum, tum vitam, ac sensum accipiunt, quo ita acuto pollent, ut vix pars nostri corporis inveniatur, quæ læsa maleque affecta, majores cruciatus, ac dentes ipsi, possit infligere. *Nutriti* autem debebant, cum semper atterantur; *vivere*, ut nutriantur; sentire, ut expositi multis injuriis in loco externo, fugere noxia facilius queant. A primis enim qualitatibus, calore & frigore, admodum læduntur, & propterea eas fere solas quoque percipiunt: Secundas, sine sensu & noxa perferunt tuto, sustinentque. Non duritie premuntur, non lima læduntur: at levi frigore tacti stupefcunt, levi calore affecti, impense dolent. Ineptum autem est, quod Aretæus prodidit, solos Deos esse qui norint, cur ab illis, quam ab his potius lædantur, cum causa cuius satis in promptu esse videatur. Dentes enim non ipsi per se sentiunt, sed membrana illa est, quæ ipsa, & propter quam illi sentiunt, in penitioribus dentium sinibus abdita. Ergo, cum nec durities, neque molities, nec lima, neque ferrum ad ipsam membranam penetret, innoxia illa manet: at calor frigisque, dente calefacto aut refrigerato, ad ipsam membranam successive tandem penetrat, & quia membrana frigidiusculum nata est temperamentum, fit ut celerius à frigore quoque, atque à calore afficiatur. Cæterum *venas* habent à jugularibus; *arterias*, à carotidibus; *nervos molles*, à tertio nervorum cerebri conjugio *propagatos*. Hæc vasa cum primaria sint, mirum profecto non est, si corpus, primum dentibus erumpentibus, tam misere afficiatur, alvi profluvii, febribus, & convulsionibus, tractis in consensum partibus principibus, hepate, corde, & cerebro. *Superficies* candida est, nitida, ac æqualis, si quidem Naturæ leges observent: sin; nigra, inæqualis, crassaque materia septa, tartaro vini dolis adhærescenti non abfimilis. *Magnitudo* moderata est, cum homo ad manfuetum contubernium natus, exertis, instar apri, dentibus non indiguerit. Nec tamen omnes æquales sunt; sed incisores minores, majores canini, maximi molares, & inter hos, posteriores. *Número* communiter in utraque maxilla sunt sedecim: variat tamen ratione individui sæpe, at non, ut Aristoteles censēbat, ratione sexus. Diversitas autem hæc in molaribus est, qui modo plures sunt, modo pauciores, raroque admodum debitum numerum expleant. Physiognomis dentium numerus absolutus laudatur, cum & robor facultatis generatricis, & copiam materiæ sufficientem ostendat, quæ duo plurimum ad sanitatis usuram conducere censentur. Sunt autem dentes triplices, ratione tum figuræ, tum usus: obtinuit tamen consuetudo, ut ab usu potius quam à figura appellationem habeant, sicque incisores, canini, molaresque vocantur.

^a **INCISORES**, à Græcis quoque *τομείς*, eadem notatione dicti, quatuor sunt, in utraque maxilla siti anteriore parte, unde & *σώματα* nominantur, qui figuram, qua sede gingivis eminent, acutam habent. *Vsus* enim ipsorum est, ingestum ori cibum incidere, inque partes dividere, quas molares facilius comminuant. ^c **CANINI**, *κυνόδοις*, sunt duo, utrinque unus, extremis incisioribus, tanquam socii adstantes. *Figura*, incisiorum figuræ non admodum dissimilis est, nisi quod extremitate sua acutiores nonnihil, cæteris quoque dentibus emineant. Horum *minus* est, ut loco, ita auxilio adstare incisioribus: & si quid duriusculum fuerit, quod ab illis dividi nequiebat, ab his frangatur, & dirimatur. *Vsum* hunc in nobismetipsis facile advertemus, si nuces, ossa, aliaque solida, non incisioribus, sed caninis frangere nos attenderimus, edocti hoc ab ipsa quasi Natura officium. Vocantur etiam *Oculares* à vulgo, quod eos ab oculo dependere putat, cum evulsis ipsis oculorum actiones lædi videt, sed alia id ratione accidit, quam docet Anatomica inspectio, quæ testatur, nervorum oculos moventium portionem in hos deferri. *Radices*, ut prædicti incisores, habent singulas, robustiores tamen, altiusque infixas. ^d **MOLARES**, *μύλαι*, & *μύλαι* dicti, quod veluti molis cibus ab ipsis atteratur, loco sunt postremi, in buccarum cavitate occulti. *Número*, si adsint omnes, quinque, utrinque, ad latera caninorum consistentes, ut sic omnes in universum, si utriusque maxillæ

maxillæ numerum requiras, viginti conficiant. Non tamen omni ætate omnes adfunt; ut plurimum quidem quatuor illi, caninis proximi, & junioribus adfunt: at ultimi duo, adultioribus solum, unde & *συνφρονήσις* Hippocrati dicti, quod non erumpant prius, atque homo sapientiæ studio idoneus evaserit. Latinis propterea sapientiæ dentes nuncupati: aliis, ut vulgo, Genuini dicti. Atque hi in causa sunt, ut inter se Authores varient in numero dentibus assignando, aliisque alio plures, vel pauciores, enumeret. Modo enim videre liceat in hoc latere quatuor, in alio quinque; modo in superiore maxilla omnes adesse, modo in inferiore quosdam deficere. *Figuram* habent à cæteris paululum discrepantem. cum enim illi acuti sint, hi latam habent superficiem & inæqualem, quatuor acutis eminentiis exasperatam, quas inter foveola quædam occurrit, ab ipsarum concursu enata. Quare & pars extra gingivas producta, non velut reliquorum acuta, sed quadrata est, quæ perfectior in tribus posterioribus, adeo ut hac causa à Ruffo Ephesio, *τεγωνίζας*, & *Mense* appellentur, quas non inelegerant videntur exprimere, tum lata hac superficie, tum triplici radice, cui hæc incumbit, cum & nostræ mensæ cuidam radici semper internantur. *Radices* autem non simplices habent, ut reliqui jam enarrati, sed plures, in quarum numero quædam occurrit discrepantia, tum ratione maxillæ, tum etiam dentium inter se. Et inter se quidem, cum proximi caninis, habeant pauciores; plures, tres posteriores: at ratione maxillæ, cum duo superioris maxillæ caninis proximi communiter binis, reliqui extremi ternis radicibus affigantur; at inferioris maxillæ illi singulas habeant; hi, binas. Sunt etiam superioris dentes, majoribus radicibus præditi, ut ita satis clare pateat, & numero, ac magnitudine ab istis, inferioris maxillæ differre. Id quod non temere, sed provido NATURA fecit consilio, cum illi, qui penduli futuri erant, firmamentum fidelius requirerent: hi, suo pondere satis muniti, onus supervacuum respuerent. Ex his nemini obscurum esse potest, quem *usum* dentes præstent corpori. Nam masticando, cibos ventriculo præparant, ut ipsius in chylum conversio sit facilior. Hos *dividunt* Incisores; *frangunt* Canini; *comminuant* Molares, & molæ instar in minimas partes dividunt. hinc *lati* facti sunt, ut excipiant facilius, retineantque fidelius: *asperi* autem, ut comminuant perfectius. Sic enim & molares lapides ferreis malleis exasperari videmus, cum nihil æquali superficie præstent.

usum dentium.

CAPUT XIV.

Os hyoidis historiam tradit.

SUB maxilla inferiore, in elatissima laryngis parte, * os continetur, quod unitatis nomine exprimitur, & à similitudine quam habet cum litera Græcorum υ, *ὕψιλον*, & contracte *υειδης*; aut cum α, *λαμβδανδης* dicitur. Meo tamen iudicio rectius comparari figura ejus cum inferiore maxilla poterit, quod antèrius sinuosum, posterius cornua, veluti processus longos educit. Sunt nonnulli Veterum, qui *φάρυγγος* vocare, vel, quia faucibus subserviat velut basis; vel, quia laryngi subternatur, quem nonnulli *φάρυγγος* vocare. Os tamen hoc unum non est, sed multiplex, & ex pluribus conflatum, magna ex parte in *Viris* adultæ ætatis, ex undecim constat: in *Mulieribus*, ex paucioribus, nonnunquam etiam ex tribus tantum componitur. ^b *Primum* os, quod in medio consistit duorum lateralium, majusque est, ac latius ipsis, et si paulo brevius, exterius, sive ^c parte anteriore, convexum est, & in obtusum angulum terminatur, at ^d interius, concavum. *Sinus* habet, ^e unum in elatiore regione transversum & depressum, ut primum sibi dicatorem musculorum, sive attollens par, excipiat: ^f duos alios in parte inferiore, utrinque unum, quibus secundum, detrahens par, inseritur. Hoc *basin* ossis hyoidis inferius in musculorum historia vocabimus. Ex hujus ^g lateribus duo alia ^h ossa secundum scilicet, *tertium* educuntur, quæ humiliora hyoidis latera dicemus, (alii *Cornua* appellant) & cartilagine, ac ligamento cartilagineo satis lato, firmiter sibi junguntur. Habet & alios ⁱ duos processus superiora latera dictos, quod ex superioribus & lateralibus partibus prodeant, qui *quartum*, & *quintum* os faciunt, teretes sunt & graciles, quibus postea ^k alia tria ossicula ut plurimum adduntur, & ossium horum numerus undecim denarius

Primum os hyoidis.

tertium os.

quartum, & quintum os. Reliqua ossa.

7. 6.

1. A. B.

1. A.

1. D.

1. C.

1. C.

1. C.

1. C.

1. C.

1. C.

1. C.

1. C.

1. C.

1. C.

1. C.

denarius absolvitur. ^a *Connectuntur* hæc ossa cum partibus adjacentibus, puta maxilla inferiore, sterno, scapulis, appendice styloide, lingua, laryngis thyroide cartilagine, œsophago. Connexio autem hæc non uno fit modo, sed partim per eam unionis speciem, quæ *συνάρθρωσις* dicitur, & fit inventu carnis: partim per illam, quæ *συνέρισις*, vel *συνωμύσις*, ut nos privato nomine & strictiore appellavimus, si quidem liceat eas etiam huc voces trahere, quæ ossibus alias proprio quasi jure competere videntur. Primum enim os, linguæ fundamenti instar subternitur, quo nomine & *basis linguæ* dicitur, quod hujus elatiori sedi lingua innitatur, cum reliqua cavitas hyoidis epiglottidem excipiat: inferior sedes, una cum secundo & tertio ossiculo, toto ductu quatuor validis ligamentis laryngis scutiformi cartilagini adnectitur, at hæc tandem extremitatibus suis ejusdem processibus committuntur. Reliqua ossicula totidem ligamentis appendici styloidi junguntur. Quamobrem qui explorare manu in vivente etiam homine ossiculum hoc voluerit, illi prompte se offeret primum illud à nobis descriptum, quod cæteris grandius est, si digitos paululum supra laryngem gutturi injiciat: reliqua lateralia, fere in intimioribus partibus latitant, nec sese tactui produnt. Cæterum quomodo reliquis partibus, quas enarravimus, ut sterno, œsophago, aliisque, musculorum inventu connectatur, dicitur eo loco commodius, quo ejus musculorum historia à nobis tradetur. *Facit hoc os plurimum ad detinendum meatum faucium ea forma, qua ipsum os est apertum, tum ut commode cibus per œsophagum quando comedimus descendat, tum ut aer in asperam arteriam, dum respiramus, & loquimur, per laryngem transferatur.*

Connectio.

CAPUT XV.

Describitur Claviculas.



C LAVICULÆ, ^b κλάδεις Græcis dictæ, non quod thoracem claudant, ut Anatomici quidam prodiderunt, sed quia figuram referant clavium antiquarum. Exprimunt enim formam *ſ* Latinorum literæ oblongæ, ad cuius similitudinem antiquitus claves ædium conficiebantur. Memini enim & me dum Juvenis Patavii literis & Medicinæ incumberem, in antiquissimis ædibus hujus figuræ claves adhuc usurpatas vidisse. Ex quo patet, *figuram* clavicularum non rectam esse, sed partim convexam, partim concavam, adeoque duos quasi constituere semicirculos. Qua enim parte ^c ab osse pectoris discedunt, extorsum gibbæ flectuntur; ^d qua vero summo humero junguntur, in anteriora curvantur, & cavæ fiunt. *Duo sunt numero*, una utrinque, inæquali crassitie præditæ. nam ^e prope jugulum dimidia sui parte teretes propemodum sunt: ^f at ubi humerum respiciunt, latiusculæ evadunt. illa pars, sedem largitur principio primo primi humerum moventis musculi, quem Pectoralem vocant: hæc, principio primo secundi, quem attollentem esse, & Deltoidem appellari dicemus. *Connectuntur* ergo duobus ossibus, ^g sterno nempe, & scapulæ, sed sterno superiore parte ossis primi, in sinu cartilagine incrustato, capitulo oblongo, depresso, & triangularis fere figuræ: at summo humero, sive scapulæ processui superiori, oblongiusculo, & lato quasi capite. *Caput* quod sterno necitur, cartilaginem habet, aliis capitibus quoque communem: sed præter hanc etiam propriam, tenuem & æqualem, similem omnino illi, quem in inferioris maxillæ, cum superiore articulo positum esse superius diximus, lævem admodum, unctuosoque humore oblitum. Habet etiam ligamenta articulum orbiculatim cingentia. Cæterum ipsa *substantia* horum ossium fistulosa est circa capita, in medio minus. *Substantia.* *Vfus* autem est, sustinere scapulas, ne una cum humero in pectus cadant, id quod evenire videmus, ubi clavicula fracturam patitur. *Vfus.*

Erymologia.

Figura.

Numerus.

Connectio.

Substantia.

Vfus.

CAPVT XVI.

Sterni, sive ossis pectoris historiam proponit.



HORACIS parte ^a anteriore in homine os occurrit, ab aliorum animalium sibi correspondente osse plurimum differens, tum brevitate, tum amplitudine sua. Hoc communiter Græcis *στέρον*, quasi *στέρον*, ab usu dicitur, quia munit, firmatque pectus. Nonnullis à figura *ἐπιφωδία*, *ensiforme*, quæ tamen vox folius hominis sterno, non aliorum animalium competit, ut audiemus. Latini, *Os pectoris*, à situ appellant, quia anticam humani pectoris partem occupat. Quanquam vero unitatis nomine vulgo exprimitur, nequiquam tamen os unum est, sed ex pluribus compositum, cartilaginum beneficio invicem connexis & unitis, communiterque in hominibus provectæ ætatis ex tribus conficitur, quorum ^b primum & ^c ultimum, semper in omni ætate unum idemque est: ^d secundum vero admodum differt, & modo plura, modo pauciora, modo etiam unum constituit, pro ut ætas hominis infantie aut virilitati proximior est. Recens natis ^e ex tribus ut plurimum conflatum est, quæ septennio elapso inter se coeunt, & in unum concedunt. *Substantia* autem horum ossium, non ut aliorum solida est, sed rubens, & fungosa, ac plena cavernulis, duplici cincta quasi testa, quarum tamen anterior posteriore multo solidior est. Puerulis in primo ortu totum cartilagineum est, postea in os abit: sic tamen, ut superiores partes inferioribus prius solidescant. *Figuram* habet, si tria ossa considerentur juncta, manubrii alicujus gladii Veterum, quæ lunatis erant lateribus. Primum enim latum cum sit, partem illam quæ sub manu consistit, refert: at lunata pars secundi, partem gladii quam manu apprehendimus: tertia tandem, gladii apicem. Est autem ^f os primum omnium crassissimum amplissimumque: crassius etiam seipso parte superiore, in versum referens triangulum, cujus vertex abscissus sit, nisi quod latera, sive crura lunata sint utrinque. Superior pars in extremitate utraque ^g sinum obrinet longum, & cartilagine incrustatum, qui claviculæ caput, de quo dictum, excipit: in horum medio ^h foveam habet lunatam, quam *σφαγνυλόν*, jugulum, vocant. ⁱ Secundum os minus crassum est, minusque latum, sed multo priore, imo fere quadruplo longius, pluribus sinibus exasperatum, quibus postea costarum tertiæ, quartæ, quintæ, & sextæ cartilagine protuberantes inseruntur. ^k Tertium minimum est, quod ^l quintæ, & sextæ cartilagine protuberantes inseruntur. ^m Tertium minimum est, quod ⁿ quintæ, & sextæ cartilagine protuberantes inseruntur. Huic in fine ^o cartilago apponitur oblonga, quam *ἐπιφωδία*, *ensiformem*, & *mucronatam* appellant, sed imperite, cum ignarum dissectionum vulgus, canum intuens cadavera, videntque nulla ratione hanc vocem sterno coaptari posse, cartilagini postea nomen tribuerit, ut quod aliqua ratione propius ad similitudinem ensis accederet. At enim, qui humani cadaveris copiam habuere, satis vident, quam bene hæc appellatio toti sterno possit congruere. Cæterum cartilago hæc, cum incertæ sit figuræ, ut plurimum tamen est triangularis, nonnunquam bifida, sæpe rotunda. Sub hac cavitas occurrit, nostris *scrobiculus cordis*, Veteribus *καρδια*, *Cor*, dicta, quod ibi *καρδια* sita sit, sive orificium supernum & finistrum ventriculi, cujus dolores omnino similes apparent doloribus cordis, unde & *καρδιαλγία*, & *καρδιωγμύς* à Practicis Medicinæ scriptoribus vocantur. Quem *usum* præstet nemo non videt. Propugnaculum enim est thoraci, & firmam sedem costis, cui implantentur, largitur. Cum enim thorax necessario ex costis fabricandus esset, ne vel osseus totus, ut Caput; vel carneus foret, ut infimus Venter, quorum utrumque motum ipsius mirum in modum impedisset, cum os continuum inflexile, & caro instabilis futura esset, alicubi profecto firmamentum & sustentaculum, cui infererentur, requiri videbatur.

*Sternum ex
tribus ossibus
in adultis con-
stat.*

Primum os.

Secundum os.

Tertium os.

*Cartilago
ensiformis.*

Vul.

CAP V T XVII

Scapularum historiam explicat.



CAPVLARVM, ^a quas Græci *ἀπὸ πλάτης* appellant, quasi dicas, ossa Scapulae humeri latitudinem constituenta, duæ sunt, utrinque una, in dorso, inter primam & quintam thoracis costam sitæ, cum raro admodum ad sextam usque pertingere videantur. Hæ in gracilibus tabi obnoxii, quod impense protuberent, alæ videntur, ex quo huiusmodi *ἀπὸ πλάτης*, hoc est, alati, dicuntur, signumque futuræ tabis secum circumferunt,

teste Galeno 4 Aphorism. *Figura* ipsarum convexa ^b foris est, tutelæ gratia, ^c intus concava; illam nos *dorsum scapulae*, hanc *cavitatem* vocabimus. Tota autem scapula triangulum, & quidem scalenum, ut Mathematici loquuntur, exprimit, cum inæqualibus lateribus constet, primumque tanto secundo sit majus, quanto secundo tertio. Est autem ^d *primum latus* illa scapulae sedes, quæ juxta dorsi longitudinem, thoracis vertebrarum spinis proxime obtenditur, quamvis non exquisitè lineam rectam exprimat, sed superius inferiusque ad externa corporis paululum se flectat. ^e *Alterum latus*, ab inferiore primi sede, obliquo ductu sursum fertur: at ^f *tertium* à superiore ejusdem regione, recta fere linea, ad exteriora similiter cum secundo progreditur, ubi postea utrumque veluti in vertice trianguli, in processu illo, qui sinuosam cervicem pro humeri capite constituit, coit. Vocatur primum latus *Basis*, quod fundamentum sit reliquorum laterum cui insunt: at reliqua duo, *Costæ*, ducta appellatione à triangulis, in quibus à Geometris costæ dicuntur latera basi incumbentia: discriminis tamen gratia secundum *Inferior*; tertium autem, *Superior costa* vocatur. Caterum ut in omni triangulo tres reperiuntur anguli, veluti & tria latera, ita hic quoque tres sunt, duo tamen præcipue musculorum gratia ab Anatomicis notantur. ^g *Alter angulus elatior* est, qui à basi, & superiore costa circumscribitur: ^h *alter humilior*, à basi, & inferiore costa continetur. In illum inferitur secundus scapulae, Elevator, musculus; ab hoc, enascitur quartus humeri, Deprimens, sive Rotundus. *Connectitur* autem scapula diversis partibus interventu musculorum, adeoque per illam unionis speciem, quam supra *συνάπτικον* vocari diximus, ossi scilicet occipitis, tum vertebri cervicis, dorsi, ac costis. Et *ossi* quidem occipitis, per musculos cucullares dictos, sive primum par scapulas moventium, qui iidem etiam dorsi vertebri adnectunt. *Vertebri* autem *cervicis*, per secundum par earundem, Elevans, quos patientiæ musculos vocabimus. *Dorso*, per rhomboidem, sive par tertium: *Costis* vero, per serratum minorem, sive scapularum par quartum adducens. *Substantiam* habent duram ac solidam, si partes duntaxat nonnullas exceperis, quæ spongiae modo raræ sunt, ac pluribus cavernulis distinctæ. Crassitiem tamen admodum inæqualem habent. Costa enim inferior crassiuscula est; superior, tenuis; medio modo se basis habet: at superiori in sede, qua costæ invicem coeunt, crassissima evadit, conspirantibus quasi lateribus in illam crassitiem: in cæteris quæ inter has sunt partes, tenuissima est. *Processus*, ⁱ *Processus*, ^j *Processus*, ^k *Processus*, ^l *Processus*, ^m *Processus*, ⁿ *Processus*, ^o *Processus*, ^p *Processus*, ^q *Processus*, ^r *Processus*, ^s *Processus*, ^t *Processus*, ^u *Processus*, ^v *Processus*, ^w *Processus*, ^x *Processus*, ^y *Processus*, ^z *Processus*, ^{aa} *Processus*, ^{ab} *Processus*, ^{ac} *Processus*, ^{ad} *Processus*, ^{ae} *Processus*, ^{af} *Processus*, ^{ag} *Processus*, ^{ah} *Processus*, ^{ai} *Processus*, ^{aj} *Processus*, ^{ak} *Processus*, ^{al} *Processus*, ^{am} *Processus*, ^{an} *Processus*, ^{ao} *Processus*, ^{ap} *Processus*, ^{aq} *Processus*, ^{ar} *Processus*, ^{as} *Processus*, ^{at} *Processus*, ^{au} *Processus*, ^{av} *Processus*, ^{aw} *Processus*, ^{ax} *Processus*, ^{ay} *Processus*, ^{az} *Processus*, ^{ba} *Processus*, ^{bb} *Processus*, ^{bc} *Processus*, ^{bd} *Processus*, ^{be} *Processus*, ^{bf} *Processus*, ^{bg} *Processus*, ^{bh} *Processus*, ^{bi} *Processus*, ^{bj} *Processus*, ^{bk} *Processus*, ^{bl} *Processus*, ^{bm} *Processus*, ^{bn} *Processus*, ^{bo} *Processus*, ^{bp} *Processus*, ^{bq} *Processus*, ^{br} *Processus*, ^{bs} *Processus*, ^{bt} *Processus*, ^{bu} *Processus*, ^{bv} *Processus*, ^{bw} *Processus*, ^{bx} *Processus*, ^{by} *Processus*, ^{bz} *Processus*, ^{ca} *Processus*, ^{cb} *Processus*, ^{cc} *Processus*, ^{cd} *Processus*, ^{ce} *Processus*, ^{cf} *Processus*, ^{cg} *Processus*, ^{ch} *Processus*, ^{ci} *Processus*, ^{cj} *Processus*, ^{ck} *Processus*, ^{cl} *Processus*, ^{cm} *Processus*, ^{cn} *Processus*, ^{co} *Processus*, ^{cp} *Processus*, ^{cq} *Processus*, ^{cr} *Processus*, ^{cs} *Processus*, ^{ct} *Processus*, ^{cu} *Processus*, ^{cv} *Processus*, ^{cw} *Processus*, ^{cx} *Processus*, ^{cy} *Processus*, ^{cz} *Processus*, ^{da} *Processus*, ^{db} *Processus*, ^{dc} *Processus*, ^{dd} *Processus*, ^{de} *Processus*, ^{df} *Processus*, ^{dg} *Processus*, ^{dh} *Processus*, ^{di} *Processus*, ^{dj} *Processus*, ^{dk} *Processus*, ^{dl} *Processus*, ^{dm} *Processus*, ^{dn} *Processus*, ^{do} *Processus*, ^{dp} *Processus*, ^{dq} *Processus*, ^{dr} *Processus*, ^{ds} *Processus*, ^{dt} *Processus*, ^{du} *Processus*, ^{dv} *Processus*, ^{dw} *Processus*, ^{dx} *Processus*, ^{dy} *Processus*, ^{dz} *Processus*, ^{ea} *Processus*, ^{eb} *Processus*, ^{ec} *Processus*, ^{ed} *Processus*, ^{ee} *Processus*, ^{ef} *Processus*, ^{eg} *Processus*, ^{eh} *Processus*, ^{ei} *Processus*, ^{ej} *Processus*, ^{ek} *Processus*, ^{el} *Processus*, ^{em} *Processus*, ^{en} *Processus*, ^{eo} *Processus*, ^{ep} *Processus*, ^{eq} *Processus*, ^{er} *Processus*, ^{es} *Processus*, ^{et} *Processus*, ^{eu} *Processus*, ^{ev} *Processus*, ^{ew} *Processus*, ^{ex} *Processus*, ^{ey} *Processus*, ^{ez} *Processus*, ^{fa} *Processus*, ^{fb} *Processus*, ^{fc} *Processus*, ^{fd} *Processus*, ^{fe} *Processus*, ^{ff} *Processus*, ^{fg} *Processus*, ^{fh} *Processus*, ^{fi} *Processus*, ^{fj} *Processus*, ^{fk} *Processus*, ^{fl} *Processus*, ^{fm} *Processus*, ^{fn} *Processus*, ^{fo} *Processus*, ^{fp} *Processus*, ^{fq} *Processus*, ^{fr} *Processus*, ^{fs} *Processus*, ^{ft} *Processus*, ^{fu} *Processus*, ^{fv} *Processus*, ^{fw} *Processus*, ^{fx} *Processus*, ^{fy} *Processus*, ^{fz} *Processus*, ^{ga} *Processus*, ^{gb} *Processus*, ^{gc} *Processus*, ^{gd} *Processus*, ^{ge} *Processus*, ^{gf} *Processus*, ^{gg} *Processus*, ^{gh} *Processus*, ^{gi} *Processus*, ^{gj} *Processus*, ^{gk} *Processus*, ^{gl} *Processus*, ^{gm} *Processus*, ^{gn} *Processus*, ^{go} *Processus*, ^{gp} *Processus*, ^{gq} *Processus*, ^{gr} *Processus*, ^{gs} *Processus*, ^{gt} *Processus*, ^{gu} *Processus*, ^{gv} *Processus*, ^{gw} *Processus*, ^{gx} *Processus*, ^{gy} *Processus*, ^{gz} *Processus*, ^{ha} *Processus*, ^{hb} *Processus*, ^{hc} *Processus*, ^{hd} *Processus*, ^{he} *Processus*, ^{hf} *Processus*, ^{hg} *Processus*, ^{hh} *Processus*, ^{hi} *Processus*, ^{hj} *Processus*, ^{hk} *Processus*, ^{hl} *Processus*, ^{hm} *Processus*, ^{hn} *Processus*, ^{ho} *Processus*, ^{hp} *Processus*, ^{hq} *Processus*, ^{hr} *Processus*, ^{hs} *Processus*, ^{ht} *Processus*, ^{hu} *Processus*, ^{hv} *Processus*, ^{hw} *Processus*, ^{hx} *Processus*, ^{hy} *Processus*, ^{hz} *Processus*, ^{ia} *Processus*, ^{ib} *Processus*, ^{ic} *Processus*, ^{id} *Processus*, ^{ie} *Processus*, ^{if} *Processus*, ^{ig} *Processus*, ^{ih} *Processus*, ⁱⁱ *Processus*, ^{ij} *Processus*, ^{ik} *Processus*, ^{il} *Processus*, ^{im} *Processus*, ⁱⁿ *Processus*, ^{io} *Processus*, ^{ip} *Processus*, ^{iq} *Processus*, ^{ir} *Processus*, ^{is} *Processus*, ^{it} *Processus*, ^{iu} *Processus*, ^{iv} *Processus*, ^{iw} *Processus*, ^{ix} *Processus*, ^{iy} *Processus*, ^{iz} *Processus*, ^{ja} *Processus*, ^{jb} *Processus*, ^{jc} *Processus*, ^{jd} *Processus*, ^{je} *Processus*, ^{jf} *Processus*, ^{jj} *Processus*, ^{jk} *Processus*, ^{jl} *Processus*, ^{jm} *Processus*, ^{jn} *Processus*, ^{jo} *Processus*, ^{jp} *Processus*, ^{jq} *Processus*, ^{jr} *Processus*, ^{js} *Processus*, ^{jt} *Processus*, ^{ju} *Processus*, ^{jv} *Processus*, ^{jw} *Processus*, ^{jx} *Processus*, ^{jy} *Processus*, ^{jz} *Processus*, ^{ka} *Processus*, ^{kb} *Processus*, ^{kc} *Processus*, ^{kd} *Processus*, ^{ke} *Processus*, ^{kf} *Processus*, ^{kg} *Processus*, ^{kh} *Processus*, ^{ki} *Processus*, ^{kj} *Processus*, ^{kl} *Processus*, ^{km} *Processus*, ^{kn} *Processus*, ^{ko} *Processus*, ^{kp} *Processus*, ^{kq} *Processus*, ^{kr} *Processus*, ^{ks} *Processus*, ^{kt} *Processus*, ^{ku} *Processus*, ^{kv} *Processus*, ^{kw} *Processus*, ^{kx} *Processus*, ^{ky} *Processus*, ^{kz} *Processus*, ^{la} *Processus*, ^{lb} *Processus*, ^{lc} *Processus*, ^{ld} *Processus*, ^{le} *Processus*, ^{lf} *Processus*, ^{lg} *Processus*, ^{lh} *Processus*, ^{li} *Processus*, ^{lj} *Processus*, ^{lk} *Processus*, ^{ll} *Processus*, ^{lm} *Processus*, ^{ln} *Processus*, ^{lo} *Processus*, ^{lp} *Processus*, ^{lq} *Processus*, ^{lr} *Processus*, ^{ls} *Processus*, ^{lt} *Processus*, ^{lu} *Processus*, ^{lv} *Processus*, ^{lw} *Processus*, ^{lx} *Processus*, ^{ly} *Processus*, ^{lz} *Processus*, ^{ma} *Processus*, ^{mb} *Processus*, ^{mc} *Processus*, ^{md} *Processus*, ^{me} *Processus*, ^{mf} *Processus*, ^{mg} *Processus*, ^{mh} *Processus*, ^{mi} *Processus*, ^{mj} *Processus*, ^{mk} *Processus*, ^{ml} *Processus*, ^{mm} *Processus*, ^{mn} *Processus*, ^{mo} *Processus*, ^{mp} *Processus*, ^{mq} *Processus*, ^{mr} *Processus*, ^{ms} *Processus*, ^{mt} *Processus*, ^{mu} *Processus*, ^{mv} *Processus*, ^{mw} *Processus*, ^{mx} *Processus*, ^{my} *Processus*, ^{mz} *Processus*, ^{na} *Processus*, ^{nb} *Processus*, ^{nc} *Processus*, nd *Processus*, ^{ne} *Processus*, ^{nf} *Processus*, ^{ng} *Processus*, ^{nh} *Processus*, ⁿⁱ *Processus*, ^{nj} *Processus*, ^{nk} *Processus*, ^{nl} *Processus*, ^{nm} *Processus*, ⁿⁿ *Processus*, ^{no} *Processus*, ^{np} *Processus*, ^{nq} *Processus*, ^{nr} *Processus*, ^{ns} *Processus*, ^{nt} *Processus*, ^{nu} *Processus*, ^{nv} *Processus*, ^{nw} *Processus*, ^{nx} *Processus*, ^{ny} *Processus*, ^{nz} *Processus*, ^{oa} *Processus*, ^{ob} *Processus*, ^{oc} *Processus*, ^{od} *Processus*, ^{oe} *Processus*, ^{of} *Processus*, ^{og} *Processus*, ^{oh} *Processus*, ^{oi} *Processus*, ^{oj} *Processus*, ^{ok} *Processus*, ^{ol} *Processus*, ^{om} *Processus*, ^{on} *Processus*, ^{oo} *Processus*, ^{op} *Processus*, ^{oq} *Processus*, ^{or} *Processus*, ^{os} *Processus*, ^{ot} *Processus*, ^{ou} *Processus*, ^{ov} *Processus*, ^{ow} *Processus*, ^{ox} *Processus*, ^{oy} *Processus*, ^{oz} *Processus*, ^{pa} *Processus*, ^{pb} *Processus*, ^{pc} *Processus*, ^{pd} *Processus*, ^{pe} *Processus*, ^{pf} *Processus*, ^{pg} *Processus*, ^{ph} *Processus*, ^{pi} *Processus*, ^{pj} *Processus*, ^{pk} *Processus*, ^{pl} *Processus*, ^{pm} *Processus*, ^{pn} *Processus*, ^{po} *Processus*, ^{pp *Processus*, ^{pq} *Processus*, ^{pr} *Processus*, ^{ps} *Processus*, ^{pt} *Processus*, ^{pu} *Processus*, ^{pv} *Processus*, ^{pw} *Processus*, ^{px} *Processus*, ^{py} *Processus*, ^{pz} *Processus*, ^{qa} *Processus*, ^{qb} *Processus*, ^{qc} *Processus*, ^{qd} *Processus*, ^{qe} *Processus*, ^{qf} *Processus*, ^{qg} *Processus*, ^{qh} *Processus*, ^{qi} *Processus*, ^{qj} *Processus*, ^{qk} *Processus*, ^{ql} *Processus*, ^{qm} *Processus*, ^{qn} *Processus*, ^{qo} *Processus*, ^{qp} *Processus*, ^{qq} *Processus*, ^{qr} *Processus*, ^{qs} *Processus*, ^{qt} *Processus*, ^{qu} *Processus*, ^{qv} *Processus*, ^{qw} *Processus*, ^{qx} *Processus*, ^{qy} *Processus*, ^{qz} *Processus*, ^{ra} *Processus*, ^{rb} *Processus*, ^{rc} *Processus*, rd *Processus*, ^{re} *Processus*, ^{rf} *Processus*, ^{rg} *Processus*, ^{rh} *Processus*, ^{ri} *Processus*, ^{rj} *Processus*, ^{rk} *Processus*, ^{rl} *Processus*, ^{rm} *Processus*, ^{rn} *Processus*, ^{ro} *Processus*, ^{rp} *Processus*, ^{rq} *Processus*, ^{rr} *Processus*, ^{rs} *Processus*, ^{rt} *Processus*, ^{ru} *Processus*, ^{rv} *Processus*, ^{rw} *Processus*, ^{rx} *Processus*, ^{ry} *Processus*, ^{rz} *Processus*, ^{sa} *Processus*, ^{sb} *Processus*, ^{sc} *Processus*, ^{sd} *Processus*, ^{se} *Processus*, ^{sf} *Processus*, ^{sg} *Processus*, ^{sh} *Processus*, ^{si} *Processus*, ^{sj} *Processus*, ^{sk} *Processus*, ^{sl} *Processus*, sm *Processus*, ^{sn} *Processus*, ^{so} *Processus*, ^{sp} *Processus*, ^{sq} *Processus*, ^{sr} *Processus*, ^{ss} *Processus*, st *Processus*, ^{su} *Processus*, ^{sv} *Processus*, ^{sw} *Processus*, ^{sx} *Processus*, ^{sy} *Processus*, ^{sz} *Processus*, ^{ta} *Processus*, ^{tb} *Processus*, ^{tc} *Processus*, ^{td} *Processus*, ^{te} *Processus*, ^{tf} *Processus*, ^{tg} *Processus*, th *Processus*, ^{ti} *Processus*, ^{tj} *Processus*, ^{tk} *Processus*, ^{tl} *Processus*, tm *Processus*, ^{tn} *Processus*, ^{to} *Processus*, ^{tp} *Processus*, ^{tq} *Processus*, ^{tr} *Processus*, ^{ts} *Processus*, ^{tt} *Processus*, ^{tu} *Processus*, ^{tv} *Processus*, ^{tw} *Processus*, ^{tx} *Processus*, ^{ty} *Processus*, ^{tz} *Processus*, ^{ua} *Processus*, ^{ub} *Processus*, ^{uc} *Processus*, ^{ud} *Processus*, ^{ue} *Processus*, ^{uf} *Processus*, ^{ug} *Processus*, ^{uh} *Processus*, ^{ui} *Processus*, ^{uj} *Processus*, ^{uk} *Processus*, ^{ul} *Processus*, ^{um} *Processus*, ^{un} *Processus*, ^{uo} *Processus*, ^{up} *Processus*, ^{uq} *Processus*, ^{ur} *Processus*, ^{us} *Processus*, ^{ut} *Processus*, ^{uu} *Processus*, ^{uv} *Processus*, ^{uw} *Processus*, ^{ux} *Processus*, ^{uy} *Processus*, ^{uz} *Processus*, ^{va} *Processus*, ^{vb} *Processus*, ^{vc} *Processus*, ^{vd} *Processus*, ^{ve} *Processus*, ^{vf} *Processus*, ^{vg} *Processus*, ^{vh} *Processus*, ^{vi} *Processus*, ^{vj} *Processus*, ^{vk} *Processus*, ^{vl} *Processus*, ^{vm} *Processus*, ^{vn} *Processus*, ^{vo} *Processus*, ^{vp} *Processus*, ^{vq} *Processus*, ^{vr} *Processus*, ^{vs} *Processus*, ^{vt} *Processus*, ^{vu} *Processus*, ^{vv} *Processus*, ^{vw} *Processus*, ^{vx} *Processus*, ^{vy} *Processus*, ^{vz} *Processus*, ^{wa} *Processus*, ^{wb} *Processus*, ^{wc} *Processus*, ^{wd} *Processus*, ^{we} *Processus*, ^{wf} *Processus*, ^{wg} *Processus*, ^{wh} *Processus*, ^{wi} *Processus*, ^{wj} *Processus*, ^{wk} *Processus*, ^{wl} *Processus*, ^{wm} *Processus*, ^{wn} *Processus*, ^{wo} *Processus*, ^{wp} *Processus*, ^{wq} *Processus*, ^{wr} *Processus*, ^{ws} *Processus*, ^{wt} *Processus*, ^{wu} *Processus*, ^{wv} *Processus*, ^{ww} *Processus*, ^{wx} *Processus*, ^{wy} *Processus*, ^{wz} *Processus*, ^{xa} *Processus*, ^{xb} *Processus*, ^{xc} *Processus*, ^{xd} *Processus*, ^{xe} *Processus*, ^{xf} *Processus*, ^{xg} *Processus*, ^{xh} *Processus*, ^{xi} *Processus*, ^{xj} *Processus*, ^{xk} *Processus*, ^{xl} *Processus*, ^{xm} *Processus*, ^{xn} *Processus*, ^{xo} *Processus*, ^{xp} *Processus*, ^{xq} *Processus*, ^{xr} *Processus*, ^{xs} *Processus*, ^{xt} *Processus*, ^{xu} *Processus*, ^{xv} *Processus*, ^{xw} *Processus*, ^{xx} *Processus*, ^{xy} *Processus*, ^{xz} *Processus*, ^{ya} *Processus*, ^{yb} *Processus*, ^{yc} *Processus*, ^{yd} *Processus*, ^{ye} *Processus*, ^{yf} *Processus*, ^{yg} *Processus*, ^{yh} *Processus*, ^{yi} *Processus*, ^{yj} *Processus*, ^{yk} *Processus*, ^{yl} *Processus*, ^{ym} *Processus*, ^{yn} *Processus*, ^{yo} *Processus*, ^{yp} *Processus*, ^{yq} *Processus*, ^{yr} *Processus*, ^{ys} *Processus*, ^{yt} *Processus*, ^{yu} *Processus*, ^{yv} *Processus*, ^{yw} *Processus*, ^{yx} *Processus*, ^{yy} *Processus*, ^{yz} *Processus*, ^{za} *Processus*, ^{zb} *Processus*, ^{zc} *Processus*, ^{zd} *Processus*, ^{ze} *Processus*, ^{zf} *Processus*, ^{zg} *Processus*, ^{zh} *Processus*, ^{zi} *Processus*, ^{zj} *Processus*, ^{zk} *Processus*, ^{zl} *Processus*, ^{zm} *Processus*, ^{zn} *Processus*, ^{zo} *Processus*, ^{zp} *Processus*, ^{zq} *Processus*, ^{zr} *Processus*, ^{zs} *Processus*, ^{zt} *Processus*, ^{zu} *Processus*, ^{zv} *Processus*, ^{zw} *Processus*, ^{zx} *Processus*, ^{zy} *Processus*, ^{zz} *Processus*.}

Dorsum scapulae
Capitulum scapulae
Lateralis tria

Basis
Costa

Anguli

Connectio

Substantia

Processus

Processus

Processus

Processus

Processus
Spina Scapulae

Fig. 13.
Fig. 14.

E. F. G.

G. D.

E. C.

C.

latitudine enatus, non in ipso quidem longitudinis medio, sed sede aliquanto elatiore, & nonnihil sub angulo superno. Hic ubi ex ^a angusto quasi vertice, juxta basin scapulæ ad anteriora delatus est, sensum fit latior ac crassior, cumque ad cervicem jam fere appulit, à scapula discedens, ^b in longam, moderateque curvam, & latiusculam appendicem finit, quæ supra humerum evecta, ad anteriora deferitur, & in extremitate sua antica ^c lævem sinum insculptum obtinet, cui claviculæ caput articulatur. Totus autem hic processus qui dorso scapulæ nectitur, *Spina scapulæ* dicitur: at illa pars spinæ, quæ abscedit, & supra humerum fertur, Græcis *ἀκρωμίων*, Latinis *Summus humerus*, quo nomine & nobis, in musculorum præsertim historia, semper vocabitur. Spina autem duas *cavitates* efficit, *superiorem* & *inferiorem*, quarum utraque *μετασπυγιον*, *Inter scapulum* dicitur, adeoque *ἡ ἄνω ἢ ἡ κάτω*, ^d *superius*, aut ^e *inferius*. ^f *Tertius processus* ille est, qui ex costa superiore, qua cervici contermina est, enascitur, minor prædicto, & situ quoque inferior. Semicirculum refert, cum ^g ex angusta basi ^h in acutiorem verticem circulari linea fastigiatur, humeri articulo præfixus, quo firmius in sua sede contineatur, minusque excidat. Sed quia figura hæc pluribus, & quidem diversis rebus accommodari commode potest, factum hinc est, ut diversa nomina ipsi ab Authoribus imposita sint, prout quisque huic, aut alteri rei assimilare voluit. Hinc aliis à cognatione quam habet cum *C Grecorum*, *σπυγιώδης*; aliis, ab *anchore* figura, *ἀγκυροειδής*; aliis denique, à *rostri corniculæ* forma, *ροστροειδής* dicitur. Nos latine Ancoriformem processum appellabimus.

Uſus scapularum per se satis manifestus est ex historia. Cum enim sinum pro humeri osse contineant, ipsius gratia creatas esse, haud difficulter quis crediderit. Et quo in loco articuletur humerus, si absque scapulis foret, cum costæ Thoracis, non modo opportunitatem; sed etiam locum penitus omnem denegent, ut ideo in reliquis etiam, præter hominem, animalibus, scapulæ os brachio articuletur? Accedit, quod plures hinc musculi, humeri motui dicati, commode enascantur: ut taceam interim Naturæ providum consilium, quo dorso voluit prospicere, dum scapulis quasi clypeo quodam textit, & adversus externas injurias à tergo incidentibus, munivit.

CAP V T XVIII.

Quæ de Spina in universum dici possunt, persequitur.

Spina.



Vertebra.

SPINA DORSI, ⁱ Græcis quoque *ἀκρωμίων*, à spinosis processibus appellata, non ex uno constat osse, tametsi id tutius fortasse erat: sed ex pluribus conflata est, tum propter motum, cujus beneficio corpus flexitur extenditurque, tum propter nervos, qui ex medulla, quam continet, pluribus ramis in universum fere corpus disperguntur. Hæc ossa Græcis *σπίθονες*, Latinis *VERTEBRÆ* vocantur, numeroque sunt viginti quatuor: ^k septem quidem Cervicis: ^l duodecim Thoracis: ^m quinque denique Lumborum. Vocamus autem nunc ⁿ *Dorsum* doctrinæ facilioris gratia, quicquid à prima colli vertebra ad sacrum os protenditur, etsi magna pars eorum qui corporis humani historiam literis prodiderunt, os quoque sacrum dorso addiderint. Habent hæc vertebræ quædam communia inter se, adeo ut omnibus totius spinæ vertebrae competant: quædam communia vertebrae solius cervicis, thoracis, aut lumborum: nonnulla etiam propria. Hæc ut fideliter omnia & ordine tradamus, primum ea quæ generalissima sunt, quæque de omnibus in universum dici possunt, hoc capite persequemur, deinde quæ singulis competunt breviter subjiciemus.

Communioria
omnibus dorsi
vertebris.
i.
Corpus.

^o *Commune* ergo hoc omnibus est (excepta prima) *spinam constituentibus vertebrae*, habere in antica sui parte ^p corpus quoddam extuberans nonnihil anteriùs, sive ea parte, qua pectus respiciunt; posteriùs, qua dorsum, modice cavum: supra vero, infraque, plana superficie donatum. Corpus hoc non ex solido osse ac duro: sed molli, fungoso, ac pumicis substantiam referente conficitur, quod ideo quoque levissimum est. *Magnitudinem* hujus quod spectat, minus id est (quemadmodum ipsæ etiam vertebræ) superioribus, adeo, ut quo remotior quæque est à prima cervicis, tanto majora sumat incrementa, ut propterea merito lumborum vertebræ, omnium quæ in spina continentur, sint maximæ. Id quod Natura sapientissima summo effecit consilio, cum ea corpora,

pora, quæ sustinent, majora semper sustinendis esse debeant. Ne tamen propterea benignissima Parens animala pondere incommodaret, ingeniose aliud quoque commenta est, & quanto majorem fecit unamquamque, tanto fungosiorum quoque, ut ita dicam, pluribusque & majoribus cavernulis refertam efformavit, ut adeo vertebrarum lumborum corpora levissima quoque sint, & nullo fere pondere prædita. His corporibus tria deinceps processuum genera adnata sunt, transversi nempe, obliqui, & acuti. ^{1.} Processus autem, qui situm obliquum obtinent, & quatuor singulis sunt, quorum duo ^b ascendentes, duo alii ^c descendentes, pro mutua vertebrarum inter se articulatione effecti. Inter hos in medio unus est, posteriore sede ^d acutus, ex utriusque horum concursu enatus, deorsumque delatus, superne acuta linea se stringens, at inferne latiore basi extendens. Habet præter hos processus, quælibet vertebra ^e foramen grandiusculum, inter corpus vertebræ, & triplices processus consistens, quod transitum præbet medullæ à cerebro per totum dorsum descendenti. Atque hoc quidem foramen proprium dicitur: nam à lateribus, qua inter se committuntur, excavatæ sunt, & sic dum invicem junguntur, ex cavo superioris inferiorisque, unum quasi rotundum foramen (unde ^f commune vertebrarum foramen dicitur) constituunt, quod postea nervo exitum, venæ autem, & arteriæ, ingressum in spinæ cavitatem largitur. Cæterum harum connexio, quo pacto inter se fiat, libro tertio, ubi de ligamentis agemus, fusius dicitur.

C A P V T . X I X .

De Vertebris Cervicis.



ERVIX septem constat ^e vertebra, raro octo, in iis scilicet, qui longo sunt collo, & quibus una postea deest in Thorace, unde oblongi colli homines phthisi admodum sunt obnoxii, quod duodecima vertebra deficiente, necessario brevior sit Thorax, minusque se pulmones expandant; quo fit, ut sanguis circa illos contentus & effervescens, acrimonia sua erodat vasa, ulceraque ac tandem totius corporis marcorem inducat. Est autem cervix pulmonum gratia condita, quatenus asperam arteriam in se pulmo continet, id quod vel inde satis colligitur, quod animalia pulmone destituta, cervicæ careant: & contra, quæ pulmone donata sunt, ea etiam universa collum obtineant. Habent cervicis vertebræ communia quædam cum cæteris dorsu vertebris, quæ præcedenti capitulo persequuti sumus: quædam communia inter se, nonnulla etiam propria, de quibus nunc agendum.

Communia inter se habent, primo ratione ^b corporis, quod in ipsis semicirculare non est, ut in thoracis aut lumborum vertebra: sed quadrilaterum potius, & oblongum, longitudine altero tanto latitudine majore. Posterior sedes plana fere est: ⁱ superior sinuata, ^k inferior convexa modice, ut scilicet inter se fidelius committantur, & motus fiat expeditior. Magnitudinem habent inter thoracis & lumborum vertebra mediam, cum summo loco sint positæ. Quantum ergo ipsæ thoracis; tantum hæ lumborum vertebra minores sunt. Osse autem durior constant ac cæteræ vertebræ, tum quia motu continuo exercentur, tum quia reliquæ magnitudinis ratione porosiores sunt redditæ, ut dictum est. Processus habent ^l obliquos, ^m transversos, & ⁿ posteriores, qui postremi in omnibus, (excepta prima, & duabus ultimis) sunt bifidi. Foramina quoque omnes obtinent, ^o primo magnum illud, per quod medulla trajicitur, deinde ^p alia duo, utrinque unum, in transversis processibus, quod nulli, nisi cervicis vertebra competit, per quod venæ & arteriæ in caput ascendunt: tandem communia dicta, quæ tamen in eo hoc habent proprii, quod in colli vertebra, inferiori vertebræ plus quam superiori debetur, cum illa, atque hæ, magis excavata sit.

^q Prima vero cervicis vertebra cæteris omnibus minor est, solidior tamen & durior, quod tenuis esse debuerit, ob cavum amplum, ad transmittendam medullam, quæ crassior huic est, ac reliquis, cum proxime ibi ex cerebro erumpat. Corpus sola non habet, sed ejus loco ^r anterius tuberculum, (in quod primus flectentium cervicem inferitur) ^s intus vero sinum quadratum, cartilagine incrustatum, qui dentiformem secundæ

G

vertebræ

^{1.} Processus^{3.} Foramen proprium^{4.} Foramen commune
^{5.} ConnexioOblongi colli
homines cum
phthisi obnoxii.Communia
vertebrarum
cervicis.^{1.}^{2.}^{3.}^{4.}^{5.}Propria vertebrarum
cervicis.^{1.}Primæ
Tuberculum.

Sinus.

Processus.

vertebræ appendicem excipit, cartilagine similiter obductam. *Processus* ^a ascendentes pa-
 riter ac ^b descendentes paulum differentes habet ab aliis, cum utrique sinuati sint, illis oc-
 cipitis tubercula; his, secundæ ascendentes, excipientibus. Super illis motus capitis in
 priora & posteriora fit, hoc est, flexio capitis & extensio; super his, circa dentiformem
 processum circularis, quo caput ad latera ducitur. ^c *Transversi* processus simplices sunt,
 majores tamen ac reliqui, quod propter musculorum caput moventium sextum septi-
 mumque par contingit. ^d *Spina*, sive posterior, admodum ab aliis differt, nam neque
 bifida, ut cæteræ colli, neque acuta, ut thoracis, sed simplex est, in tuberculum, &
 obtusum valde angulum terminans, brevissimaque, imo vero vix spinæ dignanda no-
 mine, cum spina si ibi esset, plurimum musculus ea in parte delatis (quos infra rectos
 minores caput extendentes vocabimus) incommodatam fuisset. ^e *Foramen* obtinet in
 medio proprium, majus cæterarum foramine: at inferius cum secunda, ut & secunda
 cum tertia, commune efficit, non tamen reliquis simile: sed per sinus rimæ formam
 exprimentes, exsculptos ad processus obliquos descendentes, quibus secundæ vertebræ
 ascendentes processus, committitur. In reliquis cervicis vertebra, sinus commune
 foramen efformans, orbicularis est.

Spina.

Foramina.

Secundæ
 Corpus.
 Processus.

Dens magnus
 Hippocratis.

Quatuor se-
 cundæ subja-
 centium.

Septima.

Communia
 vertebrarum
 Thoracis.

^f *Altera* vertebra corpus nanciscitur, sed strictius id est, minusque aliarum corpori-
 bus. *Processus* ^g transversos similiter minores habet, & ^h foramina ipsi insculpta mi-
 nora, deorsumque respicientia: ⁱ posteriorem bifidum, ut cæteræ. ^k Superiores leviter ex-
 tuberant, ^l inferiores leviter sinuantur: ex medio autem corpore inter duos ascenden-
 tes processus, ex elatiore regione ^m alius quidam erumpit, nulli alteri vertebræ com-
 munis, altus, admodumque solidus, & acutus, qui cartilagine contextus, in sinum primæ
 vertebræ, de quo diximus, inseritur, super quem circularis capitis motus obitur. Hic
 cum dentis, præsertim canini, formam exprimat, idē, & *Dens magnus* Hippocratis,
 à dissectionum peritis vocatur, quamvis Hippocrates totam potius vertebram hoc no-
 mine, quam processum hunc solum indigitarit. Hic elatiore in parte, qua primam
 vertebram superat, asper est, ut tutiorem sedem ligamento largiatur, quo cum osse oc-
 cipitii connectitur anteriore parte magni foraminis, per quod spinalis medulla ex cra-
 nio descendit.

ⁿ *Tertia* deinde, *quarta*, *quinta*, & *sexta* vertebra, sive quatuor secundæ subjacentes,
 similes fere sunt in omnibus. ^o *Laterales* processus omnes aliis ampliores habent, & bifi-
 dos, non secus ac bifidæ quoque sunt ipsarum ^p spinæ, quo validiore nexu plures mu-
 sculi adaptarentur: quamvis sexta spinam non ita manifeste duplicem habeat. *Obliqui*
processus quoque habent similes, ex quibus ^q ascendentes quidem tuberculo, sive capite
 donantur, leviter admodum extuberante, ut difficile sit distinguere, capitulum sit, an si-
 nus vocandus: ^r descendentes vero modice exsculptum orbicularem sinum obtinent.

^s *Septima* tandem, omnium cervicis maxima est, & quemadmodum loco, ita quoque
 figura thoracis vertebra propior. nam neque ^t transversos processus, neque ^u postero-
 rem habet bifidum, sed admodum extuberantem ac propendentem, non secus ac tho-
 racis spinæ dependent.

CAPUT XX.

De Thoracis, ac Lumborum vertebra.



SEPTEM cervicis vertebra, duodecim ¹ THORACIS excipiunt. Quan-
 quam interdum etiam tredecim inveniantur, quibus totidem costæ re-
 spondent, sed rarum id est: nonnunquam etiam undecim, ut dictum,
 sed multo adhuc rarius.

Corpora harum orbicularia sunt ² antè, ³ postè leviter cava, ac
 quasi lunata, ⁴ superius inferiusque plana superficie donata, dummo-
 do primam excipias, cujus elatior sedes inæqualis est, similisque omnino vertebrarum
 colli. Et quamvis planæ sint, circa tamen ambitum omnes leviter extuberant, ut liga-
 menta firmitus illic viciantur, ne vertebræ extra suam sedem tam prompte prolaban-
 tur. *Processus* obtinent similiter, ut reliquæ dorsi, quatuor quidem obliquos, at duos
 laterales, unumque posteriorem acutum, sive spinam. *Obliqui* inserviunt articulationi,
 quorum

quorum beneficio inter se committuntur: sic tamen, ut semper ^a superiores capitulorum vicem gerant, & inferioribus proxime adjacentium superiorum vertebrarum inarticulenter: ^b inferiores contra, sinuum, leviterque cavati sint, ut capitula proxime inferiorum vertebrarum excipiant. Et hanc articulationis rationem communem habent cum cervicis vertebra, adeo quidem, ut à secunda colli ad undecimam usque thoracis eadem sit omnium inter se, quo ad juncturam, ratio. Duodecima enim propriam postea obtinet, & quemadmodum prima cervicis utrosque obliquos, ascendentes dico & descendentes, sinuatos habebat, ut infra supraque capitula exciperet, infra secundæ colli, supra capitula occipitis: ita thoracis ultima utrosque capitatos habet, ut supra ab undecima thoracis, infra à prima lumborum excipiat. ^c Transversi processus rotundo veluti capite extuberant, sursumque feruntur. Magnitudine æquales fere sunt inter se in superioribus novem: at in tribus inferioribus sensim decrescunt. ^d Spinae omnibus data, sed tamen haud eadem magnitudine & forma: omnibus tamen simplices sunt, neque ut colli bipartitæ. Superiorum enim novem proceræ admodum sunt, supra acutæ, infra latiusculæ, oblique deorsum latæ: inferiorum trium, ut laterales quoque liquido superioribus breviores, sed utrobique crassiores tamen, rectæque delatæ. Id vero in duabus infimis, undecima, inquam, & duodecima, manifestius apparet, in quibus multo adhuc rectius progrediuntur, lumbarium spinarum, ad quas accedunt propius, ritu non ita tamen, quin agnoscas deorsum spectare, & thoracis morem sequi. Foramina nactæ sunt, ut aliæ dorsi vertebrae, ^e proprium unum, maximum, in medio, per quod medulla tranfit: communia duo, utrinque unum, quæ fiunt ex sinibus inter corpus & processus obliquos exculptis, sic tamen, ut in thoracis vertebra uterque sinus, tam superioris, quam inferioris vertebrae, æqualis sit, adeoque magnitudine ambo sibi respondeant.

Atque hæc quidem communia magna ex parte cum aliis obtinere: duo adhuc sunt reliqua ipsis propria, ac singularia. Primum quidem, sinus duo, utrinque unus, pro costarum capitibus inferendis, lævis admodum, & cartilagine investitus. Sinus hic à prima usque ad nonam, uni atque alteri vertebrae communis est, utraque dimidiam veluti partem conferente, non secus ac modo diximus, communia foramina, juxta quæ & ipsi hi sinus consistunt, ab utriusque veluti symbola produci. In reliquis tribus inferioribus, totus in ipso corpore, ejusque superiore parte, incisus est. Alterum est similiter ^f sinus lævis, cartilagine succinctus, insculptus transversis processibus novem vertebrarum superiorum, quibus costæ inferuntur, & quasi affirmantur. Vnde fit, ut longiores quoque tribus cæteris inferioribus sint, & quamdiu costas excipiunt, etiam processus harum gratia conditos proceriores exigant. Sinus autem hi, non æqualiter omnibus insculpti sunt: sed in prima vertebra deorsum magis spectant, in ultima, sive nona, paulo sursum: in mediis, medio quodam modo se habent.

^g Thoracis vertebrae immediate LUMBORVM quinque subjiuntur, quæ ^h corpus obtinent semicirculare, sed oblongum, grandius corpore superiorum, ut facilius ab ipsis ferantur, cum Naturæ legibus admodum conveniens sit, ut basis paulo latior validiorque sit re, quam sustinet. Constat autem ex substantia rara, & pumicis ritu plena foraminibus, partim ut gravitate minus animali molestum sit, partim ut venæ alimentum deferentes, viam apertam liberamque inveniant, per quam excurrant. ⁱ Superiores processus, juxta ^k ac inferiores, alio se habent, & prorsus contrario, quam in Thorace, modo. In illis enim superiores capitula exigebant, inferiores sinus: in his superiores sinus efformant, inferiores capita. Vtrique oblongi sunt, evidenterque figuram suam exprimunt, ut nullo negotio agnoscas illos sinus esse, hos capitula. ^l Transversi, tenuiores quidem sunt, longiores tamen thoracis vertebra, excepta prima & quarta, quæ omnium minimæ: tertia omnium longissima, & quinta crassissima est. Feruntur omnes recta, solam quintam si demseris, quæ ex principio latiore in acutum definit aggulum, modice curva, in processu sursum delata, ut ilium ossa sibi vicina evitet. ^m Posteriores processus validi sunt, breviores tamen pro ratione sui corporis: figuræ pæne quadrilatæ oblongæ, nisi quod inferius latus paululum sinuatum sit; exterius venter, modice convexum. Crassi sunt, non tamen æqualiter, cum superiore sui parte acutiem illam spinis propriam fere retineant, inferiore lateant: at omnium crassissimi in fine fiant. Magnitudine inæquales sunt invicem. nam ut vertebrae, quo inferiorem

Propria vertebrarum thoracis.

1.

2.

Lumborum vertebrae quæ communia habent.

3.

4.

spinalem, quæ omnia in reliquis vertebra inveniri, antea diximus. Omnia tamen ^a superiore sede latiora sunt, quam ^b inferiore, superiusque semper officulum sublequens magnitudine vincit, adeo ut in macronem terminentur, psittaci rostro non valde dissimilem. In Mulieribus hic paulo extrorsum cedit ob uteri cervicem, ne in gravida comprimatur: in Viris introrsum curvatur, ut intestinum rectum, cuius gratia conditum est, defendat. Et hanc causam esse puto, quam propter puerulis, in quibus cartilaginis naturæ, quam ossis propius accedit, frequens satis & familiaris morbus sit ani procidentia. Sphincter enim musculus, ac ipsum quoque rectum intestinum huic officulo nexu coherent, & cum humida admodum sit puerorum temperies, fit ut harum partium fundamentum instabilius reddatur. *Connectitur* autem ossi sacro, beneficio cartilaginis, sed nexu admodum laxo, ut in conatu valido, dum excrementa majora secerantur, cedere valeat. Absque eo enim foret, sapissime profecto luxationem incurreret, quemadmodum videmus contingere quoque non raro in partu difficiliore foemini, quibus tamen facile, fascia circa nates valide restricta, restituitur. Habet autem *prima* superne ^c sinum exiguum, quo postrema sacri ossis vertebra excipitur: at ubi sacrum os ex quinque vertebra constituitur, supremum coccygis officulum, transversos duos processus acutos exigit, qui sursumeducti, processui quintæ sacri ossis vertebrae valide coalescunt, foramenque efficiunt, per quod sextum nervorum par ossis sacri educitur.

Nota.

Commodo.

CAPUT XXIII.

De Costis.

I HORAX, cum motus gratia, neque ex uno osse, ut caput, constare potuerit: neque ex sola carne, quemadmodum abdomen: sed partim propter cor, omnium viscerum nobilissimum, firmum propugnaculum requirebat, partim propter pulmones motu indigebat, Natura solertissima perquam commode utrique prospexit, dum carnes ossibus alternatim intertexuit. *Ossa* ^d ergo Thoracis *anterior* quidem sunt, ^e Sternum, & Clavicula: *posterior*, ^f Vertebra: ^g à lateribus, ^h Costæ, quæ sic ingeniofo invento carnis contextæ sunt, ut & muniri firmiter ossium, & moveri commode carnis gratia posset.

Sunt autem *Costæ duodecim*, tam in maribus, quam foeminis, ut figmentum & fabula merito habeatur, deesse unam potiori sexui, quod sequior ex costa virili sit conditus. Illud sane inficias nequit iri, & experientia ipsa confirmat, fuisse nonnullos, in quibus *tredecim* repertæ sunt, sed rarum admodum id est, rariusque adhuc defuisse unam. *Quinque* quid sit, cum duodecim ut plurimum inveniantur, ^b septem superiores legitime vocari solent ab Anatomicis, ⁱ inferiores quinque, spuria. Vocantur *Legitime*, quod vere sint costæ, perfectum complentes circulum, & ad sternum usque pertinentes: at *Spuria*, quia minores illis sunt, nec thoracem ambiant, aut pectoris os attingant, sed potius in latere ipso finiantur. *Substantia* omnium partim ^k ossea est, partim ^l cartilaginea, cum ex osse consistant admodum fungoso quidem, & molli, sed in veris multo duriore, quam in nothis, quibus molle ac pæne cartilagineum est, ut tum ipsæ costæ, tum per ipsas partes subjectæ sint tutiores. *Cartilago* quoque veris sic crassa est & dura, ut senescentibus facili adeo negotio in ossa convertatur, quemadmodum & Virginibus, mammis auferentibus, quo firmior sedes incumbentibus mammillis paretur. Spuriis tamen contra ita mollis est, ut neque in extrema senectæ cartilagineam naturam, ut cætera, exuat, sed si quo forte pacto mutetur, duriuscula tantum non nihil fiat. Est etiam brevior multo legitimis, utcumque crassior: spuriis contra, tenuis, & angusta. Cæterum *mittuntur* *anterior* quidem *septem* vera sterno; posterior vero vertebra: & ^m sterno quidem, per eam enarthroses neutrius speciem, quæ arthrodia dicitur, cum sterno sinus insculpti sint, qui capitula cartilaginum recipiunt: at vertebra, ⁿ primum per capitula cartilaginea incrustata, in sinibus illis corporis vertebrae, deinde ^o per tubercula quædam similiter cartilagine tecta, sinibus transversorum processuum insculpta, ubi quoque asperæ sunt paulum & inæquales, ut ligamenta originem validiorem habeant, vertebrae neclantur,

Costarum numerus.

Distributio.

Substantia.

Cartilagineæ.

Connectio.

nectantur, & alligentur. At spuræ antèrius, sursum quasi retortæ, longo ductu se comitantur, ac tandem sibi ipsis quasi, & cartilaginibus verarum, una excepta duodecima, agglutinantur: posterius autem octava & nona, non secus ac legitimæ duplici articulo vertebri connectuntur, decima rarissime duplici, sæpissime uno: at undecima, & duodecima unico duntaxat capitulo, sinui corporis vertebræ inhæret. Sinus autem ille non æqualiter in omnibus se habet, eodemque modo; sed in prima quidem vertebra in ipso corpore rotus insculptus est: at in octo sequentibus ad latera processuum superiorum & inferiorum, utrique communis, ut dictum: ternæ ultimæ, infimo loco positæ, similiter proprios habent. *Figura* omnibus semicircularis contigit, gibba exterius, interius concava. at *magnitudo* non eadem est, cum superiores inferioreque breviores sint, *media*, longiores. Prima ergo & ultima, omnium brevissimæ sunt, paulo major secunda & undecima, hinc tertia, & decima, sexta vero, septima, & octava longissimæ, quod Thorax inferius & superius angustus, in medio autem amplissimus sit. Cæterum costarum longitudini, cartilaginis longitudo respondet, cum longiores longiorem cartilaginem habeant. Eodem pacto latitudinis & crassitiei eandem rationem obtinent: unde prima costæ, quæ latissima est, in latissimam finit cartilaginem: undecimæ vero, & duodecimæ, quæ tenuissimæ sunt, tenuissima quoque adjuncta est cartilago. Ipsa autem ossea costarum pars, posteriore sede, qua vertebri nectuntur, crassa est & stricta: at anteriore, quo propius à sterno absunt, attenuatur latiorque fit magis. Vnde evenit, ut illa quidem pars *remis*, *remulus*; hæc, *palma*, *palmula* vocetur, desumptis eleganter his vocibus à remis, à quibus & totæ costæ *αὐλῆς* vocantur, cum figura, & situ, si totius thoracis ossa respicias, non incommode remigium exprimere videantur. Superna parte hebetes sunt: inferna, acutæ, sic tamen, ut in hac * sinum, canali similem, secundum totam ipsarum longitudinem efforment, qui crassior est circa vertebra, at in progressu ad anteriora sensim attenuatur, in quo intercostalia vasa, venæ, inquam, arteriæ, & nervi tuto reconduntur. *Vsus* costarum nemini ignotus est. Natura enim provida nobilissimo visceri in Thorace contento, Cordi scilicet, firmamentum ac tutelam ossibus his parare voluit: cui promptitudo motus, in inspirantibus expirantibusve accedit, fultus carnibus ossis his fundamentis.

CAPUT XXIV.

De osse Innominato.



Amplum illud os, ad latera sacri consistens, **INNOMINATUM** Galenus, libr. de oss. ad Tyrones, capit. 30, appellavit, quod suo tempore nomine careret, quanquam hac ipsa occasione proprium nomen invenerit, quo à cæteris omnibus distinguitur, dum hodieque Innominatum vocamus. Meminit tamen ejus multis ante Galenum seculis doctissimus Poëtarum Homerus, in Iliade, propriamque imposuit appellationem, *ἰσχίον* vocando, quæ postea à Ruffo, & qui post ipsum doctiores exstitere Anatomici retenta fuit, cum vulgo os, *ischia*, aut *ilium* dicatur. Vtunque autem unitatis nomine ubique veniat, minime tamen unum ac simplex est, sed ex tribus cartilaginum beneficio invicem junctis, conflatum. Et junctura quidem hæc in pueris ad septimum usque annum maxime evidens est: in adultioribus vero, cartilagine illa exsiccata, sensim perit, ut adeo per *σύνφυσις*, sive unionem, in simplex & unicum os, tria illa abeant. Vsu tamen venit adhuc apud omnes, qui nobis humani corporis descriptionem tradiderunt, ut ossa innominata etiam in adultis trifariam dividantur, ac sic veluti triplicia proponi soleant. ^{1.} Primum os, *ilium*, sive *ἰσχυρὸν ὀστέον* vocant, quod lateri respondentem sedem constituit: ^{2.} Secundum, Coxendicis, quod illam partem conficit, cui acetabulum pro femoris capite insculptum est: ^{3.} Tertium, os pubis, aut pectinis, magnoque foramine est incisum. Primum elatiorem sedem occupat: secundum, inferiorem: tertium, anticam. Horum ossium discrimina in magno illo coxendicis sinu deprehendi solent, in quo ^{3.} lineæ ducuntur cartilaginose à centro ad circumferentem ambitum, quarum duæ versus superiora excurrunt, sed altera ad anteriora, ut prima; altera ad posteriora, ut secunda: tertia à centro ad inferiora trahitur. Ex his primæ duæ

Os innominatum ex tribus conpositum est.

b, 2. tabb.
1. Os 2. feli.
imprimis 2.
9. figura 5.
6. 7.

1. 2. 3.
d. p.
e. 2. 3.

f. 2.
g. 2. 9.
h. 1. 2. 3.

duæ ilium os constituunt: secunda & tertia coxendicis: tertia & prima, os pubis.

^a Os ergo ILLUM, omnium latissimum maximumque, superius semicirculi fere imaginem refert, & intrinsecus cavum, extrinsecus convexum est. Semicirculus ille ^b Spina ossis Ilium dicitur; at ^c cavitatis, Cossa; ^d gibbositas vero, Dorsum. Spina hæc, appendix est admodum aspera, ob musculorum nexum, cum ab externa ejus parte abdominis obliqui ascendentes oriantur, & desinant descendentes: ab interna, pars carnosâ transversæ: ab anteriore, primum par tibiam flectentium. Dorsum, tres primi fœmur extendentes, quos Glutæos vocabimus, occupant, à quo cum & enascantur, ^e tres habet asperas lineas sibi insculptas, ut principium stabilius nanciscantur: at Cossam, fœmur flectens secundus, sive Iliacus internus, totam contegit. Connectuntur hæc ossa cum sacro ^f longo ductu, qui simillimus est ejusdem transversis processibus, variis tuberculis sinibusque exasperatus, adeo ut exacte horum ossium sinus, processibus illius, & contra processus sinibus respondeant, sicque firmior conjunctio fiat.

Alterum ^g OS COXENDICIS, aut COXÆ dictum, inter Ilium & pubis ossa medio loco situm est, quod sinum habet, (quem ^h coxendicis acetabulum vocant) pro excipiendo fœmoris capite, quo major in humano corpore non datur, si conferas cum cæteris, quibus aliarum partium articuli connectuntur. Sinus hic undique ⁱ labris cingitur, posteriore tamen parte magis, quam antica; & superiore, quam inferiore; ut fœmur nobis sedentibus in acutum angulum commodius flectatur. ^k Deficiunt tamen hæc labra, qua parte sinus pubis ossa respicit, ob venam ibi transeuntem, quæ articulo nutrimentum deducit, pro generando humore glutinoso & tenaci, ad irrigationem articuli maxime necessario, quod facillime in validis illis motibus, quibus continuo agitur, præsertim in longis itineribus, summo cum animalis detrimento exsiccaretur. Est autem hic sinus cartilagine contextus ubique lævissima, præter ^l anteriorem partem, quæ foraminibus exasperata ob ligamentum teres, quod inde originem ducens, capiti fœmoris inferitur. Notandum vero hic quoque aliis ^m sinus est ossis coxendicis, posteriori & internæ ipsius sedi insculptus, circa quem veluti ad trochleæ rotulam, tertius fœmur circumagentium musculus, sive Obturator internus reflectitur. Nec prætereunda silentio est, ejusdem ⁿ appendix, quæ toti infimæ ipsius sedi, cui sedentes innititur, adnascitur. Hæc admodum lata est pro ratione ossis cui adnascitur, cum ab ea insignes musculi originem ducant, tres nempe posteriores tibiam flectentes, tertius puta, quartus, & quintus. Habet tandem etiam ^o duo tubercula in ambitu acetabuli, unum ^p internum, alterum ^q externum. Ab illo initium sumit secundus tibiam extendentium, sive Rectus; in hoc, quod acutum valde est, ligamentum inferitur, quod à quinto ossis sacri processu exoritur.

Tertium tandem ^r OS PUBIS in anteriore parte positum est, ubi cum osse pubis alterius lateris committitur ^s linea aspera & crassa recta descendente, quam intercedit cartilago quædam non admodum dura. ^t Foramen habet omnium totius corporis maximum, auriculari non absurde exprimens, inter sinum coxendicis, eamque partem, qua suo conjugi, seu alterius lateris ossi pubis committitur, positum. Levitatem affert ossi hoc foramen, sedemque præbet duobus fœmoris musculis, extrinsecus externo, intrinsecus interno obturatori, sive secundo & tertio circumagentibus musculis, qui à se invicem ligamento forti, quod foramen hoc subtendit, disparantur. Supra foramen hoc insculptus est ^u sinus, per quem venæ & arteriæ transeunt, quæ ad crura deducuntur, sive Vasa cruralia appellata. Cæterum hæc tria ossa cum sacro juncta constituunt cavitatem, quam vulgo ^v Pelvim vocant, in qua intestinorum, vesicæ, & uteri pars, continetur. ^w Vfus horum ossium est, fœmoris caput in se recipere, & sic universum corpus sustinere; deinde partes infimi ventris tum falcire, tum munire, præsertim vero intestina, vesicam, & in fœminis genitalia membra.

Cæterum cum in fœminis aliqua differentia circa hæc ossa occurrat, & haud parum à virilibus diversa sint, sub calcem hujus capituli illud discrimen breviter subicere decrevimus. Primum circa Ilium ossa invenitur, quæ latiora multo atque ampliora sunt in fœminis, spinam quoque magis in latera educunt, id quod uteri gratia factum est, ut ipse dum in magnam attollitur molem gravidus, his tanquam fulcris innitatur, suumque pondus facilius sustineat. Alterum, in coxendicis ossibus cernitur, quorum inferiores partes à se magis,

Os Ilium.

Spina.
Cossa.
Dorsum.

Connectio.

Os coxendicis.
acetabulum.

Sinus.

Appendix.

Tubercula
duo.

Os pubis.

Foramen.

Pelvis.

Vfus.

Differentia
horum ossium
in utroque
sexu.

à se magis, quàm in viris distant, ut infanti ex utero egredienti, transitus sit major. *Tertium, in ossibus pubis* advertitur, in quibus linea aspera, qua diximus inter se hæc ossa committi, in foeminis multo brevior est, ac in maribus: at cartilago contra, ipsa ossa inter se connectens, duplo crassior, laxior, ac mollior. *Processus quoque inferiores*, qui sub dicta linea siti sunt, ad externa magis à se diducuntur, ut sic in foeminis cavitas infimi ventris, quam Pelvim nominavimus, multis modis, quam in maribus sit major, quod cum intestino recto, vesicaque, uterum, & quando plenus est, foetum etiam continere debuit.

QUESTIO. De his ossibus quæstio esse solet inter Medicos, verane sit quorundam sententia, quæ pro certa à pluribus accipitur, ab antiquissimis Authoribus confirmata, de ossium pubis partus tempore inter se divulsione. Nos cum brevitati studeamus, relictis argumentis quæ pro utraque parte in medium afferri consueverunt, quid sæpenumero non tantum ipsi propriis oculis viderimus, sed aliis etiam in publico Theatro conspiciendum dederimus, brevissime hic proponemus. Incedimus enim media via, nec in omnibus hiscere,

Observatio. nec in nulla, ex plurimis observationibus statuimus, sed in illis tandem, quæ partum habent admodum difficilem ac laboriosum, aut partes ad foetus egressum necessarias, oppido quam angustas sunt nactæ. Nec quoque ita à se dividi credimus, ut à se mutuo dehiscant: sed ligamento laxiore reddito, adeoque sequace ad extensionem, nonnihil hiare arbitramur. Fieri autem id posse facilius notavimus, quo tum major ante partum ad illa membra generationi fortusque exitui dicata; tum in illis maximis doloribus, quibus in partu difficili (præsertim si diutius duret) misere mulierculæ conficiuntur, humorum affluxio fieri consuevit. Sæpe enim sæpiusque vidimus, vasa illa, quæ alias minuta satis sunt, dum utero non gestant, in eam accrevisse gravidis magnitudinem, ut minimi digiti apicem fere crassitie adæquarent. Quamobrem profecto fieri nequit, quin ligamenta omnia, adeoque & cartilagine hæc pubis ossium irrigentur, & molliores postea reddita, ad aliquem hiatum maximopere præparentur. Neque tamen ossa pubis duntaxat, sed & articulationem illam, quæ sacrum os cum ossibus ilium connectit, pro

Dolores circa os sacrum, & pubem, soli difficultatem partus.

maiore minoreque difficultate, quam partus peperit, laxatam fuisse advertimus: unde illud est, quod exacto labore gravi, de doloribus circa os sacrum & pubem puerperæ nonnunquam conquerantur, cui ut obstetrices remedium inveniant, in lectum collocatas, pedibusque crucis in modum impositis, jubent quiescere, ut illa ossium separatio, humoribus digestis, solide iterum uniatur. Quam autem promptum sit ut hæc ligamenta laxentur, quilibet experiri potest, si ossa innominata, adhuc sacro juncta, & ligamentis suis investita accipiat, cartilagineque duorum pubis ossium abscissa, ipsa pubis ossa mutuo à se dividat. Videbit protinus juncturam illam laxari admodum posse, quam ipsam nos quoque sua natura in foeminis, quam maribus laxiorem esse factamprehendimus. Id vero quoque observandum est, ligamentum illud os sacrum innominatis alligans, anteriore parte, qua abdomen spectat, tenue satis esse; posteriore vero crassissimum, ut adeo affluentibus humoribus haud difficile remitti queat, sicque anteriore parte ossa ilium à sacro hiscant, posterius autem juncta mancant. Quod sane Natura solertissima in eum fecisse videtur finem, ut luxatio horum ossium præpediretur, quæ necessario contingeret, si ligamentum utraque parte laxaretur. Revera autem se ita habere, oculisque ipsis cerni posse illam (ut sic dicam) dehiscenciam, probare citra negotium potuimus sæpe in publicis demonstrationibus, in quibus foeminarum ex difficili partu mortuarum, (cute five adhuc integra, seu secta) foemur alterum sustulimus, vidimusque os pubis illius lateris, digiti fere latitudine eminuisse, quod alias fieri sine laxitate ligamentorum utriusque articuli non potuit. Simile accidit cum alterius lateris foemur elevaremus, id quod & ab aliis doctis viris sic observatum est. Ex his autem merito omnes, & jure conclusimus, pro difficultate in laborioso partu, magis minusve ossa pubis & sacrum, dehiscere, cartilagine, & ligamento facile ad omnem hiatum, ob maximum humorum ad illas partes affluxum, sequacibus.

Nota.

CAPUT XXV.

De osse Humeri.



HACTENVS trium ventrium ossa vidimus; restat ergo ut & artuum ossa inspiciamus, quos supra in Manus ac Pedes divisimus, vocantes *manum* quicquid à summa scapula ad extremos usque digitos pertingit. Hæc in tres partes ab Anatomicis dispescitur, in Humerum, Cubitum, & Extremam manum. Dicitur ^a Os HVMERI, quod à Græcis *βραχίων*, à Latinis quoque BRACHIVM, & HVMERVS *αυτοχρονως* vocatur, & inter scapulam ac cubitum, quibus supra infraque committitur, interjacet. Os est *substantie* durissimæ ac solidissimæ, in medio per totam longitudinem fistulæ modo excavatum, partim ut medullam contineat in se, partim ut homini levitate consuleretur. *Figura* Figuram habet teretem, sed variis exasperatam lineis, pro variorum muscutorum insertione, aut exortu, superius inferiusque admodum latefcens.

Elatiore enim sede, ^b appendice donatum est, ex qua duo exigit capita; quorum ^c alterum *interrum*, amplum & circulare est, læve, ac undique cartilagine incrustatum, quod sinui cervicis scapulæ committitur, & omnes humeri motus, ante, retro, dextrorsum, sinistrorsum, ad superiora denique, & inferiora perficit. Perfectissima enim articulandi ratione connexum est, cuiusmodi Enarthrosin vocant, & omnibus motibus ciendis absolvendisque, maxime est accommodata & opportuna. ^d Alterum caput externum est, quod non, ut prius, in alium sinum recipitur, sed gratia ligamentorum inferendorum factum est, illoque multo minus existit, sed magis inæquale, quod beneficio sinus, undique prius caput ambiens, ab illo magno divellitur. Caput hoc iterum in duo alia dividitur, ^e anterius puta, ^f posteriusque, ex quibus illud multis modis majus grandiusque est; hoc, minus. Dirimuntur autem intercedente ^g sinu quodam tereti, qui pro recipiendo primo primi cubitum flectentium musculi, principio exsculptus est, quem inferius Bicipitem appellari dicemus. Totus postea humerus deorsum fertur, ita tamen, ut sensim angustetur, in quo progressu parte ^h anteriore teres est, ⁱ posteriore depressus & latior, quæ sane figura musculis, illic locorum positis, maxime opportuna est, & apta.

^k Infima parte iterum, & evidenter latefcit, maximamque varietatem, ob processuum sinuumque copiam repræsentat. Cum enim duobus ossibus conjungi debuerit, Cubito & Radio, utrumque autem os duobus motibus agitur, factum etiam est, ut capitibus differentibus indigerit. Est ergo ^l inferius interiusque caput pro Cubito, cui, quod cardinis imaginem quoquo pacto exprimit, per *γυργαλον* conjungi dicitur, sed quia trochleam refert, *Trochlea* etiam, aut *Rotule* nomen, ab Anatomix Professoribus accepit. Nam præter quod orbicularem formam mediam accepit, planam utrimque à lateribus, media quoque ipsius pars sinuata est, non secus ac trochlea, qua parte funem suscipit, utrimque modice prominens. Non tamen exacte trochleæ comparaveris, quod ab interna parte magis, quam externa extuberet. Sinus habet ^m duos, ante, retroque unum, levi squama inter se distinctos, quorum ⁿ ille, qui anticam sedem occupat, minor est, & anteriorem processum cubiti suscipit: ^o hic, major multo, posteriori ejusdem processui dicatus. A latere externo aliud caput conjunctum habet, cartilagine tectum, cui radius committitur; sed quia is non nisi anterieus flectitur, & in pronum aut supinum aptatur, anteriora non excedit. Vtrunque ad latera horum capitum, eminentiæ adfunt, quas *Tubera*, & *Tubercula* vocant: quarum illam, quæ trochleæ vicinior est, ^p internum; alteram, ^q externum vocant: utrumque exortibus variorum muscutorum destinatum. Plerique enim musculi, qui cubiti radiique ossibus interna parte incumbunt, ab interno quoque tubere ortum suum habent: similiter ab externo, forissecus situati. Majus est longe interius externo; utrumvis tamen à tubere in acutam lineam definit, & longo ductu superiores humeri partes ascendit. Ad horum latera sinus sunt, & primo quidem ad latus ^r externi in parte humeri posteriore, pro quarto pari nervorum brachii; deinde ad ^s interni, in facie anteriore, pro tertio conjugio nervorum illic transeuntium: in posteriore vero, pro quinto pari. ^t Foramina in-

H

signa

Manus m.

Os humeri.

Substantia.

Figura.

Appendix superior. Caput superius internum.

Caput superius externum.

Appendix inferior.

Trochlea.

Sinus.

Capitulum.

Tubercula humeri.

Foramina.

signia nulla habet; sed in elatiore sede, parva quædam, nullo disposita ordine, quæ pro ligamentorum insertionem, aut educationem sunt condita. ^aIn medio longitudinis, interna parte unum est evidentissimum, quod deorsum vergens, in ipsam ossis substantiam intimiorem penetrat, ut per id ramus insignis ad ossis nutritionem, in cavitatem medullarem traducatur.

CAPVT XXVI.

De Vlna, & Radio.

Cubitus, &
ejus ossa.



Vlna.

Communia
utriusque
ossa.

1.

2.

Contraria.

Propria Vlnæ

Gibber,
nigra.

Sinus stylo-
ideus.
Processus sty-
loideus.

Sinus latera-
lis.

Processus sty-
loideus.

Radii pro-
pria.
Capitulum
superius.

ALTERA brachii pars ^bCUBITVS dicitur, & duobus constat ossibus; quorum illud, quod ^cminus, superiori sede locatum est; hoc, majus puta, inferiore: vel, si mavis cum aliis loqui, illud exteriorem; hoc internam partem tenere dicas. Ratione enim situs brachii, appellatio apud Authores variat, ut modo superius dicitur illud, si cubitus pectori applicetur, totumque brachium in media figura jaceat: modo exterius, si totum à trunco recta dependeat. ^dPrimum os, ^eκέρκις, Radius dicitur: alterum, ^fπῶκος Græcis, Latinis Cubitus, utrisque, abusu quodam nominis, totius appellationem parti tribuentibus. Hunc ergo evitare conantes nonnulli, Vlnam nominarunt: toti autem parti propriam appellationem retinuerunt, Cubitum vocantes. Cæterum hæc duo ossa ita inter se summo Naturæ ingenio constructa sunt, ut Cubitus quidem flexionis, & extensionis munus obeat; & flexionis quidem, in acutissimum angulum, at extensionis ad rectam tantum lineam, quam nunquam excedit: Radius vero, manus potissimum gratia conditus sit, quam pronam supinamque reddit.

Habent hæc ossa quædam communia inter se, quædam contraria, nonnulla propria. Communia quidem, primo substantiam, quæ utrique durissima est ac solida, si appendices tantum excipias: utrique etiam fistulæ in modum excavata, ut medullam excipiant, & pondus inutile evitent. Deinde figuram non dissimilem valde inter se habent: Vtrumque enim os longum est, variis exasperatum lineis, musculorum gratia; capitibus etiam utrinque donatum, ex quibus in utrovis unum majus latiusque est; alterum, minus tenuiusque. In eo tantum ^gadmodum contraria sunt, quod Cubitus superiore parte grandiusculum caput obtinuit, motus sui gratia, inferius vero tenue: Radius vero è diverso, cum ad flexionem, & ad extensionem parum conferat, cujus gratia potissimum articulus ille humeri inferior, cui superiore parte committitur, conditus est, tenue habet caput ac rotundum; inferius autem latum, ut carpi ossa recipiat, quibuscum totam postea manum pronam supinamque præstat. Voco supernam partem eam, quæ summum locum occupat, cubito cum brachio toto dependente à trunco; infimam, quæ contra, inferiorem.

Sed enim ^hV L N A elatiore sede, qua majus caput exigit, ⁱà posteriore parte gibba est & convexa: ^jà priore, sinum obtinet maximum, cartilagine incrustatum, & semicircularem. Illam partem, Gibberum Barbari appellant; Hippocrates ἀγκυλῶνα; Galenus, modo ἀγκυλῶνον, modo cum Hippocrate ἀγκυλῶνα: hanc vero, à figura C Græcorum, semicirculari etiam, ^kστυλοειδῆ, ^lfigmiformem. Sinus autem hic, superius, inferiusque processum exigit, quorum ^mille, sinui posteriori humeri, (de quo diximus præcedenti capite) ⁿhic, anteriori inseritur. Ille, posterior; hic, anterior cubiti processus dicitur: ille, magnus est, & obtuso; hic, minor, & acuto prominet angulo. Committitur autem hic sinus cum trochlea inferioris humeri capitis, cui omnibus modis exacte respondet, & cujus etiam gratia in medio toto ductu inter duos processus obtuso angulo protuberat. Habet autem & alium præter hunc, ab externo latere figmiformi ^osinum, qui quartam fere circuli partem conficit, & capitulum minus atque superius radii excipit, cartilagine similiter investitus. Post hæc cubitus ad manum descendit, sensim gracilior factus, donec in ^pcapitulum illud minus, de quo diximus, finiat, quod sinum habet rotundum, à cuius latere posteriore ^qprocessus quidam parvus enascitur, quem à figura ^rστυλοειδῆ, ^sstyliformem dixerunt.

At ^tR A D I V S elatiore parte ^ucervicem habet, cui parvum ^vcapitulum affixum est ^wsinu rotundo præditum, cartilagine tecto; in quem recipitur caput exterius inferioris humeri

humeri appendicis. Ad latus quoque ^a paululum prominet, & similiter cartilagine in-
crustatum est, qua parte sinui illi laterali cubiti, quartam circuli partem conficienti, im-
plantatur, cujus ope manus prona redditur, & supina. Sub hoc capitulo, interna par-
te, ^b *Tuberculum oblongum* eminet, sinu aspero donatum, in quod inseritur validissime
primus cubitum flectentium musculus, Biceps vocatus. Hinc deorsum ad manum Ra-
dius progreditur oblique, sensim ab Vlna discedens, ita ut in medio magno satis dehi-
scent intervallo, & spatium relinquatur illic positus musculus. Ad manum autem ubi
fere pervenit, ^c *Capitulum latum* efficit, quod sinum habet geminum, carpi ossicula reci-
pientem. Interna sede sinum lateralem obtinet, qui inferius cubiti tuberculum suscipit.

Tuberculum.

Capitulum
inferius.
Sinus latera-
lis.
Connexio Vlnae, cum Radio.

Cæterum quoad nexum Cubiti cum Radio, monendum hoc diligenter videtur, duo
hæc ossa inter se articulo differente omnino committi, cum radius à superiore parte
excipiat à Cubito: at contra inferiore, Cubitus à Radio. Cujus quidem articulatio-
nis ratio hujusmodi est, quod Radius ad carpum latior sit, ad humerum vero Cubitus.
Quare cum ea parte, qua latiora sunt hæc ossa, felicius aliorum articulationes admit-
tant, factum est, ut pro crassitie aut tenuitate, excipiant, vel excipiantur. Sinus enim
in majore osse commodius semper insculpitur, cum continens contento debeat esse
majus. Hoc etiam sub finem addendum est, connecti duo hæc ossa invicem *Ligamento*
longo, quod internos musculos ab externis separat, & à duabus lineis acutis, quæ se
mutuo respiciunt, exoritur, cum altera in externo Cubiti latere sit, altera in Radii in-
terna parte.

Ligamentum
longum.

CAPUT XXVII.

De Ossibus extremae Manu, & Sesamocideis appellatis.



TERTIA brachii pars, ^a *Manus reliqua* est, ἀρτερος Græcis dicta, quæ to-
tum id, quod à cubito radioque dependet, complectitur. Constat simi-
liter tribus partibus, *νάγκη*, sive *Brachialis*; *μετὰ νάγκη*, sive *Postbrachialis*, &
δακτύλοι, *Digiti*. ^c *Carpus*, suprema pars est; ^d media, metacarpium; ^e in-
fima, digiti.

Manus exte-
ma.
Facies.

CARPVS ergo superne radio connectitur, inferne metacarpio, ex
octo constitutus ossiculis, quorum substantia mollis, & intus plena foraminibus est, etsi
foris solida esse videatur, quod in prima generatione non ossa sint, sed cartilagines,
postea vero sensim indurescant. *Figuram*, hæc universa invicem juncta, convexam ex-
terius, intus concavam obtinent: at singula per se considerata, diversas & indicibiles,
nullique alii rei, quam sibi proprias referunt, cum magna ex parte nexum adjacentium
ossium horum figura sequatur. *Connectuntur* inter se ope cartilaginum ac validorum vin-
culorum, ea articulationis specie, quam Neutram à Galeno vocari supra diximus, quod
ratione ipsius compositionis Diarthrosin æmulentur, cum laxa sit connexio; at ratione
obscuri motus, Synarthrosin. Componitur ergo ex octo ossiculis, sed duplici serie invi-
cem distinctis, quarum utraque quatuor in se continet: ita ut superior ordo tria ex-
terna simul sic juncta habeat, merito ut omnibus unum esse videantur, & quartum om-
nium minimum, minimo digito subtensum: inferior autem series quatuor aliis post-
brachialis ossibus necitur.

Carpus.

Figura.

Connexio.

^b **M**ETACARPVS autem, quæ altera manus pars est, ⁱ quatuor conficitur ossibus,
non quinque, ut voluere nonnulli, qui primum pollicis os in hujus album referre sunt
conati; sed male, ut recte notavit Galenus, cum diversa & alia sit articulatio huic, quam
metacarpi ossibus, tum manifestus motus. *Articulatio* quidem, quia per Diarthrosin
carpo committitur, reliquis per Neutram connexis: at *motus*, cum in illo manifestus
sit, ante, retro, dextrorsum, sinistrorsum: in his vero, aut nullus, aut certe ita obscurus,
ut nulli pateat. Ossium horum *Substantia* dura est ac solida, intus fistulæ in modum ca-
va, quemadmodum & ipsa ossa figuram teretem obtinent, quæ tamen latior ab ^k ex-
terna parte est, præsertim superiore sede, ubi planam superficiem habent: ^l interna
vero, gibba, duobus quasi planis utrinque ab extremitatibus externæ partis elevatis,
& in unam lineam acutam coeuntibus. Atque hæc causa est, cur inter bina ^m intervallum
semper cernatur, pro musculis digitorum interossei, de quibus postea dicemus, recon-
dendis,

Metacarpus.

Substantia.
Figura.

Magnitudo. dendis, cum sese exacte tangere non possint. *Magnitudinem* quod spectat, si cum digitorum ossibus conferas, multo majora sunt: si inter se componas, inæqualia cernes, & longitudine, & crassitie. Longissimum enim, crassissimumque est primum, quod indicis præfigitur: minus longum crassumque secundum est, quod medio subtenditur: tertium adhuc brevius, quod auricularem sustinet digitum: omnium vero brevissimum, tenuissimumque est minimi; adeo ut, proportionem servata, semper ipsa decrefcere videantur. ^a Supra ^b infraque habent *appendicem*: illa, carpi ossibus; hæc, digitis junguntur: illa, sinum habet; hæc, capitulum rotundum, & oblongum, cartilagine tectum, sed à lateribus compressum.

Digiti. *DIGITI* tandem, quindecim constant ossibus, cum quinque sint, & singuli terna habeant, pulchra serie sibi juncta, quam Græci *φάλαγγα*, sive *aciem*, appellant, utpote quæ ab ipsis invicem nexis aliquo pacto videatur exprimi. Cæterum ipsa ossa peculiaria nomina non acceperunt, sed Pollicis, verbi gratia, aut Indicis, primum, secundum, vel tertium dicimus: *Primum* quidem vocantes illud, quod metacarpio proximum est: huic vicinum, *Secundum*: at *Tertium*, quod ab isto dependet. Duram habent omnia *Substantiam*: *Formam* autem, intus cavam, foris convexam: inferius latam, supra angustam: dextrorsum vero, & sinistrorsum rectis lineis exasperatam, quibus quasi terminis primum & secundum os clauditur à lateribus. Acutum est tertium, quod ex lata basi in rotundum definit capitulum. *Magnitudo* inæqualis est; minimum enim est tertium, hoc majus secundum, primum omnium maximum; id quod Naturæ legibus admodum conveniens est, cum partes sustententes sustentendis semper majores esse debeant. Habent *Appendices* supra infraque: at tertium superiore tantum parte, cum inferna alteri ossi nulli nectatur. *Superiores Appendices* obtinent sinus: *inferiores*, capita: & *Primi* quidem *ossis* superior, unico tantum constat, pro capitulo ossis metacarpii sibi correspondentis recipiendo: inferior vero duplex capitulum, oblongum, utrinque anteriore sede extuberans. *Secundi* vero superior, sinum duplicem, oblongo distinctum tuberculo, pro dicto capite: inferior autem similiter duo capitula. *Tertium* tandem, supra duplicem sinum; at inferius capitulum habet asperum, foris parum, intus plurimum eminens, & quasi lunatum, ut tendinem recipiat musculorum digitos flectentium. *Eodem prorsus modo se habet & Pollex*, nisi quod primi ossis superior appendix sinum obtineat non ita cavum, sed potius antierius posteriusque extuberantem: inferior vero unico capitulo constat, unde & ipsi sinus, in appendice superiore secundi ossis respondens, necessario simplex est.

Officula sesamoidea. Ad hæc ossa merito referri debent etiam illa minima, quæ in manu occurrunt, sesamo semini comparata, & propterea ^a *σεσαμοειδή, sesamoidea* à Veteribus Anatomicis appellata. *Sita* sunt hæc in interna manu, in digitorum internodiis, & *substantia* sunt in ortu cartilaginosa, postea ossæ, sed pumicis ritu foraminulenta, efficta ad similitudinem patellæ, quæ fœmoris tibique articulo præfigitur, cujus usum quoque in omnibus referre videntur. Horum *numerus* etsi incertus sit, quod modo plura, modo pauciora reperiantur, pro subjeetorum diversitate, omnibus tamen fere doctioribus duodecim tantummodo recensentur; quorum duo secundo pollicis ossi, qua primo jungitur interna parte, bina deinde singulis primis quatuor reliquorum digitorum internodiis, ubi cum metacarpio nectuntur, & denique secundo ac tertio indicis internodio utrobique unum præfigitur, idque mediantibus tendinibus muscoli tertium digitorum articulum flectentis. *Ufus* est, prohibere quo minus in validis digitorum extensionibus ossa luxentur, & ex sua sede profiliant.

CAP V T XXVIII.

De offe Fæmoris, & Patella.



T brachium trifariam dividebatur, ita quoque Crus commodissime in tres partes dispecitur; in Fæmur puta, Tibiam, & Pedem extremum.

^a F O E M V R, Græcis *μυρὸς*, os est, ut humerus, unicum, omnium quæ in corpore nostro sunt maximum, non solum longitudine, sed crassitie quoque, robore, ac soliditate reliqua superans. *Substantiam* enim habet si quod aliud durissimam, intus tamen fistulæ in modum excava-

tam, non tantum ne pondere nimio homini incommodaret; sed etiam, ut medullam in se reciperet, quæ ad nutritionem ossium, ut ostendimus, propter illam naturalem, quam habent, siccitatem cum duritie junctam, maxime est necessaria. *Figuram* naçtum est oblongam, non tamen rectam; sed antèrius ^b gibbam, ^c posterius concavam, utrimque circa extremitates, maxime vero inferna parte impense latam: cæterà in harum medio exacte teres, nisi à postica sede ipsam inæqualem redderet ^d aspera linea, satisque protuberans, quæ à summa ipsius ad infimam usque partem ducitur. *Connectitur* superius ossi coxendicis, inferius autem tibiz.

Habet *duas Appendices*, quarum *Superior*, versus interiorem partem, ^e cervicem exigit fatis insignem, oblique sursum protensam, cui ^f caput impositum est, omnium quæ in corpore sunt maximum, exacte semiglobosum, læve, æquale, ac densa cartilagine incrustatum, quod in medio fere ^g foramen habet, cui fortissimum ligamentum rotundum, ex sinu ossis coxendicis pronatum, inseritur. Sed præter caput, & cervicem, *duos* quoque *Processus* educit, quorum *alter* ^h *externus*, ex lata basi sensim angustatus, insignis admodum, imo omnium processuum, qui alteri ossi non committuntur, in corpore maximus est: *alter*, ⁱ *internus*, multis ab illo parafangis, si magnitudinem spectes, superatus, obtusum referens tuberculum. *Processus* hi duo, cum aliis nostri corporis commune habent officium, ut musculorum insertiones excipiant, indeque appellationem propriam sunt naçi, ut apud Græcos *περὶ ἀσπίδος, καὶ τῆς ἰσχυρίας*, à Latinis *Rotatores* dicantur, quod scilicet eos musculos excipiant, qui fæmoris motui auxilium præstant. Circa primum & majorem, sinus, impressiones, ac linea diligenter observanda sunt, cum in libro quarto horum frequens futura sit mentio, quando de fæmoris musculorum insertionem loquemur. ^k *Sinus* in interna parte est eximius, in quem secundi & tertii fæmur circumagentis musculi tendines implantantur. *Impressiones quatuor sunt*, ad gibbam ejus sedem & externam. ^l *Prima*, in procliviore & humiliore sede est, ampla, ut extendentium fæmoris primi: ^m *secunda*, in anteriore sede, quæ aliquatenus aspera est & sinuosa, ut ejusdem secundi: ⁿ *tertia*, in inferiore sede, ac inter duas impressiones media, gibba nonnihil, ut tertii: ^o *quarta*, in elatiore, & apice ipso processus, ut quarti tendinem suscipiat. ^p *Linea* denique *aspera*, à prima impressione deorsum ducitur, nonnihil oblique per fæmoris posteriora incedens, ubi primus musculorum fæmoris inseritur.

Inferior fæmoris appendix, duo insignia capit: in posteriorem potius, quam anteriorem partem vergentia constituit, quorum ^q *alterum*, quod *internum* est, & corpus respicit, crassius existit: ^r *alterum externum*, latius, cæterum magis depressum. Inter hæc ante retroque *Sinus* est: ^s *ante* quidem, lævis admodum & cartilagine tectus, qui patellæ tuberculum excipit: ^t *retro*, grandis, & qui pollicis latitudinem exæquat; partim, ut sedem præbeat firmam valido illi ligamento ex fæmore enato, quod tuberculo inter duos sinus in tibiz elatiore sede exsculptos, enato inseritur; partim, ut viam tutam præsteret vasibus per crus excurrentibus, nempe nervo omnium maximo, venæ, & arteriæ. Vtrumque caput ad latera sinus obtinet, qui sedem præbent tendinibus musculorum tibiz illic transeuntibus.

^u *Foramina* quoque sunt circa appendices levia, quæ inserviunt validiori ligamentorum rotundorum articulos ambientium insertioni. Illud tamen oblivioni tradendum non est, in posteriore parte inferiorum capitum, duo ossa sesamo semini similia reperiri, quæ Natura solers ad primi pedem moventis musculi duo principia affixit, ne

scilicet musculus ab illis capitibus in motu validiori attereretur, damnumque caperet.

Cæterum cum Patellæ modo mentio injecta sit, occasione situs ejus in anteriore inferioris appendicis femoris parte, ipsaque ad articulationem femoris cum tibia faciat, eodem capite de ipsius quoque historia disseremus. Est ergo ^a PATELLA, sive ^a *μύλη*, ^a, ¹. 10. ^{fig.} 9 & 10. ^b Mola, & Barbaris *Rotula*, os subrotundum, latum, vix duos transversos digitos exæquans, ^b foris planum, & foraminulis refertum, ^c intus gibbum quodammodo, & cartilagine tectum, quod ^d femoris & tibiæ ossi anteriori præponitur, ne ultra modum extendantur, neve à tibia femur procidat, sicque in locis declivioribus, & ubi pedis extensio firmior requirebatur, ambulatorio impediretur, aut prorsus pessumiret, quemadmodum solet accidere iis, quibus hujusmodi os fractum aut luxatum est, cum plana quidem loca tuto adire, at decliviora sine metu casus, nequeant. *Substantia* hujus, in primo ortu mollis est, & cartilaginea, talisque per plures menses remanet, postea sensim in durius os ætate protractis abit. Plenum tamen foraminulis est, quemadmodum reliqua omnia, quæ ex cartilaginibus in ossa transeunt. *Connectitur*, non secus ac sesamoidæ ossa digitis, ita his duobus ossibus, beneficio tendinum crassiorum, secundi, tertii, & quarti tibiam extendentium musculorum, qui per genu ad tibiam descendunt, & tuberculo ipsius anteriori implantantur.

CAPUT XXIX.

De Tibia utroque offe.



TIBIA ^a altera pars cruris est, inter genu & pedem sita, duobus constans ^a, ¹. 1. ⁴. ossibus, quorum illud quod crassius est, nomen totius retinet, & Tibia, Græcis *κνήμη* vocatur: alterum, quod tenuius, Fibula, *πρόμη*, Illud, internam; hoc, externam partem occupat: utrumque substantiam habet duram solidamque, intus fistulæ in modum excavatam.

^f **TIBIA** autem, ut ab hac initium dicendi faciamus, duabus donata ^f, ¹. 10. ^{fig.} 4, 5 & 6. ². ³. ⁴. ⁵. ⁶. ⁷. ⁸. ⁹. ¹⁰. ¹¹. ¹². ¹³. ¹⁴. ¹⁵. ¹⁶. ¹⁷. ¹⁸. ¹⁹. ²⁰. ²¹. ²². ²³. ²⁴. ²⁵. ²⁶. ²⁷. ²⁸. ²⁹. ³⁰. ³¹. ³². ³³. ³⁴. ³⁵. ³⁶. ³⁷. ³⁸. ³⁹. ⁴⁰. ⁴¹. ⁴². ⁴³. ⁴⁴. ⁴⁵. ⁴⁶. ⁴⁷. ⁴⁸. ⁴⁹. ⁵⁰. ⁵¹. ⁵². ⁵³. ⁵⁴. ⁵⁵. ⁵⁶. ⁵⁷. ⁵⁸. ⁵⁹. ⁶⁰. ⁶¹. ⁶². ⁶³. ⁶⁴. ⁶⁵. ⁶⁶. ⁶⁷. ⁶⁸. ⁶⁹. ⁷⁰. ⁷¹. ⁷². ⁷³. ⁷⁴. ⁷⁵. ⁷⁶. ⁷⁷. ⁷⁸. ⁷⁹. ⁸⁰. ⁸¹. ⁸². ⁸³. ⁸⁴. ⁸⁵. ⁸⁶. ⁸⁷. ⁸⁸. ⁸⁹. ⁹⁰. ⁹¹. ⁹². ⁹³. ⁹⁴. ⁹⁵. ⁹⁶. ⁹⁷. ⁹⁸. ⁹⁹. ¹⁰⁰. ¹⁰¹. ¹⁰². ¹⁰³. ¹⁰⁴. ¹⁰⁵. ¹⁰⁶. ¹⁰⁷. ¹⁰⁸. ¹⁰⁹. ¹¹⁰. ¹¹¹. ¹¹². ¹¹³. ¹¹⁴. ¹¹⁵. ¹¹⁶. ¹¹⁷. ¹¹⁸. ¹¹⁹. ¹²⁰. ¹²¹. ¹²². ¹²³. ¹²⁴. ¹²⁵. ¹²⁶. ¹²⁷. ¹²⁸. ¹²⁹. ¹³⁰. ¹³¹. ¹³². ¹³³. ¹³⁴. ¹³⁵. ¹³⁶. ¹³⁷. ¹³⁸. ¹³⁹. ¹⁴⁰. ¹⁴¹. ¹⁴². ¹⁴³. ¹⁴⁴. ¹⁴⁵. ¹⁴⁶. ¹⁴⁷. ¹⁴⁸. ¹⁴⁹. ¹⁵⁰. ¹⁵¹. ¹⁵². ¹⁵³. ¹⁵⁴. ¹⁵⁵. ¹⁵⁶. ¹⁵⁷. ¹⁵⁸. ¹⁵⁹. ¹⁶⁰. ¹⁶¹. ¹⁶². ¹⁶³. ¹⁶⁴. ¹⁶⁵. ¹⁶⁶. ¹⁶⁷. ¹⁶⁸. ¹⁶⁹. ¹⁷⁰. ¹⁷¹. ¹⁷². ¹⁷³. ¹⁷⁴. ¹⁷⁵. ¹⁷⁶. ¹⁷⁷. ¹⁷⁸. ¹⁷⁹. ¹⁸⁰. ¹⁸¹. ¹⁸². ¹⁸³. ¹⁸⁴. ¹⁸⁵. ¹⁸⁶. ¹⁸⁷. ¹⁸⁸. ¹⁸⁹. ¹⁹⁰. ¹⁹¹. ¹⁹². ¹⁹³. ¹⁹⁴. ¹⁹⁵. ¹⁹⁶. ¹⁹⁷. ¹⁹⁸. ¹⁹⁹. ²⁰⁰. ²⁰¹. ²⁰². ²⁰³. ²⁰⁴. ²⁰⁵. ²⁰⁶. ²⁰⁷. ²⁰⁸. ²⁰⁹. ²¹⁰. ²¹¹. ²¹². ²¹³. ²¹⁴. ²¹⁵. ²¹⁶. ²¹⁷. ²¹⁸. ²¹⁹. ²²⁰. ²²¹. ²²². ²²³. ²²⁴. ²²⁵. ²²⁶. ²²⁷. ²²⁸. ²²⁹. ²³⁰. ²³¹. ²³². ²³³. ²³⁴. ²³⁵. ²³⁶. ²³⁷. ²³⁸. ²³⁹. ²⁴⁰. ²⁴¹. ²⁴². ²⁴³. ²⁴⁴. ²⁴⁵. ²⁴⁶. ²⁴⁷. ²⁴⁸. ²⁴⁹. ²⁵⁰. ²⁵¹. ²⁵². ²⁵³. ²⁵⁴. ²⁵⁵. ²⁵⁶. ²⁵⁷. ²⁵⁸. ²⁵⁹. ²⁶⁰. ²⁶¹. ²⁶². ²⁶³. ²⁶⁴. ²⁶⁵. ²⁶⁶. ²⁶⁷. ²⁶⁸. ²⁶⁹. ²⁷⁰. ²⁷¹. ²⁷². ²⁷³. ²⁷⁴. ²⁷⁵. ²⁷⁶. ²⁷⁷. ²⁷⁸. ²⁷⁹. ²⁸⁰. ²⁸¹. ²⁸². ²⁸³. ²⁸⁴. ²⁸⁵. ²⁸⁶. ²⁸⁷. ²⁸⁸. ²⁸⁹. ²⁹⁰. ²⁹¹. ²⁹². ²⁹³. ²⁹⁴. ²⁹⁵. ²⁹⁶. ²⁹⁷. ²⁹⁸. ²⁹⁹. ³⁰⁰. ³⁰¹. ³⁰². ³⁰³. ³⁰⁴. ³⁰⁵. ³⁰⁶. ³⁰⁷. ³⁰⁸. ³⁰⁹. ³¹⁰. ³¹¹. ³¹². ³¹³. ³¹⁴. ³¹⁵. ³¹⁶. ³¹⁷. ³¹⁸. ³¹⁹. ³²⁰. ³²¹. ³²². ³²³. ³²⁴. ³²⁵. ³²⁶. ³²⁷. ³²⁸. ³²⁹. ³³⁰. ³³¹. ³³². ³³³. ³³⁴. ³³⁵. ³³⁶. ³³⁷. ³³⁸. ³³⁹. ³⁴⁰. ³⁴¹. ³⁴². ³⁴³. ³⁴⁴. ³⁴⁵. ³⁴⁶. ³⁴⁷. ³⁴⁸. ³⁴⁹. ³⁵⁰. ³⁵¹. ³⁵². ³⁵³. ³⁵⁴. ³⁵⁵. ³⁵⁶. ³⁵⁷. ³⁵⁸. ³⁵⁹. ³⁶⁰. ³⁶¹. ³⁶². ³⁶³. ³⁶⁴. ³⁶⁵. ³⁶⁶. ³⁶⁷. ³⁶⁸. ³⁶⁹. ³⁷⁰. ³⁷¹. ³⁷². ³⁷³. ³⁷⁴. ³⁷⁵. ³⁷⁶. ³⁷⁷. ³⁷⁸. ³⁷⁹. ³⁸⁰. ³⁸¹. ³⁸². ³⁸³. ³⁸⁴. ³⁸⁵. ³⁸⁶. ³⁸⁷. ³⁸⁸. ³⁸⁹. ³⁹⁰. ³⁹¹. ³⁹². ³⁹³. ³⁹⁴. ³⁹⁵. ³⁹⁶. ³⁹⁷. ³⁹⁸. ³⁹⁹. ⁴⁰⁰. ⁴⁰¹. ⁴⁰². ⁴⁰³. ⁴⁰⁴. ⁴⁰⁵. ⁴⁰⁶. ⁴⁰⁷. ⁴⁰⁸. ⁴⁰⁹. ⁴¹⁰. ⁴¹¹. ⁴¹². ⁴¹³. ⁴¹⁴. ⁴¹⁵. ⁴¹⁶. ⁴¹⁷. ⁴¹⁸. ⁴¹⁹. ⁴²⁰. ⁴²¹. ⁴²². ⁴²³. ⁴²⁴. ⁴²⁵. ⁴²⁶. ⁴²⁷. ⁴²⁸. ⁴²⁹. ⁴³⁰. ⁴³¹. ⁴³². ⁴³³. ⁴³⁴. ⁴³⁵. ⁴³⁶. ⁴³⁷. ⁴³⁸. ⁴³⁹. ⁴⁴⁰. ⁴⁴¹. ⁴⁴². ⁴⁴³. ⁴⁴⁴. ⁴⁴⁵. ⁴⁴⁶. ⁴⁴⁷. ⁴⁴⁸. ⁴⁴⁹. ⁴⁵⁰. ⁴⁵¹. ⁴⁵². ⁴⁵³. ⁴⁵⁴. ⁴⁵⁵. ⁴⁵⁶. ⁴⁵⁷. ⁴⁵⁸. ⁴⁵⁹. ⁴⁶⁰. ⁴⁶¹. ⁴⁶². ⁴⁶³. ⁴⁶⁴. ⁴⁶⁵. ⁴⁶⁶. ⁴⁶⁷. ⁴⁶⁸. ⁴⁶⁹. ⁴⁷⁰. ⁴⁷¹. ⁴⁷². ⁴⁷³. ⁴⁷⁴. ⁴⁷⁵. ⁴⁷⁶. ⁴⁷⁷. ⁴⁷⁸. ⁴⁷⁹. ⁴⁸⁰. ⁴⁸¹. ⁴⁸². ⁴⁸³. ⁴⁸⁴. ⁴⁸⁵. ⁴⁸⁶. ⁴⁸⁷. ⁴⁸⁸. ⁴⁸⁹. ⁴⁹⁰. ⁴⁹¹. ⁴⁹². ⁴⁹³. ⁴⁹⁴. ⁴⁹⁵. ⁴⁹⁶. ⁴⁹⁷. ⁴⁹⁸. ⁴⁹⁹. ⁵⁰⁰. ⁵⁰¹. ⁵⁰². ⁵⁰³. ⁵⁰⁴. ⁵⁰⁵. ⁵⁰⁶. ⁵⁰⁷. ⁵⁰⁸. ⁵⁰⁹. ⁵¹⁰. ⁵¹¹. ⁵¹². ⁵¹³. ⁵¹⁴. ⁵¹⁵. ⁵¹⁶. ⁵¹⁷. ⁵¹⁸. ⁵¹⁹. ⁵²⁰. ⁵²¹. ⁵²². ⁵²³. ⁵²⁴. ⁵²⁵. ⁵²⁶. ⁵²⁷. ⁵²⁸. ⁵²⁹. ⁵³⁰. ⁵³¹. ⁵³². ⁵³³. ⁵³⁴. ⁵³⁵. ⁵³⁶. ⁵³⁷. ⁵³⁸. ⁵³⁹. ⁵⁴⁰. ⁵⁴¹. ⁵⁴². ⁵⁴³. ⁵⁴⁴. ⁵⁴⁵. ⁵⁴⁶. ⁵⁴⁷. ⁵⁴⁸. ⁵⁴⁹. ⁵⁵⁰. ⁵⁵¹. ⁵⁵². ⁵⁵³. ⁵⁵⁴. ⁵⁵⁵. ⁵⁵⁶. ⁵⁵⁷. ⁵⁵⁸. ⁵⁵⁹. ⁵⁶⁰. ⁵⁶¹. ⁵⁶². ⁵⁶³. ⁵⁶⁴. ⁵⁶⁵. ⁵⁶⁶. ⁵⁶⁷. ⁵⁶⁸. ⁵⁶⁹. ⁵⁷⁰. ⁵⁷¹. ⁵⁷². ⁵⁷³. ⁵⁷⁴. ⁵⁷⁵. ⁵⁷⁶. ⁵⁷⁷. ⁵⁷⁸. ⁵⁷⁹. ⁵⁸⁰. ⁵⁸¹. ⁵⁸². ⁵⁸³. ⁵⁸⁴. ⁵⁸⁵. ⁵⁸⁶. ⁵⁸⁷. ⁵⁸⁸. ⁵⁸⁹. ⁵⁹⁰. ⁵⁹¹. ⁵⁹². ⁵⁹³. ⁵⁹⁴. ⁵⁹⁵. ⁵⁹⁶. ⁵⁹⁷. ⁵⁹⁸. ⁵⁹⁹. ⁶⁰⁰. ⁶⁰¹. ⁶⁰². ⁶⁰³. ⁶⁰⁴. ⁶⁰⁵. ⁶⁰⁶. ⁶⁰⁷. ⁶⁰⁸. ⁶⁰⁹. ⁶¹⁰. ⁶¹¹. ⁶¹². ⁶¹³. ⁶¹⁴. ⁶¹⁵. ⁶¹⁶. ⁶¹⁷. ⁶¹⁸. ⁶¹⁹. ⁶²⁰. ⁶²¹. ⁶²². ⁶²³. ⁶²⁴. ⁶²⁵. ⁶²⁶. ⁶²⁷. ⁶²⁸. ⁶²⁹. ⁶³⁰. ⁶³¹. ⁶³². ⁶³³. ⁶³⁴. ⁶³⁵. ⁶³⁶. ⁶³⁷. ⁶³⁸. ⁶³⁹. ⁶⁴⁰. ⁶⁴¹. ⁶⁴². ⁶⁴³. ⁶⁴⁴. ⁶⁴⁵. ⁶⁴⁶. ⁶⁴⁷. ⁶⁴⁸. ⁶⁴⁹. ⁶⁵⁰. ⁶⁵¹. ⁶⁵². ⁶⁵³. ⁶⁵⁴. ⁶⁵⁵. ⁶⁵⁶. ⁶⁵⁷. ⁶⁵⁸. ⁶⁵⁹. ⁶⁶⁰. ⁶⁶¹. ⁶⁶². ⁶⁶³. ⁶⁶⁴. ⁶⁶⁵. ⁶⁶⁶. ⁶⁶⁷. ⁶⁶⁸. ⁶⁶⁹. ⁶⁷⁰. ⁶⁷¹. ⁶⁷². ⁶⁷³. ⁶⁷⁴. ⁶⁷⁵. ⁶⁷⁶. ⁶⁷⁷. ⁶⁷⁸. ⁶⁷⁹. ⁶⁸⁰. ⁶⁸¹. ⁶⁸². ⁶⁸³. ⁶⁸⁴. ⁶⁸⁵. ⁶⁸⁶. ⁶⁸⁷. ⁶⁸⁸. ⁶⁸⁹. ⁶⁹⁰. ⁶⁹¹. ⁶⁹². ⁶⁹³. ⁶⁹⁴. ⁶⁹⁵. ⁶⁹⁶. ⁶⁹⁷. ⁶⁹⁸. ⁶⁹⁹. ⁷⁰⁰. ⁷⁰¹. ⁷⁰². ⁷⁰³. ⁷⁰⁴. ⁷⁰⁵. ⁷⁰⁶. ⁷⁰⁷. ⁷⁰⁸. ⁷⁰⁹. ⁷¹⁰. ⁷¹¹. ⁷¹². ⁷¹³. ⁷¹⁴. ⁷¹⁵. ⁷¹⁶. ⁷¹⁷. ⁷¹⁸. ⁷¹⁹. ⁷²⁰. ⁷²¹. ⁷²². ⁷²³. ⁷²⁴. ⁷²⁵. ⁷²⁶. ⁷²⁷. ⁷²⁸. ⁷²⁹. ⁷³⁰. ⁷³¹. ⁷³². ⁷³³. ⁷³⁴. ⁷³⁵. ⁷³⁶. ⁷³⁷. ⁷³⁸. ⁷³⁹. ⁷⁴⁰. ⁷⁴¹. ⁷⁴². ⁷⁴³. ⁷⁴⁴. ⁷⁴⁵. ⁷⁴⁶. ⁷⁴⁷. ⁷⁴⁸. ⁷⁴⁹. ⁷⁵⁰. ⁷⁵¹. ⁷⁵². ⁷⁵³. ⁷⁵⁴. ⁷⁵⁵. ⁷⁵⁶. ⁷⁵⁷. ⁷⁵⁸. ⁷⁵⁹. ⁷⁶⁰. ⁷⁶¹. ⁷⁶². ⁷⁶³. ⁷⁶⁴. ⁷⁶⁵. ⁷⁶⁶. ⁷⁶⁷. ⁷⁶⁸. ⁷⁶⁹. ⁷⁷⁰. ⁷⁷¹. ⁷⁷². ⁷⁷³. ⁷⁷⁴. ⁷⁷⁵. ⁷⁷⁶. ⁷⁷⁷. ⁷⁷⁸. ⁷⁷⁹. ⁷⁸⁰. ⁷⁸¹. ⁷⁸². ⁷⁸³. ⁷⁸⁴. ⁷⁸⁵. ⁷⁸⁶. ⁷⁸⁷. ⁷⁸⁸. ⁷⁸⁹. ⁷⁹⁰. ⁷⁹¹. ⁷⁹². ⁷⁹³. ⁷⁹⁴. ⁷⁹⁵. ⁷⁹⁶. ⁷⁹⁷. ⁷⁹⁸. ⁷⁹⁹. ⁸⁰⁰. ⁸⁰¹. ⁸⁰². ⁸⁰³. ⁸⁰⁴. ⁸⁰⁵. ⁸⁰⁶. ⁸⁰⁷. ⁸⁰⁸. ⁸⁰⁹. ⁸¹⁰. ⁸¹¹. ⁸¹². ⁸¹³. ⁸¹⁴. ⁸¹⁵. ⁸¹⁶. ⁸¹⁷. ⁸¹⁸. ⁸¹⁹. ⁸²⁰. ⁸²¹. ⁸²². ⁸²³. ⁸²⁴. ⁸²⁵. ⁸²⁶. ⁸²⁷. ⁸²⁸. ⁸²⁹. ⁸³⁰. ⁸³¹. ⁸³². ⁸³³. ⁸³⁴. ⁸³⁵. ⁸³⁶. ⁸³⁷. ⁸³⁸. ⁸³⁹. ⁸⁴⁰. ⁸⁴¹. ⁸⁴². ⁸⁴³. ⁸⁴⁴. ⁸⁴⁵. ⁸⁴⁶. ⁸⁴⁷. ⁸⁴⁸. ⁸⁴⁹. ⁸⁵⁰. ⁸⁵¹. ⁸⁵². ⁸⁵³. ⁸⁵⁴. ⁸⁵⁵. ⁸⁵⁶. ⁸⁵⁷. ⁸⁵⁸. ⁸⁵⁹. ⁸⁶⁰. ⁸⁶¹. ⁸⁶². ⁸⁶³. ⁸⁶⁴. ⁸⁶⁵. ⁸⁶⁶. ⁸⁶⁷. ⁸⁶⁸. ⁸⁶⁹. ⁸⁷⁰. ⁸⁷¹. ⁸⁷². ⁸⁷³. ⁸⁷⁴. ⁸⁷⁵. ⁸⁷⁶. ⁸⁷⁷. ⁸⁷⁸. ⁸⁷⁹. ⁸⁸⁰. ⁸⁸¹. ⁸⁸². ⁸⁸³. ⁸⁸⁴. ⁸⁸⁵. ⁸⁸⁶. ⁸⁸⁷. ⁸⁸⁸. ⁸⁸⁹. ⁸⁹⁰. ⁸⁹¹. ⁸⁹². ⁸⁹³. ⁸⁹⁴. ⁸⁹⁵. ⁸⁹⁶. ⁸⁹⁷. ⁸⁹⁸. ⁸⁹⁹. ⁹⁰⁰. ⁹⁰¹. ⁹⁰². ⁹⁰³. ⁹⁰⁴. ⁹⁰⁵. ⁹⁰⁶. ⁹⁰⁷. ⁹⁰⁸. ⁹⁰⁹. ⁹¹⁰. ⁹¹¹. ⁹¹². ⁹¹³. ⁹¹⁴. ⁹¹⁵. ⁹¹⁶. ⁹¹⁷. ⁹¹⁸. ⁹¹⁹. ⁹²⁰. ⁹²¹. ⁹²². ⁹²³. ⁹²⁴. ⁹²⁵. ⁹²⁶. ⁹²⁷. ⁹²⁸. ⁹²⁹. ⁹³⁰. ⁹³¹. ⁹³². ⁹³³. ⁹³⁴. ⁹³⁵. ⁹³⁶. ⁹³⁷. ⁹³⁸. ⁹³⁹. ⁹⁴⁰. ⁹⁴¹. ⁹⁴². ⁹⁴³. ⁹⁴⁴. ⁹⁴⁵. ⁹⁴⁶. ⁹⁴⁷. ⁹⁴⁸. ⁹⁴⁹. ⁹⁵⁰. ⁹⁵¹. ⁹⁵². ⁹⁵³. ⁹⁵⁴. ⁹⁵⁵. ⁹⁵⁶. ⁹⁵⁷. ⁹⁵⁸. ⁹⁵⁹. ⁹⁶⁰. ⁹⁶¹. ⁹⁶². ⁹⁶³. ⁹⁶⁴. ⁹⁶⁵. ⁹⁶⁶. ⁹⁶⁷. ⁹⁶⁸. ⁹⁶⁹. ⁹⁷⁰. ⁹⁷¹. ⁹⁷². ⁹⁷³. ⁹⁷⁴. ⁹⁷⁵. ⁹⁷⁶. ⁹⁷⁷. ⁹⁷⁸. ⁹⁷⁹. ⁹⁸⁰. ⁹⁸¹. ⁹⁸². ⁹⁸³. ⁹⁸⁴. ⁹⁸⁵. ⁹⁸⁶. ⁹⁸⁷. ⁹⁸⁸. ⁹⁸⁹. ⁹⁹⁰. ⁹⁹¹. ⁹⁹². ⁹⁹³. ⁹⁹⁴. ⁹⁹⁵. ⁹⁹⁶. ⁹⁹⁷. ⁹⁹⁸. ⁹⁹⁹. ¹⁰⁰⁰.

lineam, media fere sede, ^a foramen insigne est exsculptum, quod in partem internam ossis penetrat, & venulam deducit pro ossis nutritione. ^b Altera appendix, inferiorem tibiæ partem constituit, multo priore minor, qua ipsa cum talo per ginglymum articulatur. ^c Sinus habet *geminum*, cartilagine tectum, linea media à posteriore parte in priorem excurrente distinctum, ubi postea in leve tuberculum terminatur. Horum qui ab interna parte consistit, major est & profundior, ob ^d processum quem ibi locorum tibia exigit. Processus enim crassus est, intus cavus, foris gibbus & excarnis, *Malleolus internus* ab Anatomicis vocatus. Externa autem parte in hac appendice, alius sinus oblongus occurrit, qui fibulæ caput inferius suscipit, asper, & nulla cartilagine munitus.

^e FIBULA autem, tibiæ adstans ab externo latere, multo minor est ipsa crassitie, etsi longitudine æqualis, cum infra tibiæ excedat, quantum superna parte ad genu superatur. Solida quoque est, & duplici appendice firmata; quarum ^f superior in latere interno, sinus habet cartilagine tectum, à quo excipitur capitulum laterale, quod sub tibiæ superiori appendice subsistit. ^g Inferior vero in acutum angulum definit, & in sinus inferitur externum & oblongum inferioris tibiæ appendicis, nulla, quemadmodum & sinus, tectum cartilagine, ibique *Malleolum externum* constituit, qui cum interno talum in sua sede continet, imo magis, quam ille, cum fibula descendat altius, & producat: ex quo fit, ut exterior interiore semper humilior appareat. ^h Reliqua fibulæ pars, quæ inter hæc duo capita interjacet, inæqualis est, & triangulum exprimit, tribus lateribus inter se junctis, in quibus aptissime locantur pedem ac digitos moventes muscoli. Confiuntur latera hæc ex totidem ⁱ lineis: una, anteriore; duabus vero, posterioribus. Anterior, acuta est, quemadmodum & posteriorum interior: exterior autem, rotunda. Ab anteriore & interiore, primum latus constituitur: ab anteriore & posteriore, secundum: at tertium, à duobus posterioribus. Cæterum cum hæc duo ossa, ^j inter se in medio dehiscant, ut musculi pedis illic commodius reponantur, ligamentum membraneum Natura condidit, quod utrumque os medio spatio complectitur. Iungit autem externam tibiæ lineam cum interna fibulæ.

CAPUT XXX.

De ossibus Pedis extremi.



QUEMADMODUM Manus extrema tribus constabat partibus, carpo, metacarpo, & digitis; ita ^m Pes quoque extremus totidem conficitur, illis plane respondentibus, ⁿ Tarso inquam ^o Metatarso, ^p & Digitis. Præter has tamen & ^q alia quædam est, cui nulla manus particula accommodari potest, quam tria ossa componunt, puta Talus, Calcaneus, & Os naviculare à forma appellatum. Vtunque autem non desint nonnulli, qui & hæc ad tarsum recte referri statuunt, quia tamen insigne quoddam discrimen inter ipsa & carpi ossa, quibus exacte tarsi à nobis vocata ossicula respondent, advertitur; doctrinæ facilius gratia distinctionem hanc ossium pedis, quam illam sequi cum probatissimis Authoribus maluimus, quartam hanc pedis ossium partem *Innominatam* vocantes. Incipiamus ergo ab istis tribus primum, postquam nonnulla ab initio, ipsis communia, enumeraverimus.

OSSEA hæc ergo omnia, tum tria scilicet dicta, tum quatuor quæ tarsum constituent, in primo ortu mollia sunt, & cartilaginea potius, quam ossæ dicenda: progressu autem temporis in solidiorem abeunt substantiam, quæ tamen ut omnium aliorum, quæcunque in recens natis cartilaginea esse solent, pumici similis est, & plena cavernulis. Quamquam nec omnia æqualiter mollia sint in ipsis etiam infantibus, sed alia aliis duriora, imprimis calcis os, quod ut omnium durissimum postea est, ita etiam in tenella ætate, medio modo inter ossa & cartilagine se habet. *Figuram* nacta sunt inter se omnia differentissimam: *magnitudinem* etiam inæqualem, cum omnium maximum sit calcaneus, hinc talus, inde os naviculare, tum cybocides, sive cubiforme; posthæc cuneiformia, quorum primum majus, alterum minus, tertium medium, à quantitate cognominatur.

TALUS

Appendix inferior.

Sinus duplex.

Malleolus internus.

Fibula.

Appendix superior.

Appendix inferior.

Malleolus externus.

Lineæ triæ.

Communia ossibus tarsi.

Talus.
Figura.

Sex latera.
1.

2. 3.

4.

5.

6.

Calcaneus.

Naviculare
Cavitas
Convexa pars

Navis.

Quatuor os
1. tarsus
2. prima.

^a TALUS ergo, Græcis *ἄστρον*, καὶ ἀστρογάλον, quæ vox à Românis civitate donata est, cum & vulgo *Astragalus* vocetur. Os est variæ formæ, quo cum tibia fibulaque committuntur, sicque pes flectitur extenditurque, nonnihil etiam ad latera movetur. Hôc ergo non solum Homo donatus est, sed cætera quoque omnia animalia, quæcumque pedibus in digitos scissis incedunt. Vt autem ejus historia facili methodo tradatur, cum sex constet lateribus, ordine singula examinanda erunt. Et sane ^bsuperius, quadratam fere figuram exprimit, nisi quod ^cposterior linea ^dpriore paulo brevior sit, cæterum cartilagine molli ac lubrica incrustatum. Non tamen plana superficie constat, sed rotunda ac gibba, in cujus medio, lateribus nonnihil prominentibus, ^elevem quendam sinum habet, in quem linea, inferiorem tibiæ sinum bifariam secans, inferitur, ut tibia sic cum talo per ginglymum articuletur. Vocatur Græcis à forma *ἀστρογάλου*, à Latinis nonnullis *Quadratum*. Latera autem hæc, quorum illud ^finternum est, hoc ^gexternum, ^hsuperne lævi cartilagine, qua malleolos suscipiunt, obducta sunt: ⁱinferne sinus habent asperos, in quos ligamenta inferuntur, quæ duo ossa tibiæ talo colligant. Verumtamen illud, ex quo spatio incrustatum est; hoc, longiore; quod fibula externum constituens malleolum, altius descendat, quam processus tibiæ, internum efficiens. ^kAnterior pars, in ^lcervicem oblongam excurrit, ^mcui exquisitè rotundum capitulum priore loco adnascitur, quod postea in sinum navicularis ossis inferitur, atque hujus beneficio in latera pes circumducitur. Inter hoc, & superius laterus, occurrit ⁿsinus rotundus, mediocriter cavus, in quod dum pes ad acutissimum angulum flectitur, tuberculum illud, quod in medio lineæ anterioris sinus tibiæ eminet, ingreditur. ^oPosteriorius laterus, quod omnium minimum est, totumque asperum, ^psuperne transversum sinum per totum latus exigit, quod recipit ligamentum tibiæ: ^qinferne sinum habet descendente parvum, per quem transeunt tendines musculorum pedem moventium. ^rInfima pars, cujus beneficio cum calce necitur, quia parte posteriore hoc recipere, parte anteriore ab ipso recipi debeat, ^sillic sinu, ^thic capite, utroque cartilagine obducto, donatur. Caput rotundum est, oblongum, sed triplo minus sinu; sinus à posterioribus ad externa excurrit oblique, coracoidem scapulæ processum non male exprimens. ^uInter hunc autem & illud, ubi talus calcem non attingit, sinus longus & satis profundus occurrit, modice latus, cui è regione calcis sinus respondet. In hoc coacervatur mucosa quædam substantia, quæ ligamenta cartilaginea, hoc loco talum calci jungentia, irrigat & humectat, ne in longis crebrique motibus nimium exsiccentur.

CALCIS OS, & ^vCALCANEVS, Græcis *ἄλγεια*, alterum os est, quod talo substernitur. Hujus ^wsuperius latus, partim talum excipit, ut anteriore parte, ubi ^xsinum habet & ^ycaput, quibus ipsi committitur: partim à talo liberum est, quemadmodum sede ^zposteriore, ubi sinum habet asperum, qui ligamentum accipit à tibia talum constringens. Latus utrumque sinuatum: ^ainternum quidem, admodum evidenter, quod tendo ibi transeat primi oblique pedem moventium, & duorum tertium & secundum internodium flectentium, quemadmodum & venæ, arteriæ, ac nervi; at ^bexternum, versus anteriora parvum sinum obtinet, eumque cartilagine tectum, pro tendine secundi oblique pedem moventium, & secundum eundem flectentium musculorum. ^cInfima pars, latiuscula est: ^dposterior, modice gibba ^eleves sinulos habens, in quos tendo primi & secundi pedem extendentium infiguntur. ^fAnteriorius leviter prominet capite amplo, quo cubiformis sinui fere plano coarticulatur.

^gNAVICULARE tertium est, *σκαφονδίσκος*, à naviculæ forma appellatum, cum oblongum sit, & ^hintus cavitate insigni exsculptum, ⁱforis convexitate prominens. ^jCavitas hæc lævi cartilagine obtegitur, in quam ingreditur caput Astragali; at ^kconvexa pars similiter incrustata, ^ltres obtinet superficies, adeo leves, ut ambiguum sit, excipiant, an excipiantur. His committuntur tria tarsi ossa: inter quæ maximum, internum latus occupat; minimum, externum. ^mSitus ergo est in parte interna pedis, cujus beneficio præcipua tarsi pars talo committitur.

Hæc tria ossa quatuor Tarsi sequuntur, quæ unum ordinem faciunt: sed ⁿprimum calci, ^oreliqua tria naviculari committuntur. Efficiunt autem omnia, juncta inter se, formicem: cum parte superiore, convexa sint; inferiore, concava. Tria etiam illa naviculari

culari commissa, fornicis in modum à terra eleuantur, solo cubiformi ipsam attingente, adeo ut insignis relinquatur cavitas in pede, in qua recondantur tum tendines, tum musculi, ne in ambulatione conterantur lædanturque, si plana inferior plantæ superficies foret. Hæc quia superiore sede lata sunt, inferna angusta, adeoque non inepte cuneum expriment, Falopius *χαλκωειδής*, hoc est, Cuneiformia appellavit, quæ nomina etiam nos retinebimus; distinctionis autem gratia, cum aliis Anatomicis magnitudinis suæ rationem addemus. *Connectuntur* hæc ossa inter se cartilagineis ligamentis: qua tamen parte se mutuo respiciunt, ab omni cartilagine nuda sunt ac libera: anterius vero, qua metatarsi ossibus; & posterius, ubi naviculari nectuntur, lævi cartilagine incrustantur.

Connectio.

Ex HIS ergo primum est *κυβοειδές*, ^a CVBIFORME, sic dictum à senis lateribus, ^b Cubiforme, quibus cubo respondet. Hoc ^c anteriori calcis lateri præponitur, cum quo posteriore suo latere nectitur; anterius, metatarsi ossi quarto & quinto jungitur, ubi superficiem geminatam habet; interno, quarto tarsi. Reliqua tria latera, externum, superius, & inferius nulli junguntur, sed soluta sunt.

^a CVNEIFORME MAIUS, five Tarsi secundum, maximum ex cuneiformibus, ^b Cuneiforme majus, internum pedis latus occupat, anterius latum & longum, quo primum os pedii, quod maximo digito, five pollicis, substernitur, suscipit. Hoc an sinuatum sit, an prominens, ambiguum valde est: videtur tamen prominere, cum primum pedii os, quod huic conjungitur, sinum levem quidem, at evidentem satis habeat. ^d Posterius sinum habet, quo navicularis processum internum suscipit: ^e superiore latere, convexum; ^f interiore, cavum; utroque tamen admodum aspero.

^a CVNEIFORME MINUS, five Tarsi tertium, quod medium locum obtinet, ^b *superiorem partem* quadratam habet, leviter arcuatam; ^c *infernam* acutam, unde omnium aptissime cuneum exprimit: ^d *anteriori*, *posterioremque*, triangularem, cartilagine incrustatam, quarum illa metatarsi secundum os suscipit, hac jungitur naviculari; at ^e *latera* quadrata, sed oblonga, ex quibus *internum*, sinum ingreditur lateris externi primi cuneiformis; *externum*, cum tertii interiore jungitur.

^a CVNEIFORME MEDIUM, seu Tarsi quartum, simile minori, nisi quod majus est; ^b *superne* sede similiter quadrilateram figuram, altera parte longiorem refert: ^c *inferne* acuminatum, sed obtusius modo, in cuius medio tuberculum exiguum, cui primus pedem oblique moventium, five Tibiæ posticus inferitur: ^d *anterior*, tertium metatarsi os admittit; *posterior*, levi sinu naviformis externum tuberculum suscipit: *lateribus*, tarsi os tertium, & primum, attingit.

Tarsum excipit ^a METATARSVS, altera pedis pars, quam Græci *μετώριον*, Celsus *Metatarsus*, *Plantam*, alii *Pecten* appellant. Componitur ex quinque ossibus, cum pollex, five magnus digitus suum quoque sibi ex his vendicet, secus ac in manu. Omnia vero *Substantiam* *Substantia* habent solidam, intus fistulæ ritu excavatam, longioraque sunt multo, quam ossa metacarpi in manu, cum ipse etiam pes manu longior sit. In *Magnitudine* *Magnitudo* eam observant proportionem, ut omnium crassissimum sit quod ^a pollicem sustinet; ex reliquis longissimum, quod ^b indici substernitur; hinc quod ^c medio; ^d reliqua quoque sensim breviora fiunt: crassitiem tamen pene æqualem retinent. Vtrinque desinunt in *capita*; ex quibus ^e *anterior* multo ^f *posterior* minus est, rotundum fere, compressum tamen admodum lateribus. Caput hoc versus superiora magis, quam inferiora diductum est, secus ac in manibus, cum pedum digitos in extensione paulo magis, atque manuum, elevari necessum fuerit. Caput tamen illius quod pollicis præpositum est, orbiculatius cæteris est, quod præ aliis digitis magis ad latera moveatur. *Posteriora* capita crassa sunt superius, infra acuta, à lateribus compressa, ut non inconcinne triangulum efficiant. Sinum levem quidem, at conspicuum tamen, cartilagine contextum habent. Anteriora ergo, in sinus digitorum profundos, & quidem primorum articulorum inferuntur: at posteriora, tarsi ossa excipiunt: & *Primum* quidem, quod pollicis substernitur, cuneiforme majus; *Secundum*, quod indici subest, cuneiforme minus; *Tertium*, quod sustinet medium, cuneiforme medium, five tertium: *duo reliqua*, cubiformis duo capitula: ex quo patet, per arthrodiam neutram cum tarso coarticulari. Verum os pollicis substratum, inferne processum exigit, ubi inferitur secundi pedem oblique

Connectio.

oblique moventium, five Peronei primi tendo. Illud etiam, quod è regione minimi situm, externo latere insignem processum habet, cum quo necitur tendo secundi pedem flectentis musculi. Caterum *media pars horum ossium*, quæ interjecta est capitibus, quo loco magis recedit à tarso, gracilior fit, supra lata, infra acuta est, lateribus in acutam lineam ex superna superficie coëuntibus; unde fit, ut spatium inter singula relinquatur, in quo musculi interossei reconduntur.

Digniti.

* DIGITORVM OSSA pedem finiunt. Sunt autem quatuordecim, quod pollex ^{a, 2. 10. 12.} ^{11. 12.} ^{C. C.} duobus tantum constet; reliqui vero, ternis. Ossa hæc substantia, situ ac structura, à manus digitorum ossibus parum differunt: sed magnitudine apprimè cedunt. Omni-

Substantia.
Internodia.

bis Substantia solida est, & cava: omnibus tria internodia, eaque duplici appendice munita, quarum anterior caput est geminum, & excipitur à sinu similiter duplici prioris internodii: posterior contra, excipit. Hoc discrepant solum, quod articuli primi profundiore habent sinum, cum in eos majora capita metatarsi inferantur.

Sesamoidea
ossicula.

Sesamoidea quoque ossa sunt eodem propemodum ordine, numero, ac situ, quo in manu: sola magnitudine differunt, cum pedis ossicula minora sint, prout etiam ipsi digiti.

CAPV T XXXI.

De Unguibus.

Vaguet.

An sint partes
inter osseas
partes.

UNGUES, Græcis *ὄνυχες* dictos, ad ossium historiam referendos censuimus, quod extrema ossium tegant. Hos nonnulli ex albo partium nostri corporis delendos censuere, quod in nullo simularium, quæ vulgo recensentur ordine, commode reponantur. Nec enim, inquit, *Cartilagine* sunt, quia præcisi renascuntur, neque in vivis solum, sed etiam in mortuis, ut tradit Aristoteles *111 Histor. animal. xi.* Nec ossa dici possunt, cum substantiam habeant oppido quam mollem. Multo ergo minus ad alias reducuntur, cum videantur his aliqua affinitate conjuncti, neque sint tamen: à cæteris autem, plurimis paraſangis distent. Verum hæc disceptationes Logicæ sunt, quibus optime satisfaciemus, si ungues sui generis partes statuerimus, quæ neque ad cartilaginem proprie, neque ad ossa commode reduci possint; *mediam tamen inter utramque substantiam* habeant. Sic infra ostendemus, cutim quoque, etsi simularis pars revera sit, ad nullam tamen speciem vulgo commemoratarum referri: sed sui generis esse propriam. Nec defunt tamen & alii, qui prorsus partes esse negent, quia scilicet non vere nutriantur, neque vitam habeant, & accrescant quidem, sed accretione imperfecta, quæ non fiat secundum omnes dimensiones, quemadmodum in ossibus, & carnibus, verum secundum solam longitudinem. Quam sententiam probant argumento, ut ipsis videtur satis firmo: negant enim venas, aut arterias ad ipsas accedere, quod necessarium foret ad nutritionem, & veram accretionem.

Augmentum
secundumLongitudi-
nem,Profundita-
tem,

Latitudinem.

Habet
venas,
arterias,
& nervos.

Sed concedamus ipsis augeri secundum longitudinem evidenter satis, quia, ut postea audiemus, erat id imprimis necessarium, quod nimio usu perpetuo atterantur, quemadmodum etiam dentes, quos similiter supra in longitudine magis atque aliis dimensionibus, eodem nomine augeri retulimus: probat tamen ipsa experientia, eos etiam secundum profunditatem & latitudinem accessiones facere, etsi non ita conspicue, nisi quis oculis etiam animi & mentis simul velit advertere. Et secundum profunditatem quidem: nam si quis vitro aut cultro abradat ita, ut ad summam tenuitatem unguis abeat, & non citra dolorem prehendere quidquam queant, paucis diebus debita crassitie recuperata, ipsum denuò munere suo fungi videas; etsi hujus ipsius limites, quos Natura semel præscripsit, nulla postea ratione egrediatur. Et quis est qui nesciat, senioribus multo, quam juvenibus crassiores esse, ut quibusdam propterea magno labore præscindantur? Secundum latitudinem autem, cum nemo ita sit ineptus, quin confiteri cogatur, juxta ætatem augeri ungues, & juvenibus esse latiores multo, quam puerulis, recensque natis. Illud autem quod *venas* negant & *arterias*, quæ tum nutritionem, tum vitam apporment, refutat satis historia & inspectio anatomica; imo vero Galenus ipse, qui *111 admin.* Anatom. vasa omnis generis in unguium radices porrigi testatur, adeoque non

non venas solum, sed & arterias, & nervos, à quibus & exquisitus ille sensus est unguium, etsi *sensus non proprius*, verum communicatus; non per se, sed per accidens fit, quia unguis substantiam ipsam nervi non ingrediuntur, pari modo ut neque ossa, nec dentes: sed sub unguibus ad digitorum summa repunt, quemadmodum & venæ, & arteriæ, quæ & ipsæ in substantiam non penetrant. *Substantia* ergo horum media est inter cartilaginem & os, quare & mediocriter dura & flexilis: tenuis etiam admodum, & mediocriter lata, ita ut extremum digitorum comode contegat. *Magnitudo* Quare magnitudo omnibus æqualis non est, sed proportionem digitorum sequitur. Pollici maximus est unguis, minimo digito minimus, cæteris mediocris, & quidem secundum omnem dimensionem: crassiores autem sunt pedum ungues, quam manuum. *Figura* sunt ante & retro semicirculari: sed ante latiores: exterius, gibbi; interius, qua parte carnes tangunt, concavi. *Numero* respondent digitis, & sunt viginti; ut manus decem, totidemque pedes habeant. *Connecuntur* autem, quo minus vacillent, ligamento quodam circa radicem: & quia antè tantum liberi sunt, ubi prominent; postèr, circa radicem & latera, cuti carniq; connasci debuerè, foris cutem circum, intus autem cutem subnatam habent, tendinèq; digitos flectentium musculorum subjacentes. Quæ res sane iis diligenter advertenda est, qui externorum morborum curationibus animum applicant, ne in affectibus unguium, si discedant, corrodentibus substratam tendineam carnem auferre conentur, cum & ea res sine immensis dolorum tormentis transigi nequeat, & deformitas renati unguis sequatur. Quin potius magna solertia studeant, quidquid adest illius carnis, eo aptare, ut speratam novi unguis generationem facili negotio assequantur. *Colorem* nullum habent proprium; sunt enim pellucidi: sed quemadmodum cutis, ita & ipsi à subiectis partibus colorem mutuuntur, qui talis in unguibus apparet, qualis in illis revera est. Hinc Europæis ungues albicant, pauca rubedine interfusa; contra Æthiopicis nigricant. Hominum enim, inquit Aristoteles *histor. animal. ix;* & *xi de Generat. vi,* nigrorum dentes, naturam ossium æmulantur: quamobrem Æthiopum dentes & ossa candicant, ungues nigricant suæ cutis in modum. Paulo autem ante dixerat, colores cornuum, unguium, & ungularum, cutis pilorumque colorem sequi. Contingit ergo ut unguium colores pro varietate temperamentorum diversi sint, & ex colore eorundem morbi etiam sæpè numero innotescant, ut icterus, ex flavis unguibus; febrim paroxyfmi, ex lividis.

Vsvs Unguium est, tegere extremas partes, tum manuum, tum pedum. Sed quia manus apprehensionis gratia factæ sunt, pedes autem ambulationis: in illis tegunt, ut res firmiter apprehendamus; in his, ut securius terræ insistamus. Qui enim non cessissent digiti, nisi robore muniti essent? aut qui pedes solo se firmarent, si apices digitorum cederent mollietati? ut adeo utrique solers Natura rectè prospexerit. Accedit, quod quæ minuta sunt, nec digitis arripi possint, ea unguium beneficio tractamus: & quæ dura pedibus propulsanda, ea facile abigimus. Sic nullum unquam beneficii genus in nos benignissima Parens effundit, quin protinus ex illo immensum bonorum lîas redundet, ubique bonitate inæstimabili divina quadam sapientia condita.

FINIS SECUNDI LIBRI.




ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS,
DE HUMANI CORPORIS FABRICA.
LIBER TERTIVS,

Qui de Cartilaginibus, & Ligamentis agit.

CAPVT I.

Cartilaginis naturam, usum, & differentias proponit.

Ratio ordinis.



I, quæ Natura provida, rerum omnium parens, tum substantiæ, tum usus ratione ita inter se conjunxit, ut eadem propemodum, aut certe parum differentia esse videantur, Ars Naturæ imitatrix, & methodus separare à se invicem non debent, jure profecto meritoque videmur facere, si postquam ossium historiam universam tradidimus, nunc eodem pacto Cartilaginum tractationem prosequamur. Nihil enim in toto corpore ossibus sic simile est, ac cartilagine ipsæ, cum substantia ita conveniant, ut ex cartilaginibus facilis sit in ossa transmutatio; quemadmodum jam sæpe monuimus in superioribus, apophyses omnes, & ossa pleraque in pueris cartilagine esse,

postea vero in ossiam naturam progressu temporis degenerare. Vñs autem & ipsentque adeo convenit, ut idem prorsus esse videatur, cum sustentandi molliores partes gratia, non secus ac ossa ipsa efficta & composita esse pareant. De his ergo ut agamus, insistentes nostræ methodo, ea primum quæ generatim de his dici possunt, in medium afferemus: deinde, quid in singularum historia observandum sit, breviter quoque trademus.

*Cartilaginei
definitio.*

Est pars,

Similis;

*Dura, & sicca,
Flexibilis.*

Usus.

CARTILAGO ergo, ut à definitione initium capiamus, *pars est nostri corporis, simplex, dura, ac sicca, sed flexibilis, ad stabilimentum securum partium molliorum, & ad eludendos duriorum rerum extrinsecus accidentium impetus.* Dico esse *partem*, quia definitio partis ipsi convenit, quæ est, esse corpus toti cohærens, & communi vita fruens, in aliquem usum aut actionem comparatum. Adjungo autem esse *simplicem*, quia cum partes nostri corporis, vel similes sint, vel organicæ, cartilago similis est, quia tota sibi similis est, nec reperire licet particulam cartilaginis, quæ non naturam & nomen totius mereatur. Est autem *dura & sicca*, quibus verbis à cæteris omnibus similibus partibus separatur: sed quia cum osse convenit in hoc ipso, additur vox *flexibilis*, quæ ab osse distinguit. Cartilagine enim omnes hoc in se habent, ut quamquam duræ sint & siccæ, semper tamen flexibiles maneant. Tandem *usus* subiungitur, qui est *stabilimentum partium molliorum securum.* *Stabilimentum* quidem, quia fundamentum largitur non secus ac ossa, fundamenti autem ratio in eo sita est, ut & robur conferat, & rectitudinem, & formam. Hanc stabilitatem præstat non quibuscvis partibus, sed mollioribus. quia enim molles necessario erant faciendæ ob suam actionem, sed molles se tueri sustinereque non poterant, ideo solers Natura partem duram molli addidit, ut hujus quidem beneficio actioni præessent, illius autem opera consisterent. Verum etsi ossa quoque idem officium mollioribus partibus præstent, *cartilago* tamen *securius* id facit; qua voce similiter, ab osse distinguitur. Hanc securitatem explicuimus ultimis verbis, dum dicimus, cartilagine *ad eludendos impetus rerum externarum duriorum facere.* Ossa enim, cum nimis dura sint, à duro forinsecus accedente facile franguntur: at cartilagine, cum moderatam obtineant duritiem, & flexibiles sint, cedunt facile; sicque impetum omnem declinant. Quamobrem videmus partes illas, quæ expositæ admodum sunt injuriis externis, cujusmodi sunt nasus, & aures, cartilagineas esse factas, cum infinitis modis frangerentur, si ex duro aliquo osse constarent, nisi crassitie, quæ tamen indecora foret

foret & admodum molesta, munirentur. *Stabilitas* ergo ipsis, à duritie: at *securitas*, à flexibilitate est. Cæterum hic usus egregie in larynge, sive capite asperæ arteriæ, conspicitur, quæ cum ex cartilaginibus tota efficta sit, musculi plures ipsi & implantantur, & ab ipsa enascuntur. Sunt tamen & alii multi, quos cartilago præstat, usus; sed secundarii. *Primum* enim, ossium laxa articulatione junctorum extrema tegunt: *Deinde*, propugnaculorum vicem obeunt ad tuendas partes subjacentes: quod quidem munus, et si ossibus quoque competat, in hoc tamen discrimen est, quod cartilagine ibi sunt, ubi propugnaculum flexibile requirebatur. Sic sterni & costarum cartilagine factæ sunt. *Tertio*, ossa inter se ligant, quemadmodum ossa pubis inter se cartilagine juncta sunt, & ligamenta multorum ossium cartilaginea existunt, qualia sunt imprimis ligamenta vertebrarum corpora connectentia, & illa teretia, quæ in articulo fœmoris cum coxendice, & altero cum tibiâ inveniuntur.

Sed enim maxima cartilaginum inter se differentia est, quas omnes ut in unum colligamus, ea nunc ordine, quæ singulis partibus quandam compositionem subeuntibus advenire solent, inspicimus. Ac primo quidem *Temperamentum* ipsam, quod tamen si omnibus cartilaginibus frigidum sit & siccum, alias tamen aliis ficiiores, adeoque etiam duriores existere cernimus, nec id tantum ipsarum cartilaginum inter se, sed etiam ætatis, sexus, & morborum ratione contingere. Et *ipsarum* quidem inter se, quia aliæ sint admodum duræ, & quæ tandem in ossa degenerant, ut sunt quatuor illæ quæ laryngem efformant: aliæ molles, ut quæ articulos connectunt mutuo, & ligamentorum monia subeunt, *χρησμονδεσμοι* propterea dictæ: aliæ tandem mediam in duritie & mollitie naturam præ se ferunt, & quæ nunquam ossescunt, cujusmodi sunt, epiglottis, & palpebrarum cartilagine. Ratione *ætatis* differunt; pueris enim cartilagine omnes molliores sunt, senibus contra sic indurantur sensim, ut nonnullæ fragiles, ac friabiles, ossium instar, fiant. *Famine* etiam mollioribus præditæ sunt, ut quæ maribus humidiores esse consuevere: id tamen è diverso peculiare habeat præ maribus, quod cartilagine illæ costarum, quæ mammis substant, his augescentibus in ossa abeunt, ut pondus sustinent facilius, cum flexibilis alias cartilaginum substantia, cum periculo partium in thorace contentarum compressa subderet. Tandem *morbi* ipsi calidi, ut febres ardentes, duriores & ficiiores ipsas reddunt. Ratione *figuræ* quoque magnum est discrimen, à cujus multiplici varietate diversa etiam nomina sunt sortitæ. Sic illa quæ pectoris ossi subnectitur *ξίφοειδής*, ensiformis dicitur: sic laryngis cartilagine diversa nomina obtinuerunt, cum alia *θυροειδής*, scutiformis; alia *καλαμειδής*, annularis; alia *ἀγυλαειδής*, guttalis vocatur. Sunt & femicirculares quædam, ut palpebrarum cartilagine, & quæ in bronchiis pulmotorum conspiciuntur, *στυμοειδής* dictæ à Græcorum C, quod exprimunt. *Magnitudo* quoque diversa est, cum aliæ sint magnæ, aliæ parvæ, quædam inter utraq; mediocres. Magnæ sunt laryngis, parvæ bronchiorum, mediæ palpebrarum. Ex magnis quædam longæ sunt, ut costarum; quædam latæ, ut auriculæ: & contra ex parvis, aliæ breves, aliæ angustæ. Ratione *superficiæ*, pleræque omnes, quæ ossium extremitates incrustant, levitate politæ sunt: nonnullæ inæqualem asperitatem obtinent, ob musculorum ibi vel exortum, aut insertiones, quemadmodum laryngis cartilagine. *Quo ad numerum*, tot sunt, quot requirebantur. Natura enim, neque deficit unquam in necessariis, nec abundat in superfluis: plures tamen sunt infantibus, pauciores adolescentibus, paucissimæ omnium senibus, quia in his sensim, ut sæpe dictum est, in ossa facessunt. In *situ* præcipua occurrit discrepantia: verum cum situs nomine duo includantur, sedes scilicet cartilaginis ratione corporis totius, & connexio cum vicinis partibus: *sedem* quidem unaquæque obtinuit, quam requirebat, & cujus beneficio, quam commodissime usum suum præstaret; sicque aliæ sunt supernæ, infernæ, anticæ, posticæ, internæ, externæ, dextræ, aut sinistræ: at *connexio* paulo aliter se habet. Sunt enim quædam cartilagine, quæ nulli parti junguntur, sed solitariae sunt; quædam aliis conterminis committuntur, & vel cartilaginibus, vel ossibus. Solitariae sunt, palpebrarum cartilago, & auricularum, quia aliis non affociantur. At cartilaginibus junguntur, ut scutiformis laryngis, & guttalis cum annulari. Ossibus vero quam plurimæ necuntur, ut omnes illæ quæ capitibus, vel finibus affiguntur. Connexio autem hæc, fit vel alligando invicem ossa ligamenti instar, ut illa quæ pubis ossa inter se jungit: vel adna-

Differentiæ
cartilaginumA tempera-
mento.

Ab ætate.

A sexu.

A figurâ.

A magnitu-
dine.

A superficiæ.

A numero.

A situ.

A sede.

A connexione.

Eiusque modi.

scendo, ut narium cartilagine ossibus narium, & cartilago ensiformis sterno: vel articulando, ut cartilagine costarum cum osse pectoris per arthrodiam. Vtunque enim in cartilaginibus tam exactam articulationis speciem observare non liceat, qualis in ossibus occurrit, tum quia pauciores sunt atque ossa; tum quia alios potius usus, quam articulationis præstare debeant; in iis tamen quæ ossium subeunt officium, expressa est utriusque compositionis vestigia cernere. Nam ut de prima specie verba faciam, quæ articulatio dicitur, Arthrodiam sat manifeste tum in costarum cum sterno, tum scutiformis cartilaginis cum annulari conjunctione cernimus. Nec obscura est altera species, quæ per symphyisin perficitur, cum cartilagine nasi cum ejusdem ossibus sine medio uniri quis videat: & alias plurimas cum medio jungi, inter quas maxime evidens est connexio illarum semicircularium, quæ in bronchiis asperæ arteriæ per *anastomosis* à nobis vocatam, nemine repugnante, junguntur.

Ordo.

Sed ut ad ipsam historiam nunc pedem moveamus, facilioris doctrinæ gratia methodum nostram observantes, singularum tractationem, pro trium Ventrium Artuumque divisione partiemur. At enim cum multæ, præsertim artuum cartilagine, vel ad ossium extremitates in crustandas, aut articulorum sinus augendo faciant, de his quidem commodior agendi locus in superiore libro fuisse videtur; in quo si quando dicendi occasio sic tulit, earum historiam inspersimus. Quæ sane, ut in præsentiarum haud tædio se repetatur, de iis tantum cartilaginibus dicturi sumus, quæ alii cuiquam, quam illi motui dicato usui inserviunt, & de quibus superiore libro dicendi ansa data non fuit.

CAPUT II.

De Cartilaginibus supremi ventris, sive Capitis.

Cartilagine
palpebrarum

Vul.

Trochlea
oculi.Cartilag.
Nasi.

IN Capite complures sunt cartilagine dignæ accurata consideratione: revocari tamen memoriæ gratia ad tria capita quam commodissime poterunt, si cartilagine palpebrarum, nasi, vel aurium dicamus esse.

PALPEBRARVM cartilagine duæ sunt, cum utrique una contingit, adeoque altera superior, altera inferior; ex quibus sane superior in homine major est, minor in avibus. Vocantur hæ à Græcis *μυρρι*, à Plinio & Latinis *Cilia*, quæ in extremitate palpebrarum, inter cutem ac membranam palpebras succingentem sitæ, corniculatam lunam haud male expriment. *U*sus harum cartilagineum est, moderate palpebram sua duritie expandere, expansamque tenere: quis sine foret, dum palpebræ ad oculos claudendos corrugantur, in se penitus subsidissent, æquabilemque illam, quam faciunt compressionem, haud unquam peregissent. Reperitur & alia quædam cartilago in oculi orbita, sede interiore superioreque, quam primus Fallopius, doctissimus Anatomicus invenit, & à figura atque usu *Trochleam* vocavit: de qua sequenti libro, ubi de oculorum musculis agemus, tractabitur, cum eo pertinere potius, quam huc ipsius historia videatur.

NASI cartilagine quinque sunt, ex quibus *prima* septum est cartilagineum, quod ab osseo septo exortum, nasum bifariam secat. *D*uæ sunt postea *laterales*, quæ ab inferiore & latiore duorum nasi ossium parte incipiunt, crassiores, ac duriores conjunctæ, hinc circa finem narium attenuantur, sic ut cartilagine esse desinant. *D*uæ alix *postrema*, in infima narium parte positæ, extrema prædictarum cartilagineum tegentes, & singulæ in unum foramen nasi in extremo finientes, idque expansum tenentes. Hæ sub septo cartilagineo sibi invicem junguntur, ac per membranas & cutim colliguntur, indeque foramina utraque nasi ambiunt, alas ejus constituentes. Duriores sunt sub septo cartilagineo, & quasi semilunares, curva parte ad nasi septum cartilagineum obversæ, circa alas molliores, & fere semicirculares. Aliquando hæ singulæ in duas veluti partes dirimi conspiciuntur: nam quæ alas constituit, ab ea quæ septo cartilagineo subjacet, dividitur, ac tunc nasus ex septem cartilaginibus constare videtur.

Cartil. Auris.

AVRICULA tandem, sive *externa auris*, parte superiore, quam Pinnam vocari diximus, cartilaginea est; at inferiore, quæ Lobus vocatur, carne constat. Est autem cartilaginea facta, ut & duritie sua sustinere se, & flexibilitate tueri contra externas injurias posset. Enascitur ex foramine meatus auditorii, quod in osse temporum est, hinc sese in orbicu-

in orbicularem cartilaginem continuam expandit, ac cum in principio sui exortus durior sit & crassior, sensum, quo longius ab origine procedit, mollior, tenuiorque evadit. Habet hæc cartilago varias circumvolutiones, & modo fimas, modo gibbas partes, quæ omnes proprias sortitæ sunt appellationes, quas ipsas supra libro primo, ubi de nominibus auriculæ egimus, jamdudum persequuti sumus.

CAPUT III.

De Cartilaginibus Medii, Infimique ventris.

IN Thorace Pulmones siti sunt, quorum aspera arteria pæne tota ex cartilaginibus confici videtur. Nos ut ordine omnes persequamur, arteriam in *Caput*, five *Laryngem*, & in *Fistulam*, cum peritioribus Anatomicis dividemus.

^a **LARYNX** ergo ex quatuor constat cartilaginibus, quibus quinta superposita est, *Παρυλαωσις* dicta. Vocatur ex illis ^b prima, *ὑποειδής*, *scutiformis*, ^c secunda *αεχροειδής*, *annularis*: ^d tertia, & quarta, *αεϋλοειδής*, *guttæles*. Vtemur autem vocibus græcis, tum quia usitatores sunt apud Autores, tum etiam quia in sequenti libro, ubi laryngis musculos enarrabimus, memoriæ gratia ex græcis appellationibus nomina musculis imponemus.

^e **Prima** ergo cartilago *Thyroides*, five *Scutiformis*, sic dicta à figura, quæ scuto antiquorum non est dissimilis, omnium quæ in larynge sunt, maxima est; anteriore parte sita, adeo ut in vivo etiam homine digitis contrectari possit; & in maribus nonnullis, iis scilicet, qui temperamentum nonnihil siccius nacti sunt, admodum evidenter conspicua sit, quam Pomum Adami tunc vocare solent, ficta fabula, protoplastæ nostro, ob divinæ vocis, post contempta monita, minas pavescenti, de pomo deglutito aliquid circa eam gulæ sedem restituisse. Hæc unica numero est, foris convexa, intus cava, quadrilaterum altera parte longius non inepte exprimens, nisi quod in sui medio, anteriore & superiore parte, (quæ similiter in vivo tangi potest nullo negotio) ^f *si fissuram* habeat, in extremitatibus autem sat eminentes processus. In singulis enim terminis *processus* obtinet, adeo ut supra infraque bini sint, quorum ^g *illis*, qui longiores sunt, ossis hyoidis inferioribus lateribus, interventu ligamenti oblongi jungitur: ^h *hisce*, qui breviores, cum secunda cartilagine, five cricoide articulatur. Articulationis autem ea species est, quæ *αεθροειδής* dicitur, cum capitulo depresso, in sinus cricoidis leviter cavos processus illi inferantur. Ex quo consequitur, Thyroidem cartilaginem evidenti motu esse præditam, cujus scilicet beneficio Larynx tum dilatatur, tum constringitur.

ⁱ Altera *Cricoides*, ut situ, ita etiam magnitudine secunda est; annuli nomen à figura sua adeptæ. *Innominata* etiam quibusdam dicta, quod ante Galeni tempora appellatione caruerit. Hæc merito omnium laryngis cartilaginum Basis dicenda est, cum infimo loco sita, reliquas omnes sustineat. Neque enim fistulæ cartilaginibus, utpote nimium infirmis, inniti; neque cum iisdem admodum tenuibus ullo pacto articulari poterant: quare cricoides facienda erat, quæ utrumque officium præstaret, & simul Laryngem perpetuo apertum servaret. ^k Anterior gibba est, semicircularis, ac tenuis: ^l posterior latior, plana, ac major, ubi in ^m medio linea quædam aspera eminet, quam Galenus *Spinam innominatæ cartilaginis* vocabat.

ⁿ Tertia, & quarta, *Arytenoides*, omnium minimæ sunt, superiori & posteriori cricoidis sedi, in cavitate thyroidis insistentes. Iunguntur enim cum crycoide per ginglymum, ut & flecti, & extendi, partim recta, partim ad latera possint, tum pro claudenda, tum pro aperienda rimula. Vocantur autem *αεϋλοειδής*, five *Guttæles*, quod gutturnii figuram repræsentent, si inspiciantur dum superiores utriusque processus communi adhuc membrana involvuntur. Est autem gemina: nam qui simplicem statuere, ab hac ipsa membrana decepti sunt, quæ utramque tegens, utriusque separatam substantiam dissimulavit. *Processibus* donantur similiter superioribus, & inferioribus. ^o Superiores molles, laxi, & extra recurvati, simul juncti gutturnii formam affabre referunt: ^p inferiores, rimulam, five Glottidem constituunt.

His omnibus in clatiore sede, sed intra Thyroidem superjacet alia, mollis admodum cartilago,

Arteria
aspera.Larynx.
Cartilagineus
Laryngis.Thyroides.
Situs.

Figura.

Fissura.

Processus.

Cricoides.

Situs.

Fissura.

Figura.

Spina.

3. 4.
Arytenoides.
Commixta.

Nervus.

Processus.

Epi-glottis.

Figura.

Vfus.

Fistula.

Figura.

Vfus.

Cartil. enfi-
formis.Cartil. infi-
mi ventris.

cartilago, quam ^a *Παγλωπίδα* vocant, ^b *ἐν ᾧ τὸ πλὺ γλωσσίδιον κείται*, quod supra glottida, five rimulam sit posita. Hæc enim glottidi incumbens, hederæ folium ex Hippocratis sententia refert, & rigida atque erecta existens, viam spiritui pulmones ingredienti largitur: sed flexibilis admodum, & assumptorum pondere pressa, rimulam exacte claudit, ne quidquam asperæ arteriæ illabatur.

^b *FISTULA* tandem asperæ arteriæ, quam *βρόγχον* vocant, ^c *ἀπὸ τῆ βρόχεως*, ab irrigando, quod Veteres potum in hanc descendere crederent, quemadmodum cibum in ventriculum, tota ex cartilaginibus pluribus, membranarum beneficio mutuo connexis, conflatur. ^c Cartilagines autem hæ annuli figuram referunt, & tenues sunt, ac moderate latæ, integrum tamen circulum non absolvunt: ^d sed ea parte, qua dorsum spectant, tanguntque œsophagum, quarta quasi parte deficiunt, sicque Græcorum *C* expriment, unde *σχηματίζεις*, signiformes dictæ. Vt autem integer circulus perficiatur, membrana subvenit, quæ reliquam partem succingit, etsi rotundum exacte circulum minime faciat. Ex his superiores majores sunt, & latiores; inferiores, minores atque angustiores, donec paulatim in minimas degenerent. Feruntur enim non tantum ad jugulum usque, quod quibusdam visum est: sed cum toto canali per universos pulmones dispersuntur. Id tamen verum est, ubi ad jugulum pervenire, ac jam pulmonum substantiam ingrediuntur, circulum eas perfectum complere, quod asperam arteriam, ad aëris tractionem expulsionemque semper patere necessum foret.

^e *Est & alia in THORACE cartilago, quam ^e *Σφραγὶς*, & *ensiformem* vocari diximus, quæque ossi pectoris subnectitur. De hac agendi cum melior occasio fuerit superiore libro, ubi sterni historiam persecuti sumus, hoc loco nihil, quod ipsam respiciat, addimus.*

^f *In INFIMO VENTRE cartilago nulla est, nisi una, eaque insignis, quæ in pueris præcipue conspicua, toti superiori ossis ilium circulo adnata, quam ^f *Spinam & Appendicem ossium innominatorum* appellant. Ab hac insignes, & plurimi muscoli originem suam ducunt, ut propterea ipsius mentio nobis sæpissime postmodum injicienda sit; sed tamen in adultioribus penitus in osseam naturam, quemadmodum & cæteræ appendices omnes, degenerare consuevit.*

CAPVT IV.

De Ligamentis agit, quorum naturam, usum, & differentias breviter persequitur.



^g *IDIMVS* Ossa & Cartilagines, quæ diximus in nostro corpore basis cuiusdam & propugnaculi vices obire, cum molliores partes sine sustentaculo sese tueri, & erectas conservare minime potuerint. Sed cum nec ipsæ inter se connecti valerent, nisi vinculis quibusdam stringerentur, maxime ea ossa, quæ articulatione insigni & laxa opus habebant, ligamenta solers Opifex condidit, quibus invicem sic conjunxit, ut & vacare suis muniis commode possent, ac secure & absque periculis luxationum persistere. De his ligamentis merito videmur hoc loco agere, postquam illorum historiam tradidimus, cum imperfecta esse videatur, nisi quo pacto invicem alligarentur, perfectum cognitumque foret.

Ratio ordinis.

Definitio ligamenti.
Est pars similis.

Media inter cartilagineam & membranaceam.

^h *Est autem LIGAMENTVM, pars similis nostri corporis, sensu carens, inter cartilagineam & membranam substantia ratione media, pro colligandis invicem ossium articulis. Dicitur esse pars similis, quia quamcumque ejus particulam inspicias, alteri consimilem videbis. Est autem media inter cartilagineam & membranam, quod illâ quidem mollior sit, hac autem durior. Non tamen (ut dicitur) æqualiter semper ab utroque extremo distat, sed interdum ad cartilaginis, quandoque ad membranæ naturam propius accedit, unde fit, ut duplicis generis ligamenta oriantur, Membranea scilicet & Cartilaginea. Nec vero hæc mediocritas in temperamento duntaxat & substantia consistit; sed & in iis, quæ temperamentum sequi consueverunt. Quod enim sic medium est, tantum à frigidityte & siccitate cartilaginis declinat, quantum ad membranæ naturam propius, & contra, accedit. Eadem ratione mollius quoque ac flexibilis erit, quanto minus frigidum,*

gidum, & potissimum minus siccum est. Sunt autem facta pro colligandis ossium articulis, quibus verbis usus ligamentorum primarius indicatur, à quo etiam nomen acceperè, ut Ligamenta Latinis, Græcis συνδεσμοί, seu Vincula dicantur. Alligant autem non tantum ea, quæ immobilia manent, ut pubis ossa: sed & illa, quæ ad motum connexa, quemadmodum sunt Articuli. Hoc tantum discrimen utriusque vincendi rationis est, quod illa arctius: at ista laxius paulo stringantur. Laxitas autem in eo consistit, ut moveri quidem sic vineta commodè possint, elabi autem nequeant, nisi magna aliqua vis & subita forinsecus accedat. Cæterum ut hoc munus fidelius exsequerentur, sensu omni carentibus ipsis erat, cum perpetuo dolori, & nunquam cessantibus cruciatibus obnoxius fuisset Homo, si alius ad ligamenta ossibus, sensus (certe molestus futurus) perciperetur. Præter hunc usum, alias etiam partes in sua sede continent, & quidem vel Viscera, quæ suspendunt, ut hepar & uterum: vel Ossa, ut ligamentum secundæ vertebræ: vel Musculos, & musculorum Tendines, ut ligamenta annularia in manibus, cruribusque. Nonnulla etiam, non secus ac cartilaginea, ossium acetabula adaugent, cuiusmodi ligamentum illud est, quod circa sinum scapulæ, quo humeri superiori capiti committitur, observatur, ut supra, cum ejus historiam persequeremur, complexi sumus.

Sunt autem complures differentie, quas omnes ut venemur, methodum consuetam observabimus, inspicientes ea, quæ partibus aliqua compositione præditis accedunt. Ac primo quidem ratione Temperamenti ipsius & Substantiæ, magna est & insignis differentia, notatu dignissima. Cum enim dixerimus ligamenta media esse inter cartilagineum & membranam, hinc fit, ut quædam sane in medio inter utramque consistant, alia vero ad extrema nonnihil declinent; & sic, quædam mollia valde sint, quædam dura admodum, nonnulla mediocria: alia membranis similia, alia cartilaginibus, alia mediæ inter hæc substantiæ. Quæ membranæ similia sunt, dicuntur Membrane: quæ cartilaginibus, Cartilagineæ, Græcis συνδεσμοί, vel περὶ σπονδύλων. Sunt membranæ similia, communia illa ligamenta, quæ articulos ambiunt: cartilaginibus vero, quæ intercedunt articulos; & vel Teretia, quæ ab unius ossis capite in sinum alterius feruntur; vel Lata, ut quæ colligant vertebrarum corpora. Sunt etiam omnia in tenera ætate molliora, quam in senili: & in sexu femineo, quam masculino, & in iis tandem qui humidius temperamentum sua natura sunt nati. Ratione figuræ, alia teretia sunt, ut cartilaginea, quæ intercedunt ossa, quemadmodum est illud quo caput femoris cum coxendicis acetabulo jungitur; alia sunt lata, ut quæ ambiunt articulos, illa scilicet quæ Communia vulgo dicuntur. Magnitudo quoque diversa est. nam quæ articulos majores devinciunt; necessario majora sunt; minora, quæ minores. Magnitudo autem hæc non in una dimensione respicienda est, sed tam in longitudine, quam latitudine, aut crassitie consideranda venit. Crassiora enim sunt, ubi vel robur magnum requiritur propter validos motus, quibus articulus subjicitur; vel ubi ob cavitatem superficiariam invalida est debilisque ossium connexio. Numerus etiam insignem, & diligenter advertendam differentiam parit. Non enim Natura unum tantum uni articulo tribuit, sed ubi luxationis periculum metuendum erat, complura confarcinavit. Ita femoris articulus cum coxendice, præter commune, quod latum est, at totum articulum ambit, etiam teres cartilagineum accepit; ejusdem vero femoris cum tibiæ superiore appendice, complura, & quidem sede posteriore, quod ea debilitate maxime laborare videbatur. Situs etiam ratione discrimina quædam advertuntur. Sic enim nonnulla ligamenta superiora, quædam inferna, dextra, sinistra, antica, aut postica sunt. Præcipua tamen differentia hæc est, quod quædam extra articulum sita, totum ipsum investiant, ut ea sunt, quæ dicuntur Lata: quædam vero in ipso articulo inter ossa, ut sunt Teretia illa duo, quæ utrumque femoris articulum alligant, partim superiorem cum coxendicis acetabulo, partim inferiorem, cum duobus sinibus tibiæ: illa etiam, quæ inter duo corpora vertebrarum sunt posita, & cartilagineam naturam æmulantur. Adnascuntur autem ossibus articulum constituentibus, capitum scilicet circumferentiis, & cavitatum superciliis, ubi plerumque foramina quædam occurrunt, & superficies admodum aspera est, ut tum exortus, tum insertio sit firmitior. Sed tempus jam videtur ut ipsam historiam aggrediamur.

Differentiæ
ligamentorum.
A temperamento.

Ab ætate.

Ab sexu.

A figurâ.

A magnitudine.

A numero.

A situ.

De Ligamentis, quæ in Capite, Thorace, ac Infimo ventre occurrunt.

Ligamenta
capitis.Ligamentum
quo caput pri-
mae colli ver-
tebrae alligan-
tur.

CAPITIS, sive supremi ventris ligamenta duplicis sunt generis: quædam enim totum respiciunt, quædam vero duntaxat partem. Totum caput respiciunt, quæ ad primam & secundam vertebrae pertinent, super quas capitis motus, tam recti, quam laterales perficiuntur: partem vero, quæ maxillam inferiorem, os hyoides, & linguam concernunt.

Caput ergo primum cum prima vertebra connectitur ligamento membraneo, quod totum articulum ambit. Validissimum autem hoc est, atque ita robustum, ut vertebra prima facilius frangi, quam luxari possit, cum luxatio talis necessario lethalis futura esset.

Ligamenta
capitis & se-
cundæ verte-
brae.

1.

2.

Cum secunda autem vertebra duobus connectitur ligamentis. Primum validum est, teres, ac cartilagineum, quod ex apice ipsius dentis secundæ vertebrae cervicis enatum, occipitis ossi à parte priorè, prope primum ipsius magnum foramen, per quod spinalis medulla elabatur, implantatur. Secundum, ab uno latere primæ cervicis vertebrae, ad alterum transversim procedit, & processum dentiformem secundæ vertebrae, à posteriore parte amplectitur, ac in loco detinet. Sive, secundum illud est, quod finem quadratum primæ vertebrae (sic supra à nobis vocatum) pro dente excipiendo exculpum, posteriore sede claudit. Validissimum autem hoc est, & cartilagineæ naturæ, ne dens in vehementioribus capitis versus posteriora motibus, ex suo sinu exiliens, cum inevitabili vitæ periculo, spinalem medullam illuc transeuntem, comprimatur.

Ligam. prima
vertebra cum
secunda.Ligamenta re-
liguarum colli
vertebrarum.

1.

2.

Iungitur deinde & prima vertebra cum secunda, ligamento tenui membraneo, quod neque substantia, neque colligandi modo ab aliis communibus differt.

Reliquæ vertebrae duobus ligamentis alligantur. Primum, validissimum est, pingui ac mucoso humore oblitum, qualis in aliis quoque articulis conspicitur, quod vertebrae undique ambit, estque ligamentum commune. Et quamvis robustum sit undique & crassum, tale tamen potissimum à lateribus versus anteriorem partem, ubi ipsæ quoque vertebrae nonnihil crassiores sunt, apparet. Secundum ligamentum, cartilagosum est, & corpora vertebrarum intercedit, cujus etiam latitudinem & figuram refert.

Inferioris
maxillæ ligamen-
tum.

Ossis hyoidis.

Inferioris maxillæ articulum cum ossibus temporum commune ligamentum obvolvitur.

Os hyoides duo quoque habet ligamenta, eaque valida, quæ ipsius lateribus committuntur: sed & alia cartilaginosa ac rotunda obtinet, utrique lateri implantata, quibus partibus adjacentibus adnectitur, & velut in æquilibrio servatur.

Linguae.

Lingua quoque ligamentum validissimum membraneum obtinet, quod medio ipsius corpori subternitur. Huius extremo circa apicem linguae funiculus quidam adnascitur, quem Lingua frenum appellant. hoc si longius sit, ut ad dentes usque priores exporrigatur, impedit linguæ (quemadmodum sæpe in pueris videmus) liberum motum, adeoque tunc sermoni plurimum officit, unde peculiaris huic negotio chirurgica operatio dicata est.

Ligamenta
Thoracis.
Vertebrarum.Costarum cum
vertebris.Costarum cum
sterno.Ligamenta
infini ven-
tris.Ossis ilium &
sacri.

THORACIS vertebrae, ut & LUMBORVM eadem habent ligamenta, quæ diximus esse reliquis, præter primam & secundam, Cervicis vertebrae. Cæteri ipsius articuli, communibus ligamentis membraneis, puta totum articulum involventibus, vinciuntur. Nam quæ Costas cum vertebrae jungunt talia sunt, paulo tamen validiora crassioraque existunt, potissimum in prima & secunda costa. Eadem sunt etiam, quæ easdem costas cum sterno connectunt; sed tenuiora, minusque robusta.

IN INFIMO VENTRE paulo plura occurrunt. Primum est, quod ilium os sacro validissime connectit. hoc robustum est, totumque articulum circumamplectitur, membranam referens forinsecus, at qua parte inter utrumque os inferitur, durum ac cartilagosum existit. Hoc ligamentum in partu difficili laxari posse, supra à nobis probatum fuit.

Ossis sacri &
coxendicis.

Alterum ligamentum est, quod os sacrum cum coxendice jungit, & hoc duplex est. Primum, quod teres, validissimum ab osse sacro exoritur, ubi quantum ipsius os cum sexto committitur, & in externum tuberculum ossis ilium inferitur, sub primo femur circum-

a. lib. 2.
21.

circumagentium musculo, Pyramiformi, statim occurrens. *Alterum*, ex eodem loco enatum in posteriorem appendicem coxendicis implantatur.

Tandem *pubis* quoque ossa varia ligamenta obtinent. *Primum*, cartilagineum est, quod lineam eorum asperam committit. *Alterum*, quod circulariter ea ambit. *Tertium*, membraneum, quod foramen pubis ossium succingit, & secundum ac tertium sæmunt circumagentes musculos, Obturatores vulgo dictos, distinguit.

CAPVT VI.

De Ligamentis Artuum, ac primo Manus.



VM MANVS dicatur, quicquid à scapula dependet, varia ligamenta erunt, quæ à manum pertinent. *Primum*, quæ scapulam cum humero jungunt; deinde, quæ humerum cubito, & cubitum radio, utrumque autem carpo, inde hunc metacarpio; ac tandem digitorum ossa inter se connectunt.

Ligamenta ergo quæ scapula humerum alligant, quinque communiter numerantur. *Primum*, commune est, latum & membranofum, quod ex superciliis cervicis scapulæ orbiculatim enatum, universumque articulum involvens, in humeri internam ac priorem ipsius capitis partem totam inseritur. *Alterum* ligamentum, omnium robustissimum & suprema sede positum, à toto externo ancyroidis processus latere eductum, oblique vehitur, internoque summi humeri, sive acromii lateri, nullibi humerum attingens, implantatur. *Tertium*, rotundum, ab externo latere ejusdem ancyroidis processus exorians, in externum humeri caput, interna parte, definit. *Quartum*, ex superiore parte cervicis scapulæ, quæ proxime ancyroidi processui adjacet, & acuta est, prodians, mox internum humeri caput superans, capiti ejusdem exteriori adnascitur. *Quintum*, ex eodem, quo quartum, loco erumpens, oblique fertur, & in posteriorem partem externi humeri capitis inseritur. Hæc ligamenta humeri esse, eoque facere vulgo creduntur, quo minus propter levem illum scapularum sinum luxationibus opportunus sit: meo tamen judicio solum *primum* est, quod huic muneri satisfacit: *secundum*, quod humerum ne attingit quidem, pro supercapulari potius superiore, sive primo humerum circumagente instructum est, ne, dum contrahitur forte, ex sua sede profiliat, cum ab hoc tendo ipsius (non minus atque à ligamentis annularibus in manu muscutorum digitos flectentium tendines) superna parte coëscatur. Atque hunc usum genuinum esse parvo negotio patebit cuivis, qui diligenter animum velit advertere, ipsamque inspectionem anatomicam consulere. Tracto enim ad suum principium hoc musculo, protinus licebit cernere, quam promptum ipsi foret è suo loco excidere, nisi ligamento, eoque tam valido, prohiberetur. Reliqua tria eo facta sunt, ut insertionibus trium muscutorum humerum circumagentium inserviant. *Tertius* enim, sive infrascapularis dictus, in *tertium* ligamentum implantatur: *Primus*, sive supercapularis superior, in *quintum*: & *Secundus*, sive inferior supercapularis, in *quartum*.

Cubitus ex Radio & Vlna compositus est, quæ ligamentis & humero, & carpo, tum inter se etiam junguntur. *Humero* quidem, membraneis communibus: at *Carpo*, primum similiter communi, sed deinde & aliis duobus, quorum alterum ulnam, alterum radium carpo adnectit, utrumque vero teres est. Illud, à processu styloide ossis cubiti oritur, inque os carpi quartum terminatur: hoc, à radii apice nascitur, & in carpum definit. *Utrumque autem os*, sibi invicem membraneo ac valido ligamento jungitur, quod ex tota ulnæ acuta linea enatum, in totam acutam lineam radii adversam infigitur, & musculos internos cubiti ab externis dirimit separatque.

Carpi ossa, *Metacarpii*, & *Digitorum*, ligamenta communia acceperunt, quæ articulos orbiculatim sic ambiunt, ut totos invicem colligent. Hoc tamen *metacarpii ossa* peculiare præ dictis obtinent, quod non ligamentis tantum forinsecus, sed intus etiam, quæ se mutuo respiciunt, cartilaginibus vinciuntur.

Cæterum præter hæc, quæ nunc exposuimus ligamenta, & quæ ad articulationum securitatem faciunt, alia quoque in manu occurrunt, tendinibus ad digitos abeuntibus inservientia, quibus sic coëscuntur, ne in valido motu extra locum exsiliant.

Ligamenta manus.

Ligamenta scapulae humeri alligantia.

Vlna.

Ligamentum cubiti & humeri. Cubiti, & carpi.

Cubiti, & radii.

Ossium carpi ligamenta. Ossium metacarpii.

Ligamenta annularia.

Hujusmodi ligamenta *Annularia* vocantur, transversum manum subeuntia, & duo sunt: ^{1.} *unum*, in interna manus sede, pro flexentium: ^{2.} *alterum*, in externa, pro extendentium musculorum tendinibus. Sed & Digni quoque singuli ejusmodi ligamenta interna parte obtinent, eodem fungentia munere; quæ secundum eorum longitudinem ad latera pronata, canalem æmulantur, per quem flexentium digitorum tendines expanduntur.

CAPUT VII.

De ligamentis Cruris universi.



CRURUS dicitur, quicquid à coxendicis articulo, in aciem digitorum pedis extremam porrigitur. Quare articuli complures erunt in crure qui ligamentis indigent: ac primum quidem femoris cum coxendice parte clariore; ejusdem cum tibia & fibula sede inferiore: tum tibiæ cum fibula, & utriusque ossis cum talo. Pedis tandem extremi, ubi talus, tarsus, pedium, & digiti sua ligamenta requirunt.

Ligamentum quo femur ossi coxa alligatur.

Femoris ergo caput superius cum acetabulo coxendicis duobus adstringitur ligamentis. *Primum*, commune est & membraneum, quale in aliis quoque articulis cernitur, latum, totam horum ossium commissuram orbiculatim ambiens, quod robore ac crassitie, ut ipse articulus aliis, ita cæteris ligamentis præcellit. *Alterum*, in ipso acetabulo, interque articulum occurrit, teres & cartilagineum. Hoc ex humiliore acetabuli sede nascitur, quo loco supercilium ejus osseum non est, sed ligamento tantum constat, & in medium femoris caput, ubi foramen hanc in gratiam exculptum habet, inseritur.

Ligamenta genu.

Inferius caput femoris cum tibia, fibulaque, pluribus necitur ligamentis. *Primum*, commune est, & membraneum, universum articulum involvens, excepto sinu illo, in anteriore parte, ubi patella est, cum eo loco ^{1.} validissime tribus tendinibus, ^{2.} secundi, ^{3.} tertii, & quarti tibiam extendentium musculorum vincitur. *Alterum*, crassum ac validum in poplite situm, à medio partis posterioris tibiæ incipit, rectaque ascendens, in duo capita abit, quæ postea in duo inferiora femoris capita, qua parte maxime inter se recedunt, implantantur. *Tertium*, quod secundo femoris ligamento respondet, cartilaginofum ac robustum est, & ex sinu illo magno, qui est inter duo capita inferiora femoris, iuxta insertionem modo dicti, nascitur, ac inter articulum consistens in tuberculum illud, quod inter duos sinus superioris tibiæ appendicis est, qua parte aspero eminet apice, implantatur. *Quartum*, gracile est, & inter duo capita femoris inferiora inseritur, ex medio ligamenti secundi nunc enarrati, ea parte, qua in duo capita dirimitur, enatum, & sursum ad femur delatum. *Quintum*, teres, genu externo lateri obducitur. *Sextum* contra, interno lateri attenditur.

Ligam. tibiæ fibulaque.

Tibia cum fibula primum superne per validum ligamentum necitur, quod ossa hæc, ut cætera solent, undique exterius circumdat: ^{1.} at vero ea parte, qua invicem distant secundum longitudinem, ^{2.} membraneo, lato, ac tenui, & obliquis fibris à tibia, ex qua oritur, ad fibulam, cui inseritur, tendente. Simile est in omnibus ligamento illi, quod cubitum radio jungit, similiterque musculos anteriores tibiam occupantes, à posterioribus dirimit.

Ligam. tibiæ fibulaque cum talo.

Tibia fibulaque cum Talo necitur tribus ligamentis. *Primum* est commune, membraneum, quod totum articulum ambit: ^{1.} reliqua duo cartilaginea sunt; ex quibus *secundum*, à processu tibiæ malleolum internum conficiente ortum, inseritur interno tali lateri, quod à malleolo excipitur: ^{2.} *tertium* contra, ab appendice fibulæ externum malleolum constituente enatum, in externum ejusdem tali latus implantatur.

Ligam. tali & ossium pedis.

Talus cum pedis ossibus ligamentis alligatur pluribus. *Primum*, commune est, calcis articulum cum talo ambiens orbiculatim. *Secundum*, cartilagineum, ab inferiore tali sede ortum, in calcem inseritur. *Tertium*, totum articulum externa sede cingit, ex cervice tali nascitur, & naviculari ossi implantatur. *Quartum*, calcis os cubiformi committit, & articulum circumamplectitur, robustum est, ac cartilagineum. *Quintum*, à tali cervice in os cubiforme inseritur.

Tarsi

Tarsi tandem, Pedii, ac Digitorum pedis ligamenta illis, quæ in manu sunt, respondent: quemadmodum etiam eodem modo in pedio, ac metacarpio, quæ ossium intervallis immittuntur, cartilaginea sunt, cæteris membraneis existentibus.

Præter hæc, etiam ligamenta, quæ ad articulos spectant, alia, similiter ac in manu annularia occurrunt, quæ tendines ad pedes transmissos continent. Horum *primum* tranſverſum eſt, in anteriore pedis parte, tibiam cum fibula neſtens. *Alterum*, ab interno malleolo enatum, in os calcis inferitur. Hoc etſi ſimplex videatur, triplex tamen eſt, tres veluti annulos effingens. *Tertium*, ab externo malleolo, in idem calcis os implantatur. Per hoc tranſeunt duorum muſculorum tendines, ſecundi ſcilicet pedem fleſcentis, & abducentis. *Tandem* in digitorum inferna ſede ligamenta occurrunt, qualia in manu, per quæ tranſeunt tendines muſculorum digitorum internodia fleſcentium.

Ligam. inſer-
ta pedis.

Ligamenta
annularia.

1.

2.

3.

4.

FINIS TERTII LIBRI.



ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS,
DE HUMANI CORPORIS FABRICA.
LIBER QVARTVS,
Qui Musculorum historiam persequitur.

CAPVT I

Quid sit Musculus, & qua ejus actio.

Ratio ordinis.



*Videtur et
necessitas de-
scriptio de mus-
culo.*

VM ea in libris superioribus uniuersa hæcenus tradiderimus, quæ ad ossium, & hisce respondentium cartilaginum, atque utraque vincientium ligamentorum historiam pertinere videbantur, quæ ut totius corporis, ita etiam solidæ alicujus in studio anatomico cognitionis fundamenta diximus: videtur reliquum nunc esse, ut tractationem de Musculis aggrediamur, qui ita longe lateque se fundunt, ut maximam corporis nostri partem, non immerito conficere videantur. Argumentum est non solum summe utile, sed & maxime necessarium, in quo diligens versetur oratio, tum quia ad ægorum curationem, cujus gratia potissimum Medici Anatomix animum applicant: tum ad eorum, quæ postmodum dicenda sunt, absolutum perfectumque intellectum plurimum conducant. Quemadmodum enim musculorum historia, in explicando situ singulorum, summam ubique ossium rationem habet, ut frustra sit, qui se aliquid promoturum in illa crediderit, nisi hanc animo prius fideliter comprehenderit, cum & ab ossibus aut cartilaginibus plerique omnes oriantur, & in ossa similiter aut cartilagine desinant: sic Venarum, Arteriarum, & Nervorum tractatio (medico futuro unice necessaria, Philosopho autem summe jucunda) nec unquam tradi feliciter, nec addisci potest, nisi prævia musculorum cognitio, eaque exacta, fundamenta posuerit, quibus reliqua superstruantur. Illud ergo hoc loco sub initium monendum duximus, uniceque observandum est ab omnibus, qui fructum aliquem ex his laboribus nostris haurire velint, ne quis ad lectionem hujus quarti libri accedat, quin exactam ossium cognitionem sibi antea comparaverit, eaque summa diligentia legerit, ac perfecto maturoque judicio apprehenderit, quæ à nobis in secundo libro superius accurate perscripta sunt. Obscura enim & inutilis erit tota hæc tractatio citra illius præviam cognitionem: at clarissima contra & perspicua futura sunt omnia, si bene, quæ exposita fuere, perspecta quisque habuerit.

*MUSCULVS.
Erymologia.*

MVSCVLVS ergo, ut à nomine exordium ducamus, Græcis *μῦς* dicitur, sive *μύων*, quod contrahere significat, quæ ejus est actio: sive à figura, ut plerique, & haud male fortassis, arbitrantur, quandoquidem musculum referat excoriatum. Caput enim magna musculorum pars acutum habet; ventrem autem rotundum; longissimamque caudam, muris instar. Eadem nominis ratione Latinis quoque *Lacertus* dicitur, ab animalis sic appellati similitudine: unde factum, ut *Lacertosus* vulgo musculosum denoter, & eum, qui carne abundat. Quanquam revera omnibus in universum musculis ea figura tribui haudquaquam opportune queat, cum alii potius rotundi sint, ut qui sphincteres dicuntur; alii triangulares, ut *Deltoides*, humerum elevans, à Δ litera Græcorum cognomen nactus; alii quadrilateri, ut tertius *scapulæ* musculus, *Rhomboides*, à Geometrarum figura quatuor lineis comprehensa, sic appellatus. Existimari ergo primos nominum impositores, cum Anatomix ignari essent, musculos vocasse, quod inter secundum tum demum horum naturam adverterint, cum hujus formæ musculos deprehenderent: reliquos postea, qui diligentiores infectionibus aliis idem munus competere observarunt, etsi forma non responderet, mutare tamen com-
mune

*Vnde muscoli
dicuntur opti-
mo Auctoris.*

mune nomen, quod jam ab omnibus quasi receptum erat, neutiquam voluisse. Sic sci-
mus membranam carnosam dici, non quod revera carnosâ sit in homine, præcipue in
adulto; sed potius, quia in brutis talis videatur, in quibus se exercebant olim, qui pri-
mi hoc nomen excogitarunt: similitudinis tamen gratia, quæ inter hominum & bru-
torum carnosam membranam est, communis illa vox postmodum retenta fuit. Idem
in pluribus aliis rebus contigit, ut primo scilicet inventum nomen, tametsi haud ita
aptum fuerit, reliquis etiam, quæ aliquam adfinitatem habuere, accesserit. Sic Geome-
tria dicta est à dimensione terræ; quia hujus occasione primum reperta est, etsi proprie
circa magnitudinem versetur, cujus affectiones persequitur. Sic Medicina, à medendo,
quantumvis non medeatur tantum ægris: sed etiam sanis, quo minus in morbos decli-
nent, prospiciat. Credibile enim est, primos nobilissimæ artis inventores, miserando
mortalium fato commotos, de restituenda amissa sanitate prius, quam de præsentī
conservanda, aut tuenda cogitasse. Cæterum musculorum mentionem Aristoteles in
genuinis operibus nullam inject, ut adeo plerisque ignorasse videatur: etsi revera in
Hippocrate se multo antiquiore didicisse poterat, qui aliquoties ipsorum in suis scri-
ptis meminit, ut 11 de fracturis, & alibi: sed potissimum libro de Arte, ubi, quacun-
que, inquit, partes carnem in orbem circumsitam habent, quam Musculum vocant,
hæ omnes ventrem obtinent. Meminit tamen sæpe *carnium* Aristoteles, per quas indi-
stincte cognovisse musculos, à non paucis creditur. Præcipuus locus est 11 de part.
animal. cap. 1x: in quo cum occasionem habeat mentionem de his aliquam aspergen-
di, caro, inquit, circa ossa consistit, vinculis modo fibrarum tenuibus adhærens, cujus
causa ossium genus habetur. Sic etiam Hippocrates musculos carnes vocat, ut 1v aphor.
xvi. At ille fortasse musculorum nomine dignatus non est, sed generali tantum *carnium*
appellatione. Quanquam Author Problematum (quisquis etiam is sit) *carnium* no-
mine eorum meminerit.

Aristoteles
musculorum
mentionem
non fecit.

Carnes vocat.

Cæterum musculus à Galeno definitur, 1 de mot. muscul. *ἑρπαιον κινήσεως τῆς κατ' ἰσχυρῆς*.
In qua definitione cum aliqua difficultas sit, sciendum est, duplicem esse in nobis mo-
tum; *unum*, qui à voluntate & arbitrio dependet; *alius*, qui citra omnem voluntatem
perficitur: ex quibus hic, naturalis: ille, animalis dicitur. *Naturalis* quidem, quod iis
proprie competat, quæ animæ naturalem facultatem, hoc est, vegetativam habent:
animalis vero, quia solis animalibus inest. *Naturalis* ergo ille est, qui in alimenti attractio-
ne, retentione, & expulsiōe fit, nec solum in ventriculo & intestinis, sed in toto quo-
que corpore, omnibusque ejus partibus: *Animalis* vero, apprehensio, & ambulatio, fæ-
cum & urina expulsiō, attractio item æris, aut detentio voluntaria. *Naturalis* enim
à sola natura regitur, nec fisci à nobis aut concitari potest, quemadmodum ciborum
attractoriam ventriculi vim, nemo pro suo arbitrio, aut sistere potest, aut impellere, sed
ipsa pro dispositione ejus secundum, aut præter naturam se habente peragitur. *Animalis*
autem à voluntate animalis totus dependet, & modo intermittere potest, modo perfici;
quo pacto in nostra voluntate est, aut apprehendere aliquid & capere, aut idem re-
linquere; ambulare, aut confidere. Hic autem etsi animalibus brutis juxta, ac ratione
præditis communis sit, in illis tamen sine electione fit, in his cum electione: in illis, spon-
taneus; in his, voluntarius dicitur. Cæterum cum spontaneum voluntarius perpetuo
præsupponat, nec citra eum reperitur unquam, Galenus profecto recte, mea senten-
tia, musculum definivit, *instrumentum esse motus κατ' ἰσχυρῆς*, sive secundum animi appetitum,
cum non semper opus sit, ut cognitio appetitioque intellectiva ad movendum partes
commoveat, sed etiam cognitio vel appetitio sensitiva sufficiat. Ex his jam concludi-
mus, quicquid in nostro corpore ad libitum movetur, id omne per musculos agi, neque ullum in corpore in-
veniri musculum, quin voluntarium motum expedire possit. Appellat autem *ἑρπαιον*, id est, partem
instrumentalem, qua voce indicat, sub quo partium genere contineatur. Est enim pars
dissimilares musculus, quæ ex pluribus similibus componitur, quæque actionem cer-
tam ac determinatam edit, quæ sane duo propria sunt omnium organicarum partium
πυκνέα, & infallibilia indicia. Nonnunquam tamen & in similiarum catalogum referri
à doctissimis videas: sed quatenus scilicet similes partes vocantur, quæ ad vere orga-
nicarum constructionem veniunt, ex quorum numero sunt muscoli, qui ad manus, pedis
capitis, imo omnium fere organorum constitutionem concurrunt.

DEFINITIO.

Motus du-
plex.
Naturalis.

Animalis.

Musculus pars
est dissimilares

Quomodo si-
milares inter-
dum dicatur.

Quam-

Motus muscu-
li est usui ac-
tionis eius.

Effigies partis
cui musculus
inferitur: ad-
eque varius.

ACTIO
musculi pro-
pria.

Quid per con-
tractionem in-
telligendum.

Motus Toni-
cus.

Relaxatio.

Quatuor mu-
sculorum mo-
tus.

Figura extre-
ma & media.

Media figura
totius corporis
qua?

Media figura
partis singu-
larum qui de-
prehendatur.

Nota.

Musculi perfe-
cti definitio.

Quamquam autem Galenus musculi definitionem proponens, ut partis organicæ, ejusdem etiam actionem, tanquam finem, à quo organis forma omnis supervenit, indicare videatur, dum motus instrumentum esse asserit: motus tamen actio musculi proprie haudquaquam dici potest, sed potius effectus quidam est, & usus actionis eorundem. Est autem motus partis ejus, cui musculus inferitur: nec tamen motus ille localis semper est, sed alterius quoque usus gratia perficitur, ut contractionis alicujus partis, verbi gratia, vesicæ & ani; aut apertionis, ut labiorum; denique aliorum usum ergo. Motus autem localis ad omnes differentias locorum fieri potest, si & partis illius necessitas postulet, & musculi dati sint necessarii, unde quædam sursum & deorsum, dextrorsum & sinistrorsum, ante & retro moventur. Destinatus enim omnibus motibus musculus est, & plerumque uni unus: interdum, sed raro, duo, ubi validior scilicet vis requiritur, ut cubiti, tum flexioni, tum extensioni.

Propria autem musculi actio, contractio est; sed contractio non quævis, verum in seipsum; nec in quamvis sui partem, sed ad principium. Hanc contractionem necessario duo consequuntur: primo, ut pars illa, cui inferus est musculus, moveatur; & deinde, ut ad illam partem, ubi musculi principium est, trahatur. Id autem, quod movetur, non semper os est; sed aliæ etiam & variæ partes, quibus musculi dicati sunt, quemadmodum postea in differentiis diceretur. Fit autem contractio hæc voluntarie, sequiturque situm fibrarum, modo rectum, modo obliquum, modo transversum, idque ratione corporis.

Cæterum, per contractionem non ipsum tantum contractionis motum, qui est adhuc in fieri: sed etiam contractionis jam factæ perseverantiam intelligimus, cum non minus sustinendo partem attractam, quam dum adhuc se contrahit, agat; tametsi quiescere omnino videatur. Motus hic, distinctionis gratia, *Tonicus* dicitur, cum in eodem perpetuo tenore ac situ partem conservet. Præter hanc tamen actionem, & alia musculis tribuitur, quam secundariam vocant, estque sui *relaxatio*. Cum enim musculus unus contrahitur, alter qui oppositum motum peragit relaxatur: verbi gratia, dum flectentes cubitum contrahuntur, relaxantur extendentes: & dum hi laxantur, illi contrahuntur. At enim, ut modo contractionis perseverantia non minus actio, quam ipsa contractio, vocabatur: ita nunc relaxationis perseverantia non minus motus musculi, quam relaxatio erit, ut sic in universum quatuor enumerari queant musculorum motus, Contractio, contractionis conservatio, sive tonicus motus, Relaxatio, & relaxationis perseverantia. Has Galenus agnovit lib. 1 de mot. muscul. cap. 8, ἡ πρὸς συστολήν, inquit, ἡ ἐκτατικὴ, ἡ μετὰ τὴν συστολήν, ἡ τὴν ἀπὸ τῆς συστολῆς ἀφάρων, aut enim contrahuntur musculi, aut extenduntur, aut transferuntur, aut tensi manent. Vterque autem hic motus, modo extremas, modo medias figuras habet. Extremas voco, in quibus summe contrahuntur, aut relaxantur musculi: medias contra, quæ ab extremis motibus æqualiter distant. Ex his sequitur, extremas omnes dolorificas esse, medias jucundas: illas, diu ferri non posse; has, quam diutissime: illis nos uti in actionibus corporis; his, in otio & quiete. Habet autem mediam figuram, & totum corpus, & singulæ similiter partes. Totius corporis mediam figuram describit Hippocrates, lib. 1 Prænot. eleganter, dum ægrotum à medico deprehendi vult, primo in latus dextrum, aut sinistrum, non in dorsum, aut ventrem decumbentem; deinde manus, collum, & crura modice inflexa habentem, ac tandem totum corpus flexibile situm. Subjungit, ita enim plurimi ex sanis decumbunt, quia scilicet hæc figura optime toleratur, & citra dolorem. Medias figuras partium singularum invenies, si facta extrema articuli, tum flexione, tum extensione, notaveris locum inter has medium, membrumque ad eum postea reducas. Hæ singulæ diligenter in omnibus notandæ & addiscendæ sunt, quod neque fracta ossa conjungi, neque luxata restitui in suum locum possint, nisi quis mediam partis illius figuram exacte noverit. Notandum autem coronidis loco est, nonnullos esse musculos, qui semper in media figura situm suum obtinent, cujusmodi sunt sphincteres dicti, quorum extremæ in dilatatione aut contractione fiunt. Sic etiam frontis musculi, ut postea dicitur, in media figura perpetuo sunt nisi à nobis contrahantur. Quod si quis jam perfectam, & omnibus numeris absolutam musculi definitionem colligere velit, ex dictis facile poterit, dicendo: Musculum esse partem nostri corporis organicam, destinatam contractioni voluntarie versus suum principium, pro motu partis cui inferitur, & cujus musculus esse dicitur.

CAPUT II.

Quæ sit musculi constructio, & quibus ex partibus constet.



VM ergo musculi actio, ut dictum, voluntaria sit sui ipsius versus principium contractio, videndum nunc est, quænam ejus sit constructio tam concinna, tamque elegans, ut actioni huic tam nobili apte satisfaciat. Id vero nos haud magno negotio consequuturos arbitramur, si quæ sint ejus partes, ex quibus conflatus est, prius diligenter exploratum habuerimus: deinde, cui ex his ipsis actio proprie competat, vel accepta referenda sit, solerti rationis indagine perscrutemur. Omne enim instrumentum ita dispositum esse debet, ut finem, cui destinatum est, quam aptissime assequatur: non tamen omnes ipsius partes proprie ipsam concernunt, sed quædam sunt, à quibus immediate fluit, quædam usum tantum nonnullum præstant.

Cæterum duplex vulgo traditur partium musculi divisio, quarum alia dissimilarium est, alia simularium. DISSIMILARIUM tres enumerantur, principium scilicet musculi, medium, & finis. Principium, alias caput quoque dicitur, servata similitudine cum mure excoriato: medium, venter: finis, cauda. Græci hanc etiam *ἀνω & κάτω* vocant, *enervationem*, quasi musculus ibi in nervum definat: aliis *ῥίζον* dicitur, seu *Tendo*. Est autem principium, ut communiter ab omnibus definitur, prima musculi pars, quæ ex ligamento ossis & nervo infimul mixto generatur, ut ex utroque composita, inter utrumque medium quandam naturam obtineat, & nervo quidem sit durius, ligamento autem mollius. Medium vero, pars tumida musculi esse dicitur, ex carne musculoſa composita, majorem ejus corporis partem constituens. Finis tandem, pars nervea & pellucida, in quam musculus terminatur. Verum quemadmodum, ut dictum est, nec nomen musculi omnibus sic appellatis apte convenit, aliis aliam figuram obtinentibus: ita profecto neque hæc divisio sic omnibus tribui potest, ut commode beneque assignata videatur, præterquam quod etiam falsa quamplurima docet, ut modo ostendemus. Non potest omnibus tribui, cum multi sint, qui toti carnei, & in quibus finis tendinosus non est, ut sunt moventes cutim frontis, multique laryngis, item ani & vesicæ musculi sphincteres, in quibus secundum substantiæ modum, principium nec à medio, nec medium à fine differt. Sunt nonnulli in quibus medium tendinosum est, ut secundum par maxillæ inferioris, digastricum dictum; & quartum ossis hyoidis, Coracohyoideum appellatum. Falsa etiam tradit, cum principium neque in omnibus nervaceum sit, ut in carnis enumeratis, & aliis quamplurimis, de quibus in differentiis musculorum dicitur: neque in quibus nervum mentitur, ex ligamento ossis nervoque compositum est, cum nec ligamentum, nec nervus ad ipsum accedat. Non ligamentum, quod oppido quam multi sint musculi, qui non ab ossibus originem ducunt, sed à membranis, à cartilaginibus, à tendinibus, ut ostendetur in sequentibus. Quin & ii ipsi, qui principium suum ab osse aliquo habent, à ligamento tamen sunt alienissimi, ut tres illi natiū fœmur extendentes, Glutæi nuncupati. Non etiam nervus esse potest, quod multi sint, ad quos nervus non pertingit, imo nec accedit quidem, quemadmodum postea ex inferioribus clarum erit ac manifestum. Si ergo nervi neque accedunt, neque attingunt musculos, quomodo dici possunt ipsorum capitis materiam esse, & principium generationis? Quod si vero accedant etiam, quam multi sunt, quorum superficiem tantum lambunt, non vero etiam in interiora penetrant? Et ut nervos etiam in nonnullis sese insinuare largiamur in intima, vel in medium implantantur, & sic caput ne attingunt quidem: vel, si caput etiam ingrediantur, usque adeo parvi sunt, ut ne cogitatione quidem à prudenti & sanæ mentis homine comprehendi possit, atque tunc quomodo tam exilis nervus, tam magnum corpus, ut caput nonnunquam esse solet, formare & constituere potuerit? Quamobrem jam recte concludere videmur, principium hoc pacto determinatum non bene esse, cum neque omnibus musculis nervaceum caput competat, neque quibus forte contingit, ex nervo & ligamento constetur. Sed nec medium bene definitum est. nam in iis, qui toti carnei sunt, non differet à principio, aut fine. Adde, quod in dictis bigastricis medium non carneum sit, sed tendinem

Divisa partium musculi. Dissimilares musculi partes.

Principium.

Medium.

Finis.

Divisio allata falsa.

1. Quia non omnibus potest tribui.

2. Quia falsa tradit. Principium musculi male definitum.

Medium musculi male definitum.

*Finis male
distinctus.*

habeat. *Finis etiam male distinctus est* : quia neque in omnibus nervaceus est, ut in sphinctere, & carneis : neque in quibus nervosus est, ut ostendimus jam statim, à principio diversam naturam obtinet. Vnde patet, quam male finis à Græcis *ἡ ἀρχὴ* dicatur, cum nervaceus omnibus non sit ; & ab aliis inepte *ἡ αὐτὴ*, sive Tendo speciali nomine, cum à principio non sit distinctus in substantia. Erronea ergo, & falsa est hæc musculi in partes dissimilares, hoc modo acceptas, divisio : servari tamen potest, quatenus quibusdam musculis ex aliqua parte convenit ; in quibus scilicet tres hæ partes distinctæ sunt, etsi profecto materia & substantia alia sit, quam statuta est ab ipsis. Vbi etiam esse potest ad faciliorem doctrinam, cum principium semper sit in parte, ad quam movetur altera mota : finis autem in illa, quæ movetur : medium, inter utramque interjectum. Præterea dicendum nobis sæpe erit, contractionem fieri versus principium : in principio, aut medio nervum inferi, aliaque in quibus has partes distinctas propriis appellationibus esse oportet. Non tamen has partes secundum substantiam definire licebit, quæ differentissima est pluribus, nec uniformis semper in principio, medio, aut fine omnibus : sed juxta usum potius determinare decet, qui omnibus & semper similis est, dicendo ; *Principium* esse illam partem musculi, quæ inserta est parti, ad quam fit contractio : *Finem*, illam, quæ parti quæ movetur : *Medium* autem, quicquid principio & fini interjacet. Atque hæc de partibus musculi dissimilariibus.

*Tota hæc
est hæc
musculi
dispositio.*

*Tres similes
partes musculi.*

SIMILARES, quæ ad musculi contractionem concurrunt, septem sunt numero, Vena scilicet, Arteria, Nervus, Caro, Tendo, Membrana, & Pinguedo. Ex his quædam sunt, quæ musculo cum aliis nostri corporis partibus communes sunt ; quædam, quæ propriæ. *Communes* sunt quinque, Venæ, Arteriæ, Nervi, Membrana, & Pinguedo. *Proprie*, de quibus primo dicemus, duæ ; Tendo, & Caro.

TENDO.

TENDINEM vocamus, *partem similem, simplicem, & sui generis, per totum musculi corpus, secundum longitudinem ejus diffusam, quæ modo unita, modo divisa est, carneque stipata, & cum contractioni maxime accommodata sit, ad arbitrium nostrum contracta, partem, cui insertitur, unâ movet.* Voco *similem* partem, ut genus assignem : sed addo *simplicem*, ut distinguam ab illis similariibus, quæ simplices non sunt, sed compositæ, quemadmodum diximus musculum quoque similem dici, etsi revera pars sit organica & ex pluribus composita. Est autem, neque nervus, neque ligamentum, neque ex utroque mixtus, quod alii voluerunt, ut ostensum : sed *sui generis pars*, quæ ligamento mollior, nervo durior est. Addo, *per totum musculi corpus diffusa*, ut denotem nullam musculi partem esse, in qua tendo non reperiatur : etsi reperiamus sæpe partes ubi caro non sit, ut fere semper esse solent, in quibus tendo unitus est. Nec enim sic diffusus per musculum sub eadem semper forma & modo apparet : sed *quandoque unitus est, interdum vero divinus.* *Unitus* est sæpe in principio ; sæpissime in fine ; nonnunquam etiam in ventre, sed rarissime, ut in dictis digastricis. *Divinus* contra sæpissime, imo semper in medio, si à digastricis discedas ; raro in principio ; rarissime in fine. Verum ubi divinus est, semper *carne stipatur*, quo autem modo, dicetur postea, cum de carne sermonem instituamus. Dicitur autem diffusus esse *secundum totam musculi longitudinem*, quibus verbis tria docentur. *Primo*, tendinem duci recta juxta longitudinem musculi, non oblique, neque transversim. *Deinde*, esse simplicem hunc ductum, quia si secundum longitudinem tantum ducitur, erunt tantum fibræ rectæ in musculo, non rectæ transversis, aut obliquis intermixtæ, ut in membranis, & in venis fieri solet. Nec est quod aliquis objiciat, fibras (quæ nihil aliud sunt, quam divinus tendo) nonnunquam obliquas dici, & transversas, uti accidit in musculis abdominis, à quibus propterea obliqui accedentes, & descendentes, item transversis vocantur. Id enim nominis ipsis impositum est, non ratione ductus in corpore musculi : sed ratione situs musculi in corpore, qui obliquus, aut transversus est. *Tandem*, id etiam illa verba edocent, tendinem non tantum in fine esse, ut plerique Galeni asseclæ tradunt, sed etiam in principio, & medio, quod etsi rationibus confirmari poterat pluribus, probare tamen satius una duximus experientia, quæ clarissima obscurorum est Magistra, fidelissima ignotorum doctrix, certissima dubitationum solutrix. Sume enim, si adhuc ambigis, musculum, eumque à carnibus libera, & inspicere, an non principium medio, & medium fini cohæreat, imo continuum sit ? Liberabis autem facile, si in aqua per plures dies maceraveris, aut in eadem

*Similari.
Simplex.*

*Sui generis.
Per musculi
corpus diffu-
sus.*

*Unitus vel di-
vinus.*

*Carne stipa-
tus.
Præter
quod
musculi
longitudi-
nem.*

3.

eadem abunde decoxeris. Cum vero in aliis atque aliis tendo magis appareat, crassiorque sit, accommodatissimus ad hoc negotium musculus erit, supernus ille in pectore, aut cruribus gallorum Indicorum, in quo exacte, quod desideras, conspicies. Subjungitur in definitione, *contractioni maxime esse aptum*: aptissime. Instrumentum enim accommodatum esse debet, ad efficiendum suam actionem, bene, expedite, jucunde. Ut id fiat, eo conspirare debent omnia, quæ ad ejus constitutionem & fabricam faciunt, substantia, temperies, temperiem consequentia, & tandem materia. *Substantia* tendinis est sui generis, nervo non valde dissimilis, qui & ipse in se contrahitur, ut patet in nervorum præcisionibus. *Temperies* est frigida & modice sicca, id quod tum constitutio ipsius excarnis, tum venarum & arteriarum inopia ostendit. *Temperiem sequentia* sunt, mediocritas inter molliem & duritiem, ut neque propter illam flaccidus sit nimis, neque propter hanc, inflexilis. *Materia* autem, est semen, quod omnibus partibus generationis principium est, quæcunque spermaticæ dicuntur.

Quam vero aptus propterea sit ad contractionem, hinc patet abunde, quod principio musculi præcisio, protinus ad finem se contrahat: fine vero, mox ad principium: at medio, ad utrumque. Imo, si aquæ injiciatur, confestim totus in se contrahi videbitur, quemadmodum etiam in fracturis id observatur, ubi subito in se musculi cœunt, cujus gratia in restitutione extensio semper maxime necessaria est, & difficilis. Vltimis tandem verbis docetur, tum actio tendinis, nempe *contractio*; tum actionis usus, *partis* scilicet cui *infitur commotio*: sicque insinuat leviter, tendinem esse partem illam, quæ primas in musculo tenet, & cui actio tribuenda est, quæ per ipsum in musculo immediate perficitur. Id si demonstratione indigeat, satis ostendetur ex eo, quod diximus, ad contractionem unam ex cæteris musculi partibus maxime accommodatam esse: at inter cæteras methodos, quibus investigamus præcipuas alicujus organi partes, hæc etiam, & quidem præcipua est, quæ tum ex fabrica desumitur, tum aptitudine ad obeundum munus, cum neque finem Natura unquam velit fine mediis, neque media sine fine. Quin imo, tendines quoque cernere est robustiores aut debiliores esse in musculis, prout actio validior imbecilliorve requiritur. quæ res certe clarissime docet, tendinem motus gratia imprimis factum esse. Hinc recti abdominis musculi, cum, uti ostendimus, totam fere superiorem corporis partem flectere debeant, tendines intersectionibus firmatæ sunt, ut robur ipsis aspergeretur, qui ob longitudinem alias tanto oneri flectendo non erant. Sic deltoides humerum attollens musculus, sic femur extendentes Glutæi, crassissimas fibras obtinent: quod ille quidem, totius brachii; hi vero, universi cruris motui sint dicati. Manifestissime autem hoc, quod dicimus, in pennatorum quorundam cruribus videre est, quorum tendines per intervalla cartilagineos fieri cernas, quod firmamento indiguere, ut qui noctu dormientium totam molem sustinere debeant. Et in his continuitatem etiam tendinis, melius quam in ullis aliis musculis videre licebit, quod durissimæ ac crassissimæ sint fibræ, nec facile dum caro separatur, lædantur divellanturve. Accedit, quod similis pars in nullo organo occurrat: & quod motus musculi imminuatur aut tollatur, pro tendinis dissectione. Seca enim tendinis partem per transversum, mox imminute musculum moveri; secam integram, omnem musculi motum tolli advertes: at incisa carne secundum longitudinem citra tendinis noxam, motus detrimentum haud ullum perferet. Tendo ergo præcipua musculi pars est, per quam contractio perficitur. Tendo autem hic, *modo unitus est, modo divisus*. *Divisus* quidem, ut aptior sit ad sui contractionem: *unitus* vero, ut accommodatus ad partis tractionem. Non enim tantum in se contrahi debebat, sed etiam contractione sua simul partem, cui infertur, movere. Ut contraheret se, divisio ejus erat necessaria; ut moveret partem una, unitio. Quare omnes quidem musculi divisum alicubi habent tendinem, non tamen omnes unitum, quia in omnibus contractione opus est, non in omnibus valida attractione. Vnitus ergo est in illis, in quibus magna moles, magnumque os appensum ad commovendum. Ad contractionem autem divisio erat propterea necessaria, quia tendo, qui durus est sua natura, ne facile rumpatur ab ossis, quod appenditur, pondere, divisus fit mollior; quemadmodum filum æneum tenue, flexile est; crassum, inflexile. Ad tensionem autem unio requiebat, quia sic tendo durior fit: durities autem necessaria est, ne cedat ponderi

*Modus exactus
panda musculi.*

*Contractioni
maxime aptus.*

*Substantia
tendinis.*

*Temperies.
Temperiem
consequentia.*

Materia.

*Tendo prima-
ria musculi
pars probatur
esse.*

1.

2.

3.

4.

*Tendo cui
modo unitus,
modo divisus
fit.*

5.

trahendi ossis. Sic animalia bruta, & homines, quibus duriores sunt tendines, fortiores sunt; sic Viri, mulieribus; sic adulti, infantibus robore præstant. Non tamen propterea tantum uniti sunt, sed etiam ne muscoli in principio & fine comprimantur; neve articulorum, circa quos fere tendines inseruntur, si carnes manerent muscoli, motus impediretur. Nam si copiosa caro musculorum finem constitueret, & crassa foret, mole profecto nimia onerarentur articuli, & sic circumsepirentur, ut nec flexi, nec extendi possent: si pauca caro & tenuis esset, quæ finem largiretur musculis; aut ponderi ossis movendi cederet, aut certe rumperetur. *Ex his patet*, non discedere à nostra sententia, qui statuunt, carnem fibrosam præcipuam musculi partem esse. In verbis enim tantum leve est diffidium, cum illi carnem fibrosam; nos potius fibras carnosas, hoc est, tendinem divisum carne stipatum primariam partem vocare velimus. Nec diversi à nobis sunt, dum ipsi tendinem, nos finem tendineum, non actionis, sed melioris tantum gratia conditum affirmant, quandoquidem & nos dicimus, tendinem in fine unitum, ad ponderosorum ossium elevationes factum esse. *Ceterum*, quoniam Tendinis vox ambigua est, & sic modò pro unito, modò pro diviso sumitur, quoties postea in historia musculorum Tendinis mentionem facturi sumus, semper unitum intelligemus, cum ita fere apud omnes Authores usus ferat, neque aliud vocabulum, quo exprimamus, commode invenitur; quod hoc loco monuisse volumus.

Quomodo caro fibrosa præcipua musculi pars dicatur.

NOTA.

CARO.

CARO altera musculi pars est, usque adeo necessaria, ut nullus omnino sit, qui carne destituatur, proptereaque caro cum musculo apud Hippocratem, ut IV aphor. XVI, sæpissime confundatur. Non tamen in omnibus musculi partibus est, sed tantum ubi tendo dividitur, quem stipat caro, & infarcit. Id ut intelligatur facilius, quomodo fiat, exemplum elegans affert Vesalius fuscæ, per quam plures crebrioresque junci porrecti, quos circa lac affusum in caseum concreverit. Iuncis respondent fibræ tendinæ; lacti, sanguis; caseo, caro, quæ ex sanguine, coacto à calore, concrevit. Ex quo fit, ut peculiare carnis genus sit musculosum, & quidem perfectissimum, cum pro diversitate infarctionis quadruplex vulgo enumeretur carniū species. *Prima* est, in qua unico & simplici ordine, juxta scilicet longitudinem, fibræ accedit, & circumponitur, qualis est musculorum. *Alteræ*, in qua duplici ordine, secundum longitudinem & transversim, quemadmodum in ventriculo, intestinis, & aliis. *Tertia*, in qua nullo ordine, vasis, arteriis scilicet & venis, accrescit, mollis & rara, qualis est glandularum. *Quarta* denique, in qua sanguis effusus circa venas nulla serie dispositus, concrevit postea, & est viscerum caro, unde & ab Erasistrato *παρέγχυμα*, quasi *παρέκχυμα*, id est, sanguinis affusio, à Galeno autem similis & simplex caro, ab Aristotele I de part. animal. I, *παρέχυμα* dicitur, cum inquit: *καὶ πλεονέχουσιν ὕδατι ἰλὺς, τὴν αὐτὰν ἀπὸ τῶν φλεβῶν ῥέουσας τὴν αἷματιον ἀπὸ τῶν ἀρτηρίων ἐστίν*. hoc est, si latine veritas, proinde quasi *fex aque profluentis, cætera viscera, veluti profusiones sanguinis per venas fluentis consistunt*. Carnis ergo usus est, divisos tendines infarcire. Infarciri autem necessario debebant, ut, quia tenues sunt, à molli carne robur acquirerent, atque invicem distincti tenerentur, nec in se conciderent. Quin ut in æstu caro umbraculo foret, & humiditate sua exsiccatio prohiberetur: in algoribus autem tegumento, & caliditate impediret, ne emorerentur.

Quatuor carniū genera.

1.

2.

3.

4.

Vfus.

NERVVS.

Insertio.

Distributio.

Ex communibus prima pars NERVVS est, qui plerisque omnibus musculis inest, adeo ut paucissimi sint qui ipso careant, quemadmodum dicitur. Quibus autem datus est, iis aut in principium musculi inseritur, veluti maximæ musculorum parti; aut in medium. In finem nullus unquam, teste Galeno, nisi in longissimis, in quibus ex adjacentibus partibus accedit, semper tamen principio simul transmittitur, & versus finem, nunquam versus principium implantatur. Insertio autem vel superficialis est, ut membranam tantum attingat; vel profunda, ut in intimas usque partes penetret. Finditur autem in musculus, non perinde ac stamen: sed ut plantæ radix, aut vena aliqua, quæ in minimos furculos divaricatur: ita nervus in minimas fibellas absumitur. Quin si profunda petat, nudus etiam perpetuo incedit, neque unquam carne cinctus aut in crustatus est, quemadmodum tendinis fibræ. Id vero diligenter notandum, musculis non inferi in parte externa, sed interna, quæ ossa respicit, quod tutelæ gratia Natura fecisse videtur, ut in profundioribus semper partibus incedens, externis injuriis minus esset obnoxius, cum nec ab aere, nec aliis incidentibus, tam facile lædi queat.

Eadem

Eadem ratione **VENÆ**, & **ARTERIÆ** sparguntur. Semper enim, aut principium, aut medium ingrediuntur; finem nunquam, nisi in longissimis, quibus à vicinis ramus transmittitur. Nunquam tamen superficiales sunt, sed semper ad interna penetrant, præsertim **Venæ**, quibus etiam hoc peculiare est, ut communi sua tunica, quam habent dum extra musculos incedunt, careant, sicque simplicissimæ sunt.

MEMBRANAM etiam omnis musculus habet, qua foris tegitur. Tegitur autem, tum ut ab aliis separetur, tum ut ab externis injuriis defendatur.

PINGVEDO tandem in quibusdam adnascitur, quam cum negare vellent nonnulli, turpiter admodum se dederunt, quod vel ex boum mactatorum carnibus id didicisse poterant, & nemo tam in dissectionibus sit rudis, quin viderit mulieram quarundam secundum glutæum, seu fœmur extendentium musculum quandoque ita commisceri pinguedine, ut ambiguum relinquatur, huic caro, an illa carni adnata, vel intertexta sit.

Ex his jam dictis tandem concludimus, musculum vere motus voluntarii organum dici. Cum autem in omni organo quatuor requirantur partium genera, ut Galenus tradidit i de usu part. cap. VIII, quarum primum illud est, à quo primò actio proficiscitur, & cui principatus debetur: *alterum*, sine quo actio perfici non potest: *tertium*, quod meliorem reddit, & iuvat: *quartum* denique, quod conservat. Primi generis erit *Tendo*, modo quidem unitus, modo divisus, qui se, & secum totum musculum ac partem, cui inferitur, contrahit. Secundi, *Nervus*; sine quo actio fieri non potest, cum facultatem motricem à cerebro beneficio spiritus animalis advehat. Terti, *Caro* est; quæ iuvat contractionem. Quarti tandem generis, *reliquæ*: *Venæ* enim, nutriunt; *Arteriæ*, vitam infundunt; *Membrana*, tegunt, ac defendunt; *Pinguedo*, humectat, & ne exsicceetur in nimis motibus musculus, prohibet. In omni autem motu, *Musculus* motum peragit, *Nervus* facultatem advehit, *Cerebrum* autem transmittit.

CAP V T I I I

Enumerantur omnes musculorum differentia, quæ alicuius sunt momenti.

MVSCVLORVM complures sunt differentia, non tamen omnes ejusdem momenti. Quamobrem potiores tantum in medium afferamus, & quæ ad explicandam historiam universam aliquod pondus habere videntur. Sed cum immensus horum sit numerus, ne sine methodo ac ordine quidquam agamus, in tres classes universa musculorum discrimina dispescemus, adeo ut *prima* contineat eas differentias, quæ à toto musculi corpore petita sunt; *altera*, eas quæ à dissimilaribus partibus, principio inquam, medio, ac fine ducuntur: *tertia* denique, quæ à septem similaribus, tendine, carne, nervo, vena, arteria, pinguedine, & membrana desumuntur. Loci autem, ac fontes, ex quibus hauriemus, quinque præcipue erunt, substantia scilicet, figura, magnitudo, numerus, & situs.

Ergo in *prima classe*, quæ **TOTVM MVSCVLI CORPVS** respiciunt, si *substantiam* consideres, alii quidem carnei erunt, quemadmodum sunt plerique linguæ & laryngis musculi; item illi, qui fronti cutis movendæ dicuntur destinati: alii vero, partim carnei, partim tendinei, ut palmaris in manu, & flectentes digitos; alii exterius carnei, intrinsecus nervosi, ut temporales: alii foris nervosi, intus carnei, ut extendens cubitum primus. Si *figuram* spectes, multiplex erit differentia. Quidam enim figuram triangularem habent, & eam æquilateram, sive quæ similis est literæ Δ Græcorum majusculæ, quemadmodum Elevator humeri, qui & propterea Deltoides dictus, adductor item scapulæ ferratæ; aut scalenam, ut obliqui descendentes. Alii quadrilateram, & quidem quadrati, ut primus radii pronator; aut altera parte longioris, ut primus tibiam extendens; aut rhombi, ut scapulæ tertius abducens; aut trapezii, ut detrahens buccas sub collo latitans, *πλάτυσμα μυῶδες* Galeno dictus. Alii pentagonam figuram sortiti sunt, ut adducens humerum, Pectoralis appellatus. Alii rotundam exprimunt, ut Diaphragma. Alii, non figuras Mathematicorum, sed aliarum rerum referunt, & vel Naturalium, ut pisciculos, quemadmodum Biceps, quem & Itali propterea Piscetto appellant;

A magnitudine.

A numero.

A situ.

Differentiæ musculorum secundæ classis. Capitis. Substantia.

Figura.

Magnitudo.

pellant; vel mures excoriatos, ut magna pars musculorum tendentium in tendinem unitum & oblongum: vel Artificialium formas æmulantur, ut annulos, quemadmodum sphincteres vesicæ, & ani, unde hic à Germanis quoque in gallinis annulus dici consuevit. *Magnitudo* quoque varia est. Maximus omnium est primus thoracem extendentium, quandoquidem à fine ossis sacri, ad primam thoracis vertebra, in quibusdam etiam ad occiput usque ascendat: minimus, internus auris: crassissimus, flectentium fœmur tertius, Triceps. Cæteri in horum medio consistunt, & maioribus aut minoribus propius accedunt. Si quis tamen in his distinguendis curiosior esse voluerit, in magnos, medios, & minimos dividat, & singulas classes iterum dispescat in tres ordines, maximorum, mediorum, & minimorum in singulis. Sic Maximi minimorum erunt, qui minimum digitum æquant: Medii erunt, quales sunt plerique laryngis: Minimi, ut auris internæ muscoli, aut qui unguem digiti exæquant. *Numerus*, si quidem omnium musculorum spectetur, à nobis postea explicabitur sub finem. Vtunque autem ipse constans fere sit ac invariabilis, quo pacto sapientissima nostri corporis Parens sibi perpetuo consentit & mutari nescia est, ut quæ ubique perfectionis summum fastigium assecuta, propter quod mutationis indiga non est: inter auctores tamen maxima de musculorum numero dissensio oritur, ob difficultatem quæ hic occurrit in secando, cum & Galenus jam olim conquestus sit, natura ita inter se coaluisse plerosque, ut videantur unus esse, & cum unus aliquis in multos desinat tendines, jam non unus amplius solus esse videatur, sed quot sunt tendines. Si quis vero de singularum partium movendarum musculus sermonem faciat, jam quidem eadem occurrit difficultas: id tamen certum est, alias aliis plures paucioresque habere. Cæterum de hac re loquendi uberior nobis occasio dabitur sequenti mox capite, in quo conabimur, quantum in nobis est, huic difficultati remedium aliquod invenire. Circa *Situm* tot sunt differentiæ, quot locorum discrimina. Alii enim ante, alii retro: alii ad dextram, alii ad sinistram; alii supra, alii infra jacent. Sunt etiam alii in superficie corporis, alii in intimioribus partibus & profundis: alii extra corpus, alii in corpore; extra, ut abdominis muscoli appellati: intra, ut iliaci interni, & *ψόας* dictus. Alii secundum longitudinem locantur, ut biceps cubitum flectens: alii oblique feruntur, ut radii pronator secundus: alii transversum sibi situm vendicant, ut pronator radii quadratus. Et hi, vel ratione corporis totius, quemadmodum muscoli abdominis recti, obliqui, & transversi; vel partis tantum alicujus, ut enumerati.

Quæ à DISSIMILARIBVS PARTIBVS petuntur differentiæ, majoris momenti sunt, & ad explicandam musculorum naturam plus faciunt. Primum ergo recensamus quæ à CAPITIBUS desumuntur, & quidem ab ejus *substantia*: sic alii carnei sunt in exortu, fibris tendinosi tantum interjectis divisique, ut fœmur extendentes, sive Glutæi tres, natium auctores: alii nervei, ut biceps cubitum flectentium primus capite primo, & recti abdominis: alii membranosi, ut aniscliptor: alii mixto constant principio, partim carnosum, partim nervosum, ut alterum caput bicipitis est, quod à scapulæ processu anchoræ simili supra humeri caput defertur, & caput primi extendentium cubitum, sive Longi. Alii partim carnosum, partim membranofum habent principium, ut oblique descendentium abdominis: alii carnosum, sed ossibus interstinctum, ut primus pedem extendentium, Galterocnemius externus, qui mox in exortu sesâminum ossiculum sibi innatum utroque capite habet, quo inferiorum fœmoris capitum vim eludat. Remanent autem hi, vel diu quales fuerunt in ortu, quemadmodum Biceps; vel statim substantiam mutant, ut maximi in sura muscoli, & plurimi in externa internaque cubiti sede, qui mox carnosi redduntur. Alii, principia mista confusa habent, ut Bicipitis secundum est; alii distincta, ut Cucullaris dictus, qui carnosum principio ab occipiti, membranoso à vertebra colli ac thoracis exoritur. A *figura* quoque magna differentia sumitur. Aliis principium est teres, ut bicipiti, & cubitum flectentium primo; aliis rectum, ut tertio scapulæ, sive rhomboidi: aliis fere circulare, ut tribus fœmur extendentibus Glutæis: aliis ferræ in modum compositum, ut serratis dictis, quarto scilicet, & quinto scapulæ musculo. A *magnitudine* exurgunt etiam multæ. Aliis est crassum, ut Glutæis & Deltoidei humerum attollenti: aliis tenue, ut latissimo humerum abducenti: aliis latum, ut pectorali, & eidem latissimo dicto: aliis angustum, ut rectis abdominis: aliis longum, ut bicipiti

ut bicipiti cubitum flectenti: aliis breve, ut rhomboidi scapulæ tertio. *Numerus* capitatis etiam complures suggerit differentias. Plerique enim unum habent caput, quemadmodum pectoralis humerum adducens, Glutæi fœmur extendentes, & cæteri: nonnulli duplex, ut biceps appellatus à gemino capite: alii triplex, vel quadruplex, ut levator scapulæ. Sed præcipuæ differentię suppeditantur à *situ* capitis, sive à loco ex quo ortum adipiscuntur. Alii enim nascuntur ab osse, quemadmodum maxima musculorum pars, alii à cartilagine, ut omnes quos laryngis proprios appellant: alii à membrana, ut omnes oculi, qui à dura membrana nervum opticum investiente, originem suam accipiunt, & Lumbricales dicti in manu, qui à membrana cingente tendines tertii digitorum internodii flexoris enascuntur: alii, quasi ex alio musculo prodeunt, ut duo penis inferiores, qui ab ani sphinctere exoriuntur.

A VENTRE non minus multæ petuntur differentię. *Substantia* tamen fere omnibus carnea est, nisi bigastricis dictis, ubi tendinem habent interjectum. *Figura*, aliis teres, ut bicipiti; aliis angularis, ut rhomboidi. *Magnitudo*, vel magna, aut parva, pro magnitudine ipsius musculi. Sic venter, longus, aut brevis; latus, aut angustus; crassus, aut tenuis. *Numerus*, vel unicus est, ut in plerisque; vel duplex, ut bigastricis, secundo scilicet inferioris maxillæ, & quarto ossis hyoidis.

A FINE tandem inter dissimilares partes potissima derivantur differentię, ex quibus *substantia* hæc suppeditat. Finis, vel simplex est, vel mistus ex duplici substantia: simplex, aut carneus, ut rhomboidis, & intercostalium omnium; aut tendineus, sive pectoralis humerum adducens, & flectentium digitos extendentiumve: aut membranæus, ut oblique descendendum & ascendendum, item transversorum abdominis. Mistus finis, ex carne & nervo, ut inferioris carpum flectentium. A *figura* etiam quædam elici possunt differentię, quia aliis finis est teres, ut temporalium musculorum, sive primi paris maxillæ inferioris: aliis, acutus. A *magnitudine* alii fines sunt crassi, ut pectoralis, & bicipitis; alii tennes, ut plantaris. Alii lati, ut rhomboidis scapulæ; alii angusti, ut omnium teretium. Aliis longissimi, ut flectentium digitos, & palmaris, ac plantam fuccingentis lato tendine; aliis brevissimi, ut quadrati, primi in pronum agentis radium. A *numero*, alii simplicem habent ac unicum, quemadmodum plerique omnes; alii plures, ut flectentes & extendentes digitos. Sed & plures interdum musculi unum constituent tendinem, ut duo suræ maximi, sive pedem extendentes, qui tendinem unicum calci inferunt. Quin & duo cubitum extendentes in unum coeunt; & uni loco implantantur. Sic tres quoque tibiam extendentes maximi, secundus, tertius, & quartus, in unum tendinem nervosum desinunt, qui patellæ adnascitur. *Situs* suppeditat præcipuas. Intellego autem per situm, insertionem. Inseruntur enim vel in ossa, ut plerique omnes; vel in cartilagine, ut laryngis multi; vel in membranas, ut obliqui & transversus abdominis in peritonæi lineam albam; vel in cutim, ut frontis & labiorum musculi.

Tandem à SIMILARIBVS PARTIBVS discrimen musculorum petitur, & primum à TENDINE, qui ratione *figura*, vel unitus est, vel divisus. Vnitus plerumque in principio, & fine: divisus fere semper (si bigastricos tantum excipias) in medio. Si *magnitudinem* spectes, unitus vel longus est, aut brevis; vel crassus, aut tenuis; vel latus, aut angustus; vel planus, aut teres. Si *numerum* inspicias, aut simplex, aut multiplex. Differentias autem tendinis, quæ ratione *ortus* sunt, aut *insertionis*, ex dictis facile colligere est.

CARO nullas differentias, quod sciam, utiles præstat.

NERVVS has porrigit; alii musculi nervum habent, alii ipso destituuntur. Carent, ut pronator radii quadratus; habent, fere omnes reliqui. Ex his autem, aliis in principio, aliis in medium inferitur, & vel superficietenus, vel in intimiora.

Similiter ARTERIA omnibus non adest, quemadmodum lato illi quadrato genas moventi, quem Galenus *ἀδενώμα πινάδες* appellat.

VENAS omnes habent; similiter & MEMBRANAS, per quas etiam à se invicem distinguuntur: sed aliis crassior est, aliis tenuior.

PINGVEDO in omnibus non reperitur hominibus, sed in obesis tantum: neque in omnibus musculis, sed in quibusdam solum, inter quos præcipui sunt Glutæi, & inter hos secundus, qui ilium ossibus obtenduntur.

C A-

Quæ difficultates sese in musculorum historia offerant, & quibus modis tollantur.



RDVAM, maximisque difficultatibus involutam esse musculorum historiam, à nemine nisi admodum rudi, in dubium incertumque revocari potest. Nam cum *numerus* ipsorum pæne immensus sit, fieri profecto nequit, quin summa se offerat protinus difficultas: & cum *incertus* apud eos, qui in hoc argumento hæcenus versati sunt, maxima etiam subito obscuritas nascitur. De *Actione* autem & *Usu*, ita ab omnibus traditum est, ut si quam mihi gloriolam novarum opinionum vendicem, quas veritati propius accedere statuam, quam receptæ sententiæ, non merito profecto à quoquam arrogantiae sim reprehendendus. His tamen omnibus difficultatibus remedium afferre conabimur, ut neque *numero* quis ab hoc studio deterri, nec *obscuritate* defatigari, neque *ignorantia* veri usus errare debeat. *Numero* medebimur ordine: *Obscuritati*, bonis præceptis: *Ignorantia*, experientia, & ratione. Nihil enim tam immensum, quin methodus comprehendat; nihil tam obscurum, quin ratio dilucidet; nihil tam ignotum, quin animus solers investiget.

*Musculorum
divisio.*

Vt ergo musculorum omnem numerum in certas redigamus classes, retineatur divisio illa nostri corporis, quæ supra proposita est, dicendo, *Musculos, vel ad Ventres, vel Artus pertinere*: & ad *Ventres* quidem, qui respiciunt caput, thoracem & abdomen: ad *Artus* autem, qui manus, aut pedes. Cæterum vel integrum Ventrem, vel aliquam tantum ipsius partem respiciunt: utriusque autem tot fere sunt, quot motus ipse obtinet, cum ita pæne comparatum esse cernamus, ut tot cuique parti dicati sint muscoli, quot ipsa motus exsequitur. Quanquam interdum uni motui etiam plures dicantur, & interdum pluribus motibus unus duntaxat destinetur musculus. Vni quidem motui plures, ut flexioni cubiti, quemadmodum & extensioni, duo: pluribus motibus unus, quemadmodum carpi flexioni, & obliquo ad latera motui, flectentes serviunt, illic quidem simul agentes, hic separatim & seorsim. Fere enim ubique id observavit solers Natura, quæ nihil unquam frustra condidit, sed semper vario potius multiplicique usui sua opificia prudentissime destinavit, ut ubicunque *conjugia musculorum sunt, recta si totum par moveat; ad latera, alteruter se contrahens, ducat; sicque postea flectat, aut extendat, cum motu obliquo, unus idemque musculus*. Sed enim ut facile animo comprehendantur, propria singulis nomina assignabimus ab actione cujusvis petita, quibus interdum à situ quoque differentiam addemus. Vocabimus ergo flectentes aut extendentes, adducentes aut abducentes, levatores aut depressores, denique circumagentes. *Flectentes* quidem, qui ad acutum angulum articulum movent; *Extendentes*, qui ad rectam lineam, *Adducentes*, qui ad internam partem; *Abducentes*, qui ad externam ducunt. *Levatores*, qui sursum; *Depressoires*, qui deorsum pellunt. *Circumagentes* tandem, qui membrum in orbem circumgyrant. In hoc ordine non tantum id erit commodi, ut facili negotio quoscunque musculos animo quisque suo comprehendat, sed & situm omnium, tum ratione corporis, tum inter se etiam, id quod scire plurimum profecto ei, qui in hac tractatione cum fructu versari cupit, interest. Vt autem verum omnium *Numerum* assequamur, qui alias ita diversus est, ut nullus Anatomicorum cum altero sit concors, quandoquidem illa diversitas ex eo potissimum orta est, quod duplici nonnulli capite constant, & unicum finem habeant, sicque unicus potius, quam duo videantur esse: nonnulli unicum caput & fines plures, sicque plures potius, quam unus: tum alii diversæ substantiæ capita obtineant, & diverso loco prodeuntia, totam litem sic dirimemus unico præcepto. *Omnes muscoli simplices, aut plures erunt, prout una membrana, vel pluribus, inter se juncti, aut distincti fuerint*. Est enim hoc axioma & principium in arte Anatomica, ut distincti muscoli dicantur illi, qui distinctis membranis involvantur. Sic ergo nobis *Gasterocnemii*, qui ab aliis duo statuuntur, unus erunt, & *Gasterocnemius externus* dicentur, quia una membrana teguntur. Et quanquam cum alio musculo subjacente, quem *Gasterocnemium internum* vocabimus, unum tendinem faciunt, tamen cum

*Prillius la-
r in nupilla-
riam.*

*Numeri pro-
positi.*

Nota.

priore

priore Gasterocnemio externo ipsum non confundemus, quod scilicet ab eo distinctam membranam, quæ ipsum investit, obtineat. Eodem pacto, primus cubitum flectentium, etsi geminum caput habeat, unus tamen erit musculus, quia una membrana est, qua venter postea involvitur in quem capita desinunt.

In *Actionibus* enarrandis nostram sententiam libere proferemus, & qua causa impulsus à communi opinione recedamus, ubi necessarium videbitur, aperiemus. In *singulorum* autem historia persequenda, hanc rationem observabimus, ut diligenter explicemus, substantiam, figuram, magnitudinem, numerum, & situm partium dissimilariarum in musculis, ex quibus fontibus antea differentias eorundem hausimus.

*Altitudo inter-
figato.
Antecedui.*

CAPUT V.

Frontis, palpebrarum, oculorum, nasi, buccarum, labiorum, maxille inferioris, & aurium musculos proponit.



GGREDIAMVR nunc ergo singulorum musculorum historiam, incipientes ab iis, qui ad caput pertinent, inter quos primum locum illis assignabimus, qui in anteriore parte capitis, seu facie occurrunt, cuiusmodi sunt frontis, palpebrarum, oculorum, nasi, genarum, labiorum, maxille inferioris, & aurium.

Ratio ordinis.

Musculi ergo, ab aliis simpliciter *FRONTIS*, à nobis (ut simul usum addamus) *CVTIS FRONTIS* appellati, ii sunt, qui cutem frontis os tegentem adducunt. Quamquam profecto rectius fortasse *Superciliorum musculi* dicerentur, cum non frontis corrugandæ, sed potius supercilii attollendi gratia videantur facti. Quod si adducentem humeri latissimum musculum, non dorsi musculum dicimus, quia in dorso situs est, sed humeri potius, quod & in hunc inferatur, & huius motibus destinatus sit; merito profecto jureque maximo, musculi hi duo qui frontis dicuntur, superciliorum musculi appellandi erunt, in quæ tum implantantur, tum quorum motui inserviunt. Nec ab hac sententia alienus videtur Galenus ipse lib. ix de *Vsu part.* cum frontis cutem & musculum tam stricte coalescere scribit, ut amborum motus unicus sit, qui supercilia attollat. Quidquid huius sit, *oriuntur* hi musculi ab elatiore frontis parte, ubi capillorum finis est ad temporales musculos, eo loci, quo membrana carnosâ cranio firmissime adnectitur, rectaque deorsum progressi, in cutem, quæ supra oculos est, & in supercilia inferuntur. Crassiores sunt in medio, quam in extremis, & revera musculosam substantiam habent, nec (uti nonnullis complacuit) membrana tantum carnosâ sunt, carneis fibris hoc loco aucta, cum ipsi potius subiecti sint, etsi in macilentis difficulter admodum à cute separentur, facilius in obes, quibus inter hos & cutim pinguedo interjacet; quæ ratio quoque est, cur in obes, dum frons attollitur, minus rugis exasperetur. Horum usus est, cutim frontis cum supercilio attollere quandocunque lubuerit, ut illo elato, palpebra una aperiatur. Quod si in media figura maneant (quemadmodum supra diximus in media figura perpetuo hos musculos persistere) nisi pro lubitu arbitrioque nostro dimoveantur, supercilia in situ naturali detinent, qui usus quantus sit, & quam necessarius, tum demum satis nobis manifestum fieri consuevit, cum videmus dissectis à vulnere per transversum ipsorum fibris, supercilia dependere, & palpebrarum apertionem impediri. Quamobrem diligenter etiam horum musculorum fibræ observandæ iis sunt, qui chirurgiæ operam suam locant, ne scilicet in frontis abcessibus, transversim incaute cutim incidant, sed potius fibrarum ductus sequentes, deorsum scalpellum recta diducant.

*MVSCVLI
FRONTIS.*

*Rectus super-
ciliorum mu-
scula dicensur.*

*Revera mu-
sculosam sub-
stantiam ha-
bent.*

Vsa.

Nota.

^a *PALPEBRÆ* duæ sunt in utroque oculo, quarum *superior* sursum deorsumque movetur, ut oculus & aperiri & claudi queat: *inferior* sursum tantum. Debit aperiri, ut videret oculus: sed debuit & claudi, ne periret. Quæ enim ad oculum externa visibilia penetrassent, nisi oculus nudus ipsis exponeretur? Quæ autem ab externis injuriis liber tutusque præstaretur, nisi nuditatem, quando opus est, tegeret defenderetque? His ergo motibus tres destinati sunt musculi, unus rectus, & duo semicirculares. Ille oculum aperit, & propterea à nobis *aperitor oculi*, aut *attollens palpebram* superiorem dicitur: hi contra claudunt, & ideo *claudentes* vocabuntur. ^e *Aperiens*, in superiore orbitæ

*PALPE-
BRARVM
musculi.
Morus pal-
pebrarum.*

*Numerus
musculorum.*

Aperiens.

M

orbitæ

orbitæ regione situs est, supra juxtaque oculi elevatorum, cum quo^a ab eodem principio oritur, nempe ad foramen per quod in orbitam opticus nervus tranfit, eodemque progreditur ductu, eadem figura substantiaque, puta carnea, præditus, donec tandem^b tendine satis lato ab illo discedens, in cartilaginem superioris palpebræ inferatur, cæterum illo paulo minor est, ut qui minus pondus commoveat. Hujus usus, palpebram attollere, & sic oculum aperire. *Claudentes* palpebras, sive *Semicirculares*, duo sunt. Vnus, superior, in superiore palpebra situs; alter, inferior: ille, major est; hic, minor. Non desunt autem, qui singularem esse & unicum velint hunc muscolum: ego tamen geminum statuo, quod in admodum musculosos duos esse perpetuo observari distinctis principiis & insertione, tamen si fibras eorum circulares sese invicem contingere verum sit: his adde, quod distinctos nervos, & à distinctis locis uterque accipiat. Cæterum siti sunt hi muscoli inter membranam carnosam, & eam quæ à pericranio educitur, figuram habentes semicircularem, ex quibus^c superior sive major, ^d acuto principio, ex interiore oculi angulo, & supercilii parte, quæ nasi proxima est, enascitur: sicque versus externum angulum transversim incedit, statim carneus, & ita^e latior factus, ut totum spatium illud occupet, quod inter supercilium & tarsum oculi, sive extremum cartilaginis, è quo pili erumpunt, interjacet, tandem^f in angulum externum inseritur. ^g Minor vero membranofus, ac tenuis, ^h à nasi vertice, juxta anteriorem angulum inferioris palpebræ exortus, principio similiter acuto, ubi, transversim vectus, ad mediam palpebræ partem pervenit, carnosior factus, externum angulum circuit, & ad superiorem palpebram ascendens, ⁱ in ipsam lato sine inseritur. ^j Hi duo muscoli contracti in se, oculos claudunt, cum major superiorem palpebram detrahat, minor inferiorem attrahat, elevetque. Superior ergo palpebra attollitur recto, sive aperiente; interdum etiam ubi opus est, musculo frontis: detrahitur contra, primo circulari, sive claudente: inferior tantum attollitur, & quidem secundo claudente.

OCULO.
RVM mus-
culi.

Motus ocu-
lorum.

Numerus
musculorum.
Ratio nomi-
ni.

Situs.

Primus.

Secundus.

Tertius.

OCULI variis cientur motibus, sed ad tres commodissime omnes referuntur, ad rectos, obliquos, & tonicum. Rectis, moventur sursum, deorsum, dextrorsum, sinistrorsum. Obliquis, voluntur sursum ac deorsum: tonico, ad interna ducuntur. Recto utimur cum oculos elevamus ad cælum, vel deprimimus ad terram, adducimus ad interna & nasum, aut abducimus ad externa. Obliquis, dum amatorie oculum volvimus. Tonico, cum demisso capite cernui terram contemplamur. Rectorum ergo primus, nobis à suo munere Elevator dicitur: secundus, depressor: tertius, adducens: quartus, abducens. Obliquorum primus volvens interior, juncto discriminis gratia nomine situs: alter, exterior. Tonico motui in homine peculiare musculi dicati non sunt, sed in belluis tantum, quod illi os sublimè Natura dederit, cælumque jusserit tueri: has pronas è contra ad passum abjecerit. Vbi ergo opus est, tonico motui recti ad sua principia simul contracti, in homine præfunt. Ex his concluditur, sex esse in universum oculorum musculos, quorum quatuor recti sunt, duo obliqui. Dicuntur Recti aut Obliqui, tum quia motus rectos, aut obliquos efficiunt: tum quia recto, aut obliquo ductu progrediuntur, & oculo inferuntur. ^k Sunt autem omnes in oculi orbita siti, substantia carnei, & figuram pyramidalem cum oculo constituentes. Ex his Recti crassiores sunt obliquis, magisque carnosì: singuli eandem figuram & magnitudinem inter se observantes. Eadem enim quoad principium, omnibus origo est; eadem quoad progressum, structura: quoad finem denique, eadem insertio. Principium enim omnibus est contiguum & acutum, juxta foramen, per quod nervus opticus orbitam oculi ingreditur, à cujus membrana exoriuntur. Medium, sive Venter carnosus omnibus, & teres fere. Finis, tendo tenuissimus & membraneus, quod corneæ tunicæ, qua parte pellucida est, juxta iridem inferuntur, sicque oculum totum antèrius cingunt, oculique candidum constituunt. Obliqui contra tum ab his, tum inter se differunt. ^l Primus ergo, attollens, sive elevator, in elatiori orbitæ sede situs est, depressore paulo major, quod difficilius sit onus aliquod attollere, quam primere. Hic ab aliis etiam Elatus, & superbus dicitur, quod his, præ aliis hominibus, rotundior esse, & ad officium suum promptior videatur. ^m Secundus sive Depressor, parte inferiore, & opposita priori situs est, ipsoque minor, qui ab aliis etiam Humilis vocatur. ⁿ Tertius, Adducens, internum oculi angulum occupat, Bibitorius ab aliis dictus, quod bibentes, ut vitrum intueamur aut poculum, eo uti

confeue-

consuevimus. ^a *Quartus*, abducens, externum angulum occupat, *Indignatorius* dictus, ^{Quartus} quod torvum faciat visum, qualis iratis convenit. ^b *Quintus*, qui *Obliquus primus* est, & ^{Quintus} *Volvens* five *Circumagens exterior* nobis dictus, aut *inferior*, à situ, cum in exteriore, & interna orbitæ sede sit positus, inter oculum & tendines depressoris, & adducents musculorum. *Minor* etiâ à magnitudine, cum sexto admodum cedat. Hic à rima, quæ in inferiore parte orbitæ est, & primum maxillæ os quarto jungit, originem ducens carnosio principio, gracilis, nec penitus teres, oblique toto suo ductu fertur per externum oculi angulum, sensimque ascendens ex inferioribus ad oculi sedem superiorem, in tendinem brevem & aliquomodo rotundum, sed nervosum definit, qui juxta iridem implantatur obliqua linea, inter elevatoris & abducents musculorum tendines, ubi & alter obliquorum inseritur, ita ut idem tendo utriusque esse videatur. Hujus *minimus* est, oculum oblique deorsum ad externum angulum circulari motu volvere, sicque pupillam naribus admovere. ^c *Sextus* qui ultimus est, & *Obliquorum secundus*, ^{Sextus} *Circumagens interior*, aut *superior*, vel etiam *major* dictus, quod omnium oculi musculorum sit longissimus: tametsi ut cæteros longitudine sua universos superat, sic è contrario tenuitate omnibus impense cedat. Hic exacte obliquus, ut præcedens, non est: sed partim rectus, partim obliquus: rectus, quamdiu progreditur usque ad trochleam; obliquus, cum ab hac discedit. *Oritur* ex eodem loco, à quo adducens nascitur, nempe à foramine per quod nervus opticus orbitam intrat, rectaque progreditur versus externam partem interni anguli, quo ubi devenit, modice crassescit, rursusque attenuatur, ac teres efficitur, & per trochleam ibi sitam transit, à qua ubi evasit, flectitur, sed ita, ut rectum angulum cum dicta jam & exposita sui parte constituat, & versus superiorem oculi regionem incedens, jam obliquus fieri incipit, supergrediensque levatori-um musculum, inter ipsius & abducents tendinem superiori oculi regioni inferitur, ubi quintus etiam innascebatur. ^d *Trochlea* autem hæc, sic dicta est à doctissimo Fallo- ^{Trochlea} pio, primo inventore, quod trochleæ & figuram, & usum huic musculo præstet, cum ibi reflectens oculum neutiquam movisset, nisi invenisset, ubi firmare se valens, vires acquireret. Est autem *Trochlea* hæc, cartilago exigua, teres, canalis modo excavata, & particulæ alicujus paleæ non absimilis, quæ in oculi angulo interiore per ligamentum suspenditur: à qua musculus nomen suum accipiens, *Trochleæ musculus* à nonnullis dicitur. *Ufus* est, oculum versus internum angulum circulari quodam motu volvere, sicque pupillam à naribus abducere.

Nas vs non quidem totus movetur, sed ejus tantum inferiores partes cartilagineæ, ^{Nas vs} quas ^{SCVII.} *Alas* vocari supra diximus. Hæ aut adducuntur, aut abducuntur, ut vel aperi- ^{Motus nasi.} antur nares, vel claudantur. Duplici huic muneri, duplex musculorum genus tribu-
tum est, & utrique muneri par geminum, quorum illud Abducentes, aut Aperien-
tes, hoc Abducentes, vel Claudentes nasum, vocabimus. ^f *Primum* ergo *par*, ^{Primum par.} *nasi alius* ^{abducens}, five *nares aperiens*, exiguum est, carnosum magis, quam membranofum, quod ^{ab osse maxillæ, juxta labiorum primum par proprium, & à subjecto ipsi sinu ortum} trahens, ^h partim in nasi alam inferiorem, partim in labii superioris elatiorem partem, & philtrum dictum, inferitur. ⁱ *Alterum par*, utrumque nasi latus contegens, triangulum refert, ^k cum in vertice ipsius acuto & carnosio principio exoritur, descendens-
que oblique per nasi ossa, in latam basin definat, ac carnosum remanens, ^l in alas implantetur. Hæ duo paria, nasi alas versus superiora trahendo, dilatant & aperiunt nares. *Constringentes alas*, five *Claudentes nares*, minimi sunt, ut vix nisi in nasutis exacte ^{Tertium.} videri distinguere queant; quorum *Primum par* externum est & carnosum, circa ala-
rum radicem exortum, quod ascendens transversim eas perrepat, tandemque ubi ad summum dorsum pervenerit, in nasi globulum inferitur. *Secundum* vero, internum est, & in narium cavitate absconditum sub tunica nasi, membraneum ab ossibus nasi, ubi ^{Quartum.} desinunt circa cartilagineas, exoritur, & alis inferitur. Illud, contractum deprimit alas; hoc, introducit, & sic nares constringit. *Constringit autem* ^{GENARPM} *alius adhuc musculus*, qui com-
munis est, ^{Motus genæ.} *Orbicularis* puta labii superioris, qui deorsum trahens labium, nares simul constringit & occludit.

^m *GENÆ* vel *BVCGÆ* tribus agitantur motibus; trahuntur enim deorsum, mo-
ventur introrsum, & extrorsum. *Deorsum*, cum unum oris latus trahimus, ac cynicum ^{spasimum}

Nomen
musculorum.

spasmodum mentimur : *introrsum* aguntur, cum inter comedendum, buccis extra dentium limites excisos cibos in locum suum repellimus : *Extrorsum*, cum buccas inflammas, quod tubicines faciunt. Primis duobus motibus muscoli dicati sunt, & quidem duo, quorum *primus* à Galeno, 1 de dissect. muscul. *ad intro- & extrorsum*, *musculi dilatatio* dicitur, à Recentioribus ob figuram, *quadratus* : *alter*, *Buccinator* ab usu, quasi ad tubarum inflationem conferret, tertiumque buccarum motum perageret, qui nullius tamen muscoli ope perficitur : sed potius laxatis hujus fibris contingit, dum spiritu in oris amplitudine retento, clausis labiis distenditur hic musculus maximam buccarum partem constituens. Quare secunda ipsi actio debetur, nimirum buccarum adductio contractioque, cui à Natura destinatus est. Sunt autem muscoli hi, non proprii buccarum, sed cum labiis communes, ut adeo nec unquam moveantur, quin eodem motu labia quoque trahant ; quia tamen plus buccis, atque illis inservire videntur, ad has potius revocare volumus, sufficitque si moneamus hic, ipsos *Communes buccarum labiorumque* dicendos esse, & quidem primum illum, detrahentem quadratum : hunc vero, contrahentem, aut adducentem communem appellitandum. *Detrahens* ergo *quadratus*, tenuis est musculus, estsi latus ampliusque, membrana quippe carnosus fibris adhaucta. Hic sub cute statim latitans, totamque inferiorem maxillam in facie succingens, originem suam à spinarum vertebrarum cervicis regionibus, colli parte externa, scapula, clavicula, & pectoris osse ducit, sensimque ad faciem obliquis fibris ascendit, & in mento implantatur ea sede, ubi labrum superius cum inferiore jungitur. Hujus munus est, buccas deorsum trahere. ^a *Contrahens* alter, prædicto in superiore sui sede subjacet, totam buccarum eam partem, quam inflammas conficiens, cum ille ipse sit musculus, qui à cohibito in ore spiritu distenditur. Hic à summis gingivis maxillæ superioris, in summas gingivas inferioris terminatur circuli instar, totus tenuis ac membranofus, variisque fibris intertextus, cujus internam partem oris tunica succingit, ut ita prompte ab ipsa separari non possit. Hic dum contrahitur, intro vertitur, sicque cibum, qui extra dentium sepes elapsus est, iterum, quasi manu, in locum propellit, & dum cibum contentur, intus Lingua, foris hic contrahens, cibum quo minus à dentibus decidat, retinet.

Detrahens
quadratus.

Contrahens.

Labiorum
musculi.
Motus labio-
rum.

Nomen
musculorum.

LABIA multis ducuntur motibus. Trahitur enim utrumque *fursum*, *deorsum*, *ad latera*, & *in seipsum*. *Sursum* autem, recta, vel oblique : *ad latera*, dextrorsum, vel sinistrorsum. Quare musculorum alii attollentes erunt, deprimentes, abducentes, aut sphincteres : non tamen cuilibet motui peculiares sunt dicati, sed ut in manu ad latera movent iidem qui flectunt aut extendunt, si scilicet alteruter tantum agat, non totum par : ita hic quoque musculorum attollentium alteruter si agat, oblique labium trahitur : at si uterque, recta. Musculi autem hi, partim communes sunt cum buccis, ut dictum, quos jam enumeravimus : partim proprii, de quibus nunc dicemus. Sunt autem propriorum quatuor paria, quorum *primum*, Attollens par superioris labii dicemus : *alterum*, Abducens ad latera : *tertium*, Deprimens inferni labii : *quartum*, Corrugas & Constringens, quod etiam Osculatorium alias ab usu vocavimus, cum hic musculus labia contrahat dum basia figimus. *Primum par* si simul agat, labium superius recta totum : at si alteruter tantum, oblique alterutrum ejus latus attollit. *Secundum par*, ad latus trahit, vel utrumque, vel alterutrum, prout par totum, aut unus tantum agit. *Tertium*, deorsum totum inferius labium ducit : sed habet socium primum par commune, detrahentem quadratum, à quo oblique etiam movetur ad alterutrum latus, dextrum aut sinistrum, prout alteruter tantum agit. *Quartum*, constringit & in se ducit labium : sed uti semicirculares illi palpebrarum, constringendo se, superiorem palpebram deorsum, & inferiorem fursum trahunt : ita hic Constringentes, five Osculatorii superius labium non tantum stringunt, sed etiam deprimunt : inferius autem simul etiam attollunt. ^b *Primum ergo par*, five *attollens labium superius*, ^c à primo superioris maxillæ osse, ubi mala consistit, principio lato & carnosio educitur, deorsum oblique in anteriora fertur, & ^d in labii superioris latera prope narium pinnas inferitur. ^e *Secundum par*, *ad latera trahens*, five *abducens*, ^f à cavitate malis subjecta, carnosum, sed teres exoritur, multa involutum pinguedine, ^g & in eam sedem inferitur, ubi duo labia invicem conveniunt, & junguntur. ^h *Tertium par*, *deprimens inferius labium*, ab ⁱ infima anteriore-

Primum par.

Secundum.

Tertium.

b. 4. 1. 2.
c. 8.
d. h.
e. h.
f. i.
g. k.
h. l. 1.
i. 2. 7. 2.
d. d.

anterioraque ea sede inferioris maxillæ carneum pronascitur, ubi asperitas quædam est, protuberans ad menti quasi latera, mox oblique ascendens, in labii medium inferitur, latum ubique permanens. ^a *Quartum par, Constringens*, utrumque quasi labium efformat, & in quibusdam maxime conspicuum est, quibus scilicet magna sunt & crassa labia. Constat autem ex substantia fungosa, sed orbicularibus fibris sphincteris instar prædita, ex quibus utriusque labii extrema conficiuntur: quæ in nobis, dum valemus, rubicunda apparent; pallida, dum ægrotamus.

Tandem ^b *MAXILLA INFERIOR* & ipsa plures motus obtinet, cum cibus neque recipi in os, neque dividi acceptus, aut comminui possit, nisi oris cavitas aperiatur iterumque claudatur, dentes autem abducantur, & mutuo collidantur. At cum & in mola, saxo uno quiescente, alterum circummoveatur, si frumentum comminui debeat, quiescente superiori maxilla circumagitur inferior. Habet enim *motus sex simplices*, ex quibus *unus compositus* nascitur, quorum beneficio sursum, deorsum, dextrorsum, & sinistrorsum, & retrorsum ducitur. *Priores duos*, ut cibo intraturo os aperiatur, ingresso claudi possit, & dentes incisori vel canini postea dissecant, aut frangant: ut vero molares & comminuant, *ceteros quatuor*, ex quibus compositus ille constat, quo ad omnes partes circumducitur. Non enim volvitur, ut oculus, sed in diversa trahitur, unde nec uno motu prædita est ut ille, sed ex pluribus composito: neque proprium & unicum obtinuit musculum circumagentem, sed illos habet omnes sibi servientes, qui præstant simplices ex quibus ipse componitur. His motibus quinque musculorum paria destinantur, ut adeo decem in universum sint maxillæ inferioris musculi, quinque à dextro latere, & totidem à sinistro. Horum *primum*, vulgo *Temporales musculi*, *negotiosi* à situ dicuntur, & celeberrimi sunt apud omnes Medicinæ scriptores; à nobis autem, *attollens maxillam temporale par* vocabitur. Hoc maxillam inferiorem valide ad supremam adducit, sicque os claudit, dentesque constringit. *Alterum*, deorsum trahit, & *deprimens digastricum*, sive *biventre* dicitur, invento nomine ab usu & figura. *Tertium*, dextrorsum & sinistrorsum movet. Vulgo *μαστωρ* dicuntur, quod propria eorum actio sit *μασθναι*, manducatio, at nos *laterales ab usu* appellabimus. *Quartum par*, antrorsum movet, & à nobis *abducens pterygoideum* vocabitur, ut usus cum situ jungatur in appellatione. *Quintum*, retrorsum movet, à Galeno *μαστωρ* dicitur, *manforium alterum in ore latitans* vocatum IV admin. anat. IV, & de dissec. muscul. VI. A nobis *adducens maxillam* nominabitur.

^c *Temporalis* igitur *attollens*, totum ossium temporum cavitatem adimplens, ^d principium suum ab osse frontis, ^e *incipitis*, temporum, & sphænoide, carnosum ac semicirculare, & latum habet, qui sensim carnosior redditus, simulque angustior descendit, & sub osse jugali, brevi, sed carnosio validissimoque tendine, ^f in processum maxillæ inferioris, quem *σφαγνύλιν* vocari diximus, inferitur, quem undique & amplectitur. ^g Velatur hic musculus externa sui parte pericranio, quod ipsum supervehitur, & involvit, cum interna parte nudus sit, nudoque accumbat ossi. Est autem hoc loci durum admodum, crassum, ac nerveum, cujus nomine exterius hic musculus livet, proptereaque occasionem dedit Columbo doctissimo, ut exteriorem hujus musculi tendinem esse crederet. Continet enim in media sui carnea substantia, ^h *validi tendinis latum* & quasi semicirculare principium occultatum, quod paulatim coangustatur perinde ac ipse musculus, antequam in *σφαγνύλιν* implanteretur. Hic tendo, per totum dispersus musculus, in causa est, cur ipso vulnerato inflammatoque, acerbissimi succedant dolores, aliaque periculosa & lethalia symptomata. Sed & membrana, qua involvitur, cum ab interna cerebri crassa meninge oriatur per futuras cranii excidente, totamque calvariam investiente, ut inferius monstrabitur, fieri nequit, quin inflammata principium suum primum lege consortii afficiat. Cæterum hic musculus sursum maxillam trahit, & sic os claudit: tanta autem violentia & robore præditus est, ut meminere, me, dum luvens essem, florentibus adhuc annis, aliquot plumbi libras dentibus sustulisse, & portasse.

^h *Alterum par, Deprimens biventre*, à nonnullis etiam *πτερυγοειδής* dictum, quod à styloide processu ossis temporum similiter vocato, initium nervosum & latiusculum ducit, statimque carnosum, tenue, ac teres factum, descendit, ⁱ & in medio, ubi ad flexuram inferioris maxillæ pervenit, carneam substantiam exiit, totumque in tendinem nerveum atque exacte teretem degenerat, pauloque progressum, iterum carneam naturam induit,

Quartum.

MAXILLÆ inferioris musculi.

Motus maxillæ inferioris.

Numerus musculorum.

Primum par.

Secundum.

duit, & juxta latus interthum maxillæ inferioris progreditur, donec perveniat ad anteriorem partem, quæ mento subest, ubi ^a internæ ejus sedi, quæ propterea aliquantulum exasperata est, inseritur. ^b Duos ergo habent ventres hi muscoli, à quibus etiam *Digastrici* vulgo: à nobis Biventre dicuntur, quibus in medio tendo interjacet. hunc ^c membrana quædam adjacentibus partibus adnata, involvit, trochleæ speciem exprimens, quam sapientissima Natura propterea condidit, ut cum muscoli hi ab inferioribus colli partibus originem non ducant, sed potius ex superioribus nascantur, circa infernas maxillæ partes, veluti ad trochleam reflecterentur. Deorsum ergo maxillam movent, & os aperiunt. ^d *Tertium par, laterale*, duplici principio exoritur, quorum ^e alterum nerveum, juxta suturam, qua primum maxillæ os cum quarto jungitur, originem ducit validam, atque amplam: ^f alterum, carneum, ab osse jugali; sicque versus mentum fertur, ^g totique maxillæ inferioris amplitudini, valida infertione implantatur. Hujus fibræ ob capita diversa, & diversimode se respicientia decussatim interfecantur, unde fit, ut quantum ad latera dextrorsum, & sinistrorsum hoc par moveat, tamen simul nonnihil vel ad anteriora, aut posteriora movere queat. *Quartum par, Pterygoideum abducens*, quod antorsum directe ducat maxillam, & quasi abducatur à capite: partim à superno, sed externo latere processum aliformium; partim ab aspera & acuta linea ossis cuneiformis ipsi adjacentis ortum ducit, & quidem initio, tum nerveo valido, tum carnosio, rectis postea fibris progreditur, majus factum & crassius, validoque tendine definit in maxillæ inferioris internam partem lateralem, quæ est sub tendine temporalis musculi, & opposita ei, quam occupat prope hunc finis tertii paris, sicque antorsum mover ipsam maxillam. *Quintum tandem par, maxillam abducens* dictum, quod quasi ad caput ipsam attrahat. Hoc crassum est, ac breve, à cavitate interna processum aliformium nervosum admodum pronatum, mox carneum, amplum, crassumque redditum, recta descendens, maxillæ inferiori, tendine valido, nerveo, latoque implantatur parte interna, sed postrema, juxta sinum per quem nervus ingreditur, ubi ejus gratia asperitates leviter protuberantes inveniuntur. Hic productam maxillam revocat, & retrorsum movet.

AVRIVUM musculi. AVRIVUM musculi duplices sunt, cum alii ad *externam aurem* ab Anatomicis sic dictam, alii ad *internam* referantur: illos, cum Latinis scriptoribus Auriculæ; hos, Auris, doctrinæ gratia vocabimus. Auricula autem, etsi in plerisque omnibus hominibus immobilis sit, raroque inveniatur, qui brutorum instar movere soleant: aliquam tamen ipsi movendi vim inesse, ex eo licet comprobare, quod motus instrumentis præditam videamus, cum & musculi, & nervi circa ipsam reperiuntur. Motus tamen sensui vix evidens est, quod ipsi musculi exigui admodum sint, & propterea etiam à Galeno XVI, de VI. part. VI, & XI, ejusdem XII. delineamenta tantum quædam musculorum vocentur. Si tamen in nonnullis evidentior sit, magisque conspicuus, ii etiam postea hos musculos crassiores corpulentioresque sunt nati. Moventur autem in his quatuor motibus, *sumsum, deorsum, antorsum, & retrorsum*, quibus totidem musculi dicati sunt, *attollens, detrahens, adducens, & abducens*. ^h *Attollens*, in anteriore parte faciei situs, musculo temporali maxillam attollenti superpositus, tenuis est, & membraneus, à fine musculi frontis externo, ubi temporali contiguus est pronatus, sensimque angustior redditus descendit, & in auriculæ superiore partem inseritur. ⁱ *Detrahens*, in posteriore capitis parte situs, latus, carneus, ac fibrosus quandoque invenitur, à mamillari temporum processu originem suam petens. hic in progressu angustatur, & in tendinem definit, qui totam auriculæ cartilaginis radicem amplectitur, sic ut una ejus portio superiorem, altera mediam, tertia inferiorem attingat. *Adducens ad anteriora*, communis est musculus, quippe particula illius, quem vocavimus Quadratum buccas detrahentem. Hic enim nonnquam carnosus redditus, fibrisque suis ascendens, in radicem auriculæ implantatur. *Abducens ad posteriora* in occipitio situs est, ab involucri musculorum occipitii ortus, supra mamillarem processum, principio angusto, deorsum transversim fertur, aurique posterius implantatur. AVRIS vero interna duos musculos habet, nostra ætate inventos à duobus Excellentissimis Anatomicis, Hieronymo inquam Fabricio ab Aquapendente, & Iulio Caserio Placentino. Ex his alter, extra; alter, intra primam cavitatem & tympanum situs est, unde externus ille, hic internus nominatus fuit. ^k *Externus*, ^l *exiguus* est.

Motus auriculæ
Nomen musculorum
Primum par.

Secundum.

Tertium.

Quartum.

Musculi auris.

Primum.

^a, 2, 7, 5, 6
^b, 4, 1, 1
B. B.
^c, ad litteram
C.

^d, 4, 1, 4
I, f, 4, 1, 1
^e, b, 1, 1

^f, b, 2, 2
^g, c, 6, 6

^h, 4, 1, 1, 1

ⁱ, T, T, 1

^k, 4, 1, 1, 1

guus est, à cute & membrana meatum auditorium investiente, exortus, postea carneus fertur. & exterius tendine brevi in membrana, tympanum dictæ, exteriorem partem, ejusque fere centrum, inseritur ea sede, qua intus malleus membranae adnectitur. ^a *In-* ^{Secundum} *ternus* vero, in osse petroso situs est, admodum exiguus. Hujus origo est, in ossis cunei- formis basi eo in loco, quo cum radice processus petrosi, & additamento ossis occipitis foramen effractum constituit: mox carneus redditus, iterumque ubi medium sui supe- ravit, angustior, in duos tendens abit gracillimos, quorum alter, in superiorem mallei processum, alter in cervicem implantatur.

CAPUT VI.

Persequitur historiam musculorum linguae, ossis hyoidis, faucium, & laryngis.



LINGVA, cum non modo vocis primarium instrumentum sit, sed & ci- bis volvendis in ore inserviat, motus voluntarios complures obtinuit. Movetur enim *anteriorum*, & extra os exseritur: trahitur *retrosum*, ad su- periora, ad inferiora, *dextrorsum*, *sinistrorsum* stringitur, & dilatatur. Pro his motibus absolvendis sex musculorum paria accepit, quibus nomina memoriae gratia imponemus, nostro more, ex officio, ortu, ac inser- tione inventa.

Primum par, *linguales* continet, qui à basi ossis hyoidis carnei oriuntur, & in apicem linguae desinunt, longiores quam latiores, & lati magis quam profundi, crassiores etiam in exortu, quam hinc. Obliquis & transversis præcipue fibris donati sunt, sed & rectis, quæ omnes per totum corpus sic disperguntur, & invicem confun- duntur, ut nequeant à sese mutuo, vel summa adhibita industria, seungi. Videtur autem tota linguae moles ex his duobus musculis constare, qui mediante linea candida, quam Hippocrates primus, *διμεῖν*, *Medianam* in Coacis vocavit, dividuntur, quæ superficie- tenus linguam percurrit, & in dextram partem sinistramque secat. Hos linguales etiam idcirco musculos vocavimus, si tamen muscoli dicendi sunt, in quos cæteri deinceps enumerandi terminantur. Quod si quis accuratior in album musculorum referendos deneget, illi ego non usque adeo repugnaverim, cum in omnibus muscoli naturam non referant, nec tamen in omnibus etiam discrepent. Vsum autem, meo judicio, habent, ut *transversa* quidem fibræ, linguae corpus in se contrahant incrassentque: *oblique* vero dilatent, & à sese abducant; at *rectæ*, ad palatum & fauces retrahendo constringant.

^b *Secundum par*, *Extrahens linguam*, *Genioglossum* ab ortu & insertione dictum, quod ab asperitate, quæ in media maxilla inferiore, sed interna facie est, initio angusto sâ- tis pronatum, mox latius redditum, in linguae fere radicem inferatur, contractumque linguam extra dentes labiaque profert. *Tertium par*, *Retrahens*, *Hyphoglossum* eadem ratione dictum, ex ossis hyoidis media superioreque sede ortum, carneum, secundum linguae longitudinem productum, in ipsius medio inseritur. Hoc contractum, intro & ad posteriora recta trahit. ^c *Quartum par*, *Attollens*, *Myloglossum*, ab inferioris ma- xillæ interno latere, juxta molarium dentium radices, initio lato exoritur, fibrisque transversis delatum, sub linguae basi, in ligamentum, qua faucibus ligatur, inseritur. Hoc, si totum agat, linguae apicem recta sursum & retrosum, ad palatum & supe- riores dentes elevat: at si alteruter contrahatur, in suum tantum latus oblique attol- lit. ^d *Quintum par*, *Deprimens*, five *Ceratoglossum*, à superioribus ossis hyoidis cornibus, si quidem adsint: sin desint, ab humilioribus enascitur, & in linguae latera, juxta ejus radicem inseritur. Hoc si totum agat, lingua deprimitur, versusque inferiores dentes recta deorsum & introrsum: at si alteruter, oblique in alterutrum tantum latus trahi- tur. *Sextum par*, *oblique trahens*, *Styloglossum*, carnosum, gracile, à styloide processu, acuto principio exoritur, & crassius latiusque factum, linguae lateribus implantatur, ut si alteruter agat, lingua ad latera recta dextrorsum aut sinistrorsum ducatur: sin uterque, ad ipsas fauces retrahatur.

^e **OS HYOIDES** sursum movetur, deorsum, *anteriorum*, *retrosum*, & ad latera. Hos motus præstant quatuor musculorum paria. *Primum* enim par, recta sursum movet, & simul modice *anteriorum*: *secundum*, deorsum recta, & parum *retrosum*: *tertium*, & *quartum*

LINGVÆ musculi.

Motus lin- guæ.

Numerus musculorum.

*Primum par.**Secundum.**Tertium.**Quartum.**Quintum.**Sextum.*

OSSIS HY- OIDIS mu- sculi. Motus ossis hyoidis.

Primum par. *quartum* ad latera, sed illud sursum nonnihil, hoc simul deorsum. ^a *Primum par*, quod *recta* attollens vocabimus à primario usu, & *Geniohyoideum*, quod à *genti*, sive maxillæ potius inferioris mento subjacentis interiore parte, enatum, in basin ossis hyoidis, circa clatiorem partem, ubi sinus ejus gratia exculptus est, amplo sine inferatur. *La-*
Secundum. *tum* hoc est, breve, & carneum. ^b *Secundum par*, *detrabens*; *Sternohyoideum*, à sterni elatioris internæque sede, latiusculum & carneum exortum, sub cute in collo, ad asperam arteriam, & laryngis thyroïdem cartilagineam attensum, ascendit, eadem semper servata amplitudine & substantia, ac tandem in basin hyoidis infigitur. ^c *Tertium par*, *e*, *P. R.*
Tertium. *oblique sursum trabens*, sive *Styloceratohyoideum*, ^d à processu styloïdis radice exortum *d*, *b. b.*
Quartum. *in cornua hyoidis totum gracile ac teres* ^e ea sede definit, ubi cum basi junguntur. *e*, *c. c.*
^f *Quartum*, *oblique deorsum trabens*, *Coracohyoideum* appellatum, gracile ac longum, ut nullum hoc simul gracilius & longius in corpore reperiatur, ^g duplici donatum est ventre ^h *h*, *L. L.*
ⁱ *tendit* tendine distincto, quemadmodum secundum par maxillam inferiorem detrahens. *h*, *c.*
^j *Oritur* enim carnofo principio ex superiore scapulæ costa, juxta cervicem ipsius, ac processum Coracoidem, & sub scapulæ elevatore, (quem Patientiæ musciculum vocavimus) occultatus ac latitans, ^k oblique sub caput flectente pari mastoideo ascendit, *k*, *x.*
^l ubi, ut ipsi veluti digniori cedat, ^l carnosam substantiam exiit, & in tendinem nervosum ac teretem degenerat. Hunc ubi superavit, iterum carne donatur, carnosusque remanet, ^m donec in cornua hyoidis, eadem sede ac par tertium, sed loco paulo inferiore, *m*, *h.*
ⁿ inferatur.

FAUCIUM *musculi.* *FAUCIUM* musculi, à nonnullis *Pharyngis*, sive principii Oesophagi musculi dicuntur, cum caput Oesophagi superius, membrana faucium esse videatur. Sunt autem illi, qui deglutitioni inserviunt. Cum enim pro nostro lubitu deglutiamus cibos potumque, necessario musculi, instrumentum voluntarii motus, creandi erant, quos Natura oesophagi principio merito jure maximo tribuit. *Dilatantur* autem fauces, vel *constringuntur*: & dilatantur quidem, paribus duobus; constringuntur autem, tribus. *Primum par dilatans*, quod aliquibus *sphenopharyngeum* dicitur, à cuneiformis ossis acuto apice, principio tenui & nerveo nascitur, per internam pterygoïdis cavitatem descendit, & in tendinem tenuem definit, qui in palati partem cutaneam, à qua gargaræon dependet, inferitur. *Secundum par*, ab eodem fere loco prodiens, & descendens, in totam fere faucium lateralem, ac posteriorem partem inferitur. *Primum par constringentium*, *Oesophagiæum*, α-*so*phagi superiori & posteriori parti præpositum, quod totum carneum est, lata origine secundum laterum scutiformis cartilaginis longitudinem exortum, sphincteris musculi more circa gulæ initium circumferitur, adnasciturque fibris transversis, quibus caput gulæ in deglutitione constringi consuevit. ⁿ *Secundum par*, *B. B.*
^o *in faucium posteriore ac laterali cavitare, quam ambit, situm, Cephalopharyngeum* dicitur, propterea quod ortum suum habeat inde, ubi caput cervicis primæ vertebræ jungitur, postea descendens, in hyoidis latera, thyroïdem cartilagineam, & oesophagi principium, cuius tunicam conficere videtur, inferitur. ^o *Tertium par*, *Stylopharyngeum* appellatum, ^p *p*, *c. c.*
Tertium. ab interna styloïdis processus facie, gracili principio exoritur, & tendine membranaceo, thyroïdi cartilagini, lateribus ossis hyoidis, & radici linguæ implantatur.

LARYNGIS *musculi.* *LARYNGIS* (sic vocant Caput asperæ arteriæ) musculi dicuntur, non quod moveant Laryngem totam, sed quod cartilagine ipsius. Cum autem ex cartilaginibus quatuor constet, tres tantum sunt mobiles, Thyroides, seu scutiformis, & duæ Arytænoides, sive guttales. Cricoides, annularis dicta, immobilis est, quia illas sustinet, cum omne mobile moveatur super immobili, & quiescente. Sunt ergo duplices Laryngis motus, quibus tum dilatatur constringiturque, tum clauditur & aperitur: unde & *duas articulationes* nacta est, quarum singulæ diversis motibus inserviunt. *Prima* enim est thyroïdis cum cricoide, per arthrodiam: *altera*, arytænoidis cum eadem cricoide, per ginglymum. Dilatatio & constrictio, pendet ab illa: clausio & apertio, ab ista. Itaque cum Thyroides dilatetur, & constringatur; Arytænoides vero, è contra aperiatur & claudatur: voluit Galenus, in thyroïdem dilatantes & constringentes musculos; in arytænoidem vero, aperiennes & claudentes inferi: ut jam concludendum sit, *laryngis musculos, alios esse dilatantes, alios constringentes, alios aperiennes, alios claudentes.* *Constringitur* larynx cum thyroïdis latera flectuntur, & intro moventur; *dilatatur*, cum eadem

eadem extenduntur, & foras pelluntur. Sic clauditur, cum arytænoides flectitur, & in cavitatem truditur: *aperitur*, cum extenditur, seu extrorsum revellitur. Vterque autem motus, vel rectus est, vel ad latera. ^a *Flectens Thyroidem* ergo, unum par est, quod *Hyothyroides* dicitur, propterea quod ab ossis hyoidis tota inferiore parte, latum, carnosumque exoriatur, sicque descendens rectis fibris, totamque thyroidem cartilagineum exterius contegens, ^b in ejus infimam partem implantatur. Hoc dum contrahitur, superiorem thyroidis partem flectit, introrsum pellit, & sic rimulam constringit. Trahit simul etiam laryngem sursum; unde fit, ut nos ipsi in nobis, dum acutam vocem formamus, laryngem sursum ferri, observare soleamus. *Extendentium thyroidem*, duo sunt paria. ^c *Primum*, vulgo *Bronchium* dictum, at nobis invento nomine nostro more, ab ortu & insertione, *Sternothyroideum*. ^d Hoc à sterni superiore, & interiore parte, ubi jugulum est, initio lato, & carnosum exortum, eandem latitudinem & substantiam servans, fibris rectis toto ductu lateribus arteriæ asperæ attensum, ascendit, tandem in thyroidis infernum latus, eodem fine inseritur. Inferiorem thyroidis partem constringere, simulque totam deorsum trahere creditur, unde superior pars extenditur, unaque rimula dilatur. Hunc motum deorsum versus, similiter notare licet, & tactu percipere, dum gravem vocem edimus. Atque *hec duo paria Communia* ab Anatomicis vulgo dicuntur, quod caput, sive initium in alia parte habeant, quam Larynge: sequentia autem omnia, dicuntur propria, quia tota sunt in larynge, initium ab ipso, & finem habentia. ^e *Alerum par extendentium*, *Cricothyroideum anticum* dictum, in inferiore, & antica laryngis parte positum, originem habet carnosam, à cricoidis cartilaginis antica parte, & in lateris exterioris thyroidis inferiorem sedem carneum implantatur. Hoc dum contrahitur, extendit cartilagineum, & sic rimulam dilatat, pro gravi ac magna voce. *Flectens recta arytænoidem*, sive *Claudens rimulam primum par*, *Thyroarytænoidem*, carneum, ac latum, in laryngis amplitudine transversum situm est, & à thyroidis parte interiore media, secundum totam ejus longitudinem exoritur, sursumque progressum, in latera Arynæoidis, quæ glottida constituunt, inseritur. Hoc arytænoidem cartilagineum ad thyroidem trahit, à posterioribus antorsum ducit, & sic glottidem comprimit, & claudit. Hoc par, si in angina inflammetur, cum exacte claudat rimulam, lethalem morbum adducit. ^f *Flectens ad latera*, sive *Claudens secundum*, *Arynæoidem*, admodum parvum est, & exile, carnosum, obliquis fibris ab arytænoidis incipiens, ubi jungitur cricoidi, & in arytænoidem definit, ubi cum conjuge colligatur. Hoc arytænoidem oblique, & ad latera, dextrorsum, aut sinistrorsum movet, sicque basin ejus constringit, & glottidem claudit. ^g *Extendens recta*, sive *aperiens rimulam par primum*, *Cricothyroideum posticum*, à cricoidis postica & inferiore sede, carnosum exortum, mox rectis fibris ascendit, & cavitatem quæ in cricoide est adimplens, in inferiorem arytænoidis sedem, qua cum cricoide articulatur, nervosum definit. Hoc extendit arytænoidem, & retrorsum ad exteriora convertit, sicque glottidem aperit. ^h *Extendens ad latera*, sive *aperiens rimulam secundum*, *Cricothyroideum laterale*, à cricoide, qua parte latior est, angusto principio carneum prodiens, mox amplius factum, ad arytænoidis latera juxta articulum implantatur, ea parte, quæ à priori pari attacta non est. Hoc extendit ad latus, sicque rimula aperitur. Ex his manifestum est, opponi inter se, primum flectentium & primum extendentium: secundum item cum secundo. Quantum enim secundum par flectentium ad mutuum contactum trahit, tantum secundum extendentium exterius deducit, & invicem disparat.

Flectens Thyroidem.

Extendentium Thyroidem. Primum par.

Secundum.

Flectens Arynæoidem. Primum par.

Nota.

Secundum.

Extendens Arynæoidem. Primum par.

Secundum.

CAPUT VII.

De musculis Caput, & Cervicem moventibus.



NTER musculos, qui ad caput referuntur restant adhuc illi, qui caput universum movent. *Movetur* autem CAPUT, motu vel primario, vel secundario: *primario*, supra primam colli vertebrae antorsum, & retrorsum, hoc est, flexione & extensione, eaque vel recta, vel obliqua, prout totum par simul agat, aut alteruter tantum contrahatur musculus. Deinde supra secundam, circa processum ejus dentiformem,

CAPITIS musculi. Motus Capit. Primi.

N

circum-

Secundaria.

Numerus
musculorum.

Flectens.

Extendentes.
Primum par.

Secundum.

Tertium.

Quartum.

circumvolutione quadam, veluti ad axem. Secundario motu, & per accidens, beneficio colli, quo modo caput movetur similiter ante & retro, sed & ad latera, dextrorsum & sinistrorsum. Dicamus primo de iis musculis, qui proprii sunt capitis, & septem paria numerari solent, ita ut in quovis pari unus musculorum dextram, alter sinistram partem occupet. Ex his unum par flectit, quatuor extendunt, duo circumagunt.

^a FLECTENS par, à nonnullis *Mastoideum* dicitur, quod ad processum temporum mastoideos, sive mammillares inferatur. Anteriore colli parte situm est, sub quadrato buccas detrahente musculo. ^b Oritur autem duplici principio, cavitate quadam inter se distincto, quorum alterum nervosus est, & à summo sterno incipit: alterum, carnosus, & à claviculæ parte elatiore, qua sterno conjungitur, procedit. Oblique deinde, totum carnosum redditum, ad collum ascendit, longum potius, quam latum, & latum verius, quam teres in initio; at ubi ^c ad mammillarem processum devenerit, teres fit, & carnosus crassoque sine ipsi inferitur. ^d Hoc in homine etiam vivo observatur, præsertim in macilentis & senioribus, in quibus admodum conspicuum est. Quod si totum par agat, caput recta flectitur: sin alteruter tantum musculus contrahatur, caput ad anteriora quidem ducitur, sed ad latus.

^e EXTENDENTIUM primum par, *Triangulare*, aliis *Splenium* dictum, oblongum est, latum, & vertebri inlustrum, duplicique principio exoritur. Altero enim ex apicibus quintæ, quartæ, tertiæ, secundæ, & primæ thoracis vertebrarum prodit, altero à quinque inferiorum colli vertebrarum spinis, ubi rectis fibris sibi mutuo nectuntur, & ^f cum ad tertiam colli vertebram pervenerint, sejunguntur, ^g fibrisque nonnihil obliquis in occipitio medio, quod inter utramque aurem est, inferuntur. ^h Intervallum hoc, quod interjacet inter utrumque cum diducuntur, triangulum æquilaterum fere efformat, ⁱ quod exprimit etiam totus musculus, sed scalenum, à quo & nomen imposuimus, ut triangulare par vocaremus. ^k Primum latus, amplum est, ab exortu usque ad tertiam vertebram, ubi dehiscunt: ^l alterum, ab hoc loco ad occipitium: ^m tertium, ab occipitio ad exortum. Est autem hoc par in thorace nerveum, in cervice vero carnosum. ⁿ Secundum extendentium par, priori subiectum, *Trigeminum*, aut *Compositum*, quod à distincto triplici principio sit præditum, ut ex tribus musculis in unum coeuntibus conflatum esse videatur. ^o Primus, principium acutum habet, ex transverso processu, quartæ, & quintæ thoracis vertebræ enatum, quod illico ab exortu carneum redditum, per reliquas thoracis vertebrae, ascendit, & ubi ad colli radicem pervenerit, carneam naturam exuit, inque teretem tendinem abit; mox vero, ubi hunc superavit, iterum carneam induens substantiam, usque ad occipitium ascendit, ibique in medium ipsius inferitur. ^p Alter, à septimæ cervicis vertebræ spina, brevi, nerveo teretique principio oritur, sed mox ascendens carnosus redditur, & cum priore ante ejus insertionem coit. ^q Tertius, ex primæ secundæque thoracis vertebrarum transversis processibus, partim nervosus, partim carnosus prodians, oblique extrorsum reductus, ad radicem processus mammillaris, cum secundo junctus, occipitio valide affigitur. His musculis, aut secundi paris principiis variis, carnea quædam moles subjicitur, & secundo pari adjungitur, ita ut secundum hoc par ex quatuor quinqueve initiis, aut musculis constare videatur. ^r Tertium par, *Recti majores* dicti, sub propositis statim occurrunt, parvi sunt, substantia carnosæ, forma graciles, teretesque. Hi ab apice spinæ secundæ colli vertebræ prodeunt, ubi contigui sunt invicem, sed statim à se diducti ascendunt, & in medium occipitium inferuntur. ^s Quartum par, *Recti minores* appellati, sub majoribus siti sunt, quibus figura, substantiaque & progressu respondent, sed magnitudine cedunt. Teretes enim à tuberculo primæ colli vertebræ, spinis aliarum dorsi vertebrarum analogo, contigui similiter prodeunt, mox à se invicem abscedentes, & sursum delati, in occipitium medium desinunt, sub finibus rectorum majorum. Horum musculorum omnium ope, si totum par simul agat, caput recta extenditur: at si alteruter, in latus movetur. Præfecit autem sapientissima nostri corporis architectrix NATURA tot musculos extensioni capitis, quod ad acutum fere angulum caput extendendum erat, ut Homo cælestium corporum contemplationi commodius vacaret. Ad hoc autem requirebantur parvi muscoli, cum longi id præstare non possent. At quia iidem invalidiores necessario futuri erant, nec diu officio

fatis-

satisfacerent, cum pondere suo caput ad anteriora ruat, magnos longosque in auxilium surrogavit. Moventur ergo semper longiores prius, at ubi admodum acutum ad angulum caput extendendum est, recti subveniunt. Voluit enim Natura, ut assidue caelestium corporum divinas moles contemplando patriæ nostræ memores redderemur, & illa simul revocaremus ad animum, quæ dignos nos caelestium animorum jugi societate post obitum aliquando præstarent.

CIRCVMAGENTIVM duo sunt paria, qui vulgo *Obliqui* dicuntur à situ, estque alterum par superius; alterum inferius; utrumque subjacens rectis extendentibus, quibus substantia & forma respondet. ^a *Superius par*, è medio occipitio juxta externum latus rectorum majorum exortum, oblique descendens, in apicem transversus processus primæ colli vertebræ transversum inferitur. ^b *Inferius par*, à spina secundæ cervicis vertebræ pronatum, oblique ascendit, & in processum transversum primæ vertebræ cum præcedente inferitur. Hi cum contrahuntur, circulariter versus spinam, retro primam vertebram super secunda circumagunt, unde fit, ut caput super ipsam consistens, una circulariter moveatur. At quia exigui admodum sunt, duo priora extendentium paria, ubi alteruter agat, horum motum (non secus ac rectorum, ut antea diximus) adjuvant.

Circum-agentes.

Superius par.

Inferius.

Caput etiam *secundario moveatur ratione cervicis*. Cervice enim mota, caput ipsi incumbens una cietur. Habet autem CERVIX motum quadruplicem, cum agatur ante, retro, dextrorsum, & sinistrorsum. Absolvuntur hi motus quatuor musculorum paribus, non tamen ita, ut quilibet motus suos sibi proprios vendicat, sed cum duo paria priora flectentia sint, & antorsum moventia, duo posteriora extendentia retrorsum: si simul illa agant, aut hæc, caput recta: at, si alteruter, oblique ad latus, flectitur, aut extenditur. Quod si vero flexores & extensores sui lateris simul contrahantur, in illud latus, dextrorsum aut sinistrorsum agitur, in quo ipsi suum situm obtinent. At si omnes simul agant, cervix erecta & rigida servatur, ac in tonico motu, ut in Tetano. Duo ergo prima paria flectentia erunt, quæ parte anteriore colli, ut primum; & laterali, ut secundum, locata sunt: reliqua duo extendentia, in posteriore colli parte, sub capitis musculis.

CERVICIS musculi. Cervicis motus. Numerus musculorum

FLECTENTIVM ergo ^a *primum par*, sive *Longum*, sub œsophago jacens, longum est, principio acuto & carneo, à quintæ thoracis vertebræ corpore, parte anteriore, ubi costæ jungitur, enatum. Hoc superiora petens, omnibus vertebrarum corporibus à latere adnectitur, usque ad primam cervicis, ubi uterque musculus se tangit, & acuto nervosoque tendine definit in processum primæ vertebræ, qui est analogus corporis vertebrarum reliquarum, ut cervix flectatur. ^b *Secundum par flectentium Triangulare*, sive ut aliis placet, qui simul speciem trianguli, quod refert sua figura, exprimunt, *scalenum* dictum, carnosam amplamque originem, à prima superioreque thoracis costâ habet: postea versus caput iter faciens angustatur, & in omnium colli vertebrarum transversos processus (prima & secunda nonnunquam excepta) qua interiora spectant, obliquis fibris terminatur. Hi musculi si simul agant, rectâ anteriora versus, cervicem, & consequenter caput flectunt: at si alteruter solum agat, in latus contracti antorsum cervicem inclinant.

Flectentium primum par.

Secundum.

^a *EXTENDENTIVM primum par*, à sex superiorum thoracis vertebrarum transversis processibus (unde *Transversales* quibusdam dicuntur) exorti, paulatim crassiores facti, in omnes cervicis vertebrarum processus transversos, externa sede infiguntur. *Secundum par*, inter spinas situm, unde & *Spinatum* aliquibus vocatur, totam cervicem occupat. Hoc è radicibus spinarum septem superiorum thoracis vertebrarum principia plura sumit, sursumque ascendit, ac similiter ex singulis transversorum processuum cervicis radicibus alia sibi afficit; tandem hisce, in totam inferiorem spinæ secundæ vertebræ partem valide implantatur, ubi dexter cum sinistro jungitur, etsi toto per cervicem progressu mutuo sibi ita accubuerint, ut, non nisi spinis à sese disparati fuerint. Hæc duo pariter cervicem primo, deinde & caput extendunt; vel recta, si uterque simul agat; vel oblique, si alteruter tantum.

Extendentium primum par.

Secundum.

CAPUT VIII.

De musculis Thoracis.

THORACIS musculi.



ABSOLVIMVS musculos omnes, qui ad primum Ventrem, sive Caput pertinere videbantur: nunc eorum aggrediemur historiam, qui ad secundum mediumque referendi sunt, quos **THORACIS** musculos doctrinae gratia vocabimus: etsi non ignorem vulgo ab Anatomicis sic appellari illos tantum, qui respirationi dicati sunt, & vel dilatant thoracem, aut constringunt; quibus opponuntur **DORSI** musculi, qui thoracem extendunt. Verum cum ab horum sententia sim alienissimus, & eos musculos plerosque omnes, qui communiter ad respirationem facere dicuntur, alium usum habere longe diversum ab eo, qui vulgo docetur, & ratione, & experientia anatomica invenerim, à me hoc loco *Thoracis musculi* vocabuntur, omnes quicunque ad thoracis, hoc est, medii Ventris motum quemcunque conferre statuuntur. Dico quemcunque; ut non solum intelligatur ille, quo dilatatur, & stringitur: sed &, quo flectitur, aut extenditur.

Thoracis motus.

Primarii.

Secundarii.

THORAX ergo, vel primario movetur, vel secundo. *Primario*, à musculis sibi propriis; *secundario*, à musculis lumborum. Motis enim lumbis, thorax ipsis incumbens, una necessario movetur, quemadmodum cervice mota, Caput, ut dictum est. Cietur autem quintuplici motuum genere, *primario*; cum dilatetur, & constringatur, flectatur, extendatur, & ad latera circulariter moveatur: *secundario*, triplici. Ad latera enim movetur, flectitur, & extenditur. Dilatatur autem Thorax, & constringitur, respirationis gratia. Respiratio autem duabus constat partibus; Inspiratione, in qua recipitur aër, & attrahitur in asperam pulmonum arteriam; & expiratione, in qua iterum à pulmonibus expellitur: in illa, cum sine thoracis motu respiratio nunquam fiat, thorax dilatatur; in hac, contrahitur, & in se stringitur. In Dilatatione autem, non totus thorax dilatatur, sed tantum ejus partes inferiores, superioribus contra modice angustatis: in Contractione vero, inferiores constringuntur, superiores partes è diverso nonnihil dilatantur. Quamobrem & Natura sapientissima, cum universum thoracem intertextis ubique inter carnes ossibus, flexibilem motuique accommodatissimum reddidit: tum vero infimas ejus partes cartilaginibus fere solis muniendo, imprimis ad hunc usum adaptavit. Ceterum etsi hic motus naturalis alias sit, non quidem, quod citra musculi subsidium perficiatur, quo pacto alios motus naturales fieri cernimus (semper enim Diaphragma hic primas partes tenet, quod musculus vere est, & recte esse statuitur;) sed quia nobis ad respirationem etiam non advertentibus, Thorax nihilominus semper amplior sit aut angustior, ne unquam respiratio deficiat, cum qua vita pari passu perpetuo ambulat: vere tamen & animalis motus est, quandoquidem respirationem intendere, aut sistere ad tempus, pro nostro arbitrio, quam commodissime possumus. Quis enim in loco admodum calido constitutus, thoracem, ut aërem attrahat in copia, pro suo lubitu non extendit: contra in admodum frigido, non aliquantulum contrahit? Si ergo motus est voluntarius, ut instrumentis motui huic destinatis, hoc est, musculis peragatur, necesse est.

Musculi Thoracis ex opinione aliorum quot sunt.

Respiratio duplex.

Ab Anatomicis ergo **MUSCULI THORACIS**, (sic vocant,) *id est, dilatationi, & constrictioni ejusdem inservientes* sexaginta quinque recensentur, à nonnullis etiam plures, illis scilicet, qui Intercostrales, in Interosseos atque Intercartilagineos, sed male, ut postea probabimus, distinguunt. Vtrique ergo lateri thoracis, triginta duos assignant, nempe *intercostrales viginti duos*, ex quibus undecim externi, totidem interni sunt: *utrumque utrique lateri communem*, puta *Diaphragma: quatuor* deinde musculos, *Abdominis* vocatos, de quibus sequenti capite, & tandem *sex Thoracis proprios* appellatos. Iam ipsam *Respirationem* duplicem quoque faciunt; unam liberam, alteram coactam. *Liberam* vocant illam, in qua aëris quantum sufficit, placide tum accipitur, tum expellitur: *Coactam* vero, in qua magna vi, & magna copia attrahitur, similiterque truditur. Illa contingit, cum naturaliter se calor noster habet; hic, cum præter naturam. Illa, citra nostram voluntatem sit, unde & *Naturalis* jure dicitur; hæc, nostro arbitrio concurrente

rente accidit, ex quo *Voluntaria* à nobis non inepte vocabitur. Illa, à solo diaphragmate contracto, aut laxato fit: hæc, cooperantibus diaphragmati cæteris musculis sexaginta quatuor, ut ipsi dicunt.

At enim, ut lubentissime amplector hæc omnia, simulque coactus experientia concedo, in libera respiratione diaphragma solum moveri: ita è contrario novi, in coacta, solos intercostales musculos, & Diaphragma operari. Rejiciuntur ergo à me, tum abdominis quatuor paria, tum sex thoracis conjugia propria. At ne citra rationem rejici videantur, nostræ opinionis fundamenta breviter hic proponemus, refutatis argumentis, quæ Adversarios in hanc sententiam protraxere. *Ac quod musculos Abdominis attinet*, ut ab iis exordium nostrum petamus, duo primariò videntur esse, quæ doctissimos Viros adduxerint, ut respirationi eos inservire crederent. *Primum* est, quod non visu solum, sed & tactu deprehenderint, in thoracis validioribus motibus, musculos hos, proportionem quadam observata cum Thoracis motu; moveri. Inspirare enim si qua vi cupias, abdomen protinus exigi dilatarique videbis; expirare si è contra cupias fortiter, inigi advertes, & intro contrahi: ut propterea Galenus, lib. de dissect. musc. cap. xxvi, ad exsufflationes, & ad vocatas spiritus cohibitiones, sive *respirationes*, ut Praxagoras olim vocabat, tum ad acutas quoque magnasque voces edendas, Naturam hinc musculis uti, non veritus sit scribere. *Alterum* argumentum est, eam partem moveri semper, in quam fines musculorum desinunt. Quod si jam anatomica inspectio demonstraret, abdominis musculos in thoracem inferi, quemadmodum Andreas Laurentius probavit, oblique descendentes illic desinere, finemque suum figere; profecto sequi hinc merito jureque videtur, Abdominis musculos thoracis motibus plurimum auxilii præstare. At enim nihil hic quidem promptius erit nobis, quam his rationibus satisfacere. Nam quod primam spectat, haud ulla ratione diversus ab iis sum, qui in utraque respiratione motive abdominis musculos una cum thorace uniformiter moveri credunt, quin lubentissimo illud animo amplector, ut cui testimonium perhibet ipsa experientia; non tamen propterea, quod ipsi hinc inferunt, unquam elargiar, instrumenta videlicet eo nomine fieri respirationis, numerumque illum musculorum, qui respirationi serviunt, augere. Nec enim thorax, costæ, quod hi muscoli moveantur, sive distenditur, seu stringitur: sed si quis motus thoracis est, ille totus quantus quantus Diaphragmati ac Intercostalibus musculis acceptus referendus est. Et hoc ipsum erat, quod postulatur, ut thoracis dilatationi constrictione inservire dicantur, ut videlicet, ex ipsorum contractione motive thoracis ille motus consequeretur: cum contra fieri videas, ut motus abdominis, qui in valida respiratione percipitur, moto thorace accidat, cum elevetur in inspiratione, ut cedat descenditibus visceribus, & contrahatur in expiratione, ut ascenditibus iterum in suum locum, sese undique accommodet, eaque contineat. Solent enim cum Diaphragmate in respiratione viscera una descendere, & ascendere, quemadmodum id in vivis dissectionibus eleganter intueri licet. Ex quibus consequi videtur, accidentalem tantum hunc motum esse: neque musculos ipsos per se contrahi, sed vel pelli, thorace dilatato; vel iterum recedere in suum locum, constricto.

In secundo argumento errorem noto doctissimorum alioquin Columbi, & Laurentii, qui oblique descenditium abdominis finem circa thoracem esse crediderunt, originem autem à superiore offis pubis illiusque parte, tum à transversis lumborum processibus. Nam si recta rem omnem tecum reputes, ipsamque potius inspectionem consulas, quam vanos novarum opinionum fucos, aut probabiles sententias, principium horum musculorum (quod paulo post, cum de abdominis musculis agemus, demonstraturi sumus,) ex inferna parte costæ sextæ, septimæ, octavæ, & nonæ, antequam in cartilagineas abeunt, carnosum, tum à membrana è vertebrarum lumborum ligamentis, & dimidia offis ilii appendice membranofum enasci deprehendes. Id quod, etsi & argumentis probari quamplurimis nullo negotio poterat, unicum tamen duntaxat hoc loco, sed Achilleum in medium adducemus. Cum enim apud omnes dissectionum Proceres, tanquam axioma quoddam, & indubitata fidei principium receptum sit, illic perpetuo musculorum originem esse, ubi nervorum insertiones comparent, cum nunquam in finem, raro in medium nervi implantentur; profecto circa costas, dictasque partes, principium horum musculorum esse, necessum est. ^a Singulis enim fibris pecti-

*Sententia
Authoris.
Ex opinione
Authoris.*

*Musculos ab
dominis ad
respirationem
nihil facere.
Argum. ad-
versariorum.
Primum.*

Secundum.

*Responsio ad
argumenta.*

Ad primum.

Ad secundum.

natis, quibus cum ferrato majore conjungitur, ex enumeratarum costarum interstitiis finguli nervi porriguntur, ut nemo possit ambiguus, vel anceps animo de origine porro hærere, dummodo vel concedat Anatomicis suum principium, vel ipsi sensui propriam fidem nolit derogare. At enim cum doctissimi Viri & ipsi habeant argumenta, quibus

Principium oblique descendentium esse circa pubis ossa. Argumentum primum.

suam opinionem fulciant, neque sint admodum de nihilo, illa hic in medium afferenda esse merito censuimus. *Primum*, inquit, si statuamus finem oblique descendentium circa Ilium & pubis ossa, aut ea mobilia dicendum erit esse, aut acculanda imprudentiæ

Secundo.

Natura, quæ musculos motus voluntarii organa, in partes immobiles inseruit: at illud dicere ignari erit motuum humani corporis, cum sciant omnes immobilia esse pubis & ilium ossa: hoc vero summæ impietatis, quandoquidem nimis quam verum illud est, Naturam nihil unquam temerario consilio; sed omnia summa potius & incredibili providentia construxisse. *Secundo*, eandem rationem, quæ nostræ sententiæ fuit fundamentum, contra nos adducunt. Nam Galeno teste, inquit, si nervi in musculorum vel principia, vel paulo post, raro in medium, nunquam ultra medium desinunt, & musculi hi nervos habere conspiciantur circa pubis os, & lineam candidam, profecto principium ipsorum circa has partes esse necesse est, finem autem circa costas. Neque vero alio instituto, illic principium, hic finis positus est, nisi ut costas deorsum trahendo, thoracem una constringant. Sed enim magni hi Viri, dum à Galeno in hoc negotio discedunt, & imprudenter mihi facere, & ejus opinionem non recte assecuti videntur.

Responsio. Ad primum.

Largiamur enim ipsis, ilium & pubis ossa immobilia esse: indene recte inferent, propterea musculorum finem illic non esse? Nam ex Galeni quidem sententia si loquamur, nihilominus hi musculi officio suo fungentur, cum munus eorum præcipuum ipso docente sit, abdomen sua contractione comprimere: quam certe compressionem citra pubis ossium motum quam optime perfici posse, quis est qui non observet? Cum enim abdomen convexum sit & prominens, maxime ubi cibo potuve Ventriculus turget, horum musculorum contractione ab utroque latere in planum componitur. Quamobrem non bene illi videntur concludere, qui, quod ilium ossa moveri non credant, propterea musculorum oblique descendentium fines illic inferi haudquaquam posse existimant. Sed & ego in sequentibus demonstraturus sum, revera & pubis & ilium ossa moveri, tamen unanimem omnium Anatomicorum, qui hæcenus quidquam in lucem prodiderunt, in contrariam sententiam consensum esse videam. Nunc ad secundum argumentum me confervo, in quo ut haud ægre concedo, Nervos circa lineam candidam iliumque

Ossa pubis & ilium moveri.

Ad secundum.

ossa conspici: nego tamen ex iis esse, qui sensum motumve his musculis offerant, de quibus scilicet Galenus loquitur, cum Nervos inquit in musculorum capita desinere, vel paulo post, vel circa medium, nunquam ultra medium. ^a Nervi enim illi perforant, & pertranseunt hosce musculos, non sane ut iis inferantur, quod dictis Authoribus visum est; sed ut hinc ex abdomine, mox ad membranam carnosam cutimque digerantur, sicque his partibus sensum præbeant.

Conclusio.

Sed de hac re plura dicendi locus infra dabitur: nunc sufficiat demonstrasse, Abdominis vocatos musculos, ad dilatationis constrictionisve in Thorace motum nihil omnino facere; cum non his motis Thorax: sed potius Thorace moto ipsi moveantur. Falsum autem & hoc est, finem oblique descendentium circa thoracem inferi; quod si vero Ascendentes, & Recti inferantur, jam longe alio fine, quam thoracis gratia inferi, inferius ostendimus, ubi horum musculorum actio aperitur. Quinimo de cæteris etiam, quos proprios Thoracis appellant, quid statuendum sit, membratim dicemus postea, cum singulorum historiam persequemur. Nam quod ^b Subclavium attinet, cum Clavicula inferi statuimus, ut ipsam deorsum trahat. Ostendimus enim finem non habere circa primam costæ partem, ut communis est opinio: sed potius in clavicula. ^c Serratum vero majorem scapulæ assignabimus, similiter demonstrantes Anatomicos circa principium ipsius hallucinatos fuisse. ^d Duos posticos ferratos, superiorem, ac inferiorem, Dorso Capitique musculos continere, ne in validis motibus exorbitent, & propterea ligamentorum annularium, in manu ac digitis positorum, munere fungi dicemus. ^e Sacrolumbum autem, Dorso oblique extendere similiter probaturi sumus. Quare jam concludentes dicimus, musculos thoracem dilatantes constringentesque non alios esse, præter Diaphragma, & Intercostales: & Diaphragma quidem semper movere, & solum in libera

Musculi Thoracem dilatantes ex sententia Authoris.

a. s. l. f. N. N.

b. 4. 12

c. D. E.

d. 4. 3. & E.

e. K. F.

libera ac naturali respiratione: in coacta autem, Intercoſtialium operam ſibi adjungere. Dilatat autem & conſtringit Thoracem, unus idemque muſculus *Diaphragma*. Quæ res ſi prima fronte mira alicui videatur, cum vix mente multis comprehendere poſſe credatur, quomodo contrarii motus ab eodem muſculo proveniant: mirari is mox deſinet, ſi advertat tale quid in ſphinctere quoque muſculo, tam veſicæ, quam ani compa-
 rare. Idem enim Sphincter, & conſtringere poteſt veſicam, contrahendo ſe, ut continet urinam: & dilatare eandem, laxando ſe, ut urinam reddat. Sic diaphragma, contrahendo ſe ad principium, Thoracem dilatat: at laxando, conſtringit, ut in uſu ejus jam demonſtraturi ſumus. ^a *Intercoſtales* vero muſculi, ut duplices ſunt, externi, & interni; ita etiam duplici funguntur munere. Illi enim, dilatationem in coacta respiratione adjuvant: hi, conſtrictionem.

^b Muſculus ergo, qui *Διφραγμα* Platoni dicitur, Hippocrati *Φέρις*, & *Διφρεξίς* vocatur, *Diaphragma* matris Nomina. *Διφρεξίς*, quod ſecernere, & ſeparare ſignificat, quia ſcilicet infimum ventrem à medio ſeparat. Ariſtoteles communiter *Διφραγμα* appellat, *Succinctum*: interdum & *Περί-ζωμα*, & *Πανζωμα*. Galenus modo *Διφρεγμα*, modo *Φέρις* vocat: at Latini Corn. Celſum ſequentes, communiter *Septum tranſverſum*, ab officio, & ſitu. Plinius, ob viciniam cordis cui prætenditur, *Præcordia*, quaſi *πρεκαρδιαν*: at Macrobius, *Diſſeptum* vocat. Nonnullis, qui Græcam vocem *περίζωμα* exprimere ſtuduerunt, *præcinctum* appellatur. Eſt autem *Diaphragma*, muſculus, unus omnium fama celeberrimus, id quod hæc vocum, qui-
 bus apud diverſos authores venit, multitudo ſatis ſuperque teſtatur. *Situm* habet in corpore tranſverſum, Thoracem ab infimo ventre ſeparans. Situs autem eſt obliquus, ob thoracis, quem ſuccingit, obliquum ambitum, quem ſterni infima pars, & cartilagi-
 nes ſpuriarum coſtarum conſtituit: quare & *magnitudo* ipſius tanta neceſſario eſt, quanta ambitus univerſus mediæ ventris, quem ſuccingit. *Figuram* obtinet nulli alteri muſculo communem, cum muſculus ſit latus, tenuis, atque orbicularis, & ^c in medio ſui principium naſtus, ^d à quo, tanquam à centro ad circumferentiam fibræ craſſæ ex-
 currunt. ^e In medio enim habet circulum quendam nerveum, qui ejus origo eſt, quem circum ^f alius quidam, totus carnes conſiſtit, per quem, ^g fibræ ab illo egreſſæ, ad peripheriam ſparguntur. Quemadmodum autem circulus interior, quo vicinior cen-
 tro, tanto nervoſior eſt: ita quo coſtis & thoraci propius accedit exterior, tanto car-
 noſior craſſiorque ſemper efficitur. Anneſcitur enim, & inferitur toti thoraci intrinſe-
 cus: ^h anteriore quidem parte, ſterni infimæ ſedi, prope mucronatam cartilaginem, quæ ejus eſt propugnaculum, tum ultimæ veræ coſtæ: ⁱ à lateribus, coſtarum ſpuriarum ex-
 tremis, & toti duodecimæ coſtæ: ^k poſterius vero, cum undecimæ dorſi vertebræ, quam ſpectat, inferi debuerit; at vero ibi ^l arteria magna deſcendat, & ^m lumbalis adne-
 ſcatur muſculus, *Ψόας* dictus; in ⁿ duos veluti proceſſus (quos *productiones Diaphragmatis* vocant) deſinit, hinc inde ad vertebraſ inferos, nervoſos, & carne commixtos, qui acu-
 tiores redditus deſcendunt, donec ad excarnes lumborum vertebraſ uſque devenerint, ^o ubi valida inferione implantantur. Muſculus hic etſi unicus ſit, in ſtrutura tamen ſua duplex eſſe omnibus modis videtur. Conſtat enim, ut dictum eſt, primum ^p duo-
 bus *circulis*, quorum ſubſtantia, partim nervea, partim carnea eſt: deinde ^q *Venas* ha-
 bet duas à trunco cavæ aſcendentis, Phrenicas dictas: duas item *arterias*, venarum
 comites, & homonymas: totidemque ^r *nervos*, à ſpinali medulla, Cervicis vertebris
 incluſa, inter quartam, & quintam vertebram prodeuntes: duas etiam *membranas*, qui-
 bus integitur; ſuperiorem, quæ thoracis cavitatem reſpicit, à pleura; inferiorem, quæ
 ventriculū & jecur ſpectat, à peritonæo originem ducentem. Duo quoque ſunt *forami-
 na*, quæ habet: ^s alterum, à dextris, in circuli nervei medio, pro Venæ cavæ ex convexa
 hepatis parte ad cor, aſcenſu: ^t alterum, à ſiniſtris, poſterius nonnihil, ut æſophago, &
 duobus nervis ad ventriculū deſcendentibus, tranſitum præbeat. ^u Inter utramque
 productionem, diviſio quoque eſt ſemicirculo ſimilis, per quam Arteriæ magnæ truncus, &
 Vena ſine pari, ſive *ἀδρυα*, tum nervi ſexti paris deſcendunt. Hoc, dum contrahitur ver-
 ſus principium, fibræ omnes colliguntur in ſe, & Thoracis inferiores partes, quibus in-
 feruntur, ſic propellunt, ac cavitatem ipſius ampliorem reddunt: at dum laxatur, ſurſum
 abit (quo pacto in mortuis cadaveribus ſemper reperitur, quod exſpirando moriamur)
 & ita una trahit intro inferiores thoracis partes, cavitæſque minor ſit, ac conſtringitur.

• INTER-

INTER-
COSTA-
LES mu-
sculi.

^a INTERCOSTALES Musculi quadraginta quatuor numerantur; in quovis scilicet latere viginti duo; ex quibus undecim externi, totidemque interni sunt. Nam cum ^b duodecim costarum interstitia undecim sint, in singulis musculi locantur. Sunt autem omnes hi musculi lati admodum, sed pro costarum à se distantia minime longi, toti carnei, obliquis fibris donati, unde cum contrarias habeant fibras, fit, ut se decussatim interfecerint. *Externi* ergo, à superiorum costarum inferna regione orti, in inferiorum proxime costarum elatiorem sedem inferuntur. Initium autem habent primum à transversis vertebrarum processibus, quibus costas suo capitulo adnecti diximus: mox carnosius, obliquas fibras validas deorsum & antrorsum spargunt, sicque progrediuntur per totum costarum ductum, donec perveniant ad cartilagineas, ubi costæ ossæ esse desinunt, ibi enim & ipsæ terminantur. *Interni musculi* contra, ab inferiorum costarum superna regione orti, in superiorum proxime costarum inferiorem sedem implantantur. Hi non à processibus vertebrarum, ut externi, sed potius ab ea parte, qua costæ paululum inflectuntur, originem trahunt, mox carnosius obliquas fibras sursum & antrorsum porrigunt, ac totum costarum intervallum implent, non tantum qua parte ossæ sunt, ut dicti: sed etiam, qua cartilagineæ, eodem semper servato fibrarum ductu, donec tandem in ipsius os pectoris, sive sternum desinant. *Cæterum*, cum externi musculi circa cartilaginum initia desinebant, ita ut spatia intercartilaginea vacua relinquantur, hinc factum est, ut Natura, quæ à vacuo ubivis abhorret, illa inania intervalla internis muscularis expleret, proptereaque ad exteriorem illius spatii superficiem elevaret. At enim evenit postea, ut, quia fibræ partis, quæ inter cartilagineas est, diversæ; imo contrariæ videantur illis, quæ inter ossa collocatæ sunt: nonnulli, etiam ex iis, qui familiam ducunt inter Anatomicos, Intercostales musculos sexaginta octo enumerarint, alios dicentes musculos esse Intercostales, alios Interossæos; & utrosque iterum, vel externos, vel internos. Cum ergo undecim costarum intervalla sint, verarum quidem sex, & quinque spuriarum: in verarum singulis quatuor collocant, duos interossæos, & duos intercartilagineos: in quolibet autem spuriarum spatio, duos tantum. Externi ergo musculi contracti ad suum principium, sursum, & extrorsum costas ducunt, unde thorax dilatatur, & sic cavitas major fit: Interni vero, sursum, & introrsum, unde contrahitur, & cavitas fit minor.

EXTENDITVR deinde Thorax; cui motui quatuor musculorum paria Anatomici destinant: quorum *primum*, Dorfi longissimum: *alterum*, Semispinatum: *tertium*, Quadratum: *quartum* denique, Sacrum appellant: ex his priora tantum duo amplectimur, posteriora vero lumbis adscribimus. Nam & in lumborum vertebrae inferuntur, & lumbos movent, ut postea dicemus, quantumvis de hoc lumborum motu ante me Anatomicorum nullus mentionem fecerit. Adjicio autem illis duobus Dorfi tertium par, quod *Sacrolumbum* vocatur, sed vulgo constituitur unum ex illis, quæ thoracem dilatant. Nec enim profecto vel mente animoque concipere valeo, quomodo ille ad thoracis dilatationem quidquam faciat: ut taceam (quod certe unice meæ opinionis veritatem evincit) uno principio, quemadmodum audiemus, continuo cum dorfi longissimo enasci; unde profecto necessario sequitur, in usu quoque in eundem finem conspirare. Non enim muscularis, diversis actionibus & partibus dicatis, ut manifestum est, unum continuumque caput habere convenit. *Primum* ergo ^c Thoracem extendentium,

Dorfi longissimum dicitur, non tantum quod inter dorfi musculos, sed universos totius corporis longissimum est, cum ab extremo ossis sacri enatum, ad primam usque thoracis vertebram, quandoque ad processum etiam mammillares ossium temporum porrigatur. ^d Hoc ex spinis omnibus ossis sacri, & vertebrarum lumborum, itemque interna ossis ilium sede, qua sacro nequitur, principio extrinsecus nervoso admodum & valido, sed acuto; intus vero carnosius, egreditur: postea ascendens, vertebrarum lumborum transversis processibus innixum, carnosius redditur, ^e ac singulis transversis vertebrarum thoracis processibus, sensim angustius redditum, ab undecima ad primam usque, unum tendinem nervosum, veluti *ansulam* largitur, & sic tandem ^f in primam thoracis vertebram definit: nonnunquam, ut diximus, usque ad processum mammillares temporum, quibus implantetur, ascendit. Huic pari ^g Sacrolumbum totum externo latere adjacet, ^h L. L. cuius principium cum principio hujus unum idemque est, & ab extremo ossis sacri usque

Cum nonnulli
tra Inter-
ossæos
fibras posue-
runt.

Extendentes
Thoracem.
Numerus.

Sacrolumbum
par thoracem
non dilatatur.

Primum par.

A. 4. 18.
K.

B. 2. 7.

E. 4. 3.
H. 1. 1.
I. 1. 1.
L. 1. 1.

A. 4. 4.

E. 4. 5.

F. 4. 4.

G. L. L.

usque ad duodecimam thoracis vertebram, adeoque toto per lumbos progressu continuum. ^a *Secundum par thoracem extendentium, Semispinatum*, totum vertebris incumbit, ^{Secundum} inter spinosos, sive posteriores, & transversos processus. Hoc ^b à duodecimæ thoracis vertebræ spina principio acuto erumpens, mox carneum redditur, ^c *singulis thoracis spinis* nervosos tendines, quo pacto prius par processibus transversis, veluti anfulas nerveas elargitur, donec tandem ^d in spina primæ thoracis vertebræ, acuto fine definat. ^e *Tertium, Sacrolumbum*, ut diximus, commune & idem principium habet ab osse tum sacro, tum ilium, ut & vertebris lumborum cum Dorfi longissimo, cuius quoque externo lateri toti totum adjacet: sed ubi ad duodecimam thoracis vertebram devenit, duo musculi esse videntur, etsi profecto difficillime à se sectione separentur, similiterque sensim tenuius redditum, ^f *singulis costis thoracis* duos tendines, sive nerveas anfulas, similes prædictorum, ea parte, quæ incurvantur & nonnihil inflectuntur costæ, inserit. Cæterum notandum est, ex his tendinibus nonnullos foris esse sitos, quosdam in facie interna. Qui foris sunt, & cutem respiciunt, majores sunt quasi duplo, & longiores robustioresque: ex adverso, qui interiorem sedem occupant, tenuiores. Cuius ergo costæ duos largitur tendines, unum foris jacentem, alterum intus: qui ^g foris situs est, inferiori costæ parti; qui ^h intus, superiori inseritur. Horum ergo musculorum munus est, Thoracem, & totam dorfi spinam extendere. Et quanquam à me, ne recedam ab Anatomicorum consuetudine dissecandi numero, tria paria recensentur: revera tamen unum tantum par est, quemadmodum tum videre licet ex principio continuo, quid vero dico continuo? imo vero uno eodemque, dorfi scilicet longissimi & sacrolumbi: tum quia difficillime admodum ipsa sectione separari possunt. Quod si verum est illud quoque Anatomicorum axioma, quod supra fundamenti loco proposuimus, singulos musculos proprias habere membranas, quibus toti involvuntur: hi autem muscoli singulis recti undique non sunt, ut cuius videre licebit in sectione, merito unus certe constituendus videtur. Crediderim autem Anatomicos ideo separasse, quod viderint anfulas diversis partibus inferi. Nam *Longissimus* transversis processibus: *Spinatus*, spinis: *Sacrolumbus* vero, flexuræ costarum duos largitur. Sed enim Natura, ut ubivis solertissima est, sic hoc summa fabrefecit providentia, & hoc pacto commodo motui commodissime prospexit. Ut enim extenderetur thorax, musculus alicubi inferi necesse erat: at inferi uno fine continuo non poterat, quia carneus imbecillior, tendineus autem neutiquam bene costis inter se disparatis implanatus fuisset: plures ergo fecit tendines, ut singulis costis singuli essent; & quia illi tendines non poterant commode totam partem occupare, plures fecit, quorum alios circa spinas, alios transversos processus, alios costarum flexuras inseruit, iis scilicet locis, ubi vel articuli sunt, vel robur ad motum habent. Sic videmus & ⁱ Sacrum lumborum musculum, triplici anfularum genere donatum esse, per omnia similem his tribus, nec tamen triplicem ab ullo musculo, sed unicum duntaxat poni. Cæterum quidquid ^{vis} hac re statuatur, tendines duorum, spinati inquam dorisque longissimi, recta dum contrahuntur extendunt: at sacrolumbi, si alteruter agat, oblique: sin totum par, priorum duorum actionem adjuvat.

His musculis adnumeramus duos illos, quos *serratos posticos* appellant, non quidem, quod in dictorum actione obeunda concurrant: sed quia actionem eorum conservent, & expeditiorem reddant. Nec enim extendunt thoracem, ut illi, sed prohibent tantum, ne in violenta validaque dorfi, atque capitis musculorum, quos similiter continent, contractione exsiliant. Ex quo patet, eos munere fungi prorsus eodem, quo ligamenta annularia, quæ circa carpum ac digitos cernuntur. Prohibent enim tendines musculorum digitos flectentium, ne dum contrahuntur, ex suis sedibus labantur. Sic primus humerus circumagentium musculus, ut in historia ipsius dicitur, & potissimum supra capite sexto libri tertii jam dictum est, ligamento secundo humeri in suo loco retinetur. Nam quod aliqui hos thoracem dilatare credant, nullo unquam tempore, quo pacto fieri id queat, animo colligere potui. Sunt enim ita imbecilles, cum nihil fere carni obtineant, sed toti quanti ex membrana consistit, ut nulla ratione tam validæ actioni, qualis hæc profecto est, præesse possint. Taceo, quod ipsis costis non inferantur, sed tantum musculis; at certe ut ineptum fuisset, tam valido motui tam imbecilles

Tertium.

Refertur ij
Anatomici
circa nume-
rum musculorum
dors.

Circa ejusmodi
anfula facta.

Vfus ex op-
tione dicitur.

Refertur u-
sus, quæ ad
flectendum dicitur
tenuia.

1.

2.

imbecilles musculos, utpote membranofos destinare: ita ineptius profecto etiam, in
 3. carnes & musculos inferere, ut Thorax moveretur. Et quomodo, sodes, dilatabitur cavitas thoracis, trahentibus his musculis costas ad spinas, & quidem superiores, cum potius in dilatatione Thoracis inferiores ipsius partes extendantur, superiores constriungantur, ut demonstratum est, sed nec dubitari à quoquam potest? Caterum duo sunt, quorum alter Serratus posticus superior, alter inferior dicitur. *Serrati* quidem vocantur, ob serratum finem, hoc est, ferræ in modum denticulatum: at *Postici* ad differentiam aliorum, qui in anteriore corporis sede locati sunt, ut duo illi ultimi scapulam moventes; quartus inquam, & quintus. Vocantur deinde *superiores*, aut *inferiores*, ratione loci, quem inter se in dorso occupant. ^a *Superior* ergo supra ^b musculorum capitis primum par, sive Triangulare situm est, minor ^c inferiore. Oritur ^d à spinis vertebrarum trium inferiorum colli, & primæ thoracis, membranofus ac tenuis; obliquo deinde progressu descendens, carneas fibras assumit, ac ^e quatuor superiorum costarum tribus intervallis tripartito fine ac serrato inseritur. ^f *Inferior*, similiter membranofus, ^g ex spinis vertebrarum duarum, quandoque trium inferiorum dorfi enatus, transversim ^h supra dorsum extendentes defertur, & fibris carnis adauctus, ⁱ ad costarum inferiorum quatuor intervalla inseritur.

FLECTITUR Thorax, cum versus terram antorsum incurvatur. Huic motui nullum assignarunt Anatomici muscolum. Ego vero ^k *Rectos ipsi abdominis*, si quidem flexio recta fiat: sin ad latera, ^l *Ascendentes obliquos* tribuo. De his capite proprio dicitur, cum de Abdominis musculis sermonem auspicabimur, quos male sic Veteres vocabant, cum abdominis tantum usui destinatos crederent, nec scirent quo pacto Thoracis motibus inservirent. Quamvis autem huc proprie illi referendi sint, quod hæc actio illa longe sit nobilior, quia tamen (dummodo error agnoscatur) haud multum interest, quemcunque in locum rejiciantur, & ea quæ à majoribus nostris sunt tradita, aut longo usu communia facta, si quo modo tolerari possint, non temere deferenda sint, sub nomine musculorum abdominis, quod à secundo usu acceperunt, de iis postea agemus.

Supereft tandem circularis motus, quo ad latera Thorax ducitur. Hunc in nobismet ipsis sedentibus, aut stantibus, dum inferiores partes quiescunt, nos autem ad latera superiores, puta thoracem & ipsi incumbens caput trahimus, levi negotio licebit advertere. Absolvitur autem à ^m *Transversis abdominis musculis*, de quibus & mox acturi sumus, cum in ipsorum actione multa egregia Naturæ secreta, nec ab aliis usque adeo bene adversa, abstrusa lateant.

CAP V T I X.

De musculo Subclavio.

Subclavius
 musculus.



visus ex alio
 rum opinione
 rejicitur.

1.

2.

3.

visus ex alio
 rum opinione
 rejicitur.

Subclavius ⁿ musculus vocatur ille, qui sub Clavicula situs est, & spatium ^o illud, quod inter ipsam & primam thoracis costam interjacet, totum occupat. Habet hic ^p principium carnosum à primæ costæ elatiore parte, ea sede, ubi sterni jungitur, deinde ^q obliquissimo, ac quasi transverso ductu ascendens, ^r in claviculæ partem humiliorem, quæ costam respicit, prope acromium, carneo fine, eoque lato implantatur. Huic ^s *munus assignant Anatomici*, in coacta respiratione primam costam sursum & extorsum trahere, ut thoracis cavitas nonnihil amplior fiat, quo nomine & principium ejus in clavicula, finem vero in prima costa reponunt. At vero cum Galeni autoritate, in dilatatione inferiores potius partes, quam superiores extendantur, imo superiores constriungantur, non video quamobrem sic dilatari debeant superiora. Accedit, quod obscurum adhuc sit, quem usum præstare valeat ejusmodi unius saltem costæ dilatatio: ut taceam, quam male ponatur principium ad claviculam, cum nervus circa costam inseratur, consentientibus unanimi omnibus consensu, exortum cujusque musculi ad nervi implantationem esse. Quamobrem alium nos assignabimus ^t *usum*, nempe detrahendi Claviculam, cum sursum una cum scapula mota est. Revocandum enim hic in memoriam erit, quod supra secundo libro propositum est, Claviculas scapularum gratia,

gratiâ, quas sustineant, conditas esse. Cum ergo scapulæ sursum eleuantur (ut quilibet vel in seipso explorare potest) simul clavicula tollitur, quæ ut postea in locum redeat, musculo detrahente subclavio indiguit. Nec enim benignissima Parens, utcumque suo pondere in locum redire posse videri poterat, quod omne grave deorsum sua natura feratur, musculo destitutam esse voluit, cum nonnunquam, ut decumbentes, eo beneficio careremus. Quare motus voluntarii instrumentum ipsi impertiit, non secus ac humero quoque detrahentem musculum concessit, quæm Rotundam appellabimus. Accedit, hoc ipso non tam claviculæ, quam scapulæ ipsi prospectum fuisse, cum ea alioquin, nisi claviculæ beneficio propter hunc musculum una detraheretur, detrahente musculo (at quanto malo) & loci situsque sui injuria caruisset. Cæterum hunc verum esse usum haud multa industria edoceri possumus, solis clavicularum fracturis vel leviter consideratis. Ecur enim si frangantur hæ juxta sternum, humerus subito cum scapula decidit: & illa pars, quæ sterno proxima est, ascendit, sursumque erigitur, uti testatur Chirurgorum maximus Hippocrates, lib. de fracturis: sin contra juxta acromium rumpantur, neutram partem ascendere conspicias? Hujus sane rei causam investigans doctissimus Hippocrates dicto loco, ingeniosam quidem rationem adducit, non tamen, si recte rem expendas, cum difficultates patiatur plurimas, veram: vera autem hæc est, quam ex Anatomicis fontibus deducimus. Cum musculus inseratur illi parti, quæ juxta acromium est, dum bifariam frangitur Clavicula, statim contrahitur musculus Subclavius, (ut solent muscoli, fractura facta, subito in se coire) sicque humerum, ac humero appensam scapulam una secum detrahit; altera autem pars, ut quæ vi musculi detinebatur in loco, ab ipso sic libera facta recta ascendit: quod si rumpatur juxta acromium, non ascendit, quia musculus detinet adhuc Claviculam. Quæ sane res manifeste etiam nobis, ut cætera taceam, ostendit, principium in costa, finem autem in clavicula ponendum esse, contra ac cæteri Anatomici hæcenus omnes ad unum fecerunt.

C A P V T X.

De infimi Ventris, & primum, de musculis Abdominis appellatis.



VIDIMVS supremi mediique Ventris musculos: restat nunc ut INFIMI quoque inspiciamus. Hi vel totum infimum Ventrem movent, vel aliquas tantum ejus partes. Totum movent, qui Lumbos flectunt, aut extendunt: at partes, qui vel externas movent, & quidem anteriorem duntaxat, quam proprie Abdomen vocant: vel internas, ut testes, vesicam, anum, & penem. De his ordine nunc agemus, initium capientes ab iis musculis, qui abdominis motui dicati sunt, quod in sectione prius occurrant. Musculi ergo Abdominis vocantur, antiqua appellatione, quod abdominis, hoc est, anterioris in imo ventre partis motui inserviant, qui usus primis hujus nominis impositoribus solus erat cognitus, cum potius Thoracem flectentes, vel circumagentes rectius dicerentur, inventa appellatione ab usu primario, ut supra cap. VII diximus. Horum a Galeno quatuor recensentur paria, quæ utrumque abdominis latus integrum, & obvelant & comprimunt: nostro tamen sæculo studio industriaque diligentissimi Gabrielis Fallopii quintum par accessit, quod ab ipso quoque nomen accepit, ut Fallopiatum dicatur. Hoc, non nego, cum totum abdomen non comprimat, sed levem tantum ipsius partem, haud ita bene cum cæteris abdominis par dicetur: ne tamen in vocabulis nimium curiosi videamur, cum aliis hoc nomine dignabimur. Majoris momenti illa quæstio est, quam multi agitarunt, sitne distinctum à cæteris par, an iisdem tantum veluti particula connexum: at revera peculiare propriumque esse, ab inventore sic probatum est, & probabitur paulo postea à nobis, ut jam dubitationi nullus sit amplius locus, nisi potius sensibus nostris, & rationi ipsi, quam authoritati Veterum aliquid derogare velimus. Sed ut, nos hodie multa adhuc latere, modestiæ cujusdam est ingenuæ confiteri: sic plurima Veteres olim latuisse, prudentiæ.

INFIMI
VENTRIS
muscoli.
Morus infimi
ventris.

Numerus
musculorum

Sunt ergo quinque in universum musculorum abdominis paria, ex quibus duo obliqua dicuntur, ut *primum*, & *secundum*; unum rectum, ut tertium; & transversum, ut quartum; tandemque Fallopiam, sive ut à figura vocant, Pyramidale. Ex his duo priora primum locum occupant, statimque sublatis quatuor communibus corporis integumentis occurrunt, & quia illius fibræ descendunt, hujus ascendunt, illud, oblique descendens; hoc, ascendens dicitur: inde Rectum se profert, cui infima sede pyramidale incumbit, utrique autem transversum subjacet. Vocantur autem hi musculi Obliqui, Recti, aut Transversi, à fibrarum ductu simili, non quidem considerato ratione ipsius corporis musculi, cum superius probatum sit, hujus respectu fibras musculorum perpetuo recta ferri, rectasque in omnibus esse: sed ratione situs musculi in illo corpore.

Obliqui descendentes.

* OBLIQVI ergo DESCENDENTES, *originem primum carnosam ducunt* ex parte infima costæ^b sextæ, septimæ, octavæ, & nonæ^c principii pluribus ferratis, sive ad similitudinem dentium ferræ pectinatis stipatis, quibus cum^d quinto scapulæ musculo similiter ferrato, (unde & ferratus major dicitur,) neantur: interdum etiam^e nervosa exilitate pectorali junguntur. Nascuntur autem ex costis, antequam in cartilagine desinant, ut fundamentum habeant robustius, nec, si flexibile sit, facile cedat. *Orium* tur deinde^f membranoso etiam principio, à tenui membranæ in modum ligamento, è transversis vertebrarum lumborum processibus, ^g dimidiaque ossis ilium appendice, sive spina, enato. Hinc progressi^h latum nervosumque tendinem, ac quasi membraneum efformant, quo una ad anteriora feruntur, & parim in medio ipsius abdominis, ad lineam candidam membranosi, parim carnosos^k in ossis ilium summitate, partim nervosi^l in pubis ossium superiorum regionem inferuntur. Incipit autem tendo ipse membranofus, circa^m lineam semilunarem à me vocatam (cum semilunæ respondeat) quæ sit à concursu tendinum musculorum, cum obliquorum, tum transversorum ibi incipientium. Atⁿ Candidam lineam Anatomici illam appellant partem, quæ à mucronata cartilagine, per medium abdominis & umbilicum ad os usque pubis excurrit. Est autem membrana tendinea, ex concursu finium tendinum ipsorum enata (unde & candidat) quæ supra umbilicum latior, infra angustior est. Tendo tandem hic, ubi ad musculos rectos pervenit, validissime cum subiecti oblique ascendentes tendine, usque ad lineam candidam jungitur, ac sic miscetur, ut separari à se invicem citra dilacerationem haud possint.

Lines Semilunares.

Linea candida.

Oblique ascendentes.

* OBLIQVI ASCENDENTES sub prioribus immediate siti sunt, proptereaque obliqui interni ab Anatomicis recentioribus vocantur. Hi^p carnosum initium ab^q ossis ilium appendice, & membranofum à membrana lumborum prædicta, tum ossis sacri spinis desumunt, mox carnosâ origine ascendentes, ^r fibris suis contraria serie atque descendentes musculi, quas crucis in modum dissecant, positos, ^s inferioribus duabus costis, undecimæ inquam, & duodecimæ annectuntur, paulatimque^t in latum tendinem, eumque nerveum ac membranofum, ut Descendentes circa lineam semilunarem transmutati, decimæ, nonæ, atque octavæ costis, qua parte cartilagineæ sunt, implantantur. Cum primum autem semilunarem lineam superarunt, & jam rectos attingere musculos, ^u bifariam (visu pulchrum & admirabile) tendo ipse scinditur, sicque in duos quasi abit, ex quibus^v superior, cum portione obliqui descendentes validissime, ut diximus, conjungitur, quoutque in lineam candidam uterque terminetur: ^y inferior autem, sub musculis rectis progreditur, quos ubi superavit, superiori adnectitur, sicque simul in lineam dictam desinunt, & veluti vagina quadam rectos musculos includunt. Ceterum superior ille tendo impense robustis nexibus, tribus illis rectorum musculorum intersectionibus, de quibus postea loquimur, sic valide alligatur, ut non nisi magna quadam difficultate divelli ab iisdem possit.

Recti.

Duo extrema rectorum.

* RECTI MUSCULI, carnosus sunt, & robusti: figuram fasciarum latam & oblongam exprimentes. Longitudine enim totum abdomen adæquant, at latitudine quatuor transversos digitos, crassitie minimum. Hi sub^z obliquorum tendinibus in medio laterum abdominis locati, duo habent extrema, ex quibus^a alterum, & infernum nervosum est, ab anteriore elatioreque ossis pubis parte exortum, quod sub pyramidalibus dimidia sui parte latitat: ^c alterum & superius carneum, ad ossis pectoris latera, ab ultimarum costarum verarum cartilaginibus enatum. ^d Reliqua pars, quæ inter hæc media, tota carne

carnea est, præterquam quod intersectionibus quibusdam nervosis distincta. Vocantur autem ^a Intersectiones ab Anatomicis, nervæ quædam fibræ horum musculorum, oppido quam densæ, & carnis mutuo intertextæ, internodia quædam referentes. Græci *αδευξιδες*, & circumscriptioes vocant, quia musculus distinguere videntur, & partes ipsius circumscribere. Harum ut plurimum semper tres observantur, ex quibus una sub umbilico est, duæ vero supra: nonnunquam etiam tres supra consistunt, & tertia directe umbilico opponitur. Interdum etiam quatuor, si abdomen sit longiusculum; sed rarum id est, multoque adhuc rarius, omnes deesse. Illud autem silentio nequitiam prætereundum est, musculos rectos circa pubis ossa conjunctos, paulatim versus umbilicum, & superiores umbilico partes disjungi, usque eo, ut circa sternum digiti fere latitudine, & quod excurrit paulo, separati videantur. Multo autem memorabilior, magisque digna spectatu est illa in ^b facie interiore vasorum insertio, ex quibus alia descendunt, alia ascendunt. ^c Descendunt à superiore parte, Venæ & Arteriæ Mammariæ; ^d ascendunt contra ab inferioribus sursum Epigastricæ, tandemque per ^e anastomoses circa regionem umbilico adjacentem invicem junguntur. Hæc Vasa consensum illum insignem inter uterum ac mammæ inferre, tradunt Anatomici; sed cum in maribus similiter cernantur, pro nutritione quoque & vita condita esse, credibile est. Anastomosis etiam illa in maribus raro, aut nunquam observatur, quod necessaria non fuerit: at in gravidis atque puerperis, in quibus hæc vasa, ut uteri quoque, impendio tument, maxime sensui obijciuntur. Nervos etiam habent, qui tum in utrumque extremum, tum in singulas intersectiones tam frequentes inferuntur, ut nonnulli ex ipsis nervis intersectiones contextas esse sibi persuaserint. In superius extremum inferuntur, orti ab extremis thoracis vertebriis ab intercostalibus prodeuntes, qui peritonæum perforant: in inferius (alii id non observant) à primo lumborum pari exporriguntur.

Rectis ^f TRANSVERSI substernuntur, qui infimi sunt inter musculos abdominis. Hi initium primo sumunt ^g nervæ membranæque, à ligamento prædicto ex transversis vertebrarum lumborum processibus enato, deinde aliud ^h carnosum, ab interioribus costarum notharum finibus, quibus sat longo ductu, in interna thoracis parte junguntur, mox carnosus redditus, ⁱ latum tendinem circa semilunarem lineam, ut obliqui, ejusdem etiam cum illis substantiæ efformant, & sic versus ^k lineam candidam properant, cui tandem, ut priores inferuntur. Tendo hic cum tendine obliqui ascendentis superius valide jungitur; sed multo adhuc validius inferne cum peritonæo, cui incumbit, cum ita contumaciter sibi id nectat, ut in homine integre ac citra dilacerationem à se mutuo separari vix possint. Hic tamen tendo juxta pubem peritonæum deferit, ut sic nudum sese offerat visui. Caterum in his musculis, quemadmodum & in obliquis, diligenter observandum est, tendines binis in locis perforatos esse, ^l uno scilicet juxta umbilicum; altero vero, in ^m descendentibus quidem, juxta ossis ilium spinam inferiorem; at in reliquis, prope os pubis. Et circa umbilicum quidem, uno foramine, ut vasa umbilicalia prodeant; at circa ilium & pubis ossa duobus, utrinque uno; per quæ in maribus ad testes & scrotum vasa seminaria præparantia ex abdomine egrediuntur, rursumque à testibus ex scroto deferentia per eadem abdomen ingrediuntur, ut postea in parastatas descendant: at in feminis, ligamenta rotunda ab utero ad summam pudendi partem transeunt. Quod si foramina hæc laxentur, quæcunque causa sit, five extrinsecus adveniens, five interne nata, herniæ oriuntur, quæ vel umbilici esse dicuntur, vel inferiorum foraminum. Et tunc vel omentum, vel intestina excidunt, & vel in inguina tantum, aut etiam in scrotum, unde variæ species herniarum oriuntur. Fæminis tamen hernia non nisi ad inguina fieri potest, cum scroto careant.

Caterum, his quatuor paribus Galeno cognitis, ut diximus, Gabriel Fallopius præclare de anatomico studio meritis, ⁿ quintum par adjunxit, quod ipse PYRAMIDALE vocavit, & succenturiatum. Pyramidale quidem, à figura: succenturiatum autem, ab usu; quia cæteris abdominis musculis in compressione vesicæ, dum urinam reddimus, subsidio venire creditur. Hoc nonnulli inter musculos referendum pernegant, sed portionem tantum esse carneam, & rectis musculis adnatam contendunt. Sed revera musculi sunt distincti, tum quia à musculorum rectorum extremo inferiori, propria membrana separantur: tum quia proprias habent fibras, à fibris rectorum distinctas. Modice enim

Non reperitur
in omnibus.

hæ obliquæ sunt, cum illæ rectæ prorsus secundum abdominis longitudinem excurrant. Quod si quis neget musculos separatos vocandos esse, propterea quod in omnibus hominibus non reperiantur, id quod & Fallopius ante me, & ego quoque sæpissime notavi, cum in quibusdam ambo, in nonnullis alteruter desit: huic respondeo, eundem doctissimum Fallopium hoc quoque observasse, nemini defuisse, nisi illis, in quibus musculorum oblique ascendentium principium non incepit primum à spina, sive appendice ossis ilium, sed inferius à ligamento illo valido, quod ab eadem spina, usque ad pubis os excurrit. Tum enim ascendentium principium horum munere fungitur, sicque ipsi merito deesse possunt. *Oriuntur* autem principio carnosum, nec admodum lato, ab ^a externo pubis osse, & inferius ^b rectorum extrema conscendunt, hinc obliquis fibris carnosæ vecti, in tendinem abeunt nerveum, ac teretem, quo in lineam albam desinunt. Iterum minor est tendo, & qui ^c ad dimidium tantum longitudinis spatii, quod infra umbilicum est, alligatur: quandoque longior, & qui usque ad ^d umbilicum pertingit. ^{e, H.} ^{d, G.}

Usum.

Nunc ut *usum* quoque horum musculorum intueamur, sciendum, sive agant ipsi, sive quiescant, usum eos præstare multiplicem. *Dum enim quiescant, primo* quidem propugnaculi cuiusdam munere funguntur, sicque viscera & partes in infimo ventre contentas, ab externis injuriis defendunt: *deinde* & tegumenti locum subeunt, quod calorem viscerum foveant, sicque concoctioni ipsius alimenti plurimum utilitatis asserunt. *Dum agunt, vel una omnes* in idem officium conspirant, *vel singuli* peculiarem usum præstant; ut ita duplex actio prodeat, communis inquam, & propria: ac communis iterum, vel primaria, vel secundaria. *Primariam* vocamus æquabilem illam abdominis compressionem, in qua muscoli omnes eodem tempore ad sua principia singulari quadam concordia trahuntur: *secundariam* contra, quæ hanc immediate sequitur; qualis in femineo quidem sexu foetus est exclusio, in utroque autem sæcum, & urinæ. De hac Galenus expresse scripsit lib. de muscul. dissect. cum portionem horum musculorum infernam, præcipue illorum, qui vesicæ ipsi incumbunt, mictioni apprime conducere ait: illam facili negotio demonstrare licuerit, cum abdomine omni ex parte æqualiter compresso, quicquid in intestinis continetur, aut sursum, aut deorsum necessario tendere cogatur. At superius cum egredi nequeat, pressis similiter à Diaphragmate (dum spiritus cohibetur) intestinis: nec in lateribus consistere possit, iisdem similiter ab obliquis & transversis musculis cohibitis, necessario profecto per inferiora & anum egredi cogetur. Eodem modo in partu uterus à musculis undique urgetur, unde onus suum quam primum deponere omnibus modis conatur. Cæterum hæc compressio, & alium usum largitur, qui non minus scitu dignissimus est. Cum enim erigentibus nobis subito corpus, aut celeriter currentibus, intestina visceraque, nisi impedirentur, ad infima imi ventris necessario corruerent, quod alligata ita non sint, quin delabi (nisi sustentaculo impediuntur) queant; Abdominis muscoli, utpote ad contractionem promptissimi, omni ex parte, tum à lateribus, tum etiam anteriore sede protinus subveniunt, & in loco naturali, unanimi ac æquabili compressione detinent. Ex quo humanæ vitæ duo maxime salutaria emergunt commoda: tum ne viscera locum mutant, & confundantur: tum ne peritonæum tam valido lapsu rumpatur, & herniæ obtingant.

Actio propria.

Circa *propriam* cuiusque horum musculorum actionem & usum, maximas difficultates invenio: sed nec mirari satis queo, quomodo tot præclarissima ingenia, quæ hæcenus tot seculis floruerunt, & in hoc ipso negotio tanta industria insudarunt, tam alieni tamen, sive à veritate, sive ab aliqua solidiore cognitione fuerint. Quamobrem quæ adhuc usque nostra industria assequi potuimus, tanto majore nunc fide ac diligentia, quanto obscuriora aliis fuere, proponemus. Cæterum ipse proprius usus, ut ipsi muscoli, quintuplex est: ex quibus, ut ab his exordiamur, **OBLIQVI DESCENDENTES**, qui, ut vulgo creditur, Thoracis constrictioni inserviunt, quandoquidem superius jam demonstratum est, erroneam fuisse Realdi Columbi, & Andreæ Laurentii de ortu horum musculorum ab inferioribus partibus sententiam: veram contra Galeni, qui initium circa superiores locavit. Si ergo à thorace hi muscoli originem suam capiunt, finem autem in linea candida, ac ilium, tum pubis ossium summitate ponunt; quotiescunque contrahentur, plures præstabunt usus. *Primo* enim, propter insertionem in lineam candidam, mediam abdominis regionem oblique sursum trahunt; ex quo fit, ut latera utrinque compri-

Obliquos enim
descendentes
actio propria

comprimantur, & tum fæces ex lateribus pellantur, nec in validis respirationibus, vel saltibus, vel in forti spiritus cohibitione, ubi thorax admodum dilatatur, intestina, & viscera in lateribus posita deorsum cadant, unde & plurima, & maxima pericula nascerentur. Absque his enim musculis foret, in dictis modo casibus, ut viscera aut maxime confunderentur, aut peritonæum rumperetur: quæ mala impediuntur, dum statim se contrahunt, visceraque inclusa, quasi manibus, excipiunt. Sic videmus, si venter turgat cibo, si ve inanis in se coeat, musculos hos semper æqualiter abdomini inferni, atque sic in suo situ omnia retineri. Accedit ad hunc usum alius, isque propter implantationem in ilium pubisque ossium summitatem, cum innominatum os oblique attollant; quemadmodum Recti musculi contra, recta thoraci admovent. Cæterum quia hujusmodi motus ab omnibus Anatomicis negatus est, paulo post, ubi de Rectorum usu loquemur, revera hunc dari, multisque nominibus concedendum esse, demonstrabimus.

DE OBLIQUE ASCENDENTIBVS Columbus sic statuit, non tantum intestina his comprimi, qui communis est omnium abdominis musculorum usus: sed & costas quoque thoracis detrahi, atque hoc pacto ad ejusdem dilatationem conferre. Hujus opinionis, ut de se ipso fatetur, occasio inde ipsi primum nata est, quod costis inferioribus finem horum musculorum implantari adverterit. At ego potius nequaquam eo nomine thoraci inservire posse crediderim, quod unanimis sit Anatomicorum omnium consensus, dilatationem thoracis, non nisi inferioribus costis extrorsum motis fieri; quod si jam detrahant comprimantque ipsas, profecto musculis dilatationi inservientibus contrarium potius, quam socium motum præstabant. Quamobrem & de alio ego usu cogitavi, & cum thoraci juxta ac lineæ candidæ inferi videam, hinc duplicem quoque usum distinctum emergere mihi persuadeo. Quatenus enim thoraci implantantur, oblique eundem flectere videntur, quemadmodum Recti (ut dicitur modo) recta: at quatenus lineæ albæ inseruntur, oblique abdominis mediam regionem detrahere, simulque latera comprimere. Ex his manifestum fit, eosdem cum oblique descendentibus usus ab ascendentibus, quantumvis à contrariis motibus, proficisci. Voluit enim sagax in omnibus Natura eidem muneri contrarias præficere fibras, ut validior esset compressio, cum & communiter id observemus, positis decussatim manibus, impendio majore robore, quam æqualiter sibi incumbenibus, quamcunque rem à nobismetipsis premi. Præter hos usus, & alius est, ille videlicet, quo Rectis musculis auxilio veniunt, quæ res tum in extensione Thoracis, tum flexione ejusdem maxime erat utilis, & necessaria. In extensione quidem versus posteriora, cum prohibere, ne Recti musculi nimium extensi, ruptionis periculum incurrant: in flexione vero ad anteriora (qui motus longe validissimus est, & insigne robur ac conatum requirit) ut minore labore difficultateve contrahant. Quo nomine si quis sit, qui obliquos hos musculos, ob maxime necessarias, & robustissimas Rectorum musculorum actiones, conditos à Natura professus fuerit, non utique à veritate, meo quidem iudicio, longe aberraverit. Sed & quam bene id statuere liceat, fusius à nobis postmodum demonstrabitur, ubi prius usum Rectorum plenius explicuerimus. Interim ut, quidquid hoc muneris fuit, commodius exsequerentur, sapientissimus rerum Opifex gemino tendine utrumque sic involvit, ut quasi in vagina quadam coercitus & conclusus videatur. De quo sane si breviter hoc loco quid dicere & perspicue voluerimus, non rectius licebit, quam si ligamenti annularibus, quæ circa carpum in manu, tarsumve in extremo pede occurrunt, tendinem hunc contenderimus. Vt enim illa tendines musculorum, qui flexioni extensionive digitorum dicati sunt, in sua sede valide inter contrahendum detinent: eadem ratione hi quoque tendines, ne forte Recti in corporis, si ve Thoracis flexione exorbitent, quam optime præpediunt. Atque hæc quidem de usu Obliquorum nunc breviter dixisse sufficiat.

IN RECTORVM musculorum usu proprio indicando, tanto diligentius laborandum nobis est, quanto verius est illud, quod modo diximus, obliquos abdominis musculos propter hos ipsos (et si non primario) conditos esse. Quoad Galenum tamen videtur is horum musculorum usum statuisse, compressionem tantum anterioris partis abdominis. Libro enim v de usu part. cap. xiv, rectos musculos, ἀπὸ τῆς στήθων ἀρχῆς τῆς

Oblique ascendentium actio & usus proprius.

Rectorum musculorum actio, & usus proprius.

ἡ στήθων

ἡ ὅς ἐστιν ἐκ τῆς κοιλίας, hoc est, à pectore usque ad pubis ossa extensos ait: & paulo post; *Secundum*, inquit, abdominis longitudinem extensi, prope utramque cartilaginis ensiformis partem, τὸ ἀνωθεν ἐκφυσὶν ἔχοντες, & τὸν πᾶν τὴν ἡ ὅς ἐστιν κατὰ τὸν ὀστέον, hoc est, superiorem enascentiam habent, & ad pubis ossa feruntur. Ex quibus verbis concluditur, horum musculorum principium ex Galeni mente, à cartilagine ensiformi prodire; finem autem in ossibus pubis constitui. Quin & quod hic obscurius dictum est, expressius alibi scripsit. Et de principio quidem, v. de Usu part. cap. xv, testatus est, quo loci à mucronata cartilagine capita rectorum pendere tradit: & lib. v de Anat. administ. cap. vii, partem musculi recti, quæ ad cartilaginis ensiformis latera adnectitur, τὸ ἀνωθεν ὀστέον, hoc est, superius principium appellat: paulo autem post, κεφαλὴν sive caput vocat. De fine autem eorundem, ibidem capite vi loquens, in ossa pubis, carnis interventu, implantari ait. Quod si ergo secundum Galenum, in pubis ossibus finis, at in pectore principium est, dum sese contrahent versus principium, anteriora abdominis compriment, immotis etiam ossibus pubis. Quæ contractio eisdem sane usus circa anteriorem imi ventris regionem obtinet, quos antea obliquos, circa laterales ejusdem sedes, præstare diximus. Dum enim Venter turgit cibo, aut in validis respirationibus viscera descendunt, vel fæces excernendæ sunt, retinet ibi, ne viscera rumpant ventrem, aut excipit hic, ne inter se confundantur, vel comprimit, ut fæces facile expellantur. Cæterum contra Galeni sententiam Recentiores quasi ad unum omnes insurgunt, inter quos & doctissimus est Andreas Vesalius, & Gabriel Fallopius, qui Rectos musculos à pubis osse enasci, & ad Iternum deinde ferri, ad cujus latera costis inferantur, contendunt. In quam opinionem delapsi sunt, quod pubis & ilium ossa immobilia esse crediderunt. Cum ergo musculi, non nisi in mobilem partem inferantur, quod voluntarii motus sint organum, non nisi in thoracem inferi, & à pubis osse enasci possunt. Posito autem fine circa thoracem, in alium lapsi sunt errorem, credentes horum musculorum id esse munus, ut respirationi interviarent, thorace deorsum tracto, quo superius dilatetur. Ego vero, ut ab his maxime dissentio, ita Galeni sententiam tanquam veram lubenter amplector: aliam tamen adhuc actionem, & multo quam illa quæ à Galeno inventa est, nobiliorem addo. Vt enim de obliquis dixi, eos non tantum propugnaculi esse loco, nec solum tegumenti, dum quiescunt: ita non tantum, dum agunt, abdomen comprimere; sed & thoracem oblique flectere: sic idem de Rectis quoque nunc inquam, eos præter cætera hæc enumerata officia, pectus etiam ad pubis ossa, & pubis ossa e contra ad pectus trahere, sicque Thoracem flectere. Mirabile sane auditu est, ex contractione eorundem musculorum, duos diversos motus fieri; at si quis tantum velit animum advertere, reipsa se, ut dico, hæc habere, facillimo negotio cognoverit. In lecto enim decumbens, manum abdomini admoveat, qua parte recti sunt musculi, percipiet manifeste, dum inter surgendum thoracem erigit, contractionem horum musculorum fieri, & ab his pectus ad ossa pubis flecti. Contra, si supinus in lecto decumbens, & capite declivi, pedibus vero extra lectum terræ insistent, inferiores partes ad supernas velit contrahere, sicque in lectum se volvere, eosdem rectos musculos contrahi animadvertet, pubisque ossa cum utroque innominato versus pectus flecti. Et quamvis hoc ipsum satis esse possit, ut dubitandi de motu illorum ossium nullus amplius relinqueretur locus: ne quis tamen anceps hæreere ulla ratione valeat, duobus adhuc aliis motibus probare idem conabor. Primo enim si quis utroque crure terræ, pedibus conjunctis, insistat, alterum deinde totum crus perpendiculariter elevet, observabit à terra transversæ manus intervallo crus tolli, id quod neutiquam posset contingere, nisi innominatis ossibus motis, aut fœmoris osse ex acetabulo suo exsiliante. At enim, ut hic ratione & animo hunc motum assequimur, ita tactu quoque facile percipiemus, si manum lateri ipsorum ossium imponamus. Quin imo adhuc manifestius patebit idem, si quis leviter ad latus scabelli alterutro clune insidens, alterius cruris digitis valide innitatur terræ, & clunem, quo non insidet, elevet, tunc enim hæc innominata ossa moveri sursum tam patebit, quam patet vere digitos motu præditos esse, dum manum in pugnum contrahimus, imo innominata ossa ad ipsas usque costas spurias attolli comperiet. Concludamus ergo, ossa ilium & pubis moveri; sed ossa ilium per se, propter articulationem cum osse sacro; ossa autem pubis per accedens, quatenus ilium ossibus per αὐτὰρ ὀστέον junguntur, unde illis motis & ipsa

Recti thoracem flectunt.

Ossa innominata moveri probatur.

Conclusio.

ipsa cientur. *Motus* autem utriusque *vel obliquus est, vel rectus*: & *obliquus* quidem ab Obliquis descendit: oritur: *rectus* autem, à Rectis. Atque hæc quidem nostra est de rectis musculis opinio; in quam sane non temere, neque fortuito incidimus, sed primum his experiētiis, & deinde ratione ducti, quam maxime quidem necessariam esse nobis persuaseramus. Cum enim omnes corporis musculos intuiti, dorsum & thoracem extendi videremus, necessario alios quoque qui eundem flecterent, dari colle-

gimus. Ut enim præclare Galenus lib. de mot. muscul. docet, nulla omnino est particula, quæ uno duntaxat musculo moveatur: sed si quidem desuper aliquis enascatur, omnino alius inferna parte contra adnascetur; & si ex dextris aliquis, omnino alius ex sinistris. Vnaquæque enim particularum, quæ à musculis moventur, veluti à quibusdam habentis in contrarium distracta, vicissim habet alterum ipsum intensum, alterum laxatum. Cum ergo Thorax antorsum flectatur, musculo à quo flectatur indigebit, nec vero præter rectos alius ullus erit, qui id officii præstet. Quin imo id clarissime vel inde licet colligere, quod musculus his per transversum sectis, flexio thoracis protinus tollatur. At enim cum ex hac opinione maximum incommodum sequi videatur, & quod in Anatomicis merito inter absurdissima reponi possit, antequam hinc discedamus, ipsi satisfaciendum est. Si enim pectus ad ossa pubis, & hæc ad pectus moveantur, idque beneficio rectorum musculorum, sequetur inde, rectos musculos duo habere principia, duosque fines; principium, inquam, unum, & unum finem in pectore, alterum vero in ossibus pubis. Dum ergo trahentur pubis ossa thoracem versus, principium horum musculorum in thorace erit, finis ad pubis ossa: contra, dum Thorax versus pubem, principium ad pubem, finis juxta pectus. At omnium Anatomicorum consensu principium cum fine in uno musculo, eodem loco esse nequit. Sed enim ego principium unum, & unum finem pono. Dum enim contrahuntur, unum os quiescit, alterum movetur; sic pectore quiescente, moventur pubis ossa; his quiescentibus, cietur pectus. Itaque ratione unius temporis, quo agunt, unum principium est, unusque finis; at respectu diverſi, quo vel partes superiores deorsum, vel inferiores sursum trahuntur, duo principia, & duo fines erunt. Quod si quis neutiquam sibi satisfactum esse hac responsione putaverit, sed instet adhuc, nihilominus duo principia, duosque fines futuros esse, ego id neutiquam absurdum esse dixerō, sed potius anatomicis demonstrationibus facili negotio confirmari posse. Si enim verum est, quod apud Galenum passim legimus, nervum in musculis inferi vel in principio, vel circa principium usque ad medium, nullibi ultra medium: profecto concludendum erit vel ex hoc ipso, duo esse horum musculorum principia, unum superius, alterum inferius, cum utriusque extremo nervi, ut in historia ostendimus, inferantur, nec vero nervi solum sic, sed & Venæ, & Arteriæ implantantur. Et cum vasa hæc non minus tantum in principium, & circa medium musculorum inferantur, nunquam in finem, utraque hic per utrumque extremum dispergi videmus, & per superius quidem, vasa mammaria descendētia; per inferius, epigastrica ascendētia. Sed videamus nunc quanto artificio Natura hos musculos ad edendos modo dictos motus conformavit. Primum *binos* fecit, ut cæteros abdominis musculos, quod, uti optime Galenus prodidit, corpus nostrum sit *geminum*, dextrum & sinistrum: deinde ut fortior sit motus. Fibræ autem rectæ per corporis longitudinem excurrunt, si quidem rectæ corporis flexioni sint destinatæ. Sunt etiam *toti quasi carnei*, nullo manifesto tendine, nisi parvo admodum & exiguo ad pubis ossa apparente, ut magis contrahi in se possint, & incurvari, cum carnea portio in musculo, non tendo unitis contrahatur, propterea ut facilius, & citra dilacerationem, in validis dorsi extensionibus cederent. Tendines enim uniti distendi se ultra modum, cum rigidi fere semper maneant & tenſi, non facile patiuntur. Cæterum Natura hos musculos, non uti in simiis & canibus, *ad jugulum usque traduxit*, sed circa cartilaginem mucronatam terminari voluit, quod homini corpus, ut hisce animalibus, sic incurvandum non fuit, cum ipsa dum quiescunt, ita corpus inflectant, ut nasum ipsi quasi flexuræ genu imponant.

Sed enim cum hi musculi, dum moventur, facile exsilire è loco suo possent, tum in validis quoque dorsi extensionibus lacerari, Natura hic quoque sedulo prospexit, & utrumque veluti vaginæ, ita tendini gemino oblique ascendētis musculi inferuit;

P

tendineas

Quales sint
motus ipsius
transversarii
musculi.

Respondetur
aliquid quod
ex Authoris
sententia
sequi videtur.

Artificium
Naturæ in
fasciis
musculorum
resol-
tione.

tendineas quoque intersectiones largita est, quibus plurimum robur his musculis accessit.

Transversorum
musculorum
actio & usus
proprius.

DE TRANSVERSIS musculis nemo dubitavit, quin versus interiora abdomen trahant. Quæ sane actio in ventris contractione maxime erat necessaria, sed imprimis in flexione thoracis, quam à musculis rectis peragi diximus. Nec enim Recti dum agunt, versus interiora flectuntur, nisi tendo transversorum, qui lineæ candidæ alligatus est, validissime cum inferiore parte tendinis oblique ascendentis, qui rectos involvit & coërcet, conjunctus foret, quemadmodum superior ejusdem pars, cum tendine obliqui descendentis, unde fit, ut musculi recti versus interiora trahantur. Sed præter hunc usum, actionem quoque insignem habent, quod thoracem, vel potius truncum ad latera circulariter movent, quemadmodum supra capite nono indicavimus.

Pyramidalium
musculorum
actio & usus
proprius.
Ex Fallopio.

Fallopio.

Aquapendens.
tui.

Authenti.

Actio tandem propria musculorum PYRAMIDALIVM, Fallopio teste, est, ut quoties obliqui ascendentes circa pubem operam suam non locant, ipsi oblique partem illam depriment. Observatur enim interdum abesse, vel uterque, aut alteruter, quod evenire solet, eodem Fallopio teste, in iis, quibus musculorum oblique ascendentium principium, non à spina, seu appendice ossis ilium, sed inferius, à ligamento illo valido, quod ab eadem spina usque ad pubis ossa percurrit, incipere solet. Tunc enim, inquit idem, oblique ascendentes musculi, ea quæ sub pube sunt, oblique deorsum trahunt. Contra Excellentissimus Aquapendens, quod tendinem usque ad umbilicum porrigi videret, umbilicum deorsum movere credit. Trahendo autem umbilicum, vesicam leviter ad meliorem urinæ excretionem comprimi. At Ego, præter hæc totam lineam candidam, à mucronata cartilagine, versus pubis ossa leviter deorsum trahere existimo, ut musculi obliqui tam ascendentes, quam descendentes, firmius ad se traherent, ac rectis musculis in magna corporis extensione auxiliarentur.

C A P V T X L

De musculis Lumborum.

LUMBO.
R V M mu-
sculi.
Lumborum
motus.



Flectens lum-
bos.

Extendens
lumbos.

UMBI tribus cientur motibus, quos duo musculorum paria perficiunt. Flectuntur enim ante, extenduntur retro, & ad latera moventur, dextrorsum, aut sinistrorsum. Flectuntur Quadratis vulgo dictis: sed extenduntur Sacro. Ex his, si totum par agat, rectus motus sequitur: sin alteruter, obliquus; ad illud scilicet latus, in quo musculus situs est. Quod si flectentium alteruter cum alterutro extendentium una agat, ad latus movent, eo prorsus modo, quo supra quoque Cervicem moveri diximus: recta quidem, si paribus concurrant in opere viribus; at antorsum magis, vel retrorsum, prout flectens, aut extendens magis contrahitur.

* FLECTENS ergo par, sive Lumborum quadratum, à figura sic dictum, in abdominis interna regione situm est, & ab ossis ilium^c posteriore superioreque cavitate; tum ossis sacri superiore, latum, crassum, ac carnosum enascitur, supra lumborum vertebra ascendens, & processibus earum transversis adhærens, sicque sensim angustius redditum, tandem^d duodecimæ costæ inferna parte carnosum^e implantatur.

^f EXTENDENS par, sive Sacrum, sic ab exortu vocatum, quod ab^g ossis sacri externa parte, ubi ipsi spina cum ilium osse connectitur, hⁱ enascatur, mox ascendens carnosus redditur, & triplici tendinum genere, veluti ansulis, donatur: quorum primum elatius, in singulos transversorum vertebrarum lumborum processus inferitur: alterum inferius, in eorundem processuum radices: tertium, in spinas singularum vertebrarum. Hinc sensim latius redditur, posteaque angustius, & in^k duodecimæ thoracis vertebra spinam, acuto fine terminatur. Hujus fibræ oblique versus interiora ascendunt. totus^l autem musculus sub principio longissimi dorsi, quem supra descripsimus, occultatur.

CAPUT XII.

De musculis Testium, Vesicae, Ani, & Peni.



ESTES cum natura penduli essent, vasa spermatica, quibus alligantur, pondere suo nonnunquam nimium distaxissent, nisi provida in omnibus Natura musculos largita foret, qui à Græcis *σπερματίπες*, hoc est, *Spermatorii* vocati, quod eorum beneficio suspendantur. Sunt ergo ^a duo muscoli, ut duo testes, utrinque unus, oblongi, graciles, ex fibris rubicundis, carnosus, ac rectis conflati, qui à ligamento illo valido, quod à spina ossis ilium ad ossa usque pubis excurrit, originem suam ea in parte ducunt, ubi transversus abdominis musculus desinere consueverunt: hinc per ^b foramina tendinum (quæ à nobis in historia illorum musculorum exposita sunt) una cum vasis spermaticis, quibus valide adnectuntur, transeunt, donec tandem ^c in testem desinant.

^a Testium musculi.

^b Numeri.

^d VESICA duos habet musculos; *unum*, qui urinam retinet; *alterum*, qui pellit.

^e Vesicae musculi.

Quam foeda enim foret humana vita, si urinæ stillicidio continuo corpus contaminaretur? at quam infelix contra, nisi in nostra foret potestate, & cum volumus, urinam reddere, aut eandem retinere? Quare Natura musculus quidem dedit *alium*, cuius beneficio clausum teneri vesicæ os posset, & cum opus, aperiri: *alius*, quo mediante pro nostro arbitrio, urina detrudi. Vocatur ille ab officio *σφιγγής*, *Vesicae constrictor*: hic, nomine caret, cum nec ab aliis in musculorum ordinem relatus sit, sed pro prima vesicæ propria membrana habitus. Primus autem Excellentissimus Hieronymus ab Aquapendente Præceptor noster hunc usum tribuit, cuius auctoritatem nos sequentes,

Urinæ detrusorem appellabimus. ^e *Constrictor* ergo in collo vesicæ situs est, à cuius substantia distingui, ut ani spinæ, haud potest, cum, si rem recte aestimare volueris, ipsius cervicis substantia sit carnosior, transversis orbicularibus fibris intertexta. Hic dum in media figura situs est, usque adeo exacte Vesicam occludit, ut ne guttula quidem urinæ inde effluere valeat; contra ubi laxatur, urinam emittit. Hunc usum facile addiscimus, dum eos intuemur, quibus paralyti laborat: aut ab imperitis Lithotomis in calculi extractione, transversis fibris incisis, læsus est. His enim præter

^f Vesicae constrictor.

voluntatem perpetuo stillicidio urina effluit. ^g *Detrusor urinae* alter est, inter communem, & secundam propriam vesicæ membranam situs, cum revera prima propria ipsius membrana sit, sed nonnihil ^h fibris carnosus conspersa, quæ sese egregie, facta aliqua sanguinis affluxione, in conspectum proferunt. Hic dum contrahitur, cum fibrae per vesicæ corpus recta excurrant, vesicam veluti manus comprimit, unde quidquid in ipsa est, expellitur. Hinc videmus non tantum urinam effluere cum volumus, sed & concitato quodam impetu detrudi, & in altum fundi. Quo in munere tamen & *Pyramidales* abdominis musculi, & in quibus hi desunt, *Transversi* succurrunt, quod quis vel in seipso experiri potest. Et hinc est, quod senes urinæ aliqua difficultate laborent, quia animalem facultatem debilitatam habent vitæ diuturnitate: itemque ii, qui herniam habent, quod laxato peritonæo, & tensione illa maxime necessaria dempta, utcunque pyramidalium musculorum vis robusta sit, vesica haud ita bene comprimat.

ⁱ Detrusor urinae.

ⁱ ANVS, sive *podex*, qui ^k recti intestini finis est, tres sortitus est musculos; quorum ^l *primus* ipsum constringit (unde *σφιγγής* etiam dictus) ne præter voluntatem nobis alvi feces erumpant, ubi vel abdomen validius comprimitur, aut spiritus diutius retinetur: *duo posteriores* eundem post excretionem sursum in suum locum retrahunt, præsertim post insignes conatus, in quibus è suo loco prodire ut plurimum consuevit. Vtriusque usum & nobilitatem optime agnoscimus, cum paralyfin forte patiuntur: tunc enim *leso illo*, excrementa præter voluntatem erumpunt: *his vero* affectis, dependet turpiter *podex*, & digitorum foeda opera, ut in locum restituatur, eget. Illum ergo ab usu, Ani constrictorem: hos, *Levatores* imposterum vocabimus. ^m *Constrictor* autem musculus, orbicularis est, & latus, ab inferioris ossis sacri vertebra enatus, intestino recto, magno spatio, transversis fibris circumannectitur. hic, cum superiore sui sede, qua in abdomine est, multo quam inferiore, ubi cuti proxima, crassior sit, imo cuti ita adnascatur, ut (quemadmodum illi in palpebris labiisque) separari ab ipsa vix queat, Galenum com-

ⁿ Ani musculi.

^o Constrictor.

Zetatores.

movit, ut duos constitueret constrictores musculos, & partem quidem inferiorem cuti connexam, *Cuticulofum*; alterum vero superiorem, *Transversum* vocaret: quem nostro tempore nonnulli & ex Recentioribus secuti sunt. ^a *Levatores* duo exigui sunt, lati, membranosi, actenuēs, sub vesica siti. Hi à ligamenti ossium pubis, coxendicis, & sacri, à parte interna enati, ad podicis utrumque latus descendunt, ac elatiori constrictioris regioni inferuntur.

PENIS musculi.

Collaterales.

Inferiores.

PENIS quatuor habet musculos, intra scemora, non procul à scroto sitos; ex quibus duo *Collaterales* sunt, qui breviores ac crassiores: duo vero *inferiores*, qui longiores, tenuioresque. ^b *Collaterales*, sive *penem erigentes*, ut ab usu nomen indamus, à coxendicis appendice, infra principium corporum penis, nervosi prodeunt, mox carnosii redditi, oblique ascendunt, & in ^c penis corpora prope exortum ^d implantantur. Hi penem in congressu venereo retinent, ne versus Austrum, vel Aquilonem (ut joco dicitur) se vertat: sed recta semper in ipsa pugna persistat. ^e *Inferiores*, sive *Vrethram trahentes*, ab ^f ani constrictore carnosii ^g exorti, & ^h internis suis lateribus uniti, recta sub ⁱ pene ad anteriora properantes, tandem ad ^k medii canalis latera inferuntur. Inferiorem ^l canalis, sive urethrae partem trahunt, ut aperiatur, cum alias tumentibus penis nervosis corporibus à spirituum affluxu, constringerentur.

CAPUT XIII.

De musculis Scapulae.

SCAPULAE musculi.

Scapulae motus.



X PEDIVIMVS adhuc usque omnes, qui ad tres Ventres pertinebant, musculos: nunc breviter eos quoque aggrediemur describendos, qui ad ARTVS, & primum quidem ad MANVM spectare videntur. Hi à me in musculos scapulae, ossis humeri, cubiti, radii, carpi, & digitorum dividuntur. Agemus autem in praesentia de Scapularum musculis, quae quadruplici cientur motu, *anteriorum, retrorsum, sursum, & deorsum*. Non tamen singulis motibus singuli destinantur musculi, quemadmodum in enarratis quamplurimis, ut nec ideo nostro more appellationes ab usu deductae imponendae sint, sed à figura potius appellationes commodae donandae.

Primum par.

^m *Primum* ergo *Cucularis* dicitur, quod cum conjuge suo cucullos monachorum non inepte exprimat. Hic primo ⁿ transversum ab inferiore parte ossis occipitii versus aurem, ubi ^o sinum ejus gratia exsculptum diximus, principio carnosio oritur, deinde ^p recta secundum corporis longitudinem ex processibus posterioribus vertebrarum colli, & octo superiorum thoracis, principio membranoso & lato, junctus suo conjugi alterius lateris. ^q Hinc versus scapulam ad externum corporis latus procedens, semper angustior redditur, donec tandem in totam scapulae ^r spinam, & ^s summum humerum, ^t basinque fere mediam, & claviculae partem, quae lata est, nervoso simul & carnosio ^u fine inferatur. A Galeno *Trapezius* dicitur, quo nomine Geometrae figuram quadrilateram inaequalibus lineis circumscriptam appellant. Habet enim quatuor latera, quorum ^v *primum* in osse occipitii transversum est, carnosum, & primum principium à nobis constitutum est. ^w *Alterum*, per spinam vertebrarum cervicis, & octo superiorum thoracis descendit, membranolum, quod secundum initium posuimus, & quo cum suo compari jungitur. ^x *Tertium*, ab externa primi lateris sede incipit, & ad summum humerum oblique descendit. ^y *Quartum*, à cervice scapulae, quae ad claviculam est, ad octavam usque thoracis vertebrae procedit, circa quam secundum latus definebat. Ceterum cum latissimum habeat principium, & angustum satis tendinem ac finem, ipsius fibrae vario quoque ductu feruntur, ex quibus quaedam rectae sunt, quaedam obliquae. ^z *Rectae*, quae medium quasi ipsius occupant: ^a *obliquae* autem, tum quae versus humerum ab occipite ad scapulam *descendunt*, tum quae à vertebrae inferioribus thoracis *ascendunt*. Cum ergo versus dorsum scapulam retrorsum moveat, patet omnibus se contrahentibus, recta quidem moveri: at oblique sursum, aut deorsum, si vel illae, vel hae ciantur magis.

Secundum.

^b *Secundus*, *scapulam attollens*, & *levator* dictus, à me vero per jocum patientiae musculus, quod aegre ferentes, quae nobis forte adversa accidere, scapulam hujus ope, cum humero,

humero, patientiæ amarum ingeminantes nomen, elevemus. Hic à vertebrarum cervicis, primæ, tertiæ, quartæ, & quintæ transversis processibus, ^a quatuor quasi separatis initiis exoritur: secundæ autem processibus non alligatur, tametsi & ab his quandoque proficiscatur. Cæterum hæc mutuo coëuntia postmodum descendunt, totique superiori rhomboidis lateri junguntur, validum carnosumque constituenta musculum, donec ^b elatiori tandem scapulæ angulo, ^c lato ac carneo tendine inferantur. Scapulam versus anteriora & colli latera: sed cum humerus scapulæ jungatur, per accidens hunc quoque attollit.

^d *Tertius, Rhomboides*, à rhombo, quem exprimit, vocatus est. Dicitur Rhombus ^{Tertius} apud Mathematicos figura quadrilatera, lineis quidem, at non angulis, æqualibus constans. Hic sub ^e cucullari immediate situs est, & ^f à posterioribus processibus, sive spinis trium inferiorum colli, triumque superiorum thoracis, carnosus exoritur, obliquis postea fibris tenuis ad scapulæ ^g basin descendit, cui toti carneus tam lato fine, quam principio ortus est, inferitur. Scapulam ergo sursum nonnihil ad posteriora trahit, dorsoque applicat.

^h *Quartus, serratus est minor*, qui totus sub ⁱ pectorali musculo in anteriore thoracis ^{Quartus} sede latitat, sic appellatus à ^k principio serræ in modum variis fibris carnosus acuminatis conspato. Minor autem ad differentiam majoris, cujus historiam sub finem hujus capituli trademus, quod ab eo magnitudine superetur. Hic à ^l secunda, tertia, quarta, & quinta (interdum & à sexta) quatuor puta costis superioribus, dummodo primam demiserit, antequam in cartilagine abeat, ^m principio lato, sed in quatuor quasi ferrarum dentes, singulis costis adnexos, diviso oritur, mox oblique versus scapulam descendens, simulque sensum angustior redditus, in ⁿ latum tendinem, partim carneum, partim nerveum abit, quo juxta processum anchoriformem scapulæ implantatur. Hujus fibræ ob latum principium invicem diductæ sunt: si tamen omnes simul agant, recta pectori scapulam admovent: sin superiores duntaxat, sursum magis: at si inferiores, deorsum ducunt.

^o *Quintus par*, quæ communiter ab Anatomicis sic recensentur, ^{Quintus} quæquæ primo Sylvio adjungimus, quod vulgo secundum Thoracis par cum Vesalio faciunt, & *serratum majorem* appellant. Nam & insertio nervorum circa serratas compages, me in thorace, non scapula, principium habere docuit; & quivis vel in seipso experiri potest, ab hoc musculo scapulam moveri, si deorsum illam vehementer versus pectus duxerit, & thoraci manum imposuerit circa latera, simul etiam scapulæ circa basin. Nec vero intelligere ulla quivi unquam ratione, qua musculus hic thoraci movendo sit, si in mobili scapula principium musculi constituatur, cum tam validæ actioni destinatus sit. Non ergo à scapula, sed à thorace originem nanciscitur, & quidem à ^p costis octo superioribus, nonnunquam etiam nona, antequam in ^q cartilagine desinunt, ^r serratis & acutis principiis, quibus cum principiis similiter serratis ^s oblique descendens abdominis musculi necitur. Hinc carnosus juxta costas ad latera thoracis ascendens, in ^t scapulæ basin interiorē totam amplo carneoque fine implantatur. Hic dum ad suum principium contrahitur, scapulam ad anteriora quidem, ut serratus minor, sed versus inferiora ducit.

CAPVT XIV.

De musculis ossi humeri.



HUMERI OS quinque cietur motibus. Ducitur *anteriorum*, movetur *retrosum*, elevatur *sursum*, trahitur *deorsum*, denique *in gyrum circumvertitur*. Musculi, qui hos motus absolvunt, septem sunt numero, quibus ab usu nomen largiemur.

^u *Adducens humerum* primus est, *Pectoralis* vulgo à situ vocatus, cum thoracis anteriorem partem occupet. Hic principium habet latissimum à diversis partibus enatum, etsi unicum sit & continuum. Nam in superiore sui parte à ^v clavicula media, qua parte teres est, & pectori proxima, oritur: in media, ^w à tota longitudine sterni, & ipsi annexis cartilaginibus: in infima, à sexta, septimæ, & octavæ costæ

costæ cartilaginibus. *Prima pars* carnosa, *secunda* & *tertia* membranosa & nervosa est: unde & Galenus in tres dividi posse non male statuit. Carnosus autem, statim crassus redditur, sensimque angustior versus humerum, & externam corporis partem prope-
rans, donec tandem ad latus thoracis in ^a tendinem brevem, sed latum, nervum, ac robustum definat, qui ossi humeri secundum longitudinem, non multo sub ipsius capite inter ^b deltoïdem attollentem, & ^c cubiti primum flectentem, sive Bicipitem, inseritur. Principium autem, ut triplex quasi est, ita fibræ quoque triplices sunt. Quæ enim ^d à primo principio oriuntur, descendunt: quæ ^e à secundo, rectâ feruntur, at quæ ^f à tertio, ascendunt. Ut ergo cum omnes contrahuntur, rectâ humerum adducunt pectori: ita, cum primi principii solius, paulo versus superiora: cum tertii, ad inferiora pectoris admovent.

Secundus.

^g Elevator, vel Attollens humerum, secundus est, *δελτοειδής*, *Deltoïformis*, à figura, quæ ^h Græcorum majusculum refert dictus, cum sit triangularis, & fere æquilaterus. Nonnullis à situ etiam *ἰσχυρὸς*, quod capiti humeri, ad scapulæ articulum, quem *ἀκρον* vocant, insertatur. Hic similiter ut pectoralis, cujus modo historiam retulimus, principium habet latissimum, quod triplex esse videtur, pro triplici parte ex qua nascitur, etsi continuum revera sit, & unicum duntaxat. *Anterior* enim ex media clavicula, qua parte lata est, & humero vicina nascitur: *in medio*, à summo humero, qua claviculæ jungitur: *posterior* vero, ex tota scapulæ spina, non quidem sic, ut tota ossium amplitudo ipsius principii tribuatur, sed prominentior tantum sedes, & ita veluti ex crassiore linea educantur. Sunt autem hæc principia omnia nervea, ita tamen, ut statim carnea crassaque reddantur, totusque musculus carnosus descendens, paulatim angustetur, donec in validum tendinem, carnosum foris, intus nerveum definat, qui transversim in humeri medio sub ipsius cervice implantatur. Cum ergo triangularis sit, *primum* ejus latus erit, quod à media clavicula, per summum humerum, ad scapulæ spinam ac basin producitur: *secundum* quod à clavicula, ab interna parte, qua cum externo pectoralis dicti latere jungitur, ad humeri eam sedem, cui implantatur, deorsum trahitur: *tertium*, quod à basi scapulæ, ubi spina incipit, ad eam usque partem humeri, cui inseritur, perducitur. Ex his lateribus primum maximum est, duo reliqua minora, & inter se æqualia. Ut autem principia diversum situm habent, ita quoque fibræ diversæ sunt. *Primi* principii, oblique ad posteriora: *secundi*, rectâ deorsum: *tertii*, oblique ad anteriora, feruntur. His omnibus simul agentibus, rectâ humerus attollitur: at *primo* principio solo contracto, versus priorem corporis partem & faciem: *tertio* autem, versus posteriora.

Tertius.

ⁱ Abducens, tertius est, qui & *Latissimus*, à magnitudine, cum totum fere dorsum cum suo conjuge tegat, à sædo usu, quem interdum præstat, scalpendo vel tergendonates, *ανίσκαλπτορ*, vel *ανίτερφορ* dicitur: absque eo enim foret, id officii haud exhiberetur. Oritur hic principio ^j membranoso, latissimo, à posterioribus processibus vertebrarum thoracis, qui à sexta ejusdem vertebra ad ossi sacri medium pertinent: tum vero & à superiore ossis ilium parte: mox superiora petens, ubi ad eam sedem dorsi pervenit, qua costæ incurvantur, membraneus esse definit, carnosusque redditur, ac ^k scapulæ angulum inferiorem supervehitur: ubi angustatus, valido brevique ^l tendine, at lato, ^m infra humeri caput superius, inter pectoralem dictum, & rotundum detrahentem, inseritur. Hujus tendo, cum tendine pectoralis, cavitatem quæ in ala est, constituit: cum ille internum, hic externum ipsius latus conficiat. Cæterum, quia latissimum habet principium, alias quidem fibras sublimiores, alias humiliores nactus est; ex quo fit, ut omnibus licet retro trahatur humerus, illis tamen solis agentibus, magis versus superiora, his contra ad inferiora deprimatur.

Quartus.

ⁿ Deprimens humerum, quartus est, qui *Rotundus* quoque dicitur, & à parte posteriore situm habet, oblique sub ala. Carnosus est, crassusque, ac si cum aliis humeri musculis conferatur teres: unde *teres* potius, quam rotundus ab iis vocaretur, qui latinæ linguæ proprietatem sanctius observandam censent. Rotundum enim dicitur, quod sphaericum est; at teres quod longum, nec angulosum, ut hic musculus. Quicquid sit, ^o oritur hic musculus carnosus initio, ex ^p inferiore angulo scapulæ, sicque carnosus inferiori ipsius costæ adhærens progreditur, ad cujus medium ubi pervenit, eam deserit, & modice

& modice sursum delatus, tendine nerveo brevi, sed lato validoque, humero infigitur eadem ipsa regione, qua primus humeri musculus adducens pectoralis inferebatur, cum ipsi contrarium motum perficiat. Vtunque autem brachium suo pondere deorsum moveatur, indiguit tamen hoc musculo, tum ut nostro pro arbitrio motum hunc obiremus, tum ut versus inferiora duceretur tunc etiam, quoties à suo pondere auxilium non habet, ut quando in lecto, aut stragulis recumbimus. Est autem multo minor deltoide, suo contrario; quod major vis requiratur ad elevandum aliquod pondus, quam ad deprimendum. Hinc videre licebit, omnes depressores, attollentibus sibi contrariis minores esse. Sic validissimus est maxillam inferiorem attollens, Temporalis: longe infirmior deprimens, Biventer.

^{17. F.} *Circumagentium humerum tres sunt, ex quibus ^a primus, supercapularis superior, carnosus & oblongus, interscapulium superius totum occupat. Oritur enim à scapulæ basi, quæ supra spinam est, & antorsum recta procedit; at ubi ad superiorem cervicis scapulæ partem pervenit, sub secundo humeri (ab aliis vocato) ligamento, hujus gratia (ut ^b supra demonstravimus) exstructo delatus, tendine lato, & valido articulum supervectus, ad articuli ligamentum oblique cervici inseritur. ^c Circumagentium secundus, & supercapularis inferior, infernum interscapulium integit. Hic à scapulæ basi, quæ infra spinam est, carnosio principio enatus, antorsum fertur, & angustior factus, tendine lato brevique humeri ligamento quarto, quod ejus causa conditum est, inseritur. ^d Circumagentium tertius, subcapularis, in cavitate scapulæ situs est, quam totam occupat. Oritur ex basi tota anteriore parte carnosus, talisque permanens, anteriora prestat: sed in progressu sensim ad cervicem scapulæ angustatus, tendinem tandem acquirit latiusculum, quo in humeri ligamentum alterum implantatur. Musculi hi postremi humerum, & per consequens totum brachium circumagunt, unde & nomen habent: sed subcapularis ad interiora; supercapularis inferior, ad exteriora, quemadmodum & superior, sed hic simul modice elevat. Horum usus commodissime demonstrari potest, si brachium totum in media figura ponatur, & postea, neque humero à pectore abducto, neque mutata figura media humeri cum cubito, cubitus ad exteriora ducatur, rursusque ad interiora.*

CAPUT XV.

De musculis ossis Cubiti.



OSSIS CUBITI duobus agitur motibus. Flectitur enim, & extenditur recta. Uterque motus duos habet musculos, ut in universum quatuor sint, qui ad cubitum pertinent: illi, in anteriore; hi, posteriore humeri sede siti sunt.

^e FLECTENTIVM ergo ^{primus}, nobilis apud Italos, quibus *Piscetto* dicitur, sive *Pisciculus*: vel, quia piscis figuram refert: vel, quia piscis instar sub cute velociter agitur. Authoribus communiter *Biceps* vocatur, quod capite, sive principio gemino, eoque distincto à scapula prodeat. ^f Alterum enim, quod exterius est, tendineum ac teres, à superiore supercilio acetabuli scapulæ pronascitur, & sub ligamenti articuli, supra caput humeri, per ^g fissuram in hoc osse, ejus gratia constructum, defertur, ubi ^h ligamento ex illo canali pronato involvitur: ⁱ alterum, priore latius, partim ex tendine, partim ex carne constans, à ^k processu scapulæ anchoriformi enatum, infernum humeri caput supervectum, descendit, tandemque infra ipsius caput cum priori ^l coiens, ^m validum ac carneum musculum constituit. Inseritur autem hoc loco ⁿ carnosam quædam portio in humeri medium, ubi privatam asperitatem habet, pro ejus elevatione, quam ^o nonnulli peculiarem musculum facientes, ad humerum referre conati sunt, credentes cum pectorali conspirare, & humerum pectori adducere. Verum *Biceps* ipse musculus, mox ab humero abscedens, ^p subiectum sibi alterum flectentem descendit, & partim teres, partim carnosus factus, paulatim angustatur, donec in robustum ^q tendinem, crassum, teretem, ac nervosum finiat, qui in ^r tuberculum oblongum sub capite superiore radii, hujus gratia exsculptum, inseritur. Atque hic est ille tendo, qui in Venæsectione ab imperitis Chirurgis sæpenumero lædi, magno cum

OSSIS
CUBITI
musculi.
Motus cubiti.

Flectentes.
Primus.

Secundus.

gno cum ægrotorum periculo solet. Quin imo vulnera ipsi etiam musculo insista, gravissima sunt, tum quia tendines habet in duobus initiis, tum quia Nervi sub ipso, Venæ, ac Arteriæ insignes incedunt. Occupat autem in situ suo internum potius ossis humeri, quam externum latus. ^a *Flectentium secundus*, *Brachieus* vocatus, primo subjacet, quo etiam brevior est, penitus carnosus. Hic externum anterioris ossis humeri latus, & mediam inferiorem ipsius longitudinis sedem, cui etiam proxime, ac immediate adnatus est, occupat. ^b Nascitur enim circa medium ipsius, ubi humerum attolens deltoides, & pectoralis adducens inseritur, principio carnosum, lato, ac duplici, partim versus externum, partim versus internum latus: illud, paulo sublimius est; hoc, paulo inferius. Inter utrumque autem nudum spatium in osse intermedium relinquitur, mox tamen in unum coeunt, & humeri ossi validissime adnata, musculum carnosum, & quo magis descendit, ^c ampliorem redditum, constituunt, donec ^d lato & carnosum sine, tandem in ligamentum articuli, tum cubiti ac radii appendicem, anteriore sede, implantetur. Hi duo musculi, cum rectas habeant fibras, recta cubitum flectunt, nec unquam in latus declinant.

Extendentes.
Primus.

^a *EXTENDENTIVM primus*, in posteriore humeri facie, sed interna sede situs, duplici constat principio, ^b uno valido latoque, quod partim carneum, partim nervum, ex inferiore scapulæ costa, paulo sub cervice, ubi sinus peculiaris ejus gratia exculptus est, enascitur, carnosumque deinde factum, recta descendit, & humero juxta internum latus connascitur, procul ab ipsius cervice, juxta insertionem musculi tertii humeri, ubi cum ipso ^c alterum principium carnosum, ibi enatum, commiscetur, ita ut unus fiat musculus, qui per medium humeri, inter externum & internum latus, partim carnosus intus, partim nervus foris, defertur, donec tandem ad internum latus posterioris olecrani processus implantetur.

Secundus.

^b *Extendentium secundus*, externam sedem occupat, & à cervice humeri, ac proprie ab ejus capitis radice, principio nervoso, enascitur: mox carnosus redditus, descendit, ac ubi ad dimidium longitudinis humeri pervenit, cum prædicto ita commiscetur, ut à se nullo modo separari queant, sicque unus quasi musculus ex utroque fiat. Hic tandem in externum olecrani latus, præsertim parte illa, cui innititur, partim carneus intus, partim nervus foris, inseritur. Hi duo musculi, similiter ut flectentes, rectas fibras à principio ad finem usque habent, quamobrem & recta cubitum extendunt.

CAPUT XVI.

De musculis Radii.

RADII
musculi.
Motus radii.Pronatorum.
Primus.

RADII duobus motibus agitur; uno, per accidens, cubiti osse moto, cum quo una flectitur, & extenditur; altero, per se, quando immoto cubito, vel intro, vel extrorsum ducitur, & sic manum pronam reddit, aut supinam. Duo ergo erunt musculorum Radio inservientium genera: quorum illi, ab usu *Pronatores*; hi *Supinatores*, vocantur. Illi, internum cubiti latus: hi, externum occupant.

Secundus.

^a *PRONATORVM primus*, sive *Quadratus*, totus carnosus, ab ^b inferiore & interna cubiti parte, prope ^c carpum duorum digitorum latitudine enascitur, transversim ^d supra ligamentum, quod radium cubito jungit, ^e ad radium progreditur, & interiori ipsius lateri, ^f sine juxta cum principio æque lato implantatur, sicque *Quadratum* Mathematicorum exprimit, cum quatuor latera, & fere æqualia habeat. ^g *Pronatorum secundus*, sive *Teres*, à radice ^h interioris humeri tuberculi, & ab interno latere ossis cubiti, sive ulnæ, qua humero jungitur, prodit, ibique cum radio, valido & carnosum principio necitur, hinc obliquo ductu per internum ⁱ radii latus progreditur, ^j cui paulo ante medium longitudinis, carnea insertionem implantatur, à qua aliud mox caput nervosum enascitur, quod versus medium radii pergens, ejusdem radii externo lateri adnectitur, ea parte, ubi hujus gratia asperitatem obtinet. *Hi duo musculi* dum ad principia sua contrahuntur, Radium antorsum movent, & sic manum, quæ radii inferiori parti, beneficio carpi connectitur, una pronam reddunt: illo, inferiorem; hoc, superiorem partem commovendo.

SUPINA-

SPINATORVM ^aprimus, sive Longior, quod omnium, qui cubitum perreptant, musculorum longissimum ventrem obtineat. Hic ^b ab externi humeri tuberculi acie carnosus enatus, ^c radio oblique insertitur, & ubi ad imam radii partem pervenit, ^d in tendinem membranaceum degenerat, qui ^e superiori parti appendicis imæ radii illigatur, nonnihil in partem internam vergens. ^f Spinatorum secundus, sive tenuior, aut brevis, secundo pronatorum figura & situ non dissimilis, ab ^g externa parte ligamenti articuli inferioris humeri capitis, & à cubiti posteriore processu carnosus enascens, oblique, foris membranofus, intus carneus, progreditur, & ^h in radium fere medium valide implantatur. Hi duo musculi, sese ad principia contrahentes, versus exteriora radium ducunt, sicque manum resupinant; sed ille, inferiorem; hic, superiorem partem trahit.

Supinatori.
Primus.

Secundus.

C A P V T XVII.

De musculis Carpi, vel potius toti manui dicatis.



ARPO, sive Brachiali, tres motus competunt. *Flectitur enim, extenditur, & in latera movetur.* Ex his motibus flexio & extensio, proprios habet musculos: at motus, qui in latera fit, à flectente & extendente illius lateris, ad quod movetur, si simul agant, perficitur. Vtrique autem motui, duo dicati sunt musculi, ex quibus alter internum, alter externum cubiti latus occupat; unde vel externos, vel internos vocabimus. *Qui flectunt*, anteriorem sedem tenent, & ab interno humeri tuberculo oriuntur: *qui extendunt*, posteriorem, & ab externo tuberculo enascuntur. Cæterum cum Manus, beneficio Carpi, Radio jungatur, fit, ut flexo, vel extenso brachiali, Manus simul flectatur, extendatur, & in latera trahatur.

CARPI
musculi.
Motus Carpi.

¹ FLECTENTIVM ergo interior, carneo nerveoque principio acuto ^k ab ossis humeri tuberculo interiore exoritur, ^l carnosus deinde per totam cubiti longitudinem, cui immediate adnatus est, progreditur, & ad carpum in tendinem, partim ^m nerveum, partim ⁿ carneum degenerat, qui in carpi os quartum primi ordinis inseritur. Hic sub ligamento transverso non transit: sed tantum communi omnium musculorum membrana involvitur. ^o Flectentium exterior, ^p ab eodem tuberculo, nec longe à prædicto enascitur: hinc transversum nonnihil juxta latus externum ^q primi digiti flectentium, qui ipsi magna ex parte subjicitur, radio adhærens incedit. Antequam autem carpum attingat, circa ipsius radicem in ^r tendinem teretem degenerat, qui illic tamen non desinit, sed transverso ligamento adnatus, ultra ipsum per internam partem progreditur, & latior redditus, in radicem ossis metacarpi, indici præposito, inseritur. *His duobus simul agentibus, Carpus, & cum ipso Manus recta flectitur: at alterutro agente, oblique nonnihil in latus illius, qui contrahitur, movetur.*

Flectentium.
Interior.

Exterior.

EXTENDENTIVM ^s interior, ^t cubito incumbens, à radice ^u externi humeri tuberculi, & à summo cubito initium sumens, per illius longitudinem fertur, qui cum ad ^v carpum accesserit, in ^w tendinem teretem ac validum abit, quo supra ^x cubiti inferiorem appendicem in sinum, juxta ^y styloidem processum, & in ^z ossis metacarpii, quod minimo digito subtenditur, partem superiorem, non procul à carpo implantatur. ^a Extendentium exterior, ab acie illa ossea, quæ in humero est, supra tuberculum exterius ^b latiusculo principio exoritur; ^c inde, carnosior factus, per ^d radium progreditur usque ad dimidium longitudinis, quo cum pervenit, in validum ^e tendinem degenerat, qui statim in ^f duos fere rotundos dividitur, latiores tamen, quam crassiores, sicque ambo per radium descendunt, nonnihil à se invicem ^g discendentes, sub ligamentum transcurrent magis inter se diducti, & ubi supra ^h carpum progressi sunt, ⁱ alter in metacarpii ^m os primum, indicem sustinens; alter, in ⁿ secundum, medio substratum, inseritur.

Extendentium.
Interior.

Exterior.

CAPVT XVIII.

De musculo, cujus latus tendo media vole subnaſcitur, quem Palmarem vocant.

*Palmaris mus-
culus deſer-
ptus.*



SUB cute in manu ^a latus quidam tendo viſitur, qui ortum habet inter-
terdum ^b à musculo, ut ceteri tendines; interdum ^c musculo caret, &
ſolus ſic expanditur. Vtriuſque hiftoriam nunc trademus, exordientes
ab illo, qui à muſculoſa carneaque ſubſtantia oritur, quod plerumque
huiusmodi inveniatur. Vocatur autem hic muſculus *palmaris*, à tendi-
ne, qui palmæ manus ſubtenditur, totamque fere inveſtit. Hic in cu-
biti anteriore, vel (ſi mavis dicere) interna regione, inter ^d duos carpum ſectentes,
quibus utrinque adnaſcitur, ſitus eſt, ceteris ibi ſitis muſculis omnibus ſuperſtratus.
Oritur autem ab ^e interno tuberculo oſis humeri, rotundo nerveoque ^f principio,
mox carnoſus redditus, ^g ventre tamen anguſto, antequam ad dimidium longitudinis
cubiti pervenit, nonnihil oblique deſertur, & attenuatus, in ^h tendinem teretem &
longum degenerat, quo ulterius progreſſus, carpi ligamentum internum tranſcendit,
& ubi volam attingit, in ⁱ membranam latiffimam expanditur, quæ cuti valide adna-
ſcitur, per totam volam fertur, demptis ^k duabus partibus, quarum illa minimo, hæc
maximo digito ſubjacet, donec ad digitorum radices & prima internodia pervenerit,
ubi in ^l internum cuiuſque eorum latus terminatur.

Obſervatio.

Muſculum hunc interdum geminum in utroque brachio, & ab eodem loco exortum
fuiſſe, doctiſſimus Fallopius obſervavit. Vnus tamen duntaxat in tendinem latum deſi-
nebat, qualis deſcriptus à nobis eſt: alter, in ligamentum illud tranſverſum carpi in-
ſerebatur.

*Palmaris
tendo.*

Quod ſi tendo hic ^m ſine muſculo reperiatur, quemadmodum non ſemel inveniri ſo-
let; tum ipſe *vel* à tendinibus duorum muſculorum carpum ſectentium, qui juncti inter
ſe, antequam ad carpum perveniant, lateſcunt; *vel* ab ⁿ interno carpi ligamento exo-
ritur. Huius *uſus* eſt, non, ut ſine pilis palma ſervaretur, aut ſenſus eſſet acrioris, cum
è regione pollicis & minimi digiti, quibus partibus non ſubtenditur, non minus & pili
abſint, & adſit ſenſus: ſed potius, ut cutim volæ in apprehenſione validius attrahat &
corruget, ne cutis mobilitas firmam rerum comprehensionem impediatur.

*Caro quædam
quadrata.*

Solet autem ad externum huius tendinis latus, ^o caro quædam quadrata reperiri, quam
nonnulli pro peculiari muſculo habent, quamvis effigiem muſculorum tenuium ac bre-
vium modo duorum, modo etiam trium, referat. Oritur autem à membrana carnoſa,
regente illam regionem, ubi ſitum eſt octavum carpi os, & ſupra ^p abducentem mini-
mum digitum incedens, in ^q latus externum huius tendinis inferitur, ut ipſum, cum ma-
nu aperimus, extendat.

CAPVT XIX.

De muſculis manus digitos ſectentibus.

*DIGITO-
RUM mu-
ſculi.
Motus di-
gitorum.*



*Digitorum
flexores.*

DIGITI manus ſectuntur, extenduntur, aut in latera moventur. Quare tria
erunt muſculorum genera, qui digitis operam locant; ſectentes, Ex-
tendentes, & Oblique moventes. At cum *Pollex* à ceteris plurimum
variet, in ſingulis generibus, alii erunt qui digitos, alii qui pollicem ſec-
tent, extendent, vel ad latera ducent. Agemus primum de ſectentibus
digitos, propterea quod ipſi in cubito poſiti ſint, à quo diſcedere
nobis religio ſit, non diligenter prius omnibus in ipſo perſpectis.

Muſculi igitur *digitos ſectentes* à nobis vocantur, qui quatuor digitorum phalanges, ex-
cepto pollice, incurvant. Horum ſex ſunt, ex quibus *primus*, ſecundum digitorum os ſec-
tit, unde ab uſu (noſtro more) *Flexorem ſecundi digitorum internodii* vocabimus: *al-*
ter, tertium os ſectit, unde *Flexor tertii internodii* dicitur: *reliqui quatuor*, primum arti-
culum curvant. Quamvis autem non ignorem, tertium os citra ſecundum ſecti haud-
quaquam poſſe; quia tamen ille ſecundo, hic tertio inferitur, ab uſu primario nomen
hoc ipſis remanebit.

DIGI-

DIGITORVM ergo ^asecundi internodii flexor ille est, qui ab ^bhumeri tuberculo interno, principio tereti, aliquantulum nervoso, sub ^cprincipiis musculi palmaris, & ^dduorum carpum flectentium enascitur: hinc ^ecarnosus latiorque redditus, versus medium radii & cubiti, utrique nonnihil inhærens, descendit: inde ulterius progrediens, ex toto carnosus ac rotundus prope carpum redditur, ad quem antequam perveniat, in ^fquatuor carnosas partes dividitur, quarum qualibet in ^gtendinem exquisitè rotundum, nerveum, ac pellucidum abit, qui omnes simul membrana quadam communi, tenui ac mucosa involvuntur, quo tutius iter faciant, sicque sub interno carpi ligamento transeunt, & ad digitos per volam properantes, ^hin quatuor digitorum secundum os, latiores & tenuiores facti, minores tendines in minora ossa, & majores in majora implantantur, cum tendinum magnitudo ossium magnitudini respondeat. Cæterum dum digitorum prima ossa perreptant, ⁱligamento transverso, quod ab uno ossis latere ad alterum pertinet, & per quod etiam subsequenteris musculi tendines transeunt, tanquam fornici subjiciuntur. Prohibet autem hoc ligamentum, quo minus è sua sede & à digito declinent tendines, vel contracti eleventur nimis, præsertim ubi secundum, aut tertium digitorum articulum flectimus, ex quo tum cutis attolleretur, tum vola nimium impleteretur. Prius autem, quam secundum digitorum os attingant, ^jsinguli longa flectione finduntur, rimamque efficiunt, per quam transeunt tendines sequentis, qui tertium digitorum os flectit.

^kFlexor ergo tertii digitorum internodii, dicto totus substernitur, sive principium ejus, seu ventrem, aut tendines consideres. Adnectitur autem interno sui latere cubito: ^lexterno, primo pollicis flexori. Originem ergo ducit parte, & quidem exigua, ab ^minterno humeri tuberculo, reliqua tota ab anterioris olecrani processus radice. Hoc initio facto, exactè ⁿcarnosus & teres efficitur, non secus ac dictus, sicque ad ^ocubiti latus descendit, cujus mediam partem ubi superaverit, angustior redditur, & in ^pquatuor carnosas partes, perinde ac primus, dividitur, quæ antequam ad carpum pertingant, in quatuor ^qtendines degenerant, eo crassiores prædicti musculi tendinibus, quo ipse totus toto crassior est. Involvuntur autem hi tendines membrana nervosa, lubrica, ac humida, magisque quam aliæ membranæ rubra. Transeunt autem sic tecti annulare carpi ligamentum, quemadmodum prioris tendines, quibus ubique subjiciuntur. Ab hac ubi recefferint, æqualiter inter se diducuntur, teretesque facti, ad digitos tendunt, horum ligamenta & fissuras tendinum primi transeuntes, tandem in tertium internodium, latiores redditæ, implantantur.

^rFlectentes primum internodium, teretes sunt, oblongi, ac graciles, unde à similitudine, quam nonnihil cum lumbricis habent, ^slumbricales sunt dicti. Hi ^tinitium suum ducunt à membranæ, quæ quatuor tertium digitorum internodium flectentis tendines involvunt, carnosæ postea progredientes, tandem in primum internodium tendine tereti, ac nervoso, inferuntur.

POLLEX flectitur: sed flectitur tribus internodiis, variisque modis: quare pollicis flexorum alios primi, alios secundi, alios tertii internodii, doctrinæ gratia, vocabimus.

^uPrimi internodii pollicis flexor primus, à ^vligamenti annularis, quod in carpo est, sede superiore, qua parte pollicis substat, carneus exoritur, ascendensque pollicis ossis primi totæ internæ regioni adnectitur, carnosusque in superius ipsius capitulum inferitur. ^wSecundus, partim ex eodem loco, partim ab osse carpi, pollicis substrato, enatus, in radicem primi ossis pollicis, usque ad medium longitudinis implantatur. Dicto totus subjicitur, à quo magnitudine etiam plurimum superatur. Hi duo pollicis os flectunt, ac manui adducunt.

^xSecundi internodii pollicis flexor primus, ab osse metacarpii indicem fulciente exoritur, paulo sub ipsius capitulo, principio carnosus, lato, sed tenui, sicque progrediens versus pollicem, sensim angustior redditur, ut triangulum perquam referat, in capitulum inferius secundi ossis pollicis tendine membraneo, qua parte indicem spectat, inferitur.

^ySecundus, prædicto ab inferiore parte contiguus, ex media sede ossis metacarpii, medio digito præposito, lato principio enascitur, sicque ad pollicem progrediens, in medium secundi ossis pollicis, parte interna implantatur. ^zTertius, secundo contiguus, à metacarpii osse annularem sustinente, similiter latiusculus exoritur, & eodem loco, ubi

secundus, desinit. Quinque hi muscoli omnes carnosi sunt: ex quibus duo primum internodium flectentes, una cum abducente pollicem, pollicis monticulum sic vocatum à Chiromantis: at tres secundi internodii, quicquid inter lineam vitalem & monticulum dictum, carnosum interjacet, constituunt. Flectunt autem secundum os versus reliquos digitos, sic quidem, ut *simul agentes*, pollicem indicis lateri apponant; at *singulis*, ad volam usque perducant, & *primo* quidem, ad partem, quæ sub indice est; *secundo*, quæ sub medio: at *tertio*, quæ sub annulari. *Quartus* autem, his tribus substratus, perinde ac ipsi carnosus, ab osse metacarpii indici subdito, infra medium usque ad articulum cum carpo enascitur, ac eodem, quo dicti modo, ossi secundo pollicis jungitur. Hic pollicem indici admovet, & superponit.

Quartus.

Tertii internodii pollicis flexor.

^a Tertii internodii pollicis flexor unus est, qui non in manu, ut prædicti: sed in cubito carnea sui parte situs, totoque ductu secundo digitos flectenti musculo, latere externo adjacet, cui ad exortum aliquantulum est continuus. Principium habet carnosum ac teres, ab osse cubiti, prope sinum in quo radii caput suscipit; deinde per radii totam longitudinem progreditur, à quo, eidem firmiter adnatus, ubique principium aliquod ducit, quemadmodum etiam à ligamento illo membraneo, quod radium cubito jungit: hic ubi sic progressus ad carpum pervenit, in tendinem teretem & nerveum propria membrana mucosa involutus, degenerat, qui per ligamentum transversum carpi, cum tendinibus duorum digitos flectentium transiens, & per sinum ossis carpi pollicem fulcientis hujus tendinis gratia insculptum, inter musculos, primum, & secundum pollicis os flectentes, occultatur: hinc ligamento transverso, quod in secundo pollicis osse est, exceptus, in ejus tertium os, tendine nonnihil dilatato, valide inferitur. Flectit tertium pollicis internodium, cui infigitur.

CAP V T X X.

De musculis manus digitos extendentibus.

EXTENSORES DIGITORVM.



Secundi ac tertii internodii extensor.

Obferuenda. Secundu.

Primi internodii extensor.

POLLICIS tertium os obliquo extendens.

Vemadmodum alii erant muscoli, qui digitos flectebant, alii qui pollicem: ita qui extendunt eosdem, diversi sunt ab iis, qui pollicis extensioni destinantur. Extenduntur autem in digitis, tertium, & secundum os, ab iisdem & simul, cum alterum absque altero extendi nequeat: primum vero, peculiare musculos habet.

^b DIGITORVM ergo extensor primus ^c trium interiorum digitorum ^d tertium & secundum os extendit, & ab ^e humeri tuberculo exteriore oritur, initio partim carneo, partim nerveo, statimque carnosior factus, inter ^f duos carpum extendentes descendit, ac juxta carpum angustior redditus, in ^g tres carnosas partes finditur, quemadmodum flectentes longi, qui mox degenerant in ^h tendines nerveos pellucidos, exacte teretes, & ligamento membraneo, à radii appendice pronato, colligati, sicque una per sinum in externa radii parte exsculptum, ad carpum deferuntur, ubi transeunt ⁱ ligamentum annulare, mox à se diducuntur, latioresque fiunt, ac primus indicem, alter medium, tertius annularem digitum petit, ac in ^k secundum & tertium internodium inferuntur. Tendines autem hi usque ad extremum tertii ossis apicem pertingunt, ac sub ipsis unguitibus recumbunt. Ex quo causa petenda est, tam levi doloris, quem experimur, si quando dolorifici quid circa illas partes fuerit. ^l Extendentium secundus, ab ^m eodem tuberculo, acuto principio, & nerveo nascitur, à quo prior, cui ad ⁿ medium ventrem etiam sic commiscetur, ut ad exortum prorsus unus esse videatur. Hic juxta cubitum progrediens, ubi ^o ligamentum transversum superaverit, in ^p tendinem nerveum, ac teretem abit, qui ad minimum digitum, latior factus progreditur, ac secundo & tertio ejus internodio implantatur.

^q Primum vero internodium extendunt, octo illi muscoli, quos *Interossos* vocabimus, tum scilicet, cum duo simul agunt, ut capite sequenti dicemus, cum ad eum potius, quam ad hunc locum referendi videantur.

^r POLLICIS tertium os extendens, à cubiti exteriore sede, ad ejus lineam asperam, carnosus exoritur, ubi ligamentum est membraneum, quod cubitum radio jungit, ad radium oblique deferitur, cujus appendicem priusquam attingit, in tendinem teretem degenerat,

degenerat, ac sub ligamento transverso ad manum abit, ac totius pollicis longitudini, qua indicem spectat, ad ejus tertium os usque inferitur. ^a *Secundus, secundi & tertii pollicis internodii extensor*, ab eadem cubiti linea juxta ipsius longitudinem carneus enatus, oblique supra radium conscendit, & in duas impares partes sibi mutuo hærentes dividitur, sinuque proprio in radii appendice inciso, infidet, ac ligamento peculiari obducitur. Superior portio aliquamdiu carnea remanet, at postea in tendinem teretem degenerat, qui in os carpi, pollicis subiectum, inferitur: at inferior, statim ac paululum processit, in portiones duas carneas subdividitur, quæ singulæ in tendinem finiunt, quorum alter radici primi pollicis internodii, alter membranoso nexu, secundo & tertio pollicis ossi validissime adnascitur.

Secundus tertii & secundi pollicis internodii extensor.

CAPUT XXI.

De musculis manus digitos oblique ad latera trahentibus.

DIGITI, præter flexionem & extensionem, etiam ad latera moventur, sicque adducuntur, vel abducuntur. Dico *adduci*, cum versus pollicem trahuntur: *abduci*, cum contra ab ipso retrahuntur. Eodem autem pacto, & *pollex* ipse *adduci* dicitur, aut *abduci*, cum vel digitis admovetur, aut ab ipsis removetur. Musculi qui hos motus perficiunt, plures sunt, ex quibus quidam, ut octo priores, *communes* quasi sunt, & in genere quatuor digitis destinantur, excepto pollice: duo alii *proprii* sunt, alter indicis, alter minimi. Pollex deinde suos quoque habet peculiare.

Communes ergo octo sunt, qui vulgo ^b *Interossei* à situ vocantur, quod inter ossa metacarpii positi sunt. *Sunt* autem octo, carnei ac teretes, ab iisdem quibus connascuntur ossibus exorti, secundum quorum longitudinem totam recta feruntur. Hi ubi ad digitorum radices perveniunt, in ^c *tendines* abeunt, qui lateribus digitorum, quibus connati erant, attensi, usque ad secundum internodium tendine suo feruntur. *Sunt* autem ^d *sex in tribus internodiis ossium metacarpii locati*, adeo ut bini in singulis, ex quibus unus ad anteriorem, alter ad posteriorem digitum deferatur. ^e *Alius deinde primo ossi metacarpii ejusdem, quod Indicem sustinet, incumbit ea parte, qua pollicem respicit.* ^f *Alius ultimo ossi metacarpii parte manus externa, sive in dorso, adhæret.* Musculi hi, *quatenus* reliqua quoque præter primum internodium, suis tendinibus attingunt, secundum etiam, ac tertium os extendunt, quod primum à Galeno observatum est, lib. 1 de Usu part. cap. XVIII. Et hæc causa est, cur digitorum extensore abscisso, digitorum extensio tamen non aboleatur; quia scilicet interossei simul agentes extensionem perficiant. *Quatenus* autem primo ossi implantantur, si contrahatur uterque unius digiti, primum internodium extendunt: at si alteruter, tum abducit, aut adducit.

^g *INDICEM abducens*, duobus extendentibus digitorum inferiores duos articulos, secundum scilicet & tertium, subjicitur. Oritur hic à cubito medio, qua parte oblongam & asperam lineam pro ejus exortu os habet, principio exacte carnoso: hinc oblique ad radium descendit, & carpi appendicem conscendens, in tendines duos dispescitur, qui postea per sinum proprium, in radii appendice exculptum, sub ligamento annulari versus manum deferuntur. Horum superior ad indicem, inferior ad medii digiti radicem oblique implantatur, ut invicem à pollice abducant.

^h *Minimum digitum abducens*, in vola manus positus est sub minimo digito, brevis, at validus, ab osse quarto carpi carnosus enatus, postea per metacarpium delatus, ossi primo minimi digiti, latere externo, gracilis & nerveus inferitur. Hic minimum digitum à cæteris abducit; & præcipuum ulum habet, dum sphericas figuras apprehendimus, cum eo tempore maxime à cæteris digitis minimus fit abducendus.

POLLEX ad latera dum movetur, vel abducitur à cæteris digitis, vel adducitur. ⁱ *Abducens*, à carpi ossis pollicem sustinentis interiore parte, nervoso principio, juxta primum flexorem primi pollicis internodii, enascitur: mox carnosus factus, deorsum fertur, & in primum pollicis internodium, tendine membranoso inferitur. Hic ab indice abducit. ^k *Adducens*, spatium quod inter pollicem & indicem visitur, in externa manus sede, occupat. Hic ab ossis metacarpii, quod indicem sustinet, partis posterioris

Digitos abducens, Interossei.

Indicem abducens.

Minimum abducens.

Pollicis abducens.

Pollicis adducens.

rioris latere externo carneus oritur, & in pollicis internodii primi totum latus internum carnosus inferitur. Adducit pollicem ad indicem.

CAPUT XXII.

De musculis Femoris.

CRURIS

musculi.

Femoris
motus.Numerus mus-
culorum.
Situs.Extendentes
femur.
Primus.

Secundus.

Tertius.

Flectentium.
Primum.

X artubus Manum vidimus: sequitur nunc, ut Cruris quoque musculos videamus, qui pro partibus cruris varii sunt, adeoque alii femoris, tibiæ, pedis, alii digitorum. F O E M V R, triplicem motum habet: extenditur enim, flectitur, & in gyrum movetur. *Extenditur*, cum femur versus exteriora ducimus, quemadmodum cum divaricatis admodum cruribus stamus. *Extendimus autem vel recta*, cum recta ab altero abducimus: vel *oblique*, versus anteriora corporis, aut posteriora, cum ad easdem partes trahimus. *Flectitur autem*, cum attollimus, quemadmodum sedentes flexo femore sedemus. *Flectitur autem similiter recta*, vel *oblique*. *Recta*, cum versus corpus tollitur, ut ad neutrum latus inclinet, & quando cum spina rectum angulum facimus; at *oblique*, cum versus latus parum movemus, ubi vere flectitur; similiter & cum femur femori imponimus. *Circumagitur autem*, cum femur circumvertitur, quod solet evenire, dum stantes pede recto, & terræ affixo, oblique crus movemus. Hic motus duplex est, & vel ad interiora, vel exteriora corporis. *Ad interiora* quidem, cum genu ad poplitem ducitur, & calcaneus foras fertur. *Ad exteriora*, quando genu foras, & calcaneus intro movetur. *Extensio*, *trium*; *Flexio*, *quatuor*; *Circumvolutio*, *totidem* musculorum beneficio peragitur. *Extendentes* partem posteriorem occupant, & ossis innominati, sive coxæ dorso incumbunt. *Flectentium* duo priores, in ventris cavitate sunt siti: duo posteriores, femori insident. *Circumagentes* coxendicis sedem occupant; unus internam, tres externam. *Extendit recta*, *tertius*: at versus anteriora, *secundus*; ad posteriora, *primus*, si toti agant. *Flectunt recta*, *flectentium primus*, & *secundus*: *oblique*, *tertius*, & *quartus*. *Circumagitur*, versus superiora, *primus*; interiorum, *secundus*; ad exteriora, *tertius*; ad posteriora, *quartus*.

^a EXTENDENTIVM ergo *primus*, quem cum duobus sequentibus *Gluteum* appellant, quod narium carnosam molem conficiant, discriminis vero gratia *majorem*, quod maximus sit omnium, & fere alterius lateris natem totam efformet. Statim detracta cute occurrit, & principium habet latissimum, à diversis ossibus enatum. Nam ^b *superior* ejus pars ab ossis ilium spinæ circumferentia tota: at ^c *lateralis* ab ossis sacri parte humilior: ^d *inferior* autem, à coccyge prodit. Ex omnibus ergo his initiis, ut semicirculo carnosus exortus, oblique nonnihil descendit, ac ^e coxendicis articulum supervehitur, ubi mox gracilior, & angustior totus redditur, & in ^f tendinem validum ac latum desinit, qui partim ^g in primam rotatoris majoris impressionem, partim in ^h asperam lineam, quæ sub quarta impressione deorsum ducitur, implantatur. ⁱ *Secundus*, sive *Gluteus medius*, ab ossis ilium spinæ anteriore sede, paulo humilior, quam *primus*, sub quo totus fere latet, quemadmodum & ab ilium ossis dorso, ^k principio carnosum, lato similiter, ac semicirculari exoritur, oblique in partem exteriorem descendens, sensim angustatur, & supra coxendicis articulum, quem contegit, vectus, in tendinem membranæ in modum latum validumque finit, qui in ^l secundam majoris rotatoris impressionem transversim implantatur. ^m *Tertius*, sive *Gluteus minor*, lividus in omnibus hominibus, præsertim in robustis, in quibus etiam ea secundi pars, quæ tertio superjecta est, livida apparet, totus sub medio latitat, quo tanto minor est, quanto ille primo. ⁿ Nascitur hic à posteriore, & inferiore sede dorsi ossis ilium, ubi coxendicis os incipit circa acetabulum, principio lato, crasso, carnosum, ac semicirculari. Hinc oblique descendit versus anteriora, in hærens fibrosis nexibus ligamento illi, quo femoris caput coxendicis sinui conjungitur, paulatimque angustatus, in latum ac validum tendinem abit, qui in ^o tertiam impressionem majoris rotatoris inseritur.

^p FLECTENTIVM *primus*, Græcis *Ψαα* dicitur, vel, ut nonnullis placet, *Ψαα*, Latine *lumbalis musculus*. Oritur hic à latere corporum ^q duarum ultimarum thoracis vertebrarum, & ^r *trium* superiorum lumborum, tum à transversis processibus eorundem, ^s principio

* principio carneo & livido. Figura vero quodammodo teres est, ex acuto initio paulatim crassescens, sicque per interiora^b ossis ilium deferitur, qui ubi ad^c ossa pubis pervenit, in teretem & validum^d tendinem mutatur, & per^e sinum ossis pubis, eo nomine exculptum, prope os coxendicis deferitur, & in superiorem partem, ^f minoris rotatoris implantatur. Transít autem per sinum huiusmodi, tum ne, si quando contrahatur, à loco suo recedat; tum ne tendo muscoli ab acuto ossis processu lædatur. Situs ergo est in abdomine nonnihil oblique, & statim in lumbis remotis visceribus imi ventris ac intestinis, occutrit conspiciendus. ^g *Secundus*, *Iliacus internus*, ab aliis communiter dictus, quod in^h ossis ilium interna parte, quam totam occupat, sub priore situs sit. Nascitur hic ab universaⁱ spina, sive appendice interna ossis ilium, ^k principio carneo semicirculari, sed mox ex lato initio^l angustior, contra ex tenui crassior factus, in priora fertur, & in^m tendinem degenerans, perⁿ sinum ossis pubis prædictum deferitur, ac tendini prædicti muscoli connatus, in^o minorem rotatorem quoque inseritur, sed sede paulum, quam prior, humiliore. ^p *Tertius*, cognomine *Triceps*, omnium fœmoris, imo universi corporis maximus est. Videtur enim hic musculus ^q tria habere capita, quæ in muscoli unius finem congregiuntur. Horum *primum*, à coxendicis appendice nerveum, deinde carneum principium sumit, quod postea in ventricosam carnem degenerat, quæ per fœmoris posteriora delata, gracilescit, & in teretem tendinem, cuius terminus est in interno fœmoris capite prope poplitem, abit. *Secundum* caput, anterius ab ea coxendicis sede, quæ cum osse pubis committitur, carneum enascitur, & obliquis, ac fere transversis fibris, ad radicem minoris rotatoris, & superiorem partem lineæ asperæ fœmoris terminatur. *Tertium*, carneum, ab inferiore coxendice incipit, & partim obliquis, partim rectis fere fibris inferiori parti lineæ asperæ implantatur. Hunc communiter pro quarto extendentium habent; sed revera quicumque recte ipsum consideraverit, nobiscum in classem eorum, qui flexioni præstant, ascribet. ^r *Quartus*, lividus est, & cum priore minime confundendus, etsi ejus portio quoquo pacto esse videatur. Oritur ab^s ossis pubis parte anteriore, prope cartilaginem, qua duo ossa sibi invicem committuntur, principio lato ac carneo, quo postea oblique descendit, donec in tendinem amplum, sed brevem degeneret, qui fœmoris lateri interno, è regione minoris rotatoris, usque ad dimidium longitudinis fœmoris implantatur.

^t *CIRCUMAGENTIVM primum*, qui *Iliacus externus* dicitur, & *Pyriformis*, ^u à tribus humilioribus ossis sacri vertebra, tereti & crasso principio exoritur, sic ut non modo à lateribus externis ipsius enascatur, sed etiam in interiore ejusdem ossis parte, ubi à sui conjugis principio haud multum distat. Hinc transversim excurrans, in teretem^x tendinem mutatur, & ^y majoris rotatoris quartæ impressioni, quæ in apice hujus processus est, implantatur. Musculum hunc Anatomici inter extendentes referunt, & quartum numero faciunt: sed quam bene diligentior consideratio, quæ me docuit, & ipsos facile, si advertant, edocebit. ^z *Secundus*, qui cum sequente *Obturator* dicitur, propterea quod^a foramen ossium pubis, principiis suis obturent. Et quia hic ab externa foraminis parte oritur, *externus obturator* dici consuevit, quemadmodum tertius, internus dicitur, quod ab interna regione, qua hypogastrium respicit, pronascatur. Oritur ergo à membrana foramen succingente, & ab ossium pubis ac coxendicis oris, carneus & amplus; deinde transversim ad posteriora fœmoris procedens, angustior fit, validum producens tendinem, qui in sinum magni rotatoris inseritur. ^b *Tertius*, sive *obturator internus*, ab interno ambitu foraminis ejusdem pariter carnosus enatus, & amplus, ac validior prædicto, totam internam ossium coxendicis & pubis sedem occupat, sensim angustior evadit, & ^c tres, quatuorve tendines porrigit, qui ad externam coxendicis partem, trochleæ modo, supra^d sinum coxendicis in hunc finem exculptum, ac crasso validoque ligamento obductum, reflexe feruntur, ^e carneoque marsupio (quod visu certè est pulcherrimum) ut robustior fiat, & minus in suis motibus ab osse offenderetur, investiti, tendinem unum constituunt, qui in sinum magni rotatoris, in quem & prior, inseritur. ^f *Quartus*, partim ab externo tuberculo ossis ilium, partim ab appendice coxendicis exoritur, sub sinu trochleæ, circa quem prior circumvolvebatur, & cui propterea etiam subjicitur. Brevis postea ac carnosus, ad posteriorem partem majoris rotatoris procedit, ibique in

Secundus.

Tertius.

Quartus.

Circumagentes sicut.

Secundus.

Tertius.

Quartus.

illud

illud spatium, quod inter utrumque rotatorem est, inseritur. Quare hic musculus cum Vesalio fortasse non incommode in duos dividetur.

CAPUT XXIII.

De musculis Tibiæ.

TIBIÆ
musculi.
Numerus.
Situs.

Motus.

Flectentes.
Primus.

Secundus.

Tertius.

Quartus.

Quintus.



TIBIA tribus motibus cietur. Flectitur enim, extenditur, & nonnihil oblique versus exteriora ducitur. *Flectunt*, quinque; *extendunt*, quatuor; unus, *oblique movet*. Primus & secundus flectentium, in anteriore fœmoris parte jacent: ille, externa; hic, interna; at reliqui, in posteriore. Extendentes omnes in anteriore sede fœmoris: Oblique autem movens in posteriore, ac superna tibiæ. Flectentes omnes simul contracti recta tibiæ flectunt: at primis quatuor solum agentibus, nonnihil ad interiora; quinto autem, modice ad exteriora circumagitur. Per hunc enim motum, pedis extremitas in qua digiti sunt, nonnihil extrorsum ducitur. Extendentes simul agentes, similiter recta extendunt, quemadmodum & primo, & secundo, deorsum moto: at tertio solum, ad exteriora; quarto, versus interiora movetur.

^a FLECTENTIVM primus, quem ego Sartorium musculum vocare soleo, quod sartores eo maxime utantur, dum crus cruri inter consuevendum imponunt. Alii fasciæ appellant, nonnulli etiam fasciam, quod hanc referat, cum longus admodum sit, & æquali fere latitudine decurrat, si caput & caudam demseris. Omnium musculorum nostri corporis pæne longissimus est. Ducit enim principium acutum, carnosum, & nerveum, ab ^b anteriore parte appendicis, sive spinæ ossis ilium, deinde statim totus carneus factus, & latiusculus, oblique per fœmoris interiora descendit, ut decussatim reliquos musculos supervehatur. Tandem ad caput internum imæ fœmoris appendicis delatus, in tendinem nervosum, latum, vel (ut Vesalio placet) teretem mutatur, qui statim infra genu, in ^c ossis tibiæ lineam acutam, parte anteriore & interna implantatur. ^d Secundus, quem Gracilem vocant, nerveo amploque principio, ab ^e osse pubis, juxta longitudinem cartilaginis, qua sibi invicem committuntur, oritur. Carnosus postea redditus, per fœmoris interiora carneus descendit, donec ad fœmoris internum caput pervenerit, ubi exacte teretem tendinem assumit, qui ^f in primam tibiæ lineam, juxta primum, paulo tamen inferius, illigatur, ad quam nonnihil latiusculus evadit. ^g Tertius, seminevrosus nuncupatur, quod ejus substantia, partim nervea, partim carnea sit. Oritur enim nervosus, ac gracilis, ab elatiore, & maxime posteriore sede ^h appendicis ossis coxendicis, nervosusque diu permanens, tandem in medio ⁱ carnosus factus, multiplicibus fibris per posteriora fœmoris, ad ^k poplitem fertur, prope quem in tendinem teretem degenerat, qui ad anteriora tibiæ reflexus (ubi & prædicti duo) sub genu in eam terminatur. Habet tamen hoc peculiare hujus tendo præ reliquis, quod ad tibiæ usque medium longitudinis pervenit, reliquorum tendinibus tibiæ implantatis, haut æque descenditibus. ^l Quartus, semimembraneus dictus, ex ^m eodem loco, quo commemoratus prodit, gracili & nerveo principio, rectisque fibris per posteriora fœmoris deorsum excurrans, toto ductu, usque ad medium fœmoris nerveus remanet, ubi primum carnosior redditur & crassior, sicque ad ⁿ poplitem in tendinem teretem definit, quo in tibiæ lateri inferius insertitur. Primi enim quatuor flectentes, in lateri inferius tibiæ illigantur; at quintus, in fibulam. Illi, internam illam duritiem in poplite efficiunt; iste, externam. ^o Quintus, biceps vocatus, ex ^p eadem ossis coxendicis appendice ac tertius & quartus, initium ducit nerveum & acutum, sed gracilius nonnihil: mox carnosus redditus, per fœmoris posteriora sensim deorsum versus exteriora decurrit. At ubi medium iter absolvit, & jam dimidium quoque longitudinis ipsius fœmoris superavit, attenuatur, & externa sui sede nerveus admodum videtur, quasi jamjam in tendinem abiturus: at interna sede, ex fœmore ^q alia quædam pars accedit, atque ita adnascitur, ac si duplici principio musculus constaret. Sic ergo ex duobus initiis in unum musculum degenerantibus confectus, ac descendens, foris admodum nervosus, in tendinem robustum abit. Tandem per sinum externum externi capitis fœmoris, in hunc finem exsculptum, repens, externo lateri superioris appendicis fibulæ pertinaciter inseritur.

EXTEN-

^a EXTENDENTIVM primus, Membranofus dicitur ab Anatomicis, & musculus lati tendinis. Hujus enim ^b principium acutum, intus carneum, exterius nerveum, originem ducit ab eo ^c latere ossis ilium, & ipsius spina, quod anterius proximum est initio musculi primi tibiam flectentium, sive sartorii: postea forma lacertæ descendit, & majori rotatori adnectitur, ubi mox carneam substantiam deponit, & in ^d tendinem degenerat latum, membranofum, ac nerveum, quo latiore in universo corpore reperire non est, cum omnes musculos totius fœmoris investiat. Duplici hic fibrarum genere donatus est, rectis nempe in externa fœmoris sede, at transversis in interna. Si tamen, quid sentiam, dicendum est, existimem eam hujus tendinis portionem, quæ rectis fibris prædita est, tendinem revera hujus musculi esse; at quæ transversis, ligamentum potius peculiare, musculis internis in contractione cohibendis, destinatum. ^e Tandem patellam in genu amplexus, tibie fibulæque, cruris puta anteriori exteriorique sedi, statim sub genu ^f implantatur. ^g Secundus, Rectus cognominatus à recto progressu, figuram veri musculi habet, flectentium tibiam primo extrorsum adjacens. Oritur enim principio acuto ac nerveo, ab ^h ossis ilium tuberculo interno: inde in ventrem carnosum, ac teretem faciens, recta per fœmoris longitudinem & anteriora, inter ⁱ duos Vastos, sive tertium & quartum tibiam extendentium, medius descendit: at ubi ^k patellam attingit, in latum validumque ^l tendinem definit, quo patellæ, tanquam in eam terminaturus, valide adnascitur: ulterius autem progrediens ad ^m articulum, sive anteriorem tibie sedem, in ejus medium, statim ac patellam superavit, eo loco inseritur, ubi ⁿ tuberculum in hunc usum peculiariter creatum, evidenter admodum prominet. ^o Tertius, quem à mole insigni *Vastus externum* appellant, ^p principio lato, ac nerveo, à radice ^q majoris rotatoris fœmoris, quam undique amplectitur, enatus, fœmoris parti superiori exteriorique valide adhærens, sensim crassescit, ac carne livida, fibris rectis prædita, usque ad ^r patellam descendens, in latum ac membranofum ^s tendinem abit, qui cum exteriori parte ^t tendinis prædicti musculi secundi commixtus, patella superata, in idem cum ipso tuberculum inseritur. ^u Quartus, *Vastus internus* appellatus, ^v principio nerveo, partim à ^w cervice fœmoris, partim ^x à magno rotatore prodit, statimque carneosus redditus, fœmoris anteriori & internæ sedi perpetuo adhærens, & diversis fibrarum generibus auctus descendit; qui ubi jam ad genu fere appulit, in tendinem membranofum terminatur, qui cum ^y tendine secundi & tertii commixtus, valide patellæ adnascitur: mox hac iterum deserta, in tuberculum superius anterioris tibie sedis, ubi & illi, implantatur.

^b OBLIQUE MOVENS, *suppopliteus* Galeno, in poplite situs est, sub initio gasterocnemii interni, sive secundi pedem extendentium, unde nec nisi illo remoto in conspectum prodit. ^c Initium ejus latum ac nerveum est, à capite fœmoris externo, sive, ut nonnullis visum, à ligamento articuli genu posteriori: hinc carnosus factus, oblique incedit ad posteriorem ac anteriorem superioris tibie appendicis radicem insertus.

CAPV T XXIV.

De musculis Tarsi, sive Pedis.



Es triplicem habet motum. Extenditur, flectitur, & ad latera movetur. ^{PEDIS musculi.}

Extendunt, musculi duo; flectunt, totidem; totidem etiam ad latera trahunt.

^a EXTENDENTIVM primus, *Gasterocnemius externus*, quod suram constituat, Græcis γαστροκνήμιον dictam, vocatur. Idem *Gemellus externus* ab iis dicitur, qui nobiscum pro uno musculo habent, etsi duo nonnullis esse videantur, quod distinctis originibus prodeant, qui tamen & una membrana contexti sunt, & in unum tendinem una cum subiecto Gasterocnemio, aut gemello interno transeunt. ^b Primum ergo ipsius principium sub poplite, ab interno fœmoris capite enascitur carnosum, latumque; & per tibie posteriora interioraque descendens, latius ac crassius, cum altero mox junctum evadit, quod cum primum ad medium longitudinis ejusdem pervenerit, in ^c tendinem cessat, alterius principii tendini similiter commixtum.

R

^a Alterum

^a Alterum autem pariter sub poplite, sed ab externo fœmoris capite, carneum incipit, sensimque per posteriora similiter, sed exteriora cruris descendens ut prius, cum quo coit, latescit, & prope eundem locum, quo primum etiam, paulo tamen superiorem, in tendinem transit, qui cum priore ita commiscetur, ut unus ex utroque tendo fiat validus, latus, ac nerveus, quique paulo post cum tendine Gasterocnemii interni ^b coiens, in ^c calcis posterius latus inferatur. Hujus musculi duobus capitibus, quemadmodum id Vesalius notat, non procul ab exortu ^d sesamoidea ossicula tributa sunt.

Secundus.

^e Secundus, Gasterocnemius internus, quorundam soleus, externo subjacens, colore lividus, à posteriore fibulæ appendice, nerveo validoque ^f initio enatus, inde ^g ventricosus factus, fibulæ ac tibie adhærens, amplitudine sua ultra hæc duo ossa sese extendit in progressu, at ubi medium fere tibie superavit, angustior factus, in ^h tendinem abit, qui non procul à calcaneo ita valide externi gasterocnemii tendini connascitur, ut unus inde tendo fiat, qui in ⁱ calcis posterius latus inferitur. Hic ille est tendo, quo Hectorem Achilles circa Troie mania traxisse Poëtarum maximus canit, quem Hippocrates *tendinem magnum* vocavit, & quo hodierno tempore macellarii boves suos suspendunt. Cæterum diligenter memoriæ mandandus est, quod obortæ circa hunc inflammationes misere universum corpus in consensum trahant.

Flectentes.
Primus.

^k FLECTENTIVM primus, ab aliis *tibialis anticus*, à me *catena musculus* vocatus, quod dissecto per transversum hujus tendine, aut amputato, catenam agri, cujus beneficio ambulantes pedem flectant eleventque, portare cogantur. Hic exacte musculorum figuram illam observans, qua lacertam expriment, antierius à ^l tibie ^m fibulæque superioribus appendicibus, quo loco sibi invicem coartulantur, quemadmodum & à communi ligamento, quod utrumque hoc os connectit, acuto carneoque principio exoritur. Cæterum illico dilatatur, sed ubi ad medium fere longitudinis tibie pervenit, iterum coarctatur, & sensim in ⁿ tendinem nerveum, robustum, ac teretem finit, in vivis quoque sub cute admodum, si pedem flectas quantum pote ad acutum angulum, conspicuum, qui nonnihil oblique inferius anticnemium supervectus, prope pedis articulum, in internum latus ossis tarsi, quod pollicis ossi præponitur, implantatur. Tendo autem hic prope articulum, antequam ulterius vehatur, sub ligamento transverso, sive annulari, quod ab inferiore tibie fibulæque appendice nascitur, transit.

Secundus.

^o Secundus, alteri oblique pedem moventium substratus, *peroneus secundus* quibuldam, mihi *semifibuleus* dictus, ^p originem ducit oblongam, carnosam, ^q fibulæ adhærentem: at cum medium longitudinis fibulæ superavit, in ^r tendinem degenerat teretem, qui ad fibulæ posteriora, sub ^s externo malleolo, reflectitur, & in os tarsi parvum digitum sustinens duplici ^t insertione implantatur, unde à me *bicornis* dici consuevit.

Oblique moventes.
Primus.

^u OBLIQUE MOVENTIVM primus, sive *adducens pedem*, quod ad interiora pedem trahat, hic à me *nauticus* vocari solet, quod eo nautæ potissimum utantur, dum malum scandunt: ab aliis *tibialis posticus* dicitur. ^v Originem habet carnosam à tibia, fibulæque, & ligamento, quod utrumque hoc os necit, cui attentus, inter posteriores musculos jacens, ^y tendinem teretem prope internum malleolum profert, quem ubi superavit, ligamento valido investitus, ad plantam pedis transit, & in tarsi ossis, quod cubiformi vicinum est, sedem inferiorem implantatur. ^z Secundus, sive *abducens*, quod ad exteriora trahat, *Peroneus primus* aliorum, sive *fibuleus*. Oritur valido nervosoque ^a principio à ^b superiori fibulæ appendice, externoque fibulæ toti lateri adhærens, descendit teres & carnosus, externa parte lividus; at interna, qua musculos spectat, rubicundus. Hic ubi ultra medium longitudinis fibulæ progressus est, carneam substantiam deponit, sicque in ^c tendinem degenerat, qui oblique retro sub ^d malleolo externo transit sinum, ^e ligamento involutum transverso, qui à fibula ad calcaneum & lorum sub planta pedis admodum reflexus, in radicem ossis pedii, quod pollicis prostat, inferitur.

Secundus.

CAPVT XXV.

De musculo, cujus latus tendo, media plantæ subnascitur, & Plantaris propterea vocatur.



INTER eos musculos, qui in Tibia situm habent, occurrit nonnullus, qui in omnibus propemodum convenit cum alio quodam, cujus historiam ^a superius complexi sumus. Vt enim ille longissimo primo ac impense tereti tendine, per universum cubitum interiorem excurrerat; inde, ad carpi ligamentum annulare appellens, in latissimam expandebatur membranam, totam manus volam succingentem, unde & Palmaris dictus: sic iste per totam posteriorem tibie sedem tendine tereti descendens, postea in plantam expanditur, ideoque Plantaris vocatur. ^b Situs enim est sub externo Gasterocnemio, & ab exteriore femoris capite sub poplite, ^c principio terete carneo ac gracili exoritur, postea nonnihil dilatatus oblique à parte externa internam versus descendit, ac statim in gracilem & longissimum ^d tendinem, quo major inter teretes in humano corpore non datur, degenerans, ad latus interius cruris, inter duos gasterocnemos, & horum tendines repit. Tandem prope calcaneum à latere tendini gasterocnemiorum adnexus, ad ^e internum calcanei latus, & ab hoc ulterius ad plantam pedis pervadit, ubi in eadem latitudine diu incedens, sensim postea trianguli ritu latefcit, & prope digitorum primos articulos totam plantam obtegens, ^f ad singulos quinque digitos inseritur. Non ergo secius in totam plantæ sedem, ac palmaris in volam totam absumitur. Quod si desit hic musculus, tum hujus tendo latus, ut & palmaris, à digitorum flexore altero surrogatur. Videtur autem cum figura eadem, eundem quoque usum habere in planta, quem habet palmaris in vola manus: nequaquam autem, ut vulgo statuitur, pedis vel tarsii extensioni ancillari.

CAPVT XXVI.

De musculis pedis digitos flectentibus.



IGITI PEDIS flectuntur, extenduntur, aut in latera moventur. Quare tria jam erunt musculorum genera, qui digitis dicati sunt, flectentes scilicet, extendentes, & oblique moventes. Ex his quatuor in tibia siti sunt, flexor scilicet tertii digitorum internodii, flexor pollicis, extensor tertii digitorum articuli, & pollicis tensor: reliqui, in pede.

^a DIGITORUM tertii internodii flexor, sive perforans, gasterocnemio interno subjacet, & à ^b tibie posteriore sede, sub ^c poplite, ^d initio longo carnosoque oritur, per longitudinem tibie, cui adnascitur, excurrens, ac ultra ejusdem medium vectus, in ^e tendinem definit, qui prope ^f malleolum internum sit nerveus ac teres, & sub ipso à ligamento, quod ab inferiore tibie appendice ad calcaneum procedit, vinctus, ad plantam pedis progreditur, ac in ^g quatuor tendines secatur, qui singuli tandem ad ^h tertium internodium, sive ultimum os quatuor digitorum, ut id flectant, inseruntur.

ⁱ Flexor secundi internodii, Perforatus dictus, carnosus nervosusque à ^j calcaneo interiore oritur, ac ubi medium pedis superavit, in ^k quatuor teretes tendines secatur, qui in ^l secundum digitorum internodium, quod flectunt, inserti, perforati sunt, ut per eos musculi prioris tendines ad tertium internodium transire queant.

^m Flexores quatuor primi internodii, Lumbricales dicti, usu, figura, atque exortu lumbricalibus in manu positis similes sunt. Oriuntur enim eodem pacto ⁿ à tendinibus perforantis musculi, & tertium articulum flectentis, parvi teretesque, & parvo ^o tendine in latus ^p primi digitorum internodii inseruntur. Horum actioni plurimum opulari videtur ^q carnea quædam portio, quæ ab anteriore parte lateris inferioris calcis duobus acutis initiis enata, non admodum crassa, recta antorsum progreditur, ad divisuram tendinis tertium digitorum internodium flectentis, ibique principii quatuor musculorum lumbricalium inseritur.

DIGITO-
RUM pedis
musculi.
Numerus &
situs.

Digitorum
flexores.
Flexor tertii
internodii.

Flexor secundi
internodii.

Flexores primi
internodii.

POLLICIS
flexor.

^a POLLICIS flexor, à ^b fibulæ posteriore sede, longe sub appendice superna, prope medium longitudinis fibulæ, carnosus acutusque prodit; deinde ventricosior factus, prope ^c malleolum internum in ^d tendinem teretem mutatur, qui oblique sub malleolo, eodem, quo ^e flexor tertii internodii, munitus ligamento, ad ^f tertium pollicis internodium accedit. Hic tendo sæpe cum tendine flecentis tertium articulum ad indicem excurrentis connascitur, & antequam attingat secundum pollicis internodium, os sesamoides grandius, quam in cæteris digitorum internodiis est, acquirit.

CAPVT XXVII.

De musculis pedis digitos extendentibus.

DIGITO-
RVM Ten-
sores.
Tensor tertii
internodii.



DIGITORVM ¹ tertium internodium extendens, nerveo & acuto principio à superiore & anteriore tibiæ appendice oritur, statimque factus carneus, & adnatus ² ligamento, quod tibiæ os fibulæ annectit, recta descendit ad pedem, ubi in ³ quatuor tendines dividitur, qui sub ⁴ transverso ligamento, & annulari, quod à tibiæ fibulæque appendice exit, uniti perreptantes, sese expandunt in quatuor digitorum tertium & secundum internodium, ut ipsa extendant. Cæterum ipsi tendines ⁵ ligamento quodam membraneo inter se alligati sunt, ubi per pedis dorsum excurrunt.

Tensor secundus
internodii.

⁶ Extendens digitorum secundum articulum, in ⁷ pedis dorso situs est, & originem suam accipit à transverso ligamento carneam & latam, ex qua quatuor veluti separati musculi prodeunt in progressu, quem ad digitos moluntur, & ex his quatuor, aliquando etiam quinque ⁸ tendines, qui singulorum digitorum tria internodia, sed præcipue secundum, adeunt, ut hæc etiam extendant, ligamento, ex digitorum articularum lateribus prodeunte, adnexi.

Tensor primus
internodii.

Primum autem internodium extendunt ⁹ interossei, de quibus in sequenti, & ultimo hujus libri capite dicemus.

POLLICIS
tensor.

¹⁰ POLLICIS tensor, ¹¹ principium carnosum à medio fibulæ, vel (uti Vesalio placet) à tibiæ externo latere, quo à fibula dehiscit, desumens, quemadmodum & à ¹² ligamento, quod tibiæ fibulæ conjungit, cui pertinaciter adnascitur; dein ¹³ tendinem generans, super anticnemium inferius fertur, & sub ¹⁴ transverso ligamento, ad ¹⁵ tertium pollicis internodium, quibus inferitur, vadit, ut ea recta extendat. Aliquando hic tendo bifariam in duos dirimitur; quorum alter, in pollicis internodium ultimum; alter, in os pedii inferatur.

CAPVT XXVIII.

De musculis pedis digitos ad latera oblique moventibus.

DIGITO-
RVM obli-
que motores.



DIGITORVM obliqui motores, ¹ Interossei dicuntur, quod inter ossa habitent. Horum in manu octo duntaxat habentur, at in pede decem, quod metacarpium, à metatarso osse uno superetur, unde quatuor emergunt ossium intercapedines, in quibus octo existunt musculi, quibus si duo alii adnumerentur, ² unus nempe ad pollicis, ³ alter ad parvi digiti externum latus, numerus denarius complebitur. Singuli autem à sui lateris ⁴ osse pedii, carnosif enascuntur, ibique secundum ossis longitudinem ducti, spatia illa interossea replent, & carnosif fere inferuntur in quinque digitorum ⁵ radices, sive ossa prima, brevibus, & aliquantulum latis tendinibus. Horum si uterque simul agat, qui uni digito inferitur, primum internodium extenditur: at si alteruter, oblique movetur. Quod si internus contrahatur, adducitur digitus; si externus, abducitur.

POLLICEM
adducens.

⁶ POLLICEM adducens, scilicet ad ⁷ internum pedis latus, interno pedis lateri exporrectus, ab ⁸ interna calcis parte, vel (uti Vesalius voluit) à ligamento calcem cum talo connectente, ⁹ originem trahit nerveam, dein ¹⁰ carne crassescens, & teres factus, cum osse pedii, cui pollex superstat, coharens, recta fertur ad externum latus primi pollicis internodii, cui teretem ¹¹ tendinem porrigit, ut pollicem à reliquis digitis abducatur, sive ad interna trahat.

^a MINIMUM abducens, externum pedis latus occupat, ab externa ^b calcis parte, ubi ^c tuberculo donatur, prodiens nervus, sed statim carnosus redditus, musculi forma procedit, & ^e processui ossis metatarsi, cui minimus digitus superstat, annexus, ^d tendine carneo brevi, mox in ^e teretem tendinem abit, qui lateri externo ^f primi interni ^g dii minimi digiti, ut ipsum à cæteris abducatur, implantatur.

MINIMUM
abducens.

CAPUT XXIX.

Brevis omnium totius corporis musculorum enumeratio, memoria gratia, instituitur.

CVM jam universa musculorum historia à nobis ad finem feliciter perducta sit, operæpretium facturi videmur, si brevem omnium enumerationem hic instituerimus, & in tabula quadam sub uno aspectu oculis proposuerimus, ut quotiescunque visum est, facillima omnium repetitione instituitur. Musculi ergo, vel ad Ventres, vel ad Artus pertinent. Qui ad Ventres, vel Caput, Thoracem, aut Imum Ventrem concernunt, & vel totum movent, vel aliquam ejus partem. Qui Artus respiciunt, vel Brachia, vel Crura trahunt.

Frontem,	aut potius Supercilia, quam attollit musculus Frontalis.
Palpebras, quarum	<div> <div>Superiorem</div> <div> <div>attollit, <i>Aperiens oculum rectus.</i></div> <div>deprimit, <i>Claudens oculum superior.</i></div> </div> </div> <div> <div>Inferiorem, attollit,</div> <div><i>Claudens oculum inferior.</i></div> </div>
Oculum, quæ movet	<div> <div>recta</div> <div> <div>sursum, <i>Attollens.</i></div> <div>deorsum, <i>Deprimens.</i></div> <div>ad interiora, <i>Adducens.</i></div> <div>ad exteriora, <i>Abducens.</i></div> </div> </div> <div> <div>oblique</div> <div> <div>deorsum ad exteriora, <i>Circumagens exterior.</i></div> <div>sursum ad interiora, <i>Circumagens interior.</i></div> </div> </div>
Nasi alas, quas	<div> <div>abducunt</div> <div> <div><i>Primus nares aperiens.</i></div> <div><i>Secundus nares aperiens.</i></div> </div> </div> <div> <div>adducunt</div> <div> <div><i>Primus nares constringens.</i></div> <div><i>Secundus nares constringens.</i></div> </div> </div>
Genas, quas	<div> <div>deorsum trahit, <i>Detrahens quadratus, Galeno ordinis p^{er} vias dictus.</i></div> <div>intro movet, <i>Contrahens genas, male vulgo Buccinator dictus.</i></div> </div>
Labia, quæ	<div> <div>attollit, <i>Primum par, attollens labium superius.</i></div> <div>ad latera movet, <i>Secundum par, labia abducens.</i></div> <div>deorsum trahit, <i>Tertium par, deprimens inferius labium.</i></div> <div>constringit, <i>Quartum par, labia constringens.</i></div> </div>
Maxillam inferiorem, quam trahit	<div> <div>sursum, <i>Primum par, Attollens, Temporale.</i></div> <div>deorsum, <i>Secundum par, Deprimens biventre.</i></div> <div>dextrorsum, <i>Tertium par, ad latera trahens.</i></div> <div>sinistrorsum, <i>Quartum par, abducens, Pterygoideum.</i></div> <div>antrorsum, <i>Quintum par, adducens maxillam.</i></div> <div>retrosum,</div> </div>

<i>Aures, quæ- runt</i>	{externam	{sursum, deorsum, antorsum, retrosum,	} movet	{Primum par, <i>Attollens.</i> Secundum par, <i>Deprimens.</i> Tertium par, <i>Adducens.</i> Quartum par, <i>Abducens.</i>
		{internam movet		{ <i>Externus.</i> <i>Internus.</i>
<i>Linguae, quam mo- vet</i>	{Stringendo, & Dilatando, Antorsum, Retrorsum, Sursum, Deorsum, Dextrorsum, & Sinistrorsum,	{Primum par, <i>Linguale dictum.</i> Secundum par, <i>Exerens, Genioglossum.</i> Tertium par, <i>Retrabens, Hyposoglossum.</i> Quartum par, <i>Attollens, Myloglossum.</i> Quintum par, <i>Deprimens, Ceratoglossum.</i> Sextum par, <i>Oblique trahens, Styloglossum.</i>		
<i>Os hyoides, quod movent</i>	{recta oblique	{sursum, Primum par, <i>Attollens, Geniohyoideum.</i> deorsum, Secundum par, <i>Deprimens, Sternohyoideum.</i> sursum, Tertium par, <i>Oblique attollens, Styloceratohyoideum.</i> deorsum, Quartum par, <i>Oblique detrahens, Coracohyoideum.</i>		
<i>Fauces, quas</i>	{Dilatant Constringunt	{Primum par, <i>Sphenopharyngeum.</i> Secundum par, <i>Dilatans.</i> Primum par, <i>Oesophagiæum.</i> Secundum par, <i>Cephalopharyngeum.</i> Tertium par, <i>Stylopharyngeum.</i>		
<i>Laryngem, qui</i>	{Dilatatur Constringitur Clauditur Aperitur	{dum ejus car- tilaginem thy- roidem dum aryta- noidem	{extendit flectit, flectit flectit	{Primum par thyroidis, <i>Sternohyoideum.</i> Secundum par, <i>Cricothyroideum anticum.</i> <i>Hyothyroides.</i> recta, Primum par flectens arytenoidem, <i>Thyroarytenoidem.</i> oblique ad latera, secundum par, <i>Arytenoidem.</i> recta, primum par extendens, <i>Cricothyroideum posticum.</i> oblique ad latera, secundum par, <i>Cricothyroideum laterale.</i>
<i>Caput, quod</i>	{Flectit, Flectens par Extendit, Ex- tendentium par Circumagit	{ <i>massoideum,</i> Primum, <i>Triangulare, vel Splenium dictum.</i> Secundum, <i>Trigeminum, vel Complexum.</i> Tertium, <i>Recti majores.</i> Quartum, <i>Recti minores.</i> Primum par circumagentium, <i>Obliqui superiores.</i> Secundum par circumagentium, <i>Obliqui inferiores.</i>		{recta, si totum agat. ad latus, si alteruter tantum contrahatur.
<i>Cervicem, quam</i>	{flectit Extendit	{Primum par flectentium, sive <i>Longum.</i> Secundum par flectentium, sive <i>Triangulare.</i> Primum par extendentium, <i>Transversi.</i> Secundum par, <i>Spinatum.</i>		

PRIMARIO, à musculis pro- priis, quorum alii illum	{	Dilant in respiratione	{ libera, Diaphragma solum se contrahens. coacta, Diaphragma, & Intercostales externi.
		Constringunt in respiratione	{ libera, Diaphragma solum relaxatum. coacta, Diaphragma, & Intercostales interni.
	{	Extendunt	{ Primum par thoracem extendentium, Dorsi longissimi.
			{ Secundum par, Semispinatum. Tertium par, Sacrolumbum.
{	Flectunt	{ recta, Recti abdominis musculi.	
		{ oblique ad latera, Oblique ascendentes abdominis.	
		Circumducunt,	Duo transversi abdominis musculi.

Secundario, lumbis motis; sicque

{	flectitur, à flectente lumbos, Quadrato.
	extenditur, ab extensore lumborum, Sacro.

{	Abdomen, quod comprimunt parte	{	Laterali,	{ Obliqui descendentes. Obliqui ascendentes. Transversi.
			Anteriore,	Recti.
			Inferiore,	Pyramidales.
{	Lumbos, quos	flectit,	Lumborum flexor Quadratus.	
		extendit,	Lumborum tensor Sacer.	
{	Testes, quos	elevant,	Cremasteres.	
{	Vescicam, quam	constringit,	Sphincter.	
		elevant,	Ani levatores.	
{	Penem, quo- rum alii	hunc erigunt,	Collaterales, penem erigentes.	
		urethram trahunt,	Intiores penis musculi.	

MANVS musculi, pertinent vel ad	Scapulam, quam	Diversimode movet, Primum par, Cucullare. Sursum trahit, Secundum par, Attollens. Retrosum ducit, Tertium par, Rhomboides. Antorsum, versus superiora, Quartum par, Serratum minus. Antorsum, versus inferiora, Quintum par, Serratum majus.	
		Humierum, quem mo- vet	Antorsum, Adducens, Pectoralis. Sursum, Attollens, Deltoides. Retrosum, Abducens, Latissimus. Deorsum, Deprimens, Rotundus.
	Circumagit, versus		{Circumagentium primus, five Superscapularis superior. Circumagentium secundus, five Superscapularis inferior. interiora, Circumagentium tertius, five Subscapularis.
	Cubitum, quem	{flectunt extendunt	{flectentium primus, five Biceps. flectentium secundus, five Brachialis. extendentium primus, Gemellus, vel Major. extendentium secundus, five Minor.
	Radius, quem	{pronant supinant	{Pronatorum primus, five Quadratus. Pronatorum secundus, five Teres. Supinatorum primus, five Longus. Supinatorum secundus, five Brevis.
	Carpum, quem	{flectunt extendunt	{flectentium interior, Cubiteus. flectentium exterior, Radius. extendentium interior, Cubiteus. extendentium exterior, Radius.
	Cutis manus, scilicet {Palmaris musculus, 3 ^o Caro musculosa quadrata.		
		Digitos, quorum alii	{flectunt, nim. internodium
{Extendunt, internodium			{Tertium, & Secundum {primus extendentium digitos. secundus extendentium digitos. Primum, Octo musculi interossei.
{Ad latera mo- vent		{Digitos quatuor, Interossei musculi. Indicem, Abductor indicis. Minimum, Abductor minimi.	
{Pollicem, quorum alii		{flectunt, in- ternodium	{Primum {Primi internodii pollicis flexor primus. Ejusdem internodii flexor secundus. Secundum {Flexor primus, flexor secundus, {secundi pollicis internodii. flexor tertius, }
		{extendunt	{Primus pollicem extendentium. Secundus pollicem extendentium.
{ad latus movent {internum, Adducens pollicem. externum, Abducens pollicem.			

CRV

VRIS
culi,
inent
ad

Femur, quod	Extendit	oblique	retrosum, Primus femur extendentium, <i>Gluteus major.</i> antorsum, Secundus femur extendentium, <i>Gluteus medius.</i>
		recta	Tertius femur extendentium, <i>Gluteus minor.</i>
	Flectit	recta	Primus femur flectentium, <i>Vas.</i> Secundus femur flectentium, <i>Iliacus internus.</i>
		oblique	Tertius femur flectentium, <i>Triceps.</i> Quartus femur flectentium, <i>Lividus.</i>
	Circumagit		versus superiora, Primus femur circumagentium, <i>Pyriformis.</i>
			intorsum, Secundus femur circumagentium, <i>Obturator externus.</i>
			extorsum, Tertius femur circumagentium, <i>Obturator internus.</i> ad posteriora, Quartus femur circumagentium, <i>Quadrigenus.</i>
Tibiam, quam	Flectunt		Primus, <i>Sartorius</i> , vel <i>fascialis.</i>
			Secundus, <i>Gracilis.</i>
			Tertius, <i>Seminervosus.</i>
			Quartus, <i>Seminembranosus.</i>
			Quintus, <i>Biceps.</i>
	extendunt		Primus, <i>Membranosus.</i>
			Secundus, <i>Rectus.</i>
			Tertius, <i>Vastus externus.</i> Quartus, <i>Vastus internus.</i>
		oblique movet	<i>Suppopliteus.</i>
Tarsum, quem	extendunt		Primus tarsi extensor, <i>Gasterocnemius externus.</i> Secundus tarsi tensor, <i>Gasterocnemius internus.</i>
			Primus flectentium tarsum, <i>Tibialis anticus.</i> Secundus flectentium tarsum, <i>Peroneus secundus.</i>
		oblique mo- vent ad latus	internum, Primus, sive <i>Adducens</i> , <i>Tibialis posticus</i> dictus. externum, Secundus, sive <i>Abducens</i> , <i>Peroneus primus</i> vocatus.
<i>Cutim plantae, Plantaris musculus.</i>			
Digitos, quorum alii	flectunt in- ternodium		Tertium, <i>Perforans.</i> Secundum, <i>Perforatus.</i> Primum, <i>Quatuor lumbricales.</i>
			Tertium, <i>Tertii internodii tensor.</i> Secundum, <i>Secundi internodii tensor.</i> Primum, <i>Interossei.</i>
		oblique ad late- ra movent, ut	<i>Interossei</i> , & <i>Minimum digiti abducens.</i>
Pollicem, quem	flectit		<i>Pollicis flexor.</i>
			<i>Pollicis tensor.</i>
		oblique movet	<i>Pollicem abducens.</i>

FINIS LIBRI QVARTI.

S

ADRIA-

ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS,
DE HUMANI CORPORIS FABRICA.
LIBER QUINTVS,

Quo Venarum natura, earumque per universum
corpus series describitur.

CAPVT I.

Venarum naturam, actionem, & usum explicat.

Ratio ordinis.



SSIVM, cartilaginum, ligamentorumque & musculorum historiam haecenus persequuti sumus. Sed quemadmodum ad hanc methodum, qua primo omnium de his egimus, ipsa quasi Natura nos impulit, quæ velut fundamenta quædam nostri corporis hæc efformavit: ita nunc, ut, omnis visceribus, historiaque trium Ventrium, quæ necessario sequi videbantur, Vascularum, sive Venarum, Arteriarum, & Nervorum tractationem aggrediamur, eadem nos cogit. Horum enim fundamentum ipsi muscoli sunt, secundum quorum ductus ipsorum series distribuitur. Et quanquam nec viscera

*Circa de Venis
primo agendum.*

*Vene coxam
figura.*

ab his immunia, liberaque sint, quia tamen musculorum tanta moles & copia est, ut universum præne corpus conficiant, merito videmur post horum explicationem vascularum doctrinam aggredi. Cæterum ex vasis omnibus de Venis primo agendum videtur, quod ipsæ tum notiores cæteris sint, tum simpliciores. Vnicam enim tantum habent tunicam, cum Arteria duas, Nervi multiplicem. Vehunt, præterea ipsæ sanguinem, arteriæ calorem, nervi spiritum, ex quibus sanguis omnium est notissimus.

Est autem *Vene vox*, quæ Græcis φλέψ, dicitur, ambigua admodum, cum lata significatione, pro quocunque vase sanguinem in se continente, sive arteria foret, sive vena communiter nunc dicta, Veteribus accepta fuerit. Hac significatione sumplerunt prisci illi Medici, qui ante Galenum floruerunt, ut pluribus in locis ipse testatur. Hoc etiam pacto intelligendus est locus ille apud Hippocratem lib. de aëre, locis, & aquis, ubi Scythas inquit, sibi ipsis sterilitatem inducere, sectis circa aures venis. Loquitur enim de arteriis, ex quibus sibi tantam sanguinis copiam detrahebant, ut in somnum, & quandoque animi deliquium inciderent, unde universum corpus impendio refrigerabatur. Et hinc factum est, ut utrumque vas, tam vena, quam arteria, Eudoxo ἐμὴν θύρον, Hesychio autem, antiquo Grammatico, non ineleganter ἀρτηρία dictum sit, quod carnalis esset, qui sanguinem recipiat. Strictiore significatione cœpit sumi circa Galeni tempora, pro eo vase, quod sanguinem quidem continet, paulo tamen crassiolem, quam ille est, qui in arteriis coercetur, quique perpetuo quiescit, nec movetur. Ne tamen ambiguus sermo obscuritatem pareret, posteriores illis antiquissimis Græcis distinguere cœperunt, & alias quidem venas ἀσφυσίdes, pulsu carentes, alias σφυσίdes, sive Pulsatiles vocabant, quomodo & Marcus Tullius Arteriam, Micantem venam, quod modo se attollat, modo deprimat, perquam eleganter vocavit. Micare enim, ut proprie, per intervalla resplendere, aut coruscare, micarum instar, significat: ita postea, pro eo, quod certis interpositis intervallis movetur, ac se in conspectum profert surripitque, accipitur. Sic ergo 11 de nat. Deorum: Iam vero, inquit, Vene & Arterie micare non desinunt, quasi igneo quodam motu. Nos, quia de Venis nunc acturi sumus, cum Galeno eas tantum intelligemus, quæ motu destituuntur, & quas Hippocrates, sive quicumque author sit libri de morbo sacro, αἱμαίνοντες, sanguinariis vocavit, ut ab arteriis distingueret, quæ calorem, & spiritus vitales per corpus diffundunt.

Distinguenda

Distinguenda autem merito est *Vena* ab *Arteria*, cum inter utramque differentia, insignemque discrimen reperitur. *Substantia* enim primo diversa est, cum *Venis* sit membranosa, *Arteriis* nervosa; unde *Arist.* 111 *Hist. de animalibus*, cap. v, *δοξη*, inquit, *νερυαδης* *ειν* *φλεψ*, *Vena Aorta* appellata, nervosa est. *Craffiti* quoque differunt, cum *Vena* ex membrana admodum tenui & molli constet; *Arteria* vero ex tunica quintuplo crassiore. Tum vero & *color* utramque ad vilum confestim distinguit; cum illa, cærulea fere sit, hæc, ediverfo alba, & candida. Iam *sanguis*, quem vehit illa, quam differens est, ut modo dicemus? & cum *Venæ* extimas quoque partes subeant, *arteriæ* intus hærent, nec nisi tribus fere in locis ad superficiem corporis accedunt, puta circa tempora, carpum, & penem, ut taceam nunc usum, & alia complura, in quibus notabile discrimen advertitur.

Est autem *VENA*, si definitionem ipsius requiras, *vas membranosum, simplex, triplici fibrarum genere intertextum, sanguinem fibrosum, & crassorem, pro nutritione totius corporis, omniumque partium conficiens, & deferens*. Dico esse *Vas*, sive *αγγειον*, ut formam generisque ipsius assignem. Tria enim vasorum sunt genera in nostro corpore, *Venæ* scilicet, *Arteriæ*, & *Nervi*. Qui ergo vasorum naturam norit, naturam quoque Venarum universalem perfectam habebit. *Vasa* enim omnia, similes partes sunt; non in illa tantum significatione, qua similes respectu organicarum dicuntur, ad quarum compositionem veniunt, quemadmodum musculi interdum similes partes vocantur: sed etiam, quatenus opponuntur parti compositæ, & simplicem naturam habent, ita ut quælibet pars venæ, vena & sit, & dici possit. *Vasa* quoque omnia oblonga sunt, & teretia corpora, quæque universo corpori aliquid deferunt, ac deportant; quæ sane conditio *Venis* non minus, ac *arteriis*, & *nervis* competit. Ut tamen à cæteris vasis distinguamus, in definitione, *Venas sanguinem deferre* addidimus, qua quidem in re à *Nervis* maxime differunt, cum hi *spiritus animales* purissimos, & ab omni terrestriore materia liberos vehant: hunc autem sanguinem fibrosum, & crassorem dicimus, ut & ab *arteriis*, in quibus liquidior tenuiorque fluit, distinguantur. His enim duabus vocibus utriusque sanguinis discrimen exprimere hic volumus, non quod aliæ differentiæ non sint, quam hæc duæ, sed quia istæ præcipuæ sint, & familiam ducant, maximeque formalem distinctionem insinuare videantur. *Primo* enim *Venarum sanguis fibrosior est*, id est, plures habet fibras. Quid autem fibræ sanguinis sint, præclare explicat *Arist.* 11 de part. anim. cap. iv: & 111 *Histor. de anim.* cap. vi: ubi *αἱ δὲ νῆς*, inquit, *νῆς τῶνδ' οὖν, fibre autem sunt, quicquid in sanguine terreum est*: sed de his postea pluribus, cum de sanguinis natura agemus. *Secundo* autem sanguis crassior est, cum contra *arteriarum sanguis* attenuatus sit magis per concoctionem, eam scilicet, quæ in Corde fit, unde eleganter *Philosophus*, 11 de gener. anim. cap. vi, hunc, *αἷμα πρὸς τὴν καὶ διασπαρμένον, & πρὸς τὴν καὶ πλεον, concoctum, purissimum, & primum*: illum, *deterius nutrimentum*, appellat. *Color* quoque utriusque sanguinis discrimen evestigio exprimit: cum ille, nigrior sit; hic, rubicundus: ille, spirituum expers; hic, prægnans: ille, quiete fruens; hic, perpetuo & indefinente motu agitur. *Ultima differentia* in definitione quoque acta est, per quam simul & actio & usus *Venarum* explicatur. *Actio* quidem, quia sanguinem conficit concoquendo: *Usus*, quia deferret per totum corpus confectum jam, & inde distribuit, propter nutritionem corporis. Sanguis ergo *Venarum* fibris & crassitie sua nutrit: at *Arteriarum*, spiritibus & calore vivificat. Cæterum *substantia venarum membranosa* est, tenuis, & rara; & propterea *simplex*, ut per eam sanguis hic ad nutritionem facilius transudet: *triplici autem fibrarum genere intertexta*, rectis, obliquis, & transversis, non tantum propter usum, quem privatum habet; sed etiam propter actionem, quæ publica est. *Rectis* enim attrahit: *obliquis*, retinet: *transversis*, expellit. *Rectæ*, secundum longitudinem ipsarum expanduntur; *oblique*, & *transverse*, secundum latitudinem: sed illæ, oblique; hæc, rectæ feruntur. Has qui velit cernere, truncos oportet insignes venarum majorum animalium uti elixet: quod si similes his *Vena cærensis* ab illa molestissima *acromedia* vendicetur, quam necessario alias incurreret, si sensum alium

*Sunt simplices
non tamen
ubique.*

Nota.

Figura.

Magnitudo.

Numerus.

*Ineffabili hi-
storia Venarum.*

Situs.

VALVULÆ

*Inventor Val-
vularum.*

*GLAN-
DVLÆ.*

quem fuissent naſcæ. Non minus enim à ſanguine copioſo diſtenta, ſi ſenſu prædita eſſent, dolore nos afficerent, ac partes carnoſæ ſolent cum inflammantur. Cæterum hæc tunica ſimplex eſt, non ubique tamen, ſed ubi muſculis defenditur, aut alia quapiam parte ambiente. Quæ enim cuti proximæ, vel ſuſpenſæ ſunt, duplici tunica conſtant, accedente à vicinis partibus alio involucri. Sic enim tutius vena deducitur, cum partibus conterminis alligatur: nec ſanguis fruſtra exſudat, quando per partes, quæ multum nutrimenti non requirunt, vena progreditur: in illis autem, quæ unica tunica in- veſtiuntur, facile tranſſudat. Hoc tamen notandum eſt, illis una cum membranis adnatis ſenſum accedere, ut dolores oriantur sæpe circa dorſum in febribus, & lumbos, cum menſes inſtant, turgente ibi ſanguine. *Figura* venis eſt cava, canalium in morem. Sic enim & plurimum capit alimenti, & tutior eſt vena adverſus externas injurias. Quo ad magnitudinem, tanta cuius parti eſt vena, quanta requirebatur. Magnis ergo magnæ quoque venæ ſunt; parvis contra, parvæ. Sed & magnæ illis ſunt, quæ plurimo alimen- to indigebant, quod id abſumatur facile, & vel ob raritatem ſubſtantia, vel calo- rem abundantior, vel motus continuitatem. Sic pulmones, & muſculi magnas ha- bent venas: oſſa contra minores, quia denſiora ſunt, frigidiora, & motus expertia. Nu- merus venarum tantus eſt, ut numero exprimi non poſſit. Infiniti enim ſunt ramuli, qui cum ſeparati non ſint, ſed ab aliis atque aliis dependeant, qui tandem in magnos truncos definiunt, aut potius à truncis oriuntur, venarum numerum ut plurimum definire ſole- mus, dum truncorum, ex quibus deſcendunt, numerum exprimimus. Quamobrem ſi vulgè tam intueamur opinionem, quatuor erunt Venæ, ex quibus reliquæ omnes na- ſcuntur. Prima vena, *Umbilicalis* eſt: Secunda, *Arteriola*: Tertia, *Vena portæ*: Quarta, *Cava*. Cæterum cum umbilicalis primo quidem revera peculiaris truncus non ſit: ſed * ramus tantum Venæ portæ, ut cuius clare patebit, qui perſequi cum inſuſcepta venam hanc in hepatis parenchymate conabitur: deinde, cum in lucem prodeunte foris venæ offi- cio amplius non fungatur, ſed ligamenti loco hepati inſerviat; tres duntaxat videntur eſſe venæ, à quibus cæteræ omnes enaſcantur. Sed enim cum Vena arterioſa ad pulmo- nes ſolos abeat, nec præter hos alteri alicui parti nutrimentum deferat, duas tantum ponemus primarias Venas, Portæ ſcilicet vocatam, & Cavam. Eſt autem maxime ne- ceſſaria futuro medico perfectæ diſtributionis omnium Venarum cognitio, non ſolum ut in morbis ex fluxione humorum dependentibus, quales frequentiffimi eſſe conſueve- runt, utrumque fluxionis terminum, mediaſque vias exacte cognoscat; ſed & pro re- vellendis, aut divertendis iſdem, locum venæ ſectionibus aptum, apte poſſit decernere. Quamobrem autem duæ venæ ſint, nec, ut arteria, una continua, in ſequentibus, cum res ſcitu maxime digna ſit, quanta fieri poterit, ſumma diligentia explicabimus. *Situs*, venarum, connexionem, & ſedem earundem indicat. *Sedes* quæ ſit unicuique ramo ex hiſtoria patebit, in qua omnium ductus deſcribemus: ad connexionem autem, origo per- tinet. De hac cum controverſiæ ſint inter Philoſophos & Medicos, quod illi quidem Cor, at hi Iecur principium venarum conſtituant, totum tertium huius libri caput huic negotio assignabimus.

Digniſſimæ autem ſunt, quarum mentio hic fiat, ^b membranulæ quædam exiguæ ^{b, f.} quæ in nonnullis majoribus venarum ramis reperiuntur, ſed inprimis in illis, qui in ar- tus, brachia inquam, & pedes diſſeminantur. OSTIOLA & venarum VALVULAS appellant, quod ſanguini impetuoſe in motibus harum partium irruenti, viam valvu- larum in morem intercipient. Hæ ^c exterius, ſi quando validius brachium fascia ſtrin- gatur, manifeſte nodis per venas apparentibus, advertuntur. Earum primus inventor noſtra ætate fuit, Hieronymus Fabricius, ab Aquapendente, Vir de Anatomico ſtudio, & Me- dicina oppido quam bene meritis. Is in Theatro princeps magnum hoc Naturæ my- ſterium humanis primum oculis; ſed poſtea elegantiore tractatu animis quoque obje- cit. Conſtant hæ Valvulæ ex membrana quadam tenuiore, quam eſt ipſa vena, valvu- lis illis figura proſus ſimiles, quæ in corde reperiuntur. Cavitate ſua Venæ cavæ trun- cum ſpectant, at convexa ſede exteriores artuum partes.

Neque vero hoc loco prætereundæ ſunt ^d GLANDULÆ, quas Græci *adlivos* vocant, ^{d, e, f.} quæque ſubſtantia laxæ, & molles, Venis, & Arteriis à Natura appoſitæ ſunt, non ta- men ubique, ſed tantum circa vaſorum divaricationes: neque in his omnibus, ſed in iis tantum,

a, hæc
ro dem
ſtratus
hepatu
carne
z. D.

c, f.

d, e, f.
Gland
ceru h
ſſima
z. f.

tantum, quæ ructioni perquam opportuna essent, vel quia suspensæ sunt, & remotæ ab aliis partibus; vel, quia circa articulationes laxas, quæ in angulum admodum acutum flectuntur, consistunt; vel, quia partibus adjacent, quæ motibus aut validis, aut continuis agitantur.

ACTIO Venis nulla vulgo communis tribuitur: ostendam tamen capitè tertio, re-
vera venis *αἰμωδίων*, quam Aristoteles Cordi, Galenus Hepati tribuit, competere: he-
par autem, & cor, longe aliam actionem obire. Interim concludamus, *Venarum actionem* sanguinis confectionem esse: *Vsum* autem, ejusdem confecti per corpus distributio-
nem. Hanc ut perficiant, quatuor facultates habent ministrantes. *Attrahunt* enim chy-
lum ex intestinis, per fibras rectas; attractum *retinent*, per obliquas; *concoquant*, per ca-
lorem partim proprium, partim influentem à Corde, quam ab arteriis per anastomoses
hauriunt: *expellunt* tandem, quæ generata sunt, excrementa. *Ceterum* cum Venæ per uni-
versum corpus sanguinem deferant, dubitatum est ab antiquis, an eadem sanguinem
quoque pro nutritione ad singulas partes expellant. Fuit enim *Erasistratus*, qui ex venis
sanguinem effundi statuit, & sic non deferri tantum per venas, sed etiam trudi creditit.
At ego contra existimem, postquam chylus in sanguinem versus sit, à carnibus potius,
cæterisque partibus trahi. Faventem habemus in hac opinione ipsum Hippocratem,
quem unum omnium Anatomicorum doctissimum existimo, qui vi Epid. sect. vi, ele-
ganti sententia, *σάρκες* inquit *ἐκ τῆς αἷμας καὶ ἐκ τοῦ χυλίου*, ἔξωθεν οὖν. δῖλον δὲ ὅτι αἰσθητοὶ ὡς ἔκπνοον καὶ ἔκτασιν
οὖλον τὸ σῶμα. *Carnes attractrices* & ex ventre & extrinsecus esse. Indicio est, sensus ipse, quod exspirabile,
& inspirabile est totum corpus. Carnes ergo sunt quæ attrahunt: non tamen carnes
tantum, quæ proprie sic dicuntur, cujusmodi est musculorum substantia, sed quæ vis
pars nostri corporis, quæ sanguine nutritur.

CAPUT II.

Differentias Venarum breviter enumerat.

Differentiæ Venarum diligenter tradendæ sunt, tum quia ad historiam
particularem plurimum momenti conferunt; tum quia nonnullæ earum sunt,
quæ Medicinæ Candidatis sæpe in arte occurrunt. Ratione
ergo *substantiæ*, Venæ inter se differunt, quia crassiores sunt, vel tenuiores;
simplicem tunicam habent, aut duplicem; eamque sensu carentem,
aut sensu præditam, ut diximus. Ratione *Magnitudinis*, discrimen
est notatu dignissimum, propter febrium doctrinam, in qua frequens ejus occurrit
mentio. Sunt enim Venæ quædam magnæ, aliæ mediæ, nonnullæ parvæ, aliquæ etiam
minimæ. *Magnæ* sunt, ut Truncus Venæ cavæ^a ascendens, &^b descendens, rami^c iliaci,
^d subclavii, ^e jugulares, &^f emulgentes. *Mediæ*, illæ in quas rami^g iliaci, &^h subclavii
dividuntur, Vena jugularis externa, ⁱ rami majores Venæ cavæ, per jecoris substantiam
transeuntes. *Parvæ* vero, quæ in habitu corporis consistunt, & per musculos dispersæ
sunt, aut per viscera, ut per lecur, Lienem, Renes, Intestina, Mesenterium, Vterum,
Pudenda. *Minimæ* tandem vocantur illæ, quas *περιχρισμὸς* Græci, quasi Capillares appel-
lant, quia pilorum crassitiem non multum superant. Hæ perquam bene in^k hepate,
aut^l liene à sua carne liberato, sed & in alba oculi tunica in homine vivo conspicuæ sunt,
cum ophthalmia laboramus, alias visum ob tenuitatem effugiunt. Quoad *figuram*, quæ
dam rectæ sunt, ut venæ cavæ^m truncus, &ⁿ emulgentes; quædam curvæ, ut^o capreo-
lares, præparantes scilicet dictæ, ubi cum^p arteriis similiter præparantibus multis vaso-
rum oculis implicantur. *A sede*, multiplex differentia peti potest. Aliæ enim per Ven-
tres excurrunt, aliæ per Artus, & ab hac nonnullæ nomen habent proprium, unde
^q Phrenicæ dicuntur, quæ diaphragma perreptant; ^r Jugulares, quæ per jugulum fe-
runtur; ^s Renales, quæ per renem: nonnullæ nomine tali destituuntur. *Connexionis* ra-
tione etiam discrimen est. Quædam enim cum carne neantur, ut quæ in musculis
sunt; quædam cum Nervo, ut Basilica in brachio; quædam cum Arteria, ut pleræque
omnes majores. Vt plurimum enim quævis vena arteriam sibi sociam habet, & fere
vena arteriæ incumbit: sæpe tamen duntaxat & lateri adjacet. Hac enim ratione san-
guis per univerfum corpus, ad partes tam superiores, quam inferiores facile propellitur,
& simul

& simul ventilatur motu, atque à putredine conservatur. Caterum ut raro admodum venam sine comite arteria reperire est; imo nunquam, si discedas ab iis, quæ *Cutaneæ* dicuntur, qualis est ramus Cephalicus: ita contra, nunquam videre licet arteriam, quæ absque focia vena incedat. Vbiunque enim arteria est, ibi quoque vena cernitur. Ratione *usus* denique, maxima est differentia. Nam etsi, ut statuimus, primarius venarum usus sit sanguinis per universum corpus distributio: sunt tamen & alii quidam particulares. Sic nonnullæ chylum ad sanguinis generationem attrahunt, ut sunt ^a melaïcæ; quædam excrementa purgant & evacuant, quemadmodum ^b Vteri venæ, & Hæmorrhoides; quarum illæ menstruatum; hæ vero nonnunquam, quicquid in corpore excrementosi est humoris, expurgant. ^c Emulgentes etiam sanguinem à sero liberant. Sed & sunt, quæ materiam deferunt pro semine, ut ^d præparantes dictæ; & quæ semen jam confectum deportant ad glandulas seminales, ut ^e Deferentia vasa.

CAP. V. T. III.

Disputationem Medicorum, & Philosophorum de principio Venarum continet: tum Authoris sententiam in medium adducit, & probat.



DE Venarum principio inter Peripateticos & Medicos maximalis est. Illi enim Cor, hi Iecur principium faciunt; utrisque suum ducem Aristotelem, aut Galenum sequentibus. Ego vero frustra quæri existimo quodnam sit Venarum principium, cum prius quærendum sit, an illud detur. Habemus enim auctoritatem doctissimi Hippocratis, lib. de ossibus, minime profecto spernendam, ubi *Venæ*, inquit, *per corpus diffuse, spiritum & fluxum, ac motum exhibent, ab una multa germinantes, atque hæc una, unde oriatur, & ubi desinat, non scio. Circulo enim facto, principium non invenitur.* Hæc sententia, ut à summo in re Anatomica viro profecta est, sic optime rationibus stabiliri posse videtur. Nam uti hinc incipiamus, probat ipsa ocularis inspectio, Venas omnes per se subsistere. Cum autem nemo sic absurdus adhuc fuerit, ut parti, quæ per se existat, principium adscribere voluerit, quemadmodum haud quisquam fuit, qui cordis, cerebri, aut jecoris originem ad aliam ullam partem revocaverit, cur Venarum principium quæramus? Vtunque autem etiam anxie aliquod investigaverimus, nullum revera est, ad quod reduci, quodcumque statueris, possit. Cum enim tria vulgo ponantur principiorum genera; unum, *spiritus*, Originis, quod ipsi rei (ut loquuntur) dat esse; alterum, *pericardius*, five Radicationis, à qua velut à radice res exoritur: tertium tandem, *disponitio*, Dispensationis, unde facultas ac virtus influit; nullum commode venis assignari potest. Nec enim originis principium ab alia parte habere possunt, cum nulla pars sit, quæ ante venas generetur. Partes enim omnes, quæcunque ad nutritionem faciunt, ut Cor, Iecur, Venæ, Arteriæ, ac si quæ sunt aliæ, simul formantur in utero, sequiturque Natura in hac re periti pictoris consuetudinem, qui ut primum lineamenta quædam rudi minerva ducit, quæ postea coloribus & aliis ornamentis perficiat; sic ipsa, primum rude omnibus partibus simul stamen, ut sic dicam, largitur, postea subtegmen injicit.

At neque Radicationis principium in venis statuendum est. Cum enim similitudo hæc ab arboribus desumpta sit, in quibus radix est, Truncus, & Rami: eandem similitudinem in venis accommodari, nisi unico in casu, quoad propages scilicet, & divisiones docendas, non posse, hinc demonstrari facillimo potest negotio, quod radicationis principium inepte ponatur in iis, in quibus radix nulla est. Radicem enim quis est, qui in venis velit statuere, cum nulla sit venarum pars, quæ radicis gerat officium? Radix enim alimentum trahit à terra, pro trunco, & ramis: at ex venis nullæ sunt, quæ pro aliis trahant alimentum. Quod si videantur forte esse, quemadmodum Venæ Melaïcæ, jam non sanguinem illæ, sed chylum tantum, & materiam ex qua sanguis, & ultimum alimentum tandem generatur, attrahunt. Atque ut largiamur quoque, dari aliquod venarum radicationis principium, non video, quæ venæ melaïcis rectius statui possint, cum aliæ non sint in corpore, quarum actio propius ad radicis officium, quam earum, accedat, & tamen hæc ab omnibus repudiantur. Taceo, si quod ponendum fuerit dari Radicationis principium, non unum, sed plura potius, utpote tria, aut minimum duo

ponenda

Ab usu.

Hippocratis
de Venarum
principio, cen-
tentia.

Probat
argumentis
duobus.

Vena non ha-
bet principium
originis.

ne radi-

ponenda esse, cum portæ vena unum, alterum cava, tertium arterialis sibi vendicet: at tot principia non nisi absurde omnino statuantur. Nam si duæ, vel tres essent venarum radices, illæ vel in unica aliqua parte forent, vel in pluribus; sed neque in una esse possunt, neque in pluribus. Ergo non possunt esse duæ, aut tres radices. Non possunt esse in pluribus, quia plura venarum principia radicationis constituenda essent, cum tamen & à Galeno, & ab Aristotele unum tantum ponatur. Non in una, quia una illa pars contineret in se necessario partes contrarii officii. Cum ergo neque unum principium radicationis, neque plura statui possint, quin protinus nascantur incommoda varia, sequitur, nullum prorsus radicationis principium ponendum esse.

Sed nec tandem *Distributionis*, sive ut loquuntur, *dispensationis principium*, à quo facultas, aut sanguis emanet, admittendum est. Ostendemus enim, nec sanguinem alibi,

Neque distributionis.

quam in venis confici, nec facultatem in venas aliunde influere. Ac jam omittamus Galeni auctoritatem, qui lib. VI II, de natur. facult. cap. IX; ubi in Venis sanguificam facultatem ponit, sic tandem inquit: Cæterum potentia illa, vel facultas in Venis, quam sanguificam appellant, atque etiam alia quævis facultas, in relatione ad aliquid intelligitur. *Et paulo post*: Ac quod agentis causæ substantiam ignoramus, facultatem eam,

sive potentiam appellamus, in Venis quidem potentiam quandam sanguinis factricem dicentes. Sufficit in medium attulisse rationem unicam, quam diligentius postea pluribus confirmemus, & explicemus. Sanguificatio enim, vel in corde constitui debet, vel in jecore, vel in Venis, propterea quod animalia omnia, quæ sanguinem habent, omnes hæc partes habeant: quæ vero sanguine destituuntur, iisdem quoque careant.

Sed neque in corde, neque in jecore constitui potest; relinquatur ergo, ut in Venis ponatur. *Quod autem neque in corde, neque jecore fiat*, ex eo manifestum esse potest, quod antequam Cordis, aut Hepatis parenchyma exstructum est, sanguis in venis generetur.

Quod in Corde, & jecore sanguificatio non fiat.

Nam dum pullus in ovo delineatur duobus primis diebus, sanguis jam fit in venis umbilicalibus, antequam vel jecoris vel cordis parenchyma factum est, in quo alii sanguificationis facultatem consilere affirmant. *Quod autem nec in Hepate tantum fiat sanguis*, speciatim ex actione ipsius læsa probari potest.

Si enim ipsum sanguinis officina foret, scirrhus affectum, paucis certe dierum spatio in mortem quovis conjiceret, cum fame & tæbe pereundum esset, omni sanguinis generatione intercepta. Sed enim videmus esse quamplurimos, qui multo tempore, & per annos etiam, cum scirrhus jecoris vitam traxerunt. Quin imo, si à jecore sanguis conficeretur, utique ab ipso parenchymate jecoris, non à venis per ipsum dispersis fieret. Sed non fit à parenchymate. Quod enim non tangit nutrimentum, ab eo sanguificatio procedere non potest, cum omnis actio naturalis, qualis alimenti est concoctio, per contactum fieri debeat. Sed jecoris parenchyma non tangit nutrimentum, quia venæ potius sunt, quæ ipsum proxime tangunt, ut pote in quorum conceptaculis continetur.

Quare recte concludimus, Venarum nullum omnino esse principium, cum à nulla parte, neque oriantur velut à materia componente; neque ab ulla, tanquam radices emergant; neque tandem ab ulla facultatem sanguificam mutuentur. Venæ ergo sanguinem generant, sed cum per totum corpus possint præparare, in hepate tamen potissimum conficiunt. Cæterum quia non sufficit probasse tantum opinionem nostram: sed necessarium omnino sit, argumentis etiam adversariorum satisfacere, ne cui scrupulos injiciant: nunc quidem ad ea paulo propius accedemus, primum quidem Aristotelis, deinde & Galeni rationes expendentes. Cæterum cum duplex uterque principium statuatur, unum Radicationis, alterum Distributionis, utrumque tamen ab una parte derivet, & ille quidem à Corde, hic vero à jecore, argumenta sic ordine proponemus, ut primo quidem ea in medium afferamus refutanda, quæ dispensationis; deinde & illa, quæ radicationis principium dari confirmant, quod ex illis, tanquam à fundamentis, argumenta hæc ut plurimum dependant.

Sit ergo principium ab ARISTOTELE, qui his rationibus probat Cor esse venarum dispensationis principium. *Primo*; ubi est fons caloris, ibi est sanguinis officina: at in corde est fons caloris. Ergo ibi quoque sanguinis officina, & per consequens, inde in venas & caloris & sanguinis distributio. At enim non valet consequentia, quod cordis calor etiam extra cor in venis sanguinem generare possit: nam neque calor hic primario ad san-

Refutantur argumenta Aristotelis quibus probat cor esse principium dispensationis.

ad sanguinis generationem concurrat, sed secundario, quatenus scilicet venarum calorem innatum, qui primarius opifex est, fovet fuscitatque. Hinc factum, ut majoribus venis, vel procul à corde disitis, arterias Natura ubique sociarit, quo idem calor in venis etiam longinquis custodiretur. *Secunda ratio est.* Quæcunque pars sanguinis cisterna est extra venas, illa sanguinis officina merito æstimanda venit: atqui cor est talis cisterna: Ergo & sanguinis officina merito appellanda erit. Respondeo, consequentiam non bene inferri. Non enim in cordis ventriculos alimentum fluit, ut ibi in sanguinem elaboretur, sed ut sanguis crassior & frigidior, partim attenuetur, partim calidior evadat; inde per arterias in universum corpus pellatur, pulmonibus quoque, & partibus supra cor positis suppeditetur. *Tertia ratio.* Si sanguis aliunde non venit, quam à corde, necessario cor sanguinis officina statuitur. Quod verum foret, si probari posset non aliunde venire. Adeoque illud si probet Aristoteles per partium generationem, & animi passionem, falsam dico esse probationem. Non enim verum est, cor prius fieri, ac sanguinolentum est, cum omnes partes in prima seminis delineatione simul formentur. Nam, ut ante diximus, quemadmodum pictor animal depicturus, primum ipsum delineat, mox coloribus perficit, ita Natura omnes partes prius delineat, postea absolvit. Simul ergo cavitates, tum in corde, tum venis, & arteriis, aliaque quavis parte, qua opus efformat. Hinc facultatem nutritivam, maxime omnium necessariam fuscitatur, per quam maximum fit desiderium omnibus partibus alimentum debitum attrahendi. Ex quo fit, ut quamprimum partes formatæ sunt, omnibus modis trahatur ab ipsis alimentum, quod est sanguis. Prius ergo sanguinem adesse necesse est, antequam cor generetur, ut genitum statim alimentum inveniat. Patet ergo per generationem male probari ex corde sanguinem omnem promanare: sed neq; ex passionibus animi id convincet, dum dicit, ibi fluxum & refluxum sanguinis esse, ubi animi & sensuum motus oriuntur, & propterea ex corde, quia ibi sedes passionum. Probandum enim est assumptum. Quod si dicat, Iram, quæ una est ex passionibus animi, ab omnibus vulgo definiri, accensionem sanguinis circa cor; id quidem male fieri responderim. Sequeretur enim, animal quod sanguineum non est, irasci non posse, & ea quæ ex sanguinia sunt, animi affectiones non pati, quod tamen ipsum vel commune illud, & tralatitium proverbium, quod vulgo fertur, coarguit, *ἰχθὺς καὶ μύα ἰσχυρὰ*, & *μυῖον ἐν ἐνστί ἡ χολή*, habet & musca splenem, & formicis sua bilis inest. Locusta certe, quæ ex crustaceis est, & metuit, & irascitur, cum polypo congressa. Testatur hoc Aristoteles lib. vii. i. hist. de anim. cap. i. i. ubi, Locustæ, inquit, vel pisces majores convincere possunt. Evenit usu, ut locustis polypi superiores sint, & adeo ut, si in retibus eisdem senserit locusta polypum, præ metu emoriatur. Pavet & locustam congrus, & rursus polypum congrus lacerant. Sed quid de apibus dicendum, quàm non in hostes suos, & fures sui dulcis illius liquoris furibundæ? ut in eos involant, ut aculeis pungunt? Vesparram nidos aggredere, quibus ad ulciscendum *ἀλκυον ἦτορ*, non *negd'ilo* doctissimus Poëtarum Homerus tribuit. Constat ergo animalibus quoque, quæ sanguinem non habent, animi affectiones esse.

Refutantur
argumenta,
quibus probatur
cor esse
principium Radicationis.

1.

2.

3.

Sed neque Radicationis principium in Venis constitui Cor potest, quamquam multis id demonstrare rationibus conetur Aristoteles. Venarum enim, inquit, primo principium, aut Iecur est, aut Cor, aut Cerebrum. Sed neque Iecur, nec Cerebrum: Ergo Cor. At enim negatur major, cum prius probandum foret, an sint principia venarum, antequam quod sit conemur ostendere. *Deinde*, ubi unum est principium, ibi in medio collocari debet: at in animalibus unum est principium. Negari debet & major, & minor. Major, quia non semper aptissimus locus est principio medius, cum modo cernamus magis in superiore parte positum esse cor, quemadmodum in piscibus, serpentibus, & lacertis: modo in medio, ut homini, aliisque nonnullis animalibus. Minor quoque negatur, quia plura sunt præter cor principia animali; ut cerebrum, quod nervorum principium est, & motui infertur, & sensibus. *Tertio*, si tria vasa oriuntur à corde, Arteria, inquam, magna, Vena arterialis, & Arteria venalis, cur non Vena quoque cava? Ex hoc argumento non sequitur, omnes venas ex corde provenire, quemadmodum certe nullatenus vena portæ hinc oritur, quæ cor ne attingit quidem, sed tantum eas, quæ basi cordis infixæ sunt. Quamobrem hæc ratio, Aristotelis opinionem destruet potius, quam probabit, cum demonstrare manifesto liceat, Portæ Venam à corde longissime distare, tantum abesse, ut ab ipso nascatur.

Iam

Iam ad argumenta GALENI deveniamus, quibus duo probare conatur. Primo, Iecur esse principium Venarum Dispensationis, deinde & Radicationis. *Primum* probat similiter ut Aristoteles, quia scilicet Iecur sit sanguinis officina. Cum ergo Venæ sanguinis sint canales, ipsum necessario ex officina petent, & per consequens ex Iecore, quare Iecur erit principium distributionis venarum. Quod autem sit sanguinis officina Iecur, probat hoc primum argumento. Cujus substantia est convenientior ad sanguinis generationem, quam cordis, in eo debet constitui sanguinis officina: at in Iecore parenchyma est talis substantiæ, quod vel cujusvis oculi probant, cum sanguinis instat rubeat. At non probant, inquam ego. Verum quidem est, ut hoc largiar, animalibus nonnullis rubrum esse parenchyma, ut homini, & quadrupedibus: pluribus tamen etiam viride est, ut Lampetræ; & nonnullis album, ut piscibus. Si ergo verum illud foret commune Galeni axioma, quod mutatur in mutantis speciem abit, sequeretur, viride & album hepar parenchyma, sanguinem ejusdem coloris generare: at sanguis tamen lampetræ, & piscium ruber est. Quin imo nec in homine quidem ipso rubrum est parenchyma per se, sed tantum à sanguine colorem habet. Id inde patet, quod maceratum paululum in aqua, aut leviter coctum, albedinem protinus, sanguine scilicet eloto, contrahit. *Secundo*, si sanguinis officina ponatur in corde, Iecur frustra esset conditum. Non sequitur. Habet enim usum admodum in animali nobilem, ut scilicet eam, quæ in ventriculo sit, chyli concoctionem adjuvet, tuendo fovendoque ipsius calorem, id quod & ipse Aristoteles, & Galenus quoque agnovit, sed & à nobis inferius, ubi de hepate sermo erit, prolixius postea demonstrabitur. Et hinc est, quod animalia, quibus Ventriculus est oblongus, & secundum longitudinem corporis positus, eadem & Iecur oblongum, & ventriculo adnatum habeant. Cætera argumenta quæ ad Aristotelis opinionem demolendam faciunt, non opus est, ut hic multis refutentur, cum tantum nostram adstruere, quantum illam destruunt, videantur. Similitudo autem, quam ab officina ferraria in medium affert, prope quam recrementa ferri inveniuntur, unde concludit Iecur sanguinis officinam necessario esse, quod & circa ipsam sint excrementorum receptacula, puta vesicula fellis, invalidior illa est, quam ut meretur refutari. Non enim probat parenchyma hepatis sanguinem conficere, sed tantum venas in hepate, præ reliquis venis potissimum sanguinem generare, quia & ex ipsis ad vesiculam fellis canales transmittuntur, non à parenchymate. Nos autem & ipsi largimur hoc lubenter, & ejusdem sumus sententiæ, venas in Iecore præ aliis universi corporis ad sanguinis concoctionem facere.

Radicationis principium esse Iecur, sic probat Galenus. *Primo*, Quemadmodum in arboribus sunt radices, truncus, & rami: ita & in Venis. Ut ergo radices arborum ex terra nascuntur: ita etiam radices venarum ex aliquo viscere prodire necesse est. Tale autem erit Iecur, cum circa illud radices videantur, non circa Cor, neque circa Cerebrum. Respondeo, hanc similitudinem nihil probare de officio venarum, ut aliæ scilicet sint tanquam radices, aliæ velut truncus, rami, aut furculi: sed tantum formam, & modum distributionis, prout nobis per corpus sparsæ apparere solent, insinuare potest. Quod si Iecur Radicationis principium poni debeat, probandum erit, Venas quæ per ipsum disperguntur, Radicum officio fungi. *Secundo*, Minora majorum non sunt principia: at Cava circa cor minor est, quam circa hepar. Ergo circa Cor principium esse non potest, sed potius circa Iecur. Vtraque propositio falsa est, & vel experientia prompte refutari potest. Nam si de falsitate majoris dubitas, aspice, sodes, fluviorum ortus, quomodo ex parvis sæpe fonticulis nascantur. Si de minoris falsitate ambigis, profecto aut oculorum hebetudine laboras, aut, si quidem recte hæc intuearis in homine, & cæteris animalibus sanguineis, nihilominus autem tuis ipsis oculis fidem detrectes, laboras *apertis & deploratis* infirmitate judicii, ut loquitur alibi Aristoteles.

Cæterum sub finem hujus capituli, postquam & nostram opinionem stabilivimus, & adversariorum argumentis, quibus suam adstruunt sententiam, satisfacimus, restat ut illis etiam argumentis respondeamus, quibus nostram impugnant. Quod ergo à Venis sanguificatio haut fiat, sic argumentantur. *Primo*, Pars frigida & alba inepta est ad sanguificationem. Venæ sunt tales, quia membranæ. Ergo, ineptæ sunt ad sanguinis generationem. Respondeo, Venarum substantiam frigidam quidem esse per se,

T

calefieri

Revelluntur
rationes G. A.
I. E. N. I. qui-
bus probat Ie-
cur esse prin-
cipium Dis-
pensationis.

3.

3.

Revelluntur
rationes, qui-
bus probatur
Iecur esse prin-
cipium Rad-
icationis.

2.

3.

Refutatio
argumenti,
quod contra
sententiam
Austoris asse-
runtur.

1.

calefieri tamen abunde, tum à partibus vicinis, & imprimis à parenchymate hepatis, in quo maxime ipsa sanguificatio celebratur, tum etiam ab influente ex Corde calore, qui potissimum per arterias communicatur, & quæ ipsæ sua vicinitate mutuisque osculis plurimum caloris aspergunt. Caterum si Venæ ob membranæ substantiam ad sanguinis generationem ineptæ sunt, non video profecto quomodo ventriculus ita aptus ad chyli confectionem esse queat, qui & ipse ex membranæ, paucis carnosæ fibræ intertextis, exstructus est. *Secundo*, Quod mutatur in mutantis speciem mutatur. Ergo, si sanguinem Venæ generant, quæ albæ sunt, humorem quoque candidum generabunt: at sanguis ruber est. Ergo, à rubra aliqua fit substantia. Falsa est major. Id enim expresse discis ex pluribus animalibus, sed iis præcipue, quæ virides adhuc plantas, & gramina comedunt, qualia sunt oves, bovesque, quæ viridem quoque chylum conficiunt, cum tamen ventriculi tunica interior sit alba. *Quin* imo & inter homines, qui vinum bibunt rubrum, cæterum parum comedunt, iis ruber quoque fit chylus, à quo usque adeo tinguntur sæpe intestina, ut ignaris possint illudere in dissectionibus, quo ab inflammatione horum, hominem mortuum esse, sibi persuadeant. Atque id non semel, sed toties totiesque hic Patavii in suspensis, & aliis vidimus, cum alias Patavini rubris vinis delectentur. Cæterum quod chylus alias plerumque albus sit, si quis carnibus vescatur, id contingit propterea, quia quemadmodum de hepate ante diximus, colorem ipsum rubicundum non habere per se, sed à sanguine, qui coctione propterea postea facile amittitur: ita & carnes dum in stomacho concoquuntur, amittunt colorem illum carneum, & in album chylum transmutantur.

C A P V T I V.

Cur dua vena, Porta nempe dicta, & Cava facta sit; tum qua ipsarum inter se differentia, & connexio.

Cur dua, non una Vena facta sit.



ATVRA provida & solers, non unam Venam condidit, quemadmodum unam arteriam: sed duas; unam, quam Portæ vocant; alteram, quam Cavam: quod duplicem oportuerit esse eum sanguinem, qui corporis nutritioni dicatus est, illum quidem crassiores, qualis in Vena portæ continetur: hunc tenuiorem, ut est ille, qui in vena Cava. Partes enim, quas naturales vocant, & alimentum concoquunt, crassiore indigebant alimento: at carnosæ & musculosæ, tenuiore, magisque elaborato. In crassiore enim materia & solidiore, & diutius calor conservatur, & fortior quoque est: calore autem omnis concoctio absolvitur. Quod si unus jam esset continuusque ductus in venis, quemadmodum in arteriis, prohiberi certe non poterat, quo minus hic duplex sanguis confunderetur. Duæ ergo factæ sunt, quæ ne consortio mutuo carerent, ecce quam ingeniosum Natura effinxit commentum, ut utrique prospiceret. Si enim unam fecisset duntaxat, ut demonstravi, confusio orta foret: si duas, non esset communio facta. Sic ergo conformavit, ut nec una esset revera, nec duæ, sed & duæ viderentur, & una. Hanc rem consequuta est, duarum venarum ramos mutuis quibusdam oscillis, quæ anastomoses vocant, inter se conjungendo, unde & sanguis diversus est in utraque, & transire simul potest ab una ad alteram, nec tamen confunditur, quia in Cavam tenuior tantum pars abit, crassior vero remanet in Vena portæ. Cum ergo duæ sint, altera quidem Portæ vena dicitur, altera vero Cava.

Vena Porta
unde dicitur.
Porta Hepatis.

Dicitur VENA PORTÆ, non Porta, ut quidam barbare & inepte loquuntur, quia ad portas, puta hepatis, enascitur. Sunt autem Portæ, sive πύλαι, ab Hippocrate nominatæ, eminentiæ duæ in cava jecoris sede, quo loci hæc vena erumpit, cumque chylus ad hepar per hanc ipsam ascendat, tanquam per januam & portam per has eminentias hepar ingredi videtur. De his loquens Hippocrates, libr. de dissectionibus, εἰς ἐκείνους τοὺς ὤμους, ὅς καλεῖται πύλαι ἐν δεξιῇ καὶ ἀριστερῇ, hoc est, duos apices, sive eminentias habens, quas portas appellant in dextris sitas. hinc 11 Epid. mentionem injiciens hujus venæ, ipsam φλέβα πρὸς τὰς πύλας ἐκ τοῦ ἥπατος appellat, venam quæ ad portas, & lobum hepatis est sita. Dicitur quoque σπληνική, ὡς τὸ σπληνικόν, à caudice, quia similis arboris trunco videtur. Ut enim hic ex multis radicibus affurgit, ita quoque & hæc vena

hæc vena ex multis ramis, per Mesenterium, Ventriculum, & Lienem sparsis. Fuerunt etiam, qui hanc eandem venam *Iecoris manum* indigitarunt, quod per eam tanquam manum hepatis alimentum ex ventre & intestinis attrahat. Arabes, *Venam lacteam* appellant, non, quod lacteo, hoc est, albidiore magis colore sit prædita, quam reliquæ Venæ, sed quod lacteus succus, chylus puta, ex intestinis per eam in Iecur intret. Vulgo à Medicis *Vena portæ* dicitur.

Altera CAVA vocatur, ob insignem ipsius cavitatem, unde *καὶ μέγλη, Cava*, & Magna Galeno, xiv de Vsu part. cap. vii, appellatur. Interdum etiam *μεγίστη, maxima*, iv de Vsu part. cap. v: ab Hippocrate, *ἡπατική, jecoraria* vocatur.

De harum propaginibus antequam dicamus, operæpretium facturos nos esse duximus, si nonnulla aliter in medium, quæ de utraque in universum dici possunt, & imprimis si collatione mutua instituta, utriusque differentias explicemus. Ratione enim *substantiæ*, ingens discrimen advertitur, cum Vena Portæ (et si utraque sit membrana) multo sit crassior Cava, ac fusca magis. Cava contra, candidior est, & tenuior. Evenire id, opinor, cum quia illa crassiore nutritur sanguine, tum quia magis nigro; hæc vero tenuiore, ac rubicundiore. Durior quoque est substantia Venæ portæ; mollior, Cavæ; quia illam aptiorem ad dilatationem & constrictionem, quam hanc conveniebat esse, propterea quod Cava in se sanguinem complectatur mobiliorem, tum per se, quatenus tenuior est, tum per accidens, quatenus semper cum arteria conjungitur, quod Venis portæ haud ita contingit. nam cæteræ quidem soboles, si Splenicum ramum excipias, non admodum arterias comitantur. Porro tenuitatis causa, copiosum serum est, quod in Venæ cavæ sanguine continetur. Id enim cum modo abundare debeat, modo deficere, ut venia modo magis, modo minus dilatetur, necesse est. Ratione

magnitudinis, utriusque venæ per Iecur dispersæ magna est differentia. Nam ^a truncus Cavæ, qui in hepate est, multo amplior est, quam ^b venæ Portæ truncus, cum illa pluribus partibus nutriendis, quam hæc, dicata sit. Nec enim portæ vena aliam nutrit, quam jecoris partem cavam, intestina, mesenterium, pancreas, lienem, ventriculum, & omentum: at Cava reliquas omnes corporis partes, omnes musculos, omnia ossa, caput cum cerebro, cor, pulmones, diaphragma, renes, uterum, vesicam, & pudenda. Notatu autem dignissimum videtur, plures ^c ramos venæ Portæ per jecoris substantiam sparsos, pauciores ^d venæ Cavæ. Iam quoad connexionem, conjunguntur hæ venæ invicem per

^e *ἀναστομωσιν*. Est autem *Anastomosis*, quam Exofculationem Latini commodè dicerent, conjunctio vasorum per oscula, seu parvos quosdam meatus. Cæterum, cum anastomosis duplici fiat ratione; una, cum extrema vasorum extremis aliorum junguntur, quo pacto epigastrica vasa cum mammariis in facie interna Rectorum abdominis musculorum nectuntur, quemadmodum libro præcedente ostendimus: altera, cum rami ramis incumbentes, in medio pertuli foramine, sibi adnascuntur: quo posteriore modo anastomoses Venæ cavæ & portæ, in hepate contingunt. Circa has *primum* notatu dignum est, non omnes propagines per jecoris substantiam dispersas, per anastomosin hoc pacto conjungi; quin imo ^f plurimas esse venæ portæ, quæ ne pertingant quidem ad cavam; plurimas etiam ^g cavæ, quæ ad venam portæ non accedant. Cujus quidem rei causa adhuc digniori notatu est, cum ex ea pateat, has anastomoses non esse factas, ut omnis sanguis ex porta deferretur ad cavam, sed quidam tantum, isque tenuior. Si enim omnis traducendus foret, quæ ratio esse possit, cur non omnes furculi portæ, omnibus venæ cavæ ramulis jungerentur, quemadmodum videmus contingere in utero, ubi furculi per placentam sparsi, cum iis, quæ per fundum uteri disseminantur, pares numero facti sunt, singulique singulis per anastomosin innectuntur. *Alberum* observatu dignum est, anastomoses has exiles admodum esse, ut Veteres propterea inconspicuas censuerint: quanquam certe oculis non usque adeo subterfugiant, si quis animum quoque velit advertere. Laxiores enim non requirebantur, siquidem cum tenui sanguine portio etiam crassioris & sacculenti sanguinis transiisset. Nec vero propterea tantum hæc anastomoses factæ sunt, ut scilicet ex portæ vena, sanguis ad superiora transcoleretur, sed &, ut rursus ex cavæ etiam in ipsam inedia tempore non nihil cederet, dum venæ Mesaraicæ sunt inanitæ. Quin nec alimento tantum viam præbent, sed & pravis quoque humoribus, & excrementis, quæ interdum ab universo corpore

per cavam

Vena cavæ.

Utriusque Venæ differentia exponitur à substantiâ.

Amagnitudinis.

A, conexione Anastomosis quid.

Notanda.

2.

Vfus anastomoses.

per cavam ad intestina; nonnunquam contra à portæ vena ad cavam transferuntur. Verum id esse apte nos docet aphorismus apud Hippocratem decimus quartus, sectionis sextæ, ubi, Ab Hydrope detento, si aqua à venis ad ventrem confluerit, solutionem fieri, docet. Ecce quomodo Venæ ad ventrem, per portæ venam, aquam illam transcolant.

Excarnæ Hepar.

Cæterum si quis, quæ diximus hæcenus, oculis ipsis usurpare velit, ille hepar ex carne, & ab omni parenchymate nudum ac liberum intueatur. Faciet autem excarnæ hepar, si prius nonnihil in aqua decoquat, eo scilicet usque, donec caro molliorem contraxerit, inde in vase aqua pleno sinistra manu submergat, & dextra interim cultello ligneo, aut lapideo, vel certe ferreo, non valde acuto, leviter fricet. Sic enim sensim caro separabitur, & quæ separata est, ab aqua subito eluetur. Est & alius modus non minus elegans, & facilius, si formicarum acervo impositum relinquatur, donec (quod brevi spatio fit) exederint. Apparebit sic postea substantia utriusque venæ, si in frigidam projicias, perquam bene, ut differentiam utriusque, & visu, & tactu usurpare queas: tum anastomoses eleganter contempleris. Cæterum, quia supra à nobis sub principium capitis dictum est, ob duplicem sanguinem, duplices esse factas venas; duplicem autem sanguinem ob partes diversæ naturæ nutriendas, ut veritas hujus rei comprobetur, ecce tibi hepar, in cujus gibba parte, ubi vena Cava est, diversam intueberis substantiam ab ea, quæ est in sima, ubi Vena portæ stabulatur. Illa enim multo est mollior, & quæ à Iecore nullo negotio discedit: hæc contra durior, & validius adhærens. Nec vero temere id accidisse credendum est, sed Naturæ singulari quadam providentia, quæ semper finis gratia optime & prudenter agit. Nam Venæ portæ radices duriore substantia fulciri debebant, ut essent magis patulæ: at Cava molliori, ut impleri, distendi, & subsidere possent, quemadmodum antea demonstratum est.

C A P V T V.

Ramos, sive propagines Vena portæ recitat, & Hippocratis aphorismum huc maxime facientem, explicat.

Per quæ partes Vena portæ dispergitur.



NOTA.
Drusio Vena portæ in Radices, Truncum, & Ramos.

ACCEDAMVS ergo jam paulo propius ad ipsam Venarum historiam, in qua à Vena portæ initium faciemus, tanquam ab ea, quæ non ita late patet, aut diffunditur, ut Cava. Solet enim per infimum duntaxat ventrem distribui, nec extra hunc propagines ulla, imo nec per hujus omnes partes, sed illas tantum, quæ nutritivæ facultati dicatæ sunt, ut puta Iecur, Vesiculam fellis, Ventriculū, Lienem, Pancreas, Omentum, Intestina, & Mesenterium, ramos dispergere: nam ad reliquas, ut Renes, Vesicam, & eas, quæ generationi inserviunt, Cava propagines suas transmittit. Cæterum, ut facilius, quæ ejus sit distributionis ratio, intelligatur, doctrinæ gratia, totam venam assimilantes arbori, in quatuor dividemus partes, ex quibus aliam Radices vocabimus, ut quæ in hepate est; aliam Truncum, quæ indivisa progreditur; tertiam Ramos, ubi truncus dividitur: quartam, Propagines, aut Surculos, venas quæ ad latera, non divisus truncus diffundit. Quæ certe appellationes diligenter observandæ sunt, quod proprietate harum vocum obscuræ huic de venis tractationi lucem adferre conati sumus. Ut autem tum memoriæ facilius commendari, tum brevius perscribi à nobis cuncta queant, ab insertione (sequeuti doctissimos quosdam Recentiores) appellationem omnibus tribuemus.

RADICES.

Ex ambitu ergo Iecoris ^a venæ quædam perexiguæ & capillares, sensim versus internam ejusdem regionem exporriguntur, ac paulatim in majores ramos abeunt, ita ut tandem ^b quinque producantur, quæ iterum veluti radices collectæ circa medium ipsius cavæ partis, paulo tamen versus posteriora juxta dorsum concurrentes, ^c caudicem ac truncum insignem constituunt, qui tandem juxta ^d eminentias illas hepatis (quas *mêlles* à Græcis appellari diximus) ^e erumpens, Vena portæ dicitur, & jam trunci nomen meretur.

TRUNCUS.
Surculi autem divisionem Trunci vocati.

Truncus autem hic ab ^a hepate jam secedens, oblique nonnihil descendit versus latam sub ^b duodeno, ubi supra vertebra stabilem locum nanciscitur. Antequam tamen in ramos

^a B. H. F.
^b E. B. E. d. cum
^c B. I.
^d E. N.
^e B.

in ramos dividatur, duas propagines five furculos de se spargit, quorum ^aprimus, tenuis admodum, ex antica & suprema parte trunci, simul ac ex jecore prodiit, enatus, in vesicæ biliaræ cervicem & corpus, five in exteriorem ipsius tunicam, multiplici ramorum subtilissimorum serie, cujusmodi superius Capillares venas vocari diximus, diffunditur. Appellatur hic furculus Græcè *νεύρος*, si latine velis dicere, *vesicalem* appelles. Vesalius duos esse ramos ait, qui per vesicam felleam excurrunt, unde & Cysticæ gemellæ quibusdam dicuntur, sed parum hoc interest. Secundus priore insignior, sed tamen inferior, ex eadem anteriore sede, dextraque magis enatus, pyloro inferitur, in cujus posticam partem, quæ dorsum respicit, plures ramulos spargit, unde *Gastricus* vulgo dicitur, sed fortasse memoriæ gratia rectius *Pyloricus*, cum & alii sint rami, qui gastrici vocantur.

His duobus furculis sic propagatis, inferiora Truncus petit, & sinistrorsum semper nonnihil inclinans, in duos ramos insignes dispescitur; quorum alter, ^bsinister est; alter, ^cdexter. *Sinister*, elatior paulum dextro, sed minor: *Dexter*, humilior, sed major. *Sinister*, per Ventriculum, Omentum, quandam Coli intestini partem, & Lienem spargitur: *Dexter*, per Intestina, & Mesenterium. Ille, Vena splenica, five Lienaris: hic, Mesenterica dicitur.

^dSPLENICA ergo *vena* postquam sic prodiit ex Trunco, versus ^eLienem, ^fomenti membrana suffulta, transversim fertur, in quam antequam absumatur, furculos quosdam producit, partim & corpori sui sede, partim ab inferiore. *A superiore* quidem ^gfurculum, qui ad lævam Ventriculi partem, qua dorsum respicit oblique ascendens, in tres dividitur propagines, ex quibus utrinque extremarum una in ventriculum porrigitur, & in plures mox furculos diffunditur. Media vero per eandem posticam sedem ascendens, per superiorem Ventriculi regionem se diffundit, & sinistram orificium undique coronæ in modum cingit, à quo & *σφαιραία*, five *Coronaria* dicitur. Hæc rursum ramulos semper quosdam sursum ad œsophagi finem, alios deorsum per ventriculum effundit. Totus hic ramus *Gastricus* dicitur, quasi Ventricularis, quia omnium, qui ventriculum adeunt, maximus est & capacissimus. *Ab inferiore* duo furculi enascuntur: *minor*, gracilis, deorsum ad inferioris membranæ Omenti dextram partem, & ad Colon eranæxum alios ramulos transmittens. Dicitur *Epiplois dextra* vulgo, Latine *Omentalem* dixeris. *Alter*, respondens ramo qui ab elatiore parte oritur, & coronarium furculum producit, in inferiorem omenti membranam inferitur, ac post exortum statim in duos ramos dividitur, qui magno à sese intervallo diducti, quamplurimos alios furculos progenerant, qui in inferiorem omenti membranam, quæ colon instar mesenterii dorso aligat, quemadmodum & in Coli partem, quam aligat, absumuntur. Vocatur *Epiplois*, vel *Omentalis postica*. Postquam sic Splenicus ramus plures furculos dispersit, jam ^hLieni approximans, in duos finditur ramos, ⁱsuperiorem, & ^kinferiorem, qui in alios, in ipso parenchymate Lienis dissipantur. *Ex superiore*, modo antequam Lienem ingreditur, modo quando jam ingressus est, aliquando geminus, interdum triplex furculus egreditur, valde celebris apud rei medicæ scriptores, quem ^l*Vas breve* vulgo, sed nos *venosum* (ad discrimen arteriosi sibi respondentis) appellamus. Hic in sinistram fundi ventriculi partem, aliquando altius etiam, & circa orificium sinistram inferitur. Quæ causa est, cur Medici nonnulli, & vulgo quoque Anatomici, inepte censuerint, ex Liene melancholicum humorem per hunc refundi in stomachum ad excitandam famem. Sæpe tamen cadavera invenias, in quibus prorsus desideretur. *Ex inferiore* ramo, qui humiliorem Lienis partem petit, una oritur propago, quæ satis ampla & insignis, dextrorsum reflectitur, ut præcedens, & Ventriculi fundum sinistra parte cingit, elatiori quoque Omenti membranæ à læva frequentes ramulos transmittit, & *Gastroepiplois sinistra* dicitur. ^mEst & alius ramus insignis, qui in plerisque reperitur à ramo splenico inferiore, rarissime à Liene ipso enasci. Hic deorsum fertur, & toti sinistræ coli parti furculos aspergens, ulterius secundum totam intestini recti longitudinem progreditur, ac tandem in ejus substantiam membranosam, & podicem, plurimis exiguis furculis terminatur. Frequentissima hujus mentio fit apud Medicos, quibus *hemorrhoidalis interna*, ad differentiam externæ, à Cava vena productæ, vere ac proprie hemorrhoids dicitur. Dico proprie, ac vere, quia hemorrhoides interdum venas quoque narium, gingivarum, & oris, sanguinem, & sine dolore quidem fundentes appellant. In hac ampla significatione Philosophus accepit

Cystum.

Gastrum.

R. A. M. I. dicitur.

Splenicus.

Qui furculus à splenico ramo oritur, antequam in Lienem absumatur.

A superiore parte qui oritur.

Coronaria.

Gastricus.

Ab inferiore parte producit.

Epiplois dextra.

Epiplois postica.

Diviso rami splenici.

Superioris ramus propagatio.

Inferioris ramus propagatio.

a.

Hæmorrhoidalis interna.

lib. xxi de part. animal. ubi menstruum etiam purgationem speciem hæmorrhoidum facit. Proprie tamen dictæ Hæmorrhoides Medicis sunt, venæ hujus in ano dilatationes, à bile, tum atra, tum flava, & tam falsa pituita, quam melancholico humore excitatæ. Et hæ duorum sunt generum, *Cæcæ*, quæ nullum sanguinem fundunt, sed iæstar acini uvæ protuberant in, vel extra anum: aliæ *apertæ*, quæ sanguinem, quem continent, fundunt. De harum curatione peculiarem libellum, vere aureum, doctissimus Hippocrates scriptum nobis reliquit. Reliqua pars rami splenici in ^a Lienem totum assumitur, ibidemque in varias, & minutissimas propagines diffunditur, circa ^b cavam, & mediam lineam ipsam parenchyma ingressa. Atque hi quidem sunt furculi, quos splenicus ramus producit.

II.
Mesentericus ramus.

Dexter.

Glandulæ.

Sinister.

Propagines
ante mesenterici
divisionem
conatæ.
Gastroepiplois
sinistra.
Intestinalis.

Vitis.
Framus.

^c *MESENTERICA vena*, sive *dexter vena porta ramus*, quamprimum atque à dorso prodit, ac ^d mesenterio committitur, in duos præcipuos ramos dividitur, qui mesenterium inter duas tunicas pertranseunt, singuli in ramulos finduntur infinitos, & hi in tenues iterum furculos, qui intestina adeunt, Venas illas, adeo celebres apud Medicos, quæ *Mesaraicæ* vocantur, constituunt. Ex his primus, *Mesenterica dextra* dicitur, à dextra, quam occupat parte, & similiter duplex est, unde factum, ut Vesalius, & qui hunc sequuti sunt, alii fere omnes, tres Mesentericas enumerent. Hæc in Jejunum, Ileum, Cæcum, & Coli intestini dextram partem, qua renibus & jecori adjacet, inseritur, & quamvis utraque plurimas de se soboles spargat, ut perquam arduum sit numero aliquo ipsas exprimere, tum quia variant admodum pro ratione subjectorum, tum quia non eundem omnino ordinem seriemque observant, notatum tamen fuit, ut plurimum quatuordecim esse, quæ postea iterum in infinitos furculos alios disperguntur. Hi ubi ad intestina pervenerunt, circa intimam ipsorum tunicam osculis tantum hiant, neque cavitatem ipsam ingrediuntur, cum crusta quadam interius illa succingatur. Quemadmodum autem, ut diximus supra, in pluribus nostri corporis partibus, vasorum divaricationes Glandulis quibusdam attenduntur, partim ut tiores sint in progressu, partim ne concidant, & una sanguinis fluxus refluxusque maxime necessarii impediatur: ita hic quoque vasorum, quæ per mesenterium diffunduntur, divisiones ^e *glandulæ* quædam suffulciunt, proportionem cum propaginibus suis ubique observantes, adeo ut majores ramos majores glandulæ; minores, exiliores quoque sustentent. Hæ ubi scirrhi laborant, compressis vasibus, & impedita chyli per venas, ac consequenter, sanguinis per corpus distributione, tabes & totius corporis marcor oboritur. *Mesenterica sinistra* in mediam mesenterii partem, quemadmodum & eam Coli sedem, quæ à læva Ventriculi regione ad rectum usque intestinum excurrit, dissecitur. Ab hac interdum hæmorrhoidalis interna, de qua modo diximus, quemadmodum id Vesalius annotavit, exoritur, quæ Colo furculos quosdam largiens, tandem per totam longitudinem Recti intestini progrediens, in podicem definit. Cæterum antequam in hos ramos Truncus mesentericus dividatur, duas prius propagines emittit, quarum *altera Gastroepiplois sinistra* dicta, quæ Ventriculi fundum dextrum antierius posteriusque perreptat, quemadmodum & omenti membranam superiorem: *altera*, aliis *Intestinalis*, nobis *duodena* dicta, ad Duodeni medium, & Jejuni principium pertingit, & per eorum longitudinem descendit.

^f *Vitis Venæ portæ præcipuus* est, partes quæ in imo Ventre sitæ sunt, & crassiore sanguine, ac faculentiore indigent, ut sunt omnes nutritioni dicatæ, nutrire. Debit enim crassior esse sanguis, ut esset calidior, cum calor semper in crassiore corpore sit potentior. Sic ergo *RADICES*, Iecur nutriunt: *TRUNCVS*, Pancreas: ex *SVRCVLIS*, Vesiculam quidem fellis, Cysticus. *RAMVS SPLENICVS*, omnia nutritioni dicata viscera, præter mesenterium, & intestina. ac Ventriculum, ejus furculus pyloricus, gastricus, utraque gastroepiplois, & Vas breve. Nec enim expellendi ad ventriculum humorem melancholicum, sed nutritionis præcipue gratia, Vas breve factum esse à Natura existimo, cum sanguis, qui in Liene generatur, non melancholia sit, & humor excrementitius, sed optimus potius, quamvis paulo crassior, quam alius sanguis, quia scilicet & partes per splenicum ramum crassiore, quam per mesentericum alendæ, indigebant. *Omenti superiorem membranam*, utraque gastroepiplois; *inferiorem*, epiplois dextra & postica: *Lienem* duo rami, in quos Splenica vena dirimitur, & qui per ejus lineam mediam parenchyma ingrediuntur. *DVO RAMI MESENTERICI*, *Mesenterium*, & *intestina* fere

fere omnia. Et intestinum quidem Duodenum, propago duodena: *Iejunum* autem, *Ileum*, *Cecum*, & *Coli dextram partem*, dextra mesenterica. *Sinistram* autem *Coli sedem*, & *totum Rectum*, hæmorrhoidalis; at *mediam partem*, quæ sub ventriculo est, Epiplois postica. *Secundus* usus est, attrahere chylum, eumque ad hepar deferre, in cuius Venis præcipue sanguificatio celebratur. Eadem autem Venæ, quæ mesenterium nutriunt, chylum etiam attrahunt, ut infra, cum ejus historiam persequemur, dicemus. *Tertius* usus est, excrementa è corpore evacuare per intestina. Sic videmus *per ramum mesentericum*, ex lecore interdum refundi biliosum serosumque humorem in dysenteria, & diarrhæa biliosa: *per Hæmorrhoidalem venam*, fæcem melancholicam. *Quartus* usus, adjuvare coctionem hepatis. Sic videmus *per splenicum ramum* attrahi crassiorem partem chyli, quæ melancholia dicitur, non quia ibi sedes melancholiæ sit; sed ut beneficio arteriarum, quæ copiosissimæ sunt in Liene, attenuetur & concoquatur, nec coctionem, quæ in hepatis venis celebratur, inturbet & impediat, quemadmodum consuevit fieri, quotiescunque Lien aliquo morbo laborat, ut sanguificationis opera statim lædatur.

CÆTERVM quoniam Hæmorrhoidalium Venarum mentio hic facta est, visum fuit non inopportunitate fore, si huc explicationem pulcherrimi aphorismi, qui duodecimus est sectionis sextæ, cum sine anatomica historia intelligi nequeat, & ab aliis ita fideliter enodatus non sit, ut erat necessarium, conijciam. Scribit in eo Hippocrates, *αἰμορροΐδας ἢ διούρῃς χροΐδας τὸ μὴ μία φλογὶς εἶναι, ἀλλ' ὅταν ὑδρωπικὴ διαγνώσῃται, ἢ φθίσιν, hoc est, à diuturnis sanato hæmorrhoidibus, nisi una omnino non servetur, periculum est aquam intercutem, aut tabem supervenire.* In hujus explicatione, de veritate ipsius aphorismi primum dubitabimus, deinde de modo, quo ex sanatis diuturnis hæmorrhoidibus hydrops, aut tabes fiat, dispositionem instituemus. Dubitare autem merito possumus de veritate, quod idem Hippocrates, in libro de hæmorrhoidibus (quem ego maxime genuinum esse statuo, quidquid etiam dicat doctissimus alioquin Mercurialis) hæmorrhoidas nos urere jubet, veratque ullam citra unctionem relinquere, sed omnes urere. Et sane *Actius*, libro *xiv* conciliare cupiens hæc duo loca, ad illa verba, *τὸ μὴ μία φλογὶς εἶναι*, hoc est, *nisi una servetur*, victus rationem, non hæmorrhoidem subintelligendam censet, quasi diceret Hippocrates, non sanabis diuturnas hæmorrhoidas habentem, nisi æger convenientem victus rationem à te præscriptum diligenter servaverit, alioquin enim periculum est, ne in tabem, aut hydropem incidat. Cæterum *Galenus*, in commento illius aphorismi expresse scribit, docere Hippocratem, nisi una hæmorrhoidis servetur, periculum illud fore, nec ullam omnino dietæ mentionem injicit. Quin & ipsa quoque cotidiana experientia, cum victu quoque exacto hæc mala insequi satis testatur; & ratio desumpta à modo, quo id potest contingere, quemque mox explicabimus, uberrime declarat. Ex quo sane patet, duo hæc Hippocratis loca controversa adhuc & sibi invicem repugnantia, ex hac Aëtii responsione relinqui. Vera autem responsio erit, si dicamus, Hippocratem, dum in libr. de hæmorrhoidibus scribit, urendas esse omnes ad perfectam sanationem, non loqui de diuturnis hæmorrhoidibus: sed de iis tantum, quæ recentiores sunt, aut in quibus jam aliò Natura tentavit expulsionem humoris illius, qui alioquin per hæmorrhoidas expurgari solebat, sive id per fonticulos factum sit, sive per fistulam, seu ulcus aliquod in crure. Hæ enim sanari citra periculum tabis, vel hydropis quam optime possunt, maxime integris adhuc & salvis visceribus, ac imprimis omnium, succedente bona victus ratione. Nec vero omnes diuturnæ hæmorrhoides sanatæ necessario hydropem, vel tabem inducunt, sed ut plurimum tantum horum malorum periculum intentant. Interdum enim repente materia melancholica in Cerebrum rapta, Mania oritur, ut *Alcipo* contigit apud Hippocratem, *xv*, *Epidem*. Hic enim, inquit, hæmorrhoidas habens curari vetabatur: nam curatus insanivit, sed acuta febre superveniente sanatus est. Pro secundo quesito explicando, primum *Galenum* audiamus. Is enim in commentario hujus aphorismi, hæmorrhoides ob sæculentum sanguinem, & melancholicum, quem ad ora quarundam venarum Iecur propellit, fieri inquit, adeoque interclusa hac via, multitudinem crassi humoris aggravare hepar, & ejus calorem nativum suffocare: hoc exstincto, non generari amplius sanguinem, sed aquam tantum, quam postea natura propellens in abdomen, hydropem facit. Quod si multitudinem humoris melancholici Iecur ad pulmones deferat, rupto aliquo vase, fieri tabem.

Hæc

1. Hæc interpretatio præter quod admodum obscura nobis videtur, nec veritati prorsus est consentanea. Primum enim falsum esse judico quod Galenus in commento statuit, impossibile esse, ut absque multitudine fæculenti & crassi sanguinis hæmorrhoides fiant, cum & rationibus, & autoritate probari possit, à bile quoque, & pituita provenire. *Autoritate quidem* Hippocratis, qui initio libri de hæmorrhoidibus, hæmorrhoidum morbum hoc modo fieri testatur, cum bilis scilicet, aut pituita ad venas recti intestini decubuerit, sanguinem qui in venis est calefacit. Calefactæ autem venæ ex vicinis venulis sanguinem attrahunt, & ubi replentur, interna sedis pars intumescit, & capita venarum supereminent. *Ratione vero* sic probatur: cum enim insaniam proficisci à pituita, & bile testetur Hippocrates lib. de morbo sacro; & vi aphorism. xxi, insanientibus si varices, aut hæmorrhoides supervenerint, insaniam solutionem fieri profiteatur, profecto non solveretur insaniam, si tantum melancholicus humor per hæmorrhoidas prodiret, nec enim causa morbifica excerneretur. Sed & nos ipsi in Germania olim vidimus, à falso catarrho molestatos fuisse Viros nobiles, sanatos tamen postea ex hæmorrhoidum larga fluxione; ut propterea existimem, non modo melancholiam, sed falsam etiam pituitam & bilem per hæmorrhoidas purgari consuevisse. Quare si contingat jam diu hæmorrhoidibus confectum postea sanari, bilis illa, & pituita, vel obstruções in Iecore aut Liene parit, vel in aliqua copia coacervata, distendendo vasa in abdomine contenta perrumpit, vel sua qualitate exedit, & in abdomine hydropem facit, vel in Iecore obstruções parando, nativumque calorem extinguendo, plurimum aquæ, & serosi humoris, loco sanguinis generat, qui per venas transiens Leucophlegmatiam efficit. Quod si hic humor ad pectus, aut pulmones retrocedat, vasa eorum perrumpit, aut exedit: hinc sputum sanguinis, deinde puris sequitur, ex quo tandem tabes, ut in aphorismo xi lib. vi docet Hippocrates. *Cæterum* hoc loco imprimis notandum est, duplices esse Venarum propagines, quæ Hæmorrhoidas constituunt. Aliæ enim sunt propagines Venæ portæ, de quibus jam egimus; aliæ vero Cavæ, quæ à ramis Iliacis pronascuntur, de quibus postea dicendum. Quod si per Venæ portæ propagines dicti humores melancholici, biliosi, aut pituitosi, & falsi fluant, hæmorrhoides internæ fiunt, quibus sanatis, refluit materia in ramos venæ portæ per inferiorem ventrem dispersos, in cujus spatium venæ, humoribus his aggravatæ, sarcinam suam deponunt, & ascitum, primam hydropis speciem faciunt. At si per ramos Venæ Cavæ fluxerint, hæmorrhoides externæ fiunt, & his, præter Hippocratis præceptum, sanatis, tabis periculum imminet, quod hinc per venam cavam ad pulmones, propter cor, facilis sit materiæ peccantis transitus. Et hoc est quod jamdudum observavimus, plurimos fistulis ani diu affictos, postea vero Medicorum imprudentia sanatos, in sputum sanguinis, & inde in tabem incidisse. Quin imo meminimus, curatam aliquando in Germania à nobis fuisse puellam, quæ in media coxa fistulam habuit, & per tres annos frustra multorum auxilium imploraverat, sed curatam tandem, post tres quatuorve menses, in sanguinis copiosum sputum incidisse. Ego, etsi vix decimum attigerat annum, ex pede agro, in quo fistula laboraverat, sanguinem illico detraxi, corporeque purgato, & inulto prope locum, in quo fistula fuerat, cauterio, ipsam à tabe præsentissima, facile sic vendicavi. Sputum hoc sanguinis non aliunde continebat, quam ab acri illa, & biliosa materia, quæ cum nullum per fistulam amplius exitum inveniret, ad pulmones, per ramos venæ cavæ postmodum ascendit. Signate autem Hippocrates inquit, periculum esse ne fiat hydrops, aut tabes, quia nonnunquam evenit, ut neutrum horum accidat, sed alius potius morbus subsequatur, quemadmodum evenit Alcippo, qui in insaniam, & hinc in febrem acutam incidit. Interdum etiam dysenteria oritur, aliaque mala: quandoque etiam accidit, ut copiosis mictionibus, sudoribus, remediis, & bona victus ratione præferentur.

Duplices Hæmorrhoides.

Nota

CAPVT VI.

Superiorem, sive Ascendentem Venam cava truncum, tum ramos per caput dispersos, enarrat.



ALTERA jam vena, quam ^a *Cavam* vocari diximus, considerata est, quæ latius multo quam Portæ vena patet, cum per uniuersum corpus distribuatur. Ejus enim munus est, omnes nostri corporis partes, quæ ad alimentum concoctionem non faciunt, enutrire, quæ cum longe lateque pateant, venam quoque Cavam maximam esse longeque diffusam necesse est. Et quia tenuiore quodam magisque elaborato sanguine alias conveniebat, nec ita crasso aut sæculento, quemadmodum Ventriculum, Lienem, Omentum, sanguis quem conficit, & vehit Cava, purior, tenuior, atque sincerior quoque est.

*Ipsi comb
Cava.*

In hujus historia tradenda, etsi minime cum iis sentiamus, qui vel à Iecore deducunt ipsius principium, vel à Corde; quia tamen alicubi principium tractationis querendum nobis est, communem Anatomicorum consuetudinem sequendum duximus, adeoque quasi à Iecore originem capiat, doctrinæ facilius gratia, sic de ea perpetuo loquimur. Accedit, quod in Iecore quasdam veluti radices spargit, haud secus ac vena Porta, in cujus historia cum propterea initium ab ipsis ceperimus, merito hic quoque exordium in Cava querendum erit. Cæterum Cava, quanquam per uniuersum corporis truncum, recto progressu excurret, & insignem caudicem ^b constituat, per medium infimumque Ventrem, rectæ instar lineæ continuæ, vel canalis potius ritu digestum: solet tamen ratione hepatis bifariam dividi, & sic alius ejus truncus Ascendens, alius Descendens vocari. Reuera enim verum illud non est, quod multi persuasum sibi habent, Cavam suo è Iecore egressu, quemadmodum Arteria magna, ubi ex corde prodit, in duos fandi truncos: interim tamen cum trunci dicuntur posthæc à me, doctrinæ gratia duntaxat id fieri, credendum. ^c *Ascendens* ergo, & *Superior* dicitur, qui supra hepar consistit, & circa jugulum terminatur; ^d *descendens* vero, qui infra hepar est, & ad crura usque pertingit. Vterque enim postea in ramos dispescitur; quorum ^e illi, ad caput sursum feruntur, ut jugulares; & brachia, ut ^f *brachiales*: hi, ad crura, & ^g *cruales* vocantur. De his ergo omnibus nunc ordine sic dicemus, ut prius trunci ascendentes historiam, deinde ramos ejus, partim ad caput, partim ad brachia progredientes enarremus: hinc descendentes truncum, ejusque ramos ad crura digestos, aggrediemur.

*Ratio ordinis
qui in historia
enarratur.*

VT ERGO EX CAVA HEPATIS parte venulas complures, veluti radices enasci ^h diximus, quæ semper in majores sensim insertæ, tandem circa medium omnibus simul coeuntibus Truncum constituiebant; ⁱ ita non diverso modo, ex ambitu convexæ ejusdem partis, numerosa venarum soboles erumpit, quæ postea in unum ^k truncum conspirat. Truncus hic ^l Diaphragmatis nervosam partem in dextro latere perforat, quam transiens, indivisus usque ad jugulum progreditur, & quia versus superiora ascendit, *ASCENDENS TRUNCUS* communiter ab iis, qui Cavam ex Hepate prodire censent, vocatur. Amplior est multo Descendente, quod partes superiores solo hoc nutrantur: inferiores autem pleræque omnes in ventre imo contentæ, Vena portæ. Quamvis autem in ramos nullatenus findatur, usque dum jugulum attigerit, propagines tamen quasdam ad latera spargit, & quidem tres insigniores. ^m *Prima* est, quæ *vena Phrenica* dicitur, utrinque una, & per diaphragmatis (quod *phrènes* vocatur) universam sedem numerosa sobole distribuitur, ramulos ad pericardium vicinum, & mediastinum transmittens, quod ubi jam superavit, & thoracem ingressa est, modice sinistrorsum inclinatur, pericardium ingreditur, & è regione octavæ thoracis vertebræ admodum latefscens, in ⁿ dextrum cordis ventriculum validissime inferitur, ut non immerito hinc Aristoteles oriri censuerit. Antequam tamen sic implantetur, ^o *alteram* propaginem educit, quæ insignis est, & secundum cordis posteriora, ac latus sinistrum, versus anteriora porrigitur, cordis basin coronæ instar succingens, unde & *Coronaria* dicitur. Hæc plurimos ramos per exteriorum cordis superficiem totam dispergens, potissimum vero per partem lævam, ut quæ copiosiore alimento ob continuum & majorem motum,

*TRUNCUS
ASCEN-
DENS.*

*Propagines
trunci ascen-
dentes.*

Phrenica.

Coronaria.

quam dextra pars, indiguit. Quia vero parenchyma cordis durum est ac solidum, propterea & crassiore quoque sanguine nutriendum erat, ex quo factum, ut hic ramus, antequam cor ingressa sit vena, exoriatur, quando scilicet adhuc sanguis paulo crassior est, nec dum in cordis sinibus attenuatus fuit. Prope hujus originem *Valvula* est, quæ sanguinis ad Cavam refluxum, propter continuum cordis motum facillimum, prohibet. Vbi jam cor superavit Cava, gracilior redditur, & pericardium denuo perforat, à vertebriis dorsi discedit, & supervecta œsophagum, asperam arteriam, atque aortam, (sibi mutuo sic incumbentia, ut vertebrarum corporibus œsophagus adiaceat, huic infernatur arteria aspera, eique iterum incumbat aorta,) per mediam pulmonum divisionem, quo loci dextra pars à læva diducitur, sursum contendit. Caterum quia hoc pacto dorsum attingere nequitam poterat, ramuli autem, si quos eduxisset, periculo ruptionis (suspensi scilicet) admodum fuissent opportuni, ^{a. c.} *tertium* propaginem simul atque pericardium egressa est, constituit. Hanc venam *ἄρτην* Græci, Latini *sine pari*, aut *conjugæ carentem* appellant, quod in homine una tantum sit, nec parem, aut conjugem in sinistro latere, ut aliæ venæ, habeat: in ruminantibus tamen animalibus gemina est, & utrinque conspicua. Egreditur vero circa quintam thoracis vertebra, & quidem ex Cavæ posteriore, & dextro latere, descendensque non recto gradu procedit, sed versus dextram nonnihil inclinans, retrorsum ad spinam quasi reflectitur. Cum primum autem octavam, vel nonam costam attingit, supra spinam in duos ramos, quorum alter *dexter*, alter *sinister* est, discinditur, qui descendentes diaphragmatis divisionem, quæ inter duas ipsius productiones est, transeunt, sicque in infimum ventrem expanduntur. Ex his sinister, qui quandoque major est, circa transversos vertebrarum processus, ac sub sinistra productione Diaphragmatis, & primi fœmur flectentis origine latens, in emulgentem sinistram, & vel juxta principium, vel (uti frequenter solet) in medium inferitur. *Dexter* vero, similiter sub membranis circa transversos dextri lateris processus, dextraque productione septi, & ejusdem primi fœmur flectentis principio, qui dextrum latus occupat, progrediens, aliquando ipsi trunco Cavæ, interdum primæ lumbari implantatur. Et hæc observatio doctissimo Fallopio debetur, qui hujus sinistri rami beneficio materias in thorace collectas, siue aqueæ sint, siue purulentæ, aut sanguineæ, evacuari voluit, de qua tamen re sequenti libro breviter aliquid dicemus. Caterum ab hac Vena, ab utroque latere, tam dextro, quam sinistro, in itinere versus inferiora, furculi egrediuntur, ex quibus tamen dextri insigniores, magisque ampli sunt, quorum decem plerumque semper numerari solent, qui ad inferiorum costarum totidem intervalla excurrunt, & *Intercostales venas inferiores* constituunt. Dico autem plerumque semper decem esse, quia raro valde evenit, ut ab hac vena omnia intervalla ramis donentur, cum duo superiora, primum scilicet, & secundum spatium, à quarto ramo jam jam enarrando, furculos suos nanciscantur. Caterum furculi hi recta progrediuntur, & quidem juxta inferiorem sedem costarum, ubi horum gratia sinus exsculptos esse secundo libro docuimus. Et hic sane locus diligenter Chirurgiæ candidatis notandus est, propter Thoracis apertionem in empyemate, ut sciant in superiore costæ loco sectionem faciendam esse, cum ex inferiore magno vitæ periculo vasa læderentur. Non tamen *per costarum verarum* totam longitudinem excurrunt hæ venæ, sed cum ossea parte una terminantur. Intercartilaginea autem sex septem verarum costarum spatia, Venæ Mammariæ propagines nutriunt, quemadmodum mox dicemus. *In spuris* tamen costis, ultra cartilagineas etiam versus abdomen pertingunt, in cujus musculos se insinuant. Propagantur autem & ab eadem vena alii quidam exigui ramuli, per quos alimentum Vertebrarum medullæ, & Musculis, circa quos scilicet feruntur, derivatur; nonnulli etiam in mediastinum juxta dorsum implantantur. Hac ergo Vena sine pari sic constituta, Cava ad ^b jugulum ascendit, suffulta Mediastino, mollicque ac glanduloso quodam corpore, quod Græci *ὑψιδόν* appellant, & in elatissima Thoracis sede positum est, ut venarum divaricationes hic suspensas, ab omni ruptionis periculo tutas præstaret.

Atque hic primo Cava vena in ^c duos insignes ramos dirimitur, à quibus oriuntur venæ omnes, quæ tum ad caput, tum brachia, aut musculos quosdam abdominis excurrunt. Ex his alter ad dextram, alter ad lævam partem abit, qui quamdiu in Thorace adhuc sunt, *Subclarii* appellantur, quia sub claviculis incedunt: at quam primum exciderunt ex ipso,

Venæ Cavæ
in duos ramos
se fundit
vires diviso.

ex ipso, & axillam attigerunt, ^a *Axillarium* nomine vocantur. Ex utroque complures emergunt propagines, quarum alia ex superiore parte, alia ex inferiore enascuntur. In harum enarratione hunc ordinem observabimus, ut quæ propius à trunco absint, prius à nobis proferantur; posterius, quæ longius recedunt.

Prima ergo propago, juxta radicem ipsius bivaricationis emergit, & ^b *Intercostalis superior* dicitur, utrinque una, quæ exilis admodum descendens secundum costarum radices usque ad tertiam, in duo superiorum costarum intervalla, Venæ sine pari instat; ^c furculos duos transversim propagat. Quod si Vena sine pari omnibus (ut nonnunquam fit) spatiis propagines offerat, deesse ipsa tunc merito solet. Interdum tamen eadem vena à Trunco quoque Cavæ, priusquam in subclavias bipartitur, originem ducit.

^a *Alteræ vena*, modo ab anteriore bifurcationis sede; modo à subclavii rami radice gemina, utrinque una; modo etiam è medio trunco, antequam dividatur, unica enascitur, quæ ubi sternum demum attingit, in dextrum & sinistrum ramum dirimitur. Solet enim Natura ludere, cum in aliis suis operibus nonnunquam, tum inprimis in Venarum exortu, adeo ut non eodem modo in omnibus corporibus Venæ spargantur. Vocatur autem *Mammaria*; quæ, undecunque exoritur, antorsum ducta, ad elatiorem pectoris ossis sedem contendit, secundum ipsius latera descendit, & ubi ad cartilaginem mucronatam pervenit, circa ipsius latera thoracem egreditur, sub rectis abdominis musculis recta procedit usque ad umbilicum, juxta quem per ^e anastomosin cum ^f epigastrica ascendente, & sibi occurrente, conjungitur, cujus beneficio insignis ille inter uterum atque mammas consensus exoritur, de quo inferius, capite VII, ubi historiam venæ Epigastricæ persequemur, pluribus agemus. Caterum antequam Thoracem relinquat, in descensu ad sex superiorum utriusque lateris septem verarum costarum spatia intercartilaginea singulos ramos transmittit, quæ cum cartilaginibus juxta finem partis ossæ costarum terminantur, quo loco ramos Venæ sine pari (quibus cum extremis junguntur) cessare monuimus. Ab his venis, quæ cartilaginum intervallis hoc modo distribuuntur, alia nonnullæ notatu dignissimæ emergunt, quæ tum in musculos pectori incumbentes, tum in mammas disseminantur. ^g *Tertia* juxta has enascitur, quandoque etiam à trunco prodit, quæ *Mediastina* dicitur, quia in mediastinum, sive membranam thoracis cavitatem intersipientem, secundum totam hujus longitudinem, cum nervo diaphragmatis sinistro exprorecta, propagatur. ^h *Quarta*, *Cervicalis* vulgo dicta, vena utrinque ampla est, quæ sursum oblique contendens versus posteriora, ad transversos vertebrarum cervicis processus abit, perque earundem foramina conscendens (unde rectius fortasse *Vertebralis* cognominaretur) musculis vertebris proxime incumbentibus soboles largitur. Hac ubi processum transversum septimæ vertebræ superavit; insignem ramum ad finem, qui in cervice est, per foramen nervorum exortibus dicatum, derivat; deinde alium, qui ubi supra sextæ vertebræ processum venit, & alium rursus, ubi à quinta evasit, sicque porro, donec ad primæ vertebræ (quam tamen non attingit, nedum in cranium penetret, ut Vesalius voluit) processum pervenerit, juxta quem partim ad eundem finem fertur, partim in posteriores colli partes distribuitur. Sunt enim *duo sinus* oblongi, sanguine referti, qui ex dura cerebri membrana conficiuntur, utrinque unus, ad latera medullæ Cervicis consistentes. Ab his ramuli distribuuntur, qui spinæ medullam, conterminalæque partes enutrient: initium autem circa articulationem capitis cum prima vertebra capiunt: finem juxta septimam colli vertebra reponunt. Sinus hi duo, quorum alter dexter est, alter sinister, communionem quandam inter se habent, per tubulum, cumque brevem, qui ab uno ad alterum, circa eam fere colli regionem, quæ inter secundam & tertiam vertebra est, transversim derivatur. Tandem ⁱ *quinta* vena est, *Muscula inferior* vocata, quæ à posteriore parte enascitur, & in musculos tum humiliorem cervicis, adeoque caput & cervicem extendentes, unde melius *Cervicalis* diceretur; tum sublimiorem thoracis sedem juxta vertebra occupantes, multis ramis distribuitur.

A sublimiore sede subclaviorum, dum adhuc in thoracè est vena Cava, cum tres prodeant, duæ sunt notatu dignissimæ propagines, quæ sub musculis caput flectentibus versus superiora viam intendunt. *Prior* internam magis partem spectat, & *Iugularis interna* dicitur: altera ad exteriora vergit, & *Iugularis externa* communiter vocatur. Vtraque enim

Propagines
quæ ex superiore
parte
subclavio
prodeunt.

^{11.}
*Intercostalis
superior.*

^{2.}
Mammaria.

^{3.}
Mediastina.

^{4.}
Cervicalis.

Propagines
quæ ex superiore
parte
subclavio
oriuntur.

^{1.}
Inguis
terna.

Emu de
in ramum
interior.
Exterior.
Interior, ex
em subter-
fu.

^{2.}
Inguis
terna.

Divisio.
Profundus.

Rami tres
calvariam
ingredientes.

^{1.}
^{2.}
^{3.}

Cutaneus qui
ramus faciei
conspicitur.

^{3.}
Musculus su-
perior.

Axillaris di-
visio in duos
ramos.

enim juxta jugulum oritur, & secundum hunc ad caput ascendit: ex quibus illa, major; hæc, minor est in Homine; contra in Brutis. Cæterum cum appellationes pleræque omnes, & optime, non à loco, per quem transeunt, sed ab insertione sint derivatæ, rectius fortassis *Cephalica*, & *Capitales* dicerentur. ^a *Inguis interna*, juxta articulum, quo clavicula sterni necitur, originem ducit, statimque ab exortu, cum arteria carotide & nervo sexti paris, tanquam itineris comitibus, ad asperæ arteriæ latus conjungitur, indeque ad fauces viam parans, circa itineris medium in duos ramos dirimitur; ex quibus alter, exterior dicitur; alter, interior. Exterior quidem, quia capitis interiora non subit, sed ad maxillæ inferioris angulum bifariam divisus, alterum ramum ad fauces, alterum prope aures & faciem distribuit. Interior autem ramus, universo ductu Carotidi arteriæ usque ad calvariæ basin commissus est, ad quam ubi appulit sede posteriore, similiter in duos ramos scinditur, sed amplitudine inæquales. ^b *Primus* enim major est & posterior, cum oblique retrorsum ducatur; qui ubi in musculos cesophago subiectos, & anteriorem cervicis vertebrarum sedem occupantes furculos propagavit, per occipitii foramen secundum cum arteriæ carotidis ramo minore cranium ingreditur, per quod idem foramen sextum par nervorum descendit, sicque membranæ crassæ sinum ^c *primum* ^d & secundum subit. ^e *Secundus* ramus, *gracilior* & anterior, carotide arteria penitus relicta, anticam capitis partem petit, & posteaquam in via auditus organo furculum non admodum insignem largitus est, calvariæ per cuneiformis ossis foramen septimum ingreditur. ^f Hic per crassæ membranæ basin & latera multiplici ramorum serie dispergitur, quorum ^g *vestigia* in ossium sincipitis interna superficie observari, superius lib. 11 diximus. Hos duos ramos, cum ad Cerebrum vadant, *Encephalicos*, quasi dicas *Cerebrales*, vocabimus, & illum quidem majorem; hunc, minorem. ^h *Inguis externa* sub cute, & Quadrato genas detrahente musculo ascendens, per colli latera, ubi ad aurem pervenit, ⁱ in duos ramos scinditur, quorum alter à me *profundus* dicitur, quia musculos ingreditur, & ad intimiora penetrat; alter, *cutaneus*. ^k *Profundus*, in primis suis divagationibus glandulas obtinet, circa fauces consistentes, & notatu dignas propagines de se mittit ad Laryngem, glandulasque ipsi adnatas, tum ad faucium & ossis hyoidis musculos; ex quibus ille, qui sub lingua per totam longitudinem prorrepit, insignis est, & in multiplices ramulos, dispergitur, qui elevata lingua etiam citra faucium coarctationem satis conspicue cernuntur, passimque à Chirurgiæ scriptoribus *Ramule* appellantur, & in ori vicinarum partium inflammationibus non sine magno plerumque successu secantur. *Ab hoc profundo ramo* tres oriuntur, qui interiora capitis & calvariæ subeunt. *Primus* quidem, postquam ad fauces & os ramulos sparfit, per quintum foramen ossi temporum insculptum, cranium ingreditur. ^l *Alter*, ex oculi sede anteriore per cuneiformis foramen secundum, unde secundum nervorum par elabitur, transit, ac per crassam membranam versus superiora aliquot furculis excurrit. *Tertius*, ex narium amplitudine per ossis cribrosi foramen in eandem membranam disseminatur. Hæc duæ anteriorem hanc partem nutriunt, cum sinus tertius ad ipsam non pertingat, sed juxta septem processuum mammillarium designat. Cæterum ^m *Cutaneus* ramus, cutim capitis perreptans, & sub aure glandulis, quas Parotides vocant, suffultus, in duos ramos dispartitur; quorum alter ⁿ *anterior*, oblique per genas sursum fertur ad oculi angulum internum, in itinere naso ramulos impertiens, & procedens ad supercilium, junctusque cum reliquo alterius lateris ramo in media fronte, rectam venam constituit, quam ^o *Frontis* appellant, & in infania maxima cum utilitate inciditur. Huc alludit Satyricus, cum de inepto quodam loquens illi *mediam* jubet *perfundere venam*. Alter ramus, *posterior*, per posteriora fertur, & ad ^p tempora atque ^q occipitis cutim ramos propagat. *Tertia*, quæ ^r à superiore subclavium ramorum sede enascitur, *Musculus superior* vulgo dicitur, respectu illius, quæ ejusdem nominis ex humiliore loco prodit. Erumpit autem juxta jugularem externam, & in posteriores cervicem occupantes musculos, ipsamque hujus regionis cutim dispergitur, quo nomine ^s *Cervicalem superiorem* non inepte vocabimus.

SED nunc ad eam unde digressi sumus venæ subclaviæ distributionem, revertamur. Hæc thoracis cavitatem egressa ^t *Axillaris* vena vocatur, atque ubi ad alas pervenit, in duas insignes propagines dividitur, ^u *Cephalicam* scilicet, & ^v *Basilicam*, quæ postea per totum

totum brachium disseminantur. Antequam autem sic dividatur, duos producit de se furculos: ^a primum, qui vena *Scapularis interna* dicitur, & per musculos internam scapulæ partem occupantes propagatur: ^b alterum, *Scapularem externam* nominatum, grandiusculum, musculis ejusdem scapulæ externam & gibbam partem obsidentibus implantatum. ^c *Basilica* vero & ipsa, antequam brachium ingreditur, duas propagines profert: ^d unam, *Thoracicam superiorem* vocatam, quod ex elatiore, quam sublequa parte oriatur, & insignis admodum, per internam faciem musculi pectoralis humerum adducens excurrat; aliis item musculis pectus occupantibus, quemadmodum & mammæ cuti in fœminis, ramos distribuat. ^e Altera, *Thoracica inferior* dicitur, insignis similiter & grandis, quæ secundum thoracis latus descendens, per tertium humerum abducentem latissimum musculum imprimis distribuitur, plurimos de se ramulos spargens, qui postea cum ramis venæ sine pari extra thoracem procidentibus per anastomosi junguntur. atque hæc nonnunquam etiam à priori, sive *Thoracica superiore* prodit. His sic ramulis constitutis *Axillaris* in brachium porrigitur.

Axillaris furculus ante divisionem.

Basilica rami ante ingressum in brachium.

CAPUT VII.

Axillaris Venæ per brachium distributæ seriem proponit.



VENA ergo ^f *AXILLARIS*, quam primum brachio approximat, in duos finditur ramos, sed eos inæqualis amplitudinis. ^g *Superior* enim, quem *Cephalicum* vocant, gracilior est; at ^h *inferior*, qui *Basilicus* dicitur, triplo fere amplior existit. *Cephalica* etiam vena subcutanea quasi tota est, nec nisi uno ramo ad profundiores musculorum recessus penetrat, unde neque Arteriam, nec Nervum intimioribus scilicet corporis recessibus additos, comites habet. *Basilica* vero, partim sub cute prorepat, partim sub musculos sese recondit, unde & magnitudine illam merito superare debuit, ut quæ pluribus partibus alendis destinata erat. Habet eadem & Nervos & Arterias itineris sui comites, quæ causa esse solet, ut hac vena incisa, sanguis cum impetu profiliat: secta è contra *cephalica* effluat leniter, quod imperitos dissectionum Medicos, Venæ sectioni adstantes, ad animi & corporis robur, aut imbecillitatem imprudenter referre cernimus. De utriusque per brachium distributionis ratione nunc breviter dicturi sumus, initium capientes à superiore, tanquam ramo minore.

Divisio Venæ Axillaris.

Discrimen ramorum venæ Axillaris.

2.

Nota.

ⁱ *CEPHALICA* ergo *Vesalio Humeraria venæ* dicitur, quod per humerum ad manum propagetur; ab aliis *cubiti exterior* à situ, quia in cubito latus externum occupat: quemadmodum *Basilica* contra, internum. A Recentioribus quibusdam communiter *Cephalica* appellatur, quod in capitis affectibus secari soleat, ob errorem Veterum, qui à jugulari externa eam pronasci, & propterea à capite immediate sanguinem evacuare, imperite credebant. Enascitur autem ab *axillaris venæ* superiore parte, tendinemque ferrati minoris, qui scapulam pectori adducit, transcendens, inter deltoideum musculum, qui humerum elevat, ac principium pectoralis, qui eundem adducit, qua parte à clavicula exoritur, excurrit, sicque ad externum latus primi cubiti flectentis (quem bicipitem vocant) per humerum descendit, cujus nomine inter bicipitem & deltoideum fonticulos inurere doctiores Chirurgi prudenter consueverunt, cum semper ad locum venæ insignioris fonticuli fieri debeant, ut materia facilius evacuetur. Quamquam vero indivisa sit, dum sic per humerum deducitur, graciles tamen nonnullos ^k furculos utrinque in musculos dictos, & cutem disseminat. Tandem ubi ad cubitum pervenit, sub membrana carnosa, ut decet subcutaneam venam, reconditur, sicque citra dissectionem oculis sese offert. At circa ipsum articulum cubiti ad externum humeri tuberculum, in tres fere ramos ^l dividi consuevit; quorum alter, exterior est; alter, interior; tertius, medius. Priores duo subcutanei sunt; tertius, profundus. ^m *Primus*, sive *medius*, qui frequenter abesse solet, gracillimus est & profundior, in musculorum, imprimis vero duorum, secundum & tertium digitorum articulum flectentium, quemadmodum & longi radii supinatoris substantiam se penetrat. ⁿ *Secundus*, & *interior*, ac præcipuus ex his tribus ramis, oblique sub cute deducitur, ac cum *basilicæ* ramo interno tribus digitis infra cubiti articulum coit, cum qua ^o *Medianam venam*, Medicis sic dictam, constituit. Hæc oblique per

VENA CEPHALICA.

Nota.

Rami venæ Cephalicæ.

Interior.

mediam cubiti regionem descendens, ad radium complures furculos dispensat, tandemque & ipsa in duos discinditur ramos minores: quorum ^a exterior, ad carpi sedem interiorem versus pollicem abit; alter ^b interior, ad indicem & medium excurrit. Ille exterior, nonnullis *Cephalica manus* dicitur, & magna cum utilitate in capitis, dentiumque affectibus aperitur. ^c Tertius tandem ramus, sive exterior cephalica, longum radii supinatorum musculum conscendit, variis in cutim dispersis venulis, sicque ^d oblique per radium fertur, cujus medium longitudinis ubi attingit, externam cubiti sedem ingreditur, ibidemque cum ^e basilica ramulo jungitur. Huic junctus ad externam carpi sedem procedit, & illi regioni, quæ ante minimum & annularem digitum est, quemadmodum & ipsis etiam digitis venas largitur. Hæc vena communiter, maxime quæ minimum digitum spectat, *Salvatella* dicitur, & in sinistra manu à Practicis incisa, in affectibus melancholicis, præcipue lienis inflammationibus & quartanis febribus admodum commendatur. De qua re cum nonnunquam disputetur, egoque experientiam Practicis favere observavi, causam indagare conatus sum, invenique complures anastomoses hic esse venæ hujus cum arteriis, quemadmodum circa extremas partes anastomoses luculentiores esse solent, tanquam in partibus remotis à fonte caloris, & quæ propterea sanguine calidiore spirituosiusque indigebant. Secta ergo hæc vena, quia proximæ anastomoses sunt, fieri nequit, quin sanguis arteriosus quoque effundatur, id quod in cubiti venis incisis non ita fieri potest, ob anastomoses paulo remotiores à loco in quo vena aperitur. Et hinc fit, ut sanguis, qui ex manu evacuetur, multo sit pulchrior & rubicundior illo, qui ex brachio educitur; quod semper arteriosus hic simul evacuetur. Cum autem in Liene sextuplo plures Arteriæ sint, quam Venæ, plurimum profecto adjumenti accidere ipsius affectionibus necesse est, quod ex his valis sanguis, in quibus peccavit, evacuetur.

VENA BASILICA.

Alter ramus axillaris, interior, & amplior, ^f BASILICA est, quæ pro situ brachii diversis diversa nomina apud Practicos Medicinæ scriptores invenit. Dextri enim brachii *Hepatica* dicitur, at sinistri *Splenica*: illam in Hepatis, hanc in Lienis affectibus pro sectione eligunt. Erumpit autem sub ala, & propaginis pluribus ad copiosas ejus loci glandulas dispersis, per humerum, ad latus bicipitis, inter flectentes & extendentes cubiti musculos defertur, nec procul ab egressu è thorace in duos ramos insignes dividitur, quorum alter profundus, alter subcutaneus, à situ & progressu dicitur. ^g Profundus ramus, qui fere crassior est, ad intimiores brachii partes toto ductu sese penetrat, ubique arteriam brachialem comitem asciscens, quemadmodum & nervi tertii ramum quartum. Fertur autem inter duos cubiti flectentes musculos, cujus articulum ubi superavit, in duos ⁱ scinditur ramos, quorum ^k exterior, juxta radium (unde *Radius* dici posset) ad manum descendit, ac versus pollicem & indicem, quemadmodum & medium digitum, ramulos dispergit: ^l interior autem juxta os cubiti (à quo *Cubitei* appellationem meretur) incedens, digito medio ac minimo ramulos, sed ut ille quidem, musculis in externa manus facie; sic hic, in interna sitis largitur. ^m Subcutaneus ramus alter est, qui per anteriorem humeri regionem defertur, variis de se ramulis ad cutem & adjacentes partes disseminatis; at ubi ad humeri tuberculum internum accesserit, in ramum anteriorem & posteriorem, similiter ut Cephalica, ⁿ dividitur. ^o Interior infra cubiti flexuram oblique defertur, & cum ^p interno Cephalicæ ramo connexus, ^q Medianam venam, de qua diximus, constituit. ^r Exterior vero, juxta humeri tuberculum internum bifariam divisus, majore ramo secundum ulnæ regionem ad carpum deorsum fertur, & ad digitum minimum sese dispergit: altero vero, ad anteriorem manus sedem derivatur.

Subcutaneus.

Dividitur subcutaneus in anteriorem & posteriorem.

Venarum distributionis non eadem est omnibus.

Cæterum hoc loco operæpretium est cum aliis doctissimis Anatomicis admonere, credendum non esse, eandem in omnibus hominibus Venarum seriem & ductum inveniri, cum sectio cadaverum demonstret, vix inter mille duos eandem Venarum distributionem accurate fervare. Quamobrem nec in eligendis locis pro Venæ sectionibus tam scrupulosos nos, ut solent quidam imperiti, esse decet, sed eam potissimum eligere, quæ tutissime secari possit, quod quam optime oculis sese offerat. Nonnunquam enim Cephalica sic gracilis est, ut vix conspectui pateat; interdum contra Basilica. Quare ille quam optime egerit, qui prudens potius consilium, quam scrupulosam imperitorum opinionem sequetur.

CAPUT VIII.

Inferiorem, sive Descendentem venam Cava Truncum explicat.

VPERIOREM Venæ cavæ Truncum & Ramos persequuti sumus; Vena Cava Truncus inferior. restat ergo nunc, ut & de inferiore agamus. Nec tamen revera, quod supra quoque monuimus, duo Trunci sunt, ut Galenus volebat; sed unus, qui à divisione circa ^a quintam lumborum vertebra, ^b ad usque jugulum continuo ductu pertingit: at doctrinæ gratia sic à nobis ratione Hepatis distinguitur, quod quasi in medio consistens, in superiore, & inferiorem scindere videtur. Vt ergo ^c superior est, qui ab hepate ad jugulum excurrit: sic ^d inferior, qui ab eodem inchoans, ad os usque sacrum terminatur. Sed & quemadmodum Superior indivisus per Thoracem excurrerebat, propagines tantum nonnullas spargens ad latera; sic & Inferior per abdomen totum integer delabatur, non nisi furculus de se quibusdam dispensatis. Cæterum ubi quintam lumborum vertebra attigerit, in ^e duos insignes ramos Iliacos dictos, non secus ac superior in Subclavios scinditur, qui postea in crura se penetrantes, Crurales ramos constituunt, ut illi in brachia digesti, Brachiales. Dicamus ergo hoc capite de Trunco, ejusdemque propaginibus, quamdiu adhuc in Ventre inferiore est, deinde ad Crurales accedamus.

^f A TRUNCO ergo DESCENDENTE, antequam in ramos abeat, quatuor nascuntur venæ. Cum enim primum à posteriore hepatis sede prodiit, ad dextrum dorsilatus declinat, ac propaginem ex sinistro sui latere educit, quam ^g Adiposam sinistram appellant, quod ad adipem & exteriorem renis membranam, à peritonæo enatam excurrat, quemadmodum & ad glandulam reni incumbentem. Huic in ^h dextro latere respondet alia, quæ tamen raro admodum à trunco emanat, sed potius à superiore & media sede emulgentis, & quia eodem, quo sinistra, modo distribuitur, Adiposa dextra nuncupatur. Interdum tamen videas contrarium quoque evenire, & dextram ex trunco, sinistram ex emulgente prodire. Naturæ enim in Venis varios lusus est cernere, nec facile in cadaver incidas, quin aliquid circa illas novi, & ab aliis diverſi reperias.

Hinc progressa Cava, ubi ultra medium dorsii pervenit, circa primam lumborum vertebra, ⁱ secundum par venarum perquam insigne educit, quod recta ad Renes prope-
rat, in quorum substantiam totam exhauritur. Hinc & Renale vocatur ab insertionem; ab usu autem, Emulgens, quia quidquid serofi est in sanguine, per hoc par renes emulgere, & ad se trahere videntur. Amplissimum ergo est, sed breve tamen, nec æquale, nec è directo sui conjugis enatum. Breve, quia longitudo nulla requirebatur, quæ fere ob præ-
viam quandam præparationem à Natura valis concedi solet. Inæquale, quia sinistram dextra longiorem esse conveniebat, quod ab ea spermaticam educere necessarium erat. Exordium autem utriusque è directo sibi non respondet, ne altera alterius actione impediretur. Sinistra tamen dextra altior est, quia & ren lævus præ dextro altiore locum est nactus. Cæterum emulgentes rami simul atque ex trunco emergere, non subito ipsam renum cavitatem adeunt, sed in duos prius majores ramos dividuntur, arteriisque associati, sic concavam partem ingrediuntur, ac postea in minores dirempti, per substantiam renum universam disperguntur, tandem extremis fibellis in processus quosdam carneos (quos Mammillares vocant) terminantur. Venæ hæc non tantum ad deferendum renibus alimentum, sed etiam ad serofos humores deducendos conferunt, cum eos ad mammillares carneos processus deponentes, in fistulas ureterum percolant, unde in pelvi colligitur, sensimque ad Vesicam (ut dicitur, cum renum historiam aperiemus) destillat. Atque hic locus notandus est, in quo calculi renales generari consueverunt, cum non sit in vasis emulgentibus, Vena, inquam, aut Arteria: sed potius in cavitate ipsa renum, sive in pelvi, & tubulis illis ureterum. In his enim, si quando materia viscosa suscipitur, vel ob insignem calorem inibi exsiccat, vel propter frigiditatem in arenam aut calculum concrevit. Materia autem hæc non tantum crudus sanguis est, qui mucii instar in massa sanguinea nonnunquam abundare solet: sed sæpe etiam pituita illa excrementitia, quæ à capite per venas & arterias, tum in cavam, tum aortam, quandoque etiam in Ventriculum & Intestina descendit. Cujus rei signum manifestissimum esse videtur, quod

^g Propagines, quæ à Trunco ante divisionem enascuntur.
^h Adiposa.

ⁱ Emulgentes.

^j Loca in quibus calculi renum generantur.

quod qui calculosis affectionibus obnoxii sunt, destillationibus & Colicis doloribus creberrime affligantur. Hos cum nonnulli à flatibus oriri sibi persuadeant, me cottidiana experientia docuit, à pituita esse, quod eos, qui renum calculo laborant, Colon intestinum copia huius semper refertum habuisse observavi, eademque ablata, etiam calculi generationem cessasse. Quamobrem & Clysteres deterforios blandeque pituitam purgantes, non solum calculis præsentibus, sed & minitantis sui generationem, frequenter maxima cum agrorum utilitate injicio. Vitanda autem perpetuo sunt omnia, quæ calculos pellunt, dolore etiam non præsentem, cum quia pleraque hujusmodi calida sunt, tum quia materiam crudam copiose ad renes sunt propellendo. Hæc persequi propterea nobis visum est, ut anatomicum studium ad ipsum accommodemus Medicinæ usum, præsertim cum videamus hunc generationis calculi locum vulgo ignorari, quod celeberrimus Fernelius, quem maxima fere Medicorum pars sequitur, lib. vi Patholog. cap. xxi, censuerit, arenularum generationem in propria renum substantia fieri, hinc fluentis urinæ impetu rapi, & in cavum ferri, sicque per ureteres in vesicam urinam arenulis refertam prolabi. Quod si quis etiam querat, quæ causa sit, quam propter sinister ren magis, quam dexter calculo sit obnoxius, id ideo evenire statuentum est, quod Colon intestinum reni sinistro magis incumbat, in cujus cellulis cum pituita hæc, de qua diximus, scateat, vel per poros ipsius transfundat, & in renes trahitur, vel ob viciniam ejus, vehementer renes refrigerantur, cum sæpe experientia nos docuerit, materiam ejusmodi pituitosam revera actu frigidissimam esse in corpore, quod perceperunt satis ii, qui per alvum eam copiose excreverunt. ^a Tertium hinc sequitur *par*, ^a *Vena spermatica*, seu *Seminales* vocatæ, quod materiam pro conficiendo semine deferant. Hæc origine inter se variant. ^b Sinistra enim ab inferiore sede, & media emulgentis exoritur, & peritonæo, qua parte musculos in lumbis jacentes integit, eidem furculis aliquot communicatis, adhærens incedit, ac oblique descendit: at ubi pubis os attingit, ipsum superequitans, peritonæum ac foramina obliquorum & transversorum abdominis musculorum transit, cujus processibus suffulta, in gyros quosdam varicosos abit, qui ^c cum arteria spermatica per anastomoses junguntur, ac tandem in ^d testem sui lateris definit. ^e Dextra vero, non ex emulgente, sed ex ipso trunco, ejusque anteriore parte, paulo infra emulgentem enascitur, similemque postea progressum observat. Atque hoc quidem pacto *in maribus* se habent, in quibus tamen Naturæ lusus quamplurimos sæpius notare licebit: *in mulieribus* vero, eth eundem exortum habeant, & eundem usque ad os sacrum cum his progressum, non tamen peritonæo excidunt, neque ad pubis ossa pertingunt, sed priusquam ad testes perveniant, in duos finduntur ramos inæquales, quorum *minor* in uteri latera versus ipsius fundum disseminatur; *mater* arteriæ spermaticæ sociatus, & per anastomosin junctus, in sui lateris testem ingreditur. ^f Quartum tandem *par*, *Lumbares* sunt duæ, aut tres, quas vena cava à posteriore sui parte, qua corpora vertebrarum lumborum spectat producit, unde nec nisi Cavæ trunco elevato in conspectum se proferunt. Hæ per vertebrarum foramina, per quæ nervi exeunt, ingrediuntur, sicque spinali medullæ alimentum deducunt. Ab his duæ, lateri medullæ utrinque attensæ, versus cerebrum ascendunt, quibus postea duæ venæ à jugulari interna descendentes per anastomosin junguntur.

His propaginibus sic eductis, ubi fere sacrum os Cava attingit, circa quintam lumborum vertebram, arteriæ magnæ subternitur, ac in duos insignes ramos, ^g *Iliacos* vocatos discinditur, qui paululum progressi iterum finduntur in ^h duos inæqualis magnitudinis; ex quibus alter, interior; alter, exterior dicitur. Interior, gravior; exterior, amplior est, & major. *Antequam tamen sic dividantur*, alias duas spargunt propagines, quarum ⁱ *prima*, *Muscula superior* communiter dicitur, quæ transversim per lumborum & abdominis musculos disseminatur, unde *Musculam lumbalem* vocarem: ^k *altera*, *Sacra*, quod ossis sacri foraminibus superioribus, aliquot exiles venulas ad spinalem medullam, & os sacrum nutriendum porrigit.

Prodeunt autem ab utroque ramo plures venæ, antequam extra peritonæum ad crura vadat, & ab interiore quidem duæ. ^l *Prima*, ab externo latere exoritur, *Muscula media*, ^m dicta, quod in omnes musculos natum, eorundemque catem dispergatur. Alimentum enim deferat omnibus iis musculis, qui ossis ilium anteriorem partem, sive dorsum occupant,

Cur sinister ren
magis, quam
dexter calculo
obnoxius.

³
Spermatica.

⁴
Lumbares.

Dissectio Trun-
ci in duos ra-
mos Iliacos.

Propagines
ante divisi-
onem hanc
etiales.

Interiori Ili-
acæ propa-
gini, ante
exi-
um ex
peritonæo.
¹
Glutula.

^a, ², ³
Vide ⁶
¹⁴ V.
⁶, ³⁶

^c, ⁸, ¹⁴
^d, ^Y.
^e, ³

^f, ⁴

^g, ²
^h, ²

ⁱ, ⁵
^k, ⁶

^l, ⁷

occupant, quemadmodum & ipsi coxendicis articulo: ut propter hanc causam maxime advertenda sit ab iis, qui doloris coxendicis, five Ischiadis causam paulo curiosius considerare velint. hanc ego *Glutæam* ab insertione non male vocari posse censuerim, quod in glutæos musculos implanteretur. ^a *Athera*, ab interno latere prodit, & vena insignis est, *Hypogastrica dicta*, à sua in omnes fere hypogastrii partes distributione. Ab hac ramus emergit, *Hæmorrhoidalis externa* dictus, quod quotiescumque sanguine fæculentiore aut fervido salfove turget, hæmorrhoidas ani externas efficiat. Hic sacri ossis foraminibus furculos dispensat, sed majores ramos in recti intestini musculos, usque ad ani externam cutim largitur. Est & *alius ramus*, qui ab eadem hypogastrica oritur, quem *Cysicum* vocamus, & notatu tam in Viris, quam fœminis dignissimus est. In Viris quidem, quia in Vescicam absumitur: in Mulieribus vero, quia in his pinguedine suffultus, quibusdam furculis vescicam adit: sed frequentioribus uteri fundum, & evidentioribus Cervicem, per quas venas solas nonnulli Virginibus, quidam etiam Mulieribus menstruatim sanguineas purgationes fluere existimant. Sed enim menses, non modo per hosce ramos, sed & per eos, quos à ramo spermatico transmitti diximus, & qui fundum Vteri, non Cervicem petunt, effluunt. Nec enim per cervicem tantum five virginibus, five fœminis: sed per uteri imprimis cotyledones expurgari singulis mensibus sanguis menstruus consuevit. Id quod Patavii hic publice in Theatro, primo nostræ Professionis anno monstravimus in cadavere cujusdam fœminæ menstrui laborantis. Vidimus enim hypogastricos ramos & vasa spermatica, cum testibus sanguine refertos fuisse, ipsumque uterum crassiore sanguine apertis interna uteri parte venarum oculis, & manifeste patentibus, fudisse. Vidi tamen bis in aliis, ex venis cervicis tantum, non etiam ex utero prodiiisse: & in alia contra, ex solo utero fluxisse. Frequentissimum tamen est, ut ex utrisque purgentur, nec non nisi præter naturam ex alterutro, cum obstructions videantur fluxum impedire.

Cæterum quo tempore menses instant, uteri os hiare, aliquoties dum ulcera pudendi ac cervicis uterinæ curavimus, observatum à nobis est & visum. Vidi etiam tunc madore quodam fœtido relaxari hæc partes, & cervicem ampliorem multo, quam esse solebat alias, comparuisse. Quamobrem mirum nemini videatur, quod à nonnullis nostræ ætatis scriptoribus observatum est, tempore mensium usque adeo laxatas nonnullis fuisse has partes, ut sponæ, quantumvis Virgines revera essent, propterea in jus vocatæ, ac pro defloratis habitæ fuerint. Quare si contingat, ut noviter conjugium ingressi, de suarum virginitate dubitent, quod vulvam admodum laxam invenerint, considerare oportebit, num fortasse menses ea tempore insliterint. Tandem quod reliquum est trunci interioris, ad pubis os contendit, & ab externo Iliaco sobolem, quæ cum ipso unam venam effingit, asciscit, sicque peritonæum & ossis pubis foramen transiens, in crus spargitur, ac fere ultra fœmoris medium latere interno protenditur.

Ab exteriori ramo similiter venæ quædam prodeunt. Et primo quidem quæ ab elatione sede pronascitur, ^b *Epigastrica dicta*, quod epigastrii musculos, nempe Rectos abdominis vocatos accedat. Præcipuo enim sui ramo extra peritonæum progrediens, utrinque sub recto musculo recta ascendit, donec prope umbilicum pervenerit, ubi cum Mammariis venis descendentibus, per anastomosis conjungitur. Anastomosis autem hæc in maribus raro adesse solet: at in fœminis, eleganter conspicua est, unde & Galenus lib. de dissect. Venar. & Arter. cap. VIII, per hæc duo vasa maximum illum Vteri cum Mammis consensum fieri testatur. Consensum autem hunc pluribus aphorismis quinta sectione doctissimus Hippocrates explicuit. Aphorismo enim quinquagesimo: Mulieri, inquit, menses si cohibere velis, Cucurbitam quam maximam ad mammas appone. Trigesimo vero septimo: Mulieri Vterum gestanti, si mammæ repente graciles fiant, abortit. Et trigesimo octavo: Mulieri uterum gestanti, si altera mamma gracilis fiat, gemellos gestans, alterum abortit. Et si quidem dextera gracilis fiat, masculum: si sinistra, fœmellam. Sic utero laborante, pallidæ fiunt papillæ, & in uteri hydrope, eadem atolluntur. Est tamen consensus etiam non tantum ratione Venarum; sed & Nervorum à sexta conjugatione prodeuntium. Vnde si mulieri aut virgini mammæ, imprimis papillæ tractentur manibus blande, libidinem accendi videmus, ut propter hanc quoque causam illæ fœminæ libidinosiores habeantur, quæ mammosæ sunt, quemadmodum

^{2.} Hypogastrica.

Hæmorrhoidalis externa.

Cysica vena

Fluxus mens-
struus per
quas vena
fiat.Exterioris Ili-
aci propages
ante epistomum
ex peritonæo
spargit.^{1.} Epigastrica.Consensus
uteri cum
mammis.

Pudenda.

Muscula inferior.

Afra apud Martialem. Eadem ratio est amoris, quem matres vel alumnae concipiunt ex infantium lactatione, qua quanto illis major voluptas & prurigo excitatur, tanto hos tenerius diligunt, & saepius naturae fontibus admovent. Notare autem, quoad originem hujus venae convenit, saepissime eam à Crurali ramo, jamjam describendo, exortum suum trahere, saepius tamen ab Iliaco. ^a Altera vena, Pudenda est, quae ab interna fede Iliaci externi jam peritonaeum egressi enascitur, & Pudenda dicitur, quod in pudenda utriusque sexus absumatur. In viris enim, in scrotum & penis cutem distribuitur: in foeminis autem, ad cutim & labra pudendi, ad nymphas, ceterasque partes; tum vero in utrisque in glandulas circa inguina jacentes propagatur, unde tempore pestiferi aut venerei bubonis materiae in glandulas confluxio oritur. Tandem ^b muscula inferior est, quae ad coxendicis articulum abit, & in musculos ac cutim eo loci sitos diffeminatur, quo nomine, meo judicio, appellatione strictiore melius *Coxendicis* vel *Coxalis* diceretur.

CAPUT IX.

Iliaci rami exterioris per crus diffeminati propagines, & ramos, enumerat.



Cruris venae, muscula inferior, & pudenda.

Quatuor propagines Trunci cruralis ante divisionem.
1.
Saphæna.Sunt autem propagines quatuor.
1.
2.
3.
4.Isthia.
Muscula.

Poplitea.

EXTERIOR ergo ^a Iliacorum ramus, ubi dictas propagines emisit, è peritonæo excidit, & ad inguina fertur, per elatiorem & interiorem ossis coxendicis regionem, per quam primus & secundus femur flexentium musculi descendunt, atque ^d venam CRURALEM constituit. ^{d, v.} Hujus historiam ut facili methodo tradamus, in Truncum illam & Ramos dividemus.

TRUNCVS autem, antequam findatur in ramos, quatuor expandit propagines, ex quibus *prima* illa est, quam ^c Saphenam, & venam Malleoli interni appellant, propterea quod juxta hanc excurrat. dicitur & communiter à Medicis vena tali, sed improprie, ut monuimus superius libro primo. Oritur autem statim post egressum ex peritonæo, ab interiore latere Trunci, quae arteria comite carens per femoris & tibiae interiorem sedem expanditur, ubi ramum per transversum spargit, à quo postea alii complures oriuntur, qui ordine ad singulos digitos distribuuntur. Ab hac aliae propagines sparguntur in itinere, quae tamen raro invicem numero aut magnitudine correspondere reperiuntur, quemadmodum Naturae lusum in venis, cumprimis autem Artuum saepius animadverti, jam aliquoties monuimus. Inter has ^f prima non procul ab ipsius venae exortu, in superiorem cutem internae femoris regionis duplici ramo spargitur; quorum *exterior*, qui crassior est, anteriorem externamque femoris partem sub cute perrepat: *interior* vero, interiora petit, & in peritonaeum spargitur. ^g *Secunda*, cum jam ad medium femoris pervenit, propagatur. ^h *Tertia*, circa genu oritur, duasque producit soboles; *unam*, quae in anterioris genu sedis cutem, secundum patellam diffeminatur; *altera* vero, spargitur in ejusdem posterioris cutim, ubi flexura est, seu poples, cui etiam orbiculatim circumvolvitur. ⁱ *Quarta*, ad Tibiae medium, antorsum & retrorsum ducitur. E regione saphenae ^k alia vena, ab exteriori fede Trunci educitur; at brevior, quam ipsa saphæna est, & extrorsum ac transversim in cutim ossis coxendicis anteriori regioni obductam, tum in musculos ejusdem loci porrigitur, quam Recentiores *Isthiam* vocant. Productis his propaginibus Truncus postea in musculos femoris os amplexantes reconditur, ac ^l tertiam digerit propaginem, quam *Musculam* appellant, & gemina esse consuevit. *Exterior* enim, quae minor est, tibiam extendentium musculus secundo & quarto, simul & cuti soboles offert; *interior*, & amplior, tibiam extendentium tertio, & fere omnibus femur circumstantibus musculis furculos largitur. Hinc truncus ad posteriora se flectens, sensumque descendens, alios quosdam in membranas musculorum dispergit, & mox quartam venam educit, quae in femoris posteriora excurrit, & ^m *Poplitea* dicitur, celebris apud Medicinæ scriptores, maxime vero eorum Principem Hippocratem, qui vi Epidem. sect. i. text. v. ipsius apertionem in renum doloribus admodum commendavit. Quia tamen non raro profundius sita est, quam ut sine

ut sine insigni difficultate secari possit, fonticulos in fura, ad quam ipsa spargitur, in-
 uastos plurimum adjumenti in pluribus morbis attulisse frequenti experientia edoctus
 sum. Huic venæ, ubi propagata est, à musculæ interiore ramo soboles nonnunquam
 accedit; *sæpe etiam* duæ à trunco statim prodeunt propagines; quarum *altera*, elatior
 est; *altera*, humilior; quæ deinde in progressu uniuntur. Spargit autem statim ab ex-
 ortu ramos quosdam in cutem fæmoris, circa elatiorem & posteriorem ipsius partem:
 deinde recta per medium poplitem, sive flexuram tibie in suram descendit, cui pluri-
 mos furculos incerto ductu, cum alii recta, alii transversim, nonnulli oblique progrè-
 diantur, distribuit. His sic disseminatis ramulis, ad talum usque progreditur, ibique
 tandem terminatur.

Atque hic est progressus Trunci cruralis, & hæ, quas spargit antequam dividatur,
 propagines. Fæmoris enim ossi accumbens sic descendit, ac juxta ipsum obliquatur,
 ut, ubi genu attingit, inter duo fæmoris infima & posteriora capita feratur, ^a quo loci
 in ^b duos ramos, interiorem & exteriorem bifariam scinditur. Sunt autem inæqualis
 amplitudinis, cum exterior tenuior sit, interior major: uterque tamen per tibiam &
 infimum pedem dispergitur. ^c Interior, descendens aliquot propagines in musculos, qui
 in duos statim scinditur ramos minores, similiter inæquales; quorum ^d interior, qui ma-
 jor est & in profundo latitat, in suræ musculos totus exhauritur, recta inter duo capita
 gasterocnemii externi, sive primi pedem moventis, tum inter gasterocnemium inter-
 num, & tibie anticum, ac tandem inter digitorum flexores, secundum longitudi-
 nem excurrens, & in itinere musculis, per quos transit, ubique furculos quosdam
 distribuens. Hic ubi ad medium longitudinis Tibie pervenit, in *interiorem & exteriorem*
iterum subdividitur. Horum interior, furculum juxta tibie & tali articulum distribuit, cum
 musculorum tendinibus descendit, & in pollicem, indicem, ac medium distribuitur.
 Exterior, juxta fibulam progreditur, ac ubi ad ligamentum pervenit, quod tibie os
 fibulamque colligat, ramum educit, qui ligamentum perforans, in pedem excurrit,
 dispersus in musculos, qui pedis digitos extrorsum reflectunt.

^e Exterior, & minor ramus, exterioris rami ex divisione illa, qua juxta poplitem sit, ad ela-
 tiorem fibule appendicem abit, tum ad externam & posteriorem tibie partem, ubi
 plurimos spargens ramulos, ad externum malleolum proficiscitur, tandemque in pede
 finitur.

Atque hæc est historia universa venarum Portæ & Cavæ, in qua distributionis se-
 riem omnem absolvimus. Restare videtur, ut de Umbilicali quoque, & Vena arteriosa
 verba faciamus. Sed quia Umbilicalis nihil aliud est, quam propago quædam insignior
 à Vena Portæ emergens, & per umbilicum excurrens; tum vero in adulto homine li-
 gamenti potius, quam Venæ vicem obeat, quod hepar in suo situ contineat, ut testan-
 tur historiae eorum, qui absisso umbilico aut vulnerato, subito interiire, impedita re-
 spiratione ob hepatis pondus decidentis è suo loco, & secum diaphragma detrahentis,
 operæpretium non duximus quidquam de ea pluribus hic agere. Quod si quis obstina-
 te peculiarem venam esse rationibus ex cerebro suo natis, velit contendere, illi non me-
 lius consulere novimus, quam ut sensum accuratius consolat; aut, si amplius contendere
 velit, caput helleboro purget, ut oculorum illa hebetudo nonnihil abstergatur. Cæte-
 rum de Vena arteriosa commodius sequenti libro, cum Arteriæ venosæ historiam expli-
 cabimus, quod magna inter utramque similitudo sit, & propterea eadem opera utra-
 que tradenda, verba faciemus.

Divisio Trunci
 in duas ra-
 mos.

Interior.

Exterior.

Conclusio hi-
 storia Venæ
 rum,
 Umbilicalis
 vena.

Vena arte-
 riola.

Sanguinis definitio proponitur, & declaratur.

Ratio traſit-

Anatomia
quid sit.

Ordo.

VM de Venis hætenus egerimus, quas sanguinis, tanquam ultimi alimenti, receptacula esse diximus, reliquum esse videtur, ut quædam de sanguine breviter subijciamus. Neque veremur hic, ut forte nobis Aristarchus quispiam propterea dicam scribat, quod methodi leges violemus, ad historiam humani corporis, partes quas vocant contentas revocando, quia scilicet plurimorum animis alte infederit, Anatomiam non nisi continentium tantum partium contemplationem sibi vindicare. At enim pertinent ad Anatomiam omnia, quæcunque in corpore nostro sub oculis cadunt, sive partes sint solidæ, sive fluidæ, ab aliis comprehensæ; cum Anatomia perfecta, sit totius corporis, omniumque partium, ex artificiosa sectione acquisita cognitio. Caterum cum brevitatis studium in omnibus nobis propositum sit, ea huc duntaxat, quæ maxime necessaria & scitu dignissima in hoc argumento videntur, in medium adducemus. Primum ergo quid sit sanguis; deinde, quæ animalia sanguine prædita sint, quæ eodem careant, dicturi sumus; tam cur alia sanguine, alia ichore nutriantur investigabimus: inde videbimus, sanguis homogeneus sit, uniusque naturæ, an ex diversis constet partibus; & ubi demonstraverimus, ex pluribus constat esse, rationem hujus compositionis proponemus, partesque omnes & earum causas venabimur, tandem differentias trademus.

SANGVIS ergo, qui & sanguen olim, genere neutro (unde Lucretius, *Visceribus viscus gigni, sanguenque creari*)

Sanguinis syn-

Homonymia.

Græcis aqua dicitur; & synonymia, quod ego quidem norim, omnino caret. Ex septem enim linguis, quas calleo, nulla est, quæ sanguinis synonymum habeat. Quæ certe res mihi perquam mira sæpe accidit, cum fere ea omnia, quæ familiaria nobis esse consueverunt, pluribus appellationibus nobilitari soleant. Contra, homonymia in omnibus invenitur linguis, & apud Græcos Latinosque rei Medicæ scriptores celebratissima est. Primo enim, sanguinis voce integra illa humorum massa, quæ in Venis & Arteriis levibus continetur, intelligitur: In qua significatione vulgo sumitur, cum dicimus sanguinem mittere, elicere, purgare, dejicere, mingere, & similia. Sic Poëta quoque sumpsit, dum canit,

*Sævus amor docuit natorum sanguine matrem
Commaculare manus.*

Alterâ significatione minus communis est, & quæ locum habet tantum apud eruditiores, cum pro certo & determinato humore accipitur, unoque ex illis multis, qui in venis continentur, nempe pro eo, qui omnium maxime rubicundus est, purus, dulcis, calidus, & humidus. Sic apud Galenum sæpe sumitur, hodieque apud eos, qui ossa non sanguine, sed melancholia nutrirî dicunt. Sunt & aliæ acceptiones, quas libens prætereo; ut cum, Poëtæ præsertim, pro genere accipiunt, sive familia; ita Virgilius

*— hortamur fari, quo sanguine cretus,
Quidve ferat, memoret: quæ sit fiducia capto.*

Item pro vi ac vigore, ut M. Tullius succum ac sanguinem Reipubl. vocat, quem alii præstantiam ac nobilitatem vocarent. Nos vero in prima hic significatione sumimus, & sic definimus;

Definitio.

SANGVIS, est humor rubicundus, aspectu homogeneus, ex cibo potuque, viscerum & vasorum ope elaboratus, per Venas & Arterias animalium sanguineorum pro alimento ultimo vitæque ad omnes partes fluens. Definitionem hanc, quia universam sanguinis naturam nobis breviter aperit, diligenter nostro more explicabimus. Primum ergo humorem esse dicimus, ut genus assignemus, simulque distinguamus ab omnibus aliis partibus corporis, quæ Contentæ dicuntur, aut Impetum facientes: tum vero etiam à sanguine concreto, qui sanguis amplius dicendus non est, sed & potius & grumus. Addimus autem humorem esse rubicundum, quæ vox illum à cæteris omnibus humoribus & contentis nostri corporis partibus

partibus separat, cum rubicundi non sint: tum à sanguine etiam non perfecte sano, qui omnis generis colores fuscipere valet. Vt autem & ab illo sanguine distinguamus, qui quarta pars est massæ in venis arteriisque contentæ, & cui tum humorem, tum rubicundum esse competit, subicitur sanguinem, quem definimus, *aspectu esse homogeneum*. Revera enim, ut demonstrabimus postea, homogeneus non est, sed ex pluribus diversis partibus conficitur: at alter ille, & aspectu judicatur, & revera quoque est homogeneus. Quia autem sanguis humor est, ut terminetur, receptaculo indiget: Subiectum, si-
ve locus. receptaculum autem hoc, duplex nobis statuitur, dum *per Venas, & Arterias* fluere indicamus. In nullo enim sanguineo, sanguis extra vasa continetur, nisi in Corde solo, teste Aristotele, *111 Hist. de anim. cap. 11: & 1 de part. animal. cap. viii.* Competit autem sanguis animalibus tantum, nec tamen omnibus, sed iis duntaxat, quæ *sanguinea* dicuntur. Animalia enim pro duplici nutrimento gemina sunt; quædam scilicet, quæ sanguine nutriuntur, & *ex aqua* dicuntur ab Aristotele, à Latinis Sanguinea: nonnulla, quæ ichore aluntur, *ex aqua* vocata, & Exsanguia. Animalia di-
plura sunt.

Generatur autem sanguis ex cibo potuque, & quidem ope *tum viscerum*, scilicet Ventriculi, *tum vasorum*, puta Venarum, quæ illum ex chylo in Hepate præcipue, & Liene elaborant. Nec vero frustra generatur, sed *ut sit alimentum*; nec quodvis, sed *ultimum*. Triplex enim est alimentum, ut docet Hippocrates lib. de Alim. Et id quod hoc nutrit, & quod velut nutrimentum est, & quod nutrimentum futurum est. Sanguis ergo est alimentum, quod hoc nutrit. Quamobrem quoties cibus non ingeritur, sanguis deficit; quoties ingeritur, augetur: tum si alimenta bona assumentur, sanguis integer est; si prava; vitiosus, ut loquitur Aristoteles *11 de part. animal. cap. 111.* Est autem *alimentum omnium partium totius corporis*, quæ verba propter eos tenenda sunt, qui negant Ossa, Cerebrum, Vngues, & Pilos sanguine nutriri. Et quo ad *Ossa* quidem, quod Galenus demonstrasse videatur, ossa aut medulla, ut magna; aut medullari humore, ut parva, nutriri. Quoad *Cerebrum*, quod Vesalius ostenderit, Venas in ipso nullas reperiri. Quoad *Vngues & Pilos*, quia in mortuis crescere sint visi, ut testis est Aristoteles; cum tamen in mortuis nutritio, quæ per sanguinem fit, cesset. Galeno, & qui ei adherent, satisfacimus opinor superius libro secundo, cum de hac re ex professo egimus: *Vesalius*, experientia & inspectio anatomica contradicit: Reliquis, qui ungues & pilos nutriri negant, nunc satisfaciamus. Non sequitur, ungues & pili post mortem augentur, non igitur nutriuntur sanguine, cum nulla pars sit, quæ post obitum augeatur. Hæ enim partes non ita perfectæ sunt, ut reliquæ, unde neque ita perfecta nutritione aluntur, sed vivunt in nobis more plantarum, quæ abscissæ etiam à suo trunco, aliquamdiu nutriri solent. Sic ergo & in mortuis exerescere possunt, cum eorum attractrix facultas, quippe in solidiori materia consistens, non ita facile post obitum evanescat. Si quis dicat, ungues & pilos partes non esse, & propterea non nutriri, partes autem non esse, quod ablata regenerentur; illi opponimus dentes, qui excidentes, eadem, qua ante erant, forma renascuntur, non secus ac ungues: imo, quod mireris forte magis, alveolum novum (cum unâ cum dente suo alveolus perpetuo pereat) recondunt. Cum ergo dentes regenerentur, nemo tamen propterea nostri corporis partes esse unquam negavit. Quamobrem jam concludimus, sanguinem partium, quotquot sunt in corpore, omnium alimentum esse ultimum: quin nec alimentum aliud, quod quidem ultimum sit, præter sanguinem reperiri. Quod si *semen* à quibusdam spermaticis partibus assignatur; *bills*, felleæ vesiculæ; *Chylus*, ventriculo; eos aut ignaros esse dissectionum oportet, qui venas has per partes digestas, sanguine plenas non viderint, aut Naturæ institutum, quæ ubivis (summæ id sapientiæ clarissimum signum) eandem rationem consiliumque sequitur, non capiunt. Et quæ ista esset tam insignis providentia, partes nutrire sanguine, ut certe hæc omnes nutriuntur, alimento in pluribus organis tam anxie elaborato: deinde & semine, quod ipsis transmitti non potest; & bile, excremento sævo; & chylo, alimento adhuc crudo? Additur deinde, & *Vita*: non enim alimentum tantum est, sed & vitam partibus largitur. Vita hæc spiritibus donatur, qui in sanguine sunt, estque illa facultas partium, nutriendi se sanguine, & (dum licet ætatis ratione) augendi. Quanquam autem imprimis hæc vox Arteriarum gratia adjecta sit, ut antea alimenti vox, causa Venarum: non tamen ille usus sic Venoso

Materia san-
guinis.
Efficiens.
Finis.

Refutatur
qui ungues &
pilos mortuis
negant.

Observatio.

sanguini debet tribui, ut Arterioso prorsus dematur: nec hic ita Arterioso arrogari, ut venali nullatenus competere credatur. Nutrit enim venosus sanguis; sed & vitam tribuit. Vitam largitur arteriosus; sed & nutrit. Sic tamen ille alimentum copiose suggerit, ut solus nutrire: sic iste vitam infundit, ut solus vita donare videatur. Hinc Vena absclissa, tabescit fere pars, relicta arteria: Arteria dissecta, pæne emoritur, illa est utunque vena: si tamen parva pars sit, tueri se alterutrus vi potest.

Definitio ergo hæc vera est; sed & perfecta, cum omnes sanguinis causas contineat. *Formam* enim exprimit, dum dicimus humorem esse rubicundum, aspectu homogeneum: *Subiectum*, dum dicimus animalibus competere sanguineis: contineri autem his, in Venis & Arteriis, tanquam in proprio conceptaculo & loco. *Materia remota*, cibus & porus est; *propinquior*, chylus. *Efficiens*, calor tum viscerum, tum Venarum, partim innatus, partim influens. *Finis*, alimentum & vita omnium partium.

C A P V T X I.

Animalium quedam sanguinea, quedam exsanguia esse, & quamobrem.



DIXIMVS animalia quædam sanguine nutrirî, quædam ichore; illaque sanguinea, hæc exsanguia vocari. Hac occasione moniti, in præsentiarum duo investigabimus; primum, quæ sint illa animalia; deinde, quamobrem sic diverso nutrimento alantur. *Sanguinea* ergo animalia, aut pedes habent, aut pedibus carent. *Quæ pedes habent*, vel bipeda sunt, ut homo, avis; vel quadrupeda, ut bos, asinus, canis, simia. *Pedibus carent*, serpentes, pisces, cetæ, & id genus. *Exsanguium* alia *insecta* sive *insecta* sunt, quæ incisuras parte sui vel prona, vel supina habent, aut etiam utraque, ut musca, vespa, papilio, scorpio: alia *malacia*, sive *mollia*, quæ sanguine carent, & foris molli carne obducta, intus solida continent, more sanguineorum animalium, ut sepia, polypus, loligo: alia *ερεσινδεγμα*, id est, *rescata*, quibus pars mollis & carnea intus, solida foris est, fragilis ac ruptilis, ut omne genus concharum; alia denique *μαλακότερεα*, hoc est, crustata, quæ carnosam & mollem partem intus, foris solidam, sed collisilem habent, ut astaci, squillæ, & omne cancrorum genus. Hæc ergo omnia ichore nutriuntur, qui per carnes eorum partim ope canalium fertur, partim (ut in plerisque) per inconspicuos meatus transmeat, non secus atque panni particula extrema madefacta, aqua per reliquum pannum paulatim penetrat.

Cur alia animalia sanguine alia ichore nutriantur.

De his jam quæritur, cur diverso alimento nutriantur? Cui quæstioni duo habeo, quæ reponam. Primo, animalia duplicis esse generis, quædam perfectiora, nonnulla imperfecta. *Imperfecta* voco, non quæ simpliciter talia sunt, sed quæ pauciora organa respectu aliorum habent, cum nihil sit à sapientissimo rerum Opifice conditum, quin in suo genere summum perfectionis gradum attigerit. Perfectiora e contra, quæ plura habent organa, pluresque obeunt actiones, ac quadam quasi majori sapientia instructa sunt. Hæc ergo cum instrumento sapientiæ indigerint, sanguinem necessario, quod id ipsum sit, requirebant. Patet hoc ex pulcherrimo Hippocratis loco, qui libro de flatibus continetur, ubi eleganter, Opinor, inquit, inter omnia quæ in corpore sunt, nihil magis ad prudentiam conferre, quam sanguinem. Sed elegantius adhuc probat. Nam cum in constanti, sic pergit, habitu persistit, consistit etiam prudentia: sanguine vero permutato, concidit & prudentia. Huic consentit doctissimus Aristoteles, qui 11 de part. animal. cap. 11, ex sanguinis differentiis iudicium de sapientia colligit. Est certe, inquit, roboris efficacior sanguis, qui crassior & calidior est: vim autem sentiendi intelligendique obtinet plenior, qui tenuior, frigidiorque est. Lib. autem 11 de Partib. cap. 14: Naturam sanguinis causam esse, cur permulta animalibus accidunt, tum per mores, tum etiam per sensum, quod sanguis materia sit totius corporis. Porro sanguinea omnia sapientiora esse longe exsanguibus, inductione facta per singula genera declarari sine negotio posset, cum sensibus aut omnibus, aut certe quampluribus sint prædita, ut taceam interim curam, quam de victu, generatione, & futuris adhibent. Potest & alia ratio assignari, nempe quibusdam in frigidiore aëre degendum fuisse, ut sanguineis, unde calore indigebant: quibusdam in calido tantum, & propterea hyberno tempore in cavernis, ut exsanguibus. Cæterum cum & inter

inter sanguinea nonnulla sint, quæ sese in latibulis abscondant frigidioribus temporibus, quemadmodum serpentes & lacertæ faciunt, considerandum est, magnam inter sanguinea latitudinem, & alia aliis calidiora esse, frigidioraque: & propterea quæ parvo calore prædita sunt, jam ad exsanguium naturam accedere. Sunt autem serpentes & lacertæ, inter sanguinea maxime frigida: ex quo contingit, ut quo magis ad septentrionem accedas, tanto pauciores invenias, cum in calidioribus locis commodius vivant.

CAPUT XII.

Sanguinem heterogeneum esse probatur; inde quibus ex partibus constet, & quæ harum causæ sint, investigatur.

SANGVINEM qui in venis coercetur, aspectu quidem homogeneousse, & unius naturæ, in definitione diximus: at si quis tamen vasculo exceptum concretumque inspiciat, non secus ac ipsum lac diversis constare partibus animadvertet. Sed & quemadmodum lac ex butyro constat, quod supernatat; & caseo, quod in imo subsidet; ac fero tandem, inter utrumque medio loco positum: sic sanguis è venis extractus, si alibi in vase servetur, in serum, & fibrosam massam concrevit. Sanguis ergo homogeneous non est & uniformis, sed ex diversis constat partibus. Caterum qui Medicinam nobis hæcenus illustrare conati sunt, alias adhuc partes in sanguine ponunt, & minutius ista inquirunt. Cum fero enim, inquirunt, bilem flavam aut atram permisceri: cum fibræ vero, sanguinem stricte acceptum, pituitam, & melancholiam. Et ut confusa sunt, si mediocriter se habeant, ita si copiosior sit pituita, eam supernatare; si sanguis, in medio consistere; si melancholia, in fundo hære: ut adeo quinque sint humorum genera, quæ in sanguinea illa venarum massa continentur, serum scilicet, bilis, sanguis, pituita, & melancholia. In hanc sententiam inducti sunt potissimum, quod videntes diversas esse nostri corporis partes, quamlibet earum sibi simile alimentum exposcere crediderunt. Partes enim aliæ, calidæ sunt & siccæ; aliæ, frigidæ & humidæ: nonnullæ, calidæ & humidæ: quedam etiam, frigidæ & siccæ. Ex primis partibus, est Vesicula felle; ex secundis, Cerebrum, & Ventriculus; ex tertiis, Carnes, Musculi, Cor, Iecur, & Parenchymata vocata; ex quartis, Ossæ, Cartilagines, & Ligamenta. Primas ergo pro nutrimento, Bilem; Secundas, Pituitam; tertiis, Sanguinem stricte acceptum; quartas denique, Melancholiam requirere. Alterum est quod eisdem delusit, cum in ægrorum sanguine, dum Venas aperuerunt, diversitatem ejusmodi partium plurium animadverterent, quare & rationi (jam adductæ) & experientiæ omnino fidendum esse sunt arbitrati. At ego ut omnes partes sanguine proprie dicto nutriri existimo; ita in hominibus perfecte sanis diversitatem ejusmodi dari, omnino pernego. Nec enim ita necessaria fuit, ut ipsi quidem sibi persuadent, tot humorum in sanguine congeries, ut unaquæque pars suo temperamento conveniens inveniatur alimentum. Sanguis enim ab Omnipotente illo Opifice sic temperatus est, ut unicuique parti in legitimum nutrimentum facile concedat. Nec difficile est hoc ostendere ad oculum, si Plantas inspicias; quæ cum diversis partibus constent, uno alimento reficiuntur. Nec vero partes unius tantum plantæ, sed & complures, naturam inter se diversissimam habentes, una eademque pluviali aqua nutriuntur, & sæpe herba venenata pulcherrimo & suaveolenti lilio adstat, utroque luxuriante, etsi uno rore, eademque pluvia irrigentur. Quod si hanc diversitatem, in venæ inveniunt sectionibus, id huc nequiquam trahendum est, cum ab illo perfecto sanitatis limite ii declinent, & jam vitiosi humores superent, ac massa sanguinea penitus sit turbata. Caterum nos in præsentia, non de morbofo, sed quam sanissimo sanguine, ejusque natura verba instituimus. Non ergo nutriuntur partes diversæ, diversis tota substantia humoribus, quia id opus non est: nec ita diversi humores reperiuntur. Illud tamen verum est, sanguinem diversum reperiiri, pro varietate partium quæ nutriuntur. Vena enim Portæ dicta, ut supra monuimus, sanguinem facultentiorē vehit, quam Cava; quod partes nutritioni destinatas alat: sanguis etiam qui pulmones nutrit, longe spirituosior est ac purior, eo qui in Cava coercetur. Nulla tamen

Partes sanguinis.

Ex opinione aliorum.

Quomodo de his sint hæc aut. cret.

1.

Sententia Aulicæ. Respondetur ad argum. primum.

Ad secundum

Conclusio.

Causa partii
sanguinis di-
versitatis
Materia san-
guinis.

tamen hic est differentia essentialis, neque etiam confusus cum aliis fuit. Ex his jam concluditur, sanguinem dupliciter considerari posse, tum in homine perfecte sano, & qui intra Naturæ limites continetur, tum qui à perfecta illa & consummata valetudine ad minus prosperam declinat. Sani ergo hominis sanguis, tribus tantum partibus constat, sero scilicet aqueo, rubro liquore, & fibris sanguineis. At eorum, qui minus sani sunt, diversis, pro exsuperante uno, aut pluribus humoribus, bile, pituita, melancholia, vel sero. Quia tamen plurimum refert nosse, quæ causa hujus diversitatis tam materialis, quam efficiens sit, de utraque nunc breviter quædam subjiciemus. Sanguinem ergo ex cibo & potu tanquam remotiore materia; ex chylo autem, ut propinquiore, fieri, iidem Medici concedunt. Hunc enim in Ventriculo confectum ad Hepar trahi per mesaraicas venas, ibique in sanguinem mutari docent, qui ex diversis constat partibus, & heterogeneus est, quod in chylo totidem partes contineantur, bilis nempe, pituita, serum, melancholia, & sanguis. In qua sane sententia omnium bonorum auctorem Hippocratem sequi videntur, qui lib. iv de morbis; *In omnibus, ait, cibis & potibus, & biliosus quid est, & aquosus, & sanguineus, & pituitosus; in alio plus, in alio minus. Quapropter & quæ eduntur, & quæ bibuntur, alia aliis præstant ad sanitatem.* Quæ quidem Hippocratis sententia non ita intelligenda est, ac si in ipsis alimentis humores hi præexistant, ex quibus postea in venas trahantur; sed quod alimenta in hosce mutantur, cum quibus idem temperamentum obtinent, si calor noster accedat, qui causa est efficiens, separans has partes, ac distinguens, sive calorem hunc postea in Venis, sive in Iecore consistere dicamus. Pars ergo chyli tenuior & calidior, in bilem abit; crudior & frigidior, in pituitam; frigidior & siccior, in melancholiam; temperata vero, in sanguinem facessit. Ex hoc fit, ut alimenta quæ temperata quidem sunt, sanguinis plurimum generent: calida & sicca, multum bilis: frigida & humida, plurimum pituitæ: sicca autem & frigida, copiam melancholias: humidus tandem victus, & plurimus potus, plurimum feri generet. Cæterum ut alimenti ratione, humores varii generantur, etsi calor unus idemque sit, & naturaliter se habeat: ita calore declinante ad statum, qui præter naturam est, tametsi alimenta sint optimi succi & uniformia, humores nihilominus diversi procreantur. Si enim fervens sit calor, alimentum quantumvis temperatum non in sanguinem, sed potius plurimam bilem vertetur: at si deficiat, contra in pituitam abibit. E diverso, si calidi temperamenti sit cibus, à calido hepate aut venis, in bilem prorsus absumetur; à frigido autem, in laudabilem sanguinem redigetur. Probari hoc potest quam optime exemplo mellis, quod cum facile in bilem vertatur à moderato calore, faciliusque ab immodico, tum vero in frigido corpore in sanguinem potius mutatur. Quamobrem & senibus pro sanguine suppeditando alimentum est aptissimum, juvenibus autem pro bile: & si quis præcalidum jecur habenti carnes etiam boni succi dederit, animadvertet facile in bilem traduci. Ex quo constat, ut quis de alimentorum sano usu sanum deferat judicium, illi omnino necessarium esse, ut alimenti temperiem, cum moderato calore conferat & componat. Alimenta enim imtemperata, in temperatis naturis prava sunt: in imtemperatis ejusdem ordinis, pessima: at contrarii, optima & salubria.

Nota.

CAP V T XIII.

Differentias sanguinis persequitur.

Differentie
san. iust.
A copia.

DIFFERENTIÆ sanguinis à variis desumuntur; à copia, qualitate, consistentia, loco, & iis quæ sanguini permiscuntur. Et ratione copię quidem, non modo animalia diversa inter se plurimum differunt, cum quædam minimum fere habeant, ut serpentes; quædam plus, ut laceratæ; nonnulla multum, ut pennata ac quadrupeda: sed & Homines ipsi, qui inter omnia animalia maxime abundant sanguine, ratione ætatis, regionis, sexus, temperamenti, & temporum anni, mirifice invicem discrepant. Pueri enim fere sanguinem copiosum habent, qui deficere videtur senioribus; pluresque illis est, qui calidas & humidas regiones incolunt, quam qui frigidas siccasque; itemque mulieribus, quam viris, quod non se tantum, sed & (cum utero gerunt) fœtum alere debeant. Temperamentum calidum vel humidum, vel ex utroque compositum feracissi-

feracissimum est sanguinis: frigidum contra & siccum, sterile. Ex illo Plethora nascitur, morbus in quo supra vires sanguinis copia in venis congeritur; quemadmodum in Athletis olim fieri solebat, quibus eam, cum ad summum pervenisset, nec posset proficere amplius in melius, in deterius mox ruituram haud cunctanter solvere, sectâ venâ, Hippocrates monuit Aphor. 111 lib. 1. Sic Vere turgent humores, & copiosissimi sunt, Ætate pauciores.

Ratione qualitatis quoque diversitas sanguinis observatur. Sic sanguis alius calidior est, frigidior, humidior, aut siccior. Et hæc differentia similiter secundum ætates, sexum, regiones, temperamentum, & anni tempora maxime observatur. Calidior est & humidior sanguis puero, quam seni; & juveni calidior, quam puero. Vir calidiorem & sicciorē habet muliere. Æthiopibus, & qui Africam Asiamque, aut cæteras orientales, & meridiem spectantes regiones incolunt, calidior est multo, quam Europæis, aut iis qui occidentem vel septentrionem inhabitant. Iam in temperamento diversitatem esse tam clarum est, ut calidi, aut frigidi dicantur non alia de causa, quam quia calido aut frigido sanguine sint præditi. Ætate etiam sanguis plus fervet, quam Vere, Autumno, aut Hyeme. Ad qualitatem videtur pertinere etiam color, in quo differentia insignis advertitur: alius enim alio est rubicundior, aut flavior, aut nigrior.

Est & sanguis alius alio crassior, ex quo superior pars corporis cum inferiore diffidet, & foemina cum mare, & dextra pars cum sinistra ejusdem corporis, uti docet Aristoteles, 11 de Part. animal. cap. 11. Alius sanguis nullo pacto concrescit, ut damarum, & cervorum: alius facile, ut taurinus; unde fit, ut epotus venenorum instar hominem enecat, intercepta voce, dolente stomacho, & retenta urina; cum alii tamen sanguines, ut hirci, capri, cervi, & leporis in antidotorum numerum à Dioscoride referantur, lib. 11, cap. xcvi. Non enim revera venenum est, sed concretionē enecat, quod tum ipsa curatio evincit, quæ per ea expeditur, quæ sanguinem dissolvendi vires habent; tum quia coctus, à pauperulis in Italia citra noxam comeditur. Cæterum hujusmodi differentia & inter homines maxime advertitur, observatum autem à me id præcipue est, eos qui rara & molli cute sunt præditi, ut plurimum sanguinem habere non facile concrescibilem: contra, qui densa & dura pelle constant, iis subito in grumos cogi. Illos timidos, sed prudentes esse notavit jam olim Aristoteles, loco citato. Omnibus tamen hominibus concrescit, & si quando in pestilenti febre emissus per Venæ sectionem haud coëat, quemadmodum & nos sæpe vidimus, insignem semper putredinem denotavit.

Est & diversitas sanguinis penes vasa, in quibus continetur. In venis enim proprie dictis, attrior est sanguis, crassior, ac terrestrior, copiosoque sero præditus; in arteriis autem, rubicundior est, pulchrior, & pauciore sero resperfus; ita ut qui per arterias diffunditur, vere sanguis; contra qui per venas, sæx potius sanguinis dici mereatur. Nec tamen uniformis est omnis Venarum sanguis, sed fæculentior, crassior, nigerque magis in venæ Portæ propaginibus observatur, quam qui in Cava est: rursusque qui in hujus est propaginibus, crassior est eo qui in trunco, & majoribus ramis conspicitur, adeo, ut qui continetur in capillaribus venulis, maxime omnium rubedine clara efflorescat. Et hinc causam colligere licet, quæ multos sane latet Medicos, cur scilicet per cucurbitulas, & hirudines rubicundior sanguis, quam per Venæ brachii sectionem evacuetur. Est & notabilior rubedo in eo sanguine, qui cordis & pulmonum substantiam, musculorum item carnem, quam alias partes nutrit.

Tandem differentia ab iis deductæ, quæ sanguini permiscetur, maxime observandæ sunt. Interdum enim sanguinea massa pura est, ut in iis qui perfecta sanitate fruuntur: interdum permixtos habet diversos humores, & vel unum, vel plures; & vel intra Naturæ limites adhuc contentos, aut præter naturam se habentes; & hos vel putridos, vel putredine carentes. Sunt autem humores hi Bilis, Pituita, Melancholia.

Cæterum antequam huic libro extremam imponam manum, cum in dubium nostro seculo à doctissimis quoque Viris fuerit revocatum, possetne sanguis inclusus Venis putredine corripī, quod crediderint, quasunque res in suo loco salvas integrasque præstari, quid sæpenumero in tot dissectionibus, quæ à me administratæ fuerunt, observa-

obſervarim, in medium afferam. Vidi enim non tantum in mortuis, ſed ſæpe etiam dum in abſceſſibus curandis occuparer, ſanguinem illum qui in Venis eſt in merum candidumque pus abiſſe. Nec vero pus tantum offendimus, ſed & vermes ex putredine generatos, & poſſimum in trunco venæ Portæ, qua hepar egreditur; qui affectus Ovibus frequentiffimus eſt, ſi in humidis & udolis locis paſcantur. Sunt hi vermes lati, nigrique, ſenſim in apicem deſinentes. Sed & in Cavæ trunco deſcendente, non longe ab emulgentibus venis Patavii, in frequentiffimo Theatro, inſignem alium duorum tranſverſorum longitudine invenimus, ſimilem proſus erucae, quem multi maxima cum admiratione inſpexerunt. Nec refert, quod ſanguis in Venis tanquam in proprio loco ſit, cum locus non diutius rem à corruptione vendicet, quam omnia in ipſo lege Naturæ diſpenſentur.

FINIS LIBRI QUINTI.



ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS,
DE HUMANI CORPORIS FABRICA.
LIBER SEXTVS,

Qui Arteriarum naturam, earumque per universum
corpus distributionem persequitur.

CAPVTE

Arteriarum naturam, actionem, & usum cum differentiis explicat.



VENAS merito Arteriæ excipiunt, ob affinitatem. Nam & *tunica*, ex qua constant, non admodum dissimilis est; & sanguis, quem vehunt à sanguine illarum, non nisi elaboratione exactiore differt, & copia spirituum. Quod si Venarum diligentissima cognitio digna est futuro Medico, ut certe est, quemadmodum diximus, multo adhuc profecto dignior est hæc ipsa, quam nunc de Arteriis instituimus tractatio. Hæc enim nos in plurium abditarum rerum cognitionem sic deducit, ut quæ aliis videntur inuestigabilia, aut certe non nisi maximo ingenii acumine penetranda, facillimo negotio aperiat. Quamobrem etsi non ignoremus Anatomicam à nobis hic neci historiam, non videbimur tamen abs re facturi, si oblata occasione nonnulla asperferimus, quæ medicinam potius spectabant, ut ostendamus vel obiter, quantum utilitatis in ea arte Anatomix cognitio afferat, & quo pacto eandem ad usum deducere liceat.

Est autem *Arteria* vox Græca origine, Romana civitate donata, cum Latini proprio vocabulo, quod designent, careant. Dicitur ergo ἀρτηρία, vel ἄρτηρ, quia continuo motu attollatur semper, & deprimatur; vel, ut video placere plerisque omnibus, ἀρτὴρ τὸ ἀέρος πνεῦμα, quod aërem, sive spiritum conservet. Arteria enim ab Antiquis vocabatur fistula illa cartilaginea pulmonum, per quam aër externus attrahitur: unde apud Hippocratem, lib. de Dissect. legimus, Arteriam ex utraque faucium parte originem ducere. Sic Plato accepit, sic & Platonis discipulus Aristoteles. Inter Latinos consuetudinem Græcorum imitatus est Celsus, qui libr. iv, cap. i, exiguam in arteriis, sub ipsis faucibus linguam esse asserit; intelligens ἀγγλωσσίδα, quæ in larynge est, sive capite asperæ arteriæ. Posteriores tamen, cum & hos de quibus nunc acturi sumus sanguinis tubulos, perpetuo motu distendi viderent; existimantes non ab alia causa, quam aëre inflari, Arteriæ appellationem ipsis tribuerunt. Ne tamen æquivocatio obscuritatem pareret, illam quidem asperam arteriam; hos vero, læves dixere; tandemque circa Galeni tempora simpliciter Arterias appellarunt, adeo ut quoties vel Galenus, vel Medici Galeno posteriores Arteriarum mentionem injiciant, de his ipsis nobis sint intelligendi. Invenio tamen & ἐκκεντρίκω φλέβα, Venam micantem, sive pullatilem dictam, ad distinctionem reliquarum Venarum, quæ non pullant; cum, uti superius monuimus, Venæ vox utramque antiquitus complecteretur. Aristoteles plerumque τὴν ἐλάσσιον φλέβα, Minorem venam appellat, ratione Cavæ, quam majorem vocat, sive ampliorem: ab aliis tamen ἀορτή dici, III Hist. de animal. cap. III testatur, & rationem etymologiæ adjiciens, ἐκ τῆς πνεύματος, inquit, ἧ ἐν τοῖς πνεύματι τὸ νεύοντες αὐτῆς μέρος, eo quod nervosa ejus pars conspici vel in mortuis queat. Sed deesse mihi videtur vox aliqua, quæ obscuritatem magnam huic loco aspergit, quam si liceat suspitione addere, erit fortasse τὸ αἶμα. Illud tamen non ignoro, Veteribus Græcis ἀορτή dictam fuisse vaginam cultrorum Macedonibus familiarium, quorum manubrium nonnihil incurvatum erat, ad quam fane figuram quamproxime accedere videtur arteriæ magnæ truncus, qua parte ex corde originem suam ducit.

Ratio ordinis.

Villat doctrina de Arteriis.

Arteria etymologia.

Ambiguitas.

Synonyma.

Definitio.

Est vas.

Cavum.

Membrana
duplex
Ectasior.

Interior.

Membrana
arteriarum
sensu caret.

Actio.

Vfus.

Pulsus.

Pulsus cordis
motus.Pulsus cordis
arteriarumque
sejunctus.

Est autem **ARTERIA**, si definitionem ipsius requiras, *vas cavum, duplici membrana constans, distensione ac contractione præditum, ut sanguis tenuior ac spirituosus à Corde pro vita omnibus partibus deferatur.* Dico esse *vas*, ut genus ipsius assignem, quod cum Venis & Nervis commune habet. Differt autem à Nervo, quia est *cavum*; à Vena, quia *duplici membrana constat.* Membrana tamen non est, ut Vena, exacte; sed nonnihil ad Nervi naturam propius accedit, cum facile & in se contrahi & extendi queat, unde & ab Aristotele sæpe sæpius νευράδιος φλέψ, *Vena Nervosa* vocatur. Nec simplex etiam membrana est, sed *gemina*; quarum altera, exterior est; altera, interior. Exterior, tenuis, rara, ac mollis, qualem in venis cernere est, quæ rectas quidem fibras complures, paucas obliquas, transversas vero nullas obtinet. Quæ causa est, ut ab humorum acredine interiore exesa, aneurisima exoriatur, extensa exteriore, quæ facile cedit, cum transversis fibris careat. Interior, crassa est, imo crassitie fere quintuplo venarum tunicas superans, densa, ac dura, quæ tota ex fibris transversis constat, rectis & obliquis profus destituta. Hanc præter & tertia est, à Galeno lib. vii de Admin. anatom. cap. v addita, quæ in superficie interiore hærens, telis aranearum persimilis est, in grandioribus sane arteriis imprimis conspicua, sed maxime eo in loco, ubi arteria magna ex corde derivatur. Habent tamen nonnunquam & aliam forinsecas, quæ ipsas vel integrit, vel vicinis partibus alligat, quod tamen non accidit, nisi ubi vel nudæ incedunt, aut quoque pacto suspensæ sunt, quod idem & supra de Venis diximus. Hanc in infimo ventre à Peritonæo mutantur; in medio, à Pleura. Sunt autem membranæ hæc omnis sensus expertes, eandem ob causam, quam de venis retulimus, ne scilicet in plethora extensæ, aut ab acribus humoribus in caco-chymia vellicatæ, dolore hominem perpetuo affligerent. Reliquis verbis actio & usus designantur. *Actio* quidem, quæ est *distensio* & *contractio*, Græcis διστέλλω, & συσπλάω dicta. *Vfus* autem, ut sanguis tenuior ac spirituosior, à Corde omnibus partibus distribuatur, cujus beneficio vita conservetur. Actio hæc *Pulsus* dicitur Latinis, quamvis apud antiquiores Græcos nullum obtinuerit nomen, vel quia animadversa non fuerit, vel quia neglecta manserit. Posteriores σφυγμὸν vocarunt, quod vocabulum apud Hippocratem non pulsus, qui naturaliter arteriis inesse solet, denotat; sed dolorem potius illum, qui in inflammationibus insignioribus circa carnes, ab arteriarum pulsū excitatus, percipi consuevit: quo pacto Aphor. xxi lib. vii legimus, à forti in ulceribus pulsū malum esse sanguinis profluvium. Caterum motus hic idem est, qui cordis; nec differt, nisi in hoc, quod Arteriis secundo in fit, Cordi primario. *Cordi enim innatus est*, cum à propria suæ carnis substantia distendatur, contrahaturque, ut in animalium quorundam cordibus videre est, quæ dissecta effusoque omni profus sanguine, diutissime nihilominus adhuc pulsant. *Arteriis contra, à Corde pulsandi facultas insluit*; ex quo fit, ut abscessis arteriis, aut ligatis, nullus omnino percipiatur motus, quod scilicet à Corde nihil accipiant, cujus vi & potentia moveantur. Contingit autem simul cum cordis motu motus arteriarum, adeo ut dilatatio cordis arteriarum dilatationi, & contractio contractioni, temporis momento respondeat. De qua re si quis dubitet, experimentum per seipsum facere non magno negotio poterit, si manu ad cordis regionem applicita, altera pulsus arteriæ, quæ circa carpum est, observet. Manifestius autem & ipsis oculis usurpare poterit, in vivi animalis dissectione, ejus præsertim quod vitam paulo longius protrahit, ut erinacei; in quo cordis arteriarumque pulsationes simul fieri quam optime notabit. Ex hoc motu usus insignis enascitur, ut sanguis spirituosus per totum corpus digeratur. Dum enim dilatantur, à Corde accipiunt: dum constringuntur, ad partes spellunt. Est autem maxime necessaria hæc sanguinis pulsio, cum absque ea ad superiores partes, & transversas sanguis nunquam abiret. Quæ causa est, ut venis arteriæ semper conjungantur, quarum beneficio motus venosi sanguinis perficiatur. Imo vero hioc accidit, ut animalia quæcunque venas obtinere, eadem quoque arterias sint nata; quod ad venosi sanguinis tum conservationem, tum usum, arteriarum præsentia videatur esse maxime necessaria. Hoc ipsum manifesto experimento discimus, cum venis valide ligatis & pertusis, sanguinem tamen nullatenus, aut admodum tarde, & citra impetum fluere videamus, laxatis postea vinculis, vi quadam & impulsu sanguinem spargi. Id quod non alia profecto de causa evenit, quam quia Arteriæ una cum Venis ligatæ, motu profus destituantur,

ruuntur, laxatæ deinde motu suo impellunt, & vi quadam sanguinem effundunt. Et hæc quoque ratio est, cur Vena Cephalica semper sine impetu, at Basilica vi quadam sanguinem ejiciat: quia hæc, arteriam comitem habet; illa, comite caret. Atque hic verus usus est dilatationis & contractionis Arteriarum. Est & alius, ut scilicet per dilatationem calor ventiletur, & externus aer suscipiatur. *Ceterum* sanguis, quem arteriæ vehunt, tenuior est, quam qui in vena Cava continetur, utpote à calore in sinistro cordis ventriculo coctus magis, & elaboratus; ex quo fit, ut & spirituosior sit, cum spiritus ex *despolat*, sive attenuatione sanguinis generetur, ut tradit Galenus. Spiritus autem hi, Vitales vocantur; quod vitam partibus omnibus largiantur, cum ligatis aut abscessis arteriis, partem ad quas sanguis arteriosus non vehitur, emori, & gangræna perire videamus. Cum enim satius foret, ut in uno loco caloris fons constitueretur, adeoque in Corde; totum autem corpus ex uno corde constare minime posset, hinc expediebat ab ipso per arterias tanquam per tubulos naturalem omnibus partibus calorem distribui & communicari. Calor autem in tenuissima necessario substantia, qui spiritus sunt, itabulatur, ut diffundi per totum corpus temporis momento posset: ne tamen in itinere longiore dissiparetur, sanguinem illi, materiam scilicet crassiorē, in qua calor diutius, quam in spiritu conservaretur, prudens natura pro repagulo adjunxit. Adde, quod ex sanguine in singulis partibus, dum in vapores dissolvitur, alii continuo spiritus nascuntur, sicque vita indefinente refectioe protrahitur. Ex his ratio nunc reddi potest, cur Arteriarum substantia densior crassiorque facta sit, quam Venarum. Nimirum ratione actionis suæ, ut in distensione facilius aperiatur, & apta manere diutius possit: in contractione autem, non penitus subsideat. Ratione vero usus, ne sanguis tenuior spiritusque subtilissimi aut exsudent, aut evanescant. Nervosa autem est hæc substantia, quod in dilatatione arteria abbreviari semper soleat, & versus cor trahi: in contractione contra elongari, & versus extrema extendi; ad quam actionem non alia substantia, quam nervosa aptior est. Fibre autem in interiori tunica transversæ sunt; in exteriori, rectæ obliquis mixtæ, quod & accipere sanguinem debeant, & acceptum propellere. Non difficulter accipiunt à corde propulsum, at difficilior ad extimas partes distribuunt. Transversæ ergo fibre interius positæ sunt, ut actionem adjuvarent operosiorē: Rectæ vero, & oblique foris.

DIFFERENTIAS Arteriarum quod spectat, perinde ac Venarum, quibus admodum respondent, complures sunt; primarias tamen duntaxat hic enumerabimus. Ratione ergo magnitudinis insignis est differentia, & magni momenti in Medicina. Sunt enim quædam maxime, ut Truncus Aorta dictus, sive arteria magna per dorsum excurrent: quædam mediocres, ut arteriæ carotides, emulgentes, & iliacæ: quædam minores, quæ per artus & caput repunt: omnium minima, sunt capillares, quæ in habitum corporis, viscerumque substantiam disperguntur. Quædam rectæ incedunt, ut jugulares: quædam tortuosæ sunt, & capreolares, ut præparantes arteriæ ad testes accedentes. Nonnullæ superficiem corporis accedunt, sed paucæ admodum sunt, ut Cutaneæ vocatæ, quæ ad tempora, frontem, penem, scrotum, & digitos excurrunt; reliquæ omnes in penitioribus corporis partibus latent, & Profundæ vocantur. In qua re à Venis quamplurimum differunt, quæ per totum corpus sub cute sparguntur. Sed benignissimus opifex, & ab externis injuriis sic defendere voluit, quæ periculose læderentur, & munus suis locum aptiorem destinavit, cum in profundo consistentes, Venarum sibi comitum sanguinem ad quasvis externas partes promptius impellant. Intima autem omnia sic pervadunt Arteriæ, ut & in recessus ossium (nonnullorum opinione ipsis inaccessibiles) penetrent. Nec tantum cavitates illas, quas medulla occupat, una cum venis ingrediuntur: sed ipsam etiam ossium substantiam (res mirabilis!) pertundunt, quemadmodum in ulceribus Tibiæ, iis qui Chirurgiæ operam navant sæpe licebit advertere, si una ossium caries insignis occurrat. Differentiæ quæ ratione connexionis observantur, facile ex superiore libro desumentur, ubi de venarum connexione egimus.

CAPVT II.

Superiorem, sive ascendentem Arteria magna Truncum, & propagines per caput distributas proponit.

Ortus Arteriae magnae.



Coronariae Arteriae.

Divisio in Arteriam Truncum.

Quae partes interque alas Cordis ducuntur.

TRUNCVS ASCENDENS.

Obfuscatio.

DE numero Arteriarum & ortu, nulla est apud Autores rerum Anatomicarum controversia, sed unanimis consensus, universas propagines, quae per corpus disperguntur ab una ortum ducere, quam Aortam vocant; hanc autem ex Corde derivari. Sed cum Cor duobus constet finibus, dextro, & sinistro; ex ^a elatiore sede sinistri sinus, sive ventriculi educitur, ubi amplissima est, duriorque & cartilaginosa, quam alibi. Simul autem ac enata est, & priusquam pericardio excidit, ^b duos protinus graciles furculos, utrinque unum propagat, quos *Coronarias arterias* appellant, quod cum Coronali vena, coronae in modum cordis basin amplectantur, à quibus secundum cordis longitudinem multae soboles deorsum sparguntur. Sunt autem plures & insigniores circa sinistram, quam dextrum Ventriculum, quemadmodum & de Vena superius diximus, quod sanguine copioso cor ea parte indiguerit, cum perpetuo & violentiore, quam dexter sinus, motu agitur, in quo plus sanguinis digeritur: amplior tamen longiorque est illa, quae à dextro arteriae latere nascitur. Interdum etiam unica tantum est, cujus orificio exigua valvula adposita reperitur. His sic disseminatis propaginibus, sub Venae arteriosae trunco ascendit nonnihil, & pericardium perforat, quod ubi superavit, in duos ramos ^c scinditur, quos ob insignem magnitudinem Truncos; & quia ^d alter ascendit, ^e alter deorsum progreditur, illum Ascendentem, hunc Descendentem vocabimus. Insignis autem utut sit uterque, Descendens tamen & inferior ascendentem & superiorem multis partibus superat, quod pluribus ille, quam hic partibus sit dedicatus. *Ascendens* enim partes duntaxat quasdam Thoracis, Caput, & Brachia; at *inferior*, Thoracis plurimas, Infimum ventrem universum, & Crura adit. De arteria ergo magna, ut perspicue agamus, primo Truncum ascendentem, ejusque per thoracem & caput progressum, postea ramos ad brachia digestos exponemus. Hinc descendentem aggrediemur, & ejus per thoracem, ac infimum ventrem, tandemque per crura distributionem explicabimus.

^f **ASCENDENS** ergo, sive *superior Aorta* **TRUNCVS**, inter asperam arteriam, venamque cavam, & mediastinum sursum contendit, oesophago attensus. Quem situm diligenter notare oportet eos, qui rationem desiderant aphorismi, qui est vigesimus quartus quintae sectionis apud Hippocratem: *Frigida enim, inquit, veluti nix, glacies, pectori inimica sunt, tussis movent, & sanguinis eruptiones, ac defluxiones inducunt.* Pectori quidem inimica sunt, quia dum deglutuntur per oesophagum, asperam arteriam ipsi adjacentem una cum gula refrigerant; quae pars cum frigida per se sit, facile à frigido tam vehementi laeditur noxamque trahit: hinc tussis, & alia pectoris mala, longo ordine se consequuntur. Sanguinis autem profluvia accidunt, arteria magna similiter refrigerata, unde spiritus vitales & sanguis ad cor repelluntur, indeque ad caput cum impetu transmittuntur, quo repleto, tum ex naribus stillans, sanguinis eruptiones, tum indigestus ad inferiores partes propulsus, catarrhos & destillationes parit. Et hinc quoque ratio reddi potest, cur à potu frigida post vehementes corporis motus, & exercitia, nonnulli protinus suffocati fuerint, cardiaca & syncope gravissima supervenientibus. Arteria enim refrigerata valide, sanguis congelatur, tam is qui in Aorta fuit, quam ille qui in Corde stabulatur, ex quo horrenda primum symptomata, deinde repentina mors evenit. Vidimus autem secta vena sanguinem his crassum ac frigidum, nec nisi maxima cum difficultate produsse, unde & praesentius remedium iis non invenimus, quam in his, quae ob tenuitatem partium grumos sanguinis dissolvendi vim habent. Hinc etiam ratio reddi potest, cur in ardentibus febribus lingua nigrescat, & difficulter agri deglutiant. Et si enim verum est (quae causa vulgo affertur) ex universo corpore vapores ad caput plurimos transmitti, non minimam tamen hujus nigredinis culpam arteriae viciniori licebit adscribere, quae accensa ac inflammata, Oesophago, & sic consequenter ipsi etiam linguae gravia mala impertit.

Ceterum

Cæterum ascendens truncus in hoc versus superiora progressu, in duas ^a subclavias arterias dividitur; quarum altera, ad dextram; altera, ad sinistram excurrit. Vocantur autem quamdiu in thorace sunt, *subclaviae*; eadem ratione, ut subclavia Venæ, quod sub claviculis incedant: at cum primum è Thorace exciderint, nomen mutant & ^b axillares vocantur. Ab utraque subclavia, ubi primam costam attigere (nam ante nulla propago emittitur) plures furculi tam ab inferiore, quam superiore parte propagantur. Ab inferiore, ^c *Intercostalis superior*, quæ costarum radicibus attensa, quatuor superiorum costarum intervallis singulos ramos largitur, sub costis usque ad cartilagineas cum venis excurrentes, à quibus ad dorsi medullam, vicinosque musculos soboles sparguntur. Ab elatiore sede prodiit primo ^d *Cervicalis* vulgo dicta, sed rectius *Vertebralis*, quæ retro magis & versus corpora vertebrarum nascitur; oblique autem ascendens, juxta septimam colli vertebram per foramina transversorum processuum & superiorum vertebrarum colli, ut *Cervicalis* vena, transit, ubi complures propagines producit, quæ ad spinalem medullam per foramina communia, per quæ nervi exeunt, intrant. Aliquam multas etiam ad musculos in posteriore cervicis sede sitos exigens, ascendit ad occipitium una cum Vena, & per primum ejus insigne foramen, per quod spinalis medulla ex capite descendit, cranium ingreditur. Hinc ^e sub medulla spinali, quæ in calvaria adhuc est, cum focia oppositi lateris ^f unitur, ^g sicque sub cerebri media basi versus anteriora recta excurrit: at ubi jam sellam ossis cuneiformis, cui glandula pituitaria incumbit, attingit, in ^h duos ramos dividitur; alterum dextrum, alterum sinistram; quorum uterque ad latus sellæ, ad nervorum secundum par repit, ubi utrinque ⁱ in furculos infinitos dirempti, inter primum & secundum nervorum par disseminantur, ac tenui membrana complicati ^k plexum choroidem constituunt. ^l Altera est *arteria mammaria*, quæ reflexa sub sterno (comite vena mammaria) secundum ipsius latera descendit, & ubi ad cartilagineam ensiformem pervenit, circa latera ejus thoracem egreditur, & substructa rectis abdominis musculis, per ipsorum inferius latus recta descendit, tandemque circa umbilicum cum ^m epigastrica arteria ascendente per ⁿ anastomosin conjungitur. Prius vero quam thoracem relinquit, ad sex septem verarum costarum spatia intercartilaginea singulos ramos diffundit, qui una cum cartilaginibus terminantur. ^o *Tertia*, *Muscula* alias, sed strictiore appellatione rectius *Cervicalis*, cum in musculos in cervicis regione positos ad occipitium usque disseminatur.

His ramis eductis, subclavia ex cavo thoracis exit, & primam costam superans, oblique vergit ad alam, sicque ^p Axillarem arteriam constituit, quæ postea in brachium diffunditur. Ante tamen propagines aliquot spargit, & ab inferiore quidem parte tres, ex quibus prima ^q *Scapularis interna*, quæ in musculos scapulæ cavitatem occupantes vadit. ^r Altera, *Thoracica superior*, quæ ad pectoralem musculum humerum adducentem abit, cæterosque pectori instratos, & satis ampla est. ^s *Tertia*, *Thoracica inferior*, quæ & ipsa insignis, secundum totum thoracis latus descendens, per musculum latissimum humeri abducentem potissimum dispergitur. Ab elatiore parte, una nascitur ^t *Scapularis externa*, quæ summum humerum conscendens, in musculos gibbam scapulæ sedem obtegentes disseminatur. *Reliqua pars arteriæ axillaris* ad brachium, comite vena basilica, progreditur, in quod totum postea exhauritur; de cujus distributione sequenti capite dicemus.

^u Quod restat tandem de ascendente trunco, juxta superiorem sterni partem Thy-mo suffultum in ^v duos ramos dividitur, quos *Carotides* appellant, sive *Soporales*, quod his obstructis aut quocunque modo oclusis, statim in somnum incidamus, cujus periculum in adolescente Realdum Columbum in magna hominum frequentia fecisse testatur Valverda in Anatome, lib. VI, c. XI. Inæquales sunt magnitudine, cum dexter multo sit sinistro crassior: tendunt autem recta versus superiora, secundum colli latera ducti, asperæ arteriæ & venis jugularibus internis membranæ beneficio connexi, ac ubi ad fauces pervenerunt, in duos ramos ^y dividuntur; quorum alter, externus est; alter, internus. Ille, minor; hic, major. ^z *Exterior*, ^a ad buccas & faciei musculos soboles propagat, deinde ubi ad aurem pervenit, circa ipsius radicem bifariam ^b dividitur: ^c *alter* enim *ramus* auris posteriora petit, à quo duæ arteriæ sub aure maxillam inferiorem per primum ipsius foramen ad processum situm ingrediuntur, & secundum ejus longitudinem

Divisio Trunci
ascendens
in duas Ra-
mos.
Arteria sub-
clavia.

Ramus ab in-
feriore subcla-
via parte or-
tus
Intercostalis
superior
Ramus a sub-
clavia parte or-
tus.

Vertebralis.

Mammaria.

Muscula.

Axillaris ar-
teria.
Eius rami an-
tequam in bra-
chium absu-
muntur.

Ab inferiore
parte.

Scapularis in-
terna.

Thoracica su-
perior.

Thoracica in-
ferior.

Ab elatiore se-
de Scapularis
externa.

Carotides

Divisio Ca-
rotidum.
Exterior, sive
ramus faciei.

dinem in omnium dentium inferiorum radices disseminantur; reliqua pars per foramen secundum, quod ad mentum positum est, egrediens, in labrum dispergitur.

*Interior, sive
ramus Ence-
phalicus.*

^a *Alter*, per tempora & frontem repit, in musculos faciei absumptus. ^b *Interior* ramus Corotidis arteriæ, sive *arteria Encephalica*, in fauces deferitur, ac ubi linguæ & laryngi propagines disseminavit, circa Calvariæ basin in duos inæquales ramos dividitur; minorem scilicet, & majorem. ^c *Minor, & posterior*, cum venæ jugularis internæ encephalico ramo majore ad crânii posteriora fertur, per occipitii foramen secundum ingreditur, ac crassæ membranæ linum subit. ^d *Major, & anterior*, ubi per foramen proprium in osse temporum exsculptum crânii cavitatem ingressus est, atque ad ossis cuneiformis sedem pervenit, ubique sub dura membrana incedens, primum utrinque ramum in latius crassæ membranæ propagat, deinde in brutis infinitos furculos dispergens, ^e *Rete* illud mirabile constituit, quod revera quidem & in Homine invenire est, at respectu brutorum exiguum, & non nisi umbra quædam videtur. His furculis sic constitutis, cerebri crassam membranam perforat, ex qua ubi emerit, propaginem aliam per cuneiformis ossis foramen secundum ad oculum ejusque musculos, quemadmodum & ad maxillæ inferioris attollentem temporalem musculum extra Calvariam propagat: inde recta ascendens ad latus glandulæ pituitariæ in duos ramos dividitur; quorum alter, interior; alter, exterior est. ^f *Interior* cum sua conjuge oppositi lateris ^g unitur, unitæque in ^h plurimas arteriolas absumuntur, quæ per tenuem membranam ipsiusque Cerebri substantiam ad principium nervorum opticorum disperguntur. ⁱ *Exterior*, reflexus & tenui membrana suffultus, in cerebri priore ventriculo abit, divisus in multos ^k furculos, qui cum ^l arteriis illis à ^m vertebrali enatis uniuntur; alii quidem cum illis, quas per basin capitis sub cerebro vertebralis spargit; alii vero cum illis, quos per tenuem membranam & cerebri substantiam disseminat, cum quibus ⁿ plexus choroideum constituunt.

*Diffusa cum
in
Cerebrum.*

*Diffusa
in
Cerebrum.*

C A P V T III.

Axillaris Arteria per brachium digesta seriem enarrat.

*Diffusa in
Brachium.*



*Diffusa in
Brachium.*

*Diffusa in
Brachium.*

ARTERIA ergo ^o Axillaris, ubi ad brachium pervenit, ^p *Brachialis trunci* nomen asciscens, unico ac indiviso trunco ultra cubiti flexuram per internam brachii partem fertur, utrinque propagines quasdam graciles ad musculos humeri internam sedem occupantes disseminans. Incedit autem interno sive profundo basilicæ venæ ramo tanquam comes individuus attensa, unde ductum quoque & seriem illius ubique sequitur. Statim autem secundum posteriorem humeri sedem, qua ipsi cubitum extendentes musculi adherent, descendens, propagines ^q duas, quarum inferior insignis admodum, educit; sicque versus cubiti flexuram retorquetur, quam ubi attingit, ^r duos furculos, utrinque unum, in articulum exporrigit, adeo detectas, ut sæpe ibi pulsus satis evidenter percipiantur. Sub cubiti deinde flexura per internam ipsius regionem incedens, inter duos musculos, secundum & tertium quatuor digitorum internodium flexentes demersa, in ^s duos dissecatur ramos insignes; quorum alter, exterior; alter, interior est. ^t *Exterior*, secundum radium fertur (unde *Radius* à me dictus) & recta carpi petit, quo loci Pulsus ipsius à Medicis solent explorari, cum manifestus admodum sit, quod cuti proxime arteria subjiciatur. Non longe autem à carpi radice ^u ramulum emittit, qui sub tendinibus musculorum pollicem extendentium in externam manus regionem excurrit, & in musculos, qui inter primum pollicis os & metacarpi, quod indicem sustinet, siti sunt, absumitur. Hoc ramo propagato, sub annulari interno carpi ligamento & palmaris musculi lato tendine incedens, ^v in tres dividitur ramos, haud secus ac Vena & Nervus ipsius comites. Ex his ^w primus, pollicis; alter, indicis internam regionem petit; ^x tertius, internum latus interioris mediæ digiti sedis. Primus & secundus, in duos quisque ramos dirimitur, tertius, indivisus est. ^y *Interior* ramos, os ^z cubiti sive ulnam recta percurrit (*Cubitus* eo nomine à me vocatus) & in manus volam dispergitur. Adeo autem abditus est in musculos, ut ejus pulsatio difficulter percipiat, nisi in macilentis, unde Medici digitos in exteriorem ramum semper injiciunt, dum

dum pulsus in carpo tangunt. Progreditur autem sub transverso ligamento carpi, & sub tendinē palmaris musculi; Vena & Nervo comitibus; ac duos quidem ramos in minimum digitum, totidemque in annularem; at unum in externum medii latus dispergit.

CAPUT IV.

Inferiorem, sive descendente Arteria magna truncum, ejusque per medium ac infimum ventrem propagationem proponit.

ARTERIAM ^a magnam, ^b cum primum pericardium superavit, in duos dividi ramos, quorum alter superiora petat; alter ad infernas partes descendat, supra diximus. De superiore jam egimus; reliquum est ut alterum quoque explicemus.

^cDESCENDENS ergo TRUNCUS arboris caudici proportionē respondens, ad quintam Thoracis vertebrae detorquetur, & nonnihil sinistrorsum declinans, vertebrarum corporis sinistro lateri adhæret, sicque sensim descendit. Vbi jam Diaphragma superavit, quod per divisionem illam semicirculum referentem, quæ inter septi transversī productiones est, transit, mox per lumborum vertebrae excurrit, medio ipsarum corpori innixus, donec ad ultimam pervenerit, ubi juxta os sacrum ^d in duos insignes ramos ^e dividitur, quos à situ cum aliis Anatomicis Iliacos dicemus. In hoc itinere complures de se spargit propagines, quæ diligenti observatione dignissimæ sunt, quod plurium in morbis accidentium rationem facillimè hinc liceat reddere. Sunt autem, octo arteriæ Intercoştalēs, duæ Phrenicæ, unà Cæliaca, hinc Mesenterica superior, duæ Emulgentes, totidem Spermaticæ, tandem Mesenterica inferior, & Lumbares. *Ex his intercoştalēs, dum in Thorace adhuc Truncus est, sparguntur; reliquæ, dum per Infimum ventrem procedit. Aliæ autem vena Portæ ramos committantur, ut Cæliaca, & utraque Mesenterica: aliæ Cava, quemadmodum cæteræ.* De his ordine nunc agemus, initio ducto ab Intercoştalibus, quæ supremum locum obtinent. Mox ergo ac ^f Descendens truncus emerfit, à posteriore sui sede ramulos utrinque ad octo inferiorum costarum intervalla transmittit, quos ^g Intercoştalēs inferiores appellant respectu Intercoştalis superioris, de qua supra diximus. Hæ Venis & Nervis ejusdem nominis affociatæ, recta secundum humiliorem costarum sedem, ubi ipsarum gratia sinus peculiare exculpti sunt, progrediuntur. Sed quemadmodum venæ intercoştalēs in legitimis quidem costis, ad cartilagine tantum usque: at in spuris, ulterius nonnihil provehantur, ad latera inquam abdominis: ita & Arteriæ in illis cum costarum ossea parte desinunt, in his paulo longius excurrunt. Cæterum hæ arteriæ propagines quasdam per nervorum foramina ad spinalem medullam & musculos dorſi vertebrae incumbentes transmittunt, non secus atque in venis intercoştalibus propagari diximus. *Vfus autem est, vitalem spiritum & sanguinem musculis intercoştalibus diffundere, quem præter & alium insignem obtinent, aquam scilicet & pus in Thorace collectum in arteriam magnam, & hinc per ramos emulgentes ad vesicam deportandi.* Tametsi neutiquam sum nescius doctissimum Fallopiū aliosque, qui ante me in nobilissimo hoc Patavino Gymnasio docuere, aliam monstrasse Auditoribus suis viam, per quam vel pus vel aqua, renū auxilio, educeretur, venam nempe sine pari, cujus ramulus in sinistro latere in sinistro renis emulgentem progreditur. At enim hæc via, quam per Intercoştalēs arterias monstramus, brevior multo est: ut taceam, per arterias facilius, quam venas materiam quamcunque congestam rapi posse. Neque est quod aliquis hic vereatur, ne ab his excrementosis pravisque humoribus, vitales spiritus contaminentur, unde Cor gravissima symptomata incurrat, cum lubentes id & æquo animo largiamur: nam & experientia sæpenumero nos docuit; dum per urinas pus evacuatur, ægros in syncopen aliaque mala incidisse, interdum etiam in repentinam mortem; nempe tunc, quando aut copia aut malitia nimia humor peccabat, & Naturæ tantam vim inferebat, ut calor spiritusque succumberent. Sed me huc vocat ad expositionem loci quidam apud Hippocratem, cum diu animum meum, sæpeque anxium tenuerit. Locus est in Coacis prænotionibus; *Quibus, inquit, totus pulmo inflammatus*

TRUNCVS
DESCEN-
DENS.
Ejus pro-
gressus.

Propagines.

Intercoştalēs
inferiores.

Vfus.
1.
2.
Per quæ vide
materiam in
Thorace col-
lectam ad vesti-
cā perveniri.

Explicatio lo-
ci Hippocra-
ti.

matus fuerit una cum Corde, ut ad latus allabatur, hi toti resolvuntur, & jacet ager frigidus, sensus exors, moriturque secunda, aut tertia die. Si vero etiam sine corde contigerit, minus diu vivunt: quidam autem etiam servantur. Diu cogitavi mecum, quis Cordis & Pulmonum cum Cerebro nervisque consensus ille foret, ut ager ab harum partium inflammatione totus resolvatur, cum idem Hippocrates eodem in loco doceat, ea parte agros solvi, & livores foris circa costam apparere, qua Aortæ appellatæ (sic videtur vocasse pulmonum lobos) ad latus inflammatæ decidunt. Si vero non valde inflammata sint, ut ad latus non decendant, dolorem quidem fieri per totum, non tamen solvi, neque livores apparere. Multis tandem apud me deliberationibus habitis, in hanc deveni sententiam, non aliam esse causam, quam consensum, qui inter has arterias Intercostrales est & spinalem medullam. Nascitur hic à propaginibus illis, quas in spinam se penetrare per foramina vertebrarum thoracis diximus. Quamobrem si Pulmones & Cor sic valida inflammatione tententur, ut in arteriam magnam sanguinis copia affatim irruat, sicque ipsa postmodum tumeat, tumeant etiam hæc vasa intercostalia, & consequenter furculi illi, qui spinalem medullam adeunt, fieri profecto nequit, quin & hæc & Nervi ex ipsa progredientes comprimantur, unde quid aliud quam resolutiones earum partium, in quas ii Nervi inferuntur, & movendi facultatem impertiunt? Hanc sententiam mirifice mihi confirmare videtur elegans quædam observatio, quæ apud doctissimum Cornelium Gemmam habetur, libro de hemitritæo pestilenti. Cuiusdam, is inquit, Iuveni studiose per universum morbi curriculum sinister oculus contractior fuit. Doluit sinistram latus, præsertim per exasperationem totius circuitus; ac circa crism inflata arteria cruris sinistri secundum longitudinem movebatur, ut nobis conspicua, veluti retractus fumis quæpiam, verti sursum deorsumque videretur. Quis hic non libens confiteatur, materiam hanc in arteriis fuisse, cum crism per arterias facta fuerit? Cæterum ex his ipsis ratio quoque reddi potest alterius cuiusdam observationis Galenicæ, quæ 1v de locis male affect. cap. 1v est, ubi sic inquit: In quodam qui à vehementi peripneumonia infestabatur, brachii tam externæ, quam internæ partes, à cubito ad summum usque digitos sensus difficultate laboraverunt, atque motus quoque nonnihil lesus est. Huic præterea nervi, qui in primo ac secundo intercostali spatio inveniuntur, noxam subierunt. Et paulo post: Huic homini celeriter sanitas reddita est, adhibito scilicet medicamento eo loci, unde nervi procedunt, juxta primum ac secundum intercostale spatium. Propter eosdem intercostales ramos, Ioannes Valeriola, Filius Medici illius cuius Observationes habemus, puer adhuc in gravi pleuritide convulsiones passus est.

Observatio.

1.
Phrenica.3.
Celiaca.Rami duo.
Dexter.Propagines
ex elatiore
sepe pro-
ducentes.

^a Phrenica arterie, duæ sunt, utrinque una, quæ ex Trunco enatæ statim atque è Thoracis cavo egressus est, in septum transversum, præsertim vero in humiliorem ipsius sedem juxta vertebrae dorsii, in plures ramos sectæ disseminantur. Nonnullos etiam furculos in superiorem partem spargunt, quæ postea ad pericardium abeunt, qua parte diaphragmati adnascitur.

^b Celiaca, una est, sic dicta, quod ad *νεφελίαν*, id est, Ventriculum ramos transmittat.

Hæc Venæ Portæ Splenico ramo simillima, Ventriculo, Iecori, Vesiculæ felleæ, Omento, Duodeno, Iejuni initio, Coli intestini parti, Pancreati, & Lienis ramos plurimos largitur. ^c Oritur autem ex anteriore corpore ipsius Trunci, & à superiore parte inferioris membranæ omenti, toto ductu suffulta, in duos ramos insignes quidem, sed amplitudine tamen inæquales dividitur; quorum ^d alter, ad dextram; ^e alter, ad lævam abit.

Ille, minor est; hic, major. ^f Dexter ergo in pancreate, sub posteriore ventriculi regione reposito, venæ portæ descendenti conjungitur, ac ibi omenti membranis innixus, ad hepar vadit, cujus exilitas profecto notatu digna est, si hepatis intuearis amplitudinem, quod Veteres olim, hodieque multi sanguinis officinam constituere. Inferitur autem parte cava, prope venæ portæ truncum, & tam parva est, quod majori arteriâ ea Iecoris pars, quæ Portæ radices suscipit, non indiguerit: reliqua autem pars, quæ Cavæ propagines habet, vitalem spiritum copiosissime per venam Cavam ex Corde transfusum suscipiat. Antequam tamen hepar ingrediatur, in itinere plures furculos, eoque partim ex elatiore, partim ex humiliore sui sede disseminat. Et ex elatiore quidem duos; primum, quem Pyloricum voco, & ex medio ductu pronascitur, ac in posterio-rem sedem dextri orificii ventriculi pluribus ramulis divisus spargitur: alterum, ^g Cysticas gemellas, quæ duo sunt exiles rami, & in Vesicam felleam abeunt, ac protinus in multas propagines

propagines dividuntur. Ex inferiore sede similiter duo oriuntur. *Primus, Epiplois dextra*, quæ in dextram sedem inferioris membranæ omenti, & in Coli partem ipsi adnexam inseritur. *Alter*, in duos scinditur ramos; quorum *unus, Intestinalis*, ad Duodenum & Iejuni principium progreditur: *alter, Gastropiplois dextra*, paulo insignior, ad dextrum fundi ventriculi latus deflectit, & superiore omenti membrana fufulta, ex superiore parte soboles quasdam in Ventriculi anteriorem & posteriorem sedem propagat: ex inferiore autem, in Omenti, cui innititur, membranam. ^a *Sinister ramus, & major, arteria Splenica* dicitur, inferiori omenti membranæ, glandulisque in ipsa repositis adhærens, cum Splenica vena, cui attenditur, & cum qua pari ratione soboles digerit, ad Lienem progreditur. In itinere autem similiter ab utraque sui parte ramos digerit. Et ex superiore quidem, ^b *Gastricam*, quæ in medium posterioris Ventriculi partis, five ejus, qua dorso incumbit, porrigitur, inde ascendens, Ventriculi sinistram orificium coronæ instar cingens circumit, & furculos partim fursum, in œsophagi finem; partim deorsum, eosque majores & frequentiores, in ventriculum dispergit, sicque *Arteriam Coronariam* constituit, similem Venæ coronariæ, quam à Portæ vena oriri, superiori libro diximus. Ex inferiore autem sede, *Epiploin sinistram* ea fere parte educit, quam Lienem attingit, quæ in inferioris omenti membranam, & quidem ipsius sinistram partem excurrit. Hæc protinus ab exortu in duos ramos scinditur, qui admodum à se mutuo diducuntur, ex quibus aliæ arteriæ plures oriuntur, quæ in dictam Omenti membranam, & colon intestinum ipsi adnexum omnes exhauriuntur. His venis constitutis ^c arteria splenica Lieni magis approximat, & non secus ac Vena splenica, quam toto itinere comitem habuit, ^d in duos ramos ad literæ Y similitudinem dirimitur, quorum alter superior, alter inferior dici queat, qui postea per cavam ipsius partem ingressi, in infinitos furculos dirimuntur, ut Arteriarum quintuplo plures sint, quam Venarum. Ex quo fit, ut in inflammationibus Lienis, si manus sinistro hypochondrio apponatur, palpitare ipsum videatur. Ante tamen ingressum arteriæ, inferior ramus cum inferiore ramo venæ anastomosin insignem facit, & furculum ad inferiorem omenti membranam propagat. Ex superiore autem, una *Gastropiplois sinistram* dicta, quæ superiori omenti membranæ annexa, in sinistram fundi ventriculi sedem derivatur, anteriori & posteriori parti, vel etiam superiori omento ramulos largiens. *Alteram, Vas breve arteriosum* constituit, venæ ejusdem nominis in morem ad sinistram ventriculi latus & orificium adducta. *Vfus dextræ ramæ*, qui ad lecur vadit, præter communem quem habet, iste est, ut bilem quoties fellis vesicula obstructa est, ad intestina deponat, maxime vero ad Colon, in quod nonnulli ipsius ramæ inferuntur. Ex quo fit, ut ulcera in dysenteriiis plerumque semper in crassis intestinis, ac præcipue Colo: rarissime in tenuibus inveniuntur. Arteria enim hæc, ubi vel hepar calidius copiosam bilem generat, aut fellis vesica obstructa est, bilem in se copiosam suscipiens recta ad Colon transfert. Eodem pacto *sinistri ramæ*, five *Splenicæ arteriæ* usus, præter communem, is est, ut Bilem, Melancholiam, Serososque humores, si quando his Lien abundaverit, ad intestina deturbet. Quin & per eandem hanc viam hydropicorum aquæ, nonnunquam vel ad intestina aut renes, & vesicam demandantur. Hic idem ramus ille est, per quem potus per univèrsum corpus tam subito penetrat, & per quem pravi humores vomitu educuntur. Hic idem in causa est, ut cibo repleti, parum: ubi vero concoctio in ventriculo facta sit, plus urinæ reddamus. Plurimum enim distento Ventriculo, premitur: at vacuo, munere suo fungi potest. Hic idem ramus nos edocet, tenuem victus rationem præscribendam esse iis, qui purgantia assumpturi sunt, ut patula medicamentis sit via, tum ea, per quam excrementa ad ventriculum; quam illa, per quam ad intestina transmittuntur. Hic idem quoque ramus, si duos mesentericos addas, Melancholiæ hypochondriacæ sedes est. Cum enim à Viscerum, quæ in imo ventre continentur, obstructione hoc malum nascatur, arterias plurimum hic pati necesse est, quod vel symptomata, quæ in hoc affectu contingunt, satis edocere queant.

^e *Mesenterica superior* paulo infra Cœliacam enascitur, venæ mesaraicæ in modum (quæ focia ejus est) numerosis propaginibus in Iejunum & Ilium intestinum, tum eam Coli regionem, quæ à cavo hepatis ad dextrum usque renem pertingit, sicque fere in superiore mesenterii partem distributa. Quo loci observandum est, arteriam modo venæ,

Ex inferiore.

1.

2.

Sinister.
Arteria Splenica.Propagines
ex superiore
parte digerit.
Gastricæ.

Ex inferiore.

Vfus
dextræ ramæ.
Cuius ultra
crassius in
retinaculum
frequenter.

Sinistri ramæ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mesenterica
superior.

Observatio.

modo contra venam arteriæ incumbere, sicque inter utramque membranam mesenterii deferri. Habent autem hæ arteriæ in mesenterio multis in locis Glandulas, quæ ad vasorum, & maxime arteriarum liberam perspirationem factæ sunt, ex quo fit, ut scirrhus laborantibus vasa comprimantur, & marcor universi corporis insequatur.

^{c.} Emulgentes. ^{6.} ^a Emulgentes arteriæ duæ sunt; una, dextra; altera, sinistra. Vtraque sub prædicta prodit, ubi prima secundaque lumborum vertebra ligamento copulatur. Prodeunt autem ab utroque trunci latere, quamquam non è directo, quemadmodum & Emulgentes venæ, cum dextra sinistra sit humilior. Hæ ubi ad renem accessere, in duos ramos finduntur, quibus in sinus cavitatis renum inferuntur, & non secus ac Venæ in ipsorum substantiam infinitis furculis absumuntur. Harum usus, præter communem, est serum, quod copiosissimum in arteriis reperitur, expurgare.

^{6.} Spermatica. ^b Spermatica, sive feminales similiter duæ sunt, quæ ex Trunco arteriæ magnæ parte anteriore, sed contiguis principiis enascuntur: non enim, ut sinistra spermatica vena, sic lava arteria ab emulgente prodit. Descendentes postea venis sui lateris attenduntur, & in viris quidem, per peritonæi processus ad testes deferuntur: in feminis autem, ubi testibus nonnihil approximant, in duas partes scinduntur; quarum altera, ad testes; altera, ad uteri fundum deferitur. Arteriæ autem ad uterum sic perveniunt, ut ipsum irrigent tantum ad latera, non etiam ad interiora penetrent. Quod quidem summa providentia Naturæ sapientissimæ contigit, quandoquidem haud ita tutum fuerit ad internam usque superficiem ipsas deducere, cum ingressu foetus maximum sanguinis profluvium, non parvo puerperæ periculo fuisset excitatum, si interna superficie placenta fuissent adnexæ. Hinc & fit, ut puerperia paulatim fluant, non cum impetu, aut confertim.

^{c.} Mesenterica inferior. ^c Mesenterica inferior, paulo supra, quam arteriæ truncus in ramos iliacos suditur, juxta os sacrum enascitur, & in Coli sinistram partem rectumque intestinum abit, cum venis hæmorrhoidajibus ad extremam usque anum descendens, & Hæmorrhoidales arterias constituens. De utriusque Mesentericæ usu queritur, an, præter communem, proprium obtineant? Galenus enim lib. iv de Usu part. alterius cujusdam mentionem videtur injicere, cum velit nonnullam chyli portionem ab ipsis attrahi. Et libro, an sanguis in arteriis contineatur, cap. v: Si ventrem imum, inquit, & interiorem membranam diviseras, arterias in mesenterio plane conspiciemus, in hædis quidem nuper natis lacte refertas, in adultis autem animalibus, alterius cujusdam rei plenas.

^{c.} ^{d.} Quibus verbis, experientia anatomica edoctus, ostendit non Venas tantum, sed & Arterias mesaraicas chylum ad se manifesto trahere. Quod sane cum revera ita se habeat, credibile omnino est, chylum ab his postea vel in venas transferri, vel ab ipsis arteriis in sanguinem converti. Nec profecto mirabile id cuiquam videbitur, qui consideraverit, etiam foetui dum utero adhuc concluditur, maternum sanguinem per arterias umbilicales transmitti. Quod si sanguis per venas receptus, elaborandus adhuc est, ut certe quivis Naturæ diligentior indagator elaborandum esse statuet, profecto is qui per arterias accipitur, tanto exactiori elaboratione indigebit, quanto venoso est præstantior. Elaboratur autem in ipsis Arteriis, & Liene, raptus in Caliacam, & ad splenem deductus, ut libro vii pluribus dicemus. Atque hic usus mesentericarum arteriarum præclarus est, dum Homo perfecta sanitate fungitur: præter quem nos alium quoque addimus, quoties à sanitatis limite declinaverit. Suscipiunt enim arteriæ hæ excrementa universi corporis, ut ad intestina deponant, non secus atque Venæ, per quas & attrahit Chylum Natura, & expellit similiter humores noxios è corpore; Bilem puta, Pituitam, & Melancholiam. Et bilem quidem, frequenter in continuis & intermittentibus febribus biliosis, quarum crisis per alvi fluxus succedit. Pituitam, quoties Podagricis dysentericiæ accidunt, quæ à doloribus liberant, si prudentis Medici auxilio Naturæ institutum fuerit adjutum. Melancholiam tandem, ab utroque, sed inprimis Hæmorrhoidali ramo: unde Hippocrates, vi Epidem. Quia Hæmorrhoides innatas habet, neque dolore lateris, neque pulmonum inflammatione, neque furunculis, aut terminibus, pariter neque lepra, cancro, aut aliis morbis corripitur. Pectoris enim maximus cum hæmorrhoidali arteria consensus est, quod truncus, ex qua oritur, à corde descendens, in primo statim exortu intercostales ramos propagat. Omnes potro atrabiles humores ex toto corpore hinc

hinc expurgantur, ut inde cancri & lepræ nasci nequeant. Ex his spontaneis purgationibus, quas Natura ipsa molitur, de iis, quæ ope Medici perficiuntur, & Artificiales dici possunt, iudicium jam ferre licet. Invaluit enim nostra ætate opinio quorundam, purgationes corporis per Clysteres institui non posse, sed per medicamenta tantum ea, quæ per os assumuntur. At ego, si Clysteres medicamenta purgantia in se contineant, universum corpus commodissime evacuari non tantum crediderim, sed etiam experientia edoctus attestari possum. Totum namque Colon intestinum cum clysteris materiam suscipit, vis ipsa Medicamenti per arterias ex trunco Aortæ noxios humores trahit. Quo posito, rationem licebit reddere (quod sæpissime vidimus) cur ex elleboro albo facta suppositoria, eadem symptomata inducant, quæ solent inferri iis, qui elleborum album per os sumserunt. Similiter hinc causam licebit petere, ob quam unctio supra umbilicalem regionem facta medicamentis purgantibus, ventrem non instrenue purget. Per arterias enim medicamenti vis attrahitur, & per arterias eadem postea purgat. Hæ arteriæ sunt, per quas Colici dolores in Arthritidem, & contra Arthritici in Colicos permutantur, ut apud Hippocratem habemus vi Epidem. sect. iv.

Cur suppositoria ex elleboro facta symptomata inducant.

Cur unctio umbilicali facta purgantibus alvum moveat.

Quæ Colici dolores in arthritidem & contra, vertitur.

Qui articulari morbo, inquit, detentus intestini dolore dextra parte vexabatur, levius habebat: ubi vero hic morbus curatus fuit, magis dolebat. Hujus rei hæc erat causa, quod humor ille qui arthritidem excitabat, ex articulis ad Colon intestinum deferebatur, unde Colici dolores aucti sunt. Andreas Laurentius hujus rei rationem inquirens, ad occultos nobisque incognitos ductus refert, ad quos confugiendum mihi minime videtur, si dicamus, ex Arteriis cruralibus in Truncum, & ex hoc in mesentericos ramos, tandem ab his ad intestina humores translatos esse: hæc enim via brevissima est & commodissima. Nec est ut vereamur illam, quam obicient nobis spirituum vitalium contaminationem, si excrementitii humores per arterias vadant: hoc enim magnam ipsorum tum in Anatomis, tum solida Medicina ignorantiam prodit, facillimumque foret, si velim excurrere, hoc loco probare, magnam quasi partem fluxionum in nostro corpore per arterias fieri. Nam & in Arteriis Naturæ vis eminet, & robustior est, ut quamprimum laceffitur, aptissima sit ad expulsionem: & sanguis continuo pulsu agitur, tum sua natura omnia ad fluxionem aptiora reddit. Et quis non credat per Arterias excrementa ferri, qui fluxiones à Liene considerat, in quo cum quintuplo plures arteriæ sint, quam Venæ, necessarium certe est, ex Arteriis Lienis illam saburram per Arterias exportari?

Magna pars fluxionum per arterias fit.

^{8.} *Lumbares* quatuor, à posteriore sede trunci arteriæ magnæ, secundum ipsius longitudinem, dum circa lumborum regionem progreditur, exoriuntur. Hæ in lumborum vertebrae per communia foramina, & ad ipsorum medullam, nec non in musculos vicinos excurrunt. Quin & ad medullæ latus dum vertebrae ingressæ sunt, utrinque ad Cerebrum, una cum venis lumbaribus ascendunt. Sunt autem omnes sibi æquales, si duas demseris, quæ juxta os sacrum prodeunt, cum non solum ad medullam in vertebrae, & ad conterminos musculos deriventur, sed etiam transversim per peritonæum & abdominis musculos transmittantur. Ex his duæ posteriores *Musculi superiores* à nonnullis vocantur, & à Lumaribus distinguuntur. Atque hæ arteriæ sunt, quas si observemus, multarum rerum, de quibus gravissime disputatum est hæctenus inter Medicos, facillimo negotio rationes reddemus. Sed imprimis difficillimæ illius quæstionis, quæ inter Medicos agitata est, per quas vias & quomodo Colici dolores in Paralyfin aut Epilepsiam terminentur. Habemus enim observationem apud Paulum Aeginetam, lib. i. c. xlii, ubi, Colica, inquit, velut pestifera quadam contagione finiebat, plerique ad morbum comitalem, aliis ad artuum resolutionem, servato sensu: & qui ad Comitialem delapsi sunt, plerique perierunt; qui vero ad Resolutionem, plerique servati sunt, velut in iudicatione causa translata. Ex Colo enim per mesentericas arterias humor morbosus regressus est, ex quo postea translatus in arteriæ magnæ truncum, ad lumbares quoque pervenit, quæ turgescentes sanguine, vicinos compresserunt nervos, ex quibus paralyfis crurum. Et hanc nos sæpe observavimus, cum in aliis, tum in nobismet ipsis, præsertim annis superioribus, quibus Patavii Epidemii erant. Neque tamen semper Paralyfis perfecta est, sed sæpe (ut ego vocare soleo) imperfecta, quod ambulandi potentia non prorsus ablata sit, sed summa quadam difficultate cruribus ægri insistant. Hanc multi eo tempore, hallucinantes circa morbi cognitionem, pro debilitate magna virium ex

Qui Colici dolores in Paralyfin aut Epilepsiam abeunt.

morbo contracta habentes, cibo & potu copiosiore, sed frustra tollere conabantur. De qua re lib. iv de febre semitertiana, cap. xlii, pluribus egimus. Hæc quoque causa est, cur post Colicos dolores Epilepsiæ fiant, imo etiam Lethargi, ut sæpe vidimus; quia materia à mesentericis arteriis transmissa ad Lumbares, ab his facile ad Cerebrum, ad quod ipsa vasa transmigrant, ire potest.

Cæterum Truncus Arteriæ magnæ, ubi ad ultimam lumborum vertebam pervenit, cum toto ductu, quem enarravimus, sub vena cava ad latus sinistrum iter habuerit, hic venam conscendit, ne ab ossis sacri duritie in continuo illo motu atteratur. ^a Dividitur autem non secus ac ipsa Cava in ^b duos ramos insignes, quos Iliacæ arterias à situ Anatomix periti appellant, & oblique deorsum ad fœmur delatæ, Græcorum Y inversum exprimunt. Proferunt autem & ipsæ antequam fœmori inserantur, non secus ac Iliacæ venæ, quibus exacte omnino respondent, ramos aliquamultos. Etenim ex inferiore arteriæ sede, antequam Iliacæ dividantur, ^c Sacrae prodeunt, quæ insignes sunt, deorsumque sacro ossi innitentes delatæ, ipsius foramina ingrediuntur, & ad medullam ipsius ac posteriora sacri ossis excurrunt. Et per has quoque via est materiæ dolorem Colicum facientis, ut Paralyfin crurum efficiat. Hinc paulo infra divisionem trunci, Iliacæ in duos subdividuntur ramos; quorum alter, interior est, & minor: alter, exterior & major. ^d Minor, vel interior Iliaca, duas propagines educit, unam ab externa; alteram, ab interna sede. ^e Exterior Muscula vulgo dicta, à nobis strictiore appellatione, *Gliæa*, quod cum vena ejusdem nominis, inter sacrum & coxendicis os, ubi invicem abscedunt, descendat, pluresque fûculos in musculos ilium ossi incumbentes, Glutæos dictos, quod natium sint authores, porrigat. ^f Interior, *Hypogastrica* dicitur, quæ insignis admodum est & ampla, rectaque deorsum ad ossis sacri inferiorem sedem delata, in *vis* Vesicæ fundo & Cervici, tum etiam recto intestino soboles quasdam largitur, quæ etiam hæmorrhoidales arteriæ dici possunt. In *Mulieribus* vero, quibus paulo amplior hic ramus est, præter dictas partes, etiam in inferiorem uteri fundi regionem, & pariter in illius cervicem numerosam propaginem distribuit. Hinc rationem licet petere, ob quam si Vteri ad medium coxendicis processerint, convulsiones fiant, ut testatur Hippocrates, lib. de natura muliebri. Item, si Vterus ad coxam decubuerit, cur menses supprimantur, & dolor fiat in imo ventre, & in laterum mollitudine. Sanguis enim, qui ad Vterum à Natura pellitur, arteriis compressis à decubitu, in uterum deponi non potest, unde necessario regurgitans, vicinas Venas & Arterias replet, quæ intumescunt dolores hos efficiunt. Vidimus enim sæpenumero in dissectionibus sic turgidis fuisse has venas, ut septuplo sese ampliores fuerint. Hinc etiam ratio reddi potest aphorismi illius, qui est trigessimus secundus quintæ sectionis apud eundem Hippocratem; ubi Mulieri sanguinem vomenti erumpentibus mensibus solutionem fieri testatur. Quod sane, cum omnium consensu fiat per revulsionem, & vero Venarum beneficio contingere nequeat, quod Venæ Ventriculi à Portæ vena, at Vteri à Cava oriantur, non alius consensus quærendus est, quam ille, qui fit per Arterias, maxime cum nec arteria hypogastrica procul à Cæliaca distet. Ex his similiter ratio reddetur sequentis hunc aphorismi, ubi mensibus deficientibus hæmorrhagiam narium salutarem censet. Reliqua pars Iliacæ minoris descendit, & ^g arteriam Vmbilicalem educit, quæ juxta longitudinem arteriæ magnæ defertur, validisque membranis Vesicæ urinariæ lateribus connectitur. Cavitatem autem amittit in iis, qui in has jucundas vitæ auras prodire, quod quomodo fiat, postmodum libro nono pluribus ostensuri sumus.

^h Cæterum hinc non secus ac vena Iliaca, quæ ipsi jungitur, per foramen ossis pubis tendit, quod antequam transit, sobolem ab exteriori Iliaco ramo enatam accipit, sicque foramen exit, à quo ubi discessit; in musculos partim quibus foramen obturatur, partim qui ab osse pubis nascuntur, perinde atque interna Iliaca Vena absimitur. Tandem ubi ad medium fere longitudinis fœmoris terminatur, ipsius extremum cum ⁱ ramis extremis Musculæ cruralis internæ, de qua sequenti capite, ^k coit & unitur.

^l Major, sive exterior similiter duas producit soboles, quarum ^m prima est Epigastrica dicta, & paulo antequam peritonæum perforat, ab externa parte oritur, sursum reflectitur, ac per internum latus musculi recti ascendit, donec circa umbilicum cum mammaria arteria descendente per anastomosin conjungatur. ⁿ Altera, *Pudenda*, quæ interior propagio

Sacra.

Propagines
arteriarum
Iliacarum.
Interioris præ
majoris.
Interioris.
Hypogastrica.

Arteria Vm-
bilicalis.

Interior, sive
hypogastrica.
Epigastrica.

Pudenda.

propago est exigua, cum in tot ramos, quot Vena, non dirimatur. Statim autem, ut a peritonæo abiit, enascitur, & transversim secundum commissuram ossium pubis delata, ad pudendas partes in penis cutim exhauritur. Quod reliquum est hujus Trunci, ² in crus abit, de quo nunc agemus.

CAPUT V.

Iliaci rami exterioris per crus propagati soboles.

OSTQVAM enarratos ramos ^b exterior truncus eduxit, è peritonæo discedit, & ad inguina in crus fertur, per eandem, quam Vena cruralis viam, cui substratus est, & ubique socius jungitur, sicque arteriæ ^c Cruralis Truncum (quem ita vocabimus semper) constituit. Statim autem ac peritonæum superavit, ab exteriori parte propaginem educit, quam ^d Musculam cruralem anteriorem vocant, quæ deorsum lata, in

Truncus cruralis, & eius integritatem diculatur propagines.

1. Muscula cruralis exterior.

2. Muscula cruralis interna.

musculos fœmoris os anteriore sede amplexantes propagatur. Huic è regione interdum, sæpius paulo infra, sed sede interna tamen, alia educitur, ^e muscula cruralis interna vocata, quæ per tertium fœmur flectentium, sive Tricipitem, & per eos, qui interiorem fœmoris regionem tenent, usque ad genu pluribus ramis distribuitur, quorum extrema junguntur cum extremis Iliacæ interioris, quam per foramen ossium pubis ad crus descendere diximus. His propaginibus eductis, Cruralis truncus ab inguine cum Vena crurali descendit, & juxta fœmoris os ita reflectitur, ut ubi ad poplitem pervenit, inter duo fœmoris posteriora capita consistat. Semper enim hoc solers Natura observat, ut vasa circa eam articuli partem deducat, ubi flexura est, ne si ea parte irent, qua extenditur articulus, ipsa comprimerentur. In ipso autem medio quasi itinere, dum per fœmur descendit, ^f propaginem educit, quæ in plures furculos dirempta, per musculos in posteriore fœmoris regione sitos, una cum Vena poplitea excurrit, tandemque per poplitem descendens (unde Poplitea dicitur) frequenti sobole in suram digeritur. In poplite autem jam consistens, utrinque ^g propaginem ad latera articuli genu educit, altius subinde demersam, quæ partim in articulo ipso, partim in duos musculos Gasterocnemios suram constituentes exhauriuntur, unde & Surales arteriæ dicuntur. Postquam ^h in poplite Cruralis truncus consistit, ⁱ ab externo latere sobolem profert, quæ juxta fibulam descendit, & inter abducentem pedem, & secundum tarsum flectentium musculos reconditur, & in reliquos anteriorem tibiæ partem occupantes quousque carnei sunt, & secundum anteriorem malleolum contorqueri incipiunt, distribuitur. Paulo sub hoc dicto ^k alia educitur ex posteriore trunci sede, quæ usque ad commixtionem tendinum Gasterocnemiorum descendit. ^l Alia deinde ex eadem posteriore trunci sede, sed sub secunda prodit, quæ descendens & ligamentum transversum transiens, per pedis dorsum excurrit, in digitos abducentes musculos diffusa. ^m Reliquum trunci per tibiæ posteriora deorsum fertur, & circa malleolum internum pedi ⁿ furculum offert, qui pollicis musculum adit, & pedis deorsum perrepat. Ipse autem truncus inter tendines musculorum digitorum pedis latens, in duos ramos ^o dissecatur; quorum ^p interior, pollicis duos, duos indici, unum medio: ^q exterior vero, duos minimi, duos huic proximis digitis, inferiore sede largitur. Caterum etsi arteriarum progressus magna ex parte talis sit, qualem descripsimus, quod tamen supra de Venis diximus, non solum pro individuum diversitate, sed etiam laterum in eodem homine, ipsorum distributionem plurimum variare, id etiam de arteriis tenendum est, quæ aliis hominibus alio modo se habent.

3.

4.

Arteriæ non eadem semper propagines.

CAPVT VI.

Vena arterialis, & Arteria venalis historiam complectitur.

Vena arteria-
lia.Arteria ve-
nalis.

Ortus.

Inferus.

Distributio.

Vfus.



T perfecta omnibusque suis numeris absoluta sit hæc de Venis & Arteriis tractatio, colophonis loco historiam tertix Venæ & secundæ Arteriæ nobis apponere libuit. Vocatur ^a Vena, arterialis; & Vena quidem ab officio, quod Veteres sanguinem deferre ex dextro cordis ventriculo credidissent: at arterialis, à tunica arteriarum membranæ simili, cum simplex non sit, ut Venarum, sed gemina. Arteria contra, venalis dicitur; & arteria quidem, quod aërem devehere attractum per pulmones Antiqui statuerint: Venalis autem, quod substantia corpori venarum respondeat, cum simplex sit tunica, nec admodum crassa. Rejecimus autem utriusque tractationem in hunc præcipue locum, ut de utraque simul ageremus, cum & ex eodem viscere nascantur, & in idem inferantur, prætereaque eadem distributione gaudeant. Enascuntur enim ex Corde; & Vena quidem ex editiore sede dextri ventriculi; Arteria autem ex sinistri. Implantatur autem & exhauritur utraque in Pulmonum substantiam, & Vena quidem per dextrum asperæ arteriæ latus porrigitur, Arteria autem per sinistrum. Mox in duos utraque secatur ramos; quorum alter, ad dextram; alter, ad sinistram pulmonum partem abit, utroque iterum bifariam secto, atque his in ramos alios, donec in minutissimos furculos dispergantur. Rami autem majores sese invicem comitantur, ut vena cum arteria perpetuo incedat, multis anastomosibus junctæ, in quarum medio asperæ arteriæ rami excurrunt. Insignia autem vasa sunt, majoraque longe, quam pulmonum magnitudo requirere videtur, cum partes illæ, ut diximus libro superiore, quæ plurimum dissipant alimenti, venas ampliores requirant; nulla autem sit, quæ pulmonibus ob perpetuum & indefinitum motum plus digerat. Harum ^{usum} omnes fere, qui hætenus in Anatomicis aliquid scripserunt, unanimi consensu prodiderunt esse, ut Vena quidem pulmonibus alimentum afferat; Arteria autem à pulmonibus haustum aërem ad Cor deducat. Quæ opinio absurdissimo fundamento nititur, sanguinem scilicet nulla ratione in hac arteria contineri, in quo confutando prolixiores essemus, nisi anatomicam inspectionem, & experientiam satis superque falsitatem demonstrare sciremus. Quare ab iis potius standum existimo, qui à dextro cordis ventriculo ad pulmones per Venam arterialem sanguinem transmitti credunt, & hinc in Arteriam venalem per anastomoses deduci, à qua postea ad Cor transportatur, ubi magis elaboratur sanguis ille dextri ventriculi, & fit spirituosus, sicque per Arteriam magnam in universum corpus, pro vita singularum partium, pellitur. Nec verum est aërem in Arteriam venalem rapi, cum foramina ibi nulla sint, sed aër qui per Laryngem in asperam pulmonum arteriam raptus est, bronchia omnia refrigerat, quod frigus cum adjacentibus vasis communicetur (diximus enim ubique bronchia ferri in medio Venæ arteriosæ & Arteriæ venosæ) refrigerat simul sanguinem in ipsis contentum, qui Cor ingrediens calorem illum nimium attemperat, ut propterea opus non sit aërem in substantia ad Cor transferri.

FINIS LIBRI SEXTI.



ADRIA-

ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS,
DE HUMANI CORPORIS FABRICA.
LIBER SEPTIMVS,

Qui universam Nervorum historiam complectitur.

CAPVT I.

Nervorum naturam, actionem, & differentias explicat.



EX vasis superest ut de NERVIS agamus, quos etsi in postremum locum rejecimus, ob causas, quæ superius à nobis sunt expositæ, primo tamen loco haberi ab iis debent, qui vel ex Philosophiæ studio delectationem, vel ex Medicinæ usu fructum aliquem eximium & præclarum cupiunt percipere. Quis enim est, qui nesciat animalium totam naturam in sensu motuque consistere, quarum facultatum vectores sunt Nervi? sed multo minus quisquam ita ignarus est, quin sæpe sæpiusque cognoverit, maximam morborum partem, qui nostrum corpus infestant, has ipsas vires lædere, quibus affectis, Homo omnium animalium præstantissimum, à trunco inutili & à stipite, non nisi sola & quam misere etiam trahit, vita differre potest. Quare non solum jucundissima est Nervorum cognitio: sed & ex omnibus maxime necessaria, ut ad unguem teneatur: at cum in ea haud leves sese difficultates offerant, conabimur quantum in nobis est, summa omnia perspicuitate ac diligentia persequi. Exordiemur autem à definitione, quam postea nobis consuetudo more breviter enodabimus, cum primum vocis homonymiam, ne qua obscuritas nascatur, è medio tulerimus.

Nervi ergo vox multiplici vulgo significatione sumitur. Primo pro ligamentis, de quibus libro tertio scripsimus; quo pacto accepit Hippocrates lib. de Arte, cum Nervi, inquit, ad ossa protensi, articulorum sunt vincula. Sic & Arist. lib. III Hist. de anim. dum ossa omnia, sive foris vicissim tangantur, sive alterum inferatur alteri, nervis ligari proficitur. hinc natum est, ut apud Anatomicos *συνδσµωτες* ea articulationis officium species dicatur, quæ ligamentorum inter se connexionem perficitur. Vocantur & nervi tendines illi, qui in musculorum sine cernuntur; ex quo factum deinde, ut illa musculi in tendinosam substantiam degeneratio, *συνδσµωτες* dicatur. Sed & Venas nervos fuisse nominatas ab Hippocrate, author est in Onomastico Erotianus, & exemplum ejus rei habemus in lib. de usu humorum. Arterias quoque eodem nomine antiquissimis venisse, Ruffi Ephesii testimonio constat. Propria tamen significatio illa est, qua nos utemur, & cui ipsa quoque nominis ratio maxime convenit, cum *νεῦρον*, *ἀπὸ τῆς νεύειν*, à nutando, seu flectendo: & *νῆρ* (nam & sic vocatur) *ἀπὸ τῆς τένειν*, à tendendo, propria scilicet nervorum actione dicatur. Musculi enim nervorum potissimum beneficio, & flectere quamcunque partem, & tendere consueverunt.

Est autem NERVVS, Vas candidum, duplici constans membrana, ad omnem intensionem aptissima, in qua substantia quedam alba ac medullaris continetur, à Cerebro, unde oritur, spiritum animale pro sensu & motu singularum partium voluntario deferens. Dum vas dico, genus ipsius exprimo, eademque volo intellecta, quæ in superioribus libris hoc nomine intelligenda diximus: puta, esse longos, teretes, canales, & si quæ sunt alia. Est autem vas candidum, qua voce statim à Venâ & Arteria, quæ & ipsæ vasa sunt, distinguitur; cum alba quidem sint, præsertim Arteriæ; non tamen ad eum appulerint gradum, ut vasa candida dici mereantur. Constas vas hoc duplici membrana, ut vulgo tradunt, quarum utraque à cerebri membranis oritur, cum nervus cerebrum compactum videatur. Exterior ergo crassa est, & à crassa meninge nasci dicitur, ad quam ex vicinis venulis furculi quidam impense

Vallens hujus doctrina.

Homonymia.

1.

2.

3.

4.

5.

Definitio.

Est genus nervi.

Duplex membrana nervi. Venula nervi dicitur. Et nutritio nervorum tunc est.

impense exiles derivantur, iis, quæ per corneam oculorum tunicam disperguntur, non dissimiles. Has in iis nervis, qui paulo crassiores sunt, evidenter conspicias: at maxime omnium comparebunt, si qua inflammatio circa nervos suborta fuerit, quemadmodum eadem venulæ, quæ corneam pervadunt, cum ob tenuitatem cerni alias non possint, in ophthalmiis egregie in conspectum se proferunt. Vanum ergo est, quod Aristoteles observavit, lib. 111 Hist. de anim. cap. v: humorem circa nervos mucori similem consistere, albidum, glutinosum, ex quo ipsi nervi & nascantur & nutriantur, cum alimentum suum ab his venulis habeant. *Interior membrana tenuior est, & à tenui cerebri membrana profecta.* Sed revera, si accurate advertas animum, nervos potius ex infinitis quibusdam funiculis contextos, & ope harum membranarum invicem connexos observabis. Id enim tibi, si per transversum nervum dissecueris, manifeste clarum reddetur. Vtunque sit, utraque membrana *ad intensionem aptissima* est, ut hoc solo nomine, quæcunque in corpore tendi apta nata sunt, quemadmodum uniti musculorum tendines & ligamenta ossium, propterea nervorum appellationem sibi adsciverint. Tenduntur enim in longitudinem quam maxime, si trahantur: rursusque relaxati, in priorem contrahuntur magnitudinem. Quod ipsum Aristoteles laudato loco nobis suggerere voluit, dum nervi naturam fissilem inquit, & in longitudinem tendi; scindi autem per latitudinem non citra difficultatem posse. *Coninet autem in se gemina hæc membrana substantiam albam ac medullarem,* quam si alicubi, perquam optime tibi certe licebit cernere in nervo optico, membranis suis involuto, & nonnihil digitis compresso. Substantia hæc nihil aliud est, quam ipsissimum cerebrum, à quo nervi omnes exortum suum trahunt, si quidem cerebri vocabulo quis intelligat, non illud tantum, quod calvaria continetur, sed etiam per spinam universam producit. Exortus autem hic non tantum ratione ipsius productionis intelligitur; sed etiam facultatis, cum à Cerebro nervi & prodeant, & facultatem nanciscantur. Sunt enim, ut reliqua omnia vasa, canales quidam, in sese deducentes facultatem, ad obeundas actiones illas in singulis partibus, quibus destinatum est id viscus, à quo oriuntur, cum in singulis partibus ipsum esse nequeat. Vt ergo Cor, cum universum corpus ex uno corde extrui neutiquam potuerit, facultatem vitalem per arterias undique diffundit: ita Cerebrum, quod in solo capite sua substantia consistit, ut viribus sit ubique, nervos in omnes partes digerit.

Facultas hæc, sensus est, & motus: non ita tamen, ut quævis pars ad quam nervus pertingit, sentiat & moveatur: neque ut alius nervus sit sensus delationi, alius motui destinatus, quemadmodum censuerunt nonnulli: sed ut unus idemque nervus, pro partis constitutione vel utrumque, vel alterutrum impertiat. Clarissimum hoc est in sexta nervorum conjugatione, quæ laryngis musculis, utrumque: Lien renibusque, alterutrum tantum largitur. Et hunc esse nervorum usum, ex eo licet satis concludere, quod nervo constricto aut dissecto, protinus sensus motusque ejus partis auferatur, in quem nervus ille inseritur. Hoc in canibus eleganter demonstrare licet: aut, quod melius est, in suibus, dum nervi Recurrentes dicti filo constringuntur. Si enim alterutrum ligaveris, mediam tantum vocem edi: at si utrumque, protinus totam auferri observabis: redire autem iterum vocem confestim, si vinculum dissolveris. *Nervi ergo sentiendi movendique facultatem deferunt:* & horum quidam solum sensum, ut qui in cutim inferuntur, & primum par Opticum vocatum: *nonnulli motum simul & sensum,* quemadmodum secundum par, in oculorum musculos digestum. Quin imo nec unum tantum sensum, utcunque ipse nervus unicus sit, sed interdum plures dispensat uni organo; ut dictus Opticus oculo non videndi tantum, sed & tangendi facultatem offert. Ita sextum par nervorum cerebri laryngi, motum & sensum; cordi, sensum solum tactus; Ventriculo autem, præter hunc etiam famis & sitis sensum largitur. Repudianda ergo eorum est sententia, qui octo nervorum paria intra calvariam orta, sensorii tantum dicata putant; reliqua vero extra nata, motui; cum clarissimum cuius sit, secundum nervorum par, oculorum; sextum autem, laryngis musculis motum tribuere. Cæterum *motus* hic *voluntarius* est, qui & fisti cum cupimus, & concitari potest: *facultas* ipsa à Galeno *animalis* dicitur, quod solis animalibus inest, & per eam animalia à plantis distinguuntur. Cum autem nulla facultas, si proprie loquamur, ab anima separabilis sit, dicimus tamen ipsam ad hanc aut illam partem deduci, quod anima immediatum illius facultatis organum eo transmittat, spiritum

Nervi ex innumeris funiculis contexti.

Cerebrum ut hic spongiæ.

Facultas hæc non est alius nervos sensus, alius motus.

Facultas animalis.

spiritum nempe animale, in cerebro ex vitali spiritu elaboratum. Revera enim ipse spiritus substantiam à Cerebro per nervos diduci, ex eo videtur perspicuum, quod partes compressæ & stupentes, ubi motum recipiunt, aliquid formicarum instar repentinum perferre videntur. id enim profecto neutiquam contingeret, nisi pars affluxionem spirituum interceptam antea redire ad se perciperet. Probare hoc conatur & alio modo, nec male profecto Galenus, lib. vii de Placit. cap. iv, exemplo oculorum, quorum uno clauso, alterius pupilla subito dilatari ob spirituum affluxum (non certe alia de causa) conspicitur. *Neque vero est, ut quisquam nervorum angustias accuset, quæ spiritum non admittant, cum cuius id notorium sit, spirituum animalium tantam esse subtilitatem, ut fulminis instar omnia pervadant: & in vivo sanoque corpore non omnia ita collapsa esse, dum calore vitali adhuc perfusa sunt, quin pori satis aperti ubique & evidentes, etiam ipsis in ossibus reperiantur. Qui enim de poris cuiusque partis ac densitate recte iudicaturus est, eum modò mactatorum animalium carnes, nervos, visceraque contemplari oportet, quemadmodum sæpe nos conspicuos nostris oculis poros in pluribus invenimus, qui in diu extinctis prorsus latebant. Frustra quoque nonnulli propterea ambigunt, quod ægre animo comprehendant, quæ temporis momento à centro corporis ad extimas usque partes hic spiritus diffundatur. Sed ego profecto etiam mirer & ipse, & in hac re immensam Conditoris nostri potentiam agnoscam, non possum tamen non propterea facile, quæ fiat id, animo concipere, cum idem in sanguine videamus contingere, qui uno ictu oculi, modo à corde ad vultum effunditur, modo à facie ad cor iterum regurgitat. Quis enim non sæpenumero vidit, vultum cuiuspiam commissio aliquo scelere, temporis momento rubedine suffusum; rursus roseum vultum nunciato aliquo desideratissimi amici inoperto obitu in pallorem subito conversum? Quod si sanguis, qui sua natura terrenus est, spirituum vitalium beneficio, indicibili quadam velocitate agitur, quid non speremus de animalibus spiritibus, quibus nescio an subtilius quid alicubi in tota hac rerum universitate reperitur? Quamobrem jam concludamus, usum nervorum non esse alium, quam animalis spiritus à Cerebro transmissi, temporis momento, pro sensu motuque voluntario partium; deductionem.*

Videamus nunc quæ differentia in nervis occurrat: quas ut ordine investigemus omnes, ea contemplabimur, quæ singulis instrumentis insunt, deducta à substantia, forma, magnitudine, numero, similibusque. Prima ergo differentia est, quæ occurrit ratione substantiæ, cum ii, qui à cerebro proficiscuntur, dum adhuc in cranio est, molliores sint; qui vero ab eodem prodeunt, dum per spinam dorso fertur, duriores. Rursus ex iis, qui à cerebro enascuntur in cranio, molliores sunt illi, qui ab anteriore parte, quam qui à posteriore: & ex iis, qui dum extra calvariam fertur, oriuntur, molliores sunt qui à superiore, quam qui ab inferiore proveniunt. Duri ergo erunt, qui ex cervicis medulla emergunt: duriores, qui ex thoracis: omnium durissimi, qui ex medulla in vertebribus lumborum & ossis sacri contenta enascuntur. Omnes autem, summam loquendo, quanto breviores sunt, tanto quoque sunt molliores: & quanto longiores, tanto duriores; cum in ipso itinere magis magisque indurescant. Caterum Galenus lib. xvi de Usu part. cap. ii existimat, molliores esse factos ad sensum; cum facilius objectorum species admittat quod molle est: duos, ad motum; cum sint robustiores. At ego longe aliud Naturæ consilium fuisse statuo, cum mollium nervorum quidam musculos moveant, ut secundum par: & durorum aliqui sensum impertiant, ut è cervice prodeuntes nonnulli, alique sparsi ad cutem rami, adeoque respexisse eo potius, ut quibus longum iter faciendum est, in ipso itinere salvos integrosque præstaret. In figura hoc discrimen observatur, quod etsi omnes nervi teretes sint ac rotundi, circa origines tamen nonnulli aliquantulum depressi videantur. In opusculo quoque sensibilem meatum notavimus cum Herophilo & Galeno; in reliquis utcumque magnis nunquam id observare licuit. Sed magnitudo complures suggerit differentias. Respondet enim ubique (ut iusta solet esse Natura in omnibus) magnitudini earum partium, quibus distribuuntur; inque primis illorum, qui motui inserviunt. Nam qui sensum deferunt, potius sentiendi magis minusve exquisitam facultatem respiciunt, unde oculi insignem nervum obtinent, Hepar exiguum. Sunt ergo alii crassissimi, ut qui in brachia & crura distribuuntur: alii mediocres, qui ad sensuum organa digeruntur; alii graciles, qui in musculos exiguos

Spiritus in substantia nervos pervadunt.

Respondet ad versus.

Vitis.

DIFFERENTIE.

A substantia.

Cur quidam nervi molles, alii duri.

A figura.

A cavitate.

A magnitudine.

At videntur.

propagantur. Notatu autem dignissimum illud est discrimen, quod ab exortu petitur. Nonnulli enim uno continuoque principio prodeunt, ut Optici; alii pluribus & distinctis, postea in se coeuntibus, ut tertium, quartum, & quintum par cerebri, dum in cranio adhuc est. Vtunque autem prodeant, alii, secundum Veteres, à Cerebro proprie & stricte sic dicto; alii vero, à spinali medulla exordiuntur; & hi iterum, vel à principio ipsius medullæ, dum scilicet adhuc in cranio est; vel à progressu, dum in spina fertur. At nobis omnes ad unum ex medulla cerebri oblongata prodire videntur, cum (quemadmodum ultimo libro docebimus) spinalem medullam, non ut vulgus, processum cerebelli oblongatum, sed tam cerebri, quam cerebelli productionem cum doctissimo Varolio credamus. Alii ergo dum hæc medulla calvarie adhuc inclusa est, enascuntur; quorum communiter cum Galeno septem paria vel conjugationes censentur, utrinque enim prodeunt: non incommode tamen octavum par addideris, quod olfactui intervit: alii vero, postquam cranium reliquit, & per dorli vertebrarum foramina procedit, jamque spinalis medulla proprie dicitur. *Florum triginta paria sunt; septem medullæ cervicalis, duodecim dorsalis, quinque lumborum, tandemque sex medullæ ossis sacri.* Hi omnes eadem serie & modo in utroque latere disperguntur, excepto solo sexto pari ejus medullæ, quæ in cranio adhuc est, cujus dexter nervus, aliter paulo ac sinister distribuitur. Ab illis, omnibus sensuum vocisque instrumentis, tum visceribus, rami transmittuntur: ab his, universis musculis, qui sub capite sunt. Cæterum, ut breviter loquamur, nec obscuritatem tamen inferamus iis, quibus nostra de cerebro sententia nondum cognita est, quam infra demum persequemur; illos nervos, qui ab oblongata cerebri medulla nascuntur, dum in cranio adhuc est, *Cerebri nervos* perpetuo vocabimus; reliquos vero, qui oriuntur, dum per spinam descendit, *nervos à spinali medulla proprie sic dicta* profluens dicemus. Priorum officia nonnemo duobus carminibus exprefsit, quæ cum digna sint ut memorie mandentur, huc descripsimus:

Optica prima; oculos movet altera; tertia gustat;

Quartaque, quinta audit; vraga sexta est; septima lingua.

Nervorum
paria 38.

Sunt igitur nervorum in universum triginta octo paria, quæ diligenter unicuique addiscenda, qui feliciter medicinam facturus est, ut sciat quo loco remedia applicanda sunt, dum sensum aut motum alicujus partis, vel imminutum, vel prorsus abolitum videt. Sed nos nunc singulorum historiam aggrediamur à Cerebri nervis exordientes.

CAPUT II.

De Nervis Cerebri.

Primum par
cerebri.Exortus
ipsius.
Progressus.
Inferio.Membranz
degenerant in
tunicas oculi
rati.

X octo conjugationibus, quæ à medulla cerebri oblongata, dum cranii limitibus adhuc coercetur, oriri diximus, primo loco se offert ea, quæ a, 70
Opticos nervos constituit, fama apud omnes dissectionum proceres admodum celebratos. Hi enim non tantum, si crassitiem spectes, maximi sunt: sed etiam omnium corporis nervorum facile mollissimi. b Oriuntur b, 10
autem ex medio basis cerebri, parte anteriore, ex opinione Veterum; sed revera, si capite inverso dissectionem administres (quæ ratio genuina à Varolio primum ostensa est) ex principio truncorum priorum spinalis medullæ, ut quasi in occipitio eorum sit exortus, statimque versus conjugem sensum contententes, supra ossis sphæroidis sellam uniuntur, (non, ut voluerunt quidam, tantum junguntur) & commune corpus quadratum confusa interiore medulla constituunt. Inde protinus iterum separati, uterque in sui lateris oculum oblique fertur, per c foramen, quod ossis cuneiformis primum est, orbitam ingredientem, & in ipsum oculi centrum desinentes. In hoc pari commode licebit demonstrare duas illas membranas, quas dixi in nervis esse, à duobus cerebri meningibus derivatas: tum ipsam etiam substantiam interiore medullarem, quæ à Cerebri corpore profiscitur. Ipse tamen nervus in plures ramos, ut alii, non discinditur; sed latefcens, oculi tunicas constituit, & ex crassa quidem membrana, Corneam; ex tenui, Vveam: ex medullari autem substantia, Retinam efformat. Cum primum enim ad oculi centrum appulit, membranz hæc expanduntur, & humores sphaera confecta in se concludunt. Nervi hi oculis videndi facultatem subministrant, unde

Ufus.
Foraminis
nervorum
opticonum.

Problemas

11

Observations

20

30

Nota.

7. 10.

5.2.1.

Rami.

2

par, five opticum ascendens, in duos, tum palpebræ, tum oculi levatorem digeritur: *alter* valde conspicuus, pluribus furculis in adducentem disseminatur: *tertius* nec ipse obsecurus, primo in duas, mox in plures fibras divisus, in oculi depresso: *quartus*, in obliquum inferiorem, five minorem circumagentem oculum versus angulum anteriorem. Tandem fibras quasdam tenues educit, quæ junctæ cum primo pari, exterioribus oculi membranis distribuuntur, adeo ut ad quatuor tantum musculos oculi hoc secundum par propagetur, tum ad eam, qui palpebram attollit. *Vfus* hujus paris est, facultatem motricem musculis oculorum impertire.

Tertium par. Exortu.

Rami.

Observatio.

Observatio.

Nota.

1.

3.

4.

Vfus.

Quartum par. Exortu.

Rami.

2.

3.

Nota.

TERTIUM PAR ex inferna & posteriore medulla cerebri sede, exiguo nervulo oritur, rectaque sub cerebri basi versus anteriora excurrit, secundæ conjugationi, cum qua dictum *secundum* ossis cuneiformis foramen oculi orbitam ingreditur, attensum. Mox in quatuor ramos digeritur; ex quibus *primus*, obliquorum oculi superiori & majori, five Trochleæ musculo vocato, ramulum offert, inde per *4* foramen ossis frontis supra orbitam exsculpto elapsus, in cutem & *c* musculum frontis (quem potius supercilii musculum dixeris) definit. Ramus hic diligenter notandus est, quod observari olim, ipso levi vulnere læso, palpebram prolapsam, dum supercilii musculus propterea paralyfin incurrerit. Vidi etiam eandem paralyfin natam ex medicamentis frigidis & narcoticis, pro somno conciliando importunitis adhibitis. Sed & ex his ratio reddi potest, cur Hippocrates *1* prognostic. inter lethalia signa retulerit, in acutis morbis semiapertis oculis dormire. Malum enim hoc signum est propterea, quod significet ficcato esse admodum nervos, adeoque & cerebrum; ex quo fit, ut ægri tales plerumque convulsi postea moriantur. Solet quoque in nonnullis Epilepsiæ prælium in palpebris, facie tota ac oculis eodem nomine oboriri, cum tertium hoc par ab humoribus epilepsiam generantibus vellicetur, sicque convulsio oculorum & faciei nascatur. *Secundus* ramus, deorsum fertur & per *2* quarti maxillæ superioris ossis foramen, quod sub oculi orbita est, excidit, statimque in faciei anteriore parte in plures dissectus propagines, in musculos superius Labium & nasi alam abducentes, tum in ipsum labium ac gingivas dentium incisiorum absumitur. *Tertius*, per *1* foramen secundi ossis maxillæ superioris, post carunculam lacrymale in oculi interiore angulo positam, in narium amplitudinem transmittitur, per tunicam ejus diffusus; ex quo fit, ut acutissimo sensu sit prædita, leviterque tantum attracta sternutationem efficiat. *Quartus*, per *4* eam rimam, quæ inter primum superioris maxillæ os est, & cuneiforme in externo oculi angulo, five per quartum foramen ossis sphenoidis egreditur, & ad anteriorem temporalem musculi partem secedit. *Vfus* hujus est, dictis musculis vim ac facultatem movendi adferre.

QUARTUM PAR ex medulla cerebri, sede posteriore enascitur, & per foramen ossis cuneiformis *6* sextum è cranio egreditur, rectaque descendens tres ramos à se propagat. *1* Primus est statim à transitu, qui vitis aut cucurbitæ capreolorum in morem aliquoties contortus, & *2* duobus furculis *3* nervi auditorii (de quo jam dicturi sumus) unitus, postea in maxillæ inferioris attollentem temporalem & abducentem, tum buccarum, furculos digerit. Hinc ulterius descendens, *2* secundum promittit, qui in gingivas superiorum dentium molarium, ipsos etiam dentes furculos feriatim propagat. *Tertius*, à posteriore parte egressus, *1* maxillæ inferioris foramen ad processum fundamenta in superficie interna insculptum ingrediens, radicibus dentium ordinatim ramulos largitur, ac tandem per anterius *4* foramen in exteriori superficie positum egrediens, in inferius labium ejusque cutem terminatur, quod *2* reliquum ejus est in linguæ tunicam juxta radicem exhauritur, & sic aptitudinem saporis dignoscendi offert. *Notetur autem hoc loco*, duo hæc paria quæ nunc recensuimus, tertium inquam, & quartum, ab Anatomicis communiter pro uno recenseri, eoque tertio: sed hæc tamen distinctione, ut dicant hoc ipsum duplici radice oriri, altera quidem tenuiore, altera crassiore. Tenuiorem radicem vocant, quam nos tertium par statuimus: Crassio-rem, quam nos quartum. Sed nos distinguimus, quod revera neque in exortu suo, neque in progressu invicem conjungantur. Quartum autem par quod ipsi statuunt, à tertio non videtur distinguendum, ut Valverda ipse libro VII Anatomiae, cap. IV concedit.

^a QUINTUM PAR ex medulla cerebri oblongata, ea sede, qua cerebelli portio annectitur, prodit: enatum ex duobus nervis, quorum alter mollior, alter durior est. Egrediuntur hi una membranam, & per foramen ossis temporum, quod in processu ejus petroso insculptum est, in signe satis & tortuosum, auditus organa intrant. Inde durior illa portio confestim in priora abit, per canalem peculiarem vecta, ac rursus per idem os, oblique ad posteriora recurrit, & in primam auris internæ cavitatem secedit: hinc reflexus magis duas propagines educit, unam, superne; alteram, inferne: sed utrinque per proprium foramen transit. ^b Superior per transversum ejusdem ossis foramen fertur, per quod vena quoque in auditus organum pertransit, & paulo post egressum ^c quarti paris ramo, prout nos tradidimus; vel ut communiter alii paria numerant, tertii, quem capreoli vitis ritu in orbem agi diximus, commiscetur. ^d Inferior per tertium ejusdem ossis foramen, quod angustum valde est, & tortuosum exit, & transversim supra musculum maxillæ inferioris lateralem delatus, in fauces descendit, aliquam multis propaginibus in nares disseminatis. Confestim autem ^e quarti paris propagini capreolum imitanti commiscetur, sive furculo illi, qui ad linguam abit, à qua ad dentium radices, & musculos buccarum, uti & cutim auriculæ radicem ambientem abit. Per hunc ramum Anatomici credunt fieri, ut qui furdi nascuntur, etiam muti fere fiant. Cæterum mollis illa portio, cum dura portione fertur: at ubi ad primam auris illam cavitatem pervenit, membranæ in modum per ipsam expanditur, sicque merito Nervus auditorius dici meretur, cum spiritus omnes ad auditum ipse suggerat.

^f SEXTUM PAR paulo magis versus inferiorem ac posteriorem partem, quam quintum exoritur: nec uno, sed compluribus à se diremptis nervulis, qui tamen simul junguntur, et si non adeo coalescant, ut unicum omnino efforment, sed duos distinctos semper, una tamen membrana à dura cerebri meninge enata coercitos, quæ res imposuit multis, ut pro uno habuerint. Sic juncti descendunt simul è cranio per ^g secundum & tertium foramen occipitii, per quod idem minor Carotidis arteriæ & major venæ Iugularis ramus calvariam ingrediuntur. Duo ergo cum sint nervi, alter in egressu magis vergit ad partem priorem dicti foraminis, ac minor est: alter, ad posteriorem, ac major. Ille, mox ab egressu è cranio recta deorsum ad linguæ fauciumque musculos tendit, & ad partes in ore collocatas, in quas totus absumitur: hic contra, ^h primam propaginem ad eos, qui posteriorem cervicis partem occupant, præcipue in primum scapulæ musculum, sive Cucullarem: deinde septimo parti, dictæque Arteriæ & Venæ membranarum quarundam beneficio adhærens, ad laryngis latera descendit, cujus musculis, præcipue internam cavitatem tenentibus, transversim ⁱ furculos largitur. Hic cum plures nervorum propagines inter se concurrant, iterumque disjungantur, ^j plexus quidam constituitur, in quo ^k nodi glandulis, vasorum divaricationibus attentis, non absimiles reperiuntur, quod primum observavit doctissimus Anatomicorum Fallopius, qui olivaris corporis imaginem referre voluit. Cæterum ipse nervus major, inter eadem, quæ dixi, vasa medius incedens sensim à larynge ad asperam arteriam fertur, ad cujus latus descendens, ad Thoracem tendit. Prius tamen quam hunc ingreditur, supra jugulum in duos ramos dirimitur; ex quibus alter, exterior est & minor: alter, interior & major. De horum distributione & propaginibus nunc breviter agemus, sed ita, ut cum dexter quam sinister truncus aliter disseminetur, separatim utriusque historiam proponamus, & primum quidem dextri, deinde & sinistri.

^l DEXTRI ergo nervi ramus exterior, protinus à divisione ^m propagines emittit ad flectentem caput Mastoideum vocatum musculum, tum hyoidis, sternohyoideum inquam, & laryngis, sternothyroideum; inde thoracis cavitatem ingreditur, ac ubi ad arteriam axillarem pervenit, ab interiore sui latere nunc tres, nunc duos educit ⁿ furculos, unum sub altero, qui circa dictam axillarem arteriam, tanquam axem, aut (ut verius dicam) trochleam quandam reflectuntur, & una coeunt unum constituunt ^o nervum, qui dextro asperæ arteriæ lateri membranæ beneficio adnexus, ab infima sede ad summam recurrit, ad dextrum laryngis latus festinat, glandulæ incumbens, quæ dextri lateris radici apposta est. Hanc ubi superavit, in plures confestim ^p furculos dirimitur, quæ in sui lateris musculos in larynge fitos, & qui capita deorsum habent,

Quintū par.
Exortus.

Dux portio-
nes.
Durior.

Mollis.

Sextum par.
Exortus.

Minor ner-
vus.
Major ner-
vus, & ejus
propagines.

1.

2.
Plexus nervo-
rum sexti pa-
ris.
Nodi.

Rami nervi
majoris.

DEXTRI
nervi ramo-
rum historia.
Exortus
propagines.

2.

Dexter recur-
rens nervus.

habent, motum ipsis concedentes, absumuntur. Atque hic nervus à progressu ^a Re-
currens dicitur, estque celeberrimus apud omnes, à sapientissima Natura magna pru-
dencia conditus, ut in musculos laryngis, quorum capita deorsum spectant, inferatur,
cum omnes nervi motum largientes capitibus inferi debeant, & versus finem spectare,
non contra. Et quia larynx vocis instrumentum est, vox autem non nisi motis musculis
perficiatur aut aperientibus laryngis cartilagine, aut claudentibus: idcirco constri-
ctis vinculo, aut abscessis his nervis, qui facultatem se movendi contrahendique mu-
sculis impertiunt, vox animali demitur. Id in canibus aut porco, quod ille latrando,
hic grunniendo indefinenter vocem edat, egregie demonstrari potest. Altero enim
nervo resecto, dimidium vocis adimitur; at utroque protinus tota aufertur. Consti-
tuta recurrente propagine, ramus exterior sub jugulo oblique descendens, postquam
in itinere ^b furculos mediocri amplitudinis in Pleuram & Pulmonis tunicam digessit, tum
^c alios Pericardio & Cordi ipsi largitus est, ulterius descendit intra mediastini duplica-
turam, & juxta vertebrae in duos ^d ramos dividitur, qui stomachicum nervum dextrum
constituunt oblique feruntur, & diaphragma inde una cum oesophago perforantes,
cui nullum tamen ramum impertiunt, in sinistram Ventriculi orificium ^e pluribus ra-
mis, reticuli instar, exhauriuntur, id quod ita cum sinistro nervo cingunt, ut totum
ex nervis constare videatur. Hinc tantus non modo cum cerebro ventriculi consensus
est; sed etiam cum corde, ut ii affectus sint, qui orificio superiori dolorem inferunt, cor-
dis esse videantur, & revera quoque sint, patiente eodem corde dolorem ob dolen-
tem hunc nervum. ^f Atque hæc vera causa est, nervi scilicet hujus communio, non
vicinitas utriusque visceris, ut alii dicunt. Interior ramus ad anteriorem sedem radices pri-
mæ costæ thoracis abit, & sub pleura vertebris adhaerens, per radices reliquarum co-
starum descendit, à singulo intercostali nervo è dorsi spina prodeunte ^g ramulum assu-
mens, inde cum Arteriæ magnæ trunco descendente diaphragma permeans, ad os us-
que sacrum defertur, ad cujus regionem ternas profert propagines, quæ in viscera
naturalia distribuuntur. ^h Prima inferiorem omenti membranam adit, perque eam de-
scendens in ramulos tres dirimitur; quorum ⁱ unus, dextro ejusdem membranæ lateri
distribuitur, coloquem intestino, qua parte ipsi committitur; ^j alter, minimus & exilis
admodum, intestinis duodeno & jejunum circa principium; ^k tertius, ventriculi fundo
parte dextra, & superiori omenti membranæ, quæ tamen paulo amplior est, com-
municatur. Quod ^l restat hujus propaginis in jecoris cavam partem, & fellis vesicu-
lam absumitur. ^m Secunda, in dextrum renem & ejus membranam abit. ⁿ Tertia, quæ
grandior utraque jam dicta, ad primam lumborum vertebram descendens, in melen-
terii dextram partem & intestina alligata porrigitur, mesenterii centrum cum Arte-
ria & Vena comite ingressa. ^o Reliqua pars in vesicam, & in mulieribus in fundi uteri
dextram partem facit.

SINISTRI
nervi ramo-
rum historia.
Exterior pro-
pagine.

1.
2.
3.
Recurrens si-
nister.

4.
5.
6.

Interior pro-
pagine.

1.
2.
3.

^a SINISTRI autem nervi ^b ramus exterior, statim in descensu Pleuræ primum & Pul-
monis tunica extrorsum, mox Pericardio ac Cordi ipsi furculos introrsum offerens, ad
arteriæ magnæ truncum descendente ea sede, qua primum è corde prodit & ad spi-
nam inflectitur, ^c tres educit furculos, qui ad dictam arteriam revoluti in unum coeunt
nervum, qui sinister ^d Recurrens nervus vocatur, & similiter ut dexter sursum progreditur
& in laryngis musculos propagatur. Inde tenuem educit furculum, qui per cordis basin
ejusque tunicam capillorum modo distribuitur. ^e Reliquum postea descendit, & dex-
trorsum oblique se inclinans ad orificium superius Ventriculi abit, in cujus partem dex-
tram, ut dexter ante in sinistram, diffunditur, multos in ramulos, retis in modum, dis-
tributum. Ab hoc furculus secundum elatiorem Ventriculi regionem ad pylorum de-
fertur, quem ubi nonnullis furculis quasi implicavit, ^f in cavum jecoris proficiscitur.
^g Interior ramus, primum ab intercostalibus propagines assumit, deinde diaphragma
penetrans in tres propagines dividitur. ^h Prima, quæ transversim ad ⁱ Lienem proficisci-
tur, & in itinere duos furculos educit; ^j unus, qui similiter in inferiorem omenti mem-
branam & coli intestini partem, quæ ipsi attenditur; ^k alium, qui in Ventriculi fundum
sinistram superioremque omenti membranam mittitur. ^l Secunda, in mesenterii sini-
stram partem, ejusque loci intestina abit. Nonnunquam etiam furculos promittit, qui
cum vasis seminariis ad testes per processum peritonæi excurrunt. ^m Tertia, sinistram
renem

renem ejusque pinguem membranam: quod reliquum est, ad sinistram vesicæ & uteri fundi partem accedit. *Vfus* hujus pariter ut satis manifestus est, ita nobilissimus; cum exterior ramus, visceribus mediis: at interior, omnibus infimi ventris ramulos largiatur, & dexter quidem, dextri; sinister autem, sinistri lateris. Præter hunc usum, Recurrentibus quoque ramis ad vocem formandam confert, facultatem motricem Laryngis musculis impertiendo.

^{III. 7.} ^b SEPTIMUM PAR in postrema occipitii sede, ubi medulla cerebri jamjam cranio egressura est, exoritur, adeoque omnium in Calvaria nascentium nervorum durissimum habetur. Oritur autem aliquot radicibus inter se disjunctis, quibus utrinque in unum coeuntibus, per ^c quartum & quintum occipitii foramen (quæ inter maximum illud, unde spinali medullæ descendenti via patet, & illud, ex quo sextum par exit, sita sunt) cranium egreditur, statimque post egressum cum sexto pari membrana communi involvitur, unde quidam non diligenter advertentes committeri crediderunt, sicque una descendunt. Vbi ad linguæ radicem pervenit, in omnes ejus musculos ^d sutculos digerit, nonnullos etiam ad quosdam ossis hyoidis & laryngis transmittens, quemadmodum & eos, qui à styloide appendice initium petunt. *Vfus* hujus conjugationis est, facultatem sentiendi movendique à cerebro linguæ musculis deferre.

^{III. 8.} Septem his paribus, quæ vulgo sic recensentur, ^e OCTAVUM addimus, quod nervos olfactorios constituit, per quos à cerebro ad externos rerum odores apprehendendos facultas defertur. Hos vulgo ex cerebri substantia medullari in basi ipsius juxta primum par pronasci asserunt: at sectio cerebri nova, quæque inverso administratur ordine docuit, ad cerebri extrema latera oriri ea sede, quæ supra auditus foramina est; unde patet, hæcenus dimidia tantum sui parte demonstrata fuisse. Sunt autem in exitu suo admodum acuti & à se distantes: cæterum sensim versus priora proficiscentes, inter supremam & mediam cerebri prominentiam crassiores evadunt, & ad se inclinant propius, sicque tandem supra ossis spongiosi sinus intra cranium recumbunt. Intruduntur hi in cerebri processus mammillares: at Galenus & Marinus (quos fere tota Anatomicorum cohors sequuta est) Nervorum nomine vocare noluerunt, etsi colore, ductu, & usu ipsis omnino respondeant, quod nec productiones reliquorum nervorum instar habeant, nec cranii cavitatem egrediantur: sed mihi non aliud profecto committere sophisma videntur, quam ii, qui dentes à numero ossium expulerunt, quod membrana exterius non involvantur, ut alia, etsi hoc neque ad ossium, neque illud ad nervorum essentiam quidquam faciat.

C A P V T III.

De nervis spinalis medulla proprie sic dicta, & primo quidem vertebrarum Cervicis.

NATURA solers rerum parens quemadmodum Nervos condidit, ut essent vehiculum facultatis spirituumque in Cerebro genitorum, quod Cerebrum ipsum per totum corpus diffundi haudquaquam poterat: sic cum idem minime posset Nervos universis partibus opportune largiri ob nimiam distantiam, Spinali medullam effinxit, quæ nihil aliud est, quam cerebri cerebellique medulla per longum dorso vertebrarum ductum extensa.

Proinde visis jam iis nervis, qui à Cerebri medulla, dum adhuc in cranio coercetur, originem suam ducunt: reliquum nunc est, ut & eos inspiciamus, qui proficiscuntur ab eadem medulla spinæ vertebris inclusa. Dicitur autem medulla, non quod affinitatem aliquam cum medulla ossium ratione suæ substantiæ obtineat: sed quia medullæ instar vertebrarum offibus inclusa est: at substantiam continet cerebro similem, quam & ipsam Plato medullam vocabat, & hoc nomine spinalis vel dorsalis dicitur, ad differentiam utriusque, in spina non coercitæ, sed vel in calvaria, ut Cerebrum, vel in ossium cavitare, ut quæ proprie medulla indigitatur. Substantia hæc duabus tegitur membranis, non secus ac Cerebrum ipsum, unde originem deducit; altera, crassa; altera, tenuiore; quas involucrum quoddam tertium, validum & membraneum investit, quod Galenus vertebrarum ligamentum putavit. Facta autem in eum finem est, ut motum & sensum

B b

sensum

senſum muſculis & membranis, ad quas Cerebri illa paria non pertingunt, diſtribuat. Proinde cum nervorum ab ea naſcentium bene magna ſit multitudo, eam tamen ad certas quafdam claſſes facile reduxerimus, ſi dicamus omnes *triginta* conſtituere *paria*, ex quibus *ſeptem* ad medullam pertinent, dum per cervicis vertebraſ vehitur; *duodecim*, dum per thoracis; *quinque*, per lumborum; & tandem *ſex* ad eam, quæ ſacri offis foraminibus continetur. Egreſſiuntur autem nervi hi per foramina vertebrarum; & *vel gemino exortu*, priore ac poſteriore parte, quemadmodum accidit in primis duabus colli & quinque ſacri offis conjugis, quæ non à lateribus, hoc eſt, dextra vel ſiniſtra parte oriuntur, ſed anteriùs & poſterius binos ramos educunt: *vel ſimplici*, per unum in utroque vertebrarum latere exſculptum, ut in reliquis ad unum omnibus evenire ſolet, in quibus unus nervus à dextro, alter à ſiniſtro latere procedit. *Primum autem & ſecundum par à gemino initio incipit*, ne ſi ſimplici inchoaret, à vertebrarum commiſſura læderetur, quod craſſius foret: aut ſi foramen majus fieret, vertebrarum os, quod per ſe ſatis tenuis fuit, ruptioni obnoxium redderetur. Vtrumque ergo malum ut evitari poſſet, duplex initium ſapiens Opifex exſtruxit: unum quidem, ab anteriore; alterum vero, à poſteriore parte. *Cæterum* ubique dextri rami ad dextrum latus, ſiniſtri ad lævum abeunt, & eodem utrobique modo diſtribuuntur.

Primum par cervicis. Primi principium. *PRIMUM* ergo par, *primo & priore principio*, ab anteriore ſpinalis medullæ parte exoritur, & inter occipitis os ac primam cervicis vertebraſ egreditur, juxta latera illius ligamenti teretis, quo ſupra dentiſformem ſecundæ vertebraſ proceſſum occipitis offis anteriori lateri alligari diximus, atque ſic in muſculos collo inſidentes & oſophago ſubſtratos, cervicis, inquam, flexores diſtribuitur. *Altero, & poſteriore*, ſimiliter per foramen, quod occipitis offi ac primæ cervicis vertebraſ commune eſt, juxta poſterioſiorem partem excidit, ſed *gemino ſurculo*; quorum *alter*, gracilis, in rectos minores & ſuperiores obliquos capitis extenſores abſumitur; alter, in principium muſculi ſcapulam attollentis exporrigitur.

Secundi paris Primi principium. Poſterioris principium. *SECUNDUM* par, *priore principio* (quod gracilius eſt poſteriore, quamquam utrumque ſat gracile videatur) ab anteriore medullæ parte enato, inter primam & ſecundam vertebraſ ad latus proceſſus dentiſformis exit, quod in muſculos collo incumbentes, quemadmodum & primi paris ramus prior, qui inter ſe complicantur, diſtribuitur, totumque fere in faciei cutim exhauritur. *Poſteriore*, per latera poſterioris ſecundæ vertebraſ proceſſus elabitur, ſed mox in duos ramos inæqualis amplitudinis ſinditur; quorum ille, qui *crasſior* eſt, à priore parte ad poſterioſiorem contendit, qua inter ſe muſculi, utrinque cervicis partem poſterioſiorem occupantes, congregiuntur, ibique *commixtus* cum *tertijs* paris nervorum ſurculo tertio, per medium dictorum muſculorum excurrit, ex poſterioribus ad anteriora revertens, ſicque in *universam* capitis cutem ad uſque ſummum verticis, quemadmodum & ad aures diſtribuitur. *Alter*, qui *tenuior* eſt, in rectos majores & obliquos inferiores capitis extendentes muſculos inferitur. De hiſce ramis Galenus mentionem facit libro *xv* de Locis male affectis, quem locum non pigebit huc tranſcribere, cum ad hujus doctrinæ uſus illuſtrationem plurimum faciat. *Caput*, inquit, *cujusdam non ita pridem impoſitis medicamentis vehementer calefacientibus ulceraverunt, putantes ſenſum ipſius graviter leſum hoc pacto poſſe revocari. Nos vero hunc ipſum ſanavimus, inventa ſede affecta tum ex reliquis accidentibus, tum ex procacitatibus cauſis. De ſingulis enim diligenter interrogavimus, atque unam ex ipſis hanc eſſe invenimus, cum ſub multa pluvia à vento impetuſo ambulante, pallium circa cervicem madefactum, adeo ut vehementi ſe frigore in ea parte affectum ſentiret. Itaque ſi ſciveris, ex primis ſpina vertebris quatuor nervos ad caput aſcendere, à quibus cutis ipſum ambiens ſenſum accipit, facile ſedem affectam invenies. Hac igitur ſanata, capitis quoque cutis ſanata eſt, utpote que nulla primaria affectione laborabat. Atque hinc ſatis apparet, quanti interſit medendi rationi ſedem affectam bene inveſtigari; ei vero inquirendæ, Anatoſes eſſe quam peritiſſimum.*

Tertij paris Ramus anterior. *TERTIUM* par, ex communi & laterali foramine, quod inter ſecundam & tertiam vertebraſ eſt, emanat, ſtatimque ab egreſſu in duos ramos ſcinditur, ex quibus *anterior* in quatuor propagineſ ſubdividitur. *Prima*, primum cervicem ſtectentium, ſive longum accedit: *ſecunda* deſcendit, & cum *ſurculo quarti paris unita* in muſculos oſophago ſubjacentes finitur: *tertia*, aſcendens, cumque *ſecundi paris modo dicti ramo* craſſiore

crassiore coiens, in cutim capitis posteriorem exhauritur. ^a *Quarta*, communicata primum musculus transversalibus, sive primo pari cervicem extendentium & scapulæ levatori; quorum ille, in transversis processibus cervicis finem; hic, initium habet: tandem in quadratum buccas detrahentem, quem *ῥαδνόςμα μυῶδες* à Galeno vocari diximus, digeritur. ^b *Posterior*, in secundum par thoracem extendentium implantatur.

^c *QUARTVM par*, ex communi foramine tertiæ quartæque vertebræ prodit, ac perinde ut tertium in duos ramos inæquales diducitur. ^d *Anterior & major*, in tres alios furculos finditur: quorum ^e *primus* ^f cum alio tertii paris ramo jungitur, & ad primum par & longum cervicem flectentium proficiscitur: ^g *alter*, in transversalem cervicis seu primum extendentium, & primum scapulæ musculum, Cucullarem dictum: ^h *tertius*, cæteris gracilior, cum quinti paris furculo, & quinti cum sexti uniti ramo junctus, juxta mediastinum seu thoracem intersepientem membranam, & supra pericardium deorsum procedit, ut ex tribus hisce principiis nervus diaphragmatis extruatur. ⁱ *Posterior*, versus spinam commigrat sub musculis eo loci collocatis, quibus etiam aliquamultos ramos largitur, inde inter musculos utriusque lateris cervicis deorsum delatus ad quadratum buccas detrahentem musculum fertur. *Hoc loco operæpretium est quærere*, quæ ratio sit, quod qui resolutione totius corporis tentantur, nihilominus Diaphragmatis motum liberum aliquamdiu habeant. *Respondent nonnulli*, id fieri, quod etiam à cerebro nihil spirituum transmittatur, attamen ex spinali medulla diffundi queat. Sed illi id quod in principio est petunt, cum nos ponamus nihil hinc spirituum venire, quod videamus omnes totius corporis musculos, ad quos à spinali medulla nervi mittuntur, resolutos esse. *Quare aliam responsionem querendam duxi*, dicendumque, Diaphragmati duos motus competere; unum, qui est voluntarius, quo utimur dum valide respiramus; alterum, naturalem, ubi fibræ per se extenduntur & contrahuntur. Hoc ergo naturali motu Homo servatur, cum videamus respirationem illam parvam esse & debilem, ac quanta sufficit, ut pulmones moveri aliquantulum possint.

^k *QVINTVM par*, inter quartam & quintam vertebram exit, & perinde ut duo proxime præcedentia, in duos ramos finditur. ^l *Anterior*, aliquot furculos educit. ^m *Primus*, cervicis flexores petit. ⁿ *Alter*, cum quarti & sexti paris propaginibus, quandoque & septimi, tum scilicet cum quarti ramus deest, juxta latus œsophagi per vertebrarum cervicis anteriora descendit & diaphragmati inferitur, sicque nervum phrenicum constituit. ^o *Tertius*, ad secundum humeri musculum, attollentem scilicet & Deltoidem dictum, per humeri sedem superiorem & externam fertur, unde ramuli primo & secundo, hoc est, Cucullari & levatori scapulæ musculo transmittuntur. ^p *Quartus*, ad scapulæ cervicem in duos scinditur; quorum ^q *prior*, in Deltoidem, qua parte à clavícula enascitur, abit: ^r *posterior*, & crassior in quartum par ossis hyoidis, quod coracohyoideum vocant, inferitur; inde musculo superescapulari superiori & deltoidi, quâ parte à scapulæ spina oritur, ramulum impertitur. ^s *Posterior*, versus spinam torquetur, & eodem modo ac posterior quarti paris ramus distribuitur.

^t *SEXTVM par*, sub quinta vertebra egreditur, similiter ut reliqua paria in duos ramos divisum. ^u *Anterior*, & *major*, ubi *furculum* ^v illum propagavit, quem cum ^w quarto quintoque pari diximus jungi, ad ^x nervum phrenicum constituendum, ulterius procedens cum duobus sequentibus, septimo inquam colli primoque thoracis pari unitur, rursusque ab illis disjungitur, & iterum cum iis unitus, retiformem quandam plexum efformat, à quo nervi prodeunt, qui ad brachium feruntur. ^y *Posterior*, fertur ad musculos posticos, caput & cervicem extendentes.

^z *SEPTIMVM par*, à medulla derivatur cervicis, & per commune foramen sextæ septimæque vertebræ prodit. Hujus *ramus anterior*, & *major*, ^a cum sexta colli ac prima thoracis statim ab egressu suo conjungitur, & ad brachium maxima ex parte cum cæteris fertur. ^b *Posterior*, & *minor ramus*, ad musculos cervici incumbentes, & quadratum buccas detrahentem abit.

Posterior.

Quantū par.

Ramus anterior.

Propaginet.

1.

2.

3.

Posterior.

QUESTIO.

Quintū par.

Ramus anterior.

Propaginet.

1.

2.

3.

4.

Posterior.

Sextum par.

Ramus anterior.

Propaginet.

Posterior.

Septimū par.

Anterior ramus.

Posterior.

CAPVT IV.

De nervis medulla vertebrarum Thoracis.



Omnia Tho-
racis conjugia
bifida.

Primum par.

Anterior ta-
mus.

Posterior.

Secundum
par
Ramus ante-
rior.

Posterior.

Reliqua de-
cem paria.

Anteriores
rami.

SPINALI medulla, dum per dorsi vertebrae excurrit, duodecim conjugationes prodeunt, ut recte doctissimus Vesalius censuit, utcumque in totidem vertebrae undecim tantum foramina sint exculptra, quemadmodum objiciebat Columbus, quia inter extremam cervicis vertebrae, & primam dorsi, primum par intercedit, quare inter thoracis potius quam colli paria adscribi debet. Omnia haec conjugia post egressum bifariam dividuntur; alterque ramus, qui major est, semper anteriorum; alter, qui minor, ad posteriora refertur, & ad musculos dorso incumbentes.

PRIMUM ergo par nervorum, qui à medulla thoracis prodeunt, ex communi foramine septimae cervicis vertebrae, primaeque thoracis egreditur, eodem modo atque quinque proxime dicta paria, eademque etiam ratione in duos ramos confestim dividitur.

Anterior & major, partim septimo cervicis, partim secundo thoracis nervo unitur, eo modo, quem antea exposuimus; totusque sic in brachia postea exhauritur, & unica propagine excepta, quae ad principium ipsius enata dictis conjungitur, & in priora juxta primae thoracis costae longitudinem ad sternum excurrit, subclavio musculo furculum elargiens, deinde reflexus sursum in musculos, qui à sterni summo originem ducunt, absumitur. Tales sunt flexor capitis, Mastoideus dictus, detrahens hyoides, sive sternohyoideus, & primus thyroideum laryngis cartilaginem extendentium, sive sternohyoideus. In hos tamen posteriores duos nonnunquam rami à sexta cerebri conjugatione & tertia thoracis transmittuntur. Idem etiam ramus ubi aliam excessit, commigraturus ad brachium aliam quandam sobolem à posteriore sui sede educit, quae ad musculum scapulae cavitatem occupantem abit. Posterior ramus & minor, sub musculis, qui vertebrae adnati sunt, latitat, & soboles aliquot in secundum cervicis flexorem musculum, & extendentes Caput ac Cervicem impertit: at ubi septimae vertebrae spinam attingit, transversim ad humiliorem sedem abit, & in inferiorem partem primi scapulae musculi seu Cucullaris, & tertii ejusdem sive Rhomboidis, tum serratum posticum superiorem furculos digerit.

SECUNDUM par, inter primam & secundam thoracis vertebrae erumpit, & perinde in duos ramos finditur. Anterior cum primo thoracis pari unitur, atque sic cum quinto, sexto, septimoque cervicis, primum ac secundum thoracis nervorum paria uniuntur invicem, ut alii ab aliis non dignoscantur, sed rete efficiant, haud dissimile illis galeris, quae ex Cardinalium pileis dependent; ex quo postea omnes nervi, qui ad brachia vadunt, emergunt & originem trahunt. hic ramum spargit, qui per primum costarum intervallum secundum primae costae ductum ad usque pectoris os progreditur, primum intercostalem nervum constituens, à quo furculi in musculos thoraci incumbentes distribuuntur. Posterior ramus, eandem quam praecedentis paria, disseminationem habet.

RELIQUA decem paria nervorum thoracis, eandem & exortus & distributionis rationem observant. Omnia enim è communibus vertebrarum foraminibus ad latera prodeunt, & ab egressu statim in duos inaequales finduntur ramos; quorum alter, anterior est & major; alter, posterior & minor. Anteriores, qui intercostales nervos constituunt, in priorem partem feruntur, & singuli ramulum secundum longitudinem ordine largiuntur interiori ramo sexti paria, qui sub pleura ad costarum radices descendit. Rami hi cum venis & arteriis intercostalibus junguntur, cum quibus simul transeunt secundum costae longitudinem ad partem priorem, per sinum, qui ab inferiore & interna costarum sede insculptus est. Ceterum qui ad veras costas pertinent, ad sternum usque progrediuntur: at qui ad spurias, in abdominis anteriora supra peritonaeum feruntur. Ab his multi rami in musculos intercostales disseminantur, non tantum internos, sed & exteriores, quemadmodum & alios qui thoraci incumbunt, quales sunt quartus & quintus scapulae musculus, sive duo serrati antiqui, tum & latissimus humerum abducens. Similiter in primum par musculorum abdominis, tum cutem thoracis ab intercostali

costali quinto circa costæ medium propago musculum intercostalem perforans abit: & quadripartita in pectoralem humerum adducens, tum cutim distribuitur, à quibus ^afurculi papillas postea petunt, & acutissimum sensum impertiunt. ^bPosteriores retrorsum ad spinam contendunt inter musculos vertebrae adnatos, qui thoracis extensioni præfunt. Nec tamen in hos toti exhauriuntur, sed ubi spinarum apices jam attingere, inter utriusque lateris musculos, qua parte sibi mutuo junguntur, excidunt; sicque postea musculus omnibus, qui ab apicibus spinarum vertebrarum exoriuntur, nervos concedunt. Tales muscoli sunt primus caput extendentium Triangularis vel Splenius dictus, tertius scapulam movens five Rhomboides, primus scapulæ Cucullaris, tertius humerum abducens latissimus, Aniscalptor vocatus, tum serratus posticus. Aliquantum multi quoque furculi in cutem dorsi distribuuntur.

CAPUT V.

De nervis medulla vertebrarum Lumborum.



SPINALI medulla, dum per lumbos fertur, tametsi quatuor tantum foramina sint, quinque tamen paria oriuntur, cum inter extremam thoracis vertebram & primam lumborum primum par intercedat. Perinde autem, ut de thoracis nervis diximus, & egrediuntur per communia foramina, & distribuuntur egressa, cum à singulis statim ab exitu unus ramus, isque grandior, ad anteriora: alter minor, ad posteriora dispergatur. Anteriores rami, ad abdominis musculos; posteriores, ad eos excurrunt, qui vertebrarum spinis, ossibusque in-

nominatis incumbunt, unde ramulos nonnullos & cuti lumbos investienti impertiunt. Eodem autem modo anteriores invicem nectuntur, primus cum secundo, secundus cum tertio, tertius cum quarto, & quartus cum quinto, quemadmodum diximus brachii nervos inter se, dum plexum retiformem constituunt, complicari.

^cPRIMUM ergo par, quemadmodum & cætera, sub peritonæo egressum vertebrarum commune foramen, quod inter ultimam thoracis & primam lumborum vertebram est, protinus ab egressu in duos finditur ramos. Anterior, qui major est, in diaphragmatis carneas portiones, tum principium primi fœmur flectentium musculi, ^dhæc dicti, abit. ^eAb hoc furculus quidam principium ducit, cum præparante arteria ad testem plerumque porrectus. ^fPosterior, in musculos lumborum vertebræ à posteriore parte incumbentibus, ut sunt primus & tertius thoracem extendentium; quorum ille dorsi longissimus; hic, sacrolumbus dicitur, cum sit lumborum extensor: at ubi à spinarum apicibus prodeunt, qua parte musculi dicti sibi junguntur, ad latera excurrunt, & in latissimum humeri abductorem implantantur.

^gSECUNDUM par, sub primo fœmur flectentium musculo ^hhæc egreditur, inter primam & secundam lumborum vertebram. Hujus anterior propago, ad secundum fœmur flectentium ossis ilium cavitatem implentem, & primum tibiæ flectentium fasciæ, tum cutim fœmoris digeritur. Posterior, abdomen egrediens, tribus fœmur extendentium, five Glutæis, & tibiæ extensori membranoso distribuitur.

ⁱTERTIUM par, similiter sub primo fœmur flectentium musculo, inter secundam & tertiam vertebram prodit. Anterior ramus prope ilium ossa transit, duas propagines digerens; unam, quæ ad genu, ejusque cutem proficiscitur: ^jalteram, quæ Venam mallooli interni, Saphenam dictam comitatur. Posterior, reflectitur & in musculos lumbis instratos disseminatur.

^kQUARTUM par, omnium lumbalium nervorum maximum est, & sub dicto musculo fœmur flectente, tum pubis ossæ delatum, venam & arteriam cruralem comitatur.

^lQUINTUM par, & ultimum, inter quartam & quintam vertebram emergit, cujus anterior ramus foramen, quod inter coxendicis os, pubis atque ilium est, transit, & propages duobus fœmur circumagentibus, Obturatoribus dictis; alias, flectentium fœmur secundo & tertio offert; alias, ad penis musculos digerit: posterior, in musculos & cutem vertebræ infiltratam abit.

CAPVT VI.

De nervis medulla ossis Sacri.

Primum par.



MEDVLLA tandem, quæ ossis sacri vertebrae coërcetur, sex ultima nervorum spinæ paria egrediuntur. Ex his ^a *primum*, inter ultimam lumborum vertebrae & primam ossis sacri emergit, eodem prorsus modo, ac reliqua à lumborum vertebraeeducta, similiter eodem quoque modo in duos ramos distribuitur. *Anterior*, etsi nervis cruralibus admisceatur, ^b *furculum* tamen juxta ossis ilium internam regionem transmittit, & in abdominis musculos ac secundum fœmur flexentium dispergitur. ^c *Posterior*, in musculos ab ilium osse pronatos, maximeque in primum fœmur extendentium sive Glutæum magnum, tum cutim natium disseminatur.

Reliqua quinque paria.

RELIQVA Quinque *paria*, propriam quandam rationem habent; adeo ut priusquam egrediantur ex osse, singula ab utroque latere gemina sint, sicque à singulis utrinque geminus nervus feratur; unus, in anteriorem; alter, in posteriorem partem. *Anteriorum tres superiores*, veluti & primi paris, ad crus abeunt: duo inferiores, in ani & vesicæ musculos: & in *fœminis* ad uteri cervicem; in *viris*, ad penem: in utroque autem sexu, ad pudenda externa. *Posteriores*, distribuuntur musculis ossis ilium & sacri, posteriorem sedem occupantibus. Hujusmodi sunt primus & tertius thoracem extendentium, sive dorsii longissimus & sacrolumbus; flexor lumborum Sacer dictus, & latissimus humerum abducens, tum tres fœmur extendentes, natium authores, ideoque Glutæi dicti. Atque hic est spinalis medullæ extremus finis, quæ in coccygis os penetrans, hoc modo terminatur: hæcque historia triginta parium nervorum, quæ ex spinali medulla egrediuntur, quæ diligenter & accurate memoriæ mandanda est, ut sciamus cui loco remedia applicari debeant, si quando ab externa causa, puta casu ab alto vel contusione, aut insigni compressione pars aliqua vel motum, vel sensum, aut utrumque amiserit. Principio enim semper illius nervi, qui in affectam partem inferitur, applicanda sunt; non loco, in quo symptoma animadvertitur.

CAPVT VII.

De nervis per Brachia distributis.

Ortus nervorum per brachia.



NUMERATIS nunc iis nervis, qui per viscera & musculos trium Ventrium disperguntur; reliquum est, ut eos quoque describamus, qui per artus propagantur. Occurrunt hic primum *per brachia digesti*, quorum sex paria vulgo ab Anatomicis constituuntur, orta à quinto, sexto, septimoque pari nervorum à medulla cervicis prodeuntium, & à primo ac secundo illorum, qui è thorace emergunt. Egrediuntur hi nervi per communia vertebrarum foramina utrinque, & protinus ab exitu inter se anterioribus majoribusque ramis uniuntur, mox à se iterum separantur, rursus junguntur, & postremo separantur, adeo ut videantur retiformem quandam *plexum* efformare, qui non melius quam cum galeris illis Cardinalium comparari potest. Nervorum hic implexus sub clavicula eo loci, quo Venæ Arteriæque axillares thoracis cavitatem egrediuntur prodit, & ab hac omnes brachii nervi originem suam ducunt. Incertus tamen admodum exortus est ob nexum; quamobrem nos in ipsis referendis cæterorum vestigiis, quam nostris observationibus potius insitemus, ne temere & præter necessitatem novarum rerum studiosi fuisse videamur.

Primum.

^a PRIMVS ergo *nervus*, qui ad brachium fertur, soboles est duplex, tertia nempe & quarta anterioris rami quinti paris cervicis. ^c *Alter* enim ramus, ad secundum humeri musculum deltoidem fertur, & cutem ipsi instratam: ^e *alter*, versus scapulae cervicem, ubi in duos finditur; quorum ^b *prior*, in deltoidem, qua parte à clavicula oritur, abit: ^d *posterior*, in quartum par musculorum ossis hyoidis, coracohyoideum inferitur; inde supercapulari superiori & deltoidi, quo loci à scapulae spina oritur, ramulum largitur. *Hic*, per humeri elatiorem partem excurrit:

at reliqui

at reliqui quinque nervi, per alam ad brachium feruntur, ibidemque in plures disperguntur ramos.

^a SECUNDVS crassior est, & à plexu illo retiformi, de quo diximus, originem sumit, neque tamen à quo nervo satis perspicuum esse potest. Hic per anteriorem & mediam brachii partem defertur, quod sub primo cubitum flectente, five bicipite musculo ea sede ingreditur, qua duo ejus capita inter se uniantur, & ubi tendines inferuntur tum pectoralis humerum adducuntis, tum deltoidis eundem attollentis. Sub hoc ergo musculo reconditus, ^b duos furculos utrinque unum emittit, qui duo capita bicipitis ingrediuntur; deinde circa medium longitudinis humeri, sub eodem bicipite musculo incedens, ^c alium furculum profert, quo mediante cum tertio nervo jungitur, indeque descendens ab externo latere in progressu ^d furculum distribuit capiti longioris radium pronatoris. Vbi jam ad cubiti flexuram pervenit, juxta externum latus tendinis dicti bicipitis musculi ad membranam carnosam ductus, in cutem digeritur, duos in ramos divisus; quorum alter, externus est; alter, internus: ille, gracilior; hic, crassior. ^e Externus ergo, cum venæ cephalicæ ramo per cubiti sedem externam aliquo usque delatus, ad pollicis internodium secundum ^f distribuitur. ^g Internus, in duos ramos sub communi brachii vena five Mediana subdividitur; quorum qui ^h exterior est, oblique sub cute procedens, relicta vena versus radium abit usque ad carpum: ⁱ interior vero, basilicæ ramo interiori, cum obliquius incedat, attensus, in cubiti regione in duos ramos præcipuos finditur; quorum ^k unus, per radii; ^l alter, per cubiti regionem ad carpum, indeque hoc superato, in manus internæ cutim distribuitur.

^m TERTIVS brachii nervus, five tertius, qui ad brachium fertur, proxime secundo subjacet, & perinde ut ipse à plexu illo retiformi oritur. Hic dum per alam progreditur, antequam adhuc brachium attigit, ⁿ sobolem expromit, qui inter pectoralem humerum abducentem & deltoidem eundem elevantem sub cute dispergitur. Cum primum autem brachium attigit, sub Bicipitem musculum five primum cubiti flexorem se recondit, ac deorsum una cum secundo nervo procedens, ^o ramulum in caput secundi cubitum flectentis expromit. Hinc descendens à secundo nervo ^p ramum accipit, quo mediante invicem junguntur, indeque ulterius per brachii anteriora in cubiti flexuram contendit, æquali semper intervallo à secundo nervo distans, interni humeri tuberculo ejulque anteriore sede invecus. Vbi hoc superavit, complures ^q propagines educit, quæ una cum ramis à quinto nervo, qui per ejusdem tuberculi posticam regionem vehitur, diductis in musculos, internam cubiti sedem occupantes & ab interno humeri tuberculo enatos distribuuntur. Tales sunt duo quatuor digitorum extrema internodia flectentes, & ille qui tertium pollicis articulum curvat. Inde aliam expromit propaginem, quæ inter dictos hos musculos per radium una cum Vena arteriaque ad carpum defertur, & sub transverso ligamento transiens, tenues quosdam furculos disseminat in abductorem pollicis musculum & duos primum ejusdem articulum flectentes. Posthæc ubi ad volam manus pervenit, in tres ramos ^r dirimitur; quarum ^s prima, furculos duos pollicis; ^t secunda, duos indicis; ^u tertia denique, unum medio digito circa internum latus communicat.

^v QUARTVS nervus, omnium qui ad brachium feruntur amplissimus est, cum triplo fere cæteros crassitie vincat. Oritur hic non minus ac reliqui à plexu retiformi, indeque per brachium similiter ac tertius, ubique inter musculos in profundis latitans, vena basilica arteriaque axillari sociis defertur. Protinus autem ac brachium ingressus est, ^w plures, sed exiguos furculos in capita musculorum cubitum extendentium derivat, & antequam ad dimidium longitudinis humeri pervenerit, oblique deorsum ad os humeri contorquetur, interque hoc & musculos cubitum extendentes progreditur. Prius tamen quam totus reflectatur, ab interno sui latere ^x furculum educit, qui inter dictos musculos, tum secundum cubitum flectentium incedit, & in cutim internam brachii sedem investientem absmitur, sursum deorsumque fibris nonnullis propagatis. Sobole hac disseminata, sensim properat per posteriorem sedem ad externum brachii latus, per sinum externi humeri ossis tuberculi in postica ipsius regione exculptum invecus, ubi similiter ^y furculum promit, qui cutem accedit humiliori sedi externi lateris brachii obductam; deinde ^z alium, qui in cutim usque in carpum digeritur. Inde juxta cubiti articulum

³
Rami duo.
Extremi.

Internus.

Quintus.

Sextus.

culum in duos ramos dividitur, externum & internum; qui in profundo & inter mœculos abdit, quemadmodum & totus truncus, ad carpum descendunt. ^a *Externus*, secundum radii longitudinem incedit, & ubi ad carpum pervenerit, transversum ligamentum ab exteriore parte transit, moxque in duos ramos ^b subdividitur; quorum *unus*, duplici furculo in externam pollicis sedem; *alter*, partim in indicem, partim medium absumitur. ^c *Internus* vero secundum cubiti longitudinem porrectus, soboles exigit plures; & ^d *primam* quidem, in mœculum primum digitorum extensorem; ^e *secundam*, in extendentium digitos secundum: ^f *tertiam*, in extendentem carpum anteriorem. In ipso autem ^g progressu tribus mœculorum principiis ab ulna sive cubiti osse originem ducentibus propagines largitur. ^h Reliquum quod est, in carpum terminatur.

ⁱ *QUINTUS nervus*, inferius quam quisquam commemoratorum ex eodem plexu retiformi productus, quartoque junctus, per brachii internam sedem inter flectentes & extendentes cubitum mœculos descendit. Nullam hic sobolem de se spargit, sed integer remanet eo usque, dum ad internum humeri tuberculum devenit, ad cuius posteriorem sinum reflectitur, & pari postea serie cum tertio nervo, qui per anteriorem regionem ejusdem tuberculi procedit, distribuitur. Vterque enim ^k *propagines* largitur mœculis, qui ab interno humeri tuberculo enascuntur, & cubiti internam sedem occupant. ^l *Sarcolum* quoque educit, qui per radium vectus, inter mœculos secundum ac tertium digitorum internodia flectentes incedit, sicque ad volam manus abit, & ramum educit primum, qui bipartitus minimi digiti interiori parti inferitur: deinde alium, qui & ipse bifariam scissus, in annularem; ac tandem alium, qui ad externam sedem interni lateris medii digiti proficiscitur. Caterum ex eodem hoc quinto nervo, & ab externo latere juxta medium longitudinis radii ^m *alius quidam furculus* nascitur, qui divisus in tres ⁿ ramos, in externam partem medii, anularis, ac minimi digiti disseminatur.

^o *SEXTUS nervus*, ab infima sede plexus retiformis emergit, & per axillam, humerique & cubiti interiorem sedem sub cute incedens, ad internam humeri ossis tuberculum properat, pluribus in hoc itinere furculis ad ^p cutim vicinam dispersis. Cum primum autem tuberculum hoc attingit, in multas *propagines* scinditur; quarum *aliæ*, basilicæ Venæ ramis subjiciuntur; *aliæ*, incumbunt, sicque sub cute delatæ ubi ad carpum devenerint, ^q terminantur.

C A P V T V I I I .

De nervis per Crura digestis.

NERVORVM, qui per crura propagantur, quatuor sunt paria. Oriuntur hæc à tribus inferioribus lumborum, & quatuor superioribus ossis sacri conjugis, quæ ubi per communia vertebrarum foramina egressæ sunt, non secus ac nervi, qui ad brachium distribuuntur, retiformem quandam plexum, illo tamen longe majorem efformant. Nec tamen ^r quali magnitudine præditi sunt, sed ^s *primus* & ^t *tertius* tenuis est, unde & ad scæmur tantum perveniunt; ^u *secundus*, paulo crassior, etiam tibiæ attingit: at ^v *quartus*, tres reliquos etiam junctos solus crassitie superat, & usque ad extremos digitorum apices defertur.

^w *PRIMVS* ergo, ex elatiore plexus retiformis parte, ^x qua tertius lumborum nervus cum quarto coit, exoritur. Fertur autem deorsum statim sub peritonæo ad scæmur, externo lateri tendinis primi scæmur flectentium mœculi incumbens, ad quod ubi pervenit, ^y *sobolem* educit, quæ per cutem anteriorem scæmoris usque ad genu articulum excurrit, ibique terminatur, & ^z primo tibiæ flectentium mœculo, tum secundo & tertio eandem extendentium furculos offert.

^{aa} *SECUNDVS nervus*, ex eodem plexu nascitur, & quidem infra primum, è regione connexionis tertie & quartæ lumborum vertebræ. Hic cum vena & arteria crurali (quæ sunt rami iliaci exteriores) in scæmur per inguina descendit, quod ubi attingit, statim ^{bb} *propaginem insignem* à latere interno exigit, Venæ saphenæ seu malleoli interni toto ductu, quo sub cute per interiora cruris ad magnum pedis digitum fertur, ab anteriore parte incumbens. Vt autem ipsa saphæna in itinere nonnullos furculos ad proximam

proximam cutim digerit, ita & nervus hic complures propagines educit, quas inter ^a præcipua illa est, quam anteriori genu regioni offert. Caterum ipse ^b truncus, ubi hanc sobolem eduxit, una cum trunco Venæ & Arteriæ cruralis in fœmur penetrat, & in musculos dispergitur interiorem fœmoris partem occupantes, ^c præsertim in tertium fœmur flectentium & quartum tibiā extendentium, sicque postea supra genu terminatur.

Trunci præ-
gressus.

^d TERTIVS, sub secundo ex plexu nascitur, è regione commissuræ quartæ & quintæ vertebræ lumborum. Hic supra secundum fœmur flectentium sive iliacum internum delatus, pubis ossis foramen transit, & duobus fœmur circumagentibus, quos Ob-
turatores vocant, puta hujus istius foraminis, tum duobus penem erigentibus musculis, qui à coxendicis osse enascuntur, ^e propagines largitur. Inde, non secus ac duo præcedentes nervi, descendit, & ^f in cutem, fœmoris interiora investientem, nervulos digerit: ^g reliqua pars in alto permanet, cujus ^h præcipua soboles partim in secundum, partim in tertium tibiā flectentium absumitur.

Tertiū.

ⁱ QUARTVS nervus, ex ossis sacri quatuor superiorum parium anterioribus ramis unitis invicem constituitur. Quo nomine & reliquos, imo omnes totius corporis nervos, non crassitie duntaxat, sed & duritie, quod ab extremis in spina prodeuntibus conficiatur, vincit. Hic per sinum in posteriori ossis coxendicis sede insculptum fœmoris posteriora subit. Protinus autem ^k insignem propaginem ex posteriore sede exigit, quæ sub primo fœmur extendentium sive Glutæo magno aliquamdiu hæret, inde in cutim nates & fœmoris posteriora ad mediam usque longitudinem tegentem dispergitur.

Quartū.

^l Alias deinde utrinque & quidem fere tres ad capita musculorum tertii, quarti, & quinti tibiā, tum tertium fœmur flectentium dimittit. Inde *truncus nervi* inter musculos posteriorem fœmoris partem occupantes juxta os descendit usque ad dimidium longitudinis ipsius; ^m ramumque alium distribuit carnosæ illi moli quinti tibiā flectentis musculi, Bicipitis dicti, quæ ipsi, postquam ultra fœmoris medium progressus est, interna parte adnascitur. Prodeunt & hinc alii furculi, qui in cutim posteriorem fœmoris digeruntur. Vterius autem provectus ipse truncus, tandem ad genu pervenit inter duo capita ossis fœmoris, & utrinque ⁿ ramulum impertit in primum pedem extendentium & plantarem musculum, moxque in sinu posteriore ipsius genu sive poplite in duos inæquales ramos ^o dividitur, qui per tibiā & pedem soli distribuuntur. Nec enim ullus est, qui per tibiā excurrat nervus, præter hos duos ramos quarti; si excipias solam illam insignem propaginem, quæ à secundo nervo derivata, ut diximus, comes saphænæ venæ per interiora cruris descendit. ^p Exterior ramus, gracilior est, & versus eam partem abit, qua fibulæ appendix superior cum tibiā committitur, in itinere ^q sobolem spargens, quæ sub cute ad malleolum externum abit, interea plurimos furculos ad cutim digerens. ^r Ramus autem ipse inter musculos anteriorem tibiæ sedem occupantes transit, & ligamentum tibiæ fibulæque longum permeans, una cum tendinibus musculorum digitos extendentium, sub transverso ligamento abit, & ad latera superioris digitorum sedis ramulos diffundit. ^s Interior, per posteriorem cruris sedem defertur, latens inter plantarem & primum oblique pedem moventium musculum, tum longos digitorum flexores, junctusque postea cum ramo externi, qui ligamentum permeat, ad plantam pedis abit, & in utrumque inferius digitorum latus sobolem dispescit.

Trunci præ-
gressus.

Divisio.

FINIS LIBRI SEPTIMI.

ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS,
DE HUMANI CORPORIS FABRICA.
LIBER OCTAVVS,

Qui historiam Infimi ventris continet.

CAPVT I.

De Cute.

Ratio ordinis.



Partes infimi
Ventrus.

ACTENVS similes nostri corporis partes vidimus : nunc ad dissimiles accedamus, ad quarum constitutionem ipsæ concurrunt. Hæ merito ratione trium Ventruium dividuntur, ex quibus de infimo primum agendum est, quod sectionis quoque initium ab hoc fieri soleat, teste Galeno, lib. v de admin. Anatom. cap. vi ; siquidem facillime omnium ob intestina & his inclusas fæces putredine corripiatur. Cæterum cum hujus appellationes libro primo, statimque ab initio persequuti simus, nunc partes ipsas inspicimus, quas optime in externas & internas dividemus. Externa, Abdominis no-

mine vulgo & quidem proprie veniunt, quia abdunt conteguntque viscera imi ventris : & iterum vel communes sunt, vel propriæ. Communes dico, quæ cæteris quoque Ventruius competunt, cum universum corpus involvant, quales sunt illæ, quas communia nostri corporis integumenta vocant; Cuticula inquam, Cutis, Pinguedo, & Membrana carnosæ. Propriæ sunt, quas solum Abdomen habet, ut decem abdominis musculi, & peritonæum. Harum partium situs in corpore ille est, ut diffecantibus primum Communes occurrant, his Propriæ subiaceant, & eo quidem ordine quo ipsas nunc enumeravimus. De externis primum dicamus, deinde & internas persequamur.

CUTIS.

Synonymia.

Figura.

CUTICULA.

Nota.

Substantia.

Ortus.

Primum igitur integumentum ex communibus Cutis est, quam Græci δέγμα vocant; Hippocrates, δέγμα; Herodotus, ἀδὲγμα; Latini, Cutem, Pellem, Corium, & in quadrupedibus, Alutam. Dicitur δέγμα & δέγες, vel ἀδὲγμα & ἀδὲγμα, quod facile excorietur; vel certe, quasi δέγμα, cum terminus sit & superficies totius corporis. Figura Cutis, membranarum in modum plana & depressa est; omnium tamen quæ in corpore sunt crassissima & amplissima, quod sola universum corpus involvat & tegat. Substantia constat duplici; una, externa & quæ superficialis est; altera, interna. Externam Græci ἀδὲγμα vocant, Latini CUTICULAM, Cutis operculum, & summam. Interna, totius nomine gaudet, quod respectu externæ maxima mole sit prædita, & quasi totam cutis substantiam constituere videatur. Dicitur autem externa ἀδὲγμα & ἀδὲγμα, ἐν δὲ δέγμα ἵκεται, quia cuti incumbit; quasi dicas, quid supra cutim positum; non (ut quidam male interpretati sunt). Cuticula diminutive. Vocabula enim in ἰς definitia, non sunt diminutiva apud Græcos, sed quid simile referunt ei, à quo denominationem habent. Sic ἐν ὤμῳ musculus, quo nomine dicitur Deltoides humeri os attollens, non parvum aut exilem humerum, sed potius musculum humero impositum significat. Substantia hujus tenuissima est, & quædam quasi cutis veræ efflorescentia, quam tunicis caparum Anatomici non inepte assimilarunt. Ex sanguis etiam & sensus experts, densior tamen cute, unde fit ut ecchymata & pustulæ sub ea nascantur, cum humores aquei à centro ad circumferentiam pulsi, cutim quidem penetrare, sed cuticulæ cancellos egredi nequeant. Sic tamen densa est, ne transpirationem impediatur. Ortus autem, non ut quidam nostræ ætatis crediderunt, ex recrementis tertiæ coctionis, cum tenuer per poros insensibiliter evanescat, crassum autem sordium specie cuti forinsecus adhæreat, & facile in balneis abscedat: sed potius à viscoso vapore sanguinis à calore interno elevato, & tum aëris ambientis, tum cutis respectu partium internarum frigiditate condensato. Simile quid

quid enim hic accidit illi, quod videmus in pultibus fieri, in quibus si oleosi & viscidus plurimum abundet, concrefcit in superiore parte levis quædam cuticula. Est autem necessario vapor hic viscidus, quia simplex facile digeritur, & in halitus insensibiles abit: at viscosus adhæret externis partibus, ibique condensatur. Sunt ergo tres causæ ad cuticulæ generationem concurrentes; *Materialis* quidem, vapor, & is oleosus ac viscidus: *Efficiens*, interna, hunc ipsum elevans calor viscerum & cæterarum partium; *Externa* autem, eundem condensans frigus. Hæ prout intensiores fuerint aut remissiores, ita crassior aut tenuior Cuticula reddetur. Adnascitur autem generata cuti tam valide, ut difficulter novacula aut cultro separetur: vi tamen ignis aut ferventis, aquæ nullo negotio decedit in cadavere; in vivo homine attritione etiam & veficatoriis medicamentis. Observarunt autem nonnulli, Veficantibus adhibitis, cuticulam hanc duplicem fuisse, prioreque ablata, aliam subcuti superiore longè crassiorem comparuisse. Hujus usus est, ut subiectam sibi cutem, quæ exactissimi est sensus, ab externo frigore aut intenso calore defendat. Frigido enim tempore nimium constricta cutis transpirationem præpediret, nisi cuticula frigoris ambientis, immediato contactu prohibiti vim hebetaret. Contra calido nimium attenuata, omnem dissipasset internum calorem, nisi densitate sua Cuticula caloris exitum interciperet. *Sunt & nonnulli, inter quos Galenus est, qui statuunt, cuti, quatenus tactus instrumentum est, inservire; cum medii cujusdam officio fungatur. Tertius usus est, ne Ichor ex Venis & Arteriis emanet; quem usum facile ipsa Natura ostendit, ubi cuticula decessit ex attritione aut aliis causis. Exsudat enim continuus quidam magno cum dolore humor.*

CUTIS VERA, Cuticulæ, qua sextuplo crassior est, subijcitur. Hujus substantia non ex Vena & Arteria constat, ut hætenus plurimi crediderunt, persuasi fortassis à principe Philosophorum Aristotele, libro de spirit. capit. iv, ubi, *Cutis*, inquit, *tribus hisce, vena, arteria, & nervo constat. Vena quidem; nam dum pungitur sanguinem emittit: nervo autem, quia tendi potest: arteria denique, quia perspirationem habet; nam sola arteria spiritum suscipit.* Sed enim si in propria significatione Philosophus horum nomina accepit, vera hæc sententia omnino esse nequit. Ex vena enim constare non potest, quod cætera animalia, quæ exlanguia sunt, cute carent, cum tamen cutim & polypus, & sepia, & loligo habeat. Quod si vena alicubi cutim ingredi videatur, id non tam generationis, quam nutritionis gratia accidit. Sed nec arteria ad ejus constitutionem quidquam facit, cum non nisi tribus in locis arteriæ cutim accedant, cæteræ per totum fere corpus in profundo lateant. Nec tandem nervus ad cutis compositionem concurrat, cum pauci admodum nervi sub ipsa cute appareant, potiusque in partes interiores disseminentur. Quod si per nervum corpus intelligat, quod distendi & contrahi nervi in modum queat, ab Aristotelis partibus jam merito sim, qui cutis substantiam sui generis esse, nec ipsi similem in universo corpore reperiri posse, adeoque vere ab Anatomicis nervum carne præditum vocari statuo. Et nervum quidem, vocabulo in communi significatione accepto; at carnem, sui generis. Constat enim ex fibris quibusdam nerveis, quarum beneficio & distenditur; & iterum stringitur. Caro autem vocari potest quæcunque substantia, quæ fibris hujusmodi intertextur. Est autem substantia hæc, in Cute glutinosa & spermatica: & glutinosa quidem, quod, uti Aristoteles libro iii Hist. de anim. ipsaque experientia apud eos qui è pellibus animalium gluten conficiunt, testatur, in omni cute mucosus quidam humor sit, sed in quibusdam paucus, in aliis uberior, ut in bubulo corio. Spermatica autem dicitur, quia semen suæ constitutionis materiam habet. Ex quo fit, ut cutis coalitus accidat *κατὰ διόλεον σκαμνὸν* & per medium heterogeneum, quod cicatricem Chirurgi vocant, quæ semper reliqua cute durior est & poris caret, unde nec pilis unquam tegitur; contra cuticula etsi deperdatur, facile restituitur. In pueris tamen, propter cutis tum humiditatem, tum humoris glutinosi copiam, observatum est consolidationem vulneris per cutem veram factam fuisse. Sunt autem Cutis complures differentiæ, quas scire & ad perfectam ipsius cutis cognitionem, & usum in medica arte plurimum interest. Ac cum, Aristotele teste lib. v de Generat. anim. cap. ix, cutem præ cæteris animalibus Homo suapte natura pro magnitudine corporis tenuissimam habeat, maximum tamen ratione ætatis, sexus, regionis, temperamentis, partium, & morborum, discrimen in crassitie & densitate observatur. Ratione ætatis quidem, cum pueris tenuis sit cutis & porosior;

porosior; adultis, crassior & densior. Ratione vero *sexus*, cum Fœminis tenuior ac rarior, quam Viris. Totum enim corpus fœminis spongiosum est, ut inquit Hippocrates libro de morbis. In frigidis quoque *regionibus* cutis & crassior multo est & densior, quam in calidioribus, in quibus rarior ac tenuior, ut Æthiopibus. Et hæc quoque causa est inter alias, ut qui ex frigidioribus plagis ad ea accedunt loca, quæ circa æquinoctialem lineam sita sunt, facillime febribus corripiantur. Cum enim densior sit cutis, fit ut calor ille insignis ab externo excitatus aëre, libere perspire, ut conveniebat, non possit, unde retentus calorem præternaturalem, adeoque febrem inducit. Sic contra, qui ex calidioribus regionibus ad septentrionales accedunt, de immenso frigore conqueruntur, à quo tueri se vix vestimentis etiam queunt, quod rarior cutis aërem frigidum nimium admittat. Si *temperamenta* spectes, frigidioribus densior est cutis, minoribusque pertusa poris; contra calidioribus spongiosa nonnihil. Ratione *partium* quoque differentia observatur. In fronte enim ac lateribus tenuis est, tenuior adhuc in vola manus, at tenuissima omnium in labiis ac scroto. E contra in capite & sub calcaneo tam crassa, ut cuticulam solam sub calce paleæ hordei latitudinem crassitie adæquasse aliquoties observari: tam duram autem, ut eadem cuticula primo ictu cultri quantumvis acuti aciem eluserit. Dorsum etiam cutis insigni duritie, densitate, & crassitie præ aliis prædita est. Quod si quis interroget, cum cutis crassissima capitis sit, qui fiat tamen ut cuticula tenuissima tegatur, quæ fere cutis sibi subjectæ crassitie adæquasse observare solet, & pro sui generatione copiosam in capite materiam habeat. Elevantur enim ex infernis partibus ad caput crassi & visceri humores, quæ crassam potius, quam tenuem efficiant. E contra, pedum calx, quæ tenui cute tegitur, & pauca excrementa crassa generat, crassissima tamen cuticula obducatur? Ad hæc respondeo, cuticulam capitis propterea exiguam esse, quod pili, qui hac corporis parte longissimi proveniunt, excrementa omnia pro sui materia aut nutrimento rapiant. Nec tamen calvis cuticulæ crassities propterea adaugetur, quod ipsis materia illa in pilos non absumatur, cum per eam cutis partem, quæ calva est, excrementa vix transpirent, utpote quæ jam densatas & occlusos poros habeat. Cæterum sub calce densior est cuticula, et si excrementa viscida eo paucissima confluant, quia nempe tenuior pars eorum excrementorum, quæ ad ipsam pertingunt, ob motum in deambulando dissipatur, remanente parte crassiore, quæ per poros cutis pulsa callorum modo indurefcit, ut rectius fortassis callum, quam Cuticulam dixeris. Hoc nomine qui manibus dura tractant, callosam cuticulam in vola contrahunt. In morbis calidis densior fit Cutis: in ficcis autem, quam humidis tenuior. Æstivo, quam hyberno tempore, rarior est cutis; ex quo fit, ut pelles animalium, quibus nos adversus frigora munimus, si æstate excoriantur, minus nostrum calorem servant, ac eorum quibus hyeme detractæ pelles fuerint. Cutis autem *color* etsi naturaliter albicat, magna tamen coloris ratione differentia notatur. In *viro* enim homine & qui inculcata corporis sanitate fruitur, tum in temperata vel frigidiore orbis Zona degit, suffuso albedini rubeo colore, rosea apparet: in *mortuo* vero pallida est, quod sanguis, qui cutem tingit, ad interiora repens externas partes deferat. Differt etiam ratione *ætatis*, cum pueris rubicundior sit, adultis albidior. Tenuior enim est sanguis pueris, adultis vero crassior: at qui tenuiorem habent sanguinem, rubicundiores sunt; qui crassiorem, pallidiores, quia crassus sanguis ad externas partes non ita facile pellitur. Ratione *sexus* discrimen magnum est, cum fœminis candidior sit ob vitam sedentariam, quæ & ipsa præpedit, ne sanguis ad extrema feratur: at Viris, qui corpus continuis exercitiis defatigant, rubet magis, nisi forte pinguedinis copia prohibeat. Ratione *regionis* color quoque valde differens est. Scytharum enim gens, teste Hippocrate libro de aëre, aquis, & locis, fulvi coloris est; cujus causam subjicit, intentum esse frigus. Nec enim ad eos sol propius accedit, ex quo fit ut à frigore albedo exuratur, & fulva fiat. Phasiani flavum habent colorem, similem illis, qui ictero detinentur, eodem teste. Cum enim stagnantibus utantur aquis & fructibus non bene maturis, fit ut obstructions in visceribus cumulent. Versantur præterea toto vitæ suæ tempore in palustri aëre, humidis crassisque vaporibus inquinato. E diverso Asiani, tum quoad corporis colorem, tum quoad formam pulcherrimi sunt, & quidem ob contrarias causas, nempe aëris temperiem & omnium, quæ in alimentum

Problemata
duo. 1.

A colore.

alimentum ipsis cedunt, perfectam maturitatem. Qui sub Æquinoctiali linea habitant, nigri sunt; à qua qui distant magis, albidiores videntur. Vnde duplex genus Æthiopum nascitur, unum quod nigerrimum est, quale est quod Nigritarum regna magnamque Abyssinorum partem incolit: alterum vero, quod inter fulvum, nigrum, & rubrum quodammodo ambigit, quales sunt Mauritani, & qui Fessæ regna occupant. Hispani qui non procul à Fretò Herculeo habitant, nigriores sunt Gallis & Italis; hi rursus, Germanis & Belgis. Peruviana autem regio quantumvis sub Æquinoctiali linea sita sit, formosos tamen & candidos alit homines, quod à montibus & ventis, maximeque à terræ vaporibus aër apprime temperetur ibi. Cæterum Æthiopes nigri sunt, cum cutim & cuticulam habeant molliorem, porosque amplos & valde laxos. Ex quo evenit, ut ipsis, dum calidissimo in aëre versantur, una cum sudoribus adustorum humorum vapores, quibus ob continuum æstum abundant, expirent, ex quorum crassiore substantia ficcata & veluti torrefacta cuticula nigra generatur. Nam & sanguinem calore exsiccatum atrum fieri, & carnem, quæ ex sanguine constat, nigrescere si soli exponatur, nemo est qui non viderit aliquando. Sunt autem Æthiopes, infantes adhuc & recenter nati, non nigri, sed rubicundi; quod ideo fit, quia cuticula ipsis, ut nobis quoque progressu tantum temporis cum augescere incipiunt, crescat: atque hæc quidem mea est de nigredine Æthiopum sententia. *Temperamenti autem ratione color cutis sic variat. Frigidis & humidis* albo colore cutis candicat; at *calidis & siccis*, subflava est & rosea; *siccis & frigidis*, fusca; *calidis & humidis*, rubicunda. Ut enim quisque in corpore humor abundat, teste Hippocrate libro de humoribus; ita diversus in cute color efflorescit: quæ tamen sententia de ea tantum cute intelligenda est, quæ alba cuticula tegitur; non de Æthiopum, quæ nigra vel fulva. Sic ergo pituitosis, pallor vel albicat; biliosis, flavescit; melancholicis, fusca est; at sanguineis, rubet. *Partes* quoque diversos colores monstrant. In Genis rubedo plerumque est, quod venæ à jugularibus ortæ complures ibi excurrant, & cuticula tenuior sit, quam alibi; unde facili negotio venarum ille calor transparet, & ex rubeo illo sanguinis & candido cuticulæ divinus quidam roseusque color emergit. Quod si vel rariores ibi venæ sint, vel cuticula crassior, pallor faciem perpetuus occupat. Rubedo enim illa perpes non est, sed pro varietate humorum & passionis animi vehementer mutabilis. Circulus mammillas ambiens, quem Aream supra vocavimus, in Virginibus quidem pallor; at in Gravidis & Lactantibus, fuscus est; in Vetulis, niger; & iis, qui antiquo aliquo affectu laborant, croceus. *In morbis* quoque diversis, diverso colore cutis subfunditur. In Ictero enim, flavescit; in Virgineo morbo, pallida redditur. In magnis Lienibus, arquatoque morbo, & scorbuto, nigrescit: in albo, maculis, iisque nigris, ferrugineis, vel flavis conspergitur. In malignis quibusdam febribus, quas Peticulares nostri Medici appellant, maculis afficitur, quæ pulicum moribus non absimiles sunt: in iis autem, qui Veneno pesteque extincti sunt, dorsum cutem præ cæteris partibus contaminatam fuisse sæpe observavimus. Cujus quidem rei causam fuisse existimo, quod paulo ante mortem dejectis ob vim veneni omnibus viribus, sustinere se & tueri in latere ægri nequierint, adeoque in dorsum devolverint, unde quicquid sanguinis in corpore fuit, ad partem declivem per venas & arterias, à venæ Cavæ & Aortæ trunco per dorsum excurrentes, repente ad cutim decubuerit, unde nigro ipsa colore postea suffusa fuit. Habet autem cutis temperamentum, in *primis* quidem *qualitatibus*, inter calorem & frigus, inter humidum & siccum temperatum: in *secundis* autem, inter durum & molle, medium. Cum enim tactui inferviat, ut externas injurias, antequam ab ipsis internæ partes lædantur, perferant, medium inter tangibiles qualitates temperamentum habere debuit, cujus beneficio omnia extrema quam exactissime cognosceret. Cutis tamen, quæ internam manus sedem investit, exacte mediam temperiem nacta est; quod manus, quæ apprehendendi organum est, præ aliis omnibus partibus externis malis opportuna fuit. *Sensu* quoque omnis cutis prædita est; in aliis tamen aliisque partibus magis. Exquisitissimus sensus illi est, in quam vel plures nervi inferuntur, vel quæ cum membranis immediate connectitur, maxime si tenuitas accedat. Hinc obesi valde, quibus pinguedo copiosa inter cutem & membranam carnosam intercedit, minus sentiunt: at circa lumbos à levi tactu titillatio molesta percipitur, quod ibi musculorum membrana copiosa statim subsint,

Obstructio.

A temperamento.

A sensu.

A superfic.

& cutis tenuior sit. *Lævis* est tota cutis, extrinsecus; intus ob connexum cum aliis partibus, aspera & inæqualis. In quibusdam tamen partibus rugis & sectionibus insignita, ut in fronte; ex quibus nonnullæ transversæ sunt, quadam rectæ. Sunt etiam in vola manus, tum planta pedis, quas Chiromantæ contemplantur. Mulieribus quoque à partu rugæ in abdominis cute nascuntur, quas propterea nonnullæ, quæ turpiter virginitatem perdiderunt, ut factum dissimulent, certis remediis tollere conantur. Est

A foramina. & Poris.

etiam continua cutis, nisi ubi meatibus quibusdam, partim manifestis, quos *Foramina* vocabimus; partim obscuris, quos *Poros* dicemus, donata est. Sunt autem pori infiniti illi meatus exigui, quos extrema venarum & arteriarum oscula constituunt, in cute, quam cuticula, majores, qui parvitate oculorum obtutum fugiunt, nonnihil tamen ubi crassior est, ut in plantis pedum, conspicui. Ob hos poros, cum innumeri sint, cutem nassæ piscatoris doctissimus Plato assimilavit. Hi in cadavere facile visui se offerunt, si candela aut fervente aqua cutis amburatur. Solent quoque in Vivis hyberno tempore conspici, cum derepente corpus denudatur, ubi cuticula anseris depuncta cutem amulatur. *Foramina*, grandia sunt & maxime conspicua; qualia in oculis, naribus, ore, auribus, umbilico, pudendis, & ano reperiuntur: quæ à poris non tantum magnitudine, sed & forma ipsa differunt, quæ poris rotunda est, propter venarum & arteriarum teretem figuram, cæteris vero varia, pro usu singularum partium, quibus insunt, communiore. Est autem tota cutis immobilis in homine, excepta illa, quæ frontem investit. In nonnullis tamen, sed rarum admodum id invenitur, occipitii

*A motu.**A sin.*

cutis movetur, quibus peculiare propterea muscoli sunt tributum. *Situs*, & sedem cutis & connexionem denotat. Sedes est in extrema corporis parte, quod universi corporis tegumen sit, & munimentum. *Connexio* autem, eadem non ubique cernitur. In quibusdam enim partibus major est, adeo ut difficulter & vix separari queat, quemadmodum in plantis pedum & volis manuum, in quibus firmioris apprehensionis gratia connascitur subjectis partibus: in quibusdam minor & facile separabilis, ut in infimo ventre, brachiis, & cruribus. In nonnullis locis *connectitur Tendinibus*, ut in vola manus; in aliis cum *Venis*, ut in brachio; in quibusdam cum *Musculis* & *Carne*, ut in fronte; in plerisque omnibus cum *Pinguedine*; in nonnullis etiam cum *Membrana carnosa*, ut in collo. In brutis animalibus contextu perpetuo pilis munitur, in Homine autem interpolata admodum est, adeo ut paucis in locis pilosa appareat. Et quamquam per universum pæne corpus, sed rari valde pili nascantur, vola tamen manus & planta pedis prorsus ab omnibus immunis est. Venas habet, quas *Cutaneas* vocant, quæ inter cutem & membranam carnosam feruntur. Sunt autem *duæ à Iugularibus*, per caput & collum disseminatæ: *duæ ab Axillaribus*, per brachia, pectus, ac dorsum propagatæ: una denique *ad inguina*, à ramo venæ Cavæ epigastrico. In pede Saphæna est, sive Malleoli interni vena, per totam cruris internam sedem recto itinere excurrrens. Harum dextræ cum sinistris, inferiores cum superioribus junguntur. Dextræ quidem cum sinistris, ut Iugulares circa frontem, ubi in unam venam coeunt, quæ Frontis dicitur; itemque circum mentum. Superiores cum inferioribus in lateribus abdominis & thoracis, ubi vena ab epigastrica ascendens cum mammaria descendente, eodem modo ac sub abdominis rectis musculis, quemadmodum diximus libro quarto, jungitur. *Arterias* paucas obtinet, easque exiles, ad tempora & frontem, penem, scrotum, & digitos litas. *Nervos* nullos habet proprios, sed fibras tantum ex nervis, quæ ad subjectas partes transmittuntur, propagatas.

*A pili.**A Venis.**Ab Arteriis.**A Nervis.**ACTIO
Cutis.
Privata.**Palloq.*

Quod *actionem cutis* spectat, nullam ipsi dissectionum Professores assignant, quod pars sit simplex & similis, non organica & instrumentalis. Id tamen de communi tantum intelligendum volunt, cum privatas necessario habeat ob sui nutritionem. Attrahit enim alimentum, idemque retinet, concoquit deinde, & si quid tandem excrementosi relictum est, id etiam expellit. Sed revera & Commune habet actionem; sensum nempe tactus; cujus utilitas ad universum, quod investit corpus, redundat; dum de quorumvis, quæ extrinsecus occurrunt, caliditate vel frigidityte, duritie, mollitie, asperitate aut levitate, cæterisque tum primis, tum secundis qualitatibus dijudicat. Non enim sensu tactus per se ad sui conservationem tam exacto indiget: sed ob partes internas; quæ facile ab externis injuriis consumptæ forent, nisi sensus ope animal

animal eas evitaret. Quis enim ignem fugeret, aut corpus adversus frigora muniret, nisi cutis, utrumque detestans, nostri defensionem injungeret? Cæterum usus habet multiplices, qui tamen omnes eo respiciunt, ut cutis & tegumentum sit, & optimum munimentum. Hinc Hippocrates lib. de Off. nat. Cutim ait omnibus partibus *ἀνθρώπου καὶ ἀνίσταται* largiri, omnia inter se necere & colligare. Quatenus ergo tegumentum est, omnia involvit: quatenus munimentum, ab omnibus injuriis tam externis, quam internis defendit. Id quomodo præstet operæ erit pretium nunc paucis explicare. Primo igitur *temperamentum* accepit medium inter omnes omnium qualitatum excessus, ut de omnibus tanto rectius judicaretur, & eas, quæ mediæ sunt ac propterea gratæ, amplecteretur; quæ extremæ & ideo ingrata, fugeret. Habet præter hoc temperamentum & aliud, cujus beneficio omnem aëris incursum intoxie sustinet, quod sane nulli alteri totius corporis parti, præterquam Cuti soli concessum est. Nam sive carnem seu ossa externo exponas aëri, calido frigidove, ita alterari subito videbis, ut putredinem minentur: cum Cutis innoxia omnes toto vitæ curriculo aëris injurias constanter sustineat perferatque. Ac certe idem hic evenire mihi videtur, quod videmus vulgo accidere in fructibus arborum, pomis scilicet & pyris, quæ putamine suo investita diu à putredine illa conservantur; at detecta vel brevis semihorulæ spatium colorem, & cum colore temperamentum immutant, sicque corrumpuntur. Quæ causa est, cur in Vulneribus subito partium actio lædatur, ut neque alimentum recte concoquant carnes, neque recrementa expellant. Signo pus est & sanies, quæ in vulneribus colligitur; & illud quidem, ex crassioribus; hoc vero, ex tenuioribus excrementis: quod per insensibilem transpirationem, ut in partibus sanis fieri solet, dum calore robusto, nec debilitato fruuntur, minime digerantur. Aër namque externus subito atque detectam aliquam internam partem attigerit, temperamentum nativum corrumpit & destruit. *Figuram* etiam habet eandem, quam universum corpus, cui obducitur; quemadmodum & *magnitudinem*. Vt tamen, quatenus corpus modo augetur; ob victus rationem lautioris & crescentem ætatem; modo imminuitur, ob jejunia & senectutem, æquabiliter undique corpus contegeret, nervosam naturam, quæ & extendi & contrahi possit, nata est; ut propterea cutem, quam extrema obesitas ad rupturæ periculum extenderat, marcor in arctam contrahat angustiam. Est etiam *crassa ac densa*, ne à pungentibus aut incidentibus facile pertundatur, & sic periculose vasa subjacentium partium læderentur. Fecit quoque Natura *debilem*, ut facile excrementa reciperet, nec ad internas partes cum vitæ discrimine repelleret. *Meatibus* autem quamplurimis pertudit, iisque tum magnis, tum parvis; tam ut necessaria in corpus reciperentur, quam inutilia extra pellerentur. Nam *per foramen*, quod oculorum commissæ palpebræ claudunt, rerum simulacra, quæ oculus excipit, intrant: at lachrymæ & reliqua, quæ oculi expurgant, recrementa egrediuntur. Per *naves* ad refrigerium cordis, aër attrahitur: emanat autem mucus è cerebro sensim destillans. Ex ore egreditur sputum, & alia quæ à cerebro orique vicinis partibus, stomacho inquam, & pulmonibus transmittuntur. Ingreditur contra cibis potusque, & aër ad refrigerium cordis. *Aures* flavam & crassam cerebri bilem expurgant: contra sonum ab aëre externo excipiunt. *Pudendum muliebre* virile semen suscipit: emittit autem menstruas purgationes, tum urinam, & foetum. *Anus* in utroque sexu, & in Viris pudendi foramen, nihil externi excipiendo, sed excrementis tantum exonerandis sunt destinata. Per *umbilicum*, dum adhuc uteri cancellis foetus includitur, sanguis maternus per vasa umbilicalia recipitur, cæterum nihil expellitur. Per *infinitos* autem illos *cutis poros* primo tenuior ac serosior sanguinis pars evaporat, quæ ubi copiose prodit aut concrevit, sudorem generat: sin parce, aut non coëat, insensibiliter evanescit. Prodit & pars crassior & fuliginosior, ex qua pili: tum tertiæ concoctionis excrementa, & quibus cutis sordes: & oleosi tandem ac visci vapores, unde Cuticula generatur. Transpirant autem hæc tum beneficio caloris innati, tum Medicamentorum discutientium: quam transpirationem Græci *ἀθροὺν ἀγαπῶν*, insensibilem appellant; quia externis sensibus investigabilis non est, ratione tamen colligitur, cum videamus sponte vel ope medicamentorum tumores præternaturales sic discuti, ut tota materia in ipsis in halitus inconspicuos absorbeatur. Quare cum per tot foramina & infinitos

cutis

cutis meatus partes corporis interiores expurgentur, non mirum est quod scripsit Hippocrates, eos qui cutem rariorem & frequentioribus poris perviam habent, ab internis minime ladi; densam autem & duram cutem habentes facile offendi, quod excrementis in corpore contentis non pateat liber per cutem exitus. Præclaram quoque aliam apud eundem legimus sententiam VI Epidem. sect. III, text. 1, his verbis: *Cutis raritas, Ventris confipatio: Cutis constrictio, carnum incrementum.* Quæ certe sententia etsi prima fronte apprimè mira videatur, ita tamen vera est, ut merito oraculi loco sit habenda. Raritas enim cutis facit copiosam humiditatis per habitum corporis dissipationem. Humiditate vero excrementorum ad cutem conversa & profusa, sicca necessario alvi recrementa, & per consequens alvus etiam ipsa dura redditur. Per hæc cutis spiracula insigne quoque refrigerium corpori accedit; non tantum, quia sic à calidis excrementis liberatur; verum quia nonnihil etiam externi aëris per ea recipiat; cum & per hæc virtutes medicamentorum exterius vix corpus attingentium usque ad intima viscera penetrent, ut ab iis, quæ periapta dicuntur, fieri videmus. Quod si cutis hæc spiracula occludantur, non solum prohibetur corporis dissipatio, & detinetur materia, à qua incrementum carnes capiunt; sed etiam calor internus augetur, auctusque potentior evadit ad coquendum & apponendum alimentum ultimum corpori quidem toti, sed inprimis carnibus; haud aliter ac fieri solet tempore coctionis ciborum in ventriculo, quo revocatis ad interna spiritibus & sanguine, pori cutis occlusi à retrocessione caloris, quæ in multis sese, imbecillioribus præsertim & à morbis gravioribus convalescentibus levi horrore manifestat, retinent intus calorem & muneri suo obeundo promptiorem reddunt. Atque ista causa est, cur mulieres plerumque carnosiores sint, quam viri; quia scilicet earum corpora minus digeruntur ob cutis maiorem densitatem. Eandem ob causam evenit ut plerumque etiam sint laxiori alvo, retentis facum humiditatibus: ut & viri sint plerumque graciliores & alvo alstrictiori. Obtinuit autem cutis, qua parte crassior est, poros evidentiones, quod inde plura è subiectis partibus crassioraque excrementa ad cutem eleventur; tum etiam quia in crassa cute, cum ductus longiores esse debebant, merito ampliores conditi sunt, ne levi facta mora, in via hæreant & obstructions facilius pariant. In faciei nonnullis partibus & in vola manus, tenuissima est & ægre à musculis subjacentibus separatur, quod ex partes, aut exquisitiori tactui sint destinatæ; aut firmiorem apprehensionem præstare debeant. Propter hanc cutis tenuitatem in vola manuum calor major, quam aliis partibus percipitur, si quando in Iecore aut Corde nimius est. In facie vero, ira, tristitia, & aliæ animi perturbationes statim se produnt, mutato variis modis colore. Dum enim commovetur in affectibus animi sanguis, & vel ad cor recedit ab externis partibus, aut à corde in has effunditur, ejus perturbationem cutis tenuissima statim per coloris mutationem indicat. Movetur autem cutis in fronte, quia musculis artificime connectitur, qui voluntarii motus sunt organa. Voluit enim Natura ut Homo ipso vultu omnem animi voluntatem desideriaque exprimat, si quando verbis aperire non liceret.

Restant adhuc duo in Cute consideranda, quorum alterum apud Recentiores controversum est, alterum à me proponetur. Quæritur enim passim, an cutis Tactus sit organum, quod summus Philosophorum Aristoteles insensibilem esse scribat. Libro enim III Hist. de animal. cap. XI; αἰσθητὴν, inquit, τὸ δέμα πνεύματι ἐστὶ καὶ αὐτὸ μάλιστα δὲ πᾶσιν, τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ, ἀλλὰ τὸ μέγιστον ἀσπρότερον ἐναι παρὰ τὸ ὅσον. Quæ verba quia doctissimus alias Theodorus Gaza haud satis fideliter expressit, sic interpretari libet: *Sensu cutis, cum secatur, per se ipsa caret; præsertim in capite quod inter eam & os, nihil sit carnis.* Contra lib. I Hist. animal. cap. IV, tactum in corporis parte similari ponit, ut in carne, aut aliqua hujus generis. Opinionem hanc Aristotelis ratio videtur stabilire, cum videamus carnem detectam cute dolere magis, quam cutem, adeoque sensu pollere acutiore. Præterea cum cutis æqualiter omnia non sentiat, ex Avicennæ auctoritate, tactus organum minime censetur, quod omne Sensorium & extrema & media objecta æqualiter sentiat, uti oculus, qui medios & extremos colores percipit. Galenus tamen contra, quem multi (& præsertim Medici) sequuntur, Cutem tactus organum statuit, motus temperamento, quod moderatissimum accepit; tum nervis,

An cutis organum, tactus
est? locus
objectionis.

μάλιστα δὲ πᾶσιν, τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ, ἀλλὰ τὸ μέγιστον ἀσπρότερον ἐναι παρὰ τὸ ὅσον.

Galenus
sensum.

tum nervis, qui cum spirituum sensibilibus latores sint, infinitis extremitatibus in cute finiantur. Accedit, quod cutis tangibilibus objectis vicinior est, quam caro, cum totius corporis quidam sit quasi terminus. Sed enim utraque sententia conciliari facili negotio potest, tametsi Philosophi & Medici tantopere inter se decertent. Id tamen necessarium est, ut prius recte Aristotelis mens accipiat, quæ à quibusdam nimis maligne torquetur. Plerique enim qui eam animo imbibere sententiam, Aristotelem prorsus Anatomix rudem fuisse, dum unum atque alterum ejus textum vix legerunt, misero sic malitiose insultant, ut neque quid velit Philosophus, neque quæ loquatur, si à Galeno dissentire ipsis videatur, considerare cupiant. Hinc indicta causâ condemnasse sufficit, quia præjudicium fatuum sanæ menti nullum relinquit locum. Idem certe & hic optimo Viro & de studio medico, nedum philosophico optime merito contigit, ut ex ignorantia vocum, quibus aliter paulo quam Galenus usus est, quod alio scilicet tempore scripserit, graves calumnias audiat. Per Cutem enim, cuticulam intelligit: per Carnem autem, quicquid quocunque modo fibris nerveis intertextum est. Quamobrem & per carnem non tantum veram & primario dictam intelligit, qualis est illa musculorum; sed etiam quæ Cutis Galeno dicitur, tum membranas nervosque, & sic revera tactus sensorium quam optime exprimit, cum illud certum sit, unum & immediatum esse constituendum. Quodcunque autem ex his ponas, alterum objicietur, cui non quadrabit, quod à te statutum sit. Galenus autem per Cutim, veram cutim cum cuticula junctam intellexit: & Cutim, ad simpliciter; Cuticulam vero, ad bene sentiendum conditam esse statuit. Cæterum ut constat, Galenus recte quidem cutim ipsam sentire credidit; at immediatum tamen tangendi organum non ita bene, ut Aristoteles, expressit. Si enim verum est, cutim proximum tactus instrumentum esse; quæ causa erit, cur membrana remota cute suprajacente sentiant, & viscera, quæ cute carent, itemque nervi? Caro ergo immediatum instrumentum est; non quidem illa musculosa, sed quæ pars est similis, fibris nerveis intertexta, quæ & musculis, & membranis ac cuti competat, etsi sui quæque postea sit generis. Sed de hac re inferius plura dicemus, cum de instrumento tactus agendum erit. Cæterum, quod dixi, cuticulam ad bene recteque sentiendum datam esse, ex Galeni dogmate; facit ut hoc loco moneam, multum referre diligenter hoc annotasse. Videmus enim sæpenumero graviter eos, qui medicinam faciunt, errare, dum in quibusdam tumoribus internis frigidos humores & pituitam causam constituunt, quod ægri de frigiditate quadam conquerantur, cum potius calidi humores sint & biliosi, qui peccant. Nam quod frigiditatem persentiant, non fit, quia frigidus humor sit, sed quia cutis ab interna sua facie, & caro quæ cuticula caret, sentiendi quidem, at sensibilia dignoscendi & dijudicandi perfectum instrumentum non sunt, nec percipere objecta sub propria forma queunt, hoc est, calidum sub specie calidi, sed potius sub forma frigiditatis. Nunc videamus, quæ causa sit, quam propter Homo non quavis sui parte, ut cætera quadrupeda animalia pilis tegatur, sed in aliis tantum atque aliis partibus nonnihil pilorum habeat. De hac re ut iudicium feramus, causas pilorum prius explicare necesse est. Communis ergo & recepta hæcenus ab omnibus sententia est, *materialem* pilorum causam esse tertix coctionis excrementa, hoc est, fuliginosos vapores per cutis spiracula & poros transeuntes: probabo tamen libro ultimo, sanguinis potius esse crassiores partem. *Efficientem*, calorem qui pilorum materiam, tum ad cutim propellit, tum siccatur & in pili formam reducit. *Finem* tandem, ut cutem & ei subjectas partes tueantur, orment, & à fuliginosis excrementis corpus liberent. Cæterum homo, ut brevibus agamus, prona sui parte pilosior est, quam supina. Pectus enim habet, siquidem mas sit, dorso pilosius, & ventrem ab umbilico usque ad peritonæum densissimis pilis horridum. In femore item & tibia pili frequentiores longe antica parte, quam posteriore videntur: at solum caput in postica pilosum est. Contra evenit in canibus plurimisque aliis quadrupedibus, quæ supina parte pilosiora multo sunt, quam prona; caput tamen minus, quam collum dorsumve pilis horret. Homo ergo pilosissimum habet caput parte posteriore & circa verticem, quod cum erectus corpore incedat, has partes habeat externis injuriis, præsertim ex alto cadentibus, quales sunt pluvie grandinesque, magis obnoxias. Prona autem parte capiti subjecta sexus masculinus in homine pilis abundat præ supina, quod recta incedens

Arist. defensio.

Ejus loci explicatio.

Observatio.

Cur Homo in serpente a feræ pili tegatur.

Pilorum causa.

dens inter progrediendum currendumque recto corpore hanc partem plurimis exponat malis. Si quis enim per pluvias nivelsque & ventos obambulet, anteriorem partem majores pluviarum injurias perpeti, quam posteriorem viderit. Ex quo fit, ut qui septentrionales plagas incolunt, & Germani adeo ipsi anteriorem partem præ posteriore vestibus crassioribus aut pluribus muniant. Fœminæ glabro magis pectore sunt & prona parte, quod carnosiores ibidem, quam Viri. Canes contra, cæteraque animalia quadrupeda cum prona incedant, prona parte minus cæli & tempestatum injuriis exposita sunt; supina magis, unde in hac pilis crassioribus, longioribus ac densioribus armantur. Et hi ipsi pili à dorso paulatim versus latera inclinant, ut cutis, quantum fieri potest, minimum madefiat, sed aqua instillans protinus ad latera declinet, & inferior pilus superioris ductum excipiat ac sequatur. Cæterum quo magis Omnipotentis illius nostri Opificis sapientiam admiremur, silentio hoc minime involvendum est, pilos densiores longioresque esse animalibus, pro cæli in quo versantur aut nascuntur temperie, itemque pro morum varietate. Quo ergo frigidior regio est aut ventosior, eo animalia pilis longioribus densioribusque sunt vestita. Hinc fit ut Islandia, quæ una est ex Septentrionalibus regionibus frigidissima, canes producat, quorum pili ob prolixitatem Leonis jubar æmulantur. Sed & Canes, quorum opera in aquis ad venationes utimur, densissimis pilis donati sunt, ne vis aquæ aut frigoris ipsis noceat. At venaticis canibus, qui sylvas camposque incolunt, breves paucioresque largita est sapientissima parens pilos, ne cum ad cursum destinati sint, pilorum copia & longitudine impediantur. Allatum etiam est superiore ætate ex India novum quoddam canum genus, pilis undique nudum, si mentum duntaxat excipias. Summa enim cæli temperies, & perpetua nullis nubibus tentata ferentitas pilorum tegumenta repudiat. Et hanc causam esse reor, quod fœnes in Italia quoque rariores habeant setas pilosque, quam in Germania aut Belgio. Quinimo huc pertinet, quod à Navigatoribus accepimus, qui novam Semblam perlustrati sunt, quæ regio ob intolerabile frigus perpetuasque nives & ventos inhabitabilis est, albos ibi urfos reperiri, tam densis & prolixis pilis obritos, ut tormentis bellicis lædi aut occidi minime potuerint. Contra Æthiopes & qui Africam incolunt, capillos habent breves, crispas & raras, barbam similiter crispam & raram: at Europæi, & si qui in aliis frigidioribus locis habitant, prolixiores comas barbamque alunt, & quo frigidior quæque regio est, eo uberiore proventu & latiore barbam profert. Vnde fit, ut Germani Italici prolixiorem ferant, & visi sint nonnulli, qui barbam pedibus tenus longam in sinu reconditam gestaverint. Sic unicuique animali clementissimum illud ac omniprovidum Numen prospexit, ut quam commodissime hoc, quidquid habet jucundissimæ hujus auræ beneficio fruatur.

CAPUT II.

De Pinguedine.



INGVEDINEM, quam Græci *πυρρὸν*, & *μύκη*, Latini Pinguetudinem & Pinguetudinem appellant, Author lib. definit. Medicar. definit, affusionem esse alimenti, sensus expertem, maxime circa membranas concrementem. Nos humorem dicimus oleosum nostri corporis, à calore moderato elevatum, & circa frigidiore densioresque partes concretum. Sunt autem duæ pinguetudinis species: una, quam Adipem simpliciter vocant; altera, quam Sebum: illam Græci, *πυρρὸν*; hoc, *σάπ* appellant. Differunt autem pluribus inter se modis. Primo, quod in diversis animalibus generentur; cum adeps in iis nascatur, quæ ab utraque parte dentata sunt, cornuum expertia, ac multifida. Sebum autem in illis, quæ ab utraque parte dentes non habent, & cornua gerunt, tum sanguinem crassiorrem obtinent. Præterea sebum concretum frangitur; adeps non frangitur. Adeps facile ab igne liquefit, non autem facile congelatur, mollior, & humidior remanet: at sebum non ita facile liquefit, sed liquefactum celerrime coit. Hanc differentiam diligenter observatam fuisse à Celfo videre licet, dum adipem vocat bovinum, ursinum, caninum, felinum: Sebum autem bubulum, hircinum, caprinum. Nonnulli tamen sunt Medici, qui promiscue utuntur, & quamcumque oleosam substantiam cujusque animalis

animalis adipem aut sebum pro lubitu appellant, ut monuit Galenus, qui tamen & ipse proprietatem hanc vocum saepe neglexit. Quin imo lib. 11 simpl. cap. de pinguedine; Si vobis, inquit, oleosam & pinguem in animalibus substantiam omnem adipem appellato: sed & pinguedinem appellare totum hoc genus licet. Sternitur autem pinguedo hæc, de qua nunc agimus, inter cutim & membranam carnosam in homine: in brutis vero membranæ subijcitur, unde fit, ut cutem universam moveant. *Materia* pinguedinis sanguis est, ut testatur Galenus, lib. 11 de temperam. cap. 111: & Aristoteles lib. 11 de Part. cap. v. Id quod ratione etiam confirmare licet, cum nullum ex iis, quæ sanguine carent, vel adipem habeat, vel sebum, siquidem sanguis deest. Non tamen quivis sanguis est, sed optime tantum elaboratus & concoctus. Vnde quibus concoctio laudabilis non est, pinguedine destituntur; & quæ pingua sunt, sanguinem purum ac paucum habent: macri autem omnes atricolorem, crudum, ac copiosum, cum latis venis. Nec tamen & concoctus omnis pro pinguedine aptus erit, sed qui oleosus est. Vnde Galenus cum ex sanguine pinguedinem gigni docuisset, lib. 11 de temperam. cap. 111, & lib. xvi de VI. part. cap. 11, addit, gigni ex sanguinis portione oleosa sive pingui, per tenues venas effusa. Oleosum autem hoc ex aërea maximeque laudabili alimenti parte coctione conficitur, quæque in sanguine perquam bene respondeat butyrosæ, uti in lacte vocatur, substantiæ. Vnde & videmus animalia pingua butyri plus in lacte continere; minus, macra. Gignitur autem maxime post tertiam concoctionem Medicis sic vocatam, quod tunc maxime aptus sit & elaboratus sanguis. Vnde & Philosophus lib. 111 de Part. animal. cap. 11, finem probæ concoctionis sanguinæ adipem & sebum esse testatur. Loquitur autem de coctione sanguinis, quæ in renibus fit, in quibus cum alia non fiat quam tertia illa dicta, recte colligitur ea secundum Aristotelem in illa tertia coctione fieri. Accedit, quod in quavis parte tum temporis demum ex sanguine eleventur vapores illi oleosi, qui allidentes ad membranas in pinguedinem, quemadmodum crassiores reliqui in carnem mutantur. Cum ergo sanguis materia sit pinguedinis, sed sanguis maxime oleosus & concoctus, patet infantes, quibus sanguis tum in alimentum partium absorbitur totum, quod adhuc crescant, tum serosus admodum est, non pinguescere, verumque esse quod lib. 111 Histor. de animal. cap. xvi 11 prodidit Aristoteles; omnia ætate provecta potius, quam novella pinguescere: sed præcipue, cum jam suæ longitudinis & latitudinis modum adeptæ, augeri in profundum incipiunt. Patet etiam eos, qui obesi valde sunt, fecundos minime esse aut salaces, cum materia seminis in pinguedinem absorbatur. *Efficiens duplex est, prout duplex est actus generationis ipsius pinguedinis. Debet enim & materia ipsa attolli, & deinde concrelescere. Elevatur igitur sanguinem oleosum in vapores resolvendo Calor; sed calor non quivis, sed moderatus; cum nimium materiam adurat, & in bilem vertat; moderato minor, nec concoquat bene sanguinem, nec in vapores resolvat. Qui ergo calidi nimium sunt, pingues esse non possunt: neque qui frigidum nimium temperamentum sunt nati. Ut autem concreseat, debet alicubi appellere, ne dissipetur: appellere autem debet ad corpus non quodvis, sed frigidum. Maxime ergo accommodatæ sunt membranæ, quæ utramque hanc conditionem observant, cum & ob densitatem suam non facile oleosum hunc vaporem amittant, & ob frigiditatem facile condenfent. Voco autem frigiditatem non illam, quæ positiva à Philosophis appellatur, cum talis vita remanente nulla in corporis parte detur: sed calorem qui minor est, quam ille, à quo vapor elevatus est. Nec mirum videri debet, quomodo minor calor concretionem efficiat, cum videamus plumbum liquidum, ubi ab igne removetur mox cogi, etsi in locum satis calidum, igne tamen paulo frigidiorum pervenerit. Hinc fit, ut animalia hyeme pinguiora fiant, cum & obstructa sit cutis, & frigidiores externæ partes, internæ autem calidiores, ut & concoquere melius alimentum & coctum elevare ac in vaporem solvere queant. Iis etiam qui versantur in calidioribus locis & exercitiis dediti sunt, nulla aut perquam pauca pinguedo est, quod consumatur materia illa; at iis, qui otiosam vitam agunt, copiosa provenit. Circa membranas igitur quam optime gignitur, quod nulla pars sit aptior ad concretionem faciendam, neque densior. Concrefcit autem sic, ut ipsas membranas undique involvat, & in minimos quosque poros sese insinuet, adeoque per universam membranam pinguedo dispergatur, quod quivis, si quam in hac re vel obiter collocare velit operam, adverterit.*

*Materia.**Cur infantes obesi non sint.**Cur obesi infantes efficiantur.*

An pinguedo
sentiat.

Dubitatio.

Temperamen-
tum.

Differentia à
pinguedinis
copia.

Quæ requi-
runtur ad
pinguedinis
generatorem.

Vita.
Generalis.

Particulares.

Et ex his facile responderi potest ad vulgatam illam quæstionem, an pinguedo sentiat? sentire enim pinguedinem dicas, si quis hac voce intelligat pinguedinem, quo pacto Anatomici crassa minerva loquentes sumunt, ut dum pinguedinem dicunt totum hoc, quod ex pinguedine strictè accepta & membrana, circa quam concrevit, constat. Non sentire inquit, si pinguedinem intelligat à membrana illa separatam, ut est illa, quæ proprie & à Medicis sic dicitur. Cæterum hoc loco dubium occurrit, cum dictum à nobis sit elevari à calore vapores oleosos, itemque eosdem concrefcere à calore partis unius & ejusdem, quo pacto ab eadem causa duo diversi effectus sequantur, ab uno scilicet calore. Sed respondeo, haud simplicem esse calorem nostri corporis, sed duplicem; unum, influentem; alterum, innatum. Influentem constituunt spiritus; innatum, temperamentum ipsius partis. Ille, major est; hic, minor: ille, elevat; hic, cogit; ille, calor vere dici potest; hic, respectu illius frigis. De *Temperamento* adipis quanquam plurimum concertant inter se artis proceres, ex causa tamen materiali, quæ concoctus est sanguis & aëreus; ex efficiente, qui calor est; ex forma ejus, quæ oleosa: ex fine tandem, qui est concoctionem juvare partium, unde in copia omento accrescit, facile judicatur calidus esse. Sed imprimis & Galeni autoritas notanda est, qui lib. xv de *Vsu part.* cap. ix; pinguedo, inquit, quod calida res sit, cognoscitur sensu ipso, utentibus ea vice olei. Indicat autem id non minimum, quod facile in flammam transmutetur, tanquam ad flammam proxime accedat, nihil enim frigidi promptè comburitur. Alba est in omnibus animalibus; in homine tamen minus, quam in cæteris: animalibus senioribus etiam flava fit. Differt pinguedo copia, ratione sexus, ætatis, temperamenti, regionis, partium, vitæ generis, temporis anni, & tandem morborum. Copiosior enim fœminis est, quam Viris. In recenter natis, nulla est; at in iis, qui justam ætatem attingere, copiosior. Calidis & ficcis, nulla aut exigua; at calidis & humidis moderate, copiosa: frigidis item moderate & humidis. Qui calidas incolunt regiones, aut calido anni tempore degunt, minus pinguescunt: at qui in frigidis & frigido tempore vivunt, copiosam habent. Vitæ genus sedentarium etiam obesos reddit; at valida & continua exercitia, maximeque hominum carnifices curæ, macros reddunt. Inedia etiam & morbi longi, prorsus absumunt. Sed & partes non omnes habent, neque omni tempore: sed ex tantum, quæ indigebant. Sic clunes habent copiosam, ut commodius sedeamus: sic omentum, ut foveat calorem internum viscerum: sic eadem de causa abdomen. At cerebrum, palpebræ, & aures, manusque carent, quod ipsorum actioni nimium incommodasset. Vt autem partes ipsæ pinguedinem generent, præter materiam, sanguinem inquam oleosum, qui in corpore redundare debet, vasa primum requirunt magna, unde fit, ut circa palpebras & caput pinguedo nulla nascatur, at copiosissima circa collum, nates & lumbos. Deinde ut membrana addit crassa, quæ prohibeat evaporationem, unde pulmones carent, qui tenuissima investuntur membrana. Tandem, ut calida sit pars, quæ bene coquat sanguinem, & attollat, unde partes externæ & cerebrum non habent, reliqua autem viscera omnia, ipsumque adeo etiam Cor, etsi Aristoteles negarit. Cæterum non uniformis est pinguedo, quæ in humano corpore reperitur: sed sub cute quidem adeps; at seum circa omentum, renes, cor, oculos, & ossium articulos. *Vsus* pinguedinis multiplex est, quatenus tum universum corpus investit, tum quibusdam partibus adnascitur. Vt enim totum corpus contegit, & adversus externas injurias protegit, & calorem naturalem conservat. *Protegit* quidem, tum contra frigus, tum calorem, adeoque & æstivo & hyberno tempore. Et *æstivo* quidem, adversus calorem; quia cum aer tum tenuis sit, & pori aperti, quatenus oleosa est pinguedo, ejus in corpus ingressum prohibet, non secus ac videmus Seplasiarios, dum succos conservare student ab aere, oleum superfundere: deinde quatenus aer omnes partes exsiccatur, rursus humiditate innata conservat. *Hyberno*, contra frigus, ne penetret & lædat viscera sua qualitate, quia pinguedo à levi frigore constringitur, & quasi coit, unde fit ut nequeat aer penetrare. *Conservat* autem calorem internum pariter tempore calido; quia, ut modo dictum, quatenus oleosum est, exire & diffipari non patitur: *frigido* autem, quatenus sua caliditate fovet. *Particulares* autem *usus*, quos diversis partibus præstat, plures sunt. In *clunibus* pulvinaris vicem gerit; in *musculis* explet loca inania; *Vasis* substernitur, ut tuto eant; in *visceribus*, coctionem juvat. His nonnulli alium adhuc usum assignant, nempe ut inedia tempore sit loco alimenti.

Existimant

Existimant enim pinguedinem quo pacto antea vaporis specie ex venis excidit, ita postea in venas redire ac in sanguinem mutari, quod tamen falsum esse credo, quandoquidem pars nulla nutrire partem alteram queat, aut alia alii fieri nutrimentum. Quod vero per inediam & penuriam alimenti ac sanguinis tum sanis tum ægrotantibus imminuatur, id evenire propterea credendum est, quod æque ac partes reliquæ, illa digeratur, dissipetur, atque absumatur à calore interno depopulante partes, quia deficit alimentum in quod agat. At vero quod præ carnibus aliisque solidioribus partibus citius defecisse pinguedo deprehendatur, causa est mollitudo ejus & levissima concretionem compactio, tum & prompte liquabilis natura.

CAPUT III.

De membrana carnosa.

SUB Pinguedine membrana reperitur, pinguedinem ita undique complectens, ut cum ipsa multifariam dividi queat. Hanc Græci, *σπέρματις* *σπέρματις*, Barbari, panniculum carnosum; Recentiores latinæ linguæ studio magis addicti, Membranam carnosam appellant. Vocatur autem carnosa, non quod carnosa sit in homine, sed quod in brutis, quorum corpora prius dissecuerunt primi Anatomici, carnosæ fibræ conspersa fuerit reperta, ut nonnulli propterea musculum asseruerint, quamquam certè & in multis animalibus musculi fungatur actione, cum hujus beneficio cutis reddatur mobilis, in canibus, equis, aliisque. Retentum ergo fuit hoc nomen postea in homine, & impositum membranæ illi, quæ cum ipsa habuit analogiam. Sic supra musculos vocatos esse diximus omnes eas partes, quæ analogiam ullam obtinere cum musculo, cui merito illud nomen tributum à principio fuerat. Est tamen & in quibusdam locis in homine carnosa, ut in fronte & collo, quamvis utrobique musculus dicatur esse. Adhæret autem cuti usque adeo valide, ut difficulter ab ipsa separetur. In recens natis, rubra est; at in adultioribus, alba. Oblita est interius mucoso & lento quodam humore, procul dubio ad faciliorem musculorum motum, ne ob frequentem motum musculorum superficies exsiccetur. Sensum exquisitissimum obtinet aliarum membranarum in morem, usque adeo, ut vellicata ab acris humoribus aut puncta, motum concussivum & horrores excitet, quales in febribus adverti solent. *Vfus* ejus est, ut *Vfus* sua densitate vapores elevatos à sanguine excipiat, & frigidityte respectiva condenses, sicque firmus sit paries cui pinguedo adhæreat; tum calorem foveat internarum partium, ne aut dissipetur is nimium aut ladatur ab externis injuriis. His addunt nonnulli, ut cutim adeuntia vasa fulciat, cum inter hanc & cutim ferantur omnes illæ arteriæ vel venæ, quas subcutaneas appellant. Sed revera membrana carnosa à pinguedine non ita jure distinguitur, cum ejus gratia potissimum facta sit, ut scilicet oleosos vapores & pingues excipiat, tum & ipsa membrana ad pinguedinem ita se habeat, quemadmodum fibræ in carnibus & musculis, ut cuivis patebit, qui tractare pinguedinem voluerit. Vbiq; enim dispersa quasi filamenta membranæ per ipsam conspiciuntur, plenamque veluti fibrarum esse. Accedit, quod in obesis à pinguedine distincta neutquam reperitur.

CAPUT IV.

De Peritoneo.

ABLATIS ^aquatuor tegumentis communibus, de quibus nunc diximus, ^bMusculi abdominis occurrunt; quorum quinque sunt paria, ut supra libro quarto docuimus. Primum, Obliqui sunt Descendentes; secundo, Ascendentes; hinc, Recti, & Pyramidales; quibus postea omnibus Transversales subjacent. His ergo & ipsis remotis una cum tendinibus ^cMembrana quedam occurrit totam infimi Ventris cavitatem succingens, quæ Græcis *σπέρματις* *σπέρματις*, hoc est, tunica prætensa; aut *σπέρματις* *σπέρματις*, id est, operimentum prætensum; interdum etiam simpliciter *σπέρματις* dicitur. Hippocrates

lib. vii Epidem. etiam *περιτοναία* in plurali numero nominavit. Arabes *Zipbach* appellant, communi membranarum nomine, κατ' ἐξοχὴν. Latini Græcam vocem Romana civitate donarunt, & *Peritoneum* vocant. Non desunt tamen, qui vocibus magis quam rebus additi, *Abdominis membranam* nominant. Dicitur autem peritonæum *περιτὸν τὸν ἐντὸς*, ab officio scilicet quo fungitur. Præstenditur enim non tantum infimo ventri universo, sed etiam omnibus ipsi inclusis visceribus, quibus membranam largitur.

Figura. Comparatur à plerisque ob figuram, sacco, qui sphaericæ figuræ sit, & ovalis, oblongus, ac nonnihil depressus. *Superficies.* Interior superficies, qua viscera respicit, lævis, æqualis ac lubrica est, humore quodam aqueo in abdomine contento irrigata: exterior vero, qua musculis abdominis adhæret, aspera & inæqualis. *Substantia.* Substantiam habet membraneam, tenuem quidem, at validam & densam, fibris quibusdam exiguis præditam, quæ extenso & distracto leviter peritonæo (obscurè tamen) comparent, ut propter hanc causam araneæarum telis sit à nonnullis Anatomicis assimilata. Non tamen ubique eadem est tenuitas, sed sub umbilico crassior, usque adeo ut manifeste ibi duplicata videatur: supra umbilicum vero, & à lateribus ita tenuis, ut simplex omnino appareat. Quin imò neque æqualem crassitiem in omnibus visceribus, quibus circumtenditur servari conspicies: sed in quibusdam, teste etiam Galeno lib. vi de administrat. anatom. cap. v, seipso crassiore constare substantia, in nonnullis tenuiore. Hac ratione in fectore tenuissimum visitur, itemque in Liene, minus in Renibus: crassum contra in Ventriculo, Intestinis, & Vesica, ita ut quibusdam imposuerit, credentibus esse partem peculiarem prædictorum viscerum. Andreas Laurentius in Viris à cartilagine eniformi ad umbilicum usque crassiorem esse hanc membranam notavit; contra, in foeminis ab umbilico ad pubem esse validiorem. Ego tamen, ut verum fatear, nunquam tale quid observare potui, nec Naturæ in hac re consilium intelligo. *Connexio.* Annectitur, superius quidem Diaphragmati: inferius, ossibus pubis & ilium: antè, validissime transversis abdominis musculis, & imprimis tendinibus, ac circa lineam candidam: retro, capitibus eorundem musculorum, & membranæ nervorum è lumborum vertebrais prodeuntium. Anatomici autem unanimi consensu in ea sententia sunt, nullum esse viscus infimi ventris, nec ullam ejusdem arteriam aut venam, quæ citra viscerum insertionem libera incedit, quin ab hoc membranam accipiat. *Exortu.* De exortu autem lis est, cum nonnulli peritonæi originem à ligamenti illis repetant, quibuscum vertebrae lumborum & os sacrum connectuntur. Doctissimus Fallopius à validissimo nervorum plexu, à quo mesenterium oriri dicitur, pronasci credit: at Piccolhomineus Ferrariensis, cum quo & ego facio, duplex peritonæi principium constituit; unum, quod vocat principium ex quo; alterum, quod appellat à quo. Illud gèminum esse vult, primum à prima, & secundum à tertia lumborum vertebra; quia hic crassissimum, & non nisi disruptum separari potest, sic valide adnectitur: hoc à dura & tenui membrana cerebri derivat. Prodeunt enim circa dictas vertebrae nervi, qui colligati inter se utraque meningē, dum ulterius provehuntur, membranam hanc constituunt. Nec immerito propterea hic adeo crassum est, cum postea in plurimas membranas, tanquam productiones quasdam dividi & extenuari debeat. Ex qua opinione non male fortasse consensus illius insignis, quæ intestinorum & quorundam imi ventris viscerum cum capite est, rationem reddemus. Observatione autem omnino dignissimum videtur, *Duplicatio.* Peritoneum ubique duplex esse, sed præsertim circa lumborum vertebrae, ubi Vena Cava, Arteria magna, & Renes utrique interjacent. Sed & in hypogastrio manifesto in duas tunicas dispescitur, in quarum amplo intervallo Vesica continetur, & Vterus. Quamquam igitur ex Galeni omniumque Anatomicorum dogmate constet, universa infimi ventris viscera peritonæo includi, revera tamen distinguendum est, & alia quidem in ipsa cavitate, alia vero extra hanc in spatio, quod ex duplicatione oritur, sita esse dicendum. Et in cavitate quidem omnia illa, quæ à Venæ Portæ ramis nutriuntur, ut sunt illa, quæ nutritioni & coctioni ciborum famulantur: in duplicatura autem, quæ à Cava alimentum accipiunt, ut sunt ea, quæ modo enumeravimus. *Foramina.* Vasa quoque umbilicalia duplicato peritonæo, ut tutius incedant, fulciuntur. Foramina quoque habet, & superius quidem, qua Diaphragmati jungitur, tria. Primum in dextra parte, ut Venæ cavæ truncus ascendens; secundum, in sinistra, ut Oesophagus cum nervis orificio

orificio stomachi insertis; *tertium*, ut Aorta, Vena sine pari, & nervus sexti paris transeat. *Inferius* circa anum & inguina, ubi vasorum tria genera ad crura transmittit. ^a *Anteriorius*, ut umbilicalia vasa, ^b Vena inquam, ^c duæ arteriæ & ^d urachus exeant. ^e *Processus* ^{Processus} etiam obtinet duos, in anteriore facie juxta pubis os sitos, utrinque unum, qui non minus in maribus, quam foeminis reperiuntur. Sunt autem oblongæ productiones exterioris peritonæi membranæ, Cucurbitæ, quibus Chymici utuntur, perquam similes, arcuæ superius, inferius laxæ. Hi foramina tendinum musculorum obliquorum & transversorum egredientes, in *Viris*, ad scrotum abeunt, & sic extra ventris cavitatem dependent: in *Mulieribus* autem, ad inguina producuntur, & in Vulvæ elatorem sedem terminantur. Descendunt autem cum *illis* Venæ & Arteriæ spermaticæ una cum cremasteribus musculis, & remeant contra à testibus, similiter processibus istis inclusi cum parastatis, vasa deferentia: *in his* vero uteri ligamentum rotundum, quod in latam ac nervosam exilitatem supra pubis os degenerat, cui Clitoris alligatur. Adhæret autem à principio interior peritonæi membrana exactissime, quæ foramen, per quod egrediuntur dicta vasa ex infimo ventre, constringit & claudit, qua disrupta, exterior laxatur, & sic hernia fit, descendente postea vel omento, vel intestino, aut etiam utroque. *Venas & Arterias* à vicinis partibus obtinet: *Nervos* autem exiles ab iis, qui ad abdominis musculos propagantur. *V s v s peritonæi primus ac præcipuus est*, ut fit ^{V s v s} ^{1.} operimento omnibus partibus, quas investit, non solum quo ab externis injuriis liberæ sint, sed etiam ne ipsorum calor aut humores expirent vel effluant. Nisi enim Iecur, Lien, Renes, & Ventriculus involuta membrana hac forent, externa vasorum oscula, quæ in nonnullis valde sunt patentia, præsertim arteriarum, sanguinem effudissent. Hinc factum est, ut solers Natura iis visceribus, in quibus plures arteriæ sunt, & adeo discrimen imminet majus, crassiores largita sit tunicam, ut ab omni effusione tutam præstaret. *Secundus usus est*, ut viscera omnia suis sedibus alligeret. Sic Hepatis ligamentum à peritonæo est, & omnes membranæ, quæ ab ipso oriuntur, reliqua vinciunt. His usus ut satisfaceret, primo *figuram* dedit ovalem, sed depressam, quia talis erat ipsius infimi Ventris figura. Decuit enim vestem aut sepimentum partis investiendæ aut obvallandæ figuræ coaptare. Quare & in aliis visceribus, quibus portio aliqua produciuntur, figuram eandem observat. Porro *internam superficiem* lævâ fecit, ut viscera in abdominis compressione citra offensam premerentur: & quo mollior adhuc contactus ille fieret, lubricam reddidit aquoso humore, in abdominis cavitate circa intestina natante, qui ne unquam deficeret, ex vaporibus à ventriculo & cæteris visceribus continuo regenerari voluit. *Externa superficies* contra aspera est, ut transversis abdominis musculis validius adnecderetur. *Substantiam* autem largita est membranæ, ut facile distendi citra ruptionem, & in sese contrahi sine complicatione posset. Partes enim imi ventris modo alimentis turgent, ut Ventriculus; modo flatibus, ut Intestina; modo fœtu, ut Vterus; modo etiam urina, ut Vesica: modo etiam evacuata in se concidunt. Hanc autem membranam *firmam* esse voluit, quia non nisi magno cum detrimento & incommodo peritonæum rumpitur; tum quia robore quoque indiget, ut viscera in suis sedibus alligata conservet. Nihilominus tamen, ne nimis pondere premat, tenuis est ubique, præterquam sub umbilico, quod magno consilio factum est, cum hac parte maxime omnium ruptioni opportunum foret. Seditibus enim aut stantibus viscera ad imam partem devolvuntur, quorum pondus ut innoxie peritonæum sustineat, hanc ejus partem munire ac firmare debuit. Et hinc fit, ut quibus tenuius peritonæum à primo ortu contigit, in magna spiritus cohibitione, vehementi saltu aut clamore, in quibus versus inferiora decidunt intestina, facili negotio peritonæum rumpatur. Est & circa viscera quædam, *tenuius*; circa alia, *crassius*. Nam in quibus copiosæ sunt arteriæ & spiritus, ne dissipentur, ut in Liene: aut humores, ut in Ventriculo, ne effluant, iis crassiores membranæ concessit. Crassior etiam iis est, quæ repleta valde intumescunt, ut Vesicæ, utero, & ventriculo, ut simul cum his extendi queat, quod fieri non potuisset, si tenuior his tunica obtigisset. *Connexionem* tandem cum musculis abdominis transversis validissimam habet, ad æqualem ventris compressionem in respiratione & fæcum expulsionem faciendam. Neque enim inter ipsâ spatium licebat intercedere, quod musculis contractis peritonæum

næum in rugas ivisset. Connexio autem hæc validior est circa tendines, quam carnosam partem, quod cum caro musculorum in abdominis compressione contrahatur, impedita fuisset, nisi laxius carnibus connecteretur. Exortus causam nunc nullam inquiri, cum de origine adhuc sub iudice lis sit, & ego omnes partes simul & formari & generari credam, quamvis de peritonæi principio, si quod est, maxime omnium Picolhominei sententia mihi arrideat.

C A P V T V.

De situ, tam naturali, quam eo qui præter naturam est, omnium quæ in imo ventre continentur, viscerum.

Ratio ordinis
in sequenti-
bus.



Viscerum imi
veteris divi-
sio.

DIXIMVS ab initio hujus libri, partes infimi ventris esse duplices, continentibus & contentas, sive externas alias, alias internas. De illis abunde hæcenus egimus, restat nunc ut & harum historiam persequamur. Sunt autem duplicis generis: quædam enim considerari queunt, quatenus ad fœtum pertinent in utero adhuc conclusum, quales sunt Secundinæ & Vasa umbilicalia, de quibus in libro de Formato fœtu complura diximus; quædam quatenus tum embryoni, tum nato homini sunt communes, quarum tractationem nunc aggrediemur. Antequam tamen membratim de singulis agamus, prius omnium situm explicabimus, nec tantum eum qui homini competit dum inculcata sanitate fruitur, sed etiam dum ab exquisita illa valetudine declinat. Argumentum non tantum utile, sed & maxime necessarium omnibus cognitum, qui animum ad Medicinam appellant, ut tum affectas partes ex situ cognoscere, tum medicamenta applicare norint. *Viscera* ergo quæ in imo ventre coërcentur, vel individui conservationi, adeoque Nutritioni interserviunt; vel speciei, & propterea Generationi. Quæ ad nutritionem faciunt, vel ad coctionem alimenti conferunt, vel ad excrementorum in coctione genitorum expulsionem. Quæ ad coctionem conferunt, vel primam faciunt, ut Ventriculus, qui cibum in ore masticatum in chylum convertit, cujus propterea actio est *χύλων*, & Chylificatio dicitur: vel secundam, ut Venæ, præsertim quæ in Hepate sunt & Liene, ad quæ duo viscera chylum ex intestinis Venæ mesaraicæ mesenterio deductæ ferunt. Primam coctionem adjuvant Omentum & Pancreas: secundam, dictorum viscerum parenchymata. Excrementa autem suscipiunt, primæ quidem coctionis, Intestina: at secundæ, Vesicula fellis. Serum vero, quod *κοιμήμα* & *νεφρὸς* Hippocrati vocatur, Renes; à quibus ad Vesicam demandatur per Vreteres. Generationi interservientes partes, pro sexus diversitate duplices sunt; Viriles & Muliebres, de quibus postea dicturi sumus, dum huic tractationi colophonem supremum imposuerimus. Omnes ergo hæ partes infimo ventri includuntur, qui *superius* quidem septo transverso & cartilagine ensiformi; *inferius*, ossibus pubis; *anteriorius*, abdomine proprie sic dicto; *posteriorius*, lumborum vertebri & ossè sacro; *ad latera utrinque* superius quidem, costis spuriis; at inferius, ossibus ilium & coxendicis circumscribitur.

HEPATIS
situs natura-
lis.

Nonnaturalis
situs
1.

Cæterum *HEPAR* in dextro hypochondrio situm est, concava sui parte ^b Ventriculum; convexa vero, diaphragma tangens. Hoc in medio ^c fissuram habet, in quam vena umbilicalis inferitur, à qua in ^d duas partes (quas *Lobos* posthac semper vocabimus) dirimitur. Earum *dextra*, dextrum hypochondrium totum occupat, ad renem usque ejusdem lateris pertingens, cui sæpe etiam incumbit. *Sinistra* brevior est, ad mucronatam cartilagine[m] extensa, quæ anteriorem ventriculi partem ac pylorum ambit. Situs hic, qui Hepati naturalis est, non raro mutatur, sic tamen ut nullam quandoque ipsius aut vicinorum viscerum actioni noxam inferat; interdum vero, ut graviter lædat. Illum, nonnaturalem situm vocabimus; hunc, præter naturam. *Nonnaturalis* ergo situs quadruplici potissimum occasione contingit, dum vel decumbimus, sedemus, ambulamus, aut respiramus. *In decubitu* enim, siquidem *supini* jaceamus, intra præcordia se recondit, & Diaphragma premit, unde fit, ut qui obesi sunt difficiliter respirent decumbentes, cum se ptum transversum magna hepatis mole nimium afficiatur: at si in alterutrum latus volvantur, à ventriculo vel abscedit, vel eidem circumvolvitur. Abscedit quidem, si dextro innitantur: at amplectitur undique, si sinistro. Hinc causam licet petere,

petere, quampropter in jecoris inflammatione ægri de dolore in dextro hypochondrio conquerantur decumbentes in latere lævo: contra minus doleant, jacentes in dextro. Trahitur enim tum ligamentum hepatis pendentis quasi, quod & ipsum cum sit inflammatum, non potest non graves dolores excitare. Patet autem ex his, eos qui cubitum ituri primum in sinistro latere dormiunt, multo rectius ciborum concoctioni consilere, quam faciunt ii, qui in dextro recumbunt. Hepar enim ventriculum undique ambiens mirum in modum chylificationem adjuvat, propriumque stomachi calorem fovet ac tuetur. *In sedentibus aut ambulanti-^{2. 3. 4.}*bus, ad umbilicum magis vergit. *In respiratione* autem, quemadmodum & cætera infimi ventris viscera, dum diaphragma contrahitur & inspiratio fit, versus inferiora descendit: at dum relaxatur, & expiratio contingit, superiora petit. Ex quo fit, ut in cadaveribus Iecur sub spuris cartilaginibus & in præcordiis reconditum semper inveniat, cum expirando moriamur, & propterea simul cum Diaphragmate ascendat. *Præternaturalem quoque situm* Hepar interdum occupat, quod evenit ubi prægrande est, & magnitudine laborat. Solet enim quibusdam in maximam molem accrescere, ut utrumque hypochondrium impleat, quod plerumque nimium obefis obtigisse vidimus. Observatum autem à me hujusmodi voraces fuisse, quod propterea evenisse crediderim, quod eorum ventriculus plurimo calore sic circumdatus plus digerat concoquatque. Ita memini legisse me olim apud doctissimum Gemmam Frisium historiam mulieris, quæ cum prodigiosæ fuisset ingluviei, post mortem hepar habuisse tanta mole præditum, ut membra spiritalia vicinasque omnes partes compresserit. Possè vero hepar mire incrementum, in anseribus jam olim observatum, quibus opipara saginatione tantum aliquando redditum est, ut libram unam, etiam duas quandoque penderet. Nonnunquam ab insigni inflammatione sic tumet hepar, ut notaverim naturali loco non contentum, & ventriculum & magnam tenuium intestinorum partem cooperuisset. *Quod si umbilicalis vena laxetur* rumpaturve, jecur ad Diaphragma sursum trahitur, cujus motus cum impediatur ob compressionem, fit ut una cum respiratione vita tollatur.

Præternaturalis situs.
1.

^a LIEN alterum Hepar est, ex Aristotelis opinione lib. III de part. anim. cap. III; ideoque in sinistro hypochondrio ex hepatis regione situm. Hic *cava* sui parte, ventriculum tangit; *gibba & superiore*, Diaphragma; *at inferiore*, reni sinistro incumbit. Mutat & hic situm, partim à causis naturæ vim nullam inferentibus, dum sedemus, respiramus, aut decumbimus, quod tamen admodum exiguum est: partim ab aliis, quæ destruant naturam. Evenit hoc potissimum laxatis ligamentis ab humorum affluxu, aut ab ingenti aliquo tumore, quod sæpius contingit. Observatum autem est usque adeo nonnunquam extensum fuisse, ut umbilicum attigerit; nonnunquam etiam ulterius porrectum, non parvam dextri lateris partem occupasse. Narrat *Vesalius* lib. v de Hum. corp. fabr. cap. IX, historiam adolescentis, cujus cadaver Patavii aperuit, in quo Lien in eam magnitudinem erat profectus, ut vix hepati cesserit, cujus anteriori parti adnatus etiam, ventriculum compresserat. Notavit & *Georgius Garnerius* vidisse se Lienem cujusdam Nautæ viginti tres libras pendentem, & in abdomine tam late protensum, ut totam ejus cavitatem implere videretur. Vidi & ego frequenter maximos Lienes: sed & in Cuniculo aliquando Lienem in dextro, Hepar autem in sinistro hypochondrio positum fuisse. Id quod idem *Cornelius Gemma* in humano cadavere vidit, & *Aristoteles* in aliis animalibus, ut testatur lib. I Histor. de animal. cap. XVII. Cæterum quibus de suo loco movetur Lien, aut quibus aliquo morbo laborat, & præsertim scirrho, iis necessario Ventriculus imbecillior est, quia ad fundum calore illo, quem Lien sanus impertire solet, non fovetur, sed frigidity potius extranea afficitur.

LIENS situs naturalis.

Non naturalis.

Præternaturalis.
2. 2.

Inter hæc duo viscera ^b VENTRICULVS medio loco positus est, ollæ instar inter carbonem circumcongestos. *Superius* hujus orificium, quod stomachus dicitur, Lieni proximum est, & sinistrum hypochondrium tenet, à suo situ immobile: at *inferius*, quod Pylorus vocatur, contra dextrum hypochondrium spectat. *Fundus* in horum medio positus est, qui nonnihil situm suum mutat. *Decumbentibus* enim, ad Diaphragma magis ascendit, cui ratione superioris orificii adnectitur: *stantibus & sedentibus*, ad umbilicum cum pyloro descendit. *Ventriculo etiam cibus repleto* nonnihil ad inferiora & abdomen antorium vergit. Quod diligenter notandum est vel ideo,

VENTRICULI situs naturalis.

Non naturalis.

1.

2.

3.

E e

ut pro

ut pro stillicidiis alium atque alium locum eligamus, si æger decumbat aut sedeat. Satius tamen esse crediderim, ut sedentibus fiant, cum versus abdomen Ventriculus his volvatur: decumbentibus autem supine, ad spinam retrorsum trahatur. Eligendus vero tunc erit locus, qui sub mucronata cartilagine in medio est. Porro in *vulnere diaphragmate*, ad superiora Ventriculus ascendit, cujus rei historiam Pareus lib. ix Chirurg. cap. LXXXI, refert. Cum enim quidam in nervosa Diaphragmatis parte transfossus esset, post obitum Ventriculus, quem anxie in suo loco Pareus quæsierat, in Thorace repertus est, etsi vulnus, per quod ascenderat, vix pollicem latum æquaret. Notavit & Vesalius lib. v, cap. xv, Omentum ita præter naturam auctum fuisse cuicdam, ut Ventriculum ex sua sede sic deorsum distraxerit, ut ejus munere deficiente, variisque singultibus obortis, occasio mortis inde nata fuerit.

PANCREAS naturalem suum situm non mutat, cum Ventriculi posteriori parti, ejusque fundo adnatum sit, quemadmodum & duodeno intestino & Venæ portæ, quam intra se comprehendit. Vbi admodum intumuerit, id latus Ventriculi comprimit, ac coctionem turbat.

EX intestinis DVODENUM similiter perpetuo eundem locum observat. Ortum enim ducit à pyloro, & ad posteriora sub ventriculo reflectitur, ut lumborum vertebri ligamenti membranis adnectatur, quo recta absque ulla circumvolutione deorsum feratur. ^b I EIVNVM *intestinum* totum fere umbilicalem regionem occupat: at

I EIVNI &
I LEI situs
naturalis.
Non natura-
lis.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Præter natura-
lis.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

RECTI situs.
Præter natura-
lis.

COLI situs
naturalis.

Non natura-
lis.

- 1.
- 2.
- 3.

I L EON in iliis situm, quæ inde nomen acceperunt. Hæc duo locum non naturaliter mutant, *ventriculo* cibus referto, à quo comprimuntur. Sic in *valida spiritus retentione* & clamore à Diaphragmate pressa descendunt. Contra dum *uterus plenus* est, versus superiora ascendunt & arctantur, ex quo fit, ut de alvi duritie gravidæ tam frequenter conquerantur. In *stantibus*, aut *sedentibus* versus inferiora nonnihil devolvuntur, unde herniæ stantibus magis, quam decumbentibus contingunt. Validiore vi descendunt in *cursu*, *saltu*, aut *equitatione*, à quibus hoc malum mirum in modum incrementa sumit. In *decumbentibus supine* versus umbilicum se recipiunt; at iis, qui in alterutro latere jacent, ad illud cui incumbunt. Præter naturam situm mutant *discentis intestinis* à flatibus, ut in Colicis doloribus, multoque magis *laxato nonnihil mesenterio* ab humoribus, ut in obesibus, propter nimiam humiditatem. In *hydrope*, in umbilicum labuntur, quod diligenter iis notandum est, qui paracentesin exercent. In *hernia*, similiter ad umbilicum, inguina aut scrotum descendunt. In *vobulo* autem, una pars intra alteram reconditur, unde Chordapilus nascitur. ^c CÆCVM in dextro ilio situm est, & naturaliter vix locum mutat, quod dextro lumbi alligetur: vidi tamen præter naturam in suspensio quodam, quem Patavii secui-mus, cæcum totum cum parte ilei & coli, qua sibi invicem necuntur, in scrotum prolapsum fuisse. Id tamen an ex violentia mortis, in qua valide ob spiritum retentum imi ventris viscera deorsum pressa sunt, an ex hernia antiqua contigerit, scire non potui. ^d COLON in dextro ileo, ubi vacuus & commodus locus est, exoritur ac re-ni dextro incumbens, ope peritonæi alligatum lateri ascendit, sub hepate fellis vesiculam contingens. Hinc fit, ut bile transsudante, luteo colore, qui semper in colo visitur, inficiat & sæpe ulcera excitet, quæ in crassius intestinis frequentiora multo sunt hac quoque de causa, quam in tenuibus. Inde sub fundo ventriculi per medium ventris transversum incedens, annexum inferiori omenti portioni, ad sinistram renem reflectitur, cui peritonæi beneficio alligatum per inania ejus lateris deorsum ad os sacrum fertur. Ad hoc ubi pervenit, in nonnullis dextrorsum reflectitur, deinde rursus ad os sacrum volvitur, ubi tandem in rectum intestinum terminatur. In quibusdam tamen citra hanc circumvolutionem recta, ubi prima vice ad regionem ossis sacri circa initium recti intestini pervenit, finire solet. Ex quo vel nullo monente patet obiter, Colon intestinum in aliis atque aliis longius esse aut brevius. *Hunc situm mutat* ventriculo alimentis referto, cum quo descendit versus umbilicum nonnihil, quemadmodum & rursus superiora petit expleto & vacuo. Sed & naturaliter descendit aut ascendit, pro motu corporis. Nam ambulantis & sedentibus magis descendit, quam decumbentibus. Sic gravidis ultimis mensibus ascendit, utero aucto & comprimente. Laterales tamen partes non mutant situm, quia valide lumbis annectuntur, nisi si forte contingat, ut copia humorum laxetur ligamentum.

Præter

Præter naturam in colicis doloribus, dum flatibus distenditur è sua sede naturali abit. **O**MENTUM sub peritonæo immediate in anteriore parte situm est, ad ^b Ventriculi fundum, & deorsum supra intestina ad ^c umbilicum usque expanditur. Situm ergo pro ventriculi, aut intestinorum repletione, aut inanitione mutat, tum pro eorundem motu. Dum igitur stamus, currimus, aut equitamus, deorsum cum utroque vergit: dum decumbimus, cum iisdem ascendit. Interdum superior membrana locum mutatur, permanente in situ inferiore, & quod sit ventriculo vacuo: interdum inferior descendit, ut cum intestinum à Ventriculo premitur. Obesibus quinetiam totum omentum sic descendit ob pondus, ut uteri os comprimat, unde Hippocrates v Aphor. XLVI: *Quæcumque præter naturam crasse non concipiunt, iis omentum os uteri comprimit, & priusquam exrenuentur non concipiunt.* Et lib. de natura muliebri; *Omentum præpingue superincumbens uteros comprimit, neque genituram suscipere finit.* Gravidis sic attollitur, ut inter uterum & peritonæum nihil omenti intercedat. *Præter naturam* intestinis flatibus repletis versus superiora convolvitur, quemadmodum id toties in dissectionibus vidimus. Labitur autem penitus extra corpus in vulneribus abdominis penetrantibus, & in hernia tum quæ scroti est, tum quæ inguinis aut umbilici.

*Præter natura-
lis.
OMENTI
situs natura-
lis.
Non natura-
lis.
1.
2.
3.*

^d **VESICA** urinaria, in hypogastrii cavitate, quam sacrum, ilium & pubis ossa efformant, sita est, una cum recto intestino. Hæc in suo semper loco permanet, præterquam distenta & repleta, ubi fundus versus tenuia intestina pertingit. ^e **VTERVS** in eadem hypogastrii cavitate inter ^f vesicam urinariam & rectumque intestinum jacet; ex quibus illa, priorem; hoc, posteriorem sedem obrinet: adeo ut in non gravidis fundus uteri sacri ossis initium haud superet. Mutat tamen hunc situm tum in gerentibus, in quibus una cum fœtu crescit & augetur, sicque sacro ossi longe supereminet: tum præter naturam etiam obstructionibus affectus, laxatisque ligamentis, in quibus partim sursum fertur, ut contingit Hystericis dictis mulieribus: tum extra sinum cadit, & vel totus, vel pars ejus duntaxat, turpiterque sic dependet. Sed de hoc motu prolixiorum instituemus sermonem inferius, cum uteri tractationem persequemur; hic nonnulla tantum dixisse, occasione sic data, sufficiat.

*VESICÆ fi-
tus naturalis
Non natura-
lis.
VTERI fi-
tus naturalis.
Non natura-
lis.
Præter natura-
lis.*

CAPVT VI.

De Omento.

QUOD Latinis ^b *Omentum* est, id Græcis *Πίπλον*, & contracte *Πίπλον* dicitur. Hippocrates lib. de Glandulis, *Πίπλον* in plurali numero vocavit, & lib. v Epidem. *διήρον*. Nonnullis *παγορέων* & *αγλύν* appellatur, à similitudine retis piscatoriæ, quam denominationem plures retinuerunt, ut Germani, Belgæ, & Itali, qui *Reticello* sive *rete* nuncupant. Arabibus *Zirbus adiposa*, & interdum etiam simpliciter *Zirbus* vocatur. Dicitur autem *Πίπλον*, *ἔστι τὸ Πίπλον*, quasi supernatans, quod superioribus intestinis veluti innatet. Est autem membrana densa ac tenuis, ex plurimis venis arteriisque cum pinguedine copiosa in formam retis contexta. Qua enim parte pinguedo cernitur vasis adnata, solum retis exprimit, quæ errabundo ductu varie inter se excurrunt; qua vero parte membranea est, cancellos seu vacua illa spatia, quæ retium chordis interjacent. Porro quo quisque obesior sit, eo copiosior pinguedo in omento reperitur, ut nonnunquam observatum sit, copia & pondere suo peritonæum rupisse aut valde laxasse. Maximum autem inter cætera animantia Homines habent, unde & *Πίπλον κοιλίης*, quasi omentum gerentes à Poëtis dicuntur. Reliquis enim umbilicum vix attingit: at homini sæpe ad ossa usque pubis porrigitur. Mulieribus tamen magis, quam Viris; & obesius, quam macris, unde in illis quidem uteri os comprimendo, sterilitatem: in his, peritonæum laxando, herniam causatur. Figura marsupium aucuparium refert, ut Galenus lib. vi de anatom. administ. testatur, cum è gemina membrana confset in fundo connexa, & orbiculatum orificium habeat. Id eleganter videre licebit, si ex ejusdem consilio aqua repleveris. *Connecitur* semper, teste Galeno lib. cit. de adm. anat. cap. v, tribus partibus, ⁱ Ventriculo, ^k Lien, & ^l Colo. Superior enim pars Omenti, fundo ventriculi seu gibbæ ejus parti secundum longitudinem adnascitur, & paula-

Synonymia.

Etymologia.

Qualitas.

Magnitudo.

Connecitur.

& paulatim descendens ad ilium & pubis fere ossa protenditur, mox subtus regreditur, & ad Coli intestini dextram partem, quæ Ventriculo proxime est subiecta, reflectitur, cui pauculis quibusdam ligamentis, tum etiam ventriculi simis alligatur. Nonnunquam, eodem teste, Iecinoris fibræ, & spuria cuidam costæ adnectitur. *Componitur* ex membranis duabus; quarum altera, superior; altera, inferior est. ^a *Superior*, ad Ventriculi fundum, à tertia ipsius tunica & communi oritur, ac hepatis & Lienis cavo committitur. ^b *Inferior*, à peritonæo statim sub septo transversò ad dorsum enascitur, & hepatis cavo, diaphragmati ac duodeno intestino, tum lienis fimo, ac tandem coli intestini toti illi parti, qua sub ventriculo incedit, annectitur. *Exortus* ergo omenti ex iisdem est sedibus, quibus adnascitur. Habet & vasa omnis generis. *Venas*, à sola vena Portæ: & superior quidem membrana, utramque Gastroepiploidem, dextram & sinistram: inferior autem, epiploidem dextram & posticam. *Arterias* totidem, à Cæliaco & Mefenterico ramo. At *nervos* exiguos, à sexti paris ramo costali.

V s v s *Omenti* præcipuus est, ut Ventriculi & Intestinatorum nativum calorem pinguedine sua foveat & coctionem juvet. Hunc Galenus lib. iv de Vsu part. cap. ix, elegantè probat, adductis in medium exemplis eorum, quibus ob vulnus in abdomine inflictum excidit, & postea abscissum est. His enim omnibus Ventriculi coctio læsa fuit, plurimisque tegumentis eguere, ut calorem imi ventris tuerentur. Contra tamen apud Forestum legimus, fuisse juvenem, qui omento ablato nihilominus commode vixit: sed huc trahendum non est, cum videamus quandoque in Natura plurima præter rationem fieri. Assignat & alium usum Galenus lib. iv de Vsu part. cap. xi, qui statuit, tempore inediæ calori nativo alimentum sua pinguedine fuggere: verum illud nobis vero simile supra visum non fuit. Hippocrates vero lib. de glandul. adhuc alium usum omento tribuit, humorem videlicet ab intestinis copiose influentem, si à glandulis excipi & absumi una vice non queat, in se veluti in astuario quodam asservandi. *Glandula enim*, inquit, *in intestinis majores sunt, quam alibi in corpore, & pascuntur humectationem nimiam ex intestinis exprimentes: intestina vero ex vasis in omentum suscipiunt, ac remittunt humiditatem. Omentum autem in glandulas distribuit.* Cæterum quia Author hujus libri mea sententia Hippocrates non est, cum Galenus in 1 comm. de Art. text. xlv i, expresse scribat, Hippocratis librum de Glandulis injuria temporis periisse, non multum in hujus loci declaratione laborabo: præsertim cum & absurda doceat, utpote Glandulas in omento reperiri, quod à nemine unquam Anatomicorum statutum est. Nisi si forte Omenti nomine abusus est, & Mefenterium intellexit. Quicquid sit, quia præcipuus, ut dixi, usus est, Ventriculi & Intestinatorum coctionem juvare, videamus nunc quomodo huic usui Natura satisfecerit. Primum ergo *figura* cavitati inferioris ventris accommodata fuit, ut commodissime omnes ipsius partes contegeret. *Magnitudinem* autem obtinuit; quantum erat spatium tegendorum viscerum: sed homini tamen, quam reliquis animalibus majus, quod cum erecto corpore incedat, nullisque munitus sit pilis, facile ab externis injuriis lædatur, & tam à frigore, quam nimio calore. At enim cætera animantia cum prono corpore ambulent, tot cæli aërisque injuriis non sunt opportuna: ut taceam, quod extremis cruribus foveant abdomen. Hinc fit, ut animalia, quæ omento destituuntur, quemadmodum sunt Lepores & Cuniculi, abdominis calorem contractis pedibus foveant, maximeque post cibum assumptum, ut quod ingesserunt, felicius concoquant. *Substantia* membranæa est, ut commodè distendi & laxari posset, ventre repleto aut inanito: ad quam rem *remittas* ipsius plurimum facit, quantumvis & ne oneri sit subiectis partibus prohibeat. Est autem *densa*, quo minus internus calor dissipetur, aut externus aër ingrediatur. Illo enim expirante, debilitas omnium viscerum: hoc inspirante, corruptio sequeretur. Hoc nomine & *pinguedo* copiosa intertexta est, quæ hic egregie olei officio fungitur, quod nostri Sepplarij expressis plantarum succis affundunt, ut ab externi aëris ingressu vendicentur. Non mirum ergo, si minus commode vivant, quibus omentum in magnis abdominis vulneribus ablatum est. Non tamen totum omentum ex pinguedine propterea constat, sed quibusdam locis membrana singulari Opificis providentia interpolata est. Debit enim dilatari & constringi quoque, quod munus membranæ substantiæ maxime omnium competit. Pinguedo autem hæc prope venas & arterias consistit,

confistit, ad tutelam vasorum, quæ externis quamplurimis periculis erant obnoxia; sed maxime compressioni in ventris repletionem & pluribus corporis motibus. Est autem *membrana*, ex qua Omentum conficitur, *gemina*, ut modo Ventriculo, modo Intestinis, quorum actio alterna est, inserviat. Stomacho enim repleto cibus, at vacuis intestinis, superior membrana attollitur, relicta in suo loco inferiore: contra repletis intestinis, inferior ascendit. *Connectitur* autem cum superioribus partibus abdominis, quod infimis annexum, dum homo erectus incedit, in se convolutum fuisset. Inferius liberum est, ut modo superior, modo inferior membrana ascenderet. Imprimis tamen ventriculo alligatur, tanquam mediæ inter colon & lienem parti, à qua æqualiter depender. Ne tamen in decubitu ad latus hinc inde volveretur, à lateribus, lien quidem in sinistro, colo autem & hepati in dextro adnexum est. Quo ad *exortum*, eo loco pronasci conveniebat, cui jungitur, quod inde venas & arterias pro sanguine & vita hauriat.

Cæterum sub finem hujus capitis corollarii loco adjicere libuit explicationem aphorismi Hippocratis, qui est quinquagesimus quintus septimæ sectionis, huc maxime facientis, & qui sine anatomica scientia declarari neutiquam potest. Inquit ergo Hippocrates; ὁ ἄσθισιν ἀντὶ τῆς παρὰ ὑδρατὸς πληθύνει ἐκ τῆς πύλης ἐκ τῆς ἐμπεσούσης, καὶ ἐκ τῆς ἐκ τῆς πύλης. Quibus *Hepar aqua plenum in omentum irruerit*, iis *venter aqua repletur*, & *moriantur*. In hujus explicatione duo quærentur; primo, per quas vias Jecur aqua plenum in omentum irrumperit; deinde, an, & cur necessario moriantur. Videndum tamen primum est, quid per *Hepar* intelligat, tum per *aquam*, inde *Omentum*, & tandem per verbum *irruerit*. Per *Hepar* enim duo intelligere licet, vel totum jecoris corpus, vel unam tantum ipsius particulam. Galenus exteriorem ipsius partem intellexisse videtur, cum in commento inquit, *hepar aptissimum esse ad generandas vescicas aqua plenas, ὑδατῶδες dictas*, & quidem in ea, quæ ipsum exterius ambit, membrana. Meo tamen judicio non inepte totum viscus hac voce sumi potest, quatenus ex venis & parenchymate constat, cum univervum venosum genus, quod in jecore est, aqua impleri & distendi possit. Sed & ipsum verbum *πληθύνει*, id nobis tacite videtur insinuare, cum jecur aqua plenum dici non possit, si una tantum ipsius pars nonnihil aquæ contineat. Per *Aquam* autem, similiter duo commodè intelligimus. Primo quidem humorem serosum ac frigidum instar aquæ: quomodo accepisse videtur idem Hippocrates, lib. I. de morb. mulier. ubi hydropem mulieribus ab aquoso liene fieri scribit, cum mulier insigni febre laborans plurimum biberit, nec revomerit, aut per urinas, sudores vel alvum reddiderit. Tunc enim Lienem aqua repleti, quæ postea in Ventrem, aliasque partes fluat. Deinde & humor biliosus, tenuis, & aquæ instar fluidus, qualis plerumque iis, qui ascite laborant, in ventris cavitate continetur. Talis enim copiosissime in fervido jecore generari potest, præsertim ex usu vini generosi aut alimentorum, quæ hepatis calidam intemperiem augeant. Cumulari autem potest tum in ipso, tum in toto corpore & venoso genere, indeque ad jecur ob partis debilitatem transferri. Mea ergo sententia per aquam hoc loco uterque humor, & calidus, & frigidus, dummodo fluidus sit instar aquæ, sumi potest. Aquam hanc in *Omentum*, eis *πύλιν* irrumperere ait: quæ verba intelligi possunt, primo quasi dixerit, *πύλιν τὸ πύλιν*: *supra omentum*, in cavitate abdominis, quæ scilicet inter peritonæum & intestina continetur. Et in hac significatione videtur accepisse Galenus in commento, dum inquit, ex vescicis hydatidibus dictis, quæ sub cute jecoris sunt, si perumpantur, aquam effundi ad locum membranæ abdominis interioris epigastrio respondentem, in quo aquæ hydropicorum congregari solent. Sumi etiam potest pro substantia omenti, quæ ex venis & arteriis constat: in qua notatione sumserunt nonnulli Recentiorum, autoritate Hippocratis fulti, qui lib. I. de Morb. mulier. Splenem aqua tumidum excrementa sua in corpus, & maxime in Omentum per venas deponere scribit. Sed & interna tandem illa cavitas, in quam omenti duplicatio constituit, intelligi potest. Nec ex his una tantum est expositio quæ mihi ardeat, sed, si quod res est fateri debeo, omnes sanæ veræque videntur. Nec enim moveor autoritate Galeni, qui negat in cavitate omenti ex hepate quidquam influere, nisi prius exedatur, cum Anatomica inspectio me longe aliud docuerit, ut postea dicemus. Hæc autem aqua non destillat sensim, ut voluerunt quidam declarare verbum *ῥαγὲν*, sed irrumperit & magna vi ac confestim illabitur. *ῥαγὲν* enim impetum fluxionis

denotat, ut patet clare ex Aphor. xxxix, lib. v: *Vbi γυναικί, inquit, αἷμα ἰσχυρόν, ἢ κατὰ μύλων παρέρων δόσις. Mulieri sanguinem vomenti, menstruis confertim erumpentibus, solutio accidit.* Galenus enim in comm. testatur, Hippocrati in more esse positum, ut confertim factas evacuationes sive arte, sive natura, per verbum *παρέρων* designet, adeoque & in hoc aphorismo ἢ κατὰ μύλων παρέρων, idem esse atque ἀδρόν ἰσχυρόν. Et sane proprium est mensium in sanis mulieribus cum impetu fluere, non paulatim. Sic Aristoteles lib. vii Histor. de anim, cap. i, κατὰ μύλων κατὰ γόγγυν scribit, cum primum virginibus decimo quarto anno erumpunt. Irrumpere ergo hic fluxionem confertim factam significat: priorque aphorismi pars ex toto jecore serosum & biliosum humorem confertim excerni posse testatur, & quidem vel in omenti partem superiorem, quæ est in abdominis cavitate circumscripta à peritonæo & intestinis: vel in venas, quæ per omentum disperguntur: vel denique in partem interiorem, quæ est cavitas, quam duplicatum peritonæum constituit.

Tres viæ per
quas aqua in
omentum erumpit.

Si quærat nunc per quas partes hæc fluxio fiat; ut tres sunt partes, quæ per omentum intelliguntur, ita tres quoque vias esse dixerò. *Prima*, est exterior illa pars Iecoris, quam tegit membrana à peritonæo profecta, & quæ nullo modo omento includitur, aut eidem etiam alligatur. Hanc ipsam quoque viam agnovisse videtur Galenus, cum in commento hujus aphorismi inquit, ruptis vesiculis aqua plenis in jecoris superficie contentis, aquam in abdominis cavitatem, cui Omentum includitur, effundi. Sed & citra vesiculas evenire potest, ut aqua confertim ex hac jecoris parte effluat, perrupta illa membrana à magna serosi humoris copia, vel exesa etiam à nimia biliosi acrimonia. Non minus hanc viam doctissimus Fernelius scivisse videtur, qui lib. vi de morb. & symptom. part. cap. viii, causam Hydropis ascitis non aliam esse testatur, quam viscerum, Iecoris inquam, Lienis, & Mesenterii sive fissuram, sive erosionem: eos autem gravissime hallucinari, qui cæcos quosdam ductus sibi imaginantur, per quos in abdominis spatium confluat, cum ascites peræque omnes invaderet, & natura humoribus distribuendis inutiliter tot vias parasse videatur. Adde, inquit, quod iis, quos ex urina dies viginti suppressa, extinctos novimus, aquæ nil quicquam deprehensum est, per cæcos illos ductus in abdominis spatium refluisset, quoniam integra his, non pertusa erant sanguinis ferique conceptacula. Hinc fit, ut ascites iis fere superveniat, qui rupta vel exesa viscerum vena cruentis vomitionibus, aut dejectionibus opportuni sunt. Licet enim suppressus sanguis sit, serosus tamen humor per derelictam fissuram præterfluit, inciditque in spatium abdominis. Ego tamen hanc Fernelii opinionem haudquamquam semper veram existimo, cum ex jecore aquam etiam sine manifesta continui solutione, sive tunicæ & membranæ exterioris, sive etiam ipsius substantiæ effluere statuat: sed per cæcos membranæ ductus, qui ampliores reddi possunt, quando membrana copia humoris nimium dilatata attenuataque fuerit, ut mediante nostro calore per ipsam aqua transsudare, ac sic paulatim stillare queat. Cæterum hoc modo paulatim tantum humores à jecore excidunt, non confertim fluunt. Ascites ergo ut plurimum sic oritur, hoc est, citra aliquam membranæ deperditionem aut fissuram, si quando ab Hepatis vitio originem trahit. Si enim omnis hydrops ex manifesta continui solutione accideret, repente in omnibus generaretur, cum plerumque tamen semper paulatim aqua in abdomine colligatur. Quin imo cum omnis continui solutio in ejusmodi visceribus lethalis fere sit, nullus omnino convalesceret, cum multos tamen in principio curatos viderimus. *Alterà via* per quam aqua in Omentum confertim irrumpit, venæ sunt. Ex jecore enim per venam Portæ in ramum Splenicum & Lienem ipsum humor deponitur, qui deinde in ramos Ventriculorum adeunt, à quibus propagines ad Omentum disseminantur, influit; quarum tunicas vel copia dilacerat, vel acrimonia exedit, & sic in spatium abdominis vel omenti cavitatem fluit. Sunt & qui statuunt, citra vasorum solutionem, quæ difficulter hic contingere queat, cum vasa omenti undique copiosa pinguedine cingantur, per cæcos ductus humorem transsudare, ubi omenti venæ aqua repleta fuerint. Quæ sententia mihi profecto non displicet, cum sciam ex Hippocrate per tunicas arteriarum venarumque ex abdominis capacitate ad renes etiam crassos humores pelli, qui certe non aliam viam, quam cæcos hos ductus sequuntur. Quin imo aquam in abdomine contentam quandoque confertim ad intestina

Altera.

ad intestina confluere & per alvum expurgari videmus, quod non nisi raptis in venas mesaraicas humoribus contingere potest. Tertia tandem *via*, & quam omnino Galenus ac Recentiores quoque ignorasse videntur, est *Lobus exiguus* in cava Hepatis parte juxta Portas vocatus situs, qui in ipsam Omenti cavitatem totus reconditur, ab aliis Anatomicis nondum descriptus. Hic enim longe tenuiore membrana, quam reliquum hepar tegitur, ut omnino credibile sit, à levi injuria, facillime perrumpi. Accedit, quod & ipsa substantia mollissima sit, ut cuius patebit, qui parenchyma à venis liberare voluerit, cum vel levi affricatione digitorum discedat. Ut taceam in hoc loco complures venæ cavæ propagines, & ipsum venæ Portæ truncum esse situm, in quibus major ferosi humoris copia, quam in aliis jecoris partibus contineri potest. Per lobum ergo hunc, aut partes ei conterminas, quæ tenui omenti portione circumsepiuntur, in omenti cavitatem commodissime ferolum humorem ex jecore erumpere pronunciamus.

Quæritur autem, an quibus ita in omentum irruerit aqua, moriantur? deinde, an necessario moriantur? Contrarium enim hoc videtur Hippocrati lib. vi Aphorism. xiv: ubi, τὸ ὕδρωπ' ἐκ τοῦ ὕδατος, ὃ καὶ πρὸς τὴν φλέβαν ἐστὶν τὸ κατὰ τὴν ὑδρατὶν, λίσσε. *Hydrope*, inquit, detento, si quæ in *venis* est, in *ventrem* aqua confluerit, solutio fit. Eandem sententiam repetit in Coacis prænotionibus, ut videatur omnino magni esse momenti. Sed dicatis, in nostro aphorismo per Ventrem, abdominis capacitatem; in laudato modò, alvum & intestina intelligi, ut adeo uterque sit verus. Aqua enim si ad alvum abeat, morbus solvitur: at si in Ventre remaneat, partium naturalium calorem debilitat primum, deinde exstinguit, unde mors sequitur. Non tamen necessario, sed ut plurimum; cum fieri possit, ut sponte naturæ aqua in ventre collecta per urinas aut alvum expurgetur. Hinc illud in Coacis prænotionibus oraculum: In aqua intercute incipiente, alvi profluvium aquosum oboriens citra cruditatem, morbum solvit. Cæterum ut judices, an aliqua salutis spes reliqua sit, præ cæteris urinas inspicere, quæ si paucæ reddantur, sintque rubicundæ ac crassæ, & febris valida detineat, de ægro conclamatum esse dixeris.

Sed restat dubitatio, quomodo jecur ita repleti aqua queat, ut si aqua illa in omentum irrumpat, venter inde distendatur, & ægri moriantur? Videtur enim fieri non posse, ut tanta aquæ copia in jecore contineatur, quod triplo minus est abdominis cavitatem. Sed vero jecur postquam aquam illam exoneravit, tum demum propter imbecillitatem & vasorum dilatationem nimiam factam & generat, & facile ex universo venoso genere suscipit novam materiam, quæ continuo deinceps in cavitatem imi ventris exstillat. Et hoc illud ipsum est, quod Hippocrates dicebat, si scilicet hydropico succedat alvi profluvium, ita ut aqua, quæ in venis est, ad alvum convertatur, morbi sit solutio. Quod enim reliquum est aquæ in abdomine contentæ, Natura sæpe dissipare ac discutere consuevit, præsertim si bona victus ratio & medicamenta accedant in auxilium.

CAPUT VII.

De Gula.



CUM Ventriculus Gulae five Oesophago continuetur, de utroque hoc libro agemus, quantumvis Gula in medio potius, quam infimo ventre sit sita. Pars ergo illa teres, quæ ab ore ad Ventriculum descendit,

Græcis οισοφάγος dicitur, & proprie σίμαχος, ὡς τὸ μήκος καὶ ἐντέλειον, *Synonymia.*

à longitudine & angustia sua, ut testatur Aristoteles ipse lib. i Histor. de anim. cap. xviii: ubi, ἐν τῷ δὲ, inquit, τὸ αὐχένιον, ὃ, τὸ οισοφάγον καλεῖται. *Etymologia.*

μήκος ἐστίν, ἔχων τὴν ἐπιφανομένην ὡς τὸ μήκος καὶ ἐντέλειον. Quem locum doctissimus Gaza sic interpretatur, Gula intra collum est, ab angustia & longitudine nuncupata. Cum ita potius ver-

tendus esset; Intra collum οισοφάγος vocatus est, cognomen habens à longitudine & angustia. Sed locus tamen ipse nihilominus obscurus manet, cum οισοφάγος ab antiquo potius verbo

εἶν φάσμα, h. e. ferendo intro quod esculentum est: at σίμαχος, quasi σῆνός καὶ μακρός dicatur.

Ex quo fit, ut locum illum paulo aliter legendum censeam, præsertim cum capite xii dixerit, σίμαχον intra collum asperamque arteriam situm esse. Vera ergo lectio fortas-

sis hæc est: ἐν τῷ δὲ αὐχένιον οισοφάγον καλεῖται ἐστίν, ὃ, τὸ καὶ σίμαχος, ἔχων τὴν ἐπιφανομένην ὡς τὸ μήκος

Tertia, I.C.
BVS Hepatis
mentum antea
descriptum.

An morian-
tur, quibus
aqua in omen-
tum irruerit,
et an necessa-
ria.

μήκος & στενότης. Intra collum *oesophagus* vocatus est, qui etiam *stomachus* à longitudine & angustia dicitur. Latini *Gulam* vocant, Arabes *Meri* & *Veset*. Dixi autem hanc partem proprie *Stomachum* Græcis vocari, quod apud Latinos hæc vox pro *Ventriculo* quoque sumatur, ut cum Celsus inquit; *Imbecilles stomacho*, quales maxima pars *litteratorum*, omnesque fere *cupidi litterarum* sunt. Est autem pars organica, cujus initium à faucibus ad linguæ radicem, statimque inter asperam arteriam, cui substernitur, tum corpora vertebrarum colli & quatuor priorum thoracis, quibus insidet, recta descendit. At ubi ad quintam thoracis vertebram pervenit, trunco arteriæ magnæ descendenti cedens, nonnihil ad dextrum latus flectitur; deinde cum eadem ad nonam usque deductus, paululum à corpore vertebræ membranarum beneficio elevatur, arteriamque supergrediens, *Diaphragmatis nervosum corpus* à lævo latere pertransit, & circa undecimam Thoracis vertebram ventriculi sinistro orificio inseritur. Constat autem ex tribus membranis; quarum una, communis est; duæ, propriæ. *Communis membrana* proprias involvit & cooperit, quam nonnulli à Peritonæo, alii à ligamenti vertebrarum, quibus adhæret, deducunt. *Propriarum* prima, sive externa, carnosæ & crassæ est, transverfis tantum fibris donata: altera & interna, membranosa, fibris rectis & tenuissimis constans, membranæ illi, quæ palatum, os, fauces & labia tegit continuata; ex quo fit, ut in labiis signa futuri vomitus appareant. *Venas* habet, tum à Cava, tum vena Portæ. A Cavæ quidem ramo sine pari, dum in Thorace adhuc est; à Portæ autem vena, ubi Ventriculo jungitur, sparsis versus superiora à coronario ramo furculis. *Arteria* ab Intercoastalibus & Cæliacæ ramo Coronario accedunt. *Nervi* autem insignes, à sexto pari, qui oblique securitatis gratia deferuntur, ut inquit Gal. lib. vi de Vsu part. cap. vi; & copiosi sunt, unde tam exactus circa superius ventriculi orificium sensus. Habet & *glandulas*: duas quidem in faucibus, gulæ & laryngi communes, quæ salivalem humorem, ne exsiccentur, præparant, & Latinis *Tonillæ* vocantur: alias vero duas in medio stomachi ductu, à posteriore ipsius sede, qua is asperæ arteriæ in duos truncos divisæ subjicitur.

Vfus. Vfus Oesophagi est, ut infundibili loco serviat, per quod cibus ac potus in ore nonnihil confectus ad ventriculum transmittatur. Sed præter hunc & *Actionem* habet, cum cibum excipiat per dilatationem membranæ propriæ interioris, & excerptum detrudat in ventriculum per constrictionem externæ tunicæ propriæ & musculorum, quos *Pharyngis* vocavimus, supraque libro quarto descripsimus.

Actio.

CAPUT VIII.

De Ventriculo.

*Synonymia.
Figura.*



Situs.

Magnitudo.

Nota.

VESOPHAGO Venter continuus est, qui Græcis γαστήρ, & κοιλία dicitur à cavitate: at Latinis *Ventriculus*, ad discrimen ventrium majorum. Hic figura utriculari pastorum tibix perquam similis est, cum oblongus sit & rotundus supra gulam; inferius duodenum connexum habens, quibus duas illas fistulas eleganter exprimit. A sinistris, & in fundo amplior paulo: at dextrorsum sensim attenuatur. *Situs* autem est in superiore infimi Ventris parte, inter primas lumborum vertebrae & cartilaginem mucronatam, fundoque ad umbilicum usque, præsertim dum sedemus aut ambulamus, porrigitur: quod si cibo potuque repletus sit, ulterius etiam nonnihil descendit. *Elatiore sui parte*, qua superius orificium est, in sinistram partem paululum declinat: *inferiore autem*, in dextrum latus. Proxime ergo Diaphragmati subjacet, quod majore etiam parte contingit, unde admodum alimentis distentus, Diaphragmatis motum impediendo, *Dyspnæam* concitat. *Anterior* & à dextris, hepatis cavo tegitur; à lævis, Liene; *posterior*, Arteria magna, Venaque cava, & pancreas sita sunt, à quibus veluti focalis quibusdam incalciscit. Quamobrem si hujusmodi viscera affecta sint, præsertim si scirrhus aut aliqua frigida intemperie laborent concoctionem necessario lædi, facile ex his colligitur. *Magnitudo* ipsius, etsi ab Hippocrate quinque palmorum longitudine definita sit, admodum tamen variat. Communiter fœminis, quam maribus minorem contigisse observavimus; quod propter uterum, ut commodius in gravidis distenderetur, evenire crediderim. Notavi etiam in Viri cadavere ventriculi amplitudinem quatuordecim

decim aquæ libras cepisse, & magnitudinem etiam in vivis ex oris longitudine desumi posse, cum grandiore habeant ventriculum, quibus os majus est. *Connectitur sinistro orificio*, cum gula; *dextro*, cum intestino duodeno. *Fundo*, cum omenti parte superiore: *cima* vero, cum portione partis ejusdem inferiori. Constat autem ex tribus membranis; quarum *prima*, communis est, à peritonæo enata ea parte, qua septum transversum circa superius orificium succingit. Rectas hæc habet fibras, & omnium quæ à peritonæo prodeunt, crassissima est. *Alteræ*, quæ exterior propriarum, tota carnosa est, transversis constans fibris, quibus paucae quædam, sed carnosæ oblique subjacent. *Tertiæ*, sive interior nervosa est, œsophagi, labiorum, & omnium quæ in ore sunt partium tunicæ continua, & triplici fibrarum genere mire intertexta: inter quas rectæ copiosiores sunt, & magis conspicuæ. Habet præterea *duo orificia* in elatissima sui regione: *unum*, quod sinistrum dicitur, & dextro majus est, cui Oesophagus continuatur. Vocatur Græcis, *καρδια*. Latinis quoque Cor (unde & dolores in ipso facti, *καρδιαλγία* & *καρδιογμοί* dicuntur) quod maximus inter cor & ipsum sit consensus, non quidem, ut vulgo creditur, ob vicinitatem, sed potius ob nervos, qui ex eodem ramo sexti paris in utrumque viscus disseminantur; unde fit, ut uno laborante, alterum similiter afficiatur. Constat hoc fibris carnosis orbicularibus, ut alimento intra ventriculum recepto, exacte claudatur, cum plurimum in coctione referat, ne fumi à cibus elevati & cum his calor dissipetur. *Alterum*, dextrum dicitur & inferius, quamvis non minus in elatissima quoque sede sit positum, quod Veteres, à quibus hæc appellatio fluxit, male crediderint in inferiore loco reponi. A Græcis *πύλωρος* dicitur, quasi Ianitor, quod cibus ex Ventriculo ad intestina viam aperiat. Huic præter transversas, quas habet, fibras, intrinsecus crassior spissiorque circulus circumjectus est, sphincteris musculi in modum, ut & claudi & aperiri queat. *Venas* complures habet, quæ tamen omnes à Portæ vena originem trahunt, & vel à Trunco vel Ramis, iisque Splenico aut Mesenterico. A *Trunco* quidem, Pyloricus ramus. A *Splenico* autem, Gastrica vena, à qua Coronaria nascitur, Gastroepiplois sinistra & Vas breve. A *ramo Mesenterico* antequam dividatur, Gastroepiplois dextra. *Arterias* habet ab arteriæ magnæ ramo Cæliaco, quæ singulas venas comitantur, de quibus supra libro sexto dictum est. *Nervos* complures & insignes à sexto pari, qui una cum œsophago Diaphragma transeuntes sese interfecant; & *dexter* quidem, sinistram & anteriorem: *sinister* vero, dextram & posteriorem ventriculi partem cingit; unde fit, ut exactissimo sensu orificium superius sit donatum. Voluit enim Natura, ut esset fides appetitus animalis & defectum alimenti in corpore quam celerrime perfentiret, cum deficiente in Venis naturali sanguinis copia, exhausti nonnihil in corporis nutritione, Ventriculus & potissimum ejus interior tunica constringatur, unde tractis nervis dolor ille, quem famem appellamus, nascitur. *Incedunt* autem tria hæc vasorum genera inter tunicas ventriculi, & quidem communem & proprias, sicque extremis oscillis in internam propriam terminantur.

ACTIO *Ventriculi*, est ciborum in chylum conversio, quam Græci *χύλων* appellant. Est autem *Chylus* succus albus & mediocriter crassus, cremori hordei non absimilis, à Ventriculo ex alimentis per concoctionem elaboratus. Coctio autem hæc per calorem fit, nec tantum illum, qui substantiæ Ventriculi innatus est, aut à Corde indefinente fluxu suppeditatur: sed & quem circumstantes partes suo fotu suggerunt, cujusmodi sunt in *dextra* parte jecur, in *sinistra* lien, *superius* diaphragma, *inferius* intestina, ante omentum, retro arteriæ & venæ cavæ trunci. Calor autem hic non est nimius, ne adurat; sed moderatus & blandus, humiditatis cujusdam non expers, ut elixationi similis sit illa coctio. Ut autem quamplurimum ipse in se reciperet, nec tamen multum loci occuparet, *figuram* rotundam nactus est, utpote capacissimam; longam tamen, ut duo orificia contineret, quorum utrumque in elatissima regione est situm, ne si in fundo alterutrum fuisset, stimulum cibi pondere incoctum adhuc alimentum exegisset. *Magnitudo* autem tanta est, ut cibi una vice recipiat, quantum ad nutritionem est opus. Fecit etiam *substantiam* ex membrana, ut & extendi, dum cibum, præsertim in copia sumimus, & contrahi iterum possit, dum munere suo peracto exinanitur. Ne autem confestim elaboretur, cum coctioni certum debitumque tempus sit definitum, interiorem membranam omni fibrarum genere intertextuit, quibus constrictis, undique cibum amplectatur.

amplectatur & contineat. Contra ut perfecto absolutoque opere chylo liberaretur, exteriori transversas fibras largita est, quibus ad intestina protrudit. Vnde & duo orificia nactus est; unum, quo excipit; alterum, per quod expellit. Et illud quidem hoc amplius est, ut cibus leviter tantum à dentibus præparatus, neque satis bene comminutus, prompte tamen in Ventriculum transiret, ne helluonibus & famelicis facile in via hærendo suffocationis aut quod aliud periculum crearet; quod metuendum non erat, ut in inferiore fieret, per quod jam ille nisi coctus & elaboratus in chylum non transit. Venas etiam habet, ut nutriatur, cum non minus ac omnes aliarum partes sanguinem pro alimento habeat. Arterias, ut vivat; & Nervos, ut sentiat. Alios usus horum vasorum libris præcedentibus quarto & sexto exsequuti sumus, quos brevitatibus studio nunc non repetemus.

Explicatio
aphorismi
54, sect. 7.

Quid per ca-
vitatem in-
telligat Hip-
pocrates, opi-
mones blan-
tius.

Galen.

Author.

Sed enim cum hætenus complures Hippocratis aphorismos, qui citra historiam anatomicam intelligi non queunt, exposuerimus, quam rem ut utilem, sic quoque gratissimam studiosis futuram judicavimus, merito laboris pretium facturi nobis visi sumus, si huc difficillimi illius explicationem conjecerimus, quem nescio an quisquam adhuc ante nos recte intellexerit. Aphorismus est quinquagesimus quartus ultimæ sectionis, in quo ita pronunciavit Hippocrates: Οἷοντι μετὰ τὸ φρενὸν ἔστι πνεῦμα φλέγμα συμπύκνωται, καὶ οὐδὲν παρέχει εἰς τὸν διάφραγον εἰς ἀντίπλευρον καὶ ἰσχυρὸν, ταῖσι τοῖς κατὰ τὴν φλέγαν ἐν τῷ κόλπῳ τεταμένον. ὅθεν φλέγμα, ὅσον πῦρ, ἔστιν. Quibus inter ventriculū & septum transversum pituita concluditur, doloremque infert, ad alterutram cavitatem exitum non habens, is per venas ad vesicam conversa pituita, morbus solvitur. Controversia est quid per cavitatem illam intelligat, quam inter ventriculū & septum transversum conclusam ait. Marinus antiquus Medicus & qui dudum ante Galeni tempora floruit, & aphorismos commentariis illustravit, statuit cavitatem hanc inter carnosam septi transversi partem & peritonæum esse, quo septum inferiore sui parte tegitur. Negat enim fieri posse, quod, ut ipse loquitur, infra septum transversum est, sed intra eam membranæ abdominis interioris partem, quæ ad epigastrium attinet. Sed cum & sic impropria quædam dicendi ratio foret, illam ego merito cavitatem statuerim, quæ ad sinistrum orificium ventriculi sub Diaphragmate membranis inclusa occurrit, in qua aquam, flatum, & pituitam coacervari sæpenumero observavimus. Vis autem per quas Pituita ad hanc cavitatem pervenit, pori sunt & insensiles illi meatus membranarum ventriculi, per quos transsudat, cum totum corpus sit transpirabile. Quæ sane viæ pluribus à me excogitatæ parebunt, nostrosque effectæ cerebro, cum nec ipse negem prima fronte vix credibile quid videri: at iis, qui in Naturæ operibus, tum eorum, qui ex morbis obierunt, dissectionibus diligenter versati sunt, nihil omnino quod mentem in admirationem possit trahere, digni æstimabitur. Quia imo hoc loco exoptem, uti omnes qui Medicinæ navant operam, hanc corporis transpirationem bene animo suo comprehendant, cum ex hac multarum gravissimarum quæstionum solutiones promptissime petantur. Cæterum abundat in Ventriculo pituita, vel ob destillationem à capite, vel propter crudos humores ex crassis cibis genitos; quo pacto memini à me curatum, qui ab esu anguillæ in hunc affectum incidit; & alium quendam, qui admodum huic malo opportunus erat, si quando crudos cibos vel degustaverat. Collecta autem sic pituita dolores concitat, quod sinistrum ventriculi orificium tum frigiditate pituitæ, tum flatibus inde obortis afficiatur. Dolor autem hic nonnunquam adeo exacerbari consuevit, ut ægri animi deliquio corripiantur. Tenetur autem conclusa, quod neque ad mediū ventris cavitatem ob solidiorem diaphragmatis substantiam: neque ad imi, ob dictam membranam transfundare queat. Hos enim ventres per ἀντίπλευρον καὶ ἰσχυρὸν intelligit, quamquam non desint, qui credant Hippocratem Thoracem & ventriculū denotasse; qui tamen errant, cum hos frequenter sic; & Thoracem quidem, τὸν κόλπον; at imum ventrem, τὸν κάτω appellent. Accedit, quod expresse in hoc aphorismo Ventriculū πνεῦμα vocet. Quod si tandem inquirat, per quos ductus pituita hæc in vesicam transfluat; illi respondeo, Venas esse ex Hippocratis sententia: intelligi

intelligi autem venam Cavam & Arteriam magnam, in ejus ramos illi cavitati vicinos attenuata à nostro calore pituita rapitur, & postea per emulgentes propagines in renes transmittitur, à quibus ad vesicam tandem derivatur, cum via sit eò rectissima. Quo loco nota, non solum divinis Hippocrati hanc de qua diximus, transpirationem corporum fuisse cognitissimam, ut ex diversis ipsius oraculis, præcipue libro de Alimento patet, sed & eandem hic ad usum revocatam, cum dicat pituitam hanc in venis ex illo spatio rapi, inde ad urinæ vias transmitti,

CAPUT IX.

De Intestinis.



Venter Gulæ Ventriculus, sic ventriculo continua sunt *Intestina*, quæ Græcis *έντερα* dicuntur, *έντερος τὸ ἐνὸς έναι*, quod in intimis corporis partibus consistant. Fuere nonnulli, qui *χολεάδας* dixerunt, quod bilem, *χολεά* appellatam excipiant. Latini communiter *Intestina*, & nonnulli *Intestina* vocant, quæ tamen vox in latiore significatione usurpata quævis interiora viscera peritonæo inclusa denotat. Hinc phrasis illa apud Latinos vulgaris, quæ *exenterare* dicunt animalia, cum interiora viscera eximuntur. Barbari *Chordas* nuncuparunt, quæ appellatio postea fidibus cessit, quæ ex intestinis fiunt & testudinibus obducuntur. Fuit tamen hæc vox & Græciæ olim familiaris, quod patet ex Athenæi lib. VII *Δαιμονιον*. ubi hæc dorum *intestina* *χολέδας έντερον* appellat. *Sita sunt in infimo ventre, cujus amplitudinem fere universam occupant, & cum longissima esse debuerint, quo facilius caperentur, plurimis modis invicem sunt convoluta.* *Conneſtuntur* autem beneficio mesenterii, cujus interventu, quemadmodum & omenti, dorso alligantur, cæterum ab ilium offibus magna ex parte sustentata. *Initium* ipsorum, à dextro ventriculi orificio sive pyloro est, cum quo continuantur: at finis, in podice terminatur. *Figuram* naſta sunt teretem, quæ quibusdam locis deprimitur, aliis recta est, nonnullis in sinus implicita. *Longitudinem* autem tantam habent, ut quatuordecim fere ulnas Patavinas æquent, vel si mavis cum cæteris Anatomicis efferre, sumpta mensura à corporis proportionem, sexies longiora sint eo homine, cujus sunt *intestina*. *Craſſities* tamen inæqualis est; cum alia, craſſiora sint; alia, tenuiora. *Substantia*, Ventriculi substantiæ non abſimilis, cum tribus consent tunicis; una, communi; & duabus, propriis. *Communis* quidem, mediate à Peritonæo derivatur: at immediate, in Duodeno & ea coli parte, quæ ventriculo adhæret, ab inferiore omenti membrana exoritur, in jejunum autem, ileo & reliqua coli parte, & craſſis intestinis, à Mesenterii membranis. *Prima propriarum*, sive exterior, membranosa est: *secunda*, & interior, nervea; quamvis ob crustam, qua intrinsecus succingitur, & ex tertie coſtionis excrementis ipsorum intestinorum enata est, carnoſa videatur. Inter communem & proprias, quemadmodum & in Ventriculo, vasa discurrent, Venæ & Arteriæ Mesaraicæ vulgo nuncupatæ. *Oriuntur Venæ* à Vena portæ, tametsi non ab uno & eodem ramo ad singula dispergantur. *Ad intestinum* enim *Duodenum*, duodena mittitur; *ad Jejunum*, *Ileum*, *Cæcum* & *Coli dextram partem*, Dextra mesenterica: *ad sinistram autem Coli*, totumque *Rectum*, Hæmorrhoidalis: *ad mediam vero Coli partem*, quæ sub ventriculo transverſim incedit, Epiplois postica. *Ad rectum* tamen *intestinum*, etiam à Cavæ ramo hypogaſtrico vena mittitur, quæ Hæmorrhoidalem externam constituit, de quibus omnibus supra libro quinto egimus. *Arteriæ*, partem à Cœliaco ramo, partim ab utraque Mesenterica oriuntur. *Ad Duodenum* quidem & *Jejuni initium*, propago à dextro Cœliacæ ramo mittitur: *ad Jejuni autem reliquum*, *Ileum*, *Cæcum* & *Coli partem dextram*, Mesenterica superior: *ad Coli vero partem sinistram* ac *Rectum intestinum*, Mesenterica inferior, quæ cum venis ad extremum podicem descendens, Hæmorrhoidalem arteriam constituit. Tandem *ad Coli partem mediam*, quæ Ventriculo subest, Epiplois postica vadit, quæ ab inferiore parte Arteriæ Splenicæ, quæ Cœliacæ sinister ramus est, enascitur. *Nervos* habent, à sexto nervorum pari: Et *Duodenum quidem*, exiguis à stomachicis, qui pylorum adeunt: *reliqua* quamplurimos, utrinque à ramo, qui coſtarum radicibus exporrigitur: *Recti* autem finis sive Podex, quatuor à quinta conjugatione ossis sacri.

Pinguetia. Hinc tam exactus intestinorum sensus, gravissimique dolores in colo & recto male affectis perferuntur. *Foris pinguedinem* adnatum habent, quod diligenter notandum est contra Medicos complures, qui statuunt pinguedinem in dysenteriae initio ab intestinis abradi. Quam prorsus ineptam sententiam ineptius adhuc probare conantur ex intestinis animalium domesticorum, quæ mensis quotidie inferuntur, in quibus pinguedo internam superficiem occupat, ignari à Lanionibus intestina ad defaecandum commodius inverti. *Intrinsicus* mucosa quadam substantia obducuntur, quæ pituita quadam est excrementitia, in prima coctione nata, qua sapientissimus Opifex intestina quasi invitravit, ut alvi faeces lubricitate promotæ ex corpore promptius depellantur. Hujus utilitas quanta sit, tum demum intelligimus, cum post diuturnas alvi fluxiones, in quibus pituita hæc una excreta est, ventris beneficium desideramus. Vt cumque autem intestinorum unus continuusque sit ductus, adeoque unum intestinum dici possit, quidquid ab infimo Ventriculi orificio ad extremum usque anum porrigitur; solent tamen complura numerari ob diversitatem, quæ occurrit circa substantiam, figuram, situm, magnitudinem, vasa, & officium. Ratione enim *substantiæ*, crassiora vel tenuiora dicuntur: à *figura*, alia recta, ut duodenum & rectum; alia, anfractuosa, ut Colon; item levia, aut aspera. Pro *situ*, vel mediam abdominis sedem occupant, ut tenuiora; vel lateralem, ut crassa. A *magnitudine*, quædam ampliora dicuntur, ut colon; quædam angustiora, ut cæcum. Alia longiora, ut ileum; alia breviora, ut duodenum. Ratione *vasorum* notatu digna est differentia. Quædam enim plura recipiunt, ut jejunum & ileum; quædam pauciora, ut duodenum & rectum. Ab *officio*, quædam chylo perficiendo & distribuendo dicata sunt, ut tenuia; quædam fecibus colligendis & excernendis, ut crassa. Cæterum utcunque sit, recepta est hucusque ab Anatomicis divisio, petita ex diversitate *substantiæ*, adeoque intestina in tenuiora, λεπτὰ ἰντερα, ἀγυὰς & σπῆλαι, & in crassiora sive πικρὰ dividuntur. Numerantur autem tria tenuium, totidemque crassorum.

TENIVM. *Primum.* TENVIVM primum, ab Herophilo δωδεκαδάκτυλον, à nostris Duodenum dicitur, quod longitudine duodecim transversos digitos exæquet. *Oritur* hoc à dextro Ventriculi orificio sive pyloro, quo nomine à Galeno ἐκφυσις dicitur: recta deinde sub ventriculo ad posteriora descendit, quousque intestina cætera in gyros & anfractus cum mesenterio involvi incipiunt, cum solum hoc cum mesenterio non connectatur.

Secundum. *Secundum tenuium*, ἰντερον sive Jejunum dictum, quod in cadaveribus semper fere vacuum reperiatur, ob vasorum multitudinem, & flavæ bilis vim acrem, quam ab hepate recipit adhuc puram. Hujus *principium* à dextris est sub colo, ubi duodenum desinit & intestina torqueri incipiunt; ac circa umbilicalem regionem, quam fere totam occupat, in orbem quamplurimos convolutum in ileum terminatur. Habet autem *Venas* & *Arterias* tum majores, tum frequentiores, quam cætera intestina, ut nihil omnino præterlabatur chyli, quin ad hepar quam celerrime traducatur. Est autem tanta harum copia, ut vel ex hac sola totius jejuni circumscriptionem Anatomici nobis designent. In hujus principium, *Meatus biliaris* inseritur, per quem ab hepate bilis evacuat, quæ postea intestina ad expulsionem stimulat, ac una cum fecibus extra corpus deturbatur. *Longitudo* ejus duodecim palmarum est, triumque digitorum: at latitudo digiti annularis transversus. Cum autem duæ membranæ sint propriæ, ex quibus constat, interior externa longior est, quod *plicis* innumerabilibus sit corrugata, quæ transversim & orbiculariter intestinum cingunt, ut chylum præterlabentem morentur & æqualiter extendant.

Tertium. *Tertium* tenuium, Græce λεπτόν dicitur, sive Tenue, κατ' ἐξοχὴν, à membranarum quam præ reliquis habet, tenuitate. Nonnulli & αἰλόν vocant, & ab hoc Ileum morbum denominari statuunt, cum Hippocrates cæterique omnes elegantiores hoc nomine pro morbo utantur. Quin & Galenus expresse lib. 11 meth. med. cap. 11, nomen Ileos non à parte laborante, sed à symptomate deductum esse testatur, siquidem αἰλὸς idem sit, quod circumvolvi. Latini horum errorem sequuti *Ileum* communiter appellant. *Initium* ducit, ubi minores paucioresque Venæ reperiuntur: at finit circa dextrum renem, ubi tum cæco, tum colo jungitur. Totum autem subter umbilicum, ad ilia utrinque & coxas situm est, omnium intestinorum *longissimum*, cum viginti & unum palmum exæquet. Cæterum ut longitudine reliqua superat, ita ab iisdem latitudine superatur, cum angustissimum sit, si cæcum excipias, & vix transversum digitum æquet. *Plicas* habet in tunica

tunica interiore rariores & minores, quam jejunum, quæ circa finem sensim obliterantur. Est autem *substantia* tenuium intestinorum eadem fere, ut diximus, quæ Ventriculi, cum consistit ex tribus tunicis; una, *communis*, quæ à peritonæo nata est; & *duabus propriis*, primum *externa*, quæ interna tenuior est, & carnosior, transversis atque orbicularibus fibris, ut ego quidem reor, insignita, & paucis quibusdam rectis, ad transversarum tantum tutelam. Deinde *interna*, rectis partim, partim obliquis, paucioribus tamen rectis, quam crassorum intestinorum tunica donata.

C. ^a CRASSA deinde sequuntur, quæ Ileo intestino adnectuntur, ex quibus primum est ^{CRASSA.} ^{Primum.} *Cæcum*, *πυλὸν* Græcis, & sic dictum, quod alter ejus terminus clausus sit & foramine careat, adeoque per idem foramen ingrediatur chylus, exeatque. Hinc barbaris Orbium, & Monoculum vocatum fuit. *Figura* in homine, crassum ac teretem lumbricum in orbes convolutum æmulatur, cum tenue admodum sit, quo nomine & inter tenuia potius, quam crassa referendum videatur. Quia tamen quadrupedibus, simia inquam, cane, aliisque (in quibus prisci Anatomici exercebantur, qui primi partibus appellationes tribuere antequam humani corporis dissectiones aggressi sunt) crassius est tenuibus, vel quia ejus *substantia* in homine quoque paulo crassior est ea, ex qua tenuia intestina constant, propterea in crassorum numerum relatum fuit. *Majus* est in fœtu, quam adulto, si corporis proportionem inspicias; & in hoc longitudinem quatuor digitorum transversorum, at latitudinem pollicis habet. Mesenterio non adnectitur, ut cætera intestina, sed quibusdam quasi fibris in orbem convolutum, reni dextro mediante peritonæo adhæret. In homine sano semper inane est; reperi tamen in quodam cadavere Patavii Lumbricum rotundum continuasse: in quadrupedibus contra, plenum semper est excrementis. Hoc simiæ majus habent, quam Homo; & illâ canes adhuc majus, sed longe maximum cuniculi, sciuri, & glires.

C. ^b Secundum crassorum, ^b Colon est; *κόλον*, *ὅθεν τὸ καλῶν*, à retardando dictum, quia scilicet in eo excrementa alvi remorentur. Absyrtus antiquus scriptor in Hippiatricis, *τὸ τὸ καλῶν ἐν ἐαυτῷ* derivat, quod in seipsum contorqueatur. Hippocrates lib. vi Epidem. *ἔντρον* appellat κατ' ἐξοχὴν, hoc est, simpliciter intestinum. Absyrtus etiam *μυστρον*, quasi dicas, quod solum intestinum est. *Oritur* superius, ab ileo & cæco; & inferius, ad initium recti circa primam ossis sacri vertebra terminatur. Ortum enim statim per dextrum ilium ascendit, ac ubi ad hepar pervenit, flexum sub Ventriculi fundo transversim ad sinistrum ilium abit, in quo iterum viam flectens, deorsum usque ad ossis sacri initium excurrit. *Alligatur* autem primum in dextro latere reni dextro, ope membranæ externæ; deinde in medio ventriculi fundo; ac tandem in sinistro latere reni lævo. *Longitudo* ejus palmarum septem est, totidemque digitorum; at latitudo pugnum æquat. Est enim amplissimum, ut quidquid chyli inutilioris remansit, in se recipiat & aliquamdiu complectatur, ne Homo, animal sapientiæ studio Musisque dicatum, egerendis fæcibus continuo interpellatur. *Figuram* teretem servat, ut cætera intestina; inæqualiter tamen variis extuberantiis modo intumescit, modo subsidet, idque propter *Cellulas*, quas intus habet. Nascuntur hæ *Cellulae* ex interiore tunica, in quas rugæ ipsius expansæ sunt, quæ à lateribus evidentius comparent: at quo viciniore sunt ipsi recto, eo magis obliterantur, adeoque ipsum colon æqualius redditur. Ne autem cellulae hæ dissolvantur, provida Natura *ligamento* quodam & vinculo prospexit, quod per hujus elatiorem & mediam sedem secundum intestini longitudinem excurrit, sed medii digiti latitudine est, quo rupto aut laxato protinus evanescunt. Sunt & *appendiculae* quædam pingues, quæ adnascuntur ubi propius ab intestino recto abest, evidentissimæ in valde obes. Habet & *Venas & Arterias*, quamvis pauciores & minores quam gracilia, delatas à ramis venæ Portæ & Arteriæ magnæ. *Nervos* autem à sexta conjugatione frequentes, unde tam exactus in ipso sensus est. Cæterum hoc loco minime prætereunda ^c est *valvula*, *valvula*, à Recentioribus Anatomicis in exortu hujus intestini, ubi Ileo jungitur, inventa, membranosa, orbicularis, sursum spectans, unoque verbo, similis illis signiformibus, quæ in cordis sinibus continentur. Magnum profecto & egregium divinæ providentiæ specimen, cujus vestigia cum per totam hanc rerum universitatem summa solertia diffusa sint, in quibusdam rebus singulariter eminent. Quia enim in alvi excretionem, quæ per ventris compressionem fit, à musculis abdominis septoque transverso faeces in Colo-

contentæ, in tenuiora intestina regurgitare poterant, & hinc vomitus stercoracei consequi, regressum illum Valvula hæc egregie coercet & impedit. Aperta enim tam exacte foramen illud, quod ileo coloque commune est, occludit, ut ne flatus quidem in ileum possit ascendere. Hanc valvulam si quis videre cupiat, rectum intestinum aqua repleat, & dependente Colo à manu suspendat. Aqua enim ubi ad valvulam pervenerit, consistet, nec ulterius ne vi quidem adacta progredietur, nisi valvula illa prius rupta ipsi cesserit. Et hoc est, quod Galenus lib. xiiii meth. med. cap. xvii, observavit, quamvis causam ignoraverit, Clysteres per sedem infusus ad jejunum usque intestinum ascendere neutiquam posse. Quod tamen ipsum de sanis tantum, iisque quibus secundum naturam se habet Valvula intelligendum est, cum sæpenumero in dissectionibus à me observatum sit, Valvulam hanc laxiorem quibusdam à morbo fuisse, ita ut aqua vel aer inflatus per colon in ileum pertransierint. Rarius tamen id contingit, nec nisi præter naturam in iis, qui ileo & colicis doloribus vexantur, quibus interdum clysteres ad Ventriculum usque una cum excrementis sic ascendunt, ut vomitu reddantur. Et in hujusmodi casibus Valvulam hanc ruptam aut male affectam fuisse credendum est: vel mucos pituitaque crassâ ita oblitam (quod facilius mihi persuaserim) ut cæco ac colo quasi agglutinata aperiri haudquaquam potuerit. Atque hoc est quod idem Galenus lib. iiii de sympt. causis. notavit, aliquibus clysteres injectos sic ascendisse, ut vomitu rejecti sint, non secus ac feces, quæ per lethales volvulos nonnunquam evomuntur. Illud autem notatu dignissimum est, tenuium intestinorum membranarum propriis coli proprias esse crassiores & nervosiores, quantoque propius ab intestino recto absunt, eo magis crassescere; & interiorum tunicam transversis circularibusque fibris plurimis donari, paucis rectis, nec iis valde conspicuis, cum tenuium intestinorum tunica interior, obliquas habeat, paucas rectas: exterior vero, transversas.

Tertium.

Tertium & ultimum crassorum, Rectum est, Græcis ἀνθρώπου δίκτυον dictum, quod à principio ad finem recta semper sine spiris aut protuberantiis procedat. Vocatur etiam ἀρχον, vel quasi ἀρχή, quod principium videatur omnium intestinorum, vel quia ἀρχή sit & Princeps, summam in nos potestatem gerens, cum cogat nos vel in maxime seriis negotiis onera, quibus premitur, deponere. Colo intestino magnitudine admodum cedit, cum nec ita amplum sit & longe brevius, utpote spithamæ longitudinem non superans. Substantia tamen eadem est quæ Coli, præterquam quod in extremitate musculum habeat orbicularem, quem σφιγκτηρ Hippocrates vocat, de quo libro quarto dictum est. Tunica autem paulo crassiores sunt & carnosiores; ex quo fit, ut vulneratum consolidetur, præter cæterorum naturam. Hæ plurimas transversas, & nonnullas rectas fibras, paucissimas obliquas obtinent. Venas etiam non tantum ut reliqua à Vena Portæ, sed etiam à Cava habet, quæ ex magno ramo iliaco prodeunt, & Hæmorrhoidales externas constituunt. Oritur statim à Colo, cui continuatur in summitate ossis sacri, & pertingit ad extremum coccygem, ubi anum constituit.

ACTIO.

ACTIO intestinorum triplex est, meo iudicio. *Primus*, chyli à Ventriculo transmissi uberior coctio; *alter*, ejusdem digestio; *tertius*, expulsio. *Uberior* quidem coctio, cum interna intestinorum tunica si quid in Ventriculo non bene elaboratum sit, in horum longo transitu perficiat, ut notat Galenus lib. iv de Vsu part. cap. xvii & xviii: itemque introduct. cap. xi. Hunc usum quæcunque intestina præstant, cum benignissima Natura quam maxime sollicita fuerit, ut prima alimenti coctio quam perfectissima foret, quod sciret errores ejus in coctione secunda emendari neutiquam posse. *Digestio* autem, cum ex his succus qui in chylo est optimus, à venis & arteriis mesaraicis attrahatur, & ad hepar totumque venosum ac arteriosum genus distribuatur. Vfus hic similiter omnibus competit, præcipue tamen tenuibus; ex quo fit, ut vasa & majora frequentioraque obtinuerint. *Receptio* tandem & *expulsio* eorum quæ inutilia sunt, potissimum crassorum est, quæ primum quidem receptaculi munere funguntur & retinent, ne continuis excretionibus Homo in rerum divinarum contemplatione interpelletur, mox ubi aut copia sua, aut qualitate molesta fiunt, excernunt, pelluntque.

Ad hæc præstanda maxime opportuna fuit Intestinorum naturalis constitutio. Nam quoad sedem, perquam commodè in imo Ventre, & quidem inter Ventriculi inferius orificium extremumque podicem sita sunt, ut ab illo promptè suscipere, per hunc quæ superflua,

superfunt, detrudere possent: quidquid autem utile est, per venas mesaraicas & arterias rapi ad hepar, & ad arteriosum genus deduci queat. Ex his primum locum habet *Duodenum*, quod sub ventriculo ad posteriora reflectitur, ut lumborum vertebri adnectatur; minimeque flexuosum est, ne chyli ingressus præpediatur. *Iejunum* postea & *Ileum*, mediam regionem & proximam mesenterii centro occupant, ut ubique à centro æqualiter abessent, ex quo *Venæ Portæ* & *Arteriæ* magnæ truncus, à quo infinitas propagines distributas habent, emergit. *Colon* autem circa inania loca sive *xaraias*, & sub ventriculo situm est, undique tenuia ambiens, ut quia facibus primum continendis, mox excernendis destinatum erat, eo in loco jaceret, ubi tum à musculis oblique ascendentibus, tum à Diaphragmate commodius comprimeretur, & excretio facum voluntaria fieret. Laterales enim partes, dextram sinistramque oblique descendentes abdominis comprimunt; mediam, & quæ transversum sub ventriculo excurrit, ex superiore sui parte Diaphragma, ex inferiore tenuia intestina, quæ colon ambit. Cum autem Valvula impediatur, quo minus ad ileum regurgitent faeces, necessario per rectum intestinum, ubi nullum, quo quiescant locum invenerint, detruduntur. *Rectum*, eam potissimum sedem obtinuit, unde quam celerrime quæ excernenda sunt, expellere possit. Situm hunc ut perpetuo inter se servant, nec confundantur unquam, vicinis partibus annectuntur; primum quidem mesenterii beneficio, quod per hoc vasa mesaraica ad intestina deducantur, deinde & omenti, quod coli mediæ parti mesenterii loco inserviat. Ut autem una vice, quantum ad corporis nutritionem restaurandam sufficit, fuscipere apta sint, figuram accipere cavam & quidem teretem, utpote quæ capacissima. Rursus ut acceptum alimentum debito tempore retineant, & æqualiter per omnia extendant, longa sunt; maxime tenuia, quibus id muneri peculiariter tributum est. Crassa autem, quod tantum inutile colligant, breviora & ampliora sunt facta. Hinc & tenuia interiorem tunicam plenam rugis obtinent, ut transeuntem chylum remorentur & intercipient: crassa autem, anfractus & cellulas; ne in unum forte locum faeces colligantur & vicinas partes comprimant, sed potius per cellulas dispersæ æqualitatem coli observarent. Cum enim ex ventriculo cibus descendit, intestina copia irritata protinus, quam fieri potest, à se conantur propellere, unde semper versus inferiora detrudunt. Ne ergo illapsus subito iterum excidat, rugis plicisque solers Opifex præcavit, quæ præterlabentem intercipient & æqualiter extendunt. Substantia autem membranæ est, ventriculi substantiæ non abfimilis, tum quia extendi dum recipiunt, tum quia subsidere in se dum inaniuntur, debebant. Habent autem duas membranas proprias, ut actio retinendi vel expellendi rectius perficiatur. *Tenuium* quippe interna, obliquas habet; externa, transversas; quod horum potior actio retentio sit & distributio chyli: crassiorum vero interna, transversas; externa, obliquas & rectas; quod majore vi indigeant in facum expulsionem. Membranæ autem hæ in illis tenuiores sunt, quod liquidiorum materiam mollioremque fuscipiant: in his crassiores, quod siccam duramque. *Venis* & *Arteriis* donata, ut sanguinem pro nutritione, & spiritum pro vita continuo affluentem accipiant: tum etiam ut id, quod in chylo utilis succi est, ab iisdem arteriis exfugatur, teste Galeno lib. iv de Usu part. c. xvii: ubi inquit, arteriarum orificia ad intestina pertingentia modicum quiddam cibi assumere, plurimum autem Venas. *Nervos* habent, non tantum ob sensum, quo tum grata arripiant, tum noxia molestaque expellant: sed etiam motum. Est enim motus quidam obscurus intestinorum tenuium, quo chylum à supernis ad inferiores sedes promovent, quum in nostro arbitrio non sit illum, ut faeces crassorum, depellere. Hunc elegantius demonstrare quam in lumbricis terrestribus & hirudinibus non licet, dum in se contrahuntur: nec dari verius probare, quam in herniis illis maximis, in quibus universum aut maxima pars ilei in scrotum incidit. Quo enim detruderentur faeces, nisi hoc ipso modo; cum nihil sit, quod à se motum habeat, præter illum qui competit ratione prædominantis elementi. Et ex hoc motu rationem licet reddere Ileii sive Volvuli, in quo superior intestini pars inferiori involvitur, qui morbus proinde & solis tenuibus competit, quod crassa hoc motu careant.

Etymologia.

Divisio.

Figura.

Magnitudo.

Substantia.

Vena.

Arteria.

Nervi.

Glandulae.

Connectio.

Exortus.

Adapt.



IXIMVS præcedenti capite Intestina Mesenterii beneficio quasi ligamento ac vinculo quodam invicem jungi : merito ergo utriusque historia connectenda est, ut eodem quasi loco eorum tractatio absolvatur, quæ Natura invicem juncta esse voluit. MESENTERIVM, *μεσεντήριον & μεσεντέριον*, à situ dicitur, quasi *μέσον τῶν ἐσίων*, hoc est, *medium inter intestina*. Cicero lib. III de Nat. Deorum, *Medium intestinum* vertit, non citra multorum iniquam reprehensionem. Veteres enim Romani non intestina tantum à nobis hodie sic dicta vocabant, sed quæcunque imi ventris viscera, & ea quæ supra Interanea nominari diximus. *Medium ergo intestinum* Tullius pro medio viscere dixit, quia mediam inter cætera sedem sit nactum. Theodorus Gaza, Vir Græce Latineque doctissimus, licentius paulo quam boni Interpretis est, passim *Lactes* apud Aristotelem transtulit, cum Lactes non mesenterium, sed proprie intestina tenuia mesenterio annexa significet. Nonnulli *μεσάραιον* appellant, unde venæ mesaricæ dictæ: at alii qui in duas partes dividunt, in eam nempe quæ intestina tenuia colligat, & eam quæ crassa, *μεσάραιον* proprie vocari statuunt partem eam quæ tenuium intestinorum vinculum est, quod sit *μέσον τῶν αἰραίων*, subintellige *ἐσίων*, hoc est, *medium inter tenuia & angusta intestina*: *μεσικρόλον* vero, quæ crassa continet, quasi *μέσον τῶν κώλων*. Posterioris mentionem Hippocrates lib. VI Epidem. iniecit, & Galenus IV aphor. VI. Palladius Sophista qui in eisdem libros commentatus est, per *κώλα* Hippocratem intestina intelligere statuit, & sic mesocolon ab ipso mesenterium vocari. Galenus autem in lib. de dissect. Venar. & Arter. cap. IX, *mesenterium in tres partes dividit; in eam, quæ tenuium intestinorum est, & media; in dextram, quæ coli dextram partem alligat; & sinistram, quæ levam; ac prope sedem pertingens, rectum intestinum lumbis annectit*. Et si enim unum videatur & continuum, ratione tamen gemini exortus & intestinorum, ad quæ abit, merito dividitur. *Figura* tam mesaræo, quam mesocolo plana est. Illud tamen in plicas totum contractum est, & circulari ambitu cingitur: hoc, curvum & oblongum secundum coli intestini processum. *Crasissimum* quoque est mesaræum: latitudine, à centro ad peripheriam, spithamæ: longitudine autem & circumferentia, trium ulnarum. Errat enim Picolhomineus, qui ambitum horum æqualem censet longitudini intestinorum dum expansa extra corpus demonstrantur. *Membranas* habet duas, sibi invicem incumbentes & validas satis, inter quas vasa ad intestina, ut tuto & citra periculum incedant, excurrunt. *Venas* etiam obtinuit, *Mesaricas* vulgo dictas, innumeras, quæ cum arteriis & nervis Mesenterii centrum ingrediuntur, ac postea innumeros in ramos dispersæ intestina adeunt, inter communem & proprias tunicas delatæ. Oriuntur autem hæ à venæ Portæ ramis Mesentericis, dextro & sinistro. *Arterias* similiter duas, à Mesenterica duplici, superiore & inferiore propagatas, quæ eodem ac Venæ modo distribuuntur & incedunt. *Nervi* pluribus furculis propagantur. Duo quidem, utrinque unus, ab iis oriuntur, qui à sexto pari costarum radicibus offeruntur: alii vero, à furculis prodeuntibus à nervis medullæ spinalis inter primam, secundam, tertiam, & quartam vertebrae lumborum. Ne vero ruptioni opportuna forent vasa, arteriarum venarumque divaricationibus *glandulas* interjecit, quæ in magnitudine cum propaginibus suis proportionem servant. Maxima harum est ad mesenterii centrum, ubi prima fit vasorum distributio, qua scirrhus laborante totius corporis marcor, ob impeditam chyli transmissionem sequitur. *Connectitur* Mesaræum anterius, intestinis tenuibus; posterius, iis lumborum vertebrae, à quibus nascitur suo centro. Mesocolon, in dextra parte dextro ileo; in sinistra lævo, musculoque primo fœmur flexentium, quem Hippocrates *ψέας* appellat; ante, Colo intestino & Recto utrinque. *Oritur* autem ex omnium Anatomicorum sententia, à ligamentis vertebrarum lumborum, quibus validissime alligatur, gemina quasi radice; una, majore, qua primæ; altera, minori, qua tertiæ adnascitur. Id intestinis omnibus & peritonæi membrana, renibus incumbente, ablata quam optime patebit. *Pinguedine* quamplurima suffusus est, quæ utramque

utramque membranam intercedit, sanguine ex vasis transudante, & membranarum respectiva frigiditate concreto.

VSVS *Mesenterii* verus præcipuusque est, vasa ad intestina excurrentia tuto deducere, & ab omni disruptionis periculo salva integræque præstare. Vt enim plantæ alimentum ex terra radicibus trahunt: sic animalia sanguine donata ex intestinis ope vasorum, quæ ne obnoxia forent tot discriminibus, ubi vel salit Homo, aut cibus plena intestina distenduntur, sagax Natura membranis inclusas propagare voluit. Vasa hæc non tantum Venæ sunt, ut communis est opinio; sed & Arteriæ, ut Galenus clarissime lib. IV de Vsu part. ostendit, & nos quoque supra cum de arteriis mesentericis ageremus. Eadem tamen Venæ & nutrimentum rursus etiam afferunt, ut idem lib. III de facult. natur. cap. XIII; & lib. IV de Vsu part. cap. XIX, docet, sicut Arteriæ spiritum. Cum enim, inquit, in venis, quæ multum spatium inter hepar & partes circa ventrem occupant, abundantia fuerit alimenti, sursum fertur in hepar: cum autem vacua sunt, & nutriri avent, per easdem ipsas ex hepate rursus trahitur. Per easdem ergo venas simul & alimentum in hepar deferitur, & rursus ab eo in ventriculum trahitur, sed non eodem tempore: quemadmodum alio tempore spiritum recipimus, alio rursus foras mittimus: ita alio tempore jecur ex ventre, alio venter ex jecore trahit. Vsum hunc adeo eximium ut opportune præstaret, figuram primo circularem largita est. Intestina enim, quæ annexa, longissima sunt, quibus ut mesenterii longitudo responderet, nec tamen propterea non in exiguo & angusto spatio continerentur, rotundum ambitum, qui capacissimus est, indepta fuere. Rursus ne distensio quoque eorundem impediretur, de qua diximus, dum se contrahunt ad chyli digestionem, plurimis plicis corrugavit. *Latitudinem* autem largita est spithamæ, ut venæ portæ truncus in mesenteriam propagatus spatium iustum haberet, in quo in alios atque alios minores ramulos discinderetur. *Substantia* autem ipsa summo consilio dura membranaque est, tum quia ratione fibrarum, ubi opus est extendi contrahique in omnes dimensiones potest; tum quia levitate prædita, quo minus inclusa vasa comprimantur. Accedit, quod densitate vapores intercipiat, ne quid utilioris chyli temere ex mesaraicis vasis in ventris cavitatem exhalet, sed frigiditate potius membranarum in pinguedinem cogatur. Et hæc ipsa quoque *pinguedo*, cum media vasorum spatia expleat, non parum postea idem præpedit, nec minimum etiam momenti præviæ præparationi aspergit, innatum vasorum calorem fovendo & conservando. *Glandulis* vasorum divaricationes obsidentur, tum ne vasa comprimantur, si quando intestina & ventriculus alimentis distenduntur, sicque chyli transitus intercipiatur: tum quia sagax Natura non ignorabat, vasa suscipiendis noxiis perquam opportuna fore ubi in ramos diducuntur. Proinde ad mesenterii centrum, ubi prima vasorum distributio est, grandiusculam substruxit: cæteris vero iustissima ratione pro magnitudine cujusque elargita fuit. Sunt nonnulli Recentiorum, qui & alium præter hos usum assignant, ut scilicet coctionem quæ in intestinis est, elixatione potius, quam assatione perficerent. Ad hanc enim maxime commodam glandularum naturam inquirunt, cum humiditatem copiosissimam ad se trahant, ex sententia magni illius Hippocratis, qui glandulas cœnofo humido pasci ac quasi nutriri credebat. Ex his ergo copiosis vaporibus elevatis & in spatia intestinorum media effusis, veluti in duplici vase cibi potiusque materia coquitur. Mihi tamen hic usus à Naturæ consilio nonnihil alienus videtur, quod sciam quamplurima esse animalia, quæ glandulis in mesenterio destituuntur; & ex iis etiam, quæ sua natura obtinent, nonnulla glandulis plena esse, ut quæ macilentia sunt: alia oppido quam exiguas habere, ut pingua, cum in his adeps vasorum divisiones defendat. Pinguedo ergo cum optimæ coctionis signum sit, coctioque hæc citra glandularum usum absolvatur, credibile omnino est, nihil ad hanc ab illis conferri. *Connectitur* autem merito anteriori intestinis, cum ad hæc deducat vasa, ex quibus chylus attrahatur: posterius, lumborum primæ & tertiæ vertebræ ligamentis validissimis, ne in violento corporis motu, qui in saltu præsertim fit aut cursu, à pondere cibo turgentium intestinorum detractum disrumpatur. *Orrium* autem à lumbis habet, quod tutius hinc longe, quam aliunde Venæ, Arteriæ, & Nervi in ipsum inserantur.

CAPVT XI.

De Pancreate.

Etymologia.

Figura.

Situs.

Membrana.

VSVS.

1.

2.

3.



PANCREAS, πᾶγκρεας & καλλιπρεας Græcis dictum, ^a omnium est nostri corporis glandularum maxima & rubicundissima, proptereaque carni molliori, à qua appellationem traxit, admodum similis. *Figuram*, ut reliquæ, ovalem non servat, sed informe ac laxum corpus est, tres aut quatuor digitos longum: in sinistra parte prope ^b lienem situm, cui superius ventriculus incumbit, inferius peritonæi membranæ, quibus valide adnectitur, subjacent. In medio ^c Splenicam venam ad lienem transeuntem, simul & ^d celiacæ arteriæ ramum sinistram, ac nervos sexti paris, qui ad ventriculum & Duodenum migrant, quemadmodum & meatum biliarium in se complectitur & suffulcit. *Membranam* quoque habet tenuem, à peritonæo profectam, qua investitur & veluti suspensum tenetur.

Hoc nonnulli dissectionum Professores pulvinaris cuiusdam vices obire & ventriculo substerni credunt, ne repletus is duritie vertebrarum lædatur. Meo tamen iudicio potior usus ille, qui glandulis quoque cæteris communis est, ut attendatur valis, ne illa, cum incumbere alteri corpori minime possent, periculo ruptionis opportuna redderetur; uti neque compressionis, à ventriculo ciborum copia distento, quod solers Opifex facile hac carne præcavit, quæ neque tam mollis est, ut prementi cedat nimium; neque tam dura, ut obeffe possit.

CAPVT XII.

De Hepate.

Etymologia.

Situs.

Connectio.

Figura.

Protuberantia.

Lobus Hepa-

tu.

Situs.

Fissura.

Magnitudo.



HOD Græci ἥπαρ dicunt τὸν ἡπατικός τὸν ἄλλον δὲ σπλῆνι. ^a μέρων, ab inopia cæterarum partium, cui succurrit; Latini lecur appellant, quasi juxta cor, aut viribus aut situ collocatum. Tam nobilem enim hanc partem omnes pæne Philosophi pariter & Medici æstimarunt, ut in ea animæ, quam naturalem vocarunt, sedem ac domicilium posuerint. Obtinuit tamen consuetudo, ut Græca vox communiter quoque usurparetur. ^c Positum est in infimi ventris dextro hypochondrio, totum sub costis demersum, tanquam in loco tutissimo, superius Diaphragma, inferius Ventriculum respiciens. *Connectitur* autem non uni conterminarum partium, sed *convexa* quidem ^e elatiore sui sede cum Diaphragmate, à quo transversus digiti intervallo distat, beneficio ligamenti membrancei, lati, nervosi, ac impense validi, quod à peritonæo, qua septum inferiore sede succingit, enascitur & transversim per hepar ad posteriora excurrit. *Anteriore parte* duobus vinculis alligatur; uno quidem, cartilagini ensiformi, quod robustissimum est, latum ac duplicatum, à membrana, qua hepar succingitur profectum: ^f altero, umbilico, estque Vena umbilicalis, quæ foetu in lucem edito cavitatem suam amittit ac ligamenti officium subit. Sima connectitur Mesenterio, *vena Porta*: Costis, *Cava*: at Omento, lobo illo exiguo, per quem aquam à Iecore in omentum transfundi supra statuimus. *Figuram* habet pæne rotundam, supra convexam, infra concavam. ^g *Convexa pars*, lævis est & æqualis: ^h *cava*, quæ & sima dicitur, variis protuberantiis sinibusque exasperata. Inter *protuberantias* dignæ sunt notatu ⁱ duæ illæ exiguæ eminentiæ, in dextra parte circa ^k venæ portæ egressum locatæ, quas Galenus cum tota Asclepiadarum familia πόλεις sive Portas vocavit. Imprimis vero ^l *Lobus exiguus*, cujus supra quoque mentionem fecimus, cum de Omento loqueremur. Hic molliore constat carne & tenuiore, quam reliquum hepar, membrana succinctus est, de quo sane à nemine quod sciam Anatomicorum hæcenus quicquam memoriæ est proditum. Sunt & duo *sinus*; *alter*, à dextris insculptus, qui vesiculæ biliaris dimidium corpus excipit: *alter*, lævis, ut transeunti stomacho cedat. ^m *Fissura* tandem quædam anteriore sede cernitur, per quam ⁿ umbilicalis vena egreditur, *αἰσφορὰ* Herophilo appellata. *Magnitudo* jecoris tanta est, ut universum dextrum hypochondrium impleat, & nonnunquam extendat sese usque ad regionem umbilicalem. Cæterum plurimum pro sub-

pro subjectorum diversitate variat: observataque à me plerunque hæc fuit proportio, ut quibus magnum jecur est, iis quoque magnus sit Ventriculus, & contra. Obtinet autem Homo jecur omnium animalium maximum, proportionem sui corporis habitam. Vidi enim sæpenumero tam vastam ejus molem, ut ad Lienis regionem validis ligamentis annecteretur diaphragmati. Ipsa autem magnitudo penes ætatem quoque multum variat: nam pueris maximum est, ut plus sanguinis conficiatur pro augmento corporis; adultis, minus; adhuc minus, senibus, ut sic juxta ætatem jecur paulatim decrecat. *Número unicum est*, neque ut in reliquis animalibus brutis in lobos divisum, sed integrum solidumque. *Substantiam* habet rubram ac mollem, concreto sanguini perquam similem, quæ ^a innumeris venarum Portæ & Cavæ radicibus circumjecta est, olim *παρέρχουσα* Erasistrato dicta. Tegitur hæc membrana tenuissima ac simplici, à ligamentis hepatis enata, quæ arctissime parenchymati jungitur. Quod si separetur alicubi, excidente è vasis aquosa materia & collecta inter ipsam & carnem, *ιδάνδες* Græcis appellatæ generantur, quibus ruptis effusaque in abdominis cavitate aqua, Hydrops ascites nascitur. *Venas* habet tam à Cava quam Portæ vena, quod nulli, præter huic, visceri aut parti totius corporis contigit. Distribuantur ^b *propagines Carnæ* magna ex parte in convexa sede; at ^c *portæ*, in sima; sic tamen, ut utraq; per ^d anastomoses sive communia quadam oscula, de quibus superius libro quinto multa diximus, invicem committantur. Plures autem multo sunt venæ portæ furculi, quam cavæ, adeo ut, si definire numerum etiam libeat, triplo plures esse non male dicturi simus. Inter has, tenues quædam gracilesque propagines deducuntur, venis oppido quam similes, quæ cum Portæ radicibus similiter per anastomoses junctæ sensimque in majores collectæ, tandem in unum caudicem abeunt, per quem bilis ab hepate in vesiculam fellis depunitur. ^e *Arteriæ* paucae sunt, à dextro Celiacæ ramo exortæ, quæ in simam hepatis partem, quo loco vena portæ egreditur, diffeminantur. ^f *Nervi* duo sunt, iique exigui, à sexta conjugatione derivati, qui per ipsius tunicam, quæ cavam succingit, disperguntur. Horum alter, à ramo qui superius ventriculi orificium adit, transmittitur: alter, à ramo illo, qui radicibus costarum dextri lateris expanditur.

ACTIO. *Iecoris est*, chyli à venis mesaraicis ex intestinis attracti & ad radices portæ in cavam partem delati coctionem in venis adjuvare, ut optimus & nutritioni corporis opportunissimus sanguis elaboretur. Nec enim crediderim veram esse eorum sententiam, qui statuunt chylum hunc ad hepar deductum, è portæ venis in ipsum parenchyma excidere, in quo perfectionem ac rubrum colorem indispiscatur, inde à Cavæ radicibus attrahi & per totum corpus diffundi. Nec enim unquam id reperire mihi in ullo animalium licuit, quæ propterea post pastum aperui, ut taceam absurdam hanc esse opinionem, & à Naturæ consuetudine alienissimam, quæ nullibi extra vasa sive chylum sive sanguinem, præterquam in corde, in quo caloris fontem constituit, & sinus ac cavitates peculiare propterea exstruxit, effundit. Venæ ergo sunt, quæ sanguinem coquant & in se vim ac facultatem sanguificandi insitam habent, quod nec ipse quidem *Galenus* negare potuit, qui lib. i de Vsu part. cap. xvi, sanguinis generandi & in omnes partes ferendi gratia venas factas testatur. Et lib. xv de Vsu part. cap. xvi i, hanc facultatem ipsis tributam inquit, ne dum per eas fertur sanguis tempus ipsi alimento frustra pereat. Quin imo lib. de differ. morbor. cap. vi i, validissimo etiam argumento comprobatur, cum venarum affectus obstat inquit, quo minus sanguis utilis gignatur. Si ergo recte concludimus cerebrum rationis esse domicilium, quod eo læso & laborante mentem nostram minus valere cernimus, recte profecto & venas sanguinis officinam vocabimus, quod iis affectis protinus pravum ac deteriolem sanguinem generari videamus. Coctionem tamen hanc plurimum adjuvat hepatis parenchyma, quod & Venas ipsas stabilis, ne concidant aut confundantur; & calorem fovet, ne expiret vel dissipetur, tum de suo etiam nonnihil impertit. Atque ut exemplo illustrem quæ jam dico, non novi præclarius & quod parenchymatis usum rectius exprimat, quam ipse ventriculus, qui cum in se propriam habeat ac insitam facultatem convertendi alimentum in chylum, nihilominus citra circumstantium viscerum operam, ut testatur *Galenus*, probatque ex historia illius cui omentum exemptum fuit, chylum vel crudum vel certe semicoctum relinquit. Sic Venæ utcunque vim sanguinem generandi in se habeant,

nisi tamen facultas quædam externa quoque ab hepatis calore accedat, illa quam primum dissolvitur & perit. Rursus ut eorundem viscerum affectus in ventriculi detrimentum concedunt, videmus enim Liene refrigerato aut scirrhus affecto coaffici ventriculum; ita quoque hepatis parenchymate læso sanguificatio protinus læditur. Nam si v. calida laboret intemperie, si v. frigidam fuscipiat, mirandum non est eandem venis è vestigio communicari, quæ ita ipsius parenchymati permixtæ sunt, ut vix quisquam Anatomicorum hæcenus fuerit, quin sibi persuaserit ideo ab hepate enasci. Non ergo venis tantum hepar auxilio est, sed & Ventriculo, cujus coctionem eodem quo diximus de venis pacto, auget servatque.

VSSS.

Quam commode autem huic actioni usibusque omnia inserviant, nunc breviter tradamus. Primum *in infimo ventre situm* est, ne ab aliis visceribus quæ alimenti elaborationi subveniunt, disparatum esset, maxime cum ex iis sit, quæ familiam in hoc genere ducunt. Situm autem *est in elatiore parte*, cum inferior ab intestinis impleatur, ut superflua primæ coctionis sine aliarum partium incommodo extra corpus quam citissime pellerentur. Accedit quod in medio trunci sic situm sit, ut æqualiter ad supernas infernasque partes sanguinem dispescat. Tenet autem *hypochondrium*, ut Ventriculus utrinque ab ipso & Liene foveatur: quia tamen Liene nobilior est, propterea & dextrum locum & nobiliorem occupavit; sub costis spuris reconditum, ut illis pro vallo objectis tutum se ab omnibus externis injuriis præstaret. *Connectitur* autem merito vicinis partibus, ut ubique alligetur, nec pondere suo moleque ruat. Et diaphragmati quidem, ne deorsum cadat: umbilico, ne ad superna rapiatur: cartilagini ensiformi, ne, dum extendimus dorsum, ad posteriora declinet: costis, ne nimium ad anticam partem, flexo corpore, excidat. *Figuram* autem variam habet, cum peculiarem non exigat, sed vel vicinis partibus ne incommodet, vel aliis ut accommodet, conformatum sit. Superior ergo pars convexa est, lævis ac æqualis, quo diaphragmati cedat, ejusque cavitati congruat: inferior sima, ut ventriculum amplectatur, qui cum sphericus sit, rotundum ambitum accepit, ut ubique æqualiter tegat. Hinc factum est, ut omnibus animalibus eadem hepatis figura non sit, sed iis quibus Ventriculus est oblongus, jecur quoque oblongum contigerit; quibus rotundus, rotundum. Homini autem *maximum* obtigit, ut plus sanguinis reciperet, quo, si à corde discedas, omnium viscerum refertissimum esse scribit Arist. lib. III de part. anim. cap. XII, cum Homo ex omnibus sanguineis plurimo abundet, ne deficient spiritus in tot obeundis animæ functionibus, quas plures præ cæteris animalibus accepit. Et propterea *unicum* quoque est, cum numerum magnitudinem compenset. *Substantia* autem, ut reliquorum viscerum, parenchymatis; quæ sit in prima foetus generatione, excidente è venis sanguine & concrecente. Venis enim, arteriisque undique intextitur, ut & aperta ipsa conserventur, nec concidant; & decente ordine, nec confundantur, quæ ratio communis est omnium parenchymatum. Decuit enim alicubi congeriem esse venarum, in qua potissimum concoctio celebraretur, maxime cum non una, sed gemina vena requirebatur, quod supra demonstravimus, quæ per anastomoses invicem conjungerentur. Venas autem cum nullibi tutas sciret sagax Natura, nisi ubi alicui solidiori corpori inniterentur, ideo carneam massam circumjecit, spatiaque omnia sic explevit, ut ab omni periculo tuta liberaque forent. Tegitur autem hæc substantia *membrana* tenuiore, quam lienis est, quod arteriarum copia tanta non esset, quæ cogeret diligentius vasa stipare. Præcavit enim Natura ubivis, ne quidquam inutile aut non necessarium conderet. Venas autem habet tum à Cava, tum Porta, ut ex portæ vena reciperet chyli tenuiorem partem Cava, ut complexi sumus in superioribus, libro quinto: Portæ autem vena crassiorem retineret, sicque postea sanguis defæcator vitales animalesque partes nutrirer; crassior vero, naturales. Hoc nomine *anastomoses* condidit, quæ viam transeunti chylo, aut sanguini elargiuntur. In medio autem ramorum portæ excurrunt tenues quædam venulæ, quæ postea in caudicem collectæ in fellis vesiculam desinunt, ut quidquid biliosum est in chylo, antequam ad Cavam transmittatur, in Porta exsugatur. Paucae sunt *Arteriae*, eæque tantum in sima parte, cum ad convexam plurimum vitalium spirituum à corde per venam Cavam transferatur. Nervos habet, ne sensu omnino destituatur: sensus tamen hic obtusus admodum est, quod & exiles sint nervi, nec altius se penetrent.

Caterum

Cæterum cum de sanguinis generatione diversæ extent Authorum sententiæ, apud omnes tamen receptum sit, in iis potissimum venis, quæ per hepar disperguntur peragi, ansam nobis hic locupletissimam datam existimavimus, nostram de sanguinis generatione sententiam hoc loco brevibus explicandi. Alimenta ergo, sive solida sint sive liquida, primam quandam ac præviam præparationem in ore accipiunt per masticationem, quæ dentium opera fit. Hinc deglutita, ad ventriculum transmittuntur, qui undique ea circumamplēctens ac debito tempore retinens in chylum, beneficio tum caloris innati, quem habet, tum viscerum adjacentium, præcipue autem hepatis & lienis, ut & omenti, convertit. Inde ubi quamoptime elaboratus est, levior redditur, à fundo assurgit, & superna petit, sicque pylorum stimulo, quò referatur efficit. Videmus enim excrementa alvi quoque, quò magis concocta sunt, eò leviora esse; graviora contra, quanto minus passa à nostro calore fuerint. Hoc ergo aperto, ventriculus ipse transversis fibris se stringens, ad intestina propellit, inque via, si qua portio minus exacte præparata fuerit, ulteriore coctione absolvitur. Intestina Chylum acceptum protinus copia ipsius irritata à se detrudere conantur, proindeque ad inferiora pellunt: at plicæ, quò minus totus elabatur impediunt, seu potius ut æqualiter extendatur efficiunt. Hinc Venæ & Arteriæ mesaraicæ quicquid utilis est materiæ hauriunt; illæ quidem, plus; hæ, minus: illæque, ad Hepar transferunt; hæ, ad Lienem. Tenuius enim est, quod arteriæ accipiunt; crassius, quod venæ. Cæterum dum chylus ad hepar sic contendit, & jam ad venæ portæ divaricationem pervenit, Lien ingenua facultate per ramum Splenicum crassiorem ac terrestriorem ejus partem ad se allicit, ut ad hepar, non nisi laudabiliores partes deferantur. In hoc itinere chylus aliquam præparationem suscipit, elaboratur autem ulterius, tum in hepate, tum liene. Nec tamen omnia vasa in jecore concoquunt, sed tantum venæ portæ, in qua si quid biliosi occurrat, protinus per meatus bilarios, partim per cysticum ad fellis vesiculam, partim per hepaticum subito ad jejenum intestinum, demandatur. Vbi perfectus est sanguis, ejus *tenuior pars* per anastomoses in Cavæ radices deponitur, & partim per truncum ascendentem, partim per descendentem abit. Per illum ad superiora & ad cor deferitur, & quidem in dextrum ipsius ventriculum, in quo attenuatur, postea in venam arteriosam distribuitur, tum ad pulmonum nutritionem, tum ut per arteriam venalem ad sinistram cordis sinum abeat, in quo extremus colophon (ut ita dicam) imponitur, cum attenuetur ulterius & in sanguinem arteriosum vertatur, qui postea per Aortam pro vita singularum partium diffunditur. Per descendentem autem truncum venæ cavæ, ad reliquas omnes partes nutritioni non dicatas digeritur. *Crassa* contra, ad mesenterii nutritionem descendit. Illa pars, quæ ad Lienem abiit, ubi jam elaborata & confecta est, partim lienem ipsum, partim viscera omnia, ad quæ Splenica vena pertingit enutrit, puta ventriculum, omentum, & coli sinistram partem, ac rectum intestinum. Quia tamen pars quoque serosa, una cum chylo vecta est, quo per angustissimos quosque anastomosium meatus sanguis penetraret ad Cavam; ea autem nutritioni postea prorsus inutilis sit, ut & illa ex corpore quamprimum amandetur, per emulgentia vasa, tam venas, quam arterias à Renibus attrahitur, à sanguine separatur, & per carunculas papillares transcolatur in fistulas, in quarum pelvi collecta, sensim per canales ureterum in vesicam destillat.

CAPUT XIII.

De Vesicula biliaria.

IN hepatis cava parte, qua dextrum ventriculi latus amplectitur, finum insculpi oblongum pro vesica biliaria, præcedenti capite diximus. De hac ergo cum nobis sit agendum, à nomine, nostro more, exordium petemus. Vocatur Græcis κύστις χολώδης & χολοδόχον, Latinis *Vesica*, aut folliculus felleus, quia conceptaculum sit, in quo biliosum venæ portæ excrementum colligitur. *Connexitur* superiore mediaque sui portione cum hepate, cui secundum latitudinem in sinu proprio innascitur: *inferiore* autem reliqua, extra substantiam jecoris libera propendente, ventriculi dextro lateri, *coloque*

SANGUIEL.
CATO.

Erythologia.

Connexio.

Magnitudo.

Figura.

Substantia.

Vena.

Arteria.

Nervi.

Partes diffi-
ciles vili-
culæ scilicet.
Fundus.
Cervix.Meatus bi-
lari.Communis
canalis.

VSVS.

coloque intestino incumbens, sæpenumero utrumque flavitie tingit. Parva est, & vix duos longitudine transversos digitos æquat: variat tamen hæc magnitudo pro temperamento & copia bilis, qua impletur. Calidioribus enim majorem esse deprehendi, & in Dysentericis dissectis usque adeo grandem sæpe vidi, ut naturalem magnitudinem multis modis superaret. Formam refert subrotundam, à latiore basi in angustum apicem pyri instar definens. Duplici membrana constat; una, exterior, tenui, & communi, fibris omnibus destituta, sed nonnunquam pinguedine obducta. Hæc à jecoris tunica enata, dimidiam tantum partem succingit, eam scilicet, quæ extra jecoris sinum prominet. Altera membrana, propria, crassa validaque est, triplici fibrarum genere intertexta; ex quibus *extima*, transversæ sunt; *intima*, rectæ; *media*, inter utrasque, obliquæ, rectis longe pauciores. Interius *mucosa* quadam *substantia*, ab excrementis tertiæ coctionis enata obtenditur, quæ prohibet, quo minus à bilis acrimonia lædatur. Generat enim quævis membrana mucosum excrementum & viscidum, cujusmodi & pus esse solet, quod sive ulceribus seu vulnere adfecta conficit. Ipsa autem membrana inæqualem crassitiem nacta est, cum in fundo tenuior sit; in cervice, durior crassiorque. Habet & *Vasâ* omnis generis: *Venas* quidem duas capillares, à venæ portæ trunco utrinque, antequam in ramos dividitur, enascentes, quas *cysticas* vocant. *Arterias* similiter duas impenfè graciles, à dextro Celiacæ arteriæ ramo, ejusque superiore sede, ubi hepatis cavum ingreditur, enatas, quæ eandem cum venis appellationem habent. *Nervum* tandem exilem & vix conspicuum, à sextæ conjugationis ramulo, qui jecoris tunicam perreptat. Inferuntur hæc vasa, primum in cervicem vesiculæ, deinde ad fundum in infinitos ramulos dispersæ propagantur.

Dividitur vesicula fellis à dissectionum Professoribus trifariam, in fundum scilicet, cervicem, & meatus bilarios. ^a *Fundum* appellant illam partem, quæ latior est, & extra hepar prominet, membrana communi tecta. ^b *Cervicem*, strictiorem, quæ sensim in angustiore meatum definit, unde ^c *cysticus* meatus exstruitur, ubi Valvulæ tres bilis regressum præpedientes, sitæ sunt. Has si videre cupias, expressam ex vesicula bilem in meatum digitis reprime. nam circa Valvulas immobilem consistere adverte. *Meatus* tandem duo, *ἄνωι χολόδοχοι* dicti, *meatus* vel *pori bilarii* Latinis; quorum ^d *primus* est, quem modo ex elongata Vesiculæ cervice pronasci diximus: ^e *alter*, ex hepate egreditur, interdum uno, interdum gemino ramo, at statim coeunte in simplicem, qui inferiori omenti membrana suffultus, venæque substantiam mentitus descendit, ac cum primo meatu ^f *coiens* ^g *communem canalem* constituit: ulterius deinde progressus, in Jejuni intestini principium ^h inseritur. Insertio autem hæc non recta est, cum oblique inter utramque intestini tunicam duorum quasi transversorum pollicum longitudine deducatur, anteriorem vero perforat. Vocatur prior meatus *cysticus*, alter *hepaticus*, uterque à parte unde originem trahit. Ille enim ex vesica, hic ex hepate bilem ad intestina purgat. Ut autem ad vesiculam ab hepate transferatur, innumeræ quædam exiles venulæ sunt, inter radices venæ portæ dispersæ, quæ postea collectæ sensim, in superiorem vesiculæ partem eam, quæ sinui hepatis adhæret, & ubi longus quidam ductus valvulæ oblongæ instar est, terminantur. Alter autem meatus similiter infinitis ramulis in hepate inter Cavæ radices excurrit, & postea in unum caudicem, undique omnibus paginibus collectis, transit.

VSVS. *Vesicula fellis* est, dum sanguis in venæ portæ radicibus coquitur, quidquid calidi & sicci est in chylo, quod in alimentum commodum homini cedere nequit, ad se trahere, & postea ad intestina demandare, ut ipsa irritata acrimonia bilis, quidquid fecum & inutilis excrementi reliquum est, è corpore depellant. Sapienter ergo sagax Natura hepati *adjunxit*, ne longius scilicet abesset ab officina, ubi excrementa, quorum receptaculum est, colligantur. *Posuit* autem in cava regione, cum in hac sanguinis coctio celebraretur, ut quam proxime scilicet à venæ portæ radicibus venulæ, quibus bilem allicit, abesset. *Figuram* etiam largita est rotundam, ut capacissima foret: sed cum globi modo adamussim sphaerica non posset esse, ne scilicet à Colo subiecto aut Ventriculo cibus repleto premeretur, rotunditatem ipsius longitudine compensavit. Rursus ut eadem impleta extenderetur, & iterum inanita subideret, *membraneam substantiam*, omnis generis fibris donatam, nacta est: at ne eadem à bilis acrimonia noxam subiret,

mucoso

mucoso quodam ac viscido humore interiore parte oblita, quæ liberam innoxiamque præstat. Trahunt autem bilem exiles illæ venulæ, quæ in medio radicum portæ disperguntur, feruntque ad superiorem partem in canalem oblongum, ut sensim exstillet in cavitatem. *Vesicula* autem hic exprimit, ut si quando (quemadmodum sæpissime fit) vesicula obstruatur, totaque turgeat bile, nihil tamen ad hepar regurgitare queat. Quod si venarum oscula libere in cavitatem hiascent, impediri regressus neutiquam poruisset: at sic, dum in canalem hunc patent, folliculo pleno valvula comprimitur, sicque clauduntur. Trahit autem mea sententia, atque in hunc usum præter alterum meatum condita est, quando vel copiosa bilis in corpore abundat, aut recto tramite, repleto Ventriculo vel intestinis, expurgari nequit. Hinc rationem petas, cur famelicis promptius quam iis, qui alimentis plenum habent stomachum, Ventriculus bile-scat. Vacuo enim stomacho in jejunum recto itinere fertur, & si biliosi sint, copiose refunditur, unde pyloro præter naturæ leges laxius patente, facili negotio aliquid Ventriculum subit. Ex eodem quoque fonte licebit respondere, cur quibus duris sæcibus colon intestinum turget, & dura sunt alvo, capitis doloribus sint opportuni. Non enim hi excitantur, quæ vulgo adfertur ratio, à foetidis vaporibus ad caput exhalantibus (nam quo duriora sunt ea excrementa, eò vaporis foetorisque magis expertia) sed quod pressa à colo vesicula fellea & immemor sui officii reddita, biliosum recrementum ex hepatis vasis in sanguinis generatione non elicit purgatque, unde retentum in venis & digestum per corpus, quamcumque partem imbecilliorē invenerit (solet enim esse ut plurimum caput) eam afficit & labefactat. Evacuatur autem absoluta sanguificatione, cum plena fere facta est, & jam universum id, quod utile erat in chylo, ex intestinis attractum fuit. Mittit autem ad intestina, & quidem per meatum cysticum, cujus initio tres valvule foris spectantes appositæ sunt, quò minus regrediatur. Et hic ipse meatus in principium jejuni intestini insertus est, quod intestinum hoc primum sit, in quo chylus parietibus adhæret, ob plicas, per quas chylus quasi distenditur, ut sæpe jam diximus. Quia autem frequentiores hoc, quam ileum habet plicas, tum majores etiam, ideo Natura sagacissima effecit, ut bilis sincera adhuc, nec chyli moderata temperie, jejunum acrius irritaret. Sapienter autem hoc excremento abusa est, cum acrimonia quidem sua stimulare intestina officii sui immemora posset: deinde tenuitate quas habet partium, pituitam quæ in gracilibus cumulatur, incidere, detergere & expurgare: sic-citate tandem, quo minus in intestinis putredines fiant, prohibere. *Alter meatus, hepaticus dictus*, qui in iis quoque semper animalibus reperitur, quæ Vesicula carent, eo trahit tempore, quo Ventriculus cibis destituitur, similiterque ad intestina per communem canalem subito deportat. Fit ut interdum meatus hi obstruantur, imprimis vero fellis Vesicula, ex quo deinceps bile non expurgata, plurima incommoda longo ordine se consequuntur. Nec tamen alterutro tantum obstructo; ut quidam ignari Anatomix blaterant, Icterus nascitur, qui protinus atque hunc viderint, vesicæ felleæ obstructions crepant: sed aut utroque, aut communi canali, cum alter alterius officium mox subeat. Habet tandem Venas, ut alatur: arterias, ut vivat: nervos, ut sentiat. Est enim inepta explodendaque eorum opinio, qui bile sive nutriti sive delectari existimant. Ec-cur enim Natura, quæ nihil unquam frustra condidit, tanto artificio per universum vesiculæ corpus tot exiles venulas deduxerit, sanguinemque largita fuerit, nisi & illas & hunc officio suo destinasset?

Vesicæ Vesicæ felleæ.

Vesicæ meatus hepatici.

CAPUT XIV.

De Liene.



LIEN, Græcis σπλην dicitur, σπλν & σπλν, quod trahere significat, quia, ut loquitur Aristoteles, lib. III de Part. animal. cap. VII, αὐτὸν ἐκ τῶν περιττῶν πρὸς ἑαυτὸν τὰς περιττὰς, ex ventre superfluos humores ad se trahit. Latini græca voce sæpissime Splenem, sua Lienem vocant, quæ vox unde sit deducta, ab Authoribus non traditur. *Situs est in infimi ventris hypochondrio sinistro, è regione hepatis; sed paulo depressius, non tamen usque adeo, quin adhuc sub spuris costis contineatur, quod propterea notandum est, ne erremus

Etymologia.

Situs.

ne erremus cum Medicis quibusdam, qui etiam in sanis lienem tactu deprehendi sibi aliisque temere persuadent. Est tamen *unus* tantum, quamvis præter naturam duplex quoque nonnunquam observatus sit. *Connectitur* elatiore quidem parte, diaphragmati; *inferiore*, renis sinistri membranæ externæ, utrinque exiguis gracilibusque membranis. *Sima parte*, primo superiori membranæ omenti, deinde ope valorum Ventriculo: *convexa* vero, dorso. Hinc est, ut scirrhi laborantes de respirationis difficultate conquerantur, quod diaphragma mole lienis deorsum trahatur. Quin et si vincula hæc rumpantur, observatum à nonnullis est, herniam natam fuisse. *Magnitudinem* quod spectat, homini ex cæteris animalibus proportionem corporis maximus contigit, minor tamen est multo, quam hepar, ut qui longitudine quasi sex digitorum, latitudine trium, crassitie sit unius. Fit tamen ut in summam molem abeat, mireque intumescat, sæpeque ad abdominis usque medium porrigatur ex concitato affluxu humorum, quos facile ob carnis laxitatem admittit. Semper tamen minor majore melior est, nisi admodum parvitate peccet, quod & ipse annuit Aristoteles lib. 111 Histor. de animal. cap. xvi. Sic Laniones nostri ex viscerum parvitate, præsertim hepatis & lienis, carniū bonitatem dijudicant. Observavi autem eos, qui in palustribus habitant locis, majorem habere, quam qui sicca incolunt: & qui amplius sunt præditi venis, majorem, quam qui parvas habent. Exinde contingit, ut macilentis pinguioribus facilis in tumidos lienēs incurrant.

Figura. ^a *Figura* ipsius est oblonga, linguæ bubulæ, secundum Hippocratem; suillo lienī, juxta Aristotelem, similis. Est ergo oblonga, Geometrarum & Euclidis *ιπέρμυκτος*, five quadrilateram figuram, altera parte longiorem exprimens. hinc Splenia apud Antiquos dicebantur linteola oblongæ figuræ, quibus cerata aut emplastra oblinebantur; inde ad omnis generis linteola translatum, est & emplastra. hinc Martialis Spleniatum mentum vocat, quod splenio obvolutum. Sic enim libro decimo ait:

*Cur spleniato sæpe prodeam mento,
Albæque pactus sana labra cerusâ,
Philiti, quævis? basiare te nolo.*

Superficiem habet, unam anteriorem, qua costas respicit, & *gibba* dicitur; alteram ^b *interiorem*, qua spectat ventriculū, & *concaua* vocatur. Vtraque levis est & æqualis, nisi ubi linea recta, ^c *παφῆ* dicta, in sima consistit, quo loci ^d Splenica vasa lienem ingrediuntur. Rufus & Hippocrates aliam quoque divisionem habent. Summam enim partem, *Caput*: infimam, *Caudam* appellant. Quod si ab hac figura discedat, fit Triangularis nonnunquam, quandoque globosa; interdum variis extuberantiis exasperatur. Aliquando in capite est crassus; in cauda gracilis; interdum contra. Illum Hippocrates *lienem acclivem*; hunc *declivem* appellat, & mentionem injicit lib. vi Epidem. sect. 111, text. 33. *Substantia* ejus est *πυκνύχυμα*, sed laxum & spongiosum valde, ^e innumeris venarum arteriarumque propaginibus refertum; ex quo fit, ut ubi humore imbibit, in maximam molem se tollat. Hæc ^f *membrana* undique tegitur, quæ tenuis quidem est si in se consideres; at si contendas cum hepatis membrana, crassiuscula apparebit. Oritur ex membrana peritonæi, & linæ rectæ lienis inseritur, totumque postea viscus succingit. Hanc observavimus non raro in senibus quibusdam in osseam naturam degenerasse. *Color* in embryone rubeus plerumque semper cernitur, si sana habeat viscera: in adultis ad nigredinem nonnihil declinat. Monstravimus tamen non semel in publico Theatro Patavii, Lienem satis magnum, lecori rubedine non cessisse, ut propterea existimem, lienem nigriorem multo hepatis parenchymate, non bene sani hominis esse, utcumque magnitudinem naturalem non valde superet. Quod si præter naturam se habeat, humoris quem in se traxit colorem exprimit, & vel lividus, plumbeus, aut cinereus est. *Vena*. *Vasa* habet omnis generis; & ^h *Venas* quidem, à ramo splenico, qui ubi ad ventriculū & omentum propagines plures disseminavit, totus postea in lienem absumitur, ⁱ *cavam* ipsius partem, ubi ^k linea recta est, ingressus. Vt cumque autem ramus ipse amplius est & insignis, ^l *rami* tamen primum quidem in parenchyma absorpti, in tenuissimas deinde & capillares fibras, easque innumeras degenerant. Antequam etiam ingreditur, eximia quadam & insigni ^m *anastomosi* cum arteria comite conjungitur. ⁿ *Arterias* habet à Cæliacæ ramo sinistro, quæ quintuplo plures sunt, quam venæ; ut omnino credibile sit, in lienis tumoribus aliisque affectibus scirrhosis materiam copiosiorē in arteriis, quam

quam venis contineri, & propterea per arterias quoque sæpius, quam venas evacuari. Quod & designat viæ brevitatis, quam Natura semper in recrementorum expurgatione sequi solet, quæ per arterias potius, quam venas esse videtur. Sunt enim quatuor loci per quos Lien expurgat humores pravos, ut testatur Hippocrates, lib. iv de morbis. Os puta, nares, urinæ meatus, & podex, ad quas omnes, si primam exceperis, brevissima via per arterias, longa nimis est per venas. Ad *Ventriculum* enim, unde ad os postea demandatur transmissa materia, arteriæ copiosissimæ à splenico cæliacæ ramo abeunt, Gastrica præsertim, Gastrociplois sinistra, & Vas breve arteriosum. Quamquam & per venas hic eadem brevitatis sit, cognomines comitesque arteriarum; sed imprimis per vas breve dictum, de quo notatu digna est historia Cardinalis Cibonis apud Valverdam in Anatome, libro vi, cap. v. Exinctus hic erat sanguinis per vomitum rejectione, cumque à Medicis aperto cadavere causa tanti fluxus inquireretur, compresso ventriculo viderunt Lienem turgescere; rursus hoc compresso, ad ventriculum copiosum sanguinem per vas breve effundi. Ad *nares*, in iis qui splenetici per hæmorrhagias sanantur, ut Bion apud Hippocratem in Epidem. lib. ii, sect. ii, text. 27, facilis via est ex arteria splenica in Cæliacam, ex hac in Aortam, à qua in caput certissimus est ductus. Per *urinas* similiter à cæliaca statim via ad emulgentes est, ex his per renes & ureteres ad vesicam. Vnde Hippocrates lib. de Internis affectibus, Lienosis diuretica jubet præscribere; & lib. de Affectu biliosis, qui magnum lienem habent, ac ideo pravi ac fædi coloris sunt, malignaque contrahunt ulcera, urinas vult subducere. Ad *podicem* per arterias & venas hæmorrhoidales æqua via est. *Nervi* tandem sunt exiles, à sexti paris ramo, qui in ipsius membranam exporriguntur; in substantiam autem non penetrant.

De Lienis actione plurimæ sunt dubitationes & controversiæ, quas nos brevitatis studio ne attingamus quidem. Plerique tamen statuunt, receptaculum esse humoris melancholici, qui in hepatis sanguificatione, tanquam crassum excrementum separatur (cum tenue per vesiculam bilis purgetur) & ab hepate ad lienem demandatur. Quam sententiam, ut omnino falsam demonstramus esse, singula verba accuratius considerabimus. Et *receptaculum* quidem esse non potest, cum nullam observet conditionem earum, quæ conceptaculis excrementorum propriæ sunt. Nec enim cavitatem habet, ut bilis vesicula, intestina, & cerebri ventriculi; nec humorem continet ejusmodi, cujus receptaculum esse dicitur, cum in sanis lien purissimo sanguine semper scareat; nec prope est ad locum, à quo excrementum haurire dicitur, sed potius è regione situm: nec tandem locus est, per quem commode extra corpus excrementum illud pellat, cum potius in suprema imi ventris regione, ubi nobilissimorum viscerum sedes est, sit locatum. Quæ autem humoris melancholici conceptaculum sit, quod nullam cum ipso observet proportionem? Omnium enim consensu Melancholia in minima quantitate gignitur, & tamen lien vesicula fellis, cæterisque excrementorum receptaculis multo est major. Quod si melancholia illa in hepate generetur, qui sit ut non pariter statim ex hepate trahatur, ut fellis folliculus, aut per quas vias immediate ad lienem ducitur. Quod si per splenicum ramum dicatur ferri, quam absurdum id erit, Naturam non statim ad intestina deduxisse, sed prius ad lienem, ut in ipso conservetur, cum via utraque ejusdem sit brevitatis, & hoc incommodum præterea inde futurum sit, ut melancholicus hic humor omnem sanguinem splenicorum vasorum contamine. Quare omnino statuerim, verissimam esse Aristotelis sententiam, lib. iii de Partib. animal. cap. vii, hepar & lienem cibi concoctionem juvare, & lienem ipsum quasi jecur adulteratum esse. Hoc patet, quia conditiones omnes habet, quæ ad eam rem requiruntur: habet enim Venas & Arterias, habet angustissimos meatus, habet parenchyma; quas omnes Galenus diversis in locis tradit, & maxime necessarias ac quasi proprias esse testatur. Accedit, quod læso liene iidem morbi contingant, qui hepar affectum sequuntur. Est & ratio anatomica maximi momenti, quod cum cætera viscera, partemque bipartitæ sint, Natura quoque hepar bipartitum condere voluerit. Cum ergo hepar unum non sufficeret, siquidem optimum sanguinem respicias, Lienem condidit, qui alium elaboraret & minus laudabilem.

Differ enim hepatis sanguificatio duobus potissimum à lienis: primo, materia; deinde, fine.

Hh

fine.

Per quas vias
Lien expurgat.

Observatio.

Nervi.

Alia.

Lien non est
receptaculum.

Nec humor
melancholicus
conceptaculum
continet.

Nec melan-
cholia in he-
pate genera-
tur.

Aristotelis
sententia præ-
batur.

Hepatis san-
guificatio duo-
bus à Lienis
sanguis, des-
cendit.

fine. *Materia* quidem, cum crassior sit & terrestrior chyli pars, ex qua sanguinem facit lien; tenuior & benignior, ex qua hepar. Antequam enim ad Iecur pervenire possit chylus, per mesentericas Venas attractus, quidquid in eo est crassius ac terrestrius, lien per splenicum ramum trahit, ibidemque beneficio caloris, tum qui in venis est, tum potissimum qui in arteriis, quarum maximam copiam hic esse diximus, in laudabilem & optimum, sed crassiorem paulo sanguinem transmutat. Existimo autem & quod à mesaraicis arteriis chyli attractum est ex intestinis (de qua re supra lib. vi ex Gal. diximus) ad lienem à ramo cæliaco sinistro, sive splenica arteria deduci, cum absurdum sit arterias illas, quæ copiosiores sunt venis in illo viscere, sic otiosas esse. *Fine* deinde differt, cum sanguis, qui ab hepate conficitur, tum pro corde, tum cæteris animalibus, vitalibusque partibus generetur. Elaboratus enim in hepate, partim ad cor abit per ascendentem venæ cavæ truncum, ut ex ipso fiat arteriosus sanguis: partim ad reliquas partes animales vitalesque, ut eas nutriat. Naturalibus enim omnibus solisque venæ portæ truncus & rami alimentum deferunt. Voluit enim Natura has partes crassiore sanguine nutriri, ut calor ipsarum esset validior; cum idem calor in crassiore substantia semper sit fortior. Accedit, quod & ipsa substantia harum partium crassior sit, quam cæterarum; ex quo conveniebat, ut simili sanguine nutrentur, quemadmodum videmus Naturæ hunc esse ordinem, ut tenuiores partes, tenuiore alantur; crassiore, crassiores.

Vide.

Nunc videamus quam bene omnia ad actionem hanc in liene conspirent. *Situm* habet in infimo ventre, ut in eodem cum cæteris nutritioni dicatis jaceret. In hypochondrio sinistro, ut hepar nobilius viscus nobiliorem locum teneret; è regione jecoris, quia est οἶον νότον ἥπαρ, ut loquitur Aristoteles lib. xxi de Part. cap. vii, et Hippocrates lib. vi Epidem. ἥπαρ ἀρκερόν: ut Plato in Timæo, ἥπαρ ἐκμαγνόν. Paulo tamen depressius, quia debet ἀνέσταν, & antequam chylus ad hepar perveniat, terrestriorem partem attrahere. Sub costis nothis reconditus, ut tutum haberet ab externis injuriis locum. *Vnus* est, quia ἑναιφανεῖς, ut loquitur Philosophus, cum hepate. *Connectitur* diversis partibus, ut ubique subternaculum habeat. Superius diaphragmati, ne decidat: inferius reni, ne corruat: posterius dorso, ne pronus: anteriori ventriculo, ne supinus fiat. *Magnitudo* homini maximā proportionem sui corporis, ut defæcari sanguis felicius queat à crassis humoribus, cum Homo animal sit sapientiæ studio additum. At sanguis quo tenuior est & purior, eò sapientiores reddere dicitur Arist. lib. xi de Part. anim. cap. xi. *Figuram* autem cum Natura tribuat semper, quæ est convenientissima actioni cuiusque, & loco ubi sita est: actio autem lienis peculiarem nullam requirat, benignissima parens hic solum locum respexit. Quia ergo dorsum erat concavum, merito pars posterior lienis, quæ illud respicit, convexa est: Ventriculus autem, quia est convexus, merito pars anterior, quæ eum intuetur, concava facta est. *Substantia* est παχύχυμα, quia viscus est. *Viscera* autem omnia sunt παχύχυματα, quia omnium usus communis est, *Venarum* necessariam ad coctiones congeriem fulcire & fovere. Propterea & *membrana* tegitur; ut cætera viscera. Protegmine enim opus fuit, quo illa serventur: cum autem id densum requireretur & leve, non melius erat, quam membrana. Est autem crassior hepatis membrana, quod plures contineat arterias, quæ adeo protegmine firmiore indigent, tum quia laxior quoque ipsa est substantia. Vasa obtinuit eadem quæ cætera viscera, & ob easdem causas. *Venas & arterias*, ut materiam coctioni aptam deferrent & concoquerent: *Nervum*, ut membrana sensum habeat, & quia non ingreditur parenchyma, hinc fit, ut lien obtuso admodum sensu sit præditus. Neque enim dolet ipse, cum ægri de ejus doloribus conqueruntur: sed partes sunt adjacentes, quæ lege confortii ab ipso afficiuntur. Non negligenda tamen hic est *anastomosis* consideratio, siquidem cum crassus valde sit humor qui concoquendus est in liene, voluit Natura arterias jungere venis, ut quod attractum ab utroque esset, in commodum utriusque conjungeretur, sicque rectius coctio fieret, & obstructions præpedirentur.

CAPUT XV.

De Renibus, & his Succenturiatis glandulis, itemque canalibus
urina transitum concedentibus.



RENES, Græcis νεφροί, ἀπὸ νεφρον, à mingendo dicti, quod serofus humor per hos in vesicam transcoletur. ^a Duo sunt numero, utrinque unus, nonnihil sub jecore & liene post intestina & ventriculum in lumbis, inter ultimam costarum spuriarum, tum ossa coxæ, quo loco corpus cingimus ad vestes constringendas, siti. Incumbunt autem sima sui parte musculorum, quos ψέας Hippocrates vocavit & primi sunt scemur flectentes, capitibus, sub quibus maximi nervi reconduntur, quo nomine & νεφρομήτρες dicti; unde fit ut calculo in renibus existente, stupor in ejus lateris crure perfentiatur. Atque his membranæ externæ beneficio connectuntur: sed dexter præter hæc cæco, sinister colo & lieni sibi incumbentibus. Inæqualis etiam utriusque positio est, cum lævus dextro elatior sit, non tamen dimidia sui parte. *Figura* phaeolum tam exacte referunt, ut nesciam si quid sit in tota hac rerum universitate, quod sit similis. *Longitudo* enim latitudinem superat, crassities autem ubique æqualiter est depressa. ^b Exterius gibbi, quo nomine & gibbam faciem dicimus: ^c interius cavi: superius nonnihil, quam inferne latiores. In gibba parte æquales: at cava, ut hepar, inæquales, cum in hanc alia vasa ingradientur, alia exeant. *Longitudine*, quinque transversos digitos; *latitudine*, tres; at crassitie, pollicem æquant. Dexter tamen sinistro semper major est. *Magnitudo.*

In his consideranda sunt partes, tum externæ, tum internæ. Externas voco, membranas quibus vestiuntur, pinguedinem, glandulas quæ incumbunt, & vasa, quæ vel egrediuntur, ut urgetes; aut intrant, ut venæ & arteriæ emulgentes. Internas, substantiam ipsam, & hujus colorem, vasa, & carunculas. *PARTES. Externæ.*

MEMBRANA renum duplex est, una communis & externa, à peritonæo deducta, qua tota ejus substantia involvitur, & Renis fascia dicitur, à μενεσφαγήτρε, quod in ea veluti matrice renes contineantur, pro ligamento inserviens, qua diaphragmati & lumbis ne-
ctitur. ^d Altera propria est & interna, immediate parenchyma ambiens, à communi tunica vasorum renum ingredientium exorta ac validissime connata, ut vix separari nisi cum difficultate queat. Cingitur externa multa pinguedine, adeo ut renes ex visceribus maxime pingues sint, teste Aristotele, lib. III Histor. de animal. cap. XVII, & nonnunquam in obesis penitus sub adipem recondantur. Dexter tamen minus semper quam sinister; & utcumque vehementer pingues fuerint, aliquid semper mediis deest.

GLANDULÆ (quarum nostra tempestate primus mentionem fecit Bartholomæus Eustachius Sanctoeverinas, Medicus Romanus,) duæ sunt, utrinque una, elatiori renis parti supra pinguedinem incumbens, externæ ejusdem membranæ, sed imprimis septo transverso validissimæ adnexæ. *Figuram* habent semilunarem, & fere renibus similem (unde Renes succenturiati dicti) in aliis aliisque locis magis aut minus depressam: *substantia* tamen paulo laxior est. Venas habent & arterias, ^e ex mediis emulgentibus: ^f interdum tamen & à rene vena transmittitur. Nervos, à plexu retiformi nervorum, quem costalis & stomachici aliquammulti furculi efformant. *Factæ* sunt, ut ego quidem arbitror, ad implendum vacuum, quod inter renes & diaphragma interstat, & ad fulcrimentum Ventriculi eo loco, qui est supra Venas & Arterias emulgentes. *Glandula.*

VRETERES, ἀραιότες, ab officio dicti, ἀραιὰ ἢ ἀραίαν, à mingendo, ἀραι φλεβίδι, & με-
tus urinarii Latinis. Vasa enim duo sunt, teretia venarum instar, nisi quod alba sint (unde Celfo Vena alba) crassiora ac nervosiora, utrinque unum. Hæc ^h ex renum sima parte ubi sinus excusculpti, ⁱ postquam interiorem ipsorum cavitatem succinxerunt, & tubulos octo aut decem effinxerunt (de quibus postea loquemur) egredientes ac per lumborum regionem vectæ (in qua mediante membrana à peritonæo delata, undique alligantur musculis ψέας dictis) in vesicam implantantur. Hinc est quod duplici membrana constant: una communis sive externa, à qua & venulas & arterias suscipiunt capillares, à partibus vicinis cum membrana profectas: altera propria sive interna, quæ priore candidior & venarum tunica durior, paucioribus obliquis fibris donata est. Inferuntur autem *Progressus.*

in posteriorem & humiliorem vesicæ partem, non procul à sphinctere musculo circa cervicem, inter duas membranas proprias delata, in cavitatem penetrantia. Infectio autem obliqua admodum est, quæ solers Natura cavit, quominus aut in compressione ipsius, aut nimia ab urina distensione quicquam in Vreteres regurgitet, cum potius his ipsis meatus occludantur, ut videmus quotidie, dum à pueris vesicæ porcorum inflantur, ne flatum quidem exire. *Magnitudo* eorum tanta est, quantus progressus per lumbos, longi palmum, & latitudine paleæ. In iis tamen, qui nephriticis doloribus sunt obnoxii, dum calculus descendit ad intestini usque crassitiem dilatantur.

Magnitudo.

VASA.

Ves.

Adipos.

Emulgenti.

Propago à Vena sine parte.

VENAS & ARTERIAS à vicinis partibus habent; sed NERVOS, à sexto pari & lumborum medulla, unde exquisitissimo sensu sunt prædita. Venas habent à Cava procedentes, ex quibus duæ *Adiposæ* dicuntur, quod in membranam anteriorem disseminantur, & tota adipe involvantur, quemadmodum & adipis materiam suppeditant. Harum *dextra*, ab emulgente oritur: at *sinistra*, à Cava. *Aliæ duæ emulgentes* ab officio, amplissimæ, ex ipso trunco Cavæ descendente inter primam & secundam lumborum vertebrarum oriundæ, quæ transversim delatæ in *sinistram* renum partem, in *duos* prius deductæ ramos, inferuntur. In hac divisione membrana communi vasa hæc involvuntur, quæ præter pinguedinem, quam habere solent copiosam, ut plurimum glandulosi quibusdam corporibus fulciuntur. Ex his *sinistra* paululum sublimius, ut ipse etiam ren lævus, sita est: at *dextra* longior esse solet. *Vatrum* etiam intra se habent, quæ feri in Cavæ truncum regressum impedit. Notatu quoque hoc loco dignissimum est, à Vena sine pari (quam *αζωγος* Græci appellant) furculum è thorace transmitti, per quem insignis fit thoracis cum rene sinistro ex Fallopii (qui primus hunc observavit) sententia consensus, cum & pus & aquam, aliasque materias in thorace collectas huius rami beneficio per urinas expurgari crediderit, ut superius quoque libro sexto mentionem fecimus. Quamquam mihi alia videatur via, utrique lateri dextro & sinistro communior, nempe Arteria magna, per quam (rapto per ejus poros insensibiles pure) propinquiore via ad emulgentes arterias & renes deducitur. Atque ut hanc sententiam veriore esse mihi persuadeam, imprimis me movet quod videam, non iis tantum, quibus in sinistro latere, sed & in dextro pus colligitur, per urinas excerni, à quo tamen latere venæ ramulus nullus, vel eodem teste, descendit. Ergo via assignanda alia est, quæ utrique lateri sit communis, ut est quam præstant Arteriæ.

Arteria.

Nervi.

Interiores partes renum. Color. Substantia. Emulgentium ramosum in rene substantiam digestio.

Vreterum tubuli. & Pelvis.

Arterias habet duas, utrinque unam, nomine, magnitudine, progressu, insertione, & denique officio dictis Venis respondentes. Dicuntur enim *Emulgentes*, & ex trunco Arteriæ magnæ enatæ insignes, transversim ad renes *venis* sociæ abeunt, ad quas ubi devenere, in *duos* ramos diducuntur; quorum alter, in superiorem; alter, inferiorem *sinistram* partis sedem implantantur.

Nervos utrinque, *partim* à sextæ conjugationis ramo stomachico unum, qui gracilis est & in renum membranam propriam disseminatur: *partim* ab iis, qui circa mesenterium egrediuntur, & in ipsam substantiam distribuuntur.

Inspiciamus nunc INTERIORES PARTES, inter quas occurrit *primum* ablata membrana utraque *Color* considerandus, qui rubicundissimus est: deinde *substantia*, seu parenchyma, quod Iecoris & Lienis parenchymate multo est durius, cordi nonnihil accedens densitate. In hoc plura occurrunt videnda; & *primum* quidem, *Vasorum* Emulgentium per ipsam digestio, quæ ubi bipartita *sinistram* partem ingressa sunt, uterque ramus subito in quatuor aut quinque minores subdividitur, qui rursus in alios minores dirempti, tandem in capillares minimasque venulas resolvuntur, quæ variis modis per substantiam renum usque ad gibbam partem dispersæ, ad *capita* caruncularum papillarum desinunt, in quæ serum transfundunt, ut ad *Vreterum* tubulos distillet. Eodem modo *Vreteres*, qui circa *sinistram* partem angustiores sunt, statim ac in renum cavitate consistunt, amphiores sunt & *sinum* quandam membraneum effingunt, quem Anatomici *Pelvis* & *Infundibulum* appellant, qui postea in duas, quandoque in tres etiam partes, tanquam ramos quosdam dirimitur; quarum una, ad renes sedem elatiorem; altera, ad inferiorem tendit: utraque postea iterum in quatuor, vel (quod pluries evenit) in quinque subdividitur, quos *Tubulos* & *fistulas Vreterum* vocamus, & octo sunt numero, aut decem. Non tamen, ut emulgentes, in capillares venulas

venulas scinduntur; sed æquali fere crassitie, nisi quod in progressu paululum late-
scent, & ubi ad gibbam pæne partem pervenerint, in finem latum & rotundum termi-
nantur, * papillares carunculas in se recipientes, à quibus tanquam operculis eorum
extremitates obturantur.

Sunt autem *Caruncule* hæc exigua corpuscula carnosæ, parenchymate renum nonnihil
duriora, & papillis mammarum quam simillima, à quibus etiam *papillares caruncule* de-
nominantur. Pisi sunt magnitudine; superius latiusculæ, inferius convexæ; quæ si
dissecantur vulnere secundum longitudinem facto, levem *canaliculum*, capilli crassitie,
à summa parte ad infimam per medium habere videntur. *Sitæ* sunt in gibba fere renum
regione, & in ureterum (quibus etiam propterea numero respondent, ut adeo de-
cem sint) tubulos supremos dehiscunt.

Atque hæc Renum, partiumque eis adhærentium fabrica est; eorumque *actio*, quic-
quid serosi est & aquei in vasis, tam Venis quam Arteriis, ad se trahere, separare, tran-
scolare, & per Vreteres ad Vescicam mittere, ut inde extra corpus pellatur. Cum enim ex
vena Portæ per angustissimos meatus anastomosium ad Cavam in hepate sanguis dedu-
cendus erat, ut ostendimus, quo tenuissimus tantum in Cavam deferretur, crassior au-
tem in portæ vena remaneret, pro nutritione partium alimenti coctioni inservientium;
& vero vel tenuissimus ægre transiret, Natura vehiculum addidit, quo nomine Hippo-
crates appellat, aquosum serum, quod ne postea, cum ineptum sit ad nutritionem, in
Cava & Aorta redundaret nimium, Renum beneficio expurgavit. Primum ergo ad se
trahunt renes, ut ostendit Galenus ex Hippocratis etiam sententia, lib. 1 de natur.
facult. cap. v, Venis non mittentibus, lib. 11 de Nat. fac. cap. 1, lib. vi, de Locis male
affect. cap. 111, & lib. de ren. affect. cap. 1, sed quo pacto fellis vesicula bilem allicit.
Attrahit autem non solum serum: sed una modicum sanguinem, qui postea in renibus
à sero separatur. Sanguis hic deinde in nutrimentum cedit parenchymati: at serum
à capillaribus venis emulgentium ad summitatem caruncularum deponitur, è quibus
postea, veluti lac è papilla, in tubulos ureteris exsudat, sensimque collectum in pel-
vim, quo loci omnes tubuli concurrunt, ubi guttula consisterint, per ureteres ad vesi-
cam destillant.

Merito ergo *duo facti sunt renes*, ob corporis æquilibratam; ne unus factus, aut in
medio, cum grandior necessario esset, reliqua viscera comprimeret: aut in latere cor-
poris, tolleretur æquilibratam. *Iacent autem sub jecore & liene* eo loco, qui in trunco cor-
poris exacte quasi medius est, ut undique ad se quam commodissime traherent. Dex-
tro autem sinister superior est, ut ille jecori cedat, quod descendit demissus liene. Non
sunt autem penitus ex adverso, ne alter alterius actionem impediret. *Figuram* habent
phaseoli, ab interna parte, qua se respiciunt, sinuati; ab externa, qua dorsum spectant,
gibbi, ut illic quidem vasa tutius implantarentur; istic, loco, in quo siti, accommodaren-
tur. *Substantia autem est dura, densa, ac compacta*, tum uti vasa tenuissima rectius fulci-
ret: tum, ut prohiberet, quia intestinis, coloque præsertim subjacent, ne ipsis aut fæ-
cibus aut flatibus turgidis nimium comprimantur. Et quia tenuissimas venas arteria-
les recipiunt, quæque ad extremitates usque producantur, hinc adeo fit, ut *duplici*
membrana tegantur.

CAPUT XVI.

De Vesica Urinaria.



ESICA urinaria, Græcis νεφρὸς ἀποδοῦσθαι, ab officio suo dicitur. ^b *Sita est in*
imo ventre, sede sexta, nempe in hypogastrio, in ea cavitate, quam
Pelvim vocari sæpe jam numero diximus. *Connectitur inferiore sui parte*
^c recto intestino, cui incumbit; ^d *superiore*, ossi pubis; at ^e *fundo* (me-
diante uracho) umbilico. Hinc eximium inter ipsam & hunc consen-
sum in quibusdam notavimus, qui grandiore vesicæ calculo labora-
bant, cum de gravi circa umbilicum dolore eoque continuo conquererentur, quem
non aliunde accidisse nobis persuasimus, quam ab uracho, à vesica ob calculum ex-
pansa aut detracta simul revulso; unde partes circa umbilicum sensu acriore præditæ,
simul

Caruncule
papillares.
ACTIO.
Magnitudo.
Figura.
Canaliculus.
Situs.

ACTIO.

Nomen.
Situs.

Connectio.

Figura.

Partes d. ff.
moues.

Substantia.

Membranae.

Foramina.

Musculi.

V. p. c.

Arteria.

Nervi.

simul vellicatæ impendio quam molestum sensum perceperunt. *Figuram* habet ovalem, cum *superior pars* amplior sit: *inferior*, angustior, sicque pyrum exacte referat; ex quo ab Anatomicis in ^a *Corpus* & ^b *Cervicem* dividitur. Comprehendit sub se corpus ^c *Fundum*, quæ latior illa pars est, ex cujus centro ^d *Vrachus* pronascitur, & sursum vectus in umbilicam definit. *Substantia* autem constat *partim* membranæ, ut *Corpus*; *partim* carnosæ, ut *Cervix*, quæ vulnerata propterea coalescit, cum cætera vesicæ vulnera sint lethalia, ut testatur Gal. comm. ad Aphor. xviii lib. vi. *Membrana* autem triplex est, una communis, & due propriæ: illa, exterior est, à peritonæo deducta, qua conterminis partibus alligatur; hæ, interiores, quæ solidæ ac duræ, sed crassæ magis minusque prout distenduntur aut relaxantur. ^e *Prima*, quæ media est inter communem & propriam, crassiuscula est præ reliquis, ^f fibris rectis conspersa, quæ affluente sanguine admodum comparent, & à nobis supra inter musculos Vesicæ, autoritate Excellentissimi Aquapendentis relata; cujus officium statuimus, urinam è vesica fè contrahendo expellere. *Alterâ*, quæ intima, lucida ac alba, exquisitissimi sensus, ut norunt, qui calculo vesicæ laborant, omni fibrarum genere donata. Intus crusta quadam mucosâ, quæ tertiæ coctionis excrementum est, in ipsa vesica excretum obducitur. *Foramina* tria obtinet: *primum* est in cervice, per quod urina excernitur: *duo* alia in postica sede & inferiore, non longe ab ejus cervice, à se invicem duorum digitorum latitudine distantia, per quæ serum ex ureteribus instillat. Obliqua sunt admodum, ne urina in vesica collecta, regurgitare ad ureteres queat. Habet & ^g *musculum*, *Sphincterem* appellatum, qui ad ^h *cervicem* situs, cujus historiam supra libro quarto excrucuti sumus. ⁱ *Venas* etiam & ^k *Arterias* obtinet, *Hypogastricas* dictas, utrinque ad cervicis latera implantatas, quæ statim in duos ramos dividuntur; quorum *alter*, per vesicam; *alter*, per cervicem, & hinc in maribus per colem distribuitur. *Nervos* insignes, nec ut fellis vesica parvos, qui ^l *partim* ab illis sextæ conjugationis nervorum cerebri, qui per costarum radices exporriguntur: *partim* ab illis transmittuntur, qui postremi à spinali medulla ossis sacri originem trahunt.

Constituit autem solers Natura vesicam tanquam receptaculum & cisternam serosi humoris, qui à renibus allectus per ureteres transmittitur, & retinetur donec insigni ejus copia collecta pro nostro arbitrio depellatur. Sapienter ergo in *imo ventre* collocavit, ubi renes siti sunt, & quidem in *infimo loco*, ut destillantem humorem opportunius excipiat, & promptius circa corporis extrema hærens iterum ubi opus est, deponat. *Figuram* rotundam, ut quam plurimum caperet, ne homo urina assidue urgente à negotiis & rerum divinarum contemplatione averteretur. Ne tamen à vicinis partibus nimium forte premeretur, præsertim à facibus durioribus recti intestini dum alvus redditur, oblongior facta est, non exacte globosa. Quæ causâ est, cur & sic, dum fæces detrudimus, urinam sæpe, fereque semper simul mittamus, quod scilicet vesica nonnihil una à facibus egredientibus comprimatur. *Substantia* autem opportunissima est, quæ & extendatur in molem, & iterum contrahatur, simul ab iis quæ recipiuntur, quia acria sunt, non facile offendatur, cum mucosâ crusta ipsi intrinsecus obtendatur. Ut autem pro nostro arbitrio retineretur urina, *Sphincterem musculum* nasci est, quo contracto aut in media sua figura relicto, ne guttula quidem exstillat: aperto autem effluit. Quia tamen & vi quadam expellere conveniebat, totum vesicæ corpus *prima propriarum membranarum* (quam supra musculum statuimus) cingit, qua contracta cum impetu exprimitur. In quod sane munus & transversos abdominis musculos, & imprimis pyramidales habet conspirantes, unde videmus urinam pro nostro arbitrio & in altum propelli posse. Iam ut nutriretur, *Venas* habet; & ut viveret, *Arterias*; utque sentiret quæ molesta sunt, sive acrimoniam urinæ, ne corrodatur, sive copiam ejus præsertim ubi plena est, *Nervos* quoque accepit. Inseruntur autem hæc vasa ad Cervicem, quod locus is maxime tum commodus sit, tum validus ac carnosus, nec suspensa ipsa vasa incedere cogantur.

CAPUT XVII.

De partibus genitalibus in mare, & primum quidem de iis, quæ
seminis generationi inserviunt.



PARTES, quæ infimi ventris cavitate coërcentur, geminas esse, & alias quidem nutritioni dicatas, alias vero generationi inservire, ab initio hujus libri statim monuimus. Voluit enim benigna parens, ne Homo omnium conditarum rerum nobilissimus vitæ hujus usura commode (quantum licuit) duntaxat frueretur: sed &, quia fatalis tandem terminus ipsi impendit, ad æternitatem sese in nova sobole proveheret. Illas quam affabre extruxerit, quamque ipsarum usus & actionis gratia situm, figuram, substantiam, ac magnitudinem tribuerit, non perfunctorie, opinor, explicuimus. Reliquum est proinde, ut & has nunc breviter persequamur, in quibus, si alicubi, magnum certe non solum providæ mentis, sed & mirabilis cujusdam sapientiæ testimonium reliquit. Sunt autem hæ partes, ut sexus, duplices, quod neque in uno, neque ab uno solo generari fortum voluerit, sed unum quidem materiam exporrigere, alterum vero suscipere & fovere. Vir ergo ea organa accepit, quæ partim semen opportune generant, partim coëctum in uterum prompte expellunt. Mulier contra, quæ à mare concipiunt, & in hominem efformant. Agemus nunc de Virilibus, quarum historiam primo, deinde actionem & usum, ut consuevimus, persequemur.

VASA ergo PRÆPARANTIA, à Galeno ἀρρῖα καὶ παρασκευαστὰ dicta, duæ sunt venæ, totidemque arteriæ, quæ idcirco à dissectionum Professoribus, Venæ, & Arteriæ præparantes vocantur, ex quibus arteriæ venis sunt ampliores. In his potissimum origo, progressus, & insertio observanda sunt. ^a Venarum enim dextra paulo sub emulgente è trunco descendente venæ Cavæ, non tamen à dextro ipsius latere, sed antica sede enascitur; & vel simplici initio, ut plerumque; vel gemino, ut non raro. Quandoque ab emulgente propaginem exiguam asciscit, id quod à Galeno quoque jamdiu observatum fuit. ^b Sinistra ex media & inferiore sede emulgentis lævi lateris oritur, quamquam & pluries visum sit, utramque venam exinde enatam. Contra ^c Arteriæ ex ipso trunco, sed longius & pæne duorum transversorum digitorum intervallo sub emulgentibus, à priore parte egrediuntur. Cæterum oblique deorsum ad venas feruntur, quibus non procul ab exortu ope membranæ à peritonæo profectæ copulatæ, inde per lumborum regionem supra primum fœmur flexentium musculum, dextra à dextro latere, sinistra à sinistro super Vreteres vectæ excurrunt, in itinere tenues peritonæo furculos imperitantes. Cum primum autem ad processum ipsius pervenerint, cavitatem abdominis relinquunt, & comite nervo gracili à sexta conjugatione, tum Cremastere musculo in scrotum descendunt. Ingressi vero, variis subito ^d plexibus ita inter se coëunt & commiscuntur, ut corpus quoddam efficiant, pyramidis formam referens, plenum infinitis venis & arteriis, vario modo sibi per anastomoses mutuas implicitis, cujus basis in parastatas ad superiorem testis sedem implantatur. Vocatur plexus hic à nonnullis pampiniformis; ab aliis, corpus varicosum.

Ipsæ autem PARASTATÆ sic dictæ, ^e καὶ τὰ παραστάτῃς ὀνόματι, corpora sunt alba, & fere teretia, nonnihil tamen depressa. Oriuntur hæc à plexu valorum præparantium, testibus (unde ἰσχυροὶ dictæ) incumbentia, quorum intimæ tunicæ illigantur, oblique posterius versus inferiora & testis fundum excurrunt, indeque in vas deferens, cum quo nonnihil reflectuntur, desinunt. Substantiam habent omnino testis instar glandulosam: duriorē tamen, sed nulla cavitate donatam, in quam ex testibus, quo loco conjunguntur, quamplurimæ tenuissimæ fibræ notatu dignissimæ terminantur. Habet & tenuem quandam, qua succingitur, membranam, interiori testis tunica propriæ perquam similem.

^fTESTES vero, qui cum his conjunguntur, substantiam reliquis glandulis similem obtinent, albam, mollem & spongiosam, plurimis venulis & arteriis referentam, unde ab humorum affluxu nonnunquam in magnam molem abeunt. Horum superior pars caput testis dicitur, inferior fundus: illud, angustius est: hic, obtusior nonnihil,

Vasa præparantia.

Præparantia.

Inferior.

Parastata.

Ortus.

Situs.

Inferior.

Fibræ.

Membrana.

Testes.

Substantia.

Partes.

Magnitudo.
Tunica.

M. f. d. d. d.

Tunica qua-
tunc.

1.

2.

3.

4.

Vasa.

Etymologia.

V. f. d. d. d.
Substantia.C. f. d. d. d.
Prostat.Vesiculae se-
minales.Humor olea-
ginosus.Prostate sive
glandula se-
minalis.

nonnihil, ampliorque. *Magnitudo & figura*, ovi columbini est, quod nomen à plerif-
que, sed præcipue Arabibus postea tributum fuit: non tamen æqualis utrique, sed
perpetua quasi Naturæ lege sinistro majore. ^a *Musculum* quoque habent, quem *νεμω-
της* vocant, ab osse ilium enatum & capiti insertum, quem supra libro quarto in reli-
quorum historia complexi sumus. Involvuntur autem *tunicis*, quas quaternas statui-
mus, etsi varie inter se de numero earum disceptent Anatomici. Harum binæ ambos
coërcent, reliquas uterque proprias habet: unde illæ *communes*, hæ *propria* dicuntur.
1. *Communium prima* atque externa, *ἄρχον* vocatur, sive *bursa scroti*, quæ nihil est aliud, quam
cutis cuticula tecta, & quia membranæ carnosæ sibi subjectæ validissime adnectitur, ut
quasi in unam videantur tunicam coire, sit ut quam promptissime contrahatur & ru-
gosa fiat, præsertim si quando sanus homo in aëre frigidiore obambulet. In infima sede
lineam habet secundum longitudinem excurrentem, qua in dextram sinistramque par-
tem dividitur, & futura vocatur. *Alteræ & interna*, quam Veteres *ἰσχυροειδῆ* vocarunt,
quasi dicas rubicundam, à colore rubro quem habet à fibris carneis, quibus varie con-
spersgitur. Ruffo *δαγδῆς* dicitur, hoc est, excoriabilis, quod ab aliis nullo negotio divel-
latur separaturque. Hæc à carnosâ membrana nascitur, quæ hîc quam alibi multo est
tenuior subtiliorque: venis tamen arteriisque plurimis referta. *Proprium tunicarum*
3. ^b *prima*, *ἰσχυροειδῆς* nuncupatur, quod testem *ἔον ἐν ἰσχυρῇ*, tanquam in vagina contineat, ^{b. s. d. d.}
unde & latina lingua opportune *vaginalem* dixeris. Paulus Ægineta *ἰσχυροειδῆς*, hoc est, *ca-
preolarem* vocat, quod vasorum præparantium plexum in modum capreolorum hederæ
contortorum (quos Græci *ἰσχυροειδῆς* appellant) in se coërceat. Membrana est valida ac
densa, abunde venis prædita, cujus extima superficies aspera est, ob fibras quibus cum
Darto adhæret: interior, lævis; estque non alia, quam ipse processus peritonæi, quos
supra testes involvere diximus. ^c *Alteræ*, quæ hac aperta statim in conspectum se offert
& proxime testes complectitur, alba est, crassa & valida, à præparantium vasorum tu-
nica enata, quam Ruffus propterea *ἰσχυροειδῆς* nostri *albugineam* appellant. *Vasa* habent
omnis generis, *Venas & Arterias* à præparantibus propagatas, quæ & in proprias tunicas
disparguntur: at *Nervum* gracilem à sextæ conjugationis furculo costali, qui una cum
vasis & Cremastere musculo peritonæi cavitatem egreditur. Cæterum vocantur testes,
vel quod virilitatis testimonium præbeant, cum ex his virum agnoscamus præ mulie-
re: vel, quod nulli apud Romanos testari licuerit, nisi cui testes essent, & sexus foret
masculini. Græcis *διδυμοι*, quasi *gemelli*, quod quemadmodum hi in utero uno nascuntur,
sic isti in uno scroto semper gemini, modo naturæ ordinem respicias, continentur. Vo-
cantur & *ἄρχοντες* & *ἄρχοντες*, itemque *νύκτοι*, *fabæ*, ex qua appellatione decantatum illud Py-
thagoræ præceptum enatum mihi persuadeo, *ἀνὴρ νύκτοι, Ἀβστῆναι ἀπὸ φάβης*, hoc est, à Ve-
neris illecebris, quanquam non desint doctissimi viri qui aliter explicant.

Parastatis autem, ut diximus, circa testis fundum inferiore sede continuantur ^d *V A-
SA DEFERENTIA* dicta, & in glandulas prostates inferuntur, ideoque partim extra
abdomen in scroto situm obtinent; partim in ipso imo ventre. *Vasa* sunt colore can-
dida, *substantiâ* nervosa, perobscura quadam cavitate prædita, quo nomine *πίπυς* *σπέρ-
ματις*, meatus seminales Herophilus vocavit. *Oriuntur* autem à parastatis inferiore se-
de, sursumque præparantibus vasis in peritonæi processibus connexa feruntur, quos
ubi superarunt & jam abdominis amplitudinem ingressa sunt, reflectuntur & postero-
rem vesicæ regionem petunt, inter quam & rectum intestinum incedunt, ^e donec iux-
ta cervicem nonnihil prius dilatata, mox unita in glandulas prostates utrinque termi-
nentur.

Paulo tamen antequam dilatentur & coeant, lateribus ipsorum ^f *VESICULÆ* quæ-
dam adnascuntur, *SEMINALES* dictæ, insignes & magnæ, quas non rectius quam
uvæ racemo, cum plures sibi adhæreant, comparaveris. Nec tamen aliarum instar
singularem cavitatem insculptam obtinent, sed anfractuosa granorum mali punici cel-
lulas ordine & figura eleganter æmulantur, plenæ humore oleaginoso & nonnihil fla-
vo, qui per foramen proprium caruncula obturatum in urinarium meatum effundi so-
let, ut sequenti capite dicitur.

Ipse autem ^g *PROSTATÆ*, sive *Glandula seminales*, in quas deferentia vasa infe-
runtur, glandulosa sunt corpora, inter cervicem vesicæ & rectum intestinum sita.

* Per

Per harum medium incedit Vrethra, quæ urinæ juxta ac femini communem viam largitur: insertio tamen nulla comparet, nec manifestus ductus est, per quem ex glandulis in ipsam semen deponatur, sed cum membrana satis densa obvolvuntur prostrata, ne quoniam spongiosæ sunt, semen sponte ab illis defluat; ea sede, qua communis ductus est, tenuior rariorque videtur, *poris plurimis pervia*, qui tempore coitus rarefacta membrana ab affluente calore aperiuntur aliquantulum & evidentes fiunt. Poros hos & meatus sæpe mihi sat commode videre contigit in iis; qui gonorrhæa admodum laborarunt, cum ipsis patentiores sint; cujus etiam mali propria sedes sunt ipsæ hæ glandulæ. Sed & in canibus juvenis quandoque deprehendi, quos una cum meis commilitonibus strangulavimus. Sæpe enim evenit, ut compressis nimium à diaphragmate intercepto spiritu visceribus, duroque stercore in recto intestino hærente, glandulis his pressis semen largius effuderint, sicque meatus hos apertos postea viderimus. *Substantia dura est & spongiosa, magnitudine juglandis fere.*

CAPUT XVIII.

De iis partibus, quæ virilis seminis excretioni sunt dicatæ.



LVRES partes sunt, quæ ad seminis generationem faciunt, à se distinctæ, ut nunc ostendimus: at una tantum, excretioni destinata esse dicitur, *PENIS* scilicet; quamquam revera & ipse simplex non sit, sed ex multis partim similaribus, partim dissimilis naturæ compositus, quæ tamen omnes affabre in hanc actionem conspirant. Hujus appellationes diversas libro primo cum externarum partium nomina traderemus, abunde recensuimus: nunc quem situm habeat, quam figuram, magnitudinem, & connexum persequemur.

In primis tamen monendum est, *Penis* vocabulum ut communiter sumitur, non totum id designare, quod nunc eo ipso intellectum volumus, cum *penis due sint partes; una* & quidem præcipua, quæ infra commissuram ossium pubis in perinæo sita est; altera, quæ ab elatiore eorundem ossium sede propendet, & vulgo penis dicitur. Illam, *Græci*; hanc, *sympa* appellant. *Situs* est ad externam imi ventris partem, ad radices ossium pubis: *figura* exacte teres; nisi in superiore parte, quæ dorsum dicitur, latiusculus foret. *Longitudinem* habet in corpore ad Naturæ leges conformato & ætate iusta spithamæ, ubi erigitur: quanquam plurimum variet, pro familiæ & vitæ ratione. Vidimus enim familias, quæ hoc nomine melius pejusve audierunt: quantum autem frequens coitus ad augmentum accessionis faciat, quotidie illi advertunt, qui in Veneris prælia vel frequentiores vel alacriores descendunt. Ineptum autem illud est quod quidam produnt, futurum esse penem majorem si vasa umbilicalia non proxime ad umbilicum ligentur abscindanturque in recens natis, ob urachum, qui inter vasa umbilicalia continetur & vesicæ fundo adnectitur, unde putant retro penem cum vesica trahi. Id enim quomodo fiat, non satis animo meo apprehendere valeo.

Cæterum ipse penis ex compluribus constat partibus, quas commode in externas five continentes, & internas seu contentas dividemus. *Externæ* sunt, quatuor illa communia nostri corporis tegumenta, dummodo pinguedinem excipias, quæ hic nusquam est inveniri, ne penis erectioni incommodet, aut liquefacta indicibilem illam voluptatem interpellat. Cuticula ergo hic mediocris est: cutis crassiuscula, in flaccido pene laxa, in rigido tensa: membrana carnosâ nonnihil nervea. *Internæ partes* sunt plures, duo scilicet penis nervosa corpora, septum, canalis, glans, quatuor muscoli & vasa. *Constat enim ex duobus corporibus*, oblongis, nervosis, ac duris ut ligamentum, non tamen ita densis ut illa, quæ partes inter se vinciunt. Hæc intus raritatem habent spongiæ similem, atraque materia & veluti sanguine nigricante oppletam. Videntur enim ex innumeris arteriarum venarumque furculis quam tenuissimis inter se complicatis retia quædam efformari, quæ inter infinitas quasdam fibras à nobis, quia seriatim septo nerveo attentæ sunt *Pectiniformes* dictas dispersa, & quasi intertexta sunt. Per hanc substantiæ raritatem, ne spiritus diffusi confestim dissipentur & penis ante tempus flaccescat, Natura tunicis quibusdam membranosis, nerveis ac densissimis

deniffimis corpora hæc tanquam involucri quodam obduxit. In medio autem utriusque corpus aliud interjectum est, quod ^a *Septum pellucidum* vocamus, ac utrumque ^{a. D. D.} conjungit, & nerveum est atque candidum. Cæterum hæc duo corpora ab inferiore offium pubis sede ubi crassiora sunt & teretia, oriuntur distincta à se mutuo, instar duorum cornuum literæ Pythagoricæ, ut urethræ inter utrumque locum medium concedant. Mox autem ut ad commissuram eorundem offium pervenerint, interven-
^{2.} *Canalis.* tu modo dicti septi invicem conjunguntur, sicque unita usque ad glandem, cum qua priore sui parte junguntur, excurrunt. His subjicitur ^b *Canalis*, ^{b. 2. 1.} *epithes* dictus, ejusdem ^{& 3. 1.} cum corporibus substantiæ nervosæ, laxæ, densæ, ac mollis. Teres hic est & cavus, ean-
^{Ortus.} dem à principio ad finem amplitudinem obtinens, unde & Celso *fistula urinaria* vocatur. *Incipit* autem à cervice ipsius vesicæ, à qua tamen non nascitur, nec continuatur, ut quidam volunt; sed conjungitur duntaxat, cum facile vesica cocta à canali recedat,
^{Foramina.} ^{1.} sicque ad glandem usque porrigitur. Ad hujus initium tria sunt *foramina*; ^{1.} *unum*, in medio majus & amplius cæteris, quod ab ipso efformatur & cervici vesicæ adnectitur: ^{2.} *duo* minora ad latera utrinque angustiora, à ductu, qui à seminalibus vesiculis in canalem patet. Constat autem *substantia* ejus ex *duplici membrana*: ^{3.} *una interna*, qua & glans tegitur, ex membrana tenui penis nervos investiente pronata, quæ sensu perquam exquisito prædita est, ut feminis acrimoniam, præsertim qua parte inter glandulas prostates consistit, persentiat, voluptatemque excitet: ^{4.} *altera externa*, carnea & pluribus transversis fibris aspersa. ^{5.} *Musculos* habent hæc corpora duos, quos libro quarto ^{6.} *collaterales penis musculos* vocavimus, & breviores sunt ac crassiores cæteris. Hi à coxendicis appendice infra principium duorum corporum nervosorum enati & oblique ascendentes, non procul à principio iisdem inferuntur. ^{7.} *Alios duos habet Canalis*, qui longiores sunt, at graciliores, ab ^{8.} *ani sphinctere* prodeuntes, qui invicem internis ^{9.} *lateralibus* juncti, recto gradu sub canale excurrunt, & in medio longitudinis suæ ad latera ^{10.} *inferuntur*. Hi muscoli etfi carnei sunt, substantiam tamen habent plurimum cum penis substantia convenientem, cum eo erecto statim ad sua principia contrahantur, & cum eodem flaccescente remittantur. *Vasa* habet omnis generis; quorum ^{11.} *alia cutanea* sunt, nec penis substantiam ingrediuntur; ^{12.} *alia vero profunda*, & in intima corpora penetrant. *Vene & Arteriae cutaneæ*, à Pudenda descendunt, quæ ad radicem penis ingressæ per latera dorsi excurrunt, & satis evidentes sunt. *Profunda gemina* ab Hypogastricis enatæ, ad bifurcatum penis exortum insertæ, quæ per penis longitudinem disseminantur. Imprimis vero insignes sunt Arteriæ, per totam penis substantiam mirifice dispersæ, ita ut dextra in sinistrum, & sinistra in dextrum diffundatur. ^{13.} *Nervi* quoque duo magnitudine extimii sunt, ab ossis sacri medulla pronati, quorum alter cutaneus & minor: alter profundus est & insignior, sub ossibus pubis ad penis radicem per mediam bifurcationem ascendens, indeque ad musculos, totum corpus & glandem disseminatus. ^{14.} *Glans*, ultima penis pars est, duobus nervosis corporibus priore sede obnata, quæ nonnihil ^{15.} *ambitu* quoque excedit, cum coronæ modo circulo cingatur, antè tamen acuta est. Exquisitum hæc *sensum* habet, *substantiamque* spongiosam, ut penis, sed solidiorem; in medio *foramina* pertusa, & tenuissima membrana investita. Obtegatur autem cute à penis cute producta & reflexa, quam ^{16.} *membrana præputii* vocant, quæ ab Hebræis & Turcis olim hodieque refecatur, unde Recutiti & Apellæ dicuntur. Inferiore parte membranam vel vinculum, quod ^{17.} *vinculum* frænum appellant, & cum summa glande ligatur.

ACTIO 6
VSVS.

Atque hæc omnium quæ ad generationem faciunt, viro concessarum partium structura est, quæ quam affabre sit facta, ex functionibus nunc videamus. Cum enim in generatione hominis requirebatur sexus, neque unus in se generare posset, ut demonstrat Aristoteles lib. 1 de Gener. anim. sed per venereum congressum in altero; Viro quidem elargita est provida in omnibus Natura, ut semen in uterum muliebrem exporrigeret. Cæterum cum id minime posset fieri, nisi semen prius confectum & elaboratum quam optime foret, proinde *duplices sunt eæ partes*, quas *baelenus* persecuti sumus; & *alia* quidem, ad solam generationem extructæ; *alia* autem, ad excretionem. Videamus primum illas, quæ generationi incumbunt; ex quibus imprimis *Vasa* occurrunt *præparantia* dicta, quæ duæ sunt Venæ totidemque Arteriæ, à Cavæ & Aortæ trunco descendente

scendente pronata. Vasa hæc materiam seminis transferunt, quam Natura esse voluit sanguinem, quod hic animæ, quæ in semine erat collocanda, sedes maxime sit propria. Sanguinem autem hunc non quemvis esse conveniebat: sed quam optime elaboratum & perfectum: qui cum duplex esset in corpore, tam ille qui in Cava vehitur, quam qui in Aorta continetur, non ex Venæ portæ trunco sed ex his & quidem utraque canales deduxit, ut *venosus* quidem seminis (quod sic dicitur) crassamentum: *arteriosus* autem, spiritus suppeditaret. Semen enim Virile corporis nostri materia ex qua partes conformantur non est: sed sanguis maternus à semine virili attractus in uterum, tum semen muliebre in coitu effusum. Virile autem cum utroque mixtum, *calidum primum nativum* in singulis partibus, deinde in corde *influens* illud constituit. Quare ex spiritibus constat, qui cum citra crassiorem materiam in qua resideant prompte sane evanescerent, in corpore quodam maxime opportuno Natura firmavit. Hoc eleganti exemplo docuit summus Philosophorum Aristoteles, lib. 1 de Generatione animalium cap. 11, ubi illos τὸ σπέρμα τὸ ἐκ ψυχρῆς ἀρχῆς, *semen principii animæ*: hoc, τὸ ἐκ τοῦ σπέρματος corpus appellat, quod mox διαλύειν inquit & πάλιν αἰετῶς, *solvi ac in spiritum verti*. Quæ sane verba male à quibusdam intellecta occasione dederunt doctissimum & quam optime de humana societate meritum virum acerbè ac contumeliose reprehendendi. Nec enim (ut ajunt ipsi) in inanes auras & vaporem dissolvi voluit, sicque evanescere ex utero: sed quia φέρον habeat ὑγρὸν & ὑδατώδη, *humidam & aqueam naturam*, ratione crassamenti διαλύειν, *dissolvi*: ratione vero spirituum πάλιν αἰετῶς, *spiritescere*, & quidem (ut eleganti exemplo verborum obscuritatem explicat) ὡςπερ εἰς οὖρον τὸ ὄνιον, & τὸ πάλιν αἰετῶνται, *quemadmodum videmus coagulum lac coevis*. Solvitur enim & in omnes partes cum quibus commiscetur sic diffunditur, qualiter coagulum & fermentum absumi videmus, etsi revera commixtum sit illud cum lacte, hoc cum pane, ut nequeas ullam particulam ostendere, quæ ex coagulo aut fermento sit effigurata: neque tamen etiam, quæ non coagulum aut fermenti aliquid habeat. Sic in embryone haudquaquam monstrare licuerit, quæ pars ex semine virili condita sit, cum neque vena, neque nervus, neque caro, nec cutis ex semine constet, sed universum dissolutum fuerit ac in spiritum versum, qui postea per totum corpus diffusi, ut sic cum ubique sit nullibi tamen monstrari digitis queat: & cum omnibus partibus infit, nullam tamen earum efformet. *Materia ergo seminis* sanguis est: sed sanguis purus & elaboratus, maximeque spiritibus refertus, cum semen ipsum non fere aliud quam spiritus sit, junctus modico humido in quo subsisteret. Deduxit autem merito ex *Arteria magna & vena cava vasa præparantia*, ex quibus arterias ampliores fecit venis, quia plus scilicet spirituum quam corporis seminalis requirebatur. *Venam tamen sinistram* nequaquam ut dextram ex ipso trunco *eductam* voluit; sed ex emulgente potius ramo, ejusque media sede, ne contra justitiæ leges quas tam sanctè ubique ac religiose observat, hic temere peccaret. Expediebat enim ut utrumque vas æqualis esset longitudinis, adeoque præparatio seminis ab utroque æque fieret. Cum ergo truncus cavæ ad dextram nonnihil sedem necessario declinet, ut cedat Aortæ sinistram occupanti, futurum omnino erat ut si ex eodem loco prodiret sinistra è quo dextra nascitur, hac multo longior fieret. Sed & serum sanguini miscere in sinistro voluit, non quidem (ut plerique omnes censent) quo à sinistro teste generarentur fœminæ, à dextro mares; semen enim quod in coitu emittitur, in glandulis proftatis est, & ex utraque effusum in canalem urinarium confunditur: verum ut acredine nonnihil semen profunderetur, qua voluptatem illam in coitu sive augeret seu perficeret. Quod si ex utraque emulgente duxisset, nimium seri semen infœcundasset. Ineptum autem est, quod ab aliis fere omnibus tradi videmus Anatomicis, cavisse Naturam prudenter hoc invento, ne arteriam magnam sinistra vena superequitaret, à cujus continuo motu ruptionis periculum præsentaneum imminerebat, cum videamus per universum fere corpus arterias venis subterni, nec unquam observemus ullam hoc nomine ruptam detritamve.

Cæterum hæc vasa merito longissima sunt, ut diligens quædam præcedat præparatio, quam facile in his fieri observabis si sanguinis duntaxat advertas albedinem, quam auge-ri cum itineris longitudine indubitata fidem oculorum æstimatio præstat. Hæc causa

quoque est, cur in tot plexus coeant, ut scilicet quemadmodum intestina cum longiora sint futura, in angustiore spatio promptius continerentur. Arteriae autem longius sub emulgentibus quam Vena oriuntur, ut breviores sint; quia spiritus præparatione tam exquisita ut sanguis, non indigebant. Coniunguntur quoque per anastomoses, ut Arteriae quidem præparatos spiritus, Venae autem sanguinem conferrent, & quædam exacta commixtio fieret antequam Parastatas materia seminalis ingrederetur. Inde ad has utriusque sanguinis mixtura transfunditur, & mea quoque sententia in his in semen perfectum propria vi elaboratur. Dico, in his elaborari; quod plenas semine non ego tantum sed & alii quam plures doctissimi Viri mecum invenerint; tum quia haud temere Naturam huc materiam feminis deposuisse, sed potius ut coqueretur, crediderim. Adde autem, vi propria; ut demonstrem me cum iis non facere, qui cum testes nunquam in se semen continere inveniant, adeoque officinam feminis non esse vel oculorum testimonio convincantur, irradiatione tamen in parastatis generare profitentur. Atque nunc antequam ulterius provehamur, ut omnia clariora sint quæ dici in hoc negotio possint, duo quidem imprimis mihi agenda videntur. Primo, demonstrandum quibus ex causis hanc facultatem tum generandi in se, tum in alio per irradiationem testibus derogem: deinde investiganda propria ipsorum actio, & si quid erit quod possit objici diluendum. Nec enim ita temere à Galeni opinione unquam discedendum aut aliorum Clarissimorum Virorum sententiis contradicendum putavi, nisi quoties causas habui admodum graves experientiamque ipsam contrariam viderem. Testes igitur in se non generant, quod materia feminis testes non ingrediatur, sed in parastatis remanet, ut & alii observant, inter quos imprimis doctissimos duos, Fallopius inquam & Fernelius nomino. Et quam ineptum foret hoc Naturæ consilium, quæ cum brevissima semper utatur ubicunque licet via nihilque frustra tentet, si materiam hanc à parastatis ad testes, iterumque ab his ad illas traduxisset, & in tam anxio itinere difficilique nihil à parastatis beneficii quævisset. Taceo nunc in testibus semen nunquam, interdum serosum tantum humorem reperiri. Sed nec per irradiationem testes semen generant, cum hæc ope spirituum necessario accidat, quod præparatio feminis sit coctio; omnis autem coctio ope calidi spirituumque perficiatur. Spiritus autem cum in testibus non sint ut in fonte caloris, aliunde ergo ipsis accedunt, quemadmodum Cerebro à Corde: at certe quod testibus affluit non tanti est, ut aliis partibus possit suppeditari postea: ut nihil jam dicam neque arterias nec venas à testibus ad parastatas desinere, quæ vicem possint obire canalium per quos influant. Quod si objiciat quispiam, vicinæ beneficio irradiationem hanc fieri, id mihi quidem ex iis esse videbitur, quæ inter impossibilia referuntur, quæque à Naturæ institutis maxime aliena sunt, cum nullibi spiritus ob tenuitatem suam nisi per crassiores fistulas traducat & communicet aliis partibus, ut videmus in arteriis & nervis contingere. Quod si à corde influat vis generandi feminis, quid opus est à testium arteriis spiritum advocare, cum parastata copiosioribus irrigentur arteriis, & per quas à corde rectissima via est, qua assiduo ac indefinenter spiritus influant. Nec vero peculiarem credendum est requiri hic calorem, qui semen confectum primum, deinde fecundum reddat, qualem nonnulli vana certe opinione confinxerunt sibi, qui spiritus quosdam singulares in testibus generari statuere, diversos ab illo triplici spirituum genere quod vulgo statuitur, cum in nulla universi corporis coctione distinctum esse videamus genus: sed omnibus, ut ventriculo, hepati, lien, mammillis, cæterisque à Corde influere. Quod si inde Ventriculus chylum, Hepar sanguinem, Mammillæ lac generant, id non ideo evenire putandum, quod à diverso calore influente coctio sit instituta: sed quia temperamentum illius partis diversum longe est ab aliarum temperie, quemadmodum neque in oculo alius animalis spiritus est ab eo qui ad aures transmittitur, etsi in illo videat, in hoc audiat: sed quia illa partis illius conformatio est, aliudque temperamentum. Calor enim non nisi solam coctionem efficit: at formam aliam atque aliam temperamentum partis materię concoquendæ inducit. Parastata ergo semen generant, & quidem in se atque à se, propria & insita facultate, ob temperamentum, quo præditæ sunt, coadjuvante tamen quamplurimum & excitante hoc ipsum calore à corde influente. Testes autem coctionem seminis secundario adiuvant, quatenus scilicet serum ad se trahunt digeruntque; illud inquam, quod necessario

Parastatarum
visus est
generatur.

Testes in se
semen non
generant.

Testes neque
in alio semine
generant.

Parastatarum
visus est.

Testium ve-
rus est.

necessario una cum sanguine ad parastatas vadit, ut per tenuissimos arteriarum venarumque plexus, tum anastomoses transeat. Si enim hoc consilio Natura ut diximus superius sanguini sero providit, ut in hepatis parenchymate ex radicibus Portæ ad Cavam traduceretur, in quo satis evidentes adhuc sunt anastomoses: multo profecto magis erat necessarium ut in his prospiceret, quæ ita angustæ sunt, ut omnino sensum omnem effugiant. At revera id fieri vel ipse nos sensus edocere potest, cum videamus in Testibus nonnunquam serosum humorem coacervari, & sinistram testem multo majorem dextro reddi, quod scilicet per venam emulgentem lævi lateris serosior sanguis traducatur. Accedit, quod testis substantia glandulosa est, qua Natura per totum fere corpus ad ferositates hujusmodi absumendas abusa est, vel ipsius magni Hippocratis testimonio. Et hoc nomine fibræ illæ tenues ad parastatas à testibus ea parte qua invicem coherere digeruntur, ut per eas commode attrahant. Quod si quis hanc sententiam non omnino quidem à veritate alienam esse statuatur, at interim urgeatur vulgari illo dubio, quæ causa sit, si testibus feminis generatio proprie non competat, ut iis tamen ablatis vel quocunque morbo causæ externa & imprimis frigore læsis, animal semen aut non conficiat aut certe generet infœcundum. Illi ego respondeo, me sic nihil hac ratione urgeri, ut haud videam quid facilius sit quam huic scrupulo satisfacere. Nec enim vel frigore testis afficitur, vel cultro dum castramus læditur, quin una afficiantur & lædantur ipsi adnatæ parastatæ, in quibus feminis officinam ponimus. Quod si jam illudere quis responsionem hanc voluerit dicatque infœcundum quoque futurum esse animal, si abscisso teste parastatæ relinquantur, nec illi ego valde contrarius propterea fuero. Infœcundum enim merito erit, cum coctio perfecta in parastatis tum haudquaquam futura sit, quod serum illud superfluum non absumatur, à quo semen aquosum nimis efficitur. At inde non magis sequitur parastatis fecunditatem feminis accedere à testibus: ac hepatis venis à liene vis sanguificandi, quod læso liene videamus sanguinis generationem in jecore corrumpi, cum crassior chyli pars non attrahatur. Videbimus tamen nihilominus hoc, materiam scilicet seminalem confici, quæ nonnunquam & Eunuchos quibus relicta parastatæ ad venerem excitat & effunditur, quamvis ob dictam causam fortum haudquaquam generet. Cæterum testes ne frigoris tempore plurimum paterentur, Natura musculos tribuit & complures tunicas, ut illi quidem contracti abdomini admoventur à quo foverentur: hæ autem, tegerent. Hoc idem præstant & ipsæ communes membrane, quæ attactæ leviter à frigiditate protinus contrahuntur in rugas, quo nomine cuti tam valide Natura membranam carnosam fibris carneis conspersam junxit. Siti autem sunt extra abdomen, propter parastatas connexas: at hæ, ut longior esset via vasorum præparantium, sicque melius feminis materia præpararetur. Elaboratum hoc modo semen in parastatis per deferentia vasa ad glandulas transmittitur. Vasa hæc perobscura cavitate prædita sunt, quod semen facile cum totum sit spirituosum permeet: nervæ autem & crassa tunica constant, quod minus idem dissipetur. Hæ in glandulas prostatas desinunt, in quibus colligitur & tanquam in promptuario aservatur. Antequam autem eò perveniant, Vesiculis quibusdam amectuntur, quæ quod oleosum & pingue est in semine ad se attrahunt, à quibus postea sensim in communem urinæ feminisque ductum sive urethram per foramen caruncula obturatum elabitur, ut is continuo irrigetur nec urinæ acrimonia erodatur vel exsiccat in se consadat. Idem fit, & potissimum coitus tempore, ubi compressis his una cum glandulis copiosius effunditur, ne feminis acior vis damni quid invehat, proptereaque hujus humoris defectu nonnunquam stranguariam nasci Galenus nobis auctor est. Sunt autem complures, ne si una duntaxat foret cum impetu efflueret; sic cum multæ sint, ex una in alteram paulatim derivatur. Intus anfractus habet, ut sensim ac sensim distribuant ad infimam, ex qua in meatum paulatim transmittitur: ne autem regurgitet, caruncula ductus ille obturatur. De prostatis postea dicturus sum, cum penis actionem investigabimus.

Est autem PENIS ACTIO erectio, cum à Natura conditus sit ut semen optimè elaboratum in uterum transferat. Vterus hic cum in corporis cavitate necessario recondere, quo tutior foret ab externo frigore, ne feminis calor dum ipsum exporrigitur evanesceret, canalem longum Natura effecit, per quem ad uterum excurreret. Canalem hunc ut recondere in vaginam uteri Vir posset, durum esse conveniebat &

tenfum : at si perpetuo talem servaret homo non minus molestum incommodumque illi foret , ac si manum perpetuo tensam erectamque secum circumferret. Proinde sic solers Opifex condidit , ut utrique sane tempori inserviret , & ubi opus fuit in coitu quam facile erigeretur , reliquo autem flaccidus à corpore dependeret. *Substantiam* ergo ipsi concessit , quæ facile tenditur ; & materiam , quæ admodum inflat. Talis substantia est corporum nervosorum & urinarii meatus , ex poroso nervo & fungoso constans , ad quam arteriosus sanguis & spiritus imaginatione venerea concepta copiosissime affluunt & tendunt. Id ipsum videmus venis nonnunquam contingere , ut spiritibus turgidulæ fiant calidiore tempore in manu , brachiove. Cæterum ut & quam citissime & maxima copia affluerent , calore prospexit , confricatione & sensu insigni glandis , quæ attrahunt spiritus & sanguinem : at ne facile dissiparentur , *septo & tunica nervea* undique munivit & prohibuit. Hoc nomine per universam penis substantiam omnis generis vasa sed *imprimis arterias* sparsit , quod ab his quidem maxime omnium tenderetur. Nec tamen corpora tantum nervosa dicta , sed & canalis ipse & simul musculi , quod ejusdem fere cum his substantiæ sint , inflantur. Ex quo fit ut *canalis* viam quidem aperiat : at *musculi collaterales* penem detineant , ut quam rectissimus flaret , ne forte ad latus declinans meatum clauderet. Ne quoque idem pressus à corporibus nervosis subsideat , *inferiores musculi* inflati & proinde contracti deorsum trahentes ipsum impediunt. Sed & aliud insigne officium præstant quatenus breviores adeoque crassiores facti , dum omnia cætera sic tument prostratas glandulas comprimunt , sicque per *angustissimos illos meatus & inconspicuos* , in urethram granulatim semen (non secus ac argentum vivum in corio arcte conclusum solemus) exprimunt , adeoque summa coitus voluptas exoritur , quod membrana interior qua urethra investitur , præsertim ubi media inter glandulas incedit , acutissimi sensus sit & gratissimus quidam ac indicibilis pruritus excitetur. Rarefiunt enim tum pori illi angustissimi à calore affluente , patentioresque fiunt : quo autem angustiores sunt , eo major delectatio percipitur. Ex quo fit ut qui raro Veneri indulgent , majore perfruantur voluptate : qui sæpius , minore : sed interdum nec cogitantibus quidem effluat , ubi laxiores pori illi redduntur. Sic exclusum ex glandulis semen à meatu urinario contractis *transversis extrema membrana* , ex qua constat , fibris propellitur.

*Vbi voluptas
percipitur.*

Dux ergo sunt partes , in quibus maxime voluptas percipitur in emissionem seminis , *Urethra* & præsertim illa ipsius pars quæ intercedit duas Prostatas ; in ipsa autem pugna , *Glands penis*. Hoc nomine *reliqua penis corpora ambitu nonnihil excedit* , & maxime circa *Coronam* , ut undique arctius ab uteri vagina & transversis ejus rugis constringatur. Acuta vero antè est ut ipsum internum osculum sese peneret. Ut enim uterus semen felicius & calens bene hauriat , glandem uterum ingredi conveniebat. Substantia spongiosa & solidiore quam corpora constat , ut quam plurimos spiritus susciperet , eoque diutius tensa maneret , cum ipsa & Hymenem percurrere , & denique omnia agere debeat. Exquisiti sensus , ut tanto major hæc delectatio sit , quam Lucretius describens libro 1, hominum Divumque (fœdissime!) voluptatem appellat. Quamquam autem exquisitissimi sensus sit , mirabilis tamen in omnibus Natura præcavit , ut compressa aut trusa suavem quandam potius delectationem quam dolorem percipiat , quod ideo contigit ut dum in pugna comprimitur ob suavitatem potius incredibilis illius voluptatis assurgeret , quam ob dolorem subsideret. Reliquorum usus facile ex dictis quibus colliget.

C A P V T XIX.

De partibus genitalibus in feminis , & primo quidem de Pudendo muliebri.

FV D E N .
D A .



NARRATIS partibus genitalibus Virorum , nunc Muliebres inspiciamus , quas commode in Pudenda , Vterum , & Testes , ipsisque annexa Vasa præparantia & deferentia dividemus. Dicuntur *Pudenda* , Græcis *αἰδοίων γενναίων* , quicquid nobis de obscænis partibus citra dissectionem in oculos incurrit. Latinis antiquioribus *Natura* vocabantur , unde doctissimus Romanorum Varro , *Nutrices* , inquit , *naturam* , qua *fœmina sunt* , Porcum

Porcum appellant. Obsceniore vocabulo Cumum nonnulli dicunt: at qui student honestis auribus placere, locos muliebres nuncupant. Ex his primo omnium occurrit^b pars illa ex qua pili primis adolescentiæ annis erumpunt, quam *pubem*, Græci *ῥέβω* appellant; an-
nos autem ipsos quibus prodeunt, pubertatis. Vocatur & *ῥέβω*, *πέπτην*; & à pilis *πέχωντες*.
Aristoteli *ῥήσιον*, *ῥόνος ῥήσιος*, quod in congressu mutuo hæc pars præcipue concutia-
tur. In hac, superior pars præ reliquis nonnihil eminentior est & pilosior, quam ideo
Veneris montem appellant. Erumpunt autem pili circa decimumquartum annum, qui in
mulieribus quidem quam virginibus crispiores sunt. *Rima magna* quæ inter^c labra con-
stitit, major est quam^d foramen colli uteri seu cervicis, quæ virile membrum admittit,
cum ab osse pubis incipiat & fere ad anum usque pertingat, ut inter hanc & istam peri-
næum transversus digiti latitudinem vix excedat. Græcis *ῥήσιον* vocatur sive *fissura*, ad
cujus latera sunt^e duo *labia*, *ῥήσιον* Hippocrati dicta, quibus interiores pudendi partes
clauduntur, non secus ut dentes & lingua labiis oris. Constant ex communi corporis
integumento cute, quæ adipem non paucam & fungosam continet. Diductis his non-
nihil^f *alæ* in conspectum prodeunt, quæ Græcis *ῥήσιον*, quibusdam & *ῥήσιον* dicun-
tur. Galeno *ῥήσιον*, quod primæ sunt quæ sponsum admittant, vel certe quod scaturienti
urinæ fonti præesse videantur. Productiones enim sunt duæ, utrinque una, quæ
ex molli & spongiosa carne, tum ex reduplicatione cutis ad latera externi cervicis osculi
oriuntur & sub labiis testæ ad commissuram ossium pubis ascendunt, junctæque^g *Clit-*
oridem amplectuntur; unde quibus hæc magna est, iis & *alæ* majores esse solent. Figu-
ra & colore galli cristam æmulantur, unde *Crista* fortassis Juvenali Poëtæ, dum scribit,
Callidus est crista digitos imprescit Aliptes,
Ad summum Domina femur, exclamare coëgit.

Hæ quoties collabuntur ad se invicem externum cervicis osculum exacte claudunt. In
harum ergo apice^h *Clitoris* est, caro quædam nervosa, dura, intus nigricante & spongio-
sa materia plena, similis omnino illi ex qua præcedenti capite duo nervosa penis cor-
pora extrui diximus. Sed ut substantiam eandem cum virili pene obtinuit, ita quoque
usum fere & figuram. Erigitur enim non secus ac penis una cum circumstantibus alis
si quando lascive manibus tractatur, copioso spiritu influente; ac rursus hoc dissipato,
flaccescit. Hoc nomine ab Albucase *tentigo*, ab Avicenna *virga*, à Laurentio *mentula mu-*
liebris dicitur. Constat autem ex tribus corporibus, quorumⁱ duo *lateralia*, à nonnullis
ligamenta, aliis *Crura* vocata, quod ipsis erecta inniti videatur, & ab ossis ischii tubere
interno distincto principio enascantur: ^k *tertium* ac inter hæc medium è superiore parte
commissuræ ossium pubis prodit, in cuius extremitate^l *glans* est, à Veteribus *μύρον*
dicta, ut puto ob similitudinem quæ ipsi est cum baccis myrti; quæ etiam^m *tenuissima*
cute tegitur tanquam præputio quodam, enata ex nympharum coitu. Huic nonnulli
musculos quoque ascribunt. Vocatur à Græcis *κλειτορίς*, ab obscæno verbo *κλειτορίζω*,
quod hanc partem digitis petulanter fricare significat. Polluci lib. 11 *ἡνδραίης*, qui de-
finit *τὸ ἐν μέσῳ ῥήσιον ὁκαίρον σαρκίον*, carunculam quæ in media muliebris pudendi fissura
subsultat. Hæc interdum ad tantam magnitudinem intumescit, ut sæpe anatomix
ignaris imponat, qui credunt mulieres in viros commigrasse, quod extra pudendum
propendat instar mentulæ virilis. Atque hoc quidem foeminarum genus eo sæpe in-
fantiæ devenit, ut cum aliis mulieribus illicite coëat, in quas elegans est carmen Martia-
lis ad Bascam,

Inter se geminos audet committere cummos,
Mentiturque virum prodigioſa Venus.

Vocantur à Græcis antiquis *ῥήσιον*, Latinis *fricatrices*, quas frequentissimas in Ægypto
& Africa Nautæ qui orientales plagas peragrati sunt, referunt reperiri. Cæterum do-
ctissimus Hippocrates libro de Natura muliebri morbi cuiusdam meminit, quem *κίονα*
appellat, & Interpres vetus recte *Columellam* traduxit: at cum ignoretur ab aliis hoc
morbi genus, plures varias lectiones excogitarunt, plerique tamen legunt *κίονα*, inter
quos præcipue familiam ducit Hieronymus Mercurialis, Vir sui seculi doctissimus. Ego
nihil immutandum cenſeo cum videam duo esse morborum genera, quæ *κίον*, hoc est,
columna appellari queant, deducta similitudine ab uvula in faucibus dependente. Pri-
mum est de qua nunc locuti sumus, Clitoridis prominentia & aucta præter naturam
magnitudo

magnitudo: *alterum*, quam sæpe deprehendi, carnea quædam & callosa excrescentia circa osculum cervicis. Et de hac posteriore ut imprimis Hippocratem laudato loco verba fecisse statuo, sic reor etiam non alteri magis, quam huic convenire curationis modum quem ibidem proposuit, puta resectionem. In hæc corpora ^a *Vena & Arteria* pudendæ numerosa fobole propagantur; tum *Nervus* à sexta conjugatione, valæ quæ omnia insigniora sunt, quam corporis ratio exigit.

Foramen Vesicae.

Sub ipsa autem Clitoride supra cervicem externum osculum quod Nymphæ circumstant, ^b *foramen* quoddam reperitur mediocris magnitudinis, per quod scæminis sexus urinam reddit. Diligentius hoc propterea notandum est, ne suppressa urina erremus cum iis, qui anatomia ignari sunt & catheterem in vulvæ vaginam injiciunt, credentes ex illa urinam reddi. In hoc sinu quatuor *carunculae* observantur, quas à forma quam similem habent cum myrti baccis, *myrtiformes* appellant: in Virginibus rotundæ, in defloratis attritæ & flaccidæ. Hæc in quatuor quasi angulis sitæ sunt, *duæ* à lateribus secundum longitudinem; *una* in elatiore parte, quæ cæteris major ac bifida ut dictum urethræ foramen obturet occludatque: alia in inferiore, versus interiora. Has carunculas conjungit membrana quædam partim carnosa, partim nervosa, mediocriter crassa, in medio instar oblongioris annuli foramine pertusa, ut in adultis minimum digitum facile admittat. Per hoc Virginibus menses effluunt & urina: at membrana decantatissima illa est, quæ *Hymen* dicta, *ὄπλον ναρὶ ἰεργῶ*, & virginittis signum statuitur, reveraque est quoties reperitur. De hac cum plures sint Anatomicorum inter se controvertiæ quas nunc in medium asferre præter nostri propositi rationem censemus, hoc unum monendum duximus, in rebus Anatomicis audiendos neutquam esse, utcumque in aliis medicinæ partibus docti fuerint, qui experientia & observationibus carent. Ridendi ergo imprimis illi qui nunquam; post hos, qui raro admodum inveniri nec nisi præter naturam existimant. Hanc enim in omnibus quas secui virginibus me deprehendisse & in publico Theatro sæpenumero demonstrasse testor, nec defuisse unam notavi nisi præter naturam, vel quia petulanti manu (ut interdum evenire solet) rupta sit, vel quia ab affluxione humorum (quod etiam quandoque accidit) erosa fuerit. At enim in maturis Virginibus crassiorem reperi: in junioribus debiliorem mollioremque, rarissime imperforatam, nec nisi semel dum hic Patavii adolescens Medicinæ studio incumberem, quam nulli propterea quantumvis omnes animi nervos intenderent, percurrere potuerunt, Chirurgia tamen curata est ab Excellentissimo Præceptore meo Hieronymo ab Aquapendente. Aliis enim in primo congressu facile rumpitur, ex quo fit ut virginibus fere omnibus sanguis in coitu maritali effundatur. Dixi fere, quod non ignorem contingere nonnunquam posse, ut foramen sit amplius penisque angustior, sicque prompte citra vim ingrediatur uterum. Et hinc consuetudine nata est teste Leone Africano, ut qui Fessam incolant in nuptiis dum novi conjuges amoris indulgent, præ foribus adsint, quibus si monstretur sanguis effusus in coitu læti ad convivia parata se conferunt, de virginittate sponsæ sibi mutuo gratulantes; sin minus, impransi discedunt. Cæterum eos hic qui Medicinam faciunt velim admonitos, ut cautiore esse discant, nec Virginibus si quando ex utero laborent, temere pessaria intrudant, cum ea ad uterum nequeant pertingere nisi prius virginale claustrum rumpatur. Hymen autem membrana cum carunculis myrtiformibus corrugata formam calicis parvæ rosæ semiexpansæ refert, unde & fortassis ab Antiquis *flos* dicta, & hinc nata phrasis *deflorare virginem*, quod pudicitiam expugnare significat. De hoc flore virgineo elegantissimum carmen est apud Catullum, quod cum dignum sit ut alibi quoque legatur, huc transcripsimus:

*Vt flos in septs secretus nascitur hortis,
Ignotus pecori, nullo confusus aratro:
Quem mulcent aura, firmat Sol, educat imber,
Multi illum pueri, multa optavere puella.
Idem cum tenui carptus defloruit ungui,
Nulli illum pueri, nulle optavere puella:
Sic virgo dum intacta manet, tum chara suis: sed
Cum castum amisit, polluto corpore, florem;
Nec pueris jucunda manet, nec chara puellis.*

Post

Post carunculas has & hymenem ^a rima occurrit sub vesicæ foramine rugosa, inter duas alas sub magna rima conclusa. Vocatur hæc *cervicis osculum*, Galeno *σῆμα τερχήλις*, nonnunquam *externum orificium*. Per hoc primo in vaginam penis virilis ingreditur, quod in quibusdam præter naturam sed raro tamen imperforatum est, unde *ἀνεῖρηται* dicuntur. Ultimo tandem loco, negligenda non sunt *duo cæca foramina*, quæ statim apparent diductis labiis, sed fere tantum in vivis, cum admodum parva sint, in quibus serofus quidam humor non parva quantitate prodit, qui maris pubem in coitu madefacit.

Cervicis osculum.

Duo cæca foramina.

CAPUT XX.

De Utero.



UTERUS à figura utris vel utriculi, qua voce Plinius lib. xi, cap. xxxvii, quoque non inepte appellavit, dictus videtur. Hujus enim ritu cavus est & fœtum coërcet. Hippocrates & Galenus ut plurimum *ὄστρον* & *μήτραν*, aliqui etiam *ματρίδα* appellant, ex quo etiam sacris literis usitata phrasis nata est, *ἐν ματρὶ ἔχον* pro eo quod nos dicimus *utero ferre* & *gravidam esse*. Latinis *matrix* dicitur. Vtunque autem unus continuusque

Uteri etymologia.

ductus sit, à fundo usque ad pudenda, quia tamen diversæ in eo reperiuntur partes, ^b commodè trifariam dividitur in *cervicem uteri*, *osculum*, & *fundum*. Dicitur ^c **CERVIX** tota illa pars, quæ virile membrum in coitu suscipit, unde & *vagina penis* quibusdam, quanquam communiter *collum* nominetur, quam appellationem & Græci retinuerunt, *αὐχένια* & *τερχήλιον* ἢ *μητρίδα* vocantes. Soranus Ephesius honestissimum vocabulum indidit, qui *κόλπον γονακῶν* *sinum multebrem* appellat. Est autem meatus teres, ab ^e externo orificio ad ^f internum uteri osculum pertinens. ^g *Situs* ergo est in imi ventris cavitate illa, quæ pelvis dicitur, inter ^h vesicam & ⁱ rectum intestinum, quibus *membrana à peritonæo enata* alligatur. Exstruitur autem ex *membrana duplici*, quam si per transversum feces, spongiosa quædam caro intercedit, similis omnino illi quæ in duobus nervosis penis corporibus reperitur. Hujus beneficio à libidine & in coitu à penis frictione erigitur ac intumescit, infinitis venarum arteriarumque furculis copiosam spirituum vim suggerentibus. Voluit enim sapientissimus Opifex ut penem undique amplexu suo comprimeret, quo suavior majorque sexus utriusque delectatio foret, eoque modo in coitu pro ratione penis nunc latior nunc angustior, modo brevior aut proluxior redderetur. Hoc nomine internam quoque tunicam frequentibus ^k *rugis transversis* & ^l *orbicularibus* intertextuit, ut arctius retineant, quæ in *Virginibus* duriores sunt ac eminent; in *Vetulis* acis quæ *sæpe virum admiscere*, sensim quasi pereunt. Ipsa autem *cervix* in juvenculis mollissima est; at iis quæ sæpe conceperunt indies fit durior. *Connectitur* *cervix* cum vicinis partibus: *anterior*, ¹ *cervici vesicæ urinariæ*; & quia nonnihil latior est, etiam ossibus pubis ope membranarum à peritonæo prodeuntium: *posterius* ^m recto intestino, cui toto ductu incumbit. Hoc quoque *diligenter notandum*, *Cervicem* cum nec virilem penem suscipit nec menses fluunt, contortam esse & in se pluribus rugis concidere, ut internas partes ab externo aëre sive calido sive frigido defendat, quo nomine menstruo tempore mulieres, nisi sibi prospiciant, impense refrigerantur.

CERVIX uteri. Appellatio.

Situs.

Rugæ cervicis.

Connectio.

ⁿ *Os Vteri*, ἢ *σῆμα* ἢ *μητρίδα*, & Galeno interdum *Cervicis internum orificium*, foramen est quod oris modo dilatari & constringi potest. *Situm* est inter ^o *cervicem* & ^p *fundum*, ex cuius infima sede protuberat *corpus referens* quasi glandem obtusam perforatam transversa linea, quod tamen cum hiat exacte rotundum efficitur. Hoc perpetuo connivet: at *conceptionis tempore* *primisque* dum *utero gerunt* *mensibus* sic constringitur, ut ne angustissimum quidem admittat stylum: *in coitu* contra adeo dilatatur, ut penis glandem suscipiat, quem dum suaviter amplectitur multa voluptate utrumque sexum perfundit. *In partu* adeo extenditur, ut commodum egredienti utcumque magno fœtui aperiat viam, quam rem considerans Galenus se admirari quidem at intelligere non posse ingenue confitetur. Quod si forte inversum sit, induratum, exulceratum, cicatrice obductum aut nimis humidum, sterilitas sequitur. *Inversum* enim glandi virili non opponitur, ut semen recta injiciatur in uterum, unde refrigeratur, atque adeo infœcundum fit: *induratum*

OS VTERI.

Situs.

Figura.

Conniventia perpetua. Aperitio eiusdem.

ratum vero non admittit glandem, nec ingressuro cedit: *exulceratum*, penis attactum refugit: *cicatrice si obductum sit*, obstruitur via semini: *humidum vero*, nimis laxatur, nec infulum semen retinet; nec bene clauditur. Sic quibus nimio coitu laxatum plus æquo apertum est, Hippocrate teste, lib. 1 de Morb. muliebr. non concipiunt. *Figura* ipsius si quando extra vulvam procidit aut invertitur, os tincæ piscis exacte refert. Ut enim illud, sic hoc oblongum est quando connivet.

UTERI tandem ^a FUNDVS sequitur, qui proprie *uterus* dicitur, cum omnium partium uterum constituentium nobilissima sit, & in cujus actionem omnes reliquæ conspirant. Vocatur & *Matrix*, quod matris officio fungatur, generando & fovendo foetum. Hæc elatissima uteri pars est, in suprema dicti osculi regione sita: cujus magnitudo omnibus æqualis non est. *Virginibus* enim quantumvis adultis nucem juglandem non multo excedit: non item *Vetulis*, quia exsiccata. *Mulieribus* autem & iis quæ virum expertæ sunt, præsertim si sæpius conceperint, amplior evadit: quemadmodum & iis quibus *mensæ effluunt*, cum eo tempore venæ omnes sanguine turgant. *Gravidis* contra in tantam assurgit molem, quanta pro commodo foetus habitaculo sufficiat. *Figura* cucurbitulæ Chirurgorum perquam similis, cum ex latiore fundo in angustum os coarctetur. Hanc tamen non semper servat, sed nonnihil in gravidis immutat, undique in rotundam sphaeram se conglobando, ex quo Galenus vesicæ urinariæ assimilabat. *Connecitur* fundus conterminis partibus, non tamen quavis sui sede, sed ad latera tantum; cum ante, retro, & supra se partem non habeat, cui adnascatur, sed liber sit, ut in coitu nunc ascendere ad superiora, nunc descendere versus inferiora queat.

Sunt autem *ligamenta* quatuor; ex quibus ^b duo superiora sunt, lata ac membranosa, à peritonæo enata, quibus ossis ilium lateribus uterus alligatur. Laxa sunt & mollia, ut cum utero dum gravidus est, & extendi & iterum, dum subsidet postea à foetu liberatus, contrahi possint. Deducunt hæc ^c vasa præparantia & ^d deferentia utero, quemadmodum & ^e testes continent: & quia lata admodum sunt, ab Aretæo vespertilionum alis fuere non inepte assimilata. Hæc ligamenta uteri fundum in suo loco detinent, ne à quavis causa inde dimoveatur; quemadmodum *videmus interdum ascendere*, & diaphragma ac hepar comprimendo suffocationis periculum inducere; nonnunquam prorsus *in sinum decidere*; interdum etiam una cum cervice, eaque inversa *extra pudendum propendere*; sæpe ad lumbos & coxas *declinare*. Neque vero dum uteri hunc fundum sic locum mutare dicimus, solum ipsum, sed uterum una cum testibus & vasis intelligimus. Et quamvis dubitatum sit à multis de hac re nostro seculo, quibus res visâ fuit risu potius, quam fide digna: merito tamen ridendi illi ipsi sunt potius, ut qui neque in Anatomicis quicquam, neque in rerum Natura experientia habeant. Revera enim multiplicem loci mutationem, non tantum in iis, quæ utero non gerunt: sed & in ipsis gravidis sæpenumero animadverti, ut vel propterea censcam, non frustra doctissimum *Hippocratem*, in libro de Mulierum morbis, tam crebram hujus morbi fecisse mentionem, tamque sollicite symptomata ipsius omnia assignasse. Nec *Plato* certe, quem divinum vulgo appellant, uterum frustra appellat animal vagabundum ac generandi avidum, quod passim per corpus oberrat, meatu aëris intercludit, respirare non finit, extremis denique vexat angustias, ac morbis omnibus premit. Male tamen propterea à Galeno, lib. vi de locis male affect. cap. v, reprehenditur, quasi animal quoddam statuerit; cum *Plato* eo loci per similitudinem loquatur, & cum de pene virili dixisset, animal esse veluti imperiosum, rationis expers, voluit idem de muliebri utero per comparisonem efferre. Uterus tamen per se non movetur; sed ab aliis trahitur, aut pellitur; idque fit, si præter modum distensus sit aqua vel mola aut (quod frequentissime evenit) copioso flatu: quoties Iecur nimium tumefactum ad sinistram partem protrudit, aut Lien ad dextram: intestina plena flatibus aut excrementis, antèrius vel deorsum. *Hystericus* autem affectus, meo iudicio, sic generatur: inflatur uterus & ligamenta ipsius à copiosis flatibus, pluribus de causis excitatis, unde sursum trahitur, & hepar ac diaphragma premit, sicque respirationem intercipit. Non tamen ideo gravidæ uteri præfocationem patiuntur, aut quando mola uterus distenditur. Vergit enim tunc potius pondere suo deorsum aut ad posteriora, & sic tantum intestina premit. At flatibus repletus, ob levitatem ascendit,

Connecitur.

Ligamenta superiora.

Uteri ascensio.

Uteri prolapsus.
Uteri inclinatio.
Alio intervallo loco motus generatur.

Hystericus affectus ut generatur.

ascendit, inter intestina se insinuat, & ventriculum ac diaphragma petit. Et hoc est quod Hippocrates dicit, vacuos & leves uteros facilius mulieribus ascendere & os earum intorqueri. ^a *Ligamenta inferiora*, processus sunt nervei, teretes, ac cavi. ^b Oriuntur a lateribus fundi uteri prope ^c vasa deferentia, quæ contingunt, ad inguinæque descendunt per ^d productiones peritonæi (de quibus jam actum est) ac supra pubis os in latam ac nerveam excitatæ degenerant, cui Clitoris alligatur: reliqua pars usque ad genu postea in interni femoris membranam excurrit. Hujusmodi ligamenta in inguine infra supraque glandulis fulciuntur, ut propterea huc nonnullis, cum concava sint, excrementitiosi uteri humores transferre videantur. Ego quoque anno supra millesimum sexcentissimum vigesimo, pridie Nonarum Februarii, fœminam Patavii aperui, quæ à nimio coitu mortua dicebatur, reperique ligamenta hæc, qua parte vicina sunt utero, plena semine fuisset.

Substantia uteri ex plurimis constat membranis, iisque nervis, infinitos tubulos amploque vicinos constitutentibus, quæ anfractuoso transitu invicem coherent. Facile hi comparant in utero gravidæ, cum omnia distensa sunt: in at non prægnante, dum membranae sunt corruptæ & contractæ, nec foramina hæc conspicua sunt, nec tubuli: ipsa quoque substantia dura est; ut in illa, mollis. Vtunque autem plures sint membranae, omnes tamen à duabus tantum conteguntur; una, externa, quam à peritonæo deducunt anatores periti; altera vero, interna. *Externa*, lubrica est ac levis, nisi qua sede intrant vasa spermatica aut exeunt ligamenta; omnium tamen quæ à peritonæo oriuntur, crassissima. *Interna* vero, plena meatibus exiguis, maxime sub fundo ea sede, qua uterus tegit intestinum rectum. Meatus hi ubi mulier à mensibus purgationibus vacat, vix conspicui sunt: quo tempore vero laborat, evidentes fiunt: quippe cum per hos purgetur menstrualis sanguis ex corpore. Hos Veteres venarum arteriarumque ora crediderunt, & quia in utero ovillo, tum etiam vaccino (quem propterea velim thryones ante humani uteri dissectionem inspicant) cavitatem habent instar acetabuli (est hoc mensuræ genus, quo acetum antiquitus vendebatur) idcirco *κευλιδένους* appellaverunt, nec modo in prædictis quadrupedum uteris, sed etiam in muliebri. Cæterum, fundi externa superficies superne ad latera obtusos duos emittit *processus*, qui in non gravidis prominentes illas nonnihil exprimunt, quæ in vitulis conspiciuntur, ubi primum cornua erumpunt, quos ideo Diocles *μεγαλίας*. Cornua uteri vocavit, sed in prægnante uteri forma in vesicæ figuram mutata pereunt.

¹ *Cavitate* habet si dissectetur unicam; in qua *nullo* observantur *cellule*, quas quidam sibi finxerunt, decepti fortassis libro de anatomæ parva, qui male ad Galeum auctor-
re fertur, cum spuris sit: beneficio tamen ² *lineæ*, futuram referentis secundum lon-
gitudinem in dextram sinistramque partem dividitur. Est autem exigua admodum
hæc cavitas & vix vulgaris fabæ magnitudine, ut facile tota repleatur in coitu, cum
etiam in quolibet feminis minimo formatrix vis univerfa lateat.

Habet tandem uterus ² *Vafa* omnis generis, quæ exterius uterum ingrediuntur, & diligenter consideranda sunt, ut rationem multorum affectuum liceat reddere, qui ob consensum uteri enascuntur. Sunt enim vasa insignia & frequentia, præsertim Venæ, quæ arteriis multo majores à Cava originem trahunt, ut cum universo corpore propterea uterus consortium habeat. Oriuntur hæc à duplici ramo ex utroquelatere, uno præparantium vasorum, altero hypogastricæ. *Vena, quæ à præparantibus* oritur, à superioribus descendit, & per universum uterum dispergitur, maxime tamen per fundum, & cum utrinque implantetur, dextræ cum sinistris per anastomoses invicem copulantur. Altera, *quæ à ramo hypogastrico* mittitur, ab inferioribus ascendit, & partim per cervicem, partim per fundum disseminatur. Ex his quæ ab hypogastrico ramo procedunt, majores sunt iis, quæ à præparantibus descendunt; utraque autem per ipsam substantiam uteri disperguntur, multis intus unitæ anastomosis. Per illas putant nonnulli menses fluere, cum forte gravidis procedunt, quod credant ex uteri fundo nihil his egredi posse, persuasi autoritate Hippocratis, qui os uteri gravidis clausum, lib. v, Aphor. LI, pronunciat. At illi mihi non recte intellexisse videntur, cum eo aphorismo sic inquit, *ἡσυχὰς ἐν γαστρὶ ἔχειν, τὰς αἰσὰς δὲ εἰς τὰ ὑπεράνω συσπόμεναι*, hoc est, ut ego vertendum censeo, *quæ uterum ferunt, iis os uteri committere; συσπόμεναι* enim non significat (ut ipsi

Per quæ uterum gravidis menses fluunt.

K k 2

ficæ cervicem inferi, sed ne ad cervicem quidem uteri pervenire. Quod si aliquando Laurentius invenit, lufum Naturæ fuisse credimus, nec inde quid universale aſtruedum, quomodo Natura tum in his nonnunquam locis, tum in præparantibus vafis & renibus, ac vena fine pari & aliis ludere confuevit.

Est & aliud vas, quod ^a CÆCUM, quia unicum tantum habet orificium; & à Fallopio inventore, qui Tubæ extremo orificio aſſimilavit, *Tuba Falopiana* dicitur, non ſecus utero ac inteſtinum cæcum colo connexum. Hoc à cornibus fundi oritur, ſurſumque oblique è teſtium regione fertur, ſuſſultum ligamento membraneo ſuperiore uteri, ſicque teſtes circumdat, nec tamen aut ab iis naſcitur, aut ipſis ullo modo inferitur, quemadmodum nec vas apparet, quod huc à teſtibus perveniat. Pervium hoc eſt ab ortu ſuo circa fundum uteri: at in fine cæcum clauſumque.

C A P V T XXII.

Traditur actio & uſus ſingularum partium, quæ ad genitalia mulierum referuntur.



VENIADMODVM partes, quæ in Viro generationi famulantur, eo omnes conſpirant, ut ſæcundum beneque elaboratum ſemen opportune in uterum conſociatur: ita quæ ſœmineo ſexui tributæ ſunt, ad hominis procreationem omnes tanquam ſummum ultimumque ſcopum collimant. Sed ut illa actio non ita ſimplex eſt & unica, quin alias ſub ſe comprehendat, cum ſemen neutiquam expelli poſſit, niſi prius generetur; nec generari, niſi materia aliunde accedat: ſic ad hominis generationem, quæ fit in utero, complura concurrant neceſſe eſt, ut adeo ſolertiſſimus noſtri corporis Architectus, non temere tot partes in ſequiore ſexu conſtruxerit, quæ humanæ ſocietatis propagationi inſervirent. Primum namque ut generetur fœtus, ſeminis utriuſque conceptio requiritur; deinde ejuſdem conſervatio; hinc opportuna maturatio; ac tandem in fœtum redacti excluſio. Recipi ſemen non poteſt, niſi injiciatur in uterum: injici autem nequit, niſi per coitum; qui ut fiat, rigiditas utriuſque membri & inſignis quædam voluptas requiritur, cum Homo omnium animalium ſapientiſſimum ad ſœditatem coitus, niſi maxima delectatione quaſi compulſus, nunquam deſcenderet.

Actio partium genitalium, quæ ſunt in ſeminis.

Sed videamus nunc quam ſapienter omnes quas expoſuimus partes, his actionibus inſerviant. Primum enim ſe offert forinſecus *pudendum*, quod ex labiis, nymphis, carunculis myrtiformibus, & clitoride conſtruitur: tum *cervix* & *osculum internum*, quæ omnia ad delectationem vel utriuſque, vel certe alterutrius ſexus mirifice faciunt. Hæ enim partes cum ex ſubſtantia quadam ſpongioſa effictæ ſint, præcipueque Cervix & Clitoris, non ſecus ac penis, ita omnes in coitu eriguntur & intumeſcunt. Labia ergo, *nymphae*, ac *myrtiformes carunculae*, dum inſtantur valide penem amplectuntur & premunt, præſertim in juvenculis, unde Viro inſignis voluptas accedit. Clitoris vero, cujus propria actio eſt erectio, ſœminis præcipuum titillationis eſt instrumentum, unde laſcipientibus indurari & prominere ſolet. Erecta autem ſic pubi virili opponitur, à qua cum concutitur in coitu, uterum movet & ſemen quod paulo remotius eſt, in ſuis receptaculis excitat prolicitque. Inde rationem licet haud difficulter petere, quam propter ſitum circa pubis oſſa obtineat & ſubſtantiam eandem cum pene, tum arterias venasque majores, quam ſui corporis ratio exigebat: nervos quoque inſigniores & frequentiores. Cervix autem & *osculum internum*, utrique ſexui voluptatem conſert, & illius quidem actio ſimiliter erectio eſt; hujus, apertio. Erigi enim conveniebat, ut & prompte exciperet penem, cum in corrugatam recta via non penetraſſet, & exceptum commode amplecteretur. Vndique ergo penem ſtringit, & ſecundum omnes ipſius dimensiones ſeſe erigit, ſicque brevi occurrit, longo cedit, craſſo dilatatur, tenui conſtringitur. Natura enim ita omnibus penis differentiis conſultuit, ut non opus ſit ſollicitè vaginam cultello æquam quærere, ſed ubique Opificis beneficio inveniat. Id quoque utilitatis hæc ratio attulit, ut dum flacceſcit penis, cum eodem cervix hæc concidat, ſicque uteri oſculum dum extrahitur, non refrigeretur. Fit autem hæc erectio eodem modo, ut in pene, repletionem; quia tum ſubſtantia ſic adaptata eſt, ut prompte ſpiritus

Pudendum.

Cervix internum &c.

exciat copiosos, & arteriis tam copiosis ac grandibus referta, ut plurima materia suppedietur. Os quoque *uteri internum dum inflatur* aperitur, ut glandem penis in se recipiat, quam stringendo, cum in Viro potissima sit voluptatis sedes, immensam delectationem exhibet. Sed & ipsis feminis voluptatem affert, quod norunt nonnulli, qui certo quodam situ mulieris in coitu (quem aperire quamvis honestus sit, multis de causis hic nolumus) membrum ad uteri orificium intimius protrudunt, unde semen uterum semenque proritant, qui coeundi modus dignissimus est ut ab iis observetur maritis, qui sobolis gratia matrimonium iniere, ceterum conjuges habent ad Venerem & seminis ejectionem tardiusculas. At enim hæ partes ubi libidine non turgent, colapsæ in se omnes resident prohibentque, quo minus aer externus ad uteri fundum penetret. Et *labia* quidem, rimam magnam: *nympha*, externum uteri osculum claudunt: *cervix* autem in se concidit, & quemadmodum penis flaccidus reſtitutionem non observat, sic ipsa flaccida incurvatur. *Osculum* autem *et ipsum internum*, præsertim dum conceperint, ita stringitur, ut vix specillum tenue primis gestationis mensibus admittat. Hoc officio & membrana ipsa fungitur, quam *hymenem* vocari diximus, quæ in virginibus externo osculo à Natura præfixa est.

Atque hæ sunt partes, quæ seminis virilis ejectionem, penisque amplexum adjuvant: sunt & alix, quæ muliebris expulſioni inserviunt. At enim cum id prius ex sanguine & spiritibus vitalibus elaborandum fuerit in testibus, elaboratum deinde detinendum, donec opportuno tempore in uterum porrigeretur, à Venis & Arteriis præparantibus idonea materia defertur ad testes, sed brevior longe ductu quam in Viris; quod minus coctionis requirebat, ut liquidius ipsum sit & frigidius. Antequam autem inferantur in testes, *capreolorum instar torquentur inter se*, quo longiora nonnihil fierent, quamvis & hoc ipso modo prudentissime seminis præparationi Natura providit. Nam cum præparantia vasa in duos diducantur ramos, quorum alter ad uterum tendit, alter ad testes: illeque tempore gestationis uteri aut mensium ad insignem magnitudinem excrescat, ne impetu quodam magna copia sanguis in testes irrueret, capreolaribus his vasorum præparantium ductibus efficit, ut materia femini conficiendo destinata sensim & paulatim testem ingrederetur. Testes autem *una tantum* circumdedit *membrana*, quod extra corpus non propenderent, ut Viris; quibus contra externas injurias muniendi erant. *Deferentia* autem *vasa brevia sunt et lata*, ut cito ad uterum feratur, quod minus mobile sua natura videbatur. Comportatum in uterum semen retineri debuit, unde *interior superficies aspera* facta est, cui adhæreat semen, & osculum validdissime statim à coitu concluditur.

Facta conceptione, foetus alimento pro nutritione & augmento egebat, unde magna *vasorum copia* uterum accedit, & *cotyledones* in uterum pertusi sunt, quibus cum placentæ carnes vasa coherant. Vbi jam conceptus augendi tempus adest, nullum in utero obstaculum est, quo non possit in magnam molem excrescere, cum *ex membrana* constet, quæ in immensum dilatari potest. Iam cum foetus ad maturitatem pervenerit, exitum sibi quærens non difficulter invenit vias aptissimas admodum, latas & amplas, cum & cervix ex membrana constructa sit, quæ mirifice dilatari potest. Ipsum autem *puerum* ne sua angustia obstare posset, cum undique cute densa, & non valde dilatabili sit circumcirca in extremitatibus & labiis obvallata, fecit *multo grandius, quam est cervicis*, qui penem admittit, amplitudo, quam per fissuram claudi voluit labiis, ne frigidus aer ad uterum posset penetrare. Ipsi quin etiam uteri fundo *fibras* dedit omnis generis, ut in partu vel mensuris fluxionibus expelleret foetum vel sanguinem: in conceptione seminis vel retentione se constringeret. Reliquos usus & Galenus ac ceteri diligentissime persequuti sunt, & facillime à quovis possunt indagari, cum sapientissima Natura non ita obscura hæc nostro intellectui esse voluerit, si quis animum saltem velit advertere.

CAPUT XXIII.

Exponit differentias, quæ in partibus genitalibus gravida, & ejus quæ utero non gerit, observantur.

QUAM partes generationi famulantes in iis, quæ utero gerunt, nonnihil immutentur, cujus cognitio non tantum mirifice animum delectat eorum, qui Naturæ opera sollicitè inquirunt: sed & ad Medicinam feliciter faciendam plurimum adfert auxilii; visum est nunc ea subicere, quæ in plurimum gravidarum dissectionibus sæpe à nobis sunt animadverta. Ac in *pudendis* quidem nihil unquam reperi discriminis eo tempore, quo gerunt adhuc: cæterum ubi vel tempus pariendi instat aut abortus eveniat pluries notavi, pudendi labia à sanguine ad illas partes confluente nonnihil tumefacta fuisse. Interdum supervenit inflammatio, ex qua mater cum foetu non leve periculum tulere. Accidunt hi tumores Venis & Arteriis hypogastricis compressis, dum uterus sua mole ad inferiora ruit, unde sanguinis aliorumque, quibus abundant, humorum ad contermina loca affluxio excitatur.

Cervix quoque insigniter abbreviatur, ut haud difficile sit uteri os digito attingere, præsertim si pedibus gravidæ insistant. Vtero enim in omnem dimensionem aucto, nonnihil de longitudine cervicis demitur: premente etiã ob molem, cervix aliquantulum subsidere cogitur. Non inepte igitur à quibudam dubitatum mihi videtur, sitne proficuum nocuisse coitus, qui ultimis mensibus exercetur; cum prompte ob brevitate cervicis, ad interiora usque uteri penis penetret, præsertim aperto osculo, dum voluptuoso tangitur impulsu, unde discrimen est, ne rumpantur membranæ. Contra foemina plurimum commendant coitum, partumque (si frequentior sit extremis mensibus) facilitari asserunt, dilatari os cervicis, & lubricari semine, quod ipsæ præ omnibus unguentis & oleis emollientibus aut laxantibus velint adhibitum. Ego tamen, cum experientia probeat esse proficuum, ut admittam: ita nihil temere agendum esse censeam, si mulier staturæ parvæ sit, primum gerat foetum, dolores lumborum aliquoties passa fuerit, aut antea sine manifesta causâ facile abortierit.

Os uteri Veteri os interius gravidis hiat, tantoque magis, quanto sunt partui viciniore, quidquid etiam alii crepent ex Hippocrate, cum ipsi (ut demonstravimus) nec rectè Hippocratem intelligant, neque experientiam, quæ Veterum scriptorum, in primis autem divini Hippocratis fidelissimus est interpres, consulant. Ego vero non tantum centies id tetigi, sed & obstetrices investigare docui, ut cognoscerent revera gravidæ essent mulieres, an molam tantum gererent, cum facile digito id explorare liceat. Docui quoque easdem, cum tempore partus maxime hiet, investigare, foetusne versus terram capite sit convolutus, an proprium adhuc situm teneat, ex quo colligant jam jam instare partum, aut longius adhuc abesse. Vidi enim in hac re gravissimos fuisse sæpius commissos errores, quod cum primum obstetrices os uteri hiare percepissent, gravidas fellæ imposuerint, & ad conatus parturientium adegerint. Quæ res quantum afferat incommodi, quis peritor ex se prompte noverit, cum uteri osculum refrigeretur, maximeque si hyems sit, unde foetus tenellus adhuc ab aëre non mediocriter læditur. Veteri autem osculum hoc cum hiet in gravidis, obturatur crassa & lenta materia, quam quidem ego semper statui esse seminalem. Servit hæc mucosa substantia, primo ut aërem externum ne ingrediatur in uterum impediat, cum & substantia sua status generando, & frigore plurimum nocere possit: deinde, ut visciditate partus tempore, uteri sinum & pudendum lubricet.

Cæterum ipse *uterus*, dum gerunt, plurimum variat. Nam *magnitudinem* quod spectat, in immensum semper crescit: neūtiqum tamen semper æqualis est, sed ratione sexus & numeri ipsorum foetuum, major vel minor observatur. Foemineus enim, majorem reddit quam masculus; & gemelli aut tergemini, quam foetus singularis. *Figura* quoque non amplius cucurbitulæ medicæ, sed velicæ potius, flatibus aut urina distentæ assimilatur: *situs* autem in medio est ut plurimum, nisi vicus aliquod auctum ex morbo, in alterutrum latus compellat. Ultimis tamen mensibus antequam sic devolvitur, ut ipsum

ipsum peritonæum attingat, omento & intestinis cedentibus versus posteriora. Primis enim versus superiora adigit, & simul ventriculū ac eam colī intestini partem, quæ ventriculo subjacet premit; unde vomitus accidunt, & naturales facultates languent. Substantia autem & tunica uteri, statim ac concepit mulier, crassior fit ac mollior, ut falsum sit quod à nonnullis proditum est, quo magis distenditur, tanto fieri tenuiorem, cum postremis mensibus duorum pæne digitorum crassitiem, maxime circa superiorem fundi partem, cui placenta carnea adnectitur, adæquet. Constat enim uteri substantia ex pluribus nervaceis membranīs, inter quas obliquo ductu procedunt Venæ & Arteriæ, exiguis ramulis sanguine repletis, sic ut substantia intumescat à repletis ejus spatiosis sanguine, quæ rursus corrugatur à partu brevi spatio, ut sedecim dierum intervallo ad naturalem fere magnitudinem redeat.

Vasa preparantia.

Vasa preparantia sunt multo majora, quam in non gravidis, cum per ea nutriatur infans. Minores tamen sunt Arteriæ, quam Venæ, quæ nonnunquam ad minimi digiti crassitiem elewantur.

Testes.

Testes & Vasa deferentia una cum cecis, quod sciam, non mutantur.

Ligamenta.

Ligamenta autem uteri inferiora, sextuplo crassiora videntur, quam in non gravidis, ob sanguinem. Sinus horum ligamentorum implentur, non secus ac alterius uteri substantiæ, cum qua habent similitudinem, cum cava sint, sinuosa, membranosa & mollia.

FINIS LIBRI OCTAVI.



DE HUMANI CORPORIS FABRICA.

LIBER NONVS.

Qui medii ventris historiam complectitur.

CAPVT I.

De quatuor communibus medii ventris integumentis.

VEMADMODVM imus venter iis partibus ab immenso nostri corporis Architecto destinatus est, quarum beneficio non tantum calorem indefinenter effluentem : sed etiam seipsum in nova sobole Homo quam diutissime saluum integrumque præstaret : sic medium, de quo nunc dicturi sumus, iis dedicavit partibus, quæ idem calidum fovere, per corpus digere, ac si quando calor superet, circumfusi aëris frigiditate attemperare queat. Venter hic inter supremum imumque *situs* est ; ab illo cervice, ab hoc diaphragmate separatus ; *anterior* osse pectoris & cartilaginibus : *ad latus*, costis ; *posterius* au-

MEDIVS
VENTER

Situs.

Figura.

Substantia.

Partes.

Contenta.

Communes.

Propria.

tem, vertebris scapulisque circumseptus. Voluit enim prudens Natura ut medium obtineret locum, quo calidum illud omnia permeans vitæ perfundens, per uniuersum corpus æqualiter distribueretur. *Figuram* nactus est ovalem, ante retroque nonnihil depressam ; cuius substantia, neque ossea tota facta est, neque carnea : sed partim osse constat, partim carne, ut & motu esset præditus, nec tamen mollitie in se concideret.

Cæterum cum plures coërceat partes, eas omnes opportune meo iudicio, similiter ut superius imi ventris, in duos dividemus ordines, continentium scilicet, contentarumque. Voco *continentes*, quæcunque exterius sunt, & reliquas includunt : hæcque iterum communes, vel proprias facio ; cum nonnullæ cæteris quoque Ventribus, quædam huic tantum convenient. *Communium* sunt quatuor ; cuticula, cutis, pinguedo, membrana carnosa, eadem qua recensuimus serie invicem incumbentes. *At propriarum* plures numerantur, primumque mammæ utriusque sexus, quæ anteriorem sedem in pectore occupant ; deinde muscoli, quorum bene magnus est numerus, partim ante retroque, partim inter ipsas costas sitorum. Hinc membrana duplex ; quarum altera totum ventrem fuccingit, ut pleura ; altera bifariam dirimit, ut mediastinum : post hæc ossa, quæ vel antè iacent, ut sternum, sive pectoris os, & duæ Claviculæ, utrinque una, in elatiore sede ; vel ad latera, ut duodecim costæ ; vel posterius, quemadmodum scapulæ & vertebræ. Tandem sunt cartilaginee, quæ septem illas costas, quas veras vocari diximus, sterno adnectunt, & reliquas quinque spurias sive jungunt inter se, sive efformant. Cæterum *contentarum partium* duæ sunt duntaxat, Cor scilicet & Pulmo ; & *ad Cor* quidem *Capſula* pertinet, Pericardium dicta, quæ humorem quandam serosum continet : *ad Pulmones* autem, aspera arteria. De harum quibusdam antea diximus, puta de musculis, libro quarto : de ossibus, secundo : de cartilaginibus, tertio. De communibus quoque integumentis abunde quædam exsecuti sumus superiori libro : quamobrem cum nolimus fastidiose hic ruminare eadem, non nisi quo pacto ratione ventrium differant, leviter attingemus.

Cuticula ergo & *cutis* ab infimi ventris cuticula cuteque in eo differunt, quod sub alis & in quibusdam etiam paulo supra cordis scrobiculum, cui ventriculi superius orificium subjacet, pilosa est : dorsi autem cutis, durior multo ac densior, unde & pilis vacat ; sensum tamen habet acutissimum, tum ob nervos, qui eo frequentes appellant ex posterioribus nervorum dorsalis spinæ furculis ; tum ob musculos thoracem moventes subiectos, qui tendinosi, adeoque admodum sensibiles sunt.

Cuticula.
Cutis.

Pinguedo

Pinguedo.

Pinguedo hic multo minore copia, quam in abdomine cernitur, quod nec opus fuerit ita defendere calorem, ut in imo Ventre viscerum, & plurimum impediendi attulisset Thoracis continuo motui. Ipsa autem pinguedo cum alias alba sit, in thorace flavior nonnihil apparere solet, forte propter tenuiorem & calidiorem sanguinem, ex quo fit, & majorem concoquentem inibi calorem.

Carnosa membrana.

Cæterum *carnosa membrana* nihil peculiare obtinet, nisi quod circa colli anteriorem regionem carnosior esse videatur & musculi naturam assumere, ubi quadratus ille musculus efformatur, qui detrahit buccas & labia.

CAPUT II.

De mammis utriusque sexus.

MAMMÆ.



AMMILLARVM externas partes, earumque appellationes libro primo copiose tradidimus, ut operæ pretium non videatur eas denuo hic repetere. Nunc quæ substantiam, figuram, magnitudinem, aliaque partibus organicis necessaria concernunt, breviter exsequemur, dum prius monuerimus, Mammæ utrique sexui communes quidem, at sequiori tamen in primis convenire, propriasque velut esse, cum in masculis similitudinis potius quamdam rationem, quam ipsam rem videantur exprimere. Et hoc illud est, cur à Latinis nomine diminutivo in *Viris*, adeoque *mammilla* vocentur: in *mulieribus* autem, *mammæ*. His enim propter alendum nuper natum foetum concessæ sunt; illis usum fere nullum, aut certe minimi admodum momenti præstant. Id tamen observatum est à nobis sæpius, si quibus viris paulo majores contingere, eosdem frigidiore sua natura fuisse, & adeo depili pectore, ut propterea mihi persuaserim, consilio certo id à summo Conditore obtigisse, qui hoc quasi tegumento calorem cordis exiguum fovere ac conservare voluit.

Mammillæ virorum.

Insident autem *Viris* similiter ac *Mulieribus* pectorali humerum adducente musculo, numeroque duæ sunt; at non attolluntur, cum glandulis careant; nec lac generant, cum foetum non alant. Quod si quid lacti simile interdum in ipsis visum est, ut testem habemus Arist. lib. 1 Hist. de animal. cap. xi 1, id humor fuit albus & prorsus ad alendum inutilis. Constant ergo tantum ex cute, membrana carnosa, papillis in centro, & pinguedine, quæ quoties prominent totam quasi magnitudinem ipsis largitur. At *feminarum*, non ex his tantum conficiuntur, sed & ex vas, & imprimis glandulis pluribus ac candidis, thoracis musculis adhaerentibus, quibus omnibus in medio una superjecta est majuscula, in ipso quasi cæterarum centro, & sub ipsa papilla consistens. His innumera vasa intertexta sunt omnis generis, venæ inquam, arteriæ & nervi, circa quæ alia quædam consistunt veluti canales quidam, candida, & ab inferiore parte toto ambitu enata, quæ in mamillarum centro semper angustiora facta coeunt, in quibus lac confectum in glandulis ad usum asservatur. Vocamus hæc vasa *candidos lactis tubulos*, vel, si magis hæc appellatio alicui arrideat, *lactiferas venas*. Venæ autem ipsæ duplices sunt, externæ & internæ: ille, à ^a ramo axillari profiscuntur, & ^b Thoracicæ superiores vocantur, quæ

Canales lactiferi. Vasa. Venæ.

Arteriæ.

libro quinto, & ^d Mammaria vocantur, quæ recta ad latera sterni sive ossis pectoris utrinque una descendunt, & ubi ad mucronatam cartilaginem pervenerint, thoracem egrediuntur, deorsumque per rectorum musculorum internam faciem procedunt, donec fere ad umbilici regionem appulerunt, ubi pluribus ^e anastomosibus cum ^f epigastricis venis ibidem obviæ factis uniuntur coeuntque. Oriuntur autem ^g Epigastricæ venæ ab ^h externo ramo Iliaco, rectaque per eosdem musculos ascendunt, & quia ab eodem ramo nascuntur à quo ⁱ hypogastricæ venæ, quæ ad cervicem uteri fundumque feruntur, fit ut in iis, quæ recentior enixæ sunt, in magnam attollantur molem & sæpe minimi digiti crassitiem adæquant. Arteriæ similiter ^k mammaria, sunt à ramis ^l subclaviis eodem pacto enatæ & distributæ, quibus eadem quoque ratione ^m Epigastricæ arteriæ ascendentes circa umbilicum ⁿ oculis suis conjunguntur. Cæterum ubi venæ arteriæque hæc mammaria in itinere versus inferiora ad intervallum quartæ quintæque costæ pervenerint, per medium spatium intercartilagineum, propagines quasdam emittunt,

emittunt, quæ per intercostales mûculos penetrantes, in *viris* quidem in mûculos pectori incumbentes; at in *feminis*, & in hos & similiter in mammarum glandulas infinitis furculis distribuuntur, diversosque veluti plexus efformant. Nervos quoque habent ortos à ^a quarto intercostali nervo ex thoracis medulla egresso, qui circa medium costæ mûsculum intercostalem perforans, in quatuor ramos divisus, postea in mûsculum pectoralem & per cutim disseminatur, crassiore ramo ^b papillam adeunte. Vasis his & glandulis *pinguedo copiosa* intertexta est ubivis, ut æqualitatem quandam mammis aspergat, unde quibus aut vi morbi ablata est aut vitio ætatis incrementis, iis flaccidæ marmæ turpiter dependent. Ipsa autem glandulosa substantia interna parte membranæ carnosæ superjecta est, cujus beneficio mûculo pectorali humerum adducenti adnectitur, extra vero à cute nonnihil crassiore tegitur.

In medio ipsarum ^c mammarum foris tanquam in centro ^d papilla consistit, corpus ^e teres, substantia constans fungosa & rara, aliquamultis foraminulis priore parte perforata, quæ à contactu affluente spiritu non secus ac penis virilis subito attollitur, mox iterum eo disperso flaccida subfidet. Exquisitissimo autem sensu prædita est, cuteque obducta tenuiore, sed nonnihil rugosa, magisque aspera, quam in aliis mammarum partibus. Cæterum ipsæ marmæ in humano genere *situm suum* in pectore five anteriore thoracis parte obtinent, cum cætera animantia rationis expertia vel in ventre, aut inter femora recondita habeant. Numero quoque duæ tantum sunt, & utrinque una, figura subrotunda, dimidiam sphæram conficientia, in quorum centro velut axis quædam papilla non indecore prominet. Magnitudo autem nec ætati cuivis, nec omni conditioni æqualis est. Puellis enim *antequam Veneris usus aptæ sunt*, præter papillas fere nihil apparet: ubi *pubescunt*, leviter attolluntur; cum vero *menfes primum erumpunt*, ad duos fere transversos digitos excrescunt. Rursus *Virginibus jam viro aptis*, in eam elewantur magnitudinem, ut manu opportune contegant: *mulieribus* autem, *dum utero gerunt*, una cum utero & foetu augmentur. *Quæ obesa sunt*, iis quoque ob pinguedinem in majorem molem, quam naturæ leges ferunt, elewantur.

Ufus mammarum maxime necessarius est, cum infanti postquam ex utero in lucem prodit, commodum alimentum præparet suppeditetque. Perquam enim à Naturæ admirabili in aliis providentia alienum erat, si quem tot mensibus in utero per umbilicales venas materno sanguine, adeoque alimento concoctu minime difficili nutruisset, editum protinus ad solidos duxisset cibos, quos neque confecisset unquam, & tam gravi mutatione derepente facta graviter offensus fuisset. Quare haud dissimile ab illo præparavit, & ex eadem materia; sed multo, quia per os ad ventriculum gustatus sensu donatam partem deducendum erat, dulcius jucundiusque. Tale lac est, quod ex sanguine ab utero resfluente in mammis generatur, & omnes optimi alimenti conditiones obtinet, cum & palato arrideat, facile à ventriculo coquatur, & quam citissime ac optime nutriat.

Videamus autem quanta solertia ipsa clementissima Parens usa sit, & quam opportunam fabricam mammis ad hoc munus exsequendum largita fuerit. Primo, ex glandulosa *substantia* extruxit, qua nihil ad coctionem omnibus numeris absolutam magis idoneum est: nec tamen unam tantum glandulam esse voluit, sed plures, ut tanto perfectius in pluribus conficeretur; imo ne abscessu ex lactis concretionem oborto mox periculum esset non amplius fruendi beneficio istius marmæ. His intertextuit *vasa*, Venas & Arterias, quæ canales sunt materiam advehentes, & quidem non quamvis, sed sanguinem; nec undecunque, sed ab Vtero, ut eodem prorsus nutriretur alimento, quo antea cum adhuc obscuris alvi carceribus includeretur. Sanguis hic non tantum venosus est, sed & arteriosus, quo nobilius sit ipsum alimentum & infanti à matre vita quasi spiritusque infunderentur. Sanguis autem hic ad mammas non solum sua sponte affluit, & quidem eo statim tempore, quo foetus jam plane absolutus est: sed multo copiosior postea, tum trahente suctu infante, tum pellente utero inutilem illam copiam, affluente adhuc semper aliquid etiam foetu edito ob consuetudinem. Postquam ergo venas omnes impleverit, à glandulis, per quas magno numero pluribusque plexibus sparæ sunt, conficitur: confectus postea transfertur ad canales lactiferos, in quibus ad usum tanquam in penuario quodam asservatur.

æquali inter se spatio distinctæ distribuuntur: Venæ tamen & Arteriæ per totam costam non excurrunt, sed cum ossea parte terminantur: ne tamen intercostalia spatia vasis destituantur, eo à mammariis furculi secundum longitudinem seriatim enati digeruntur. Quia autem plurima hæc vasa sunt, propterea & frequentis admodum membranæ hujus inflammatio nascitur, quæ à Medicis Pleuritidis nomen ab affecta parte accepit. Neque tamen inter pleuram tantum & musculos intercostales, quos una cum costis pleura succingit, si quando inflammatio hæc in abscessum versa fuerit, pus ipsum coacervatur: sed pluries fere inter duplicaturam hujus membranæ, per quam vasa incedunt, & qua stabiliuntur.

Figuram ergo Thoracis quoque habet, hoc est, variam: *superius*, angustam nonnihil; *inferius*, latam; latiore adhuc à *lateralibus*; *foris*, gibbam; *intus*, cavam. *Superficiem* autem *interiorem* lævem, ne pulmonibus asperitate incommodet: *exteriolem* asperam, ut validius alligetur. Illa etiam aquoso humore semper illita est, qui nascitur ex vaporibus elevatis à sanguine, & postea condensatis respectiva hujus membranæ frigiditate. Prodeunt tamen ab ipsa nervæ quædam fibræ, quibus pulmo pleuræ alligatur, quæ si nimis strictæ sint, cum pulmo libere moveri non possit, Dyspnœam perpetuam, eamque incurabilem inferit. *Magnitudo* quoque thoracis internæ magnitudini respondet, quemadmodum peritonæum, tum viscera & vasa. *Foramina* quoque sunt complura. *Superne* quidem, ut transitum largiatur venæ cavæ & arteriæ magnæ, tum gulæ, asperæ arteriæ, ac nervi sexti paris: *inferius*, qua diaphragma tegit, terna, adeoque totidem ac ipsum diaphragma, habent, eodemque modo posita: unum, pro vena cava; alterum, pro gula; tertium, pro magna arteria. Cæterum ipsius *exortum* à meningibus cerebri spinalem medullam investientibus quamplurimi dissectionum procures repetunt: hæ enim cum nervis in thorace deductæ & latefcentes, in pleuram degenerare videntur.

Vfus autem ipsius similis est usui peritonæi, ut scilicet tegat & alliget tum totum medium ventrem, tum viscera & vasa. Huic usui quomodo Natura solertissima satisfecerit, & quam opportunam substantiam, figuram, magnitudinemque concesserit, promptum erit cuivis per se videre, cum nihil facilius sit quam in laudes Naturæ excurrere, ut ille ajebat de Hercule; cum iis immensa hæc rerum machina tota plena & perfusa sit.

CAPUT IV.

De Mediastino, sive membranæ cavitate thoracis intersipientibus.

ALTERA membrana, quæ in medio ventre reperitur, ab illa jam dicta pronascitur. Cum enim primum pleura à nervis circa dorsum vertebra exorta est, ad sternum per latera contendit, indeque iterum ab hoc versus spinam per medium longitudinis thoracis ad principium redit. Ut ergo pleura medium ventrem totum intus succingebat: sic hæc secunda interstinguit, & in dextram sinistramque partem sive cavitate dirimit. Hinc nomen accepit, ut à Græcis *ἡ μεστέριον*, membrana intersipiens; à Latinis autem, *Mediastinum*, quasi quod per medium stet, appellatur. Vera tamen membrana una non est; sed duæ potius: nec quemadmodum pleura, ob duplicationem; sed quia distinctæ duæ sunt, adeoque una dextra, altera sinistra. Sunt autem secundum longitudinem Vertebrarum dorsum continguæ; at circa sternum, pro ipsius latitudine, à se invicem distantes. Quod si ut sæpe accidit, circa hanc partem inflammatio oboriatur, eadem quæ in pleuritide, contingunt symptomata, & febris ac dolores acuti nascuntur & pungentes ægrum, non tamen in latere, ut in vera pleuritide; sed in parte pectoris anteriore, qua sternum est. Hæc materia si suppuretur forte, perforatione facta in sternum vel spatio cartilagineo, facili negotio evacuetur. Sed & hoc loco iis, qui Chirurgiæ operam navant, notandum est, fieri posse ut vulnus in hac parte transversum factum, propter hanc cavitate videatur profundissimum, imponatque Medicis, quod sæpe vidi, credentibus penetrare ad pulmonem, cum tamen in hanc duntaxat pertingat cavitate. Quare caute hic agendum, accurateque videndum est, ne præcipiti prognostico sese attemque suam quisque prostituat. *Substantia* ergo Mediastini membranæ est, sed pleura tenuior molliorque; cujus *superficies exterior*, qua pulmones spectat, lævis, *superficies* multoque

Magnitudo.
Vas.

Vfus.
1.

2.

3.

multoque interdum adipe circa vasa perfusa: interior, aspera propter fibras, quibus membranæ junguntur. Magnitudo autem ipsius tanta est, ut à jugulo usque ad diaphragma, & à vertebra ad os thoracis pertingat. Venas habet & arterias exiles, à mammariis & à vena sine pari. Præterea venam aliam, quam Mediastinam supra ideo vocavimus, quod in hanc membranam tota absumatur. Oritur hæc à subclavii rami inferiore sede, interdum etiam ex ipso trunco ascendente antequam ad jugulum dividatur; ac modo vena una est crassa satis, quæ secundum utriusque membranæ longitudinem cum nervo ad Diaphragma abeunte supra pericardium descendit, per mediastinum dispersa; modo propagines duæ, quæ per mediastinum deferuntur. Nervi quoque sunt Stomachici dicti, qui in duplicatura hac mediastini feruntur. Vfus ipsius est, ut non modo dextram thoracis cavitatem à sinistra dividat; sed & ut pericardium, in quo cor continetur, sursum suspensum detineat, ne vel ad spinam concidat, dum supini jacemus; vel anteriùs procumbat, dum versus terram flectimur; aut ad alterutrum latus provolvatur, dum dormientes ipsis innitimur. Præterea vasis quibusdam tutum iter præparat, prohibetque cum pulmones repleti multo aëre totam cavitatem replent, ne pars pulmonis dextra ad sinistram pertingat & premat, quod Natura hoc intersepimento facile cavit, quod non osseum nec cartilagineum factum est, sed membraneum, ut aliquo pacto cederet, nec duritie pulmones offenderet, si quando ultra consuetudinem pulmones extenderentur.

C A P V T V.

De Pericardio, & humore in ipso contento.

Synonyma.



LERTIA membrana est, quæ περιάρδιον dicitur, quod περι τὴν καρδίαν posita sit, hoc est, circa cor, unde & interdum περιάρδιον χρίον à Græcis nominatur. Hippocrates vocat καρδίαν, five τριγιναν: at Aristoteles περιάρδιον πικρὸν καὶ παχύν, membranam pinguem & crassam. Latini ut plurimum Græcam appellationem retinent, vocantes pericardium: alii quam optime cordis involucrium, capsulam, aut indumentum indignant. Membrana enim est ampla, universum cor involvens, à Mediastino producta: vel potius, si primam inde originem repetas à qua & ipsum Mediastinum nascitur, à pleura, cui parte anteriore & posteriore necitur: at inferius, diaphragmatis circulo nervo tam valide, ut citra dilacerationem separari haudquaquam possit. Magis autem ad sinistrum latus spectat, quam ad dextrum; & ad priorem partem, quam posteriorem. Substantiam habet satis crassam, quæ commodè distendi & dilatari potest, ex quo fit, ut ægri in cordis palpitatione vix sentiant dolorem, nisi forte tam valida sit, ut valide cor ad costas impingat. Figuram habet pyramidalem, cum superius latius sit, inferius angustius, sicque cordis quod complectitur in se figuram affabre exprimit. Distantia etiam, inter cor & pericardium æqualis est, adeoque ipsum pericardium majus, ut in suo motu naturali commodè distenderetur, nec tamen in pericardium allideret. Tantum ergo intervallum inter cor & hoc ipsum intercedit, quantum requirebat commoda cordis dilatatio. Est autem continua omni sui parte, excepta basi, in qua quinque foramina ob vasa cordis obtinet: duo quidem, propter venæ Cavæ partim introitum, partim egressum: alia vero tria, ob venæ arteriosæ & arteriæ venosæ, tum Aortæ exitum.

Humor in
pericardio
contentus.

Humor in
pericardio
contentus.
A copia.

In hac membrana continetur aqua, quam Galenus lib. v de Locor. male affect. cap. xi, urinæ similem statuit; ea non tantum in mortuis reperitur, sed & in viventibus, quanquam in illis semper copiosior sit, & præsertim si diutius à morte aperiantur. Differt hæc aqua & copiâ, & à colore. Copia quidem, pro ratione ætatis, temperamenti, sexus, & morborum. Pueris enim uberius est, quam juvenibus; & iis qui temperamenti sunt valde humidi, quam qui sicco præditi: fœminis quoque ac maribus copiosior colligitur, & qui seroso admodum sanguine abundant. Hinc est quod observemus eos, qui ex obstructionibus viscerum, lienis, jecoris & mesenterii laborant, adeoque copiam aquosi humoris in venis coacervant, quia propter has ipsas obstructions chyli tantum tenuior aquosiorque pars per mesaraicas venas ascendere queat, si quando nimio

nimio animi affectu & potissimum mœrore afficiantur, Cordis palpitazione corripitur, quod in his ad cor illico effundatur, sicque copiosum humorem hunc generet. *Quo ad Acolorem*, in sanis limpidissima est; in hydropicis, urinæ turbatæ similis; in quibusdam aliis, loturæ carniū similem vidimus.

Vitus pericardii est primo, ut Cor in loco naturali contineat, quoties vel supini vel proni jacemus, aut ad alterutrum latus volvitur, in qua re quam proficuum quoque sit mediastinum capite præcedente ostendimus. Colligit deinde & asservat in se hanc aquam sive serosum humorem, qui multis nominibus utilissimus est. Cor enim nimio motu aestuans, refrigerat: exsiccatum, humectat & madefacit: asperum, lubricat: nudum, contra externas injurias munit & quasi loricat. Hinc est quod videamus eos, quibus absumpta est, in hæcicas febres ac tabes incidere, quod cor habitualement calorem hac destitutum prompte suscipiat, & susceptum fervet. Sed & digna memoratu videtur historia, quam refert Realdus Columbus de discipulo quodam suo Romæ mortuo, cui pericardium prorsus defuisse inventum est. Subinde is dum vivebat, in syncopen incidit, & subinde mortuo similis videbatur, ex qua & extremum tandem diem clausit. Cæterum de ipsius generatione diversæ admodum sunt authorum sententiæ. Quidam connatum à primordiis vitæ primoque natali statuunt, non secus ac aërem implantatum in auribus: sed quia tamen experientia comprobatum est, alio atque alio tempore plus aquæ contineri, aut minus, generari ipsam plures postea statuerunt. In vivis enim animantibus sectio docuit, modicum contineri humoris: at in iis, qui à cordis palpitazione vel mortui sunt, vel sæpe vivis infestati fuere, copiosorem inventum esse, quam naturalis quantitas requirebat. Non defuerunt autem qui ex potu generari crediderunt, transudante ex Oesophago dum descendit, quæ opinio risu potius, quam refutatione digna mihi videtur. Eorum ergo sententia aut verissima, aut certe à vero non longe aliena videtur, qui arbitrantur aquam hanc ex vaporibus generari, elevatis ex sanguine & sero qui in venis arterisque cordis continetur, & postea respectiva pericardii frigiditate condensatis. Sic videmus in iis etiam, qui inculpatissima fruuntur sanitate, peritonæi internam superficiem semper madere, pleuramque perpetuo humidam, non aliunde certe, quam ab istis vaporibus condensatis, cum solers Opifex præpedire sic conatus sit, quo minus membranæ, quod prompte alias fieret, exsiccarentur.

CAPUT VI.

De Corde, ejusque partibus externis.

COR, Latinis à Græco vocabulo καρδιά dicitur: καρδιά autem, vel quasi *Eymologia.* *negitia*, ab imperio, ut voluit Chrysippus apud Gal. lib. 11 de Placit. Hippocr. & Plat. cap. v, quod habet in alias partes; vel certe quasi καρδιά, per literarum transpositionem, καρτ καρδαινεα, quod vibrare significat, ac si perpetuo motu vibretur. Græci veteres & præcipue Poëtæ, excellentiæ gratia καρδιαν, sive viscus appellarunt, unde Medea μετὰ καρδιαν λαγχνη dicta, cordata & magnanima: hinc elegantissimum verbum καρδιαχὴς, quo Græci summum cordolium denotant, quasi dicas, imo corde dolorem sentire. *Situm* est cor in medio ventre: *anterior*, sterno & in fœminis quoque mammis; *ad latera*, costis; *posterior*, scapula & vertebriis munitum. Hujus *Basis* secundum omnem locorum differentiam exacte medium locum obtinet: at *b mucro* sinistrorsum nonnihil & antorsum infra lævam papillam exporrigitur, cujus & motum in sinistro latere percipimus, unde nonnulli anatomix imperiti, totum cor in sinistro latere jacere crediderunt. In quadrupedibus contra non basis tantum, sed & mucro mediam sedem tenet. *Figuram* habet pyramidalem; quo fit ut nuci pineæ à priscis dissectionum proceribus fuerit assimilatum: sed hæc figura quadrupedum potius, quam hominis cordi convenit, quod illorum cor ex basi ampla & rotunda sensim in mucronem acuminatum terminetur; at hujus latius sit, & nonnihil depressum. Quamvis crediderim & cor in vivo homine rotundius esse, quam post mortem apparet; & rotunditatem illam amittere tantum, coincidente ob molliorem & ventriculorum magnitudinem ipsius carne. *Superficies* cordis *superficies* à basi usque ad mucronis summum lævis est & æqualis; præterquam in locis, ubi adipe

Magnitudo. ubi adipe perfunditur, aut ^a vasa discurrunt: *interior*, maxime inæqualis. Quoad *magnitudinem*, ratione corporis majus homini, quam cæterorum animalium ulli contigit, & in longitudine quidem sex transversos digitos æquat: in latitudine vero & altitudine, quatuor. Totum autem *carneum* est, crassum, rubrum, ac densum: in mucrone tamen quam basi nonnihil spissius, fibrisque multis intertextum, quo nomine Hippocrates non veritus est libro, quem de Corde inscripsit, musculum vocare. Plurimum tamen inter utrumque discriminis occurrit, ut haud sciam qua ratione defendi possit, si carnis colorem, densitatem, fibrarum diversitatem, ipsamque actionem respicias. *Color* enim in musculorum carne multo rubicundior est, ipsaque caro mollior, quam in corde. *Fibræ* autem simplices, cum recta cunctæ à principio ad finem excurrant: at Cor ex omni fibrarum genere contextitur: nec locò inter se differunt, quemadmodum videmus in intestinis aliisque quibusdam partibus; in quibus transversæ fibræ exteriorem partem obtinent; rectæ & obliquæ, internam, aut contra: sed invicem inibi omnes implicite sunt ac confusæ. Iam si *actionem* spectes, musculorum actio contractio est ad suum principium, dependens à voluntatis nostræ imperio, adeoque delassatur ac fatigatur, si nimia sit: cordis contra substantia motum habet à naturæ instinctu insitum ac innatum, qui neque sisti à voluntate nostra neque concitari potest, & (res dictu mirabilis) indefinenter multorum annorum spatio sine ulla fatigatione aut noxa cietur. *Connectitur* ope pericardii superius, mediastino; inferius, diaphragmati; per vasa autem, aliis partibus: cætera liberum est ubique, ut libero motu perpetuo agitur.

PARTES CORDIS.
1. *Disimilares.* Cæterum ut partes omnes inspiciamus, dividi cor potest in partes dissimilares & simplices. *Disimilare* duæ sunt; una, superior; altera, inferior: illa, ^b *Basis* dicitur, & *Caput* ^c *cordis*, estque lata & orbicularis, ex qua quatuor illa vasa, de quibus postea dicturi sumus, originem suam deducunt: hæc, ^e *Mucro* & *Apex* vocatur, estque acuminata. *Similare* alia sunt externæ, alia internæ. *Externæ*, Adeps, Membrana integens, Vasa omnis generis, & Auriculæ. *Internæ*, Ventriculi & Valvulæ.

Adipe. Incipiamus ab ^d *adipe*, quam circa cor inveniri negavit Philosophus, in Historia de animalibus: quæ tamen in homine copiosior quam brutis, maxime ad basin, ubi vasorum est egressus, invenitur. Quin imo cor nonnunquam adeo adipe involvitur, ut minus peritis anatomicis imposuerit, cor abfuisse: præsertim cum & ego ex dissectionibus observarim, animalia sanguinea quò pinguiora sunt, eo minus cor habere. Et hoc effe reor quod legimus in historiis, immolante C. Cæsare in tauri opimi extis cor abfuisse. Quis enim credat bovem exordem vixisse unquam, cum animalium sanguineorum principium cor sit, à quo omnia dependent? Et mihi certe ipsi superioribus annis obtigit, ut dum in theatro publico struthiocamelum dissecarem, cor tanta adipis quantitate oblitum invenirem, ut facile multis præsentibus fidem fecerit, cor huic avi defuisse.

Membrana. Quis enim credat bovem exordem vixisse unquam, cum animalium sanguineorum principium cor sit, à quo omnia dependent? Et mihi certe ipsi superioribus annis obtigit, ut dum in theatro publico struthiocamelum dissecarem, cor tanta adipis quantitate oblitum invenirem, ut facile multis præsentibus fidem fecerit, cor huic avi defuisse. *Vasa.* Membrana, qua obvolvitur, tenuis est, à subjecta carne, cui validissime adnascitur, inseparabilis. *Vasa* habet omnis generis per suam substantiam dispersa, venas, arterias, & nervos. ^e *Vena*, à cavæ trunco ascendente oritur paulo antequam in dextrum ventriculum implantatur, & *Coronaria* dicitur, quod coronam antiquorum regum imitetur. Cingit enim undique basin, multosque ramos per exteriorem cordis superficiem in totam ejus substantiam ad mucronem usque dispergit, qui per sinistram partem frequentiores majoresque; rariores & exiliores ad dextram digeruntur. Huic ad exortum ne sanguis ad cavam refluat, *Valvula* apposita est, lunam dimidiatam referens. *Arteriam* modo unam habet modo duas, ab Aorta derivatas, ubi ad sinistrum cordis ventriculum enascitur, statim in exortu, antequam pericardio excidat. Vocantur hæ arteriæ similiter *Coronariæ*, quod eodem cum vena modo basin cingant, & per longitudinem cordis, potissimum in sinistro latere, furculos transfundant. *Nervos*, à sexta cerebri conjugatione exiles habet, in basin juxta venam arteriosam disseminatos. Hos Piccolhomineus vim ac facultatem motoriam præter sensum cordi suppeditare censuit, adeoque si derepente obstruantur lædanturve, mortem improvisam inferre. Ego tamen hæc falsâ esse experientia didici, cum plurium animalium corda exempta è corpore, absisso penitus nervo aliquamdiu commota fuisse observarim.

Auriculæ. Sunt tandem in basi cordis utrinque duæ partes veluti appendices, quas ^f *auriculas* ^g *Veteres* vocarunt: non tantum ut quidam voluerunt, à forma quam habent cum auribus

auribus canum communem: sed & à connexionem, cum cordi utrinque, ut capiti aures adnexæ, eodemque modo ab ipso dependant. *Dua* ergo sunt, una dextra, altera sinistra, ad officia eorum valorum quæ cordi materiam invehunt, hoc est, ad Venæ cavæ & Arteriæ venalis. *Figuram* habent pyramidalem, sed vertice nonnihil acuto præditam: *superficie* autem sunt inæquali tam foris, quam intus; oppletæ tamen & extensæ sanguine, foris æquales apparent. *Substantia* etiam utraque constat nervosa ex triplici fibrarum genere conflata, & tenui adeo ut cutis crassitiem haud multum superet. *Differunt* autem inter se primo, situ; quod dextra venæ cavæ ostiolo præjaceat, cum qua veluti commune corpus efficit; sinistra, arteriæ venali: *deinde* magnitudine; quod dextra sinistra altero tanto sit amplior: *tertio*, duritie; quia sinistra durior pauloque carnosior sit & crassior. *Quarto* tandem, figura, læva acuminatiore magisque in latus exposita. Hæ motu perpetuo & indefinente juxta cum corde moventur, sed contrario. Dum enim cor dilatatur, ipsæ contrahuntur, & materiâ effundunt: dum constringitur illud, dilatantur & sese expandunt. Motum hunc doctissimus Hippocrates quoque observavit, qui libro de Corde, tota sua natura cor agitari scribit; at aures privatim tum intumescere, tum flaccescere.

CAPUT VII.

De Cordis partibus internis, Ventriculis inquam, & Valvulis.

CONTINET Cor omnium animalium cavitates, quas Hippocrates *κοιλιας*, id est, *ventres*: Galenus & Aristoteles *κοιλιας*; Iulius Pollux *κοιλιας*, sive *sinus*, Latini, *Ventriculos cordis* appellant. De horum *numero* magnus est inter dissectionum Professores, cum Galenus cæterique Medici duos tantum agnoscant: at Peripatetici secuti Aristotelem, tres velint esse. Hic enim lib. III Historiæ de animal. cap. III, tres inveniri ventriculos in maximis animalibus; duos in mediocribus; at unum tantum in minimis tradidit. Quin & lib. I Historiæ de animal. cap. XVII, ordinem quoque & situm cuiusque explicans, maximum quidem, in dextro latere; minimum, in sinistro; at medium magnitudine inter sinistram & dextram locatum scribit. Et ne quid desit tandem, lib. III de Part. animalium, cap. IV, laudat quoque hoc Naturæ institutum, & satis esse judicat tres fuisse constitutos ventriculos, quam duos; ut unus quidem commune sit utriusque principium, medium enim & impar principium est. Hunc ternarium cum Aristoteles mediocribus animalibus assignarit, non defuerunt quamplurimi qui in homine tres sinus conati sunt ostendere, quos cum ego minime unquam observare potuerim, nec vero Aristotelem ita temere erroris accusandum censeam: crediderim equidem inter maxima animalia, elephantos, rhinocerotem & balenas retulisse; hominem autem, equum & bovem inter mediocria, quæ duos tantum habent. Nullibi enim, de hominis corde quod sciam, loquens, ternos in eo ventriculos statuit: at clarissimus locus est lib. IV de Generatione animalium, cap. ultimo, ubi hominem respectu elephantum *ἐλάφια* vocat & parvum: quo eodem sanè loco eandem illam divisionem animalium, qua in majora, mediocria, & minima dirimuntur, insinuat. Duo ergo sunt in humano corde ventriculi; unus, dexter; alter, sinister.

Differunt hi ventriculi primo *magnitudine* inter se; cum dexter sinistro multo sit major, ut qui à basi ad mucronem usque pertingat, unde & ab Aristotele lib. I Historiæ de animal. cap. XVII, *κοιλία μεγάλη*, major, ille dicitur; hic, *ἐλάφια*, minor. Deinde, *sanguine*; cum dexter crassiore paulo contineat, & ut melius exprimam, venosum; quæ causa est, cur Galenus *κοιλία φλεβώδης καὶ αἰματώδης*, ventriculum venosum & sanguineum appellet. *Sinister* contra spirituosum obtinet, omninoque talem, qualis per arterias in universum corpus digeritur. *Forma* quoque differunt; cum si per transversum cor disseces, *dextrum* quidem figuram crescentis lunæ semicircularem exprimere invenias: *lævum*, orbicularem. Septum enim quod utrumque ventriculum interjacet, qua dextrum sinum respicit, gibbum est: qua lævum, cavitatem habet. Ex quo fit, ut figura dextri à basi cordis usque ad cavitatis finem semicircularis scilicet; sinistri vero cavitas orbicularis, paulatim instar conii à latiori basi in angustum tendens. *Quarto*, *sinister ventriculus* à sin.

Mm

in cordis

Cordis Ventriculi.

Numerus.

An tres sint ventriculi cordis humani.

Differentia contritudinum. A magnitudine. A sanguine.

A forma.

A sin.

A. crassitie.

in cordis medio exacte exsculptus esse videtur, si portionem illam, quæ dextrum constituit, auferas: *dexter* autem quodammodo à latere tantum appositus. *Quinto*, carne *sinister* triplo quam dexter crassiore constat, multoque solidiore ac compactiore.

Septum cordis.

Dividuntur autem ventriculi hi ne sanguis uterque confundatur, pariete dextro sinistri ventriculi, quem *septum cordis* Anatomici vocarunt. Hoc propterea à dextris gib-

Interna facies ventriculorum.

bum, à læva concavum est, & cum sinistro sinistri ventriculi pariete æqualis crassitie.

^a Apertis ventriculis à basi ad mucronem sectione secundum longitudinem ducta, ^b *interna superficies* inæqualis admodum cernitur, multisque velut ^c cavernulis referta, quæ carni ejus imprimuntur cum in parietibus reliquis, tum in septo. Hos Galenus in septo pervias putat, sed obliquo tortuosoque ductu non recto, ut sanguis à dextro ventriculo in sinistrum sensim feratur, non cum impetu irruat. Ego cum doctissimo Vesalio sum, qui censuit, nullatenus penetrare. Cæterum ex ventriculis sinister inæqualior est, & foveis pluribus ac insignioribus refertus, quod etiam notavit magnus Hippocrates libro de Corde; *qui ambo*, inquit, *sinus interiore parte asperi sunt, veluti erosi aliquantulum: sed sinister magis, quam dexter*. Observare præterea licet carneas quasdam fibras in utroque ventriculo, teretes & graciles, à ventriculorum mucrone prodeuntes, quæ in membraneas fibras desinunt, infernæ parti valvularum, de quibus jam dicemus, insertas. Hæ in dextro quinque vel sex quandoque: in sinistro tantum binæ, at crassiores ac solidiores occurrunt, quibus si quis nomen velit imponere, *Carunculas teretes cordis* vel *papillares* non male credo vocabit.

Caruncula teres.

Vasa quatuor circa cordis basin conficiuntur.

Porro hi duo ventriculi circa basin cordis in quatuor vasa desinunt; quorum duo sunt Venæ, totidemque Arteriæ. *Venæ*, in dextrum ventriculum: *Arteriæ*, in sinistrum terminantur, aut prodeunt. *Venarum prima*, ^a *Cava* dicitur, Aristoteli *magna*; quia omnium venarum maxima est, quæ Galeno reliquisque Medicis à lecore originem trahere videtur. Hujus orificium aortæ orificio triplo majus in totum dextrum ventriculum expanditur, exceptum primo à dextra auricula. *Altera Vena*, *Arterialis* vocatur, *vena* quidem (ut superius libro quinto complexi sumus) quod sanguinem crassiusculum pro nutritione pulmonibus deferat, cum sanguis in dextro cordis sinu contentus fibrosior sit: *arteria* autem, quia corpus arteriæ obtineat, hoc est, ex duriori membrana & duplici, ut alias arteriæ omnes, confecta. Hæc, vena cava longe minor, in duos divisa truncos ad pulmones tendit, dexterque in dextram, at sinister in lævam partem in ramos innumeros iterum dispersi disseminantur. *Arteriarum*, quæ ex sinistro ventriculo prodeunt, prima dicitur ^c *magna*, Aristoteli *ægen*. Hæc ex basis ipsius ventris contra crassam membrana enascitur, & in duos divisa truncos, unum sursum, alterum deorsum mittit; unde illum truncum ascendentem, hunc descendentem vocavimus. ^e *Arteria venosa* altera est, *arterie* nomen ab officio obtinens; quia sanguinem scilicet spirituosum & vitalem pulmoni transportat: sed *venæ*, ob tunicam simplicem venarum tunica similem. Hæc similiter bifariam divisa statim ab egressu è corde, alterum ramum in dextrum, alterum in sinistrum lobum digerit.

Arteria.

Arteria.

VALVULÆ.

Ad horum vasorum officia undecim membranæ reperiuntur, quas Hippocrates libro de Corde *pelliculas cordis* appellat: Galenus, lib. vi de Vsu part. cap. xiv, *membranas* generali voce: Anatomici Recentiores *Valvulas* & *Ostiola*, ab usu. Videntur enim instar valvarum aut portæ aperiri aut claudi, ut materia affluens aut assumatur, aut interceptiatur. Sunt autem duplicis generis: *aliæ* enim ex ampla basi in obtusum mucronem desinunt, atque ubi clauduntur telorum triangularium eminentiis similes sunt, unde *trifidæ* aut *tricuspidæ* vocantur: *aliæ* iis similes, quæ in reliquis venis, præsertim artuum cernuntur, semilunæ aut Græcorum C similes, unde *semilunares* vel *signiformes* appellantur. Ille intro spectant, quod vasis intromittentibus appositæ sint, ut cito admittant materiam, sed non emittant: hæc, extra; & vasis educentibus appositæ. Trifidæ ergo tres, Venæ cavæ orificio; & duæ, Arteriæ venosæ appositæ: signiformium autem tres juxta arteriæ magnæ, quam venæ arteriosæ. Valvulæ hæc, sed imprimis trifidæ plurimis fibris & quasi filamentis, iisque fortibus ad septum cordis, maxime versus mucronem carunculas teretibus adnascuntur. Has omnes qui videre velit, ventriculos transversim incidat prope basin, cum omnes in situ egregie tunc sese monstrant.

Differentia.

Trifidæ.

Semilunares.

CAPUT VIII.

De actione, & usu Cordis, partiumque ipsius.

QUÆNAM propria cordis sit actio, & quæ soli competat, nemini meo ACTIO
Cordis, Pul-
sus.
judicio obscurum esse potest, cui unquam vivi alicujus animalis dissec-
tioni interesse licuit. Vidit enim haud dubio cor indefinente quodam
perpetuoque motu modo latius ampliusque fieri, modo rursus angus-
tius strictiusque. Motus hic à Galeno lib. VI de Placit. Hippoc. & Plat.
itemque ab Aristotele libro de Respiratione, σφύγξιν vel σφύγις dicitur,
ὅτι δὲ σφύζειν, quod pulsare vel salire significat. Latini *Pulsus* appellant. Constatque hic Partes pulsan.
Dilatatio.
Contractio.
motus duabus partibus; quarum altera, *διαστολή* dicitur, *dilatatio*: altera, *συστολή*, *CON-*
tractio. Est autem *dilatatio cordis*, mucronis ipsius ad basim attractio, qua amplius ipsum
fit, & siquidem longitudo comprimitur, sphaericum: *contractio* autem, ejusdem mu-
cronis à basi discessus, à quo cor angustius redditur. Inter utramque hanc actionem
necessario *quies* quædam quasi media intercedit, cum nulla res sit, quæ contrariis moti-
bus citra hanc agitari possit, quod, ut summus Philosophorum demonstravit lib. VIII
Physicor. text. 62 & 63, duobus simul oppositis motibus res illa agigaretur. Est igitur
duplex; aut *interna*, quæ intercedit contractionem & dilatationem: aut *externa*, quæ in-
ter dilatationem & constrictionem interjicitur. Perficiuntur hi motus & gemina quies
beneficio fibrarum, quas diximus omnis generis cordi tributas esse. Cum ergo rectæ
contrahuntur relaxatis transversis, cor dilatatur; cui quod de longitudine decedit, in lar-
titudinem additur: ubi contrahuntur transversæ relaxatis rectis, constringitur; & quod
demittit de latitudine, in longitudinem accedit. Quod si oblique contrahantur, in se
coactum cor manet, & intermediam illam quietem inter dilatationem & constrictionem
perficit. Cæterum cum duos esse cordis ventriculos dixerimus, dextrum scilicet
& sinistrum, & hunc altero multo nobiliorem, merito ambigere videmur, uterque
an vero hic tantum moveatur: & si uterque, an æqualiter, & an hujus motus illius mo-
tum sequatur. Huic dubitationi sic satisfaciendum esse censeo, utrumque pulsare, sed
magis sinistrum quam dextrum, quod viva dissecctio edocet: utrumque autem per se,
quia in utroque principium hujus motus est, etiam in sinistro præstare videatur. Ipse ta-
men hic motus voluntarius non est, & qui ex nostro dependeat arbitrio, quemadmo-
dum musculorum contractio, quam & sistere cum volumus & concitare possumus: sed
naturalis prorsus est, qui absque voluntate & nobis nihil tale cogitantibus perficitur.
Est ergo internum quoddam & naturale principium, unde pendet: quale autem sit,
graviter Philosophi Medicique inter se certant. *Aristoteles* enim Peripateticorum prin-
cipes libro de Respiratione statuit, pulsum à fervore sanguinis fieri dum in spiritum con-
vertitur, adeoque dilatari cum bullæ elevantur; rursus contrahi, dum subsidunt. Quæ
sententia utcumque primum audita vero impense similis videatur, experientia tamen
Anatomica falsissima deprehenditur, cum sæpe adverterim cor quorundam animalium
extractum & discissum, omni quoque sanguine exhausto adhuc fortes validosque
pulsus edidisse. Magis ergo mihi aridet *Galeni sententia*, statuentis à peculiari facultate
cordi insita, profluente à forma ejusdem proficisci: quam ipsam à beneficio, quod
universis nostri corporis partibus confert, vitalem; à munere autem, pulificam ap-
pellavit.

VSUS *pulsus* commodè geminus statuitur: *unus*, qui cordi convenit quatenus pars
est principalis, toti humanæ fabricæ inserviens; *alius*, qui cordi inservit quatenus pri-
vatam actionem habet. *Communis* ergo & *generalis* usus est, ut sanguis spirituosus per uni-
versum corpus indefinente motu diffundatur ac pellatur. Pellitur autem sanguis per
constrictionem, dum cor angustius redditum contractis fibris transversis non secus exigit
ea, quæ suis finibus continentur, ac nos manu farcimine pressa quicquid intus est, su-
pra infraque pellimus. At enim cum sanguis hic digeri per corpus non posset, nisi prius
in corde generaretur; nec generari, nisi prius materia suppeditaretur; præter con-
tractionem etiam *dilatatio* maxime erat necessaria, cujus ope dum cor latius fit, & cavi-
tatem ampliore nanciscitur, vi vacui validissime venosum sanguinem è cavæ trunco
Mm 2 ad se

Vfus.

1.

2.

Communis.

Constrictionis.

1.

Galeni.

2.

Dilatationis.

Quies.

Cur sanguis
ex corde pel-
lendus.

1.

2.

Vita.

3.

Cur influens
calore opus
fuerit.Cur infuso ca-
lore opus fue-
rit.

Proprium.

Cur mucro
cordis in sin-
istro latere si-
tus.Refutatur
alii.

ad se trahit. Ipsa autem *quies* ad motum cordis per se non pertinet, nec quidquam efficit: sed tanquam id, quod contrarium motum consequitur, accedit, & id teste Gale-
no, lib. 1. de Cognit. puls. cap. x. Cæterum sanguis hic ex corde duplicis usus gratia
pelli debuit; primo, ne cum ad putredinem perquam aptus sit sui temperamenti culpa,
quod calidum humidumque est, quiescens prompte admodum putresceret: deinde, ad
partes alendas minime secederet; quæ causa est, ut supra quoque diximus, cur Natura
venis ubique arterias adjunxerit, nec à latere sed inferius posuerit, ut scilicet motu Ve-
narum sanguinem indefinenter propellerent: tandem maxime necessarius, ut vitam sin-
gulis partibus largiretur. Cum enim *Vita* nihil aliud sit, quam calidi in corpore perma-
nentia, & calidum hoc ipsum aut insitum sit aut influens: utrumque sane necessarium
esse facile patebit, si cogitaverimus omnes animæ, sed imprimis naturalis & vegetati-
væ actiones caloris beneficio obiri. Cum autem ea animalia præ aliis calore abundare
æquum sit, quæ aëris frigidi injuriis exposita erant (unde supra divisionem in sangui-
nea, & exsanguia attulimus) Homini profecto, qui omnium animalium calidissimum
maximeque sanguineum est, neque ut cætera bruta in latibulis alicubi latitare, sed quo-
cunque tempore aptum ad aëris quascunque injurias esse debebat, ut contemplationi
rerum divinarum singulis momentis & ubique locorum, ubi ea se diffusa undiquaque
offerunt, incumbere, præ reliquis influente calore erat opus, ne si per totum cor-
pus unus fuisset dispersus, facile à frigore victus exspirasset. Quod sane sic impeditum
quam sapientissime fuit, dum frigore extrinsecus accedente influens repercutitur, in-
tusque effervescens magis cum opus est, opportune externis partibus inde suggeri-
tur. Similiter calidis temporibus quid facilius erat, quam exsolvi & dissipari: at ita
interioribus adhærens omnes caloris ambientis ac dissipantis vires eludit, dummodo
(quia semper quod ad externas partes digeritur, in auras abijt dissipatum) suo tem-
pore alimentis restituatur. Similiter insito erat opus quam maxime, ut facile influens
ob affinitatem susciperetur. Cum ergo fonte quodam caloris necessario indigeret Na-
tura, Cor extruxit, in quo calor sic abundat, ut qui in corde existimatur minimus
esse, in alijs partibus maximus sit: imo talis, ut si vivente adhuc homine in sinistrum
ventriculum demittatur digitus, fervens calor percipiatur; quod testatæ sunt historiæ
eorum, qui à carnifice vivi sunt dissecti. Proprius usus ac privatus est, ut sibi ipsi serviat,
respiratione scilicet pulmonum mediante, quæ similiter inspiratione & expiratione
constat. Inspiratio cordi necessaria est, ut aer attrahatur frigidus, qui sanguinem in cor-
de ferventem & calorem attemperet: exspiratio, ut fuligines genitæ expellantur. In dila-
tatione ergo aer advenit; in contractione, fuligines pelluntur. Non tamen aer sua substan-
tia ingreditur, ut postea monstrabimus: sed refrigeratur tantum sanguis ab aëre, qui in
arteria venosa est, & sic vicissim infusus in cor eum frigefacit, qui in sinistro ventriculo
continetur.

Sed age, videamus quomodo fabrica cordis actionibus his & usibus satisfaciatur.
Primum ergo situm est, in medio ventre, ut ad utrumque reliquorum, supremum in-
quam & imum, tum ipsos quoque artus æqualiter sanguinem & cum hoc spiritus dif-
funderet. Ex quo fit, ut & ipsa basis exacte medium in hoc ipso teneat secundum omnem loco-
rum differentiam, sed imprimis juxta superiorem & imam: nam à dextra & sinistra, à
priori & posteriore parte, propterea potius remota æqualiter videbitur quo com-
modius sese dilatare possit, nec ullibi allidat, quod accideret prompte si ad alter-
utram declinaret. Mucro autem nonnihil ad latus vergit in homine, quia thoracem parte in-
ferna depressum habet & brevem: at brutis ad diaphragma, quod pectus acutum ob-
tineant & longius. Absque hoc ergo foret utriusque motus, cordis inquam & dia-
phragmatis se mutuo impedissent, quod Natura solers evitare cupiens mucronem in
latus nonnihil reposuit; nec tamen in dextrum sed levum collocavit ob venam cavam, quæ
in thoracem per septi transversii dextram partem ascendit. Sunt ergo nugæ, quas qui-
dam afferunt, factum hoc esse propterea ut sinistram partem calefaceret, quæ alias
frigidior est dextra. Quid enim quæso commodi à situ cordis quævis pars consequetur,
cum cor transmissione sanguinis spirituumque, non positu vel connexione calorem
largiatur? Figura oblonga est, sed superius latiuscula, adeoque pyramidalis; oblonga quidem, quia
hac ratione attracto mucrone ad basim quam commodissime in spheram globatur,
& sic

& sic in dilatatione plurimum sanguinis trahit : rursus discedente mucrone ab eadem quam opportune stringitur. Superius autem lata est nonnihil & ampla, ut quatuor vasis partim ingredientibus, partim e corde emergentibus sedem præparet. Majus autem cor est homini quam aliis animantibus, quia homo omnium animalium maxime sanguineum est. Ut ergo hepar quoque maximum obtinuit, à quo confectus sanguis in venis portæ ad cor transmittitur : ita & jam cor ipsum merito maximum habet, quod copiam illius sanguinis suscipiat. Substantia dura est ac densa, ut spiritus qui calorem influentem constituunt, ne dissipentur conservet : quemadmodum arteriæ eadem de causa venis crassiores spissioresque sunt factæ. Cæterum cum fons sit caloris ac veluti cisterna quædam sanguinis, quem attenuat, merito *cavum* esse debuit. Sufficiebat autem huic munerì una cavitas, unde unum tantum ventricululum habere videmus pisces aliaque multa animalia : sed quia Homo pulmonibus præditus est atque respirat, dextrum sinistro summus Naturæ opifex adjecit. Et hoc est quod diximus, sinistrum scilicet sinum Cor totum constituere, adeoque & in ejus medio exacte exsculptum ; dextrum, tantum appendicem quandam esse. Voluit enim summus Parens ut Pulmo peculiari nutriretur sanguine ; non venoso, quod nimis esset crassus : neque arterioso, quia nimis tenuis : sed medio inter utrumque, adeoque tali, qui in dextro ventriculo nonnihil attenuatus foret. Decebat enim pulmones esse levissimos, & propterea ex tenui & rara carne constare, unde etiam sanguine diverso à sanguine quo aliæ partes nutriuntur ali conveniebat. Hoc quam verum sit non melius licebit intelligere, quam si experientiam me imitatus consulas. In fœtu enim dum adhuc utero conclusus coëctetur, crasso & venoso sanguine nutritur, quemadmodum sequenti capite dicemus ; unde duplo gravior est, & quævis particula pulmonum aquæ injecta protinus submergitur, cum pulmo hominis adulti vel totus in summo natet. Dexter ergo *ventriculus* ea ratione conditus est, ut pulmonibus opportunum conficiat alimentum ; unde quæ pulmonibus carent, eadem & hoc destituuntur. Sinister autem, ut sit cisterna caloris sanguinisque, ex qua univërso corpori suppeditetur. Ex his jam causas licebit reddere differentiarum utriusque. Dexter enim sinistro major est, quia plurimum sanguinis à pulmonibus digeritur ; tum quia sanguis admodum tenuis necessario est qui alit, & sic facile dissipatur ; tum quia pulmones ipsi in perpetuo sunt motu, & valde quoque à vicino corde incallescunt ; calor autem digerit dissipatque. Continet quoque crassiorem sanguinem quam sinister, quia ille nutrire debet ; hic vero in spiritus converti, qui, tenuissimi cum sint, materiam subtilem requirunt. Sinister in medio quasi corde exsculptus est, quia est cavitas primaria : at dexter, appendix tantum, unde lateri adhæret. Tandem ille & triplo fere crassior est, quia spirituosus sanguis facile dissiparetur, nisi optime munitus foret, quod in dextro non est verendum, qui crassiorem continet. Hæc ergo cum ita se habeant, merito quatuor vasa circa cor conspiciuntur ; duo circa dextrum sinum, & duo circa sinistrum, ut in utroque sint & inferentia & educientia. Vena quidem cava, ut materiam pro spirituoso sanguine suggereret : Arteria autem magna, ut eundem per totum corpus distribueret. Rursus Vena arteriosa, ut pulmonibus sanguinem : Arteria venosa, ut calorem & vitam suppeditaret. Vena autem cava & arteriosa junctæ sunt in dextro, ut prius in hoc pro pulmonibus sanguis elaboraretur : arteria vero magna & venosa, ut ex eodem optime præparatus per illam omnes partes, at per hanc ad pulmones disperceretur. Sed & alia causa est, quia dum vena arteriosa nutrimentum pulmonibus suggerit, partem aliquam arteriæ venosæ per anastomoses quibus invicem junguntur, infundit ; sicque ex dextro ventriculo ad sinistrum sanguis, materia spirituum, in dilatatione transportatur. Falsum enim est per septum quidquam exsudare, cum illa foramina pervia non sint : ineptum autem, quod laudant Naturæ quoque in hac re providentiam, quæ per septum voluit traducere ut sensum instillaret, non vi aut impetu irrueret, quod fieret si per arteriam venosam, utpote vas magnum ac insigne, accederet, unde calor suffocaretur : quasi vero Vena cava non multo major sit, per quam in dextrum sinum sanguis effunditur. Quod si quis quærat quo nomine foramina ea facta sint, promptum mihi erit respondere propter nutritionem esse condita, cum venæ per cordis intimos recessus haud dispergantur, nutritio tamen necessaria sit, unde consuluit cordi Natura foraminibus his interim, quæ venarum ductibus respondent. Id verum esse facile licebit col-

Pulmo nutritur peculiari sanguine.

Am per septum sanguis exsuditur.

ligere, cum videamus non in septo tantum hæc comparere sed in universo corde, id quod mihi quidem magni argumenti loco est, alio quam dicunt ipsi sine creata esse. Est tandem & alius usus, cum circa bronchia asperæ arteriæ vasa hæc consistant, unde ipsis refrigeratis ab externo aëre attracto necessario & ipsa frigus concipiunt, ipseque sanguis in iis contentus, qui postea infusus in sinistrum ventriculum reliquum attemperat. Nec enim verum est, substantiam ipsius aëris cor accedere; cuius substantia cor non indigeat, & nec via ulla sit per quam ingrediatur: ut taceam maximam Naturæ imprudentiam, quæ cætera tam provide tantoque consilio omnia perfecit, si Cor vitæ fontem externi aëris injuriis tam temere objecisset, à quo tam sedulo omnes reliquas vel minimi quoque momenti partes defendit. Taceam quoque refrigerari satis ebullientem sanguinem ubi frigidus arteriæ venalis affunditur, cum videamus à levi halitu ebullientem in magno aëno ad ignem aquam componi, dum carnes nostras coquimus. Vterque ergo ventriculus duo vasa continet, unum, quod infert; alterum, quod exportat: infert, dum cor dilatur; exportat, dum constringitur. Cæterum quia futurum erat ut illatum modo subito reslueret, nisi impediretur; Natura sane ingeniosissimum quid commenta est, dum vasorum orificiis membranulas quasdam præfixit, quæ alternatim aperiuntur & clauduntur. In dilatatione quidem aperiuntur omnes sive extenduntur, adeoque *trifurcæ* veluti fissuras efficiunt inter se, per quas materia intromittitur: *figmiformes* vero extrema fuorum vasorum claudunt & sanguinem egressum remeare prohibent. In contractione contra omnes clauduntur & laxantur, sicque *trifurcæ* spatia illa & fissuras claudunt, ne quid regrediatur: *figmiformes* vero flaccescunt, ut sanguis libere efflueretur. Omnes namque eam conformationem adeptæ sunt, ut simul tensæ totum orificium exacte tegant & occludant. Vt autem quam optime tendantur & vim sanguinis irruentis sustineant fortius, plurimum *fibræ* illæ à *carunculis* teretibus enatæ juvant, quæ contrahuntur & valvulas resupinant. Tres autem tantum sunt creatæ, quia ut Galenus præclare philosophatur, pauciores adeoque majores neque tam exacte clausissent, neque tam celeriter: plures adeoque minores multo quidem citius & exactius, at imbecilliores fuissent. *Due* tamen tantum arteriæ venosæ principio affixæ sunt, ut non tantum per ipsam ingrederetur cor sanguis ille, qui per venam arteriosam à dextro ventriculo supeditatur: sed & semper aliquid vicissim ex sinistro ventriculo ad pulmones transmittatur, spatio aliquo relicto quod vitam ut reliquæ arteriæ ipsis offerret. Cæterum eleganter dubitari hoc loco potest, quæ causa sit quam propter Omnipotens illud Numen in dextro quidem ventriculo, venæ arteriosam substantiam crassamque membranam; at in sinistro, arteriæ venosam & simplicem tenuemque sit largitum. Nec enim temere, sed summo id fecisse videtur consilio, partim ut fœtui, partim ut adulto homini inserviret. Et *venæ* quidem arteriosæ crassities fœtui id utilitatis defert, ne sanguis spirituosior, qui ab arteria magna in venam arteriosam refunditur, quemadmodum nunc dicturi sumus, nimium dissipetur: adulto autem & excluso ab utero, ut quia tenuiorem sanguinem in dextro scilicet ventriculo elaboratum, quam venæ aliæ ferat, cujus pars una pulmonibus; altera, arteriæ venosæ offertur, ne in itinere longiore interim pereat profundaturque. Contra arteriæ venosæ tunica simplex est, ut fœtui venæ loco esset, & sanguis crassus per eam posset excidere, cum crassum sanguinem & venosum à cava accipiat, antequam dextrum cordis ventriculum ingreditur: adulto autem, ut, quia plurimo sanguine pulmo indiget, copiose is excideret, qui tamen non nimium ut in vena arteriosa dissipari potest, quin aliqua portio ad cor perveniat, cum brevior jam multo ad cor sit via. At enim duobus vasibus quæ materiam important, Auriculæ appositæ sunt, ne sanguis quem majori conatu cor allicit quam expellit, maxima vi in dilatatione irrueret, & sic vel cor totum periculose impleret, ne distendi amplius aut contrahi in se posset, ut videmus interdum vesicam urina nimis plenam; vel vasa ipsa rumpantur. Primo ergo in auriculis colliguntur materiæ, unde dum dilatur cor ipsæ constringuntur, & sic modeste infundunt sanguinem. Merito autem *due* sunt, quia duo quoque vasa quæ intro ferunt. Substantia constant nervosa, ut possint dilatari magis minufve, ne attractionis impetu rumpantur. Dextra autem major est sinistra, quia & cava arteria venosa major est ampliorque. Vasa tandem omnis generis habet: Venas, ut nutriatur; Arterias, ut vivat; Nervos, ut sentiat. Et Vena quidem oritur à cavæ trunco antequam in ventriculum

triculum dehiscat, ut cor sanguine nutriatur crassiore, quia crassam habet & densam substantiam. *Vahula* huic apposita, ne in contractione cordis sanguis regrediatur. *Adipis usus est*, ut humectet cor: at ne facile liquefcat à calore ejusdem, non pinguedo sed vera adeps est.

CAPUT IX.

De unione vasorum cordis in fœtu, quæ in nato perit; ubi modus simul aperitur, quo non ipsa solum perditur, sed & vasa umbilicalia in editis cavitatem suam amittunt.

IN vasis quæ circa cordis basin sunt, discrimen quoddam occurrit, cum aliter se in fœtu quamdiu utero concluditur, aliter in homine jam nato habeant. Bina enim utrobique invicem junguntur, unum ex vasis dextri; alterum, ex sinistri ventriculi: & quidem vasa inferentia simul, & simul educentia. Illa, per anastomosin; hæc, per canalem proprium: utraque, priusquam cordis basin attingant. ^a Vena ergo cava cum ^b arteria venosa paulo quam in dextrum ventriculum hiet, eo scilicet loco quo vena coronalis pronascitur, per ^c foramen satis insigne necitur, cui ^d membrana quædam tenuis ac pelucida ex parte arteriæ venosæ præfecta est, sola radice superius firmata. Contra, ^e Arteria magna cum ^f vena arteriosa per ^g canalem sive tubulum venosum necitur, qui à ^h trunco descendente Aortæ ea sede oritur, qua nervus recurrens sinistri lateris reflectitur, sicque oblique venam arterialem accedit, cui circa bifurcationem ⁱ inferitur. Vnio hæc in homine in lucem edito confestim aboletur, & membrana quidem ipsa primo statim triduo adnascitur, sicque foramen occluditur: *tubulus* autem, post paucos dies non secus ac Vasa umbilicalia primum cavitatem amittit, & in ligamentum abit, mox profus aliquammultis tamen annis, fereque tribus aut quatuor interjectis evanescit.

Vnio vasorum cordis in fœtu.

Vniones hæc vasorum pulmonum gratia conditæ sunt, quos in fœtu & crasso sanguine venoso nutrirî, nec arterioso destitui conveniebat. *Crasso nutrirî*, ut cum nondum cordi respirandi præstarent officium ad quod levitas ipsorum requirebatur, aspera arteria tenera adhuc & flexibilis ab eorum pondere comprimeretur, ne vacuum in ea esset quod aërem traheret, qui in utero concedi non poterat. Hinc & in fœtu pulmones graviore esse cernimus, & aquæ injectos quantulacunque portione non secus ac parenchyma cordis jecorisve subito mergi, cum adutorum animalium pulmones contra vel tori innatent. *Arterioso non destitui*, ne privarentur vita, qua carerent necessario, quod sanguis vitalis per umbilicales arterias attractus & hinc in truncum Aortæ delatus, cor haudquaquam subire posset, nec adeo ad pulmones deduci ob valvulas, quæ circa orificium arteriæ magnæ qua sede in cor hiat, sitæ foris spectant. Vasa ergo hæc sapiens Natura sic adaptare debuit, ut neuter sanguis ad cor appelleret: non venosus, ne in dextro ventriculo ut in editis attenuaretur: nec arteriosus, ne non ad pulmones deveniret. Ille ergo per venam umbilicalem attractus ad hepar, indeque per radices portæ refusus in cavam, cujus beneficio ad cor deferretur, statim antequam id attingat, in arteriam venosam effusus pulmonibus subministratur. Hic contra attractus per arterias umbilicales, ubi prope orificium arteriæ magnæ confluerit, cum cor ingredi nequeat, per tubulum ad venam arteriosam, indeque ad pulmones deferretur. Ex quo patet, cur in sinistro Ventriculo *Arteria vena substantiam nacta sit*, nimirum ut sanguinem venosum distribuât, qui crassior cum sit, ut excidat tenuiorem membranam requirit: contra, in dextro. *Vena vero arteria*, ne cum deferat spirituosum sanguinem, si simplex esset tunica subito digereretur. *Iungitur autem Vena cava cum arteria venosa foramine*, quia sibi conterminæ sunt: *Arteria vero magna cum Vena arteriosa tubulo sive canali*, quia longius à se distant. At enim ne ex arteria venali refundi quidquam posset, *membrana* foramen clauditur: rursus ne regurgitaret ex vena arteriali sanguis, *canalis obliquitate* prospectum est.

Caterum qua ratione post editum fœtum tum anastomosin hæc oblitteretur, tum etiam vas ipsum pereat, nemo quod sciam hæcenus aperuit. Hanc tamen princeps investigavit, & ad nos perscriptit Excellentissimus Vir, Hieronymus Teobaldus, Medicus

Modus quo unio hæc destruitur ex sententia Hieronymi Teobaldi.

Venetus,

Arterium
umbilicalem
in ligamen-
tum conver-
sus.

Venetus, quæ cum non minus elegans sit, ut ipse Medicorum est elegantissimus, quam ingeniosa & Anatomico homine digna, sic dignissimam merito statuimus, quæ non prius tantum, sed & publice legatur, ut fidæ nostræ amicitia pluribus confirmatæ officiis, ob commune dissectionum studium, in quo Vir egregius egregia plurima invenit, grata memoria hic & ubique præstetur. Eadem autem opera ob argumenti vicinitatem ejusdem quoque de vasorum umbilicalium & urachi in funiculos permutatione sententiam proponemus: In prima ergo respiratione quæ subito partum excipit, duo evenire inquit, quibus fœtus adhuc utero inclusus minime assuetus fuit, pulmonum nempe ab aëre impletio & inanitio reciproca: deinde, Diaphragmatis ad inferna viscera depressio. Ab illa, hæc vasorum circa cor unio: ab hac, umbilicalium structura perit. Repletis enim ab aëre pulmonibus Vasa duo (Vena scilicet arterialis & Arteria venalis, quod arteria aspera jam extendatur, quæ antea in fœtu ob pondus pulmonum compressa subsidebat, cum bronchia ramosque ejus circumflectent, ut dicitur sequenti capite) stringuntur, unde sanguis utriusque ad cordis sinus vi pellitur. At enim cum Venæ arteriosæ valvulæ ingressum ejus prohibeant: Arteriæ autem venosæ admittant (quod illæ foris, hæc intro spectent) fit ut sanguis hujus ad cor perpetuo motu tradatur. Cum autem Vena cava & ipsa more suo sanguinem ad arteriam venosam impellat, membranula à sanguine compressa valide, exacteque clausa (quæ ratio est cur in superiore parte adhæreat, in inferiore libera sit) omnem ingressum præpedit, ex quo fit ut sanguis hic postea qua data via ad dextrum cordis ventriculum secedat. Quia vero in constrictione cordis sanguis expellitur, evenit rursus ut per Venam arteriosam detrudatur, à qua digestus deinceps continuo ad Arteriam venosam, dum sanguis in hanc nunquam cessat irruere, perpetuoque etiam à cordis dilatatione ex ea attrahatur in sinistrum sinum, ipsa membranula fatigata assiduo ad suas oras affluxu tandem coalescit, sicque anastomosis hæc aboletur ac perit. Affluente ergo hac ut dixerat ratione sanguine & petente sinistrum cordis Ventriculum in dilatatione, ubi cor constringitur per arteriam magnam iterum effunditur, unde cum deorsum à corde sanguis jam tendat arteriosus, nec ut antè (cum à matre suggerebatur) sursum quidquam trahatur, in tubulum nullus effunditur. Sed nec ex Venâ arteriosa quidquam in hunc secedit, cum uti diximus Natura id obliquitate ipsius prohibuerit, unde fit ut alimento omni tubulus hic destituatur, sicque primum in ligamentum coalescat, mox omni prorsus ut & vita carens computrescat, & ex putredine in auram abeat. Eadem compressio vasa umbilicalia in aliam substantiam transmutat: & Venam quidem in ligamentum, quod Iecur suspendit: Arterias vero & Vrachum, in funiculos. Cum enim ad Venam umbilicalem à matre sanguis amplius haud digeratur, à musculis autem abdominis, tum visceribus quoque ob diaphragmatis descensum compressis & ipsa prematur, nec ab hepate alimentum nanciscitur, sicque necessario cavitate amissa in ligamentum abit. Non tamen, ut obliquus vasorum cordis ductus evanescit, qua ejus substantiam à vicinis venis nutriri voluit Natura & incrassari, ut in ligamentum abiret, cum tantam compressionem quæ vita privare queat, haudquaquam patiatur. Arteria quoque umbilicales similiter comprimuntur, impleta vesica urinaria atque in latitudinem distensa, cum antea in fœtu in longitudinem porrigeretur, & eadem arteriæ dum animal accrescit in funiculos abeunt, quia elongantur & cum non una ubique augeantur, manent breviores. Vrachus quoque ob eandem distensionem quam facillime comprimitur, cujus officium brevissimo temporis spatio sic perit, ut ne guttula urinæ perfluat.

Arteriarum
nonnullarum
ligamentum
conversio.

Vrachii per-
mutatio.

CAPUT X.

De Pulmonibus, & eorum aspera Arteria.

Etymologia.

Synonyma.

Partes.



VLMO, quod alterum viscus est eorum quæ in medio ventre continentur, Græcis πνεύμων dicitur, πνέω τὸ πνεῦμα, à respirando, quod ipsius officium est. Avicenna cordis culcitram vocavit, quia cor ei tanquam pulvino incumbit. Vulgus cordis flabellum & ventilabrum appellat. Dividitur in duas partes, quarum altera dextrum, altera sinistrum thoracis latus occupat; in quorum medio cor situm, unde apud Veteres pluries propterea

pterea plurali numero *pulmones*, & apud Græcos quoque *πνεύμονες* vocati legimus. Sic Plautus in Curculo, Pulmones distrahuntur, cruciatur cor. Ab hoc *Pulmonarii* nomen acceperunt qui pulmonum inflammatione laborant, Græcis *πνευμοναῖοι* dicti. Horum utraque pars è regione quartæ thoracis vertebræ, *linea* per tranversum nonnihil oblique ducta, in duas alias subdividitur, superiorem scilicet & inferiorem: interdum in tres, quas *lobos fibrasque pulmonum* appellant, & membraneis nexibus ita sibi adherent, ut sectio hæc interdum vix compareat. Quod si duo duntaxat sint, superior lobus inferiore brevior est. *Figuram* habent ungulæ bubulæ, cum extrinsecus qua parte thoracis cavitatem respiciunt, gibbi sint: intrinsecus, cavi. Hippocrates tamen libro de Corporum dissectione, testudini animali nec inepte comparavit. *Magnitudo* tanta est, ut in viventibus cum inspirant, universam medii ventris cavitatem repleant; at dum expirant, flaccidi clicant: non ita tamen opere magno ut in mortuis, cum semper aliquid æris spiritusque in se retineant in vivis, nec omnis una regrediatur. *Connecuntur* superius ope asperæ arteriæ collo & dorso: *anterior*, sterno: *posterior*, vertebri, idque ope mediastini: *infra*, septo quibusdam nexibus (notatu dignissimum) à membrana qua tegitur pleura, qui si breviores sint, jam diximus, dispenam incurabilem insequi. *Substantia* ipsa est *παρέγχυμα*, & caro (si adulti hominis sit) rosei coloris, mollis, spongiosa, admodumque levis, unde in aquam projecta supernat. Contra *fœtus* pulmo, rubicundior est, durior & gravior, statimque submergitur ob sanguinem venosum quo nutritur in utero, deductum à cava ad arteriam venosam per anastomosis, ut monstravimus. *Παρέγχυμα* hoc membrana cingitur à communi vasorum pulmonem ingredientium tunica enata, quæ tenuis, mollis & vehementer porosa est, ut mirum nulli videatur si ex thoracis cavitatem materiam per hanc in asperam arteriam rapi exspique postea videat. *Vasa* autem accepit omnis generis: *Venas* quidem, à vena arteriali ex dextro cordis ventriculo prodeunte: *Arterias* vero, ab arteria venosa è sinistro. Illa, nutrimentum; hæc, vitam affert; sed utraque in duos statim ac primum pulmonem attigere, ramos dividuntur, mox iterum in plures, donec tandem penitus in capillares furculos prope externam superficiem dissolvantur. De his supra sub finem libri sexti egimus, cum Venarum Arteriarumque historiæ colophonem imponeamus. *Nervum* quoque exiguum à sexta conjugatione nervorum cerebri habet, qui tamen ad membranam duntaxat accedit, à quo & obtusus ille sensus quem nactus est ipsi nascitur.

Est & aliud vas nulli alteri visceri aut parti totius corporis præter pulmones commune, quod olim ab antiquissimis anatomie proceribus, *ἀσπέρια* dicebatur ab officio, *ἀσπέρια* τὸ τ' αἰὲρ πρὶν, quod ærem in respiratione attrahat, cum reliquis arteriis hodie sic vocatas Venarum nomine complecterentur. At enim posteriores cum Galeno vocabulum *τρεχῆα* addiderunt, vocantes *asperam* hanc arteriam ab inæquali sua substantia, ut à Venis pulsantibus distinguere, quæ nunc Arteriæ simplici voce nuncupantur. Est autem *aspera arteria* fistula oblonga, ex cartilaginibus rotundis membranisque invicem connexis efformata & semper patula, quæ ex humiliore faucium sede incipiens gulæque incumbens in pulmones multiplici ramorum serie dispergitur. Dividitur in duas partes; quarum altera, elatissima est & *caput asperæ arteriæ* dicitur, Græcis *ἀσπέρια*, τὸ τ' αἰὲρ πρὶν, quod gutture latius diducto vociferari significat. Nonnullis etiam improprie *φάρυγξ* vocatur, quemadmodum Aristoteles lib. 11 Historiæ de animal. cap. 11 r, sæpe confundit; cum propria acceptione fauces denotet, sive partem ante laryngem sitam. Altera pars & inferior, *βρέχων* vocatur, τὸ τ' ἐν βρέχεσσι, quod Veteres potum ad pulmones per hanc ferri crederent. Latini *fistulam*, Barbari *cannam pulmonis* appellant; Latentius, *spiritaalem fistulam*.

Situs est LARYNX in collo & quidem in ipsius medio, cum unicus sit; figuram peneteretem referens, nisi quod antè acute nonnihil extuberet; posterius autem, depressus subsidat. At enim cum organica pars sit, ex pluribus similibus exstruitur, cartilaginibus inquam, musculis, membranis, vasis & glandulis, de quibus fere omnibus jam ante egimus, ut necessarium non sit plura de larynge hoc loco verba facere. Nam *cartilagineum* historiam tertius liber complexus est: *musculorum*, quartus; in quibus & obiter data occasione de *glottide* ac *laryngis rimula* locuti sumus. Quod *Vasa* spectat, vasa

N n

quæ

quæ sola reliqua fecimus, *Venas* à vena jugulari externa habet, & quidem ramo interiore qui os subit. *Arterias*, similiter à carotidis majore ramo & profundo, fauces accedente. *Nervos* autem, à sexta cerebri conjugatione *Recurrentes* dictos, de quibus supra libro septimo pluribus egimus. *Glandularum* autem duo sunt paria, quæ laryngi adjacent. *Primum par* Anatomici *Tonfillas*, Chirurgi *amygdalas*, Græci *μαλίσσια* & *αμυγδαλές* appellant, quæ ad elatiorem ipsius sedem & latera gargareonis circa linguæ radicem in ore collocantur utrinque, cujus communi quoque membrana integuntur, ut cerebri humiditatem suscipiant & in salivam convertant. *Aliæ duæ* ad laryngis humilem sedem sitæ sunt, thyroïdi seu scutiformi cartilagini incumbentes. Hæ cum in fœminis plerisque omnibus ob temperamentum sui humiditatem fere tumeant, fit ut collum teres & æquale his reddant. At in maribus præsertim qui sicciore sunt cum flaccescant, laryngis illam anteriorem extuberantiam monstrant, quam vulgus credulum *Adami pomum* appellat, fabulans protoplastæ nostro cum exterius omnipotentis Dei voce peccati sui pœnitentia tangeretur, de pomò illo fatali nonnihil in faucibus adhæsisse.

Membrana. **FISTULA** contra partim ex membranis, partim cartilaginibus constat. *Membrana* enim duplex est; una *exterior*, à pleura enata, eaque tenuis, cartilaginum vinculis pertinacissime connata; altera *interna*, à tunica palatum succingente profecta, densiore ac solidiore substantia constans, humore quodam unctuofo perfusa, fibrisque rectis prædita. Donata hæc sensu est exquisitissimo, ut minimum quodque in arteriam asperam illabens protinus perferat, tussique ejiciat, ne obstructa alias fistula in præsentissimum vitæ discrimen animal conjiceretur. Est autem *tussis* vehementissima quædam efflatio, quæ animalibus naturalibusque instrumentis concurrentibus accidit, in qua plurimus aer celerrime ac concitatissime erumpit, ut id ex aspera arteria ejiciatur quod ipsius interiorum tunicam laceffit. *Cartilagines* vero inter utramque hanc membranam consistunt, quarum quamplurimæ sunt, annuli figuram non tamen integri referentes, cum quarta parte & quidem posteriore sui sede deficiant; quam tamen ipsam supplet membrana dura quæ ibi succingitur, quantumvis rotunditatem illam circuli in planam superficiem extendat. Vocantur hæ cartilagines à figura sua *σφυρηνόειæ*, *sigmiformes*, cum C Græcorum referant, quod similiter rotundum quidem est, at circum tamen integrum haudquaquam absolvit. *Fistula* ergo hæc cum statim sub cricoide sive annulari laryngis cartilagine initium ducat, recta descendit angustior semper facta, & posteriore sui sede membrana quadam œsophago adhærens, donec sub jugulo prope quartæ thoracis vertebræ corpus in duos dividatur ramos, dextrum & sinistrum, quorum uterque sui lateris pulmonem ingreditur. Ingressi autem subito in duos alios subdividuntur, & hi rursus in alios, donec tandem in minimos furculos ad externam usque superficiem pulmonum dispersos facessant. Vocantur hi rami qui per ipsam substantiam excurrunt, pulmonis *βρόγχινα*, quæ vox apud Latinos postea Medicos retenta fuit. Cæterum ut annulares cartilagines trunci quo fistula magis deorsum fertur eo minores angustioresque fiunt; ita rami cum primum pulmones ingressi sunt, non amplius ex sigmiformibus annulis constant; sed ex integris, minoribus tamen & varias exprimentibus formas, rhombos inquam, quadrata & triangula, quæ propria membrana cohærent, ut quibus in locis arteriæ venalis & venæ arterialis propaginibus junguntur, membranei sint; cæteris vero in locis, cartilaginei. Locantur enim inter utriusque hujus vasis propagines, ita ut asperæ arteriæ rami in medio sint; anteriore sede arteria, posteriore vena. Interdum tamen varius observatur situs, & asperæ arteriæ rami cæteris vasis incumbunt aut subjacent.

ACTIO. **ACTIO** pulmonum est *respiratio*, cum nullum animal sit pulmonis expertus quod respiret. Est autem *Respiratio*, attractio emissioque aeris per asperam arteriam, ut fons & principium caloris refrigeretur. Primaria ergo pars in pulmone asperæ arteriæ fistula est, Veteribus cisterna aeris propterea nuncupata: ipsa autem respiratio duobus perficitur motibus, inspiratione & expiratione. Inspiramus aërem, dum dilatatur pulmo & cum ipso arteria: expiramus, dum concidit rursus & aërem pellit. Dilatatio hæc & restrictio pulmonum unde fiat, in dubium à multis revocatum est: ego tamen ab eorum semper sui partibus, qui non per se sed motu thoracis has fieri credere, cum satis ex viva sectione nobis pateat, dilatato diaphragmate protinus thoracem & cum hoc pulmones

mones extendi. Sequitur enim fugam vacui pulmo, qua nihil in naturâ est ad trahendum fortius: at ne præsentî vitæ periculo in thoracis vulnere hæsitaret Homo, propterea fibris quoque Natura benignissima pleuræ quasi alligavit, ut nihilominus quamquam remissius si forte thorax læsus sit, trahatur. Ex his intelligitur motum pulmonum esse interdum naturalem tantum, interdum ex naturali animalique compositum, quemadmodum thoracis motus, à quo pender, duplex est, ut supra lib. IV, cap. VIII ostendimus. Naturalis est simpliciter, cum libera est respiratio & à solo diaphragmate thorax movetur: composita est, cum violenta & thoracis musculi intercostales concurrunt. Reliquos enim quos cæteri Anatomici addunt, ad respirationem nihil facere satis citato loco probatum fuit. Neque est quod quis objiciat diaphragmatis motum naturalem dici non posse, quod hoc musculus sit, cum sciamus sic vocari non tantum ipsum qui fit fibris, sed & qui musculis, si naturali modo fiat, hoc est præter nostræ voluntatis arbitrium. Comprimitur ergo pulmo compresso thorace, eodemque distento dilatatur, & non secus ac fabrorum folles, ne inane spatium maneat, aëre impletur: In primis tamen aspera arteria, cujus cartilagines à se mutuo nonnihil recedunt: membranæ autem quæ illas jungunt, in latitudinem expanduntur.

Vsvs *respirationis* est, tueri attracto aëre calidum quod in suo fonte est, hoc est in corde. Cum autem calidum pluribus modis servari possit; *primum*, pabulo & materia in quam agit; *deinde*, ventilatione à frigido: *tandem*, excrementorum fumosorum evacuatione: non secus ac videmus externum nostrum ignem tribus his modis apud nos conservari (absque his enim si foret, in locum naturalem qui supra est, protinus avolare) *pabulo* quidem, per alimentum, cibum potumque servatur; *fuliginosorum excrementorum evacuatione*, per arterias ad quas deferuntur, & per poros exhalant reliquæ: *ventilatione à frigido*, per aërem externum conservatur. Non enim credendum est, aëris substantia transformata in spiritus vitales, tanquam pabulo calidum nostrum refici; cum videamus inspirato plurimo aëre, si cohibeatur, suffocari tamen animal: quod certe propterea fit, quia aëris substantiæ suscipiendæ gratia respiratio non sit instituta. Quin videmus plura quoque esse sanguinea animalia, ut pisces, quæ vitali spiritu prædita, aërem tamen non attrahunt. Accedit, quod à Naturæ providentia admodum foret alienum, si, cum reliquas partes omnes ab aëre tam solerter & studiose defenderit, ipsum caloris fontem cor, tam temere eidem objecisset. Sic enim protinus omnia ab aëre lædi cernimus, ut quamprimum aliqua pars interior ipsi exposita sit, actiones omnes naturales quæ ipsi famulantur, læsæ deprehendantur. Attrahit ergo aërem externum pulmo, ut qualitate sua frigida fruatur, quod nobis satis manifestum fit in calidioribus locis ubi violentè respiramus, quod cor quantumvis pulmones plurimum hauriant aëris, nihil adjumenti percipiat, cum non refrigeretur. Quia tamen nulla in re unquam prodiga Natura est, sed ut Oeconomus solers studiose omnia in usum revocare contendit, ne quid pereat quod quocunque modo animali poterat esse adjumenti, ut inspirationem aëris ad vitæ tutelam traduxit, ita expiratione ad melioris vitæ usum abusa est. Adhibet enim ad vocem, qua affectuum suorum promit reconditas vires, alterique significat. Ac uti *fistula* quidem asperæ arteriæ præcipuum erat instrumentum refectionis calidi innati, quod in corde est: ita *caput* ejusdem primarium organum vocis existit.

Sed jam videamus quomodo his actionibus satisfaciatur Pulmo. Primum *in thorace situs est*, ut & ori larynge esset vicinus, à quo haurit aërem & reddit: & deinde cordi suo corpore, cui in inspiratione servit: tum linguæ, quæ vocem postea in articulatam sermonem discriminat. *Divisus autem in duas partes*, ut in medio cor tegetetur, & ut à se diductæ hæ partes violentius aërem attraherent. *Linea autem subdividuntur*, ob flexuram thoracis, cui sic sequaces redduntur. *Figura* peculiaris nulla est, sed talis quæ loco accommodata erat; unde *foris gibba, intus concava*, quod dorsum cavum erat, cor convexum. *Substantia constat spongiosa ac molli*, ut essent quam levissimi, unde dum fœtus adhuc uteri ergastulo concluditur, nec respirationis munere indiget, duriores sunt ac crassiores. Cæterum ut nutriatur & vivat nonnihilque sentiat, *omnis generis vasa accepit*; & *venam quidem non à portæ vena*, quia hæc nutrit tantum eas partes, quæ sanguine admodum crasso indigebant, ut viscera nutritioni dicata; *neque à cava*, quia &

Vsvs respirationis.
Calidum quod motus servatur.

Inspirationis
signa.

Expirationis
signa.

Quomodo ca-
lidiorem cordis
refrigeretur.

ille crassior erat, quam levitas substantiæ pulmonum admittebat; sed à dextro cordis ventriculo, in quo sanguis fit medius inter arteriosum & venosum, adeoque nec nimis tenuis nec crassus, sicque sanguine nutritur quali non alia pars corporis, quemadmodum & ipsum quoque parenchyma ab aliis variat. Arteriam autem à sinistro ventriculo. Est & alia causa maximi momenti, quamobrem à corde hæc vasa immediate deducta sint, nempe ut ex dextro ventriculo ad sinistrum feratur sanguis, è vena arteriali in arteriam venosam effusus, sicque spirituosus ac nobilis ille sanguis qui per arterias deducitur, generetur. In ipso autem itinere, ne qua occasio benefaciendi animali Naturæ temere præterlabatur, refrigerat hunc, ut effusus in sinistrum sinum calidum, quod in corde effervescit, temperetur: non secus ac nos ad ignem nostrum externum sæpe uno oculi ictu ebullientem cohibemus aquam, pauca frigida affusa. Atque hæc est illa refrigeratio calidi, cujus gratia respiratio instituta est, pulmoneque & totus thorax fabrefactus. Attractus enim per arteriam asperam frigidus aër bronchia primum refrigerat; hæc quia medium tenent locum, utrinque adjacentia vasa; unde & sanguis protinus vicinitate frigidum concipit: effusus autem ad cor necessario effervescentem calorem cohibet. Hæc causa est, cur ubi junguntur invicem membranæ sint bronchia, ut scilicet frigus promptius penetret. Arteria autem aspera non tota ex cartilagine constat, quia dilatari haud potuisset: neque ex membrana, quia facile concidisset: ut ergo neutrum deficeret, cartilaginibus membranas intertexuit, non secus ac costas musculis intercostalibus in structura thoracis. Larynx autem ex rima constat, ut sonum ederet aër per angustum spatium trajiciens; cæterum hunc ut variis modis & pro suo quisque libitu formaret, cartilagine circumjecit. quibus præfecit musculos, qui pro nostro arbitrio modo claudunt aut aperiunt; modo dilatant aut constringunt, sicque amplum angustumve reddunt. At enim ne exsiccentur nimium hæc instrumenta, cum vox à sicco corpore ingrata fiat (quemadmodum fistulæ arte paratæ id edocent) glandulas adjecit, à quibus perpetuo moderate irrigantur.

FINIS LIBRI NONI.



ADRIA-

A D R I A N I S P I G E L I I
B R V X E L L E N S I S ,
D E H V M A N I C O R P O R I S F A B R I C A .
L I B E R D E C I M V S ,

Qui supremi ventris historiam continet.

C A P V T I .

De capillis, & quatuor communibus summi ventris integumentis.



LX tribus Ventribus supremus restat, quem CAPVT vocamus, Cerebri & facultatis animalis adeoque sensus motusque CAPVT.
domicilium. Hunc in summo corporis loco magnus nostri Situs.
corporis Architectus collocatum voluit, quod sensuum organa contineat, quorum pleraque in sublimiore sede felicius suum munus exsequuntur. Oculi enim in alto siti tanquam ex specula quadam quæ distant intuentur & prospiciunt: Aures, vocem in sublimi evolantem hauriunt: nec minus odores, quorum vis ignea summa quævis petit à Naribus opportunius in alto positus excipiuntur. Sed enim cum hic locus mi-

nus tutus sit, cui undique scilicet variorum discriminum vis plura intentat mala, & substantiam ei dedit, quæ resistere quibuscumque injuriis commode valeret; & figuram, quæ easdem declinare haud difficulter posset. Non enim carneum fecit, ut inum ventrem: neque carnes junxit ossibus, ut in medio: sed totum ex uno quanquam non continuo osse extruxit, cui formam adaptavit sphaeræ in modum rotundam, nonnihil tamen ad latera potissimum priore parte compressam. Substantia n.

De hoc ut verba nunc faciamus, primum singulas ipsius partes enumerabimus: deinde singulorum succinctam historiam persequemur. Cæterum omitemus quæ exteriores sunt, cum earum appellationes jam superius abunde complexi simus: de iis tantum agemus quæ internarum rationem observant, suntque ut in reliquis duobus ventribus, vel continentes vel contentæ. Continentes vocantur, quarum complexu aliæ coercentur; suntque decem; partim communes, ut capilli & quatuor integumenta communia dicta; partim propriæ, ut pericranium, muscoli & ossa calvariæ, quæ externæ sunt: duæ membranæ, Meninges dictæ & Cerebrum ambientes, quæ omnes in calvariæ interna sede continentur. Contentæ primum duæ sunt, Cerebrum & Cerebellum; quibus tamen non inepte Spinalis medullæ principium, quod adhuc calvariæ terminis continetur, adjunxeris. Plures deinde aliæ quæ quinque sensuum sunt instrumenta, quanquam tactus sensorium non in capite solum coerceatur sed per universum corpus diffusum, latissime pateat. Ex his quarundam historia jam ante enarrata est, & quatuor quidem communium libro septimo, ut hic nihil supersit aliud quam discrimen quod occurrit ratione aliorum ventrium: propriarum, puta musculorum & cranii, partim in quarto, partim in secundo libro abunde satis enodata etiam fuit. Ordinis ratio.

CAPILLI primum in conspectum se offerunt, * totam posteriorem capitis partem quæ capillata propterea dicitur, contegentes. Horum substantia densa est, solida ac dura, secundum longitudinem fissilis; at in latitudine flexibilis. Habent hi pili tres partes; summam unam, quæ interdum finditur; mediam alteram, quæ flecti potest; tertiam tandem imam, alba quadam & mucosa substantia obstitam, quam pilorum radicem appellant, & cujus beneficio cuti pilus inhæret. Situs omnibus communis est, in postica capitis parte: at ductus tamen diversus, cum ^b syncipitis capilli versus frontem; ^c occipitis, ad dorsum; ^d qui circa tempora sunt, versus aures vertantur; quorum ductuum centrum idemque causa in summa mediaque calvariæ sede locus ille est, qui Aristoteli CAPILLI.
Substantia.
Partes.
Situs.
καρυφῆ, quasi καρυφῆ, quod crinibus densioribus ac reliquæ capitis partes regi & velut

Vertex. velut abscondi videatur. Latinis autem proprietatem rei apta voce exprimentibus, **Vertex* vocatur, quod circa eum capilli vertantur. Hic ergo communis terminus est quatuor calvariae partium, syncipitis inquam, quæ se usque ad frontem versus priora extendit; occipitis, quæ ad dorsum inclinatur; & temporum, quæ latera respiciunt. *Figuram* habent non uti creditur vulgo teretem: sed quod nuper inventi instrumenti optici beneficio (quod res quantumvis minutissimas evidenti magnitudine oculis offert) observare licuit, quadrangulam, in morem stipitem cauliumve quarundam plantarum. In nonnullis recti sunt, in aliis intorquentur & crispi fiunt. Cæterum in humano corpore *longissimi* sunt, qui nascuntur non quidem ut aliis placuisse video ex fuliginosis cerebri excrementis; sed ex sanguine potius attracto per radicem pili in reliquum truncum. Probari hoc ex iis potest, quæ analogia quadam pilis correspondent in aliis animalibus; qualia sunt in aquatiliis quidem genere squamæ, quæ per radices suas alimentum attrahunt: in volatilibus autem pennæ, in quibus, si quam extrahas junioribus, manifeste sanguinem advertas, qui pennas componat idemque alat. Eodem ergo modo & in pilosis animalibus ex sanguine à pilorum radice attracto & in propriam substantiam elaborato pilos generari mihi omnino persuasum habeo, quod una eademque in analogis ubique ratio à sapientissimo rerum Opifice accurate observata fuerit. Quæ causa certe est, ut consumpto cerebro quemadmodum Hippocrates lib. vii Epidem. loquitur, calvities sequatur, exhausta sanguinis debita copia, ejus scilicet à quo pili proveniunt, & quo cerebrum partesque circumstantes nutriuntur. Quod si *calidum sit* moderate, ut ferax esse solet humorum hæc temperies, sanguinem suppeditabit, unde læta ipsorum seges luxuriabit: contra si *frigidum sit*, & materia deficiet & egressus quoque interceptetur. Iam si *secum sit*, quis dubitet raros futuros, & quam subito defluvio perituros? contra si *humidum sit*, densos, frequentes & in extremum usque senium perduraturus.

Differentia. Differunt tamen capilli in homine, penes ætatem, sexum, regionem, temperamentum, & habitum corporis. Ac *quoad magnitudinem*, brevissimi rarissimique sunt infantibus, prolixi mulieribus, breviores viris. Breves sunt Æthiopibus, longiores Scythiis aliisque Septentrionem incolentibus populis. Qui humidior sunt cerebro, longiores producant: qui siccior, breviores. *Quoad figuram*, pueris nuper natis molliores ac simpliciores sunt, rectique: feminis & qui frigidas humidæque plagas incolunt, ut Europæi, aut temperamentum simile sunt indepti, rectos alunt: calidi contra vel in calidis regionibus degentes, crispis, quemadmodum Æthiopes. *Quoad colorem*, humoris prædominantis color in capillis ubique cernitur, cum qualem humorem caro attraxerit, talem colorem pilus induat, ex Hippocrate lib. de Natura pueri. Pueri albos capillos plerumque aut modice flavos habent; juvenibus ad nigredinem vergunt; senibus & decrepitis cani fiunt. Viri & qui calidam siccamque regionem inhabitant aut temperamentum hujusmodi natura obtinere, nigris capillis teguntur. Nonnulli sunt pauciores, ut infantibus: alii pauci, ut senibus, quibus decidunt; quod malum Calvities vocatur, oriturque in syncipite potius, quam alibi. Calvescunt autem celerius, quibus pili molles sunt, parvi, tenues, & qui calida cerebri temperie laborant, cum à bilis acrimonia pilorum radices his prompte erodantur.

VSSVS. Vfus capillorum *primarius* est, ut cutem; *secundarius*, ut cerebrum defendant ab injuriis vel foris vel intus subeuntibus. Foris quidem *incidunt* aër, pluviae, grandines: at *intus* vapores ex inferioribus partibus exhalantes negotium facessunt. Aër pluribus nocere potest modis; *frigiditate*, cutis poros constipando, unde vaporum egressus inhibetur: *caliditate*, unde spiritus dissipantur, cerebrumque velut excoquitur: *humiditate*, partes internas laxando: *siccitate*, omnia adstringendo & innatam humiditatem absumendo. His omnibus capilli caput contegendo quam aptissime subveniunt. *Pluviae* madefaciunt, *grandines* concutiunt: illas, capillorum densitas; has, ductus arcet. Densitas enim pluvias non admittit facile; at ductus, quod incidit grandinis statim deducit. Similiter autem & internorum vim hebetant. Vaporibus enim ab infernis partibus elevatis & summa capitis petentibus exitum largiuntur, viamque liberam atque apertam concedunt.

CVTICVLA. DE CVTICVLA & CVTE nihil est novi quod afferam & differens à reliqua, nisi

nisi quod illa tenuior sit in capite; hæc, crassior. Non tamen per se, sed capillorum illam conspiciant gratia, quæ tenuitas his diffluentibus in calvitie vel tactu percipitur. Eadem de causa & durior est alia cute ut Fallopius libro de vulneribus monet, & frigidior, indeque & siccis gaudet medicamentis & calidioribus, ne calor ejus exsolvatur. Aristoteles Philosophorum coryphæus, lib. 111 Histor. de animal. cap. xi, sensu cutim per se carere inquit, maximeque in capite id contingere. Rationem mox subjicit, quod inter cutim & os minime omnium caro sit interposita. Sed falsus videtur fuisse, cum liquido pateat sensu revera esse præditam, sed obtuso. Nec causa ejus rei hæc est, quod substrata carne careat, ut censuit Philosophus; nam & tibiæ priori parti cutis excarnis obducitur, nihilominus acuto sensu donata est: sed quia tum pauci nervi ad eam pertinent, tum quia partim ex sensibili, partim sensu destituta substantia constat. Sensum enim habet cutis; at caret eo, pilorum radices. Venas quoque obtinuit & Arterias; illæ, a jugulari externa; hæ, ab arteriæ carotidis exteriore ramo propagantur.

^a PINGVEDO circa occipitium observatur copiosior in obesis, pauca aut nulla etiam in macilentis. In fronte quoque pauca licet, quædam tamen est; & præcipue in iis qui obesi sunt, imo omnibus quibus glabra obtigit nec rugis intricata, ut adolescentibus, pinguedo cuti subest, cum rugæ ob carnosam membranam fiant, quando pinguedine nulla interjecta immediate cuti substernitur, unde & macilentis frequentiores sunt majoresque.

^b MEMBRANA CARNOsa circa frontem, præterquam in obesis, vicinissime adheret, crassiorque est, & ^c musculos illos constituit qui vulgo fronti, a nobis autem superciliis tribuuntur.

CAPV T II.

De Pericranio.

S V ^a membrana carnosâ subito ac nullo intercedente corpore alia quædam ^e membrana invenitur, quam Græci à situ περιεγύριον, subintelligente περιεγύριον, & communiter quoque περιεγύριον in neutro genere appellant, ^{αὐτὰρ τὸ περιτὸν νεγρίον τένινος}, quod circa cranium five calvariam tendatur. Membrana est tenuis & alba, capitis ossa investiens, non tamen omnia sed frontis tantum, duo syncipitis & occipitii. Frontis quidem os, ad oculorum usque orbitas: syncipitis, ad squammiformes conglutinationes: occipitii, ad primam usque vertebra. Temporum enim ossa nuda sunt, cum ad ea appellens musculos eam sedem occupantes (sunt autem attollens inferiorem maxillam) ascendat & externa obtēgat, non tamen ad insertionem pertingat; sed circa jugalis ossis regionem terminatur. Hanc nonnulli duplicem faciunt, aliam dicentes esse quæ membranæ carnosæ, aliam quæ cranio nectitur: illam vere ^g pericranium dici, hanc ^h periostrium. Attendi enim omnibus ossibus membranam foris, quæ ab externis protegat & tueatur. Mihi tamen simplex tantum semper visa est, etsi in ipsa dissectione geminam mentiatur naturam, id ipsi cum cæteris omnibus membranis quæ quantulamcunque crassitiem nactæ sunt, commune obtinuisse. Crassior autem hæc est pluribus aliis, quæ in nostro corpore reperiuntur: sic tamen ut circa futuras seipsam quoque crassitie vincat. Sensum habet acutissimum, ob primi secundique nervorum cervicis conjugia, quæ per occipitium sparguntur: tum ⁱ propaginem tertii paris cerebri, quæ foramina ossium frontis egrediens ad cutem eidem obtensam proficiscitur. Hujus gratia prudenter Chirurgi admovent, pericranium pungendum haudquaquam esse; & in vulneribus capitis studiose dum terebris cranium perforamus præcavendum, ne alicubi lædatur, sed si à subiecto osse removendum sit, incisione cultelli acuti unguibusque separetur. Connecitur enim cum crassa cerebri membrana fibris quibusdam nerveis ad cranii interiora se penetrantibus, valideque sic hanc membranam & cum hac cerebrum suspendentes, ne in inordinatis corporis motibus nunc huc, nunc illuc propulsam alicubi cum præsentis vitæ discrimine allidatur. Quamvis autem non ignorem aliis dissectionum Professoribus quasi omnibus contra fuisse visum atque ego statuo, cum credant emergere potius ex intimioribus calvariæ adytis à crassa meningē, quæ pericranio originem communicat: quo minus

Confusio in-
ter pericra-
nium & du-
ram membra-
nam.

quo minus tamen cum ipsis faciam diligentior pericranii in recenter natis infantibus in-
spectio mihi persuasit. Docuit enim me & hanc & istud circa ossium fyncipitis com-
missuram anteriore sede committi quidem inter se valide: at ætate paulo post crescen-
te discedere invicem, nec nisi nexibus fibrosis conjungi. Quidquid tamen sit, sive oriri
à crassa membrana statuamus, sive neci tantum, animadversione dignissimum est, ma-
ximum utriusque inter se consensum esse, & vel levem quancumque hujus inflamma-
tiunculam cerebro protinus communem fieri. Et hæc causa quoque una est ex præ-
cipuis, cur vulnera & confusiones musculorum temporalium lethales habeantur. Nam
ut relinquam jam Venarum & Arteriarum (sat insignium) copiam, à quibus sanguinis
enorme impendet profluvium: ut etiam tendinem nerveum, ac si quis alius egregie
validum ac robustum: acutus pericranii hunc investientis sensus dolore exacerbatus
quam insigni vi ex vicinis partibus ad inflammationem sanguinem allicit? unde peri-
cranium consequutione quadam conterminarum partium facta tandem eandem duræ
membranae & quod hac integitur, cerebro imperit.

CAPVT III.

De duabus cerebri obcingentibus membranis.

Synonymia.



Substantia.
Tenuis
Alia, pituitaria.

Numero.

Appellatio.

Alia mem-
bra.

...

...

...

...

...

...

continentibus capitis partibus duæ adhuc supersunt, quarum histo-
ria enarranda; membranae inquam, in ipsa cranii cavitate interiore fi-
ta. Vocantur hæc à Galeno *μενinges*, velut propria quadam appellatio-
ne nullique alteri membranae communi: Hippocrates tamen libro de
Carnibus sic late accepit, ut & venis & ventriculo, tum intestinis aliis
que partibus voluerit tributam esse. A barbaris qui Arabum scholas
sequuntur, *Matres* vocantur, vel quia ab his reliquæ corporis membranae ortum suum
derivant, quæ sententia multis visa est: vel quia materna quadam cura cerebri incolu-
mitati prospiciant, continendo illud integrumque præstando. Sunt enim ut alia mem-
brana ex fibris cujusvis generis, tum propria substantia contexta: figura ac magnitudine
Cerebro, quod ambiunt ac circumamplectuntur, respondentes. Cum autem duæ sint
numero exterior cranio subiecta, nonnihil major est; interior, & cerebro contermina,
minor angustiorque. Distat illa & à cranio & suo conjugè: ab utroque quantum re-
quirit intervallum distensio contractiove finuum quos vehit, arteriarum ritu pulsant-
ium. Illud in capitis vulneribus in quibus internæ partes detectæ sunt, comparebit:
hoc, Galeni documento facili opera conspicias, pertusa exteriori membrana levi fora-
mine & insufflato calamo fistulave aëre. Vtriusque historiam nunc subnectemus, ubi
prius monuerimus à substantia sua utramque nomen sortitam, & exteriorem quidem
à Galeno passim *σκληρὴν* & *παχέαν*, duram crassamque: ab Hippocrate *μεγίστην*, vocabulo
relationem quandam ad comparem exprimente dictam: internam *λεπὴν* sive tenuem.
Barbari duram piamque matrem appellant.

^a CRASSA ergo membrana crassiorē habet ac duriorē substantiam, non tantum
si cum sua conjugē conferas sed & reliquis universi corporis membranīs; quæ causa for-
tasse est cur ab hac principium cæterarum plerique omnes Anatomici petierint. Im-
mediate ^b cranio substrata est, cui validissime cum omnibus in locis tum præsertim circa
futuras cohæret, per quas ut dixi ^c fibras quasdam ad exteriores cranii sedes educit, ut
validissime alligetur. Sed & circa basin ejusdem ubivis, imprimis ubi processus acutos
exigit os cuneiforme; tum foraminibus cranium ipsum pertusum est, quorum orbibus
firma connexionē jungitur, si discedas à duobus tantum ossis cuneiformis sinibus, circa
quos glandula pituitaria sita est. ^d Nequitur & tenui membranae & hujus intervēntu
cerebro, beneficio vasorum quæ huic & illi largitur. ^e Superficies externa vel superior quæ
cranium respicit, ^f inæqualis est & asperitate quadam donata ob fibras, quibus se con-
terminis partibus adstringit; interna vel inferior, æqualis, splendida, & humidior. Fora-
minibus pertusa est plurimis, sparsim seminatis ad vasorum; sed in medio majusculo,
ad infundibuli transitum: maximum omnium obtinuit, qua sede spinalis medulla dor-
si vertebrarum seriem ingreditur: quemadmodum & cribri instar perforata cernitur,
ubi os spongiosum obtendit. Membrana hæc duobus in locis reflexa se reduplicat,
sicque

ficque processibus duos exigit, quorum alter in elatiore capitis parte, alter in posteriore consideret: ille, superior; hic, posticus non immerito nominatur. Subjicitur ^a superior quem quasi deducit, ^b sinui tertio, de quo paulo post dicemus, sed cum per medium cerebri ad anteriora excurrat, bifariam idipsum in ^c dextram ^d sinistramque partem fecat. Redditur autem in itinere angustior, & quo longius à principio suo profectus est in ^e apicem tenuiorem definit, qui tandem in ^f processum superiorem ossis spongiosi quem Cristam galli vulgo vocari supra monuimus, alligatur. Hic quia apte satis falcem mesforiam exprimit, à Dissectoribus Falx vocatur. Posterior ergo sedes, quæ portioni duræ membranæ cerebellum obvelanti contigua est, *falcis basi*: at prior quæ Cristæ adnascitur, *mucroni* respondet. *Superna* ^g convexa pars, *dorsum*; *inferna* & cava, *aciem* mentitur. A posteriore autem sede in priora latus sensum falcis in morem stringitur & angustatur. ^h Posterior brevior at crassior, ⁱ cerebellum potissimum à ^j cerebro dividit. Ad superiorem processum nonnulli referunt, quod hemisphæria nonnunquam caput tener, cohibita scilicet vi dolorificæ causæ ab hoc intersepimento, quo minus utrumque latus occupet. At falluntur hi graviter, cum hemisphæriæ non internas subeant capitis partes; sed foris temporales musculos obfideant, humoribus biliosis irruentibus.

In his duobus processibus quatuor quasi tubuli sive canales deducuntur, non ut reliqua cerebri aliarumque partium vasa ad amussim rotunda, sed latiora nonnihil, quos *Sinus* appellant. ^k Primi duo sive dexter & sinister, à situ lateris in quo consistunt sic appellati, ad latus foraminis primi ossis occipitii oriuntur & per posteriora ascendentes oblique ad se versi circa cerebelli apicem ^l coeunt atque angulum efficiunt, quem nonnulli resectionum studiosi Herophili *λῆνὴ* sive *Torcular* fuisse arbitrantur. ^m In hos sub principium inferuntur Venæ jugularis internæ major & Arteriæ carotidis minor ramus per ⁿ secundum ac tertium occipitii foramina primo accumbentia, cranii amplitudinem subeuntes. Circa finem autem duos alios ex concursu suo educunt, quorum ^o alter sursum vadit, ^p alter deorsum labitur. Ille, tertius dicitur; hic, quartus. ^q Tertius longissimus omnium totam ^r superiorem sedem elatioris hujus membranæ processum perrepat, & cum eadem circa cristam finit. ^s Ab hoc sinu plures deinde propagines variatim sparguntur; *partim sursum*, ad cranii medietallium quod ipsius lamina intercluditur, tum pericranium membranam contententes: *partim deorsum*, ad processum superiorem elabentes: *partim versus latera*, tum in crassæ membranæ tum tenuis sedes propagatæ. ^t Quartus autem *sinus* è diverso brevissimus, inter cerebrum & cerebellum ad nates glandulamque pinealem recta fertur, in itinere furculos spargens, à superiore quidem parte unum, qui ad callosi corporis sedem sublimiorem vadit; ab inferiore alium, qui ad ventriculos secedit: ipse autem *truncus* juxta testes varie divisus glandulam pinealem petit, & bifariam scissus ventriculos anteriores subintrat, utrique ramum dispensans.

Sunt & alia vasa partim ^u à jugulari vena interna ejusque ramo anteriore minore que per crassæ membranæ latera propagata, cujus vestigia in syncipitis ossibus impressa egregie conspici supra jam dictum est, quo nomine & diligenter in cranii perforatione Chirurgis advertendum est, ne hic terebram nimis immergant, sed caute venarum sedes evitare discant. Est & ab arteriæ carotidis majore ramo soboles; tum exiles quædam per anteriorem sedem distributæ.

^v TENVIS *membrana*, λεπτὴ μὲνιγξ, ^w crassæ nullo intercedente corpore subiecta immediate cerebrum contingit tegitque, tenuior illâ ut appellatio ipsa fert, mollior & sensus exactioris. ^x Insuper autem valorum propagines à ^y crassâ derivatas in se suscipit, iterumque cerebro dispensat: quæ ut tutius progrediantur & citra ruptionis periculum substantiam cerebri pervadant, usquequaque variis anfractibus hoc nomine cerebro incisis se insinuat, & ad intimiores partes transmittit. Ex quo clarum est graviter nonnullos hallucinari, qui Cerebrum inflammatione posse corripri negant, quod & Galenus olim agnovit scripsitque, & experientia ipsa sæpenumero evidenter ostendit. Ad aphorismum enim quinquagesimum ultimæ sectionis, in quo Hippocrates eos quibus cerebrum syderatum est tridui intervallo obire docet, gravem potius inflammationem, quam nativi caloris extinctionem (quam alias Sphacelus significat) intelligendam esse testatur. Rationem addit, quod ab hoc nulla salutis spes super sit, quam Hippocrates

a, 10. 2. 1.
& G. G. vi.
de & c. 1.
T. T. in qua
totus con-
spicius est.
b, L. L.
c, F. F.
d, F. F.
e, I.
f, 10. 7. 1.
D.

g, 10. 6. 11
K. K.
h, I. I.
i, B. B.

k, 10. 6. 11
O. & P.
itemque 101
11. 1. M. O.
1, 10. 6. 1. 5.
m, 10. 11. 11
L.

n, 2. 1. 1. Z.
Z.

o, 10. 6. 1.
R. R. R.
p, Q. Q.
q, R. R. R.
r, T. T. T.
s, 10. 1. 1.
D. D. D.

t, 10. 1. 2.
C. D. E.

u, 10. 2. 1.
E. E. F.
x, A. A. A.
y, D. D. D.
z, C. C. C.

tamen promittit si hoc superaverint. ἐκείνοι δὲ σφακελιδοῦ ἢ ἐγκέφαλου, ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρῃσι δὲ πάλιν πάλιν αὖτὸς ἀποφύγουσι, ὑγίαιεν γένονται. Iam & nos ipsi per foramina cranii quæ terebris fiunt in capitis vulneribus, cerebrum cum dura membrana ita sublatum esse ut extra calvariam prominere sæpe vidimus: sedata mox inflammatione in suum locum rediisse. Quin & in apertis cadaveribus abscessus in ipsa Cerebri substantia repertos multorum gravissimorum authorum testimonio comprobatur.

CAP V T IV.

Cerebri, quatenus id in Veteri sectione se offert, historiam necit.

CERE-
BRUM.
Etyologia.



Substantia.

Magnitudo.

Figura.

Superficies.

Divisio.

Discrimen
Cerebri, &
Cerebelli.

Duplex Cere-
bri sectionis
ratio.

Antiqua.
Nova.

CONTINENTES supremi ventris partes vidimus, reliquum nunc est, ut & contentas inspiciamus. Continetur in cranio *Cerebrum*, Græcis ἐγκέφαλον dictum, à situ suo, ὅτι ἐν τῇ κεφαλῇ ἵθεται, quod in capite locetur. Veteribus Philosophis quibus medulla esse credebatur, cum adjectione μυελὸς ἐγκεφαλῆς, medulla capitecontenta ad differentiam ἢ ῥαχιδῶς, ejus quæ dorso comprehenditur & spinalis medulla hodie nuncupatur. Revera autem Cerebri substantia à medullari ossium plurimis in rebus distat, & id multis paralangis superat five temperamentum intuearis, five usum consideres. Calida enim hæc est, & ossium humectationi dicata: illa frigida, sensui motuique destina-
ta. Substantiam ergo habet sui generis peculiarem ac propriam, & nulli alteri parti nisi spinali medullæ, quæ quasi oblongatum cerebrum est, communem. Hanc etsi haud accurate definire nobis liceat, quod mens nostra ad formarum inspectionem hebescat: nonnullis tamen accidentibus circumscribere conveniet, si dicamus crassam esse, viscidam, glutinosam, albam, ac mollem. Magnitudo autem tanta, ut homo in respectu sui corporis ex omnibus animalibus maximam cerebri copiam sit nactus, teste Aristotele lib. 1. Histor. de anim. & mares plus quam feminæ, in qua re tamen haud subscribo. Id vero notandum est, quod tradit Fallopius lib. de Vulneribus se observasse in profundis capitis vulneribus, in plenilunio turgere cerebrum, subsidere decrescente Luna. Ex quo facile rationem licebit multorum petere, sed imprimis cur in lunæ obitu graviora eveniant incommoda ex ictu capitis, quod tunc temporis ob intervallum cranio duræque membranæ interjectum promptius venæ quævis abrumpantur. Quin & cur novilunii tempore epilepsiæ periodo quadam moveantur. Humores enim acres denegata humiditatis permixtione acridinem concipiunt, cerebrumque mox lacerant, sed imprimis si melancholia peccet adusta aut atrabilaris humor. Figura cranii formam æmulatur, adeoque rotundum est, sed circa basin aliquantulum depressum. Superficiem autem habet inæqualem, & hoc duabus de causis: Primo, ob anfractus & spiras intestinorum circumvolutionibus similes; deinde ob tubercula quæ per basin sparguntur, ex quibus quatuor priorem sedem circa frontem occupant, duo utrinque ad latera sita sunt in media basi, quinque circa occiput.

Dividitur ^b Cerebrum in tres partes, in ^c Cerebrum proprie sic dictum, ^d Cerebellum, & ^e principium spinalis medullæ. Varia enim Cerebri acceptio est, & modo ut jam sumpsimus, totum id insinuat quod cranii amplitudine comprehenditur, quomodo & Cerebri vulnera dicuntur, quæ quocunque loco inflata sunt huic substantiæ: modo anteriorem & majorem ejus partem, ut sumpsit Aristoteles lib. 1. Histor. de anim. cum bipartitum esse inquit omnibus animalibus, ejusque postremæ parti adjunctum id quod Cerebellum vocatur. Differt autem à Cerebello substantia, colore, magnitudine, figura, & cavitatibus. Substantia, quia mollius est: colore, quia candidius: magnitudine, quia triplo amplius: figura, quia rotundum: cavitatibus, quia his plenum.

Caterum antequam harum historiam enodandam fuscipiamus, merito monendum est, duplicem esse sectionis Cerebri rationem: unam, à Galeno traditam & à pluribus quoque Recentiorum observatam, puta Vesalio, Fallopio, aliisque: aliam noviter opera Constantini Varolii inventam, qui & ipse plures mox affecit indeptus. Inter utramque illud est discriminis, quod antiqua à superiore sede sectionis seriem auspicatur: nova, liberato cerebro ab ossibus omnibus, à basi initium ducat. Hanc & illam cum tenere plurimum interfit, quod sine antiqua Veterum Medicinæ Scriptorum, sed imprimis Galeni

Galenī lectio necessario obscura fiat: citra novam Veritas vix unquam pateat, de utraque sermonem instituemus à Veteri initium petentes.

* Cerebrum ergo ab ^b elatiore crassæ membranæ sive falciformi processu bifariam, in ^c dextram ^d sinistramque partem dividitur, quæ foris ^e spiris anfractibusque inæquales intestinorum sibi implicatorum situm haud inepte expriment. Secta hæc substantia cultello duplicem ostendit naturam; *aliā*, quæ continet & colore subcinericia est; *aliā*, quæ continetur & alba. Illam, *corticem* vulgo; hanc, *medullam* vocitant: illa, mollior est; hæc, dura. ^f Sublato autem mox processu qui sic medias sedes dirimit, ^g compressisque leviter ad latera his partibus in fundo divisionis ^h candida quædam substantia emergit, quam *Corpus callosum* *πυλωειδὲς σάγμα* appellant, quæ medulla cerebri est utramque partem committens.

ⁱ Abtruncatis autem his duabus partibus & intacto corpore, Cavitates duæ occurrunt, quas ^k *Ventriculos cerebri* *πυλίας ἑγκεφάλου* Galenus appellat, in utroque latere unus, qui vulgo *Anteriores*, ab aliis *superiores* dicuntur à situ, relato ad quartum qui his à tergo est; vel tertium, qui substat. Nam si studiose rem tecum reputes, ad omnes locorum differentias mediam occupare sedem in cerebri corpore observabis. Rectius ergo dextrum sinistrumque dixeris, qui ^l septo quodam distinguuntur, quod superne calloso corpori, inferne fornici unitur. Laxa est substantia & rugosa; at explanata claræque luci vel ardenti candelæ exposita vitri in morem transparet, unde & nomen invenit, ut *septum lucidum* vel *speculum* dicatur. Cæterum ipsi ventriculi cum insigni sint amplitudine conspicui, priore posterioreve parte latefcunt magis, & obtusa rotunditate se circulant; in medio contra, stringunt se & angustantur. Versus inferiora quoque declivitate quadam ad se versi, ad tertium ventriculum properant. Succinguntur autem interna parte *membrana* quadam tenuissima, quæ male à pluribus negata, ab infundibulo huc ascendente originem derivat, sensuque pollet exquisito. Inter hos ventriculos & forniciem ^m *plexus quidam* ex infinitis minimorum vasculorum complicationibus ope tenuis membranæ suffulcantis contexti reperiuntur. Vasa hæc primo quidem ex iis sunt, quæ à quarto sinu huc contendente offeruntur cum in tenuissimas propagines dissolvitur: deinde ex *farculis* quos arteriæ Carotidis major ramus digerit, & commiscentur anastomosibus cuncti cum ramulis Vertebralis arteriæ. Vocantur hi *plexus* (duo enim sunt, utrinque unus) *χοροειδὴς πλέγμα* & *Choroides* vel *Chorioformes*, assimilati *χορῶ* membranæ forum involventi in utero. ⁿ *Fornix* autem *καμάρον* dictus, à forma qua testudinis instar tertio ventriculo incumbit, sub calloso corpore cum quo substantiam habet similem situs est. Amplius hic & latus est, quàm posteriorem duorum ventriculorum sedem respicit, at mox paulatim angustatus in apicem tenuem definit, ut sic triangulum Isosceles sive æquicrurum sed longioribus base cruribus referat. Superna sede se attollit & convexitate protuberat: inferna, cavus sinuatur.

^o *Tertius ventriculus* sequitur, quem si recte intuearis profecto à dictorum natura impendio alienum esse fateberis: imo hercle concursum potius eorum quam peculiarem sinum dixeris. Vbi enim coeunt postica sede, cum paulo profundius, quam priore descendant, vallem quasi exstruunt. In hoc duo sunt *meatus*; ^p unus anterior, insignis, maximeque conspicuus, qui in cerebri substantia exsculptus ^q recta deorsum versus infundibulum fertur: ^r alter, in posteriora porrectus sic angustus ut Vesalius interdum reperiri negit, sub ^s testibus & ^t natibus cerebri in quartum Ventriculum delabitur. Circa hunc rima quoque est, quam Columbus Vulvæ muliebri assimilat.

Ex priore ergo ad infundibulum via patet. Est autem ^u *Infundibulum*, quæ & *Pelvis* quibusdam, cavitas quædam sub tertio Ventriculo ex membrana cerebri tenuiore composita, quæ sensim angustior reddita infundibulum, quo utimur ad transfundenda liquida in vasa strictioris orificii æmulatur. Definit autem in ^v glandulam quandam eadem tenui membrana obvelatam, quæ Galeno innominata mansit: cæterum nostris *Pituitaria* dicitur, quod credatur excipere pituitam destillantem à cerebri ventriculis. Sita est autem in ^w sinu ossis cuneiformis quadrato qui in sellæ medio exsculptus est, à quo quatuor alii excurrunt, partim versus ^x priora ad secundum foramen ejusdem ossis in oculi sedis radice positum; partim ad ^y posteriora ad inæquale & asperum foramen, quod ejusdem ossis quintum est. ^z Circa glandulam à lateribus dicti sinus plexus quidam

dam membranofus confistit, infinitis arteriarum furculis retis instar complicatarum exstructus, qui omnes originem habent ^a à majore carotidis arteriæ ramo, qui per foramen proprium in osse temporum insculptum cranii amplitudinem ingreditur. Vocatur hic plexus *Rete admirabile* Recentioribus: Galeno, διαιρούμενος πλέγμα, hoc est, *plexus retiformis*. Figuram ejus non rectius animo committes quam si piscatorum retia quamplurima extensa & inter se confusa mente conceperis. Quanquam autem à doctissimo Vesalio negatum sit esse quale à Galeno descriptum reperimus, quem nec hominis cerebri sed bovis; nec exacte vidisse, sed delusum visu profitetur: omnino tamen id statuendum est, in hominum quoque cerebri plexum hunc reperiri, quantumvis non negemus in vitulorum boumque capitibus multo majorem, adeoque & evidentiorum.

^b Circa secundum ac posterius foramen quâ in quartum itur, corpora quædam occurrunt non admodum insignis magnitudinis, inter quæ primas meretur partes illud quod ab Anatomia proceribus κωνάρεον vocatur sive ^c *Glandula pinealis*, ducta appellatione tum à substantiæ tum figuræ ratione. Substantia enim glandulæ est nonnihil duriuscula, & figuræ nuci pineæ aut turbinatæ similis, cujus apex sursum spectat, basis deorsum. Sitæ ergo est hæc glandula in principio canalis illius qui posteriorem ventriculum cum tertio conjungit, & prout cæteræ glandulæ omnes venarum divaricationibus tributæ sunt, sic hæc sinum quartum ad duos priores ventriculos contendentem sustinet ac suffulcit. Glandulæ pineali ex utraque tertii ventriculi parte contiguæ sunt particulæ quatuor, rotundæ ac eminentes; ex quibus priores, ^d *Testes ὀδύμοι*: posteriores, ^e *Nates & Chmes*, Græcis similiter γαστήρα appellantur. Sunt autem portiones cerebri tenues & globosæ, imaginem eorum à quibus nomen acceperunt representantes, quæ meatum ducunt ex tertio ventriculo in quartum patentem.

^f Quartus autem hic *Ventriculus* inter Cerebelli inferiorem partem & spinalem medullæ superiorem situs est, omnium ventriculorum cerebri minimus, qui ad teretem figuram compositus sensim in acumen se stringit, unde & ab Herophilo scriptorio calamo comparatus fuisse æstimatur.

CAPUT V.

Cerebelli, ejusque partium juxta Veterum dissectionem, enarratio.

CEREBELLUM.
Erymologia.
Juxta.



Substantia.
Magnitudo.
Forma.
Color.
Partes.

Globi.
Processus.

Suturæ.

CEREBELLUM altera ac posterior Cerebri pars est, à Græcis πυρρομεφαλὲς dictum, quod Cerebro velut appendix cohæreat. ^g *Situm* enim est à posteriore ipsius sede in occipitio, cui duarum membranarum interuentu quibus involvitur, cohæret. Differt autem à Cerebro pluribus in rebus, idque haud leviter; substantia inquam, magnitudine, forma, cavitatibus, & colore. Substantia enim ejus qua spinali medullæ circa basin originem confert, durior multo est: & magnitudo vix tertiam partem conficiens: forma autem latiore, quam rotunda; tum sinibus nullis intus excavata; colore flava & cinerea. ^h Constituitur autem ex quatuor partibus, quarum ⁱ duæ laterales sunt, dextra & sinistra: ^k duæ mediæ, anterior & posterior. Illæ, rotundæ sunt sphaerarum in morem: hæ, teretes, & si simul contempleris, velut in orbem aguntur. Illas, *Globos cerebelli* haud incommode vocaveris: has, Veteres *Vermiformes processus*, σκωληκοειδὲς ἐπιφύσεις dixerunt. Sunt autem apud eosdem celeberrimi; ex quibus alter anteriorem quarti ventriculi sedem, alter posteriorem apice suo respicit. Figuram enim habent vermium qui cariosa ligna depascuntur, multipliciter orbiculati, ex altera parte latiores, altera strictiores. Strictæ ergo sinum respiciunt, qui inferiorem sedem cavat, & cisterna à nonnullis dicitur, estque elatior sedes quarti ventriculi, cum reliquam sedem tenuis membrana obvelet.

CAPUT VI.

Spinalis medulla, secundum Veterum placita, descriptio.

LERTIA pars Cerebri, ejus inquam substantiæ mollis & albæ, quæ toto cranii complexu coercetur, *Spinalis est Medulla*, improprie sic hodieque dicta ob erroneam Veterum opinionem, quibus à medulla ossali nulla propemodum in re distare credebatur. Græcis ergo *μυελὶς ἰσχυρὴ* sed & *ναισιέει* dicitur, sive *dorsalis*. Vtunque vocetur, ejus appellatio ambiguitatis haud est expers, sed sæpe ut apud Galenum & plerosque omnes Antiquos Anatomicos, illam substantiam denotat, quæ cranio veluti processus quidam cerebri oblongus per occipitii foramen primum & amplissimum egrediens in totam vertebrarum dorsii seriem ad ossis usque coccygis sedem, cum itinere semper decrescens, labitur. Interdum ut ab iis usurpatur, qui falsitate præcæ sectionis deprehensa & abolita novam substituerunt, pro ea tota sumitur cujus pars adhuc cranii terminis contenta ab Antiquis ignorata fuit. Medulla ergo spinalis commode situs ratione bifariam dividitur, si aliam quidem Cranio, aliam spina vertebrisque comprehensam dixeris. Quæ tamen verà ejus origo sit & quantulacunque illa portio, quam Cranium tegit, sequens enarrabit Caput: nunc enim sic ejus historiam persequi animus est, ut Antiquis illis Refectoribus perspecta erat.

SPINALIS medulla.

Etymologia.

Hemiplegia.

0.
le.
9.

Cæterum spinalis medulla ex Galeni sententia lib. vii de Usu part. cap. x, ex quarto cerebri ventriculo tanquam principio suo digreditur, cum cerebri non minus quam cerebelli sit quædam productio; at ubi jam ad amplum occipitii foramen pervenit, recto tramite per spinam fertur. Substantiam ergo & Cerebri nata est, non tamen ut illa duplicem sed medullarem tantum: nec ita mollem sed duriusculam, ut adeo alba sit & compacta, quamquam nec sibi ipsi ubique similis, cum progrediendo semper indurescat. Est & gemina, divisa velut longa sectione in medio usque ad lumborum vertebra, quam bipartitionem coëctio tibi oculis subjiçiet facile, cum citra dilacerationem divellet. Sed & animo si velis hanc concipies, dum advertas causam quæ alterutrius lateris paralyfin impingit. Cingitur hæc membrana duplici, non secus ac Cerebrum unde oritur. Vna, quæ immediate tangit à tenui meninge protensa, & sese inter utramque partem infinuans sola seorsim involvit. Per hanc vasa excurrunt, quæ vel nutritioni ipsius vel vitæ prospiciunt. Altera, quæ hanc obtendit & à crassa membrana proficiscitur. His duabus involucrum circumjicitur ex Galeni sententia, enatum à ligamento vertebrarum corpora jungente. Cæterum id observandum est, priores duas quæ à cerebri meningibus descendunt, nullo inter se, quemadmodum ubi adhuc in calvaria sunt, intervallo distingui, sed sese contingere. Figura teres est, sub principium amplior, sensimque in apicem, ubi nonnihil processit, attenuatur. Tota autem continua cum sit, circa finem tamen in plures funiculos ac quasi filamenta quædam caudæ equinæ speciem referentia dissolvitur. Educit autem similiter ac Cerebrum (quanquam hercle, ut dicturi sumus, ipsa potius sola ipsius portio superior) nervos, qui cum innumeri sint, ab Anatomicis tamen in numerum foraminum vertebrarum communium, per quæ ex spina egrediuntur, sunt digesti, ut adeo tot sint conjugationes quot vertebrarum foramina. Quo autem pacto hi nervi ingrediantur, & egressi distribuantur in singulas partes, abunde satis in superioribus videmus esse complexi.

Crura.

Membrana.

Figura.

Funiculi.

Nervus.

CAPVT VII.

Cerebri eam diffecandi rationem, quam Recentiores invenerunt, primum proponit, mox partium ejus beneficio inventarum aut aliter comparentium historiam nectit.

*Nova sessio-
na nullius.*

*Differen-
tia.*

*Caput quale
requiritur.*

*Preparatio
caput ad se-
ctionem.*

*Sectionis in-
strum. unde
faciendum.
Dura mem-
brana.
Sinus qua-
tuor.
Tertia mem-
brana.*



IC ergo Cerebrum se ejusque partes, si Galeni Veterumque præceptis insistentem sectionem aggressus fueris, habent: at si Recentiorum quorundam inventis placide acquiescens ab inferiore sede auspicaberis, & plures primo partes quam enumeravimus, & elegantius nonnullas ac aliter se oculis objicientes tam figura, quam magnitudine, situ, atque origine haud dubio deprehendes. *Plures dico partes*, cum præter Vermiformes Cerebelli processus, & Pontem (sic ab inventero Varolio vocatum) intueri detur: *elegantius*, Infundibulum & glandulam pituitariam, tum rete admirabile. *Aliter se habentes, in figura* quidem, tertium & quartum ventriculum: *in magnitudine* autem, duos primos & anteriores dictos sinus: tum *in situ* nates & testes, nuncupata corpuscula: tandemque *origine* spinalem medullam, duo prima nervorum cerebri paria, tum quintum & octavum olfactui famulans. In his ergo discriminis utriusque sectionis cardo vertitur, quæ omnia fusiore nunc stylo persequemur, sectionis seriem una cum partium quæ se aliter ac in vulgari habent, natura describendo.

Ad hanc ergo administrationem Caput quam recentissime abtruncatum eligatur, cui si desit forte, Vitulinum aut Ovinum substitutes, cum præter magnitudinem illorum corpusculorum quæ testes natesve dici commemoravimus, nullum se monstret discrimen ab humano. Quin si meum non detrectes consilium, etiam atque etiam in his te prius exercebis quam humani capitis sectionem aggredieris, quod in his pleraque evidentiore quadam magnitudine sensibus egregie se ingerant. Vtrumvis autem habeas, ossa primum solertissime separabis, id diligenter animadvertens ne qua parte subjectam crassam membranam viroles, cum qua nervos opticos iisque appendos oculos in suis sedibus relinquere te velim. Cæterum ut id in expedito tibi sit, quanquam hercle citra laborem & difficultatem nequaquam transigi potest, primum omnium communibus illis tegumentis una cum musculis cranio infiltratis, tum maxilla inferiore ablatis, orbiculatam calvaria sectionem institues, ferra qua Chirurghi nostri in abscindendis gangræna tabidis membranarum utuntur, transversim in ipso nasi ossium medio injecta. Deduces autem mox per conterminum oculorum ambitum supra ossis jugalis sedem mediumque ossium temporalium ad occipitii inferiorem regionem, rursumque repetens per alterum latus principii tui terminum, sic circumcirca ferram promovebis. Inter ea temporis studiosè caveas ne qua altius forte immergatur, neve membrana subfrata ossi læsa operi tuo ignominiosam noxam impingas. Hac sectione rotunda expedita aliam auspicaberis in basi cranii transversim per mammillarum processuum apices. Inde injecto cultelli manubrio quanta poteris summa diligentia conaberis ossis hanc partem (quæ occipitii ossis pars est posterior) liberatam à reliquo à supposita membrana levare. Hoc enim ablato jam liquido tibi postica cerebri pars ipsūque adeo Cerebellum patebit. Reliqua autem ossa haud magno ingenio studioque deinceps separabis, dummodo laboris moræque nonnihil fueris patiens. Egregiam hic operam præstabit ferra partim, partim & forfex excisoria, quibus nonnunquam & cultellum acutum addas, ubi os tenue occurrerit, qualia circa oculi orbitam se offerunt. Denu- dato sic ab inferiore sede cerebro quid promptius erit, quam & ab elatiore à cranio se- jungerè, cum injecto cultello & sursum deorsumque acto facili prorsus negotio à se disparentur?

Cerebro hac ratione cum suis membranarum è calvaria exempto *dura* ^a primum *membrana* ^b substantia consideranda erit, tum sinus inspiciendi; in quibus ad memoriam revocanda omnia, quæ de his paulo ante sunt tradita. Mox inverso cerebro basique sursum spectante ^c crassam membranam decussatim interfecabis, ad latera portionibus repositis. Circa tamen nervos quicquid ejus est omne relinques, ne forte hi disrumpantur, eorumque postea ortus te subterfugiat. Eodem modo *tenuem* quoque auferes, cujus ope ^d anterior

anterior spinalis medulla pars cerebro, posterior cerebello connectitur. At enim hic plures tibi illico patebunt partes, ipsumque adeo ^a Cerebrum inferiore sui facie conspiciendum, tum ^b Cerebellum cum vermiformibus processibus ac ipsa ^c Spinalis medulla. Præter hæc priore sede ^d processus cerebri duo quos mammillares vocant, tum ^e oculi à quibus mûculos cunctos removebis, ut à solo optico nervo dependeant liberi. Inter hos progreditur ^f oclavum par nervorum, quod odorum receptioni dicatum est. Inde ^h Arteriae carotidis ramus major utrinque, & rete admirabile spectabis, in quorum medio ⁱ glandula pituitaria cum ^k infundibulo suo est sita. Hinc ^l secundum nervorum par contempleris, & ^m Vertebralem arteriam quæ per transversos vertebrarum cervicis processus ascendens sub ⁿ spinali medulla cum conjuge ^o unita ad anteriora capitis ^p excurrit, ac ^q iterum bifariam divisa ^r rete admirabile cum carotide arteria efformat. His sic obiter lustratis accuratius mox omnia rimanda sunt.

Primum ergo investigandus verus spinalis medullæ ortus, qui sese haud difficulter in conspectum proferet, reflexa eadem versus anteriora. Non enim in occipite ut alias creditur, sed anteriore magis cerebri parte exoritur, efficta ex quatuor veluti radicibus, quarum anteriores duæ majores sunt, & ea sede ex cerebro enascuntur, quæ circa Ventriculorum fere medium consistit; duæ posteriores minores, ex cerebelli inferiore parte enatæ. Progredientibus autem versus posteriora illis, hæc occurrentes junguntur, sicquæ spinalem medullam producant, ex qua ut uno sic vero principio omnes quotquot sunt corporis nervi emergunt. Circa truncos posteriores processus occurret nonnullus, qui in veteri sectioni prorsus se nequaquam prodit, à Varolio Pons Cerebelli dictus. Hic per transversum in anteriora & inferiora fertur, sicquæ spinalem medullam amplexatur, ut scripsimus superius primum par gulam constringentium Oesophagi principium amplecti.

His indagatis exacte nervorum, quos vulgus ad Cerebrum refert, originem investigare expedit. Primum enim par non ut inquitur Prisci ex cerebri basis anteriore sede oritur; sed ex radicum anteriorum spinalis medullæ superiore parte, qua ventriculorum cavitatem respiciunt. Similiter secundum ex eodem fere loco, quod in suo exortu sic unitur, ut angulum communem efficiat. Quintum ex ponte Cerebelli prodit, qui cum Veteres fugerit, & hujus parvis verum exordium latuisse eos necessum est. Oclavum similiter ad extrema cerebri latera ea sede, quæ supra auditus foramina est. Cætera vel ex Vesalii quoque & Columbi mente à spinali medulla egrediuntur. Quis autem omnium progressus sit, quæque distributio, supra libro septimo comprehendimus.

Nervorum principis dimissis Cerebellum auferendum est, ut quartus ventriculus pateat, qui inter ipsius basin & superiorem ac posticam partem spinalis medullæ ex eorum concursu enatus reconditur, cum revera non sit aliud quam cavitas quædam teres ex duobus sinibus semicircularibus efformatus. Superiorem ergo ejus portionem Cerebellum: inferiorem, Spinalis medulla confert: ac, si rem æqua metiaris æstimatione, ventriculi nomine prorsus indignus est, cum in ipsa cerebri cerebellive substantia non sit situs, neque primaria intentione à Natura exsculptus, sed ex corporum dispositione necessario talis emergat.

Remoto deinde Spinalis medullæ principio, ablatis autem penitus nervis opticis una cum demonstratis, corpuscula illa quatuor, Nates, Testes, & Pinealis glandula, non tamen ut vulgo in ipso Cerebri corpore sed extra tibi apparebunt, faciliq; agnosces industria principia esse spinalis medullæ, ut in usu investigando sudorem haud moveas. Testes enim portiones sunt radicum medullæ à Cerebro enascentis: nates autem earum, quæ à Cerebello derivantur. Foramen deinde tertii ventriculi per quod ad quartum viam esse tradiderunt, non aliud est quam intervallum quod ex concursu quatuor horum corporum sphaericorum ob figuræ necessitatem sequitur & formatur.

Tandem Ventriculorum cerebri inspectio restabit, qui ut pateant longa tibi & profunda sectio in basi utrinque facienda erit, labraque sectionis ad latera conjicienda aut distrahenda. Sic manifesto comperies, quoad numerum duos tantum esse Ventriculos: ratione magnitudinis, ampliores quam vulgo creditur: at figura, cerebri formam sequi. Quin si advertas majori industria unicum esse affirmabis, distinctum septo lucido. In

Partes Cerebri ablatæ membracula conspiciantur.

Spinalis medulla versus ortum.

Pons Cerebelli.

Nervus Cerebri dexterius versus ortum Primi.

Secundi.

Quinti.

Oclavi.

Quartus ventriculus quid sit.

Nates. Testes. Pinealis glandula.

Foramen posterius tertii ventriculi.

Ventriculi anteriores.

Septum lucidum.

his con-

Plexus retiformis.

his considerabis plexus retiformes, qui ex membrana & vasis varie inter se complicatis, tum (quod diligenter notandum ex observatione Varolii) innumeris glandulis componuntur.

Dextra & sinistra cerebri pars. Callosum corpus.

His visis invertendum cerebrum est & ejus superior pars diducenda, quæ falcis interuentu (est hic processus superior duræ membranæ) bifariam scinditur. Circa medium utriusque callosum corpus interjacet, quod utramque necit.

C A P V T V I I I .

De Actione & usu Cerebri.

Uterque meningis Cerebri & utrumque laterale.



VM omnis quæ de rerum naturalium actione usuve instituitur disquisitionis principium vera sit ac perfecta ipsarum prævia inspectio, quod animus noster in causarum investigatione iis insistat & utatur notionibus, quas sensus mentis satellites obtulerunt; neminem esse statuo, quin tacita protinus vi quadam intelligat majores nostros utcanque summos & in Philosophia exercitatisimos Viros graviter in Cerebri usu hallucinatos esse, quod uti monstravimus pleraque omnes ipsius partes vel imperfecte vel false admodum ob ignotam veram dissecandi rationem cognoverint. Quamobrem & dum ad hanc nos disputationem componimus, ab eorum vestigiis merito discedendum erit, & Recentiorum potius sequenda inventa, quorum ingenio ut primum vera dissecandi Cerebrum ratio in lucem eruta est, ita & occasio data fuit accuratius subtiliusque plurima investigandi. Vtunque autem necdum omnia sic clara reddita sunt, ut omnes superasse tenebras videantur: credendum tamen fore aliquando qui in hanc rem velut omnium præclarissimam animum diligentius intendentes, quæ nunc mentem nostram fugiunt, clara ac manifestiora reddant. Interim dicamus quæ in hac difficillima resectionum parte nostro sumus assequuti studio, exordium ab ipsa Actione desumentes.

Actio Cerebri.

Graves hic mox disceptationes inter Medicos Peripateticosque Philosophos se offerunt. Hi enim cordis refrigerandi gratia conditum, ex duce suo Aristotele lib. 11 de Partib. animal. cap. VII, probare conantur: illi, spirituum animalium generandorum nomine factum non instrenue profitentur. Ego etsi haud ignorem quam longe inter se distent summi hi Viri si primum eorum opiniones recitari audias; non tamen sic sententiis quam verbis à se mutuo mihi dissentire videntur. In eorum ergo concedo placitum, quibus creditur Galenum rem ipsam duntaxat; Aristotelem vero etiam modum indicasse. Ille enim spiritus animales ex vitalibus in cerebro elaborari statuit: hic, modum simul exprimit, quo generatio illa perficitur. Dum enim beneficio arteriarum carotidum tum jugularium venarum spiritus & sanguis in duræ cerebri membranæ sinus effunduntur, temperamento cerebri quod quam cordis frigidius est temperantur, aptique animalibus functionibus (sensu hæc motuque absolvuntur) fiunt. Manifeste id tibi licebit notare, ubi vel vino vel internis causis cerebrum incaluerit, in quo subito nec mens sibi constat; errantque sensus ac motus labascunt. Nec tamen quod quibusdam visum est secundum substantiam quædam hic vitalium spirituum fit mutatio, quæ totam horum naturam evertat: sed temperamenti solius alteratio quædam perficitur. Quanquam certe credam quoad substantiam attenuationem quoque aliquam accedere, cum nudos magis liberosque ab omni concreta materia, atque vitales spiritus qui sanguini adherent, usu experiamur. Cæterum ipse Aristoteles utcanque à multis hic acerbè reprehendatur, qui obscuritatem ejus exprobrant, prudentissime tamen meo judicio egisse videtur, ut qui modum cum re breviter sic explicare contendit. Nec tamen ita obscuritatem ipse suis verbis vel ambiguitate vocum vel impropria quadam dicendi ratione affert, quam relinquit iis quibus legendi Aristotelem & intelligendi ratio non satis est perspecta. Nam cum loquendi formulas quas ipse habet, tum à nostris hominibus tum imprimis Galeno diversas acerbè nimis subito elidunt, næ illi faciunt ut omnia intelligendo nihil intelligant. Quam enim clarus sit ac quam præclaram sententiam de Cerebri actione protulerit, aperte satis ex laudato loco colligitur, lib. 11 de part. animal. cap. VII, in quo clarissime edocet Animæ nostræ officia muniaque omnia caloris beneficio obiri,

ficio obiri, adeoque & motum ac nutritionem calore absolvi. Calorem autem hunc cum in corde stabiletur ut in fonte, propterea & calidissimum ibi esse: sed cum in aliis aliisque tum partibus tum actionibus mediocritas quædam requiratur, momentum quo hanc assequitur, contrarium postulare. Necessario ergo pars aliqua (talis est Cerebrum) condenda erat, quæ calorem cordis ferventem, id est vitales spiritus temperaret, cujus ope reliquæ actiones ut motus ac sensus absolverentur. Ergo cum Cordis refrigerandi gratia Cerebrum conditum scribit, multa simul non minore elegantia quam brevitate explicat, usum primo, deinde modum, ac tertio materiam. *Usum* quidem, quia Cordis gratia factum: *Modum*, quia refrigerat: *Materiam*, sive subiectum, Calorem. Sed videamus quam apte etiam Galeno assentiatur. Calorem inquit cordis refrigerari: at calor hic ubique animæ instrumentum ab eodem vocatur, & hoc ipsum Spiritus alibi dicuntur esse: qui ergo clarius Vitales Galeni spiritus indicasset, cum calorem cordis vocat? Sed & qui melius? cum sic causam illius refrigerationis simul includat, quod scilicet tam ferventem calorem actiones omnes haudquaquam perferant. Galenus tamen strictius hunc usum persequitur, dum sensus motusque gratia fieri id contendit: explicat enim quæ sint actiones illæ, quæ refrigerio cerebri indigent. Ex his concluditur, partibus omnibus sensu motuque præditis facultatem hanc spirituum animalium in Cerebro genitorum ope offerri, haud secus ac Vita ipsa eorum subsidio qui in corde residentes Vitales à Medicis propterea appellantur. Cæterum ut hi ipsi sua ipsorum substantia Arterias pervadunt, omnesque, ad quas transmittuntur, adeunt partes, sic & (superius libro VII, cap. I, id probatum est) animales spiritus nervorum penitissimas partes cum vitalibus sint tenuiores fulminis instar pervadunt, ac temporis momento penetrant. In vivo namque corpore partes quævis apertæ sunt ac raræ ob calorem à corde indefinenter suggestum & pervadentem omnia atque attenuantem, quæ postea ob frigiditatem concidunt mox in morte ac stringuntur. Cerebrum ergo canalibus quoque eget Nervis, non aliter atque Cor Arteriis, quibus idcirco abscissis aut interceptis omnium animalium functionum perniciēs subsequitur.

Spiritus animalis in substantia nervi non videtur.

Intueamur nunc structuram Cerebri, ac videamus ut his actionibus satisficiat. *Primum in cranio situm est*, ut quam vicinissimum esset sensuum instrumentis, à quibus sensibiles species offerendæ erant, cum Cerebro dignoscendi discernendique eas facultas sit tributa. At enim cum sensuum organa supremum requirant locum, isque à cranio occupetur, quemadmodum id sub principium huius libri adstruximus, merito & Cerebro hic assignandus erat. *Figura* ergo & ipsa crani est, quod peculiarem per se nullam requirat actionis suæ gratia, quanquam ut audiemus postea rotunda quam plurimum juvet accommodetque. Est autem *hominis* inter cætera animalia *maximum*, quia maxime sanguineus est, adeoque & maxime calidum cor habet & refrigeratione majore indiget. *Substantia* vero ipsa *sui generis est ac peculiaris*, quod cum præcipuum generationis spirituum organum ipsa cerebri sit substantia, & vero hæc ab omnibus aliis diversa, hanc nulli communem esse decuerit. *Crassa* autem est, ne fluere: ne tamen vicissim nimis dura non reciperet specierum impressionem, *glutinosa ac viscida*. *Alba* autem, quia sanguinis expertus: & hoc, ut frigidior esset aliis omnibus corporis partibus, quo calore suo moderato vitalium spirituum calorem remitteret, ut videmus à calore mediocri plumbi eliquati æstum temperari. *Duplex* autem hæc substantia merito est, *partim mollior*, ut ea quæ Cerebro sic dicto strictius; *partim duriuscula*, ut quæ Cerebello competit. Molliores enim nervos & humidiores ut recte Varolius atque ingeniose asserit, Opticos sive Visui dicatos necesse erat, quod Visio mediante humido absolvatur: duriores adeoque siccos magis, Acusticos sive Auditui inservientes, quod quæ sonum apprehendunt organa aliquam ariditatem exposculent. Hinc adeo & illi ex Cerebro; at hi è contra ex Cerebello originem suam ducunt. Quia tamen haudquaquam conveniebat diversa omnimodo nervis qui omnes uni communi functioni deferunt, principia constituere, ab utroque alia quædam substantia enascitur, quæ quia per Spinam se penetrat, *Spinalis medulla* cognominatur, tamen bene magna ipsius portio calvarie amplitudine adhuc coërceatur. Hæc omnium totius corporis nervorum unum ac commune principium est, quanquam ex gemino corpore ac geminam uti diximus originem capiat.

Vitis cerebri.

P p

Cæterum,

Cæterum, cum hæc substantia sic mollis ac tenera infinitis opportuna fuisset periculis, nisi firmata aliquo corpore imperum omnem declinaret, *Membranis* eam solers Natura involvit, quas ipsas postea cum nec sic satis tuta in saltibus aliisque corporis violentis motibus foret, cranio quaquaversum alligavit & quidem præsertim uti firmius id esset, trajectis quibusdam fibris per futurarum compagines. Harum membranarum *duæ sunt*, ut altera quidem, dura scilicet, contineret nec rumpetur, unde crassior facta est: altera immediate tegetet, ne cerebrum pars mollis ac tenera diffunderet; ne tamen alicubi offenderet, mollis, tenuis, lævisque exstructa fuit. Sed & illa sinibus dicata crassitiem exposcebat: hæc ductus tantum exiliores per cerebrum spargit, per quod uti tutius ferantur comes ipsa varios *anfractus* in superiore ipsius superficie exsculpsit, quibus sese ubivis insinuat. In sinus autem sanguis arteriosus venosusque effunditur, qui mox confusus & Cerebro alimentum & spiritibus animalibus generandis materiam suppeditat. Quicquid enim crassi ac fibrosi in eo est, in nutrimentum cedit: at vitales spiritus exhalantes in Cerebri substantiam attenuatique, mox ac refrigerati fuerint in animales facessunt, nervisque postea transmittuntur. *Sinus hi quatuor sunt*, ex quibus *primi duo* oblique ascendunt, cum à lateribus utrinque ipsos exstruenda vasa ascendant, quæ in communi sede cœunt: *reliqui* excurrunt partim versus superiora, ut *tertius*; partim ad inferiora, quemadmodum *quartus*. Cum autem quaquaversum propagines multiplices disseminant, quam commodissime sane omnibus cerebri partibus prospectum fuit. Duo enim priores cerebri quidem posteriorem tantum at totam cerebelli substantiam nutriunt, spiritibusque perfundunt; tertius vero, superiorem; sed quartus, mediam ac inferiorem sedem. Alii rami Venarum Arteriarumque qui cranium subeunt, nec nutriunt cerebrum nec vitam largiuntur, quemadmodum neque horum quæ diximus propago ulla extra cerebrum ad alias partes defertur. Ad crassam enim membranam à minore jugulari vena, tam Carotidis majore ramo vasa accedunt.

Excrementa cerebri.

Ventriculi duo.

Cæterum ut in quavis nostri corporis coctione excrementa quædam separari necesse est, quæ tanquam inutilia primum colliguntur, mox detruduntur: sic eadem ratione in tertia concoctione cerebri, imprimis quia frigidior pars est, vel potius minus ac aliorum caloris particeps, coacervari plurima necessitate quadam colligitur. Sunt hæc crassa viscidaque (Mucum vulgus Medicorum appellat) quæ uti coacerventur alicubi sapiens Natura *Ventriculos duos* (revera enim duo tantum sunt) efformavit, è quibus postea per anteriorem tertii dicti ventriculi meatum, tum per pelvim sensim ad glandulam pituitariam transmittit, à qua ad inferiores inde partes stillando deducitur. *Ac si moderate quidem* excrementa hæc *converantur*, oculis affluunt, pro musculis: tum nervis, pro eorundem principiis, ne in motibus partium quasi perpetuis exsiccentur, irrigandis: his enim munis etiam abusu quodam abluantur, maxime tamen necessaria videbantur. *Iam si abundant*, vel errore externo aut debilitate cerebri, ad spongiosi ossis sedem nonnunquam (frequentissime id adeo hyberno tempore frigoris gratia evenit) affluunt, ubi obstructions foraminulorum inferentia Gravedinem excitant. At enim cum promptum foret ut vel sua natura quæ viscida est, vel mora diuturniore in cerebro tenacior materia hæc reddita ventriculorum parietibus, tum inferioribus cerebri sedibus adhereret, sicque irremediabiles concitaret obstructions, provida in cunctis Parens plexus Choroides ex arteriis infinitis efformavit, quarum tum motu tum calore ac spiritu attenuata sensim deturbantur. Quia etiam excrementa haud unquam in suum concedunt locum, sed vel expultricis facultatis vi qua truantur, vel attractricis ut trahantur indigent, *Glandulis* iidem hi plexus pleni sunt, quarum substantia, vel magni illius Hippocratis testimonio, quocunque corporis loco inveniat seroforum humorum expurgationi dicata est. Sunt autem arteriæ hæc glandulaque membranulæ tenuis, densæ tamen ope connexæ, ut à disruptionis periculo cui tenuitatis suæ gratia objectæ erant, vindicarentur. Quemadmodum autem à viscositate discrimen erat, ne obstructio oboriretur: sic ubi acridinem excrementa hæc suscipiunt, epilepsiæ vellicato nervorum principio quod circa spinalem medullam est, periculum imminet.

Reliquarum partium quæ in Cerebro sunt, usus ex dictis facile colliguntur, ut demonstratione prolixiore haud egeant, dum veram modo dissecandi rationem & noris probe

probe ac studiose sequaris. *Testes* enim & *Nates* portiones tantum esse radicū medullarū à cerebro tum cerebello enascentis, ipsa inspectio docebit: *foramen* autem *posterius tertii ventriculi* non aliud quam meatum ex horum globosorum corporum concursu enatum ipse conjicies. Vbi enim cumque quatuor sphaeræ sese contingunt, in medio intervallum quoddam spatiumque interjici nulli nec dubium est, nec obscurum. *Glandula pinealis* his adstans glandula est divaricationem sinus quarti sustinens, ac versus anteriora deducens. Ipse autem *quartus Ventriculus* & extra ipsam Cerebri substantiam consistit (unde nugæ sunt spiritus eum suscipere) & nihil est aliud, quam cavitas ex sinu Cerebelli & medullæ spinalis enatus. Ille, ob concursum processuum vermiformium fit; hic, ob unionem duorum truncorum. Ex necessitate ergo fabricæ horum corporum, non finis alicujus gratia qui quidem Cerebri actioni interserviat, conditus videtur.

Testes.
Nates.
Foramen posterius tertii ventriculi.

Glandula pinealis.

Quartus ventriculus.

CAPUT IX.

De oculo interno, sive visus instrumento.

IN capite Cerebrum si late hoc vocabulo utaris, tum sensuum instrumenta contineri ab initio hujus libri diximus. Cum ergo quantum præsens institutum requirebat abunde satis de illo verba fecerimus, reliquum videtur ut de his quoque sermonem exordiamur. Sed enim cum sensuum alii quidem interni dicantur, alii externi; illos Cerebro tanquam instrumento proprio uti apud omnes pæne pro confesso habetur; modum tamen ipsum nemo fortasse adhuc est qui aperuerit, cum fere sic evenire videamus, uti anima nostra licet infinitarum rerum cognitionis sit capax & in divinarum quoque scientiam penetret, seipsam tamen immerfa his corporis vinculis intelligere nequaquam possit. Externorum vero sensuum domicilia quinque sunt, quod totidem reperiantur objecta, quæ sensibus observantur; non tamen omnia in cranio collocata sunt, sed quatuor tantum, diffuso per totum corpus quinto quod Tactui debetur. Exordiemur ab *Oculo* qui visui dicatus est, cum & subtilissimo objecto gaudeat, & hanc mortalium vitam beatam ex omnibus quam maxime reddat, quo sine voluptas nulla, nulla jucunditas est, cum immensam hanc rerum pulchritudinem eum necesse sit fugere, qui visu destitutus perpetuis tenebris urgetur.

Sensus.

Dicitur autem *Oculus*, ὁ ὀφθαλμὸς Græcis, quasi ὀπίσθεν ὕδατος, sedes ac domicilium visus; & vel externus est, de quo libro primo actum fuit, vel internus. *Externus* dicitur, qui citra dissectionem conspicuus est; ad quem referuntur supercilia, palpebræ, tarsi, cilia, tum glandulæ & foramen lacrymale: *interior* contra, qui dissectionis beneficio innotescit. Conficitur hic ex musculis, adipe, vasis, tunicis & humoribus. De *musculis* libro quarto dictum est: de *adipe* pauca monenda sunt, si dicamus copiosum satis oculis apponi, interjectum inter musculos & vasa, qui servit ad eosdem irrigandos, ne in motu qui perpetuus quasi & continuus est, exsiccentur. *Vasa* omnis sunt generis: *Vena*, à jugularibus ortæ, à Carotidibus: *Nervorum* duplex genus, unum sensum primario impertiens: alterum, motum: illud, primum par & Opticum: hoc, secundum & motorium vocatur: cæterum utriusque historia libro septimo enarrata est. Restat ergo ut hic de solis tunicis humoribusque agamus.

Oculus.

Externus.

Internus.

Musculi.

Adip.

Vasa.

Nervi.

De *Tunicarum* numero magnalis est inter Anatomiarum proceres, quam ipsam ut declinemus inspectioni potius quam authoritati insistamus, sed & hac divisione evitabimus. *Altas* enim dicimus tunicas quæ ipsum oculi globum efformant, pro humorum receptione: *altas*, quæ adnascuntur oculo, ut alligent vicinis partibus: *normulas* demum, quæ humores ipsos immediate cingunt, ne inter se confundantur. *Primi ordinis* sunt, quæ proprie oculorum tunicæ vocantur: *secundi*, quæ improprie: *terti*, quæ humorum membranæ appellari quam commodissime queant. *Primi ordinis*, ab optico nervo efformantur, qui cum triplici constet substantia (constatur enim ex duabus cerebri membranis dura tenuique, tum ipsa ejusdem molli natura) à se mutuo quod in nullo alio totius corporis nervo videre est separata, mox expansa & se conglobante, tres quoque sunt numero; una, crassa, à dura; altera, tenuior, à tenui; ultima, mollis, à cerebri

Tunica.

à cerebri ipsissima substantia producta. *Prima*, ^a Dura dicitur : *secunda*, ^b Vvea; ^c *tertia*, Retina vel Retiformis. *Secundi ordinis*, duæ sunt : *altera* enim à pericranio constituitur, & ^d Adnata vocatur; *altera*, à tendinibus musculorum oculorum duræ tunicæ implantatis, & Innominata appellatur, quasi incognita Veteribus nomen indepta haud fuerit, cum tamen expressam ipsius mentionem Galenus, lib. x de Vsu part. cap. 11, fecerit, ubi ad circulum, inquit, sexta quædam tunica extrinsecus prope accedit in duram tunicam inserta, in quam musculorum oculos moventium enervationes (id est, tendines) finiunt. Prior ergo ex his, orbitæ; posterior, musculis oculum alligat. Humororum cum tres sint ut postea dicetur, Aqueus quidem nullam habet membranam, quæ ipsum coërceat : at Crystallinus & Vitreus membrana cinguntur, quas opportune Crystallinam, Vitreamque dicemus. ^e Dura ergo tunica, Græcis σκληρῶδες dicta, omnium oculi membranarum substantia durissima crassissimaque est, situ extima, colore cinereo. Hanc nonnulli Arabes secuti in duas dividunt, posteriorem inquam, & priorem; illi totius nomen tribuunt, hanc à substantiæ similitudine *Corneam* appellant. Pellucida enim est instar laminæ corneæ bovinæ, eundem etiam colorem refert : magnitudine tamen alteri usque adeo cedit, ut non ulterius se extendat quam crystallini humoris est ambitus. Rotunda ergo quoque velut ipse est, perque eam iridem & pupillam apertis oculis extrinsecus tanquam duas hæc partes cooperientem intuemur. Gibbam sedem anteriorem habet, at posticam concavam, densa, dura, æqualis ac tensa. ^f Vvea, ab optico nervo usque ad iridis ambitum sive Coronam sese expandit, ac totam eam oculi partem quam dura usque ad corneam cingit. Atra est in utraque sua facie, sic tamen ut in exteriori color hic facile à digitis detergatur, at in interiori inseparabilis sit. In bovis interior cærulea est, externa perpetuo nigricat. Hanc Herophilus folliculo uræ nigra ex qua succus cum gigartis expressus est, haud inepte assimilavit, *ραροῦδω* vocans. Cum enim colore conveniant, foris quoque ut folliculus hic lævis est, intus asperiuscula, ante perforata, unde & aliis *πλεγματὴν* appellatur. Foramen hoc *Pupilla*, Græcis κόρη, & quia nigrum esse solet, *Nigrum oculi* quibusdam dicitur, ea sede exsculptum quæ centrum corneæ ambit. Est autem in homine, rotundum : in bove, ovale : in felle, fissuræ instar oblongum, cui dilatatio ac constrictio pro ratione lucis vehementioris aut debilis ingressu vel recessu competit. Cæterum membranam hanc similiter ut duram in duas nonnulli auctoritatem sequentes Arabum divisere, quarum priori totius nomen tradidere, *Vveam* vocantes : posteriorem *χοροῦδω*, *Chorioformem* dixere, quod Chorii in modum plurimis venulis arteriolisque interna sui sede sit perfusa. At enim cum nullibi discrimen reperire sit, ne præter necessitatem immensam rerum nostri corporis copiam augeamus, unicam constituere satius est quam Vveam appellare cum Herophilo, quod commodissime nomen hoc inventum fuisse videatur, fas erit. *Retina* vel *Retiformis*, *ἀμφιδληροειδής*, quod figuram exprimat retis rotundi quod in aquam orbiculariter projicitur, & *ἀμφιδληρον* vocatur, *ἄρξὲ π ἀμφιβάλλειν*, quod *circumjicere* significat : Latini evericulum dicunt. Hæc à nervi optici medio & extremo mucosa & rubescens nonnihil ad crystallinum usque humorem cujus ambitum complectitur, sese extendit. *Adnata*, *ἑπικρυφῶδες*, à pericranio originem suam ducit, quod ubi palpebram succinxerit, reflectitur & totum illud album oculi bulbum quem citra dissectionem in vivis intuemur, usque ad corneæ circumferentiam contegit. *Innominata* autem à tendinibus musculorum oculos moventium producitur, qui sub adnata tunica progredientes in eandem prope iridem locum terminantur. Crystallina, quam & *Araneam* & *ῥααχνοῦδω* Græci vocant à tenuitate qua aranearum telas æmulatur, æqualis est, densa, lævis, ejusdem & figuræ ac magnitudinis cujus est crystallinus humor quem succingit, non tamen parvis ubique crassitie. Anterior enim pars, quæ aqueum humorem respicit, sic tenuis est ut multis occasionem præbuerit dubitandi essetne crystallinus humor membrana involutus : posterior, crassiuscula videtur. *Vitreæ*, *ὕαλοειδής*, humoris vitrei tunica tenuissima, alba ac lævis est, quæ facile se prodit cum eaincisa quem continet humor effundatur.

^g Humororum interni oculi tres sunt, ^h Aqueus, ⁱ Crystallinus, ^k Vitreus, à rebus illis quibus quam simillimi sunt suum nomen indepti, & eodem quo recensuimus ordine in oculo siti. *Aqueus* enim aquæ instar fluidus, nullaque interceptus tunica angustis

gustis illis, quæ inter corneam uveæque foramen & crystallinum sunt, anteriore maxime sede intercluditur, quantitate quoque reliquis admodum cedens. Hunc sequitur *Crystallinus*, *μεγαλλοειδής*, aranea contentus membrana, concretæ glaciæ purissimæ æmu- *Crystallinum*
lus, lenticularis potius quam exacte sphaericæ figuræ, quæ causâ est cur à Ruffo Ephesio *Lenticularis oculi pars* fuerit vocatus. *Vitreus* sive *υαλοειδής*, quod vitrum liquefactum colore, consistentia ac splendore exprimat, copiosissimus, à tergo crystallini quo quintuplo maior situs, totamque fere oculi bulbum adimplens.

ACTIO Oculi nulli non manifesta est, nimirum *Visio*: at *Vfus* partium ipsius præcipui non rectius queunt explicari, quam Visionis ratione sedulo percepta. Ad hanc tria requiruntur; instrumentum, objectum, & quod utrumque intercedit medium. *Instrumentum* est Oculus; *Objectum*, res visibilis; *Medium*, aër illustratus & à re visibili maximeque ejus colore affectus. Aërem enim affici ab objecto visibili, immutarique pluribus experimentis nullo negotio probari potest. Candida namque induti veste si æstivo tempore ac sereno sub virente confideant arbore viridi colore à foliis veluti tingi videbuntur. Hæc aëris mutatio non quatenus aër est eidem accidit, non enim illustratus nihil hujusmodi patitur; sed quatenus diaphanus est ac perspicuus, & verbi gratia à solis radiis illustratus. Lux namque corporis colorem attingens coloratur; sensus autem formam citra materiam suscipit. Ob hanc ergo causam duabus ex partibus internus oculus extruitur, ex diaphanis inquam & opacis. Diaphanæ sunt ex tunicis quidem, Cornea, Aranea ac Vitrea, omnesque humores; cæteræ membranæ, opacæ. Diaphanæ ergo partes anticam oculi sedem occupant, ut ab affecto aëre & ipsæ afficiantur, ab illuminato & ipsæ illuminentur: opacæ contra, in posteriore & à lateribus sitæ sunt, ut lumen melius clariusque per diaphana corpora penetret & splendet. Sic in profundo putei fundo si obscurissimus sit, meridianis horis stellæ comparebunt. Cæterum cum in omni organo pars una sit, cui potissimum actio refertur accepta, quæ & *primaria*
oculi, Merito ergo *Cornea gibba exterius est*, ut in oculum magna corpora aliæque res visibiles; etiam ex obliquo inciderent: *interius convexa*, ut humori aqueo (sub ea enim totus continetur) conveniens spatium tribueretur. Eundem ut retineret, neve aut diffunderet aut exhalaret, *densa facta est*; & ne perumperetur aut facile erosa damnum acciperet *tum* à fumo acribusque foris incidentibus, *tum* à lacrymis excurrentibus, *dura est extructa*. *Aequalis ac tensa*, ne species visibiles corrugatæ offerrentur: Diaphana vero, ut lux ad humores qui lucis in oculo refractiones efficiunt, transiret. Prima enim in aqueo fit cum cornea; secunda, in crystallino; tertia in vitreo. Fit namque visio per refractionem: refractione diversa corpora postulat, diversæque magnitudinis ac splendoris. Rursus inter opacas partes tunica *Dura facta est*, ad oculum in sua rotunditate conservandum. *Vitrea*, nigra interius & exterius, ut aqueus crystallinusque humores obscurarentur impenitus, sicque lux oculum subiens splenderet magis ac colligeretur: absque hoc enim foret, ad profundum locum non penetraret. *Foramen uveæ datum*, ut res visibiles admitteret: *Crystallina ac Vitrea*, ut suos humores terminent, ne disfluant.

CAPUT X.

De Aure interna, sive organo Auditus.



V DITVS organum, *Auris* dicitur à vocibus hauriendis, quod ejus est *AVRIS*. officium. Hæc duplex est; una, externa; altera, interna; eadem sane ratione qua Oculum geminum diximus. *EXTERNÆ*, Græcis diminutive *ωτιον* dicitur, quos Latini recte imitati *Auriculam* vocant: *Internæ*, totius nomine gaudet ac verum præcipuumque auditus est organum. Appellationes illius partesque * libro primo persequuti sumus, hic figuram tradamus, quæ pæne ovalis si latitudinis circumferentiam spectes: sin altitudinis,

dinis, exterius ubi occipitium respicit, magna ex parte gibba; interius, tribus cavitatibus sinuata. *Prima*, intima est, ^a auditorium meatum constituens & ad tympani usque membranam penetrans: *Secunda*, quæ hanc immediate ambit, latiuscula ac ^b Concha dicitur: *Tertia*, sub oris auriculæ reflexa totam fere ipsam circumit, & innominata remanet. Componitur ^c superior auriculæ pars, ex cartilagine, cute tenui & membrana carnosa, per quarum externam superficiem quæ caput spectat, exiguæ venæ atque arteriolæ à venis jugularibus tum carotidibus arteriis ortæ excurrunt. ^d Inferior pars (*Lobus dicta*) ex molli spongiosaque carne constat, cute obiecta citra membranam carnosam. Ipse autem auditorius meatus, partim cartilagineus est, ut foris; partim ossæus, ut sede interna. Cæterum *Vsum* Auriculæ egregie nobis clarum reddunt quibus vel frigoris injuria perit vel gladio abscissa est, cum articulatam sonum nequaquam apprehendant, sed fluentis instar aquæ murmur duntaxat percipere sibi videntur. Percussus enim aer neque præparatus neque collectus prius à cavitatibus auriculæ in meatum auditorium compellitur. Ipsa autem auricula cartilaginea est, ut commode omnibus externis resisteret, nec tamen in se mollitie concideret, quo pacto & aliæ partes extremæ è cartilagine, ut superius ^e libro tertio diximus, extructæ fuerunt.

Interna. INTERNA auris in osse temporum consistit, sed ea ejus parte, quam ^f os petrosum appellamus. Habet hæc cavernas tres, membranas, ossicula tria, musculos duos, & nervum. De ossiculis, ^g libro secundo actum est; de musculis, ^h quarto: de nervo, ⁱ septimo: Cavernæ ergo & membranæ hic explicandæ erunt.

Cavernarum Prima. Cavernarum ^k prima, Tympanum à nonnullis Recentioribus vocatur, quia tympano bellico instrumento cum sua membrana impendio quam similis est. Hæc omnium maxima ossis petrosi principio insculpta ea sede est, quæ mammillaris processus radicem & sinum qui maxillæ inferioris capitulum suscipit, intercedit. Continet autem in se tum aërem illum quem implantatum Philosophi appellant, tum duo foramina, ^l unum majusculum, per quod in secundam cavernam itur; ^m alterum minus, quod in tertiam tendit. ⁿ Secunda, Labyrinthus dicitur, & in ossis petrosi radice insculpta rotunda est, in innumeros & anfractuofos meatus magna ex parte posterius ad mammillaris processus interiora tendentes definit. ^o Tertia, quam Cochleam appellant, omnium minima est, cochlearumque gyros perquam affabre exprimit, in anteriore sede processus petrosi sub primæ cavitatis tuberculo sita.

Membranarum. Membranarum complures sunt, pellucidæ ac aranearum telarum instar tenues, quæ priores duas cavernas, nonnullosque in labyrintho meatus investiant. ^p Vna est præ cæteris maxime nobilis à Barbaris *myrinx*, à Recentioribus quibusdam Tympani membrana vocata. Hæc rotunda est, cæteris crassior, ^q annulo illi osseo qui ^r tympano sive primæ cavernæ circumjicitur, quaquaversum adnata, adeoque & veluti septum quoddam eam ipsam ab auditorio meatu separans. Post hanc in eadem caverna ^s tria ossicula continentur, à figura Malleus, Incus, & Stapes dicta; *musculusque* exiguus, quem supra Internum auris internæ vocavimus.

Allo. Auditus sive actio auris ut Recentiores asserunt Anatomici, accidit cum sonus, qui solidorum corporum velociter percussorum qualitas sensibilis est, vicino aëri tanquam proprio subjecto impressa ad aurem internam & ejus præcipue membranam tympanum obcingentem per continuatum aërem defertur. Ingreditur enim hic aer commotus primam cavernulam, in qua implantatum illum aërem movet, quo commoto reliquus qui in aliis continetur cavernis agitur & ad nervum tandem pertingit, à quo tandem percipitur.

CAPVT XI.

De naso interno, sive olfactus instrumento.

INSTRUMENTVM Olfactus nonnulli, vulgi sententiam sequuti, nasus. NASVS. sum esse arbitrantur. Galenus modo anteriores cerebri ventriculos, modo processus mammillares autumat; quia tamen hæ partes concurrere ad olfaciendum videntur, dicamus Odoratus instrumentum ex duplici constare parte, externa nempe & interna. *Externæ*, Nasus vulgo dicitur, & tribus *ex ossibus* constat, de quibus libro secundo actum est: *Externus.* *Ossa.* *Cartilagineæ.* *Membranæ.* *Cutis.* *ex cartilaginibus* quinque, quarum historiam in *tertio* persequuti sumus: tum *cute membranæ* carnosæ, quarum tractatio sub generali continetur, quam libro octavo exhibuimus. Illius membranæ enarratio omiſsa adhuc est, quæ interius nasi foramina investit & acutissimum habet sensum, tenuis & rubicundi coloris. Hæc, quo cerebro vicinior sit, maximeque circa elatiorem nasi regionem, sensum acquirit exquisitiorem: mox vero cristosum os succingit ac foraminulis totidem quo ipsum pertunditur, per quæ mucosus humor gravedine pressio capite exſillat vacuaturque.

Cæterum *internæ partes instrumenti olfactus* sive nasi interni, os sunt *cribrosum*, crassa & exſangui membrana obcrustatum ea sede, qua cerebrum respicit, tum *processus mammillares*. Ex *cerebri* enim anterioribus partibus duo veluti tubercula vaccarum mammis similia prominent, quæ ideo *mammillares* (ab aliquibus *papillares*) *cerebri processus* vocantur. His subjacet *cerebri* anterior pars (incumbens adeo ossi cristoso) octavi paris nervorum cerebri, per quos ad cerebrum deferri, apprehendi autem primum odores per processus mammillares credimus, cum os cribrosum ad odoratum primario non concurrat, sed tantum odoribus viam concedat.

CAPVT XII.

De gustus, tactusque instrumentis.

GUSTVS tactusque instrumenta hic jungimus, quod Gustus, vel Aristotele teste cui omnes subscribunt, quædam tactus sit species. De neutro tamen multa dicenda sunt, quod omnium quoque confessione Gustus instrumentum sit Lingua, cujus historiam in libro quarto recensuimus, quanquam primaria pars tunica illa sit, qua obcingitur. Nervi deinde quas partim à quarta, partim septima conjugatione eorum qui à spinali medulla dum in cranio adhuc est oriuntur, accipit, superius quoque libro septimo sunt explicati. De tactus organo è diverso lites movent Dissectionum Professores innumeras, quia tamen certum est immediatum aliquod constituendum esse quod competat partibus tam diversis tactu præditis, Cuti, Membranæ, Nervo, Tendini, Carni, non melius possumus, quam si dicamus Carnem esse, non illam intelligentes quæ vulgo sic vocatur, sed quicquid fibris nerveis constipatur ac molle est. Sic facile infinitis nos subtrahemus disputationibus, quas Philosophi Medicique instituunt, modumque inveniemus qui sententiam utrorumque necet.

GRATIAS TIBI DOMINE IESV.



INDEX.

- sunt æquales in corpore proportiona-
 to, *ibid.*
 tum ossa, 32
 arteria, 7
 pera arteria, *vide* pulmonum aspera
 arteria.
 tragalus, *vide* Talus.
 A. os, 64
 trahit humores per quas vias ex-
 purgantur, 180
 auditorius meatus, 302
 auditorius nervus, 191
 auditorius ossicula, 37. eorum numerus,
ibid. substantia, *ibid.* magnitudo, *ibid.*
 historia, *ibid.*
 auditor organum, 301
 res & earum partium appellationes, 6
 aurium motus, 94. musculi, *ibid.*
 auris externa, 301. figura, *ibid.* cavi-
 tates, 302. partes, *ibid.* usus, *ibid.*
 auris interna, 302. ejus cavitates, *ibid.*
 meatus, *ibid.* membranae, *ibid.*
 aurium pinnae, 6. lobi, *ibid.* fibræ, *ibid.*
 helix, *ibid.* *ωχελὺς*, *ibid.* conchæ, *ibid.*
 bircus, *ibid.* *τεργύ*, *ἀντιτεργύ*, *ibid.*
 auricula, 6. ejus cartilago, 70. mo-
 tus, 94. musculi, *ibid.* *vide* etiam
 Auris externa.
 auriculæ cordis, *vide*, cordis auriculæ.
 actor non discedit à Galeni sententia
 nisi victus oculorum inspectione, 252
 actor septem linguas callet, 164
ἡλὼ, 6
ἡλὼ *πῶς* *ἐκτετακός*, 257
ἡλὼ *ἐστὶν*, 25
 ulla, 6
ἡλὼ *ἡλὼ* *ἡλὼ*, *vide* vena *ἡλὼ* *ἡλὼ*.
 B.
ἡλὼ, 9
 ossicula vena, *vide* Vena basilica.
 ceptus muscululus, 119
 lis usus, 239
ἡλὼ, 4
ἡλὼ, 5
ἡλὼ, 8
 rachiale, 11
ἡλὼ, 10. 57
 rachium, 10. 57. duas habet signifi-
 cationes, 10. ejus partes, *ibid.*
ἡλὼ, 2. etymon, *ibid.*
ἡλὼ, 282
ἡλὼ, 72. 281
 ucca, 5
 uccarum motus, 91. musculi, *ibid.*
 uria virilis, 9
 C.
 cæci nonnulli à vulnere frontis, alii à
 subito oborta dysenteria visum rece-
 pere, 189
 cæcitas repentina quibusdam à sterna-
 tamento nimio oborta, 189
 cæcitas ejusdem causa & curatio, 189
 Calcanæus, 13. 64. ejus latera, 64
 Calamus scriptorius in cerebro, 292
 Calculus renum ubi generetur, 159. quæ
 ejus materia, *ibid.*
 Calidum cur duplex à natura factum, in-
 fluens scilicet & innatum, 276. cur in
 corde, & cu fonte influens stabulari
 voluit, *ibid.*
 Calidum influens in corde ut refrigeren-
 tur, 284
 Calidum quot modis conservetur, 283
 Calidi nimis cur non pinguescant, 211
 Calor cur in spiritu recumbat, 173
 Calor unus idemque est, qui in ventricu-
 lo chylum, in Hepate sanguinem, in
 mammis lac generat, 252
 Calvaria, *vide* Cranium.
 Calvitiei causa, 286
 Canna pulmonum, *vide* pulmonum
 Canna.
 Caput, *vide* Venter supremus.
 Caput ossium, *vide* ossium caput, 26
 Capitis ambiguitas, 2. etymologia, 2.
 divisio, *ibid.*
 Capitis ejusdemque partium externa-
 rum appellationes, 1. ejus partes con-
 tinentes & contentæ, 285
 Capitis pili, 285. cuticula, 286. cu-
 tis, *ibid.* pinguedo, 287. membrana
 carnosa, *ibid.*
 Capitis figura, 16. magnitudo, *ibid.*
 proportio ad totum corpus, *ibid.*
 Capitis motus primarius, 97. secunda-
 rius, 98. ejusdem musculi, 97
 Capilli, 2. 285. eorum substantia, par-
 tes, situs, *ibid.* magnitudo, 286. ma-
 teria, *ibid.* figura non teres sed qua-
 drangula, *ibid.* differentia penes æta-
 tem, sexum, regionem, temperamen-
 tum & habitum corporis, *ibid.* u-
 sus, *ibid.*
 Caput longum, breve, latum, acuminat-
 um, rotundum, unde, 16
 Caput *φύλον* unde, 16
 Caput proportionatum, 16
 Caput cur in postica parte solum pilo-
 sum sit, 209
 Cardinalis Cibonis obitus, 241
 Carnium quatuor genera & quæ, 84
 Carnis in musculis usus, *ibid.*
 Caro simplex quid apud Galenum, *ibid.*
 Caro fibrosa quo modo præcipua mu-
 sculi pars dicatur esse, *ibid.*
 Caro viscerum quomodo aliter appelle-
 tur, *ibid.*
 Caro maxime necessaria musculi pars,
ibid. non tamen in omnibus musculi
 partibus eam reperire est, *ibid.*
 Caro cum musculo confunditur apud
 Hippocratem, 84
 Caro immediatum tactus instrumentum
 & quomodo, 209
 Carotides arteriæ, 175. ligatæ somnum
 inducunt, quod demonstravit Colum-
 bus Pisis, teste Valverde, *ibid.*
 Carpus, 11. 59. ejus figura, *ibid.* ossa
 octo, *ibid.* connexio, *ibid.* motus, 121.
 musculi, *ibid.*
 Cartilago quid, 68. usus, *ibid.* differe-
 rentiæ, 69. quædam nulli parti con-
 nexæ, quædam junctæ, *ibid.*
 Cartilaginis similitudo cum osse, 68
 Cartilagine palpebrarum quot, 70. na-
 si, *ibid.* auriculæ, *ibid.* laryngis, 71.
 asperæ arteriæ, *ibid.* thoracis, *ibid.*
 infimi ventris, 72. supremi ventris, 70
 Cartilago annularis, 71. arytenoides, *ibid.*
 cricoides, *ibid.* eniformis, 46. ejus
 figura, *ibid.* cavitates, *ibid.* guttalis, 71.
 mucronata, 46. *ἐκφυσθὲς*, *ibid.* scu-
 tiformis, 71. *στυμνοειδὲς*, 72. thyroi-
 des, 71. trochlea, 70
 Carunculæ myrtiformes pudendi mulie-
 bris, 10. 256. earum situs & nume-
 rus, *ibid.* usus, 261
 Carunculæ papillares renum, 245
 Cauda, 52
 Caulis, 9
 Cavum oculi, 4
 Cavitas Hippocratis inter ventriculi &
 septū transversum conclusa quæ, 226
 Cephalica vena, *vide* vena cephalica.
 Cerebrum, 19
 Centrum totius corporis ubi, 9
 Cerebrum, 290. ejus etymologia, *ibid.*
 substantia, *ibid.* magnitudo, *ibid.* fi-
 gura, *ibid.* superficies, *ibid.*
 Cerebri divisio, 290
 Cerebri stricte dicti divisio, 291
 Cerebri & cerebelli discrimen, 290
 Cerebri substantia duplex, Cineritia &
 alba, 291
 Cerebri membranae, 288. earum syno-
 nymia, *ibid.* substantia, *ibid.* figu-
 ra, *ibid.* magnitudo, *ibid.* numerus, *ibid.*
 Cerebri substantia sui est generis, 297
 Cerebri membranae cur factæ, 298
 Cerebri membrana crassa, 288. ejus fi-
 tus, *ibid.* connexio, *ibid.* superficies
 utraque, *ibid.* foramina, *ibid.* pro-
 cessus duo, 289. sinus quatuor, *ibid.*
 Cerebri membrana tenuis, 289
 Cerebri processus mamillares, 193. 303
 Cerebri corpus callosum, 291
 Cerebri cortex, *ibid.*
 Cerebri medulla, *ibid.*
 Cerebri ventriculi quot sint ex opinione
 veterum, *ibid.*
 Cerebri duo ventriculi anteriores, 291.
 eorum situs, *ibid.*
 Cerebri ventriculi revera duo tantum, 295.
 & 298. quis eorum verus usus, 298
 Cerebri ventriculus tertius, 291. ejus
 foramina, *ibid.*
 Cerebri ventriculus quartus, 292. quid
 sit revera, 295
 Cerebri septum lucidum, 291
 Cerebri ventriculos succingens mem-
 brana, *ibid.*
 Cerebri infundibulum seu pelvis, *ibid.*
 Cerebri calamus scriptorius, 292
 Cerebri felix, 289. ejus fornix, 291
 Cerebri glandula pituitaria, 291
 Cerebri plexus choroides, *ibid.*
 Cerebri rete admirabile, *ibid.*
 Cerebri nates, 292. quid sint revera, 295
 Cerebri testes, 292
 Cerebri vulva, 291
 Cerebri actio & usus, 296
 Cerebri usum non bene noverunt vete-
 res & cur, *ibid.*
 Cerebri usus unde petendus, *ibid.*
 Cerebrum an nutriatur sanguine, 165
 Cerebrum in plenilunio turget, decre-
 scente vero luna subfidet, 290
 Cerebrum an inflammetur, 289
 Cerebrum cordis refrigerandi gratia
 conditum, Aristoteles statuit & quam
 bene, 296
 Cerebrum spirituum animalium gene-
 randorum gratia factum Galenus cen-
 suit, *ibid.*
 Cerebrum cur in cranium situm, 297
 Cerebrum cur homini maximum, *ibid.*
 Cerebrum secandi duplex ratio, antiqua
 & nova, 290
 Cerebrum secandi nova ratio, 294. quæ
 inter ipsam & antiquam sit differen-
 tia, *ibid.* ad eam quale caput referatur,
ibid.
 Cerebellum, 292. ejus etymologia, *ibid.*
 situs, *ibid.* substantia, *ibid.* magnitu-
 do, *ibid.* figura, *ibid.* color, *ibid.*
 partes, *ibid.* globi, *ibid.* processus
 vermiciformes, *ibid.* sinus, *ibid.*
 Qq Cerebelli

I N D E X.

Cerebelli pons,	295	Contractio musculorum quid sit,	80	Cristagalli quoddam os dicatur,	
Cervix, 6. ejus motus quadruplex,	99.	Cor, 271. ejus etymologia, <i>ibi</i> .	fitus, <i>ibi</i> .	Crista pro alis vulvae sumitur,	
musculi, <i>ibid.</i> ossa, 31. vertebrae,	49.	figura, <i>ibid.</i> superficies, <i>ibid.</i> magni-	tudo, 272. substantia, <i>ibid.</i> connec-	Crus, 12. ejus divisio seu partes,	12.
pulmonum gratia coadita,	49	xio,	<i>ibid.</i>	Curis motus, 126. masculi,	
Cervicis processus,	25	Cordis partes,	272	Cubiforme os,	
Cerumina,	6	Cor non est musculus,	<i>ibid.</i>	Cubitus, 10. 58. ejus ossa,	
χαλκινόν,	9	Cor quo ad basin exquisitè medium tho-	racis obtinet, 276. at non ratione mu-	Cubiti motus, 119. musculi,	
χαλκινός,	5. 26	cronis, & cur?	<i>ibid.</i>	Cucullares musculi,	
χαλκινός,	10	Cordis adeps, 272. hujus usus,	279	Cuneiformia ossa, 65. eorum nume-	
χαλκινός,	6	Cordis batus, 272. mucro, <i>ibi</i> . fibræ, <i>ibi</i> .		rus, <i>ibid.</i> majus, <i>ibid.</i> minus, <i>ibi</i> .	
Chordæ,	227	Cordis finis, 273. ventres,	<i>ibid.</i>	medium,	
Chordapfius,	218	Cordis membrana,	272	Cunus, 10. vox obscuræ,	
Chylus quid, 225. unde albus, 146. in-	<i>ibid.</i>	Cordis vasa,	<i>ibid.</i>	Cuticula, 202. ejus substantia, <i>ibid.</i> se-	
terdum ruber,	<i>ibid.</i>	Cordis auriculæ, 272. earum nume-	rus, 273. ut differant inter se, <i>ibid.</i>	sus expers, <i>ibid.</i> causa materialis	
Chylificatio absolvitur ope caloris ven-		ulus, 278. earum motus,	273	efficiens, 203. connexio, <i>ibid.</i> usus, <i>ibi</i> .	
triculi, conterminarumque par-		Cordis ventriculi, 273. eorum nume-	rus, an tres vel duo, <i>ibi</i> . differentia, <i>ibi</i> .	Cutis, 202. ejus synonymia, <i>ibid.</i> sub-	
tium,	225	facies interior, 274. usus,	277	stantia,	
χολοστέ,	225	Cordis septum, 274. an sanguinem	transmittat ex dextro ventriculo in fi-	Cutis quomodo nervæ dici queat, 203.	
Cibo concocto cur plus urinæ, quam		nistrum,	274	alis crassior, alius tenuior, idque per	
nondum absoluta chylificatione red-		Cordis caruncula,	274	ratione sexus, ætatis, regionis, par-	
damus,	179	Cordis involucrium,	270	tium, &c. 203. varii coloris est, 1.	
Cilia,	4	Cordis capsula,	<i>ibid.</i>	militer penes ætatem, regionem, 1.	
Claves olim ad similitudinem latino-		Cordis culcitra, 280. ejus flabellum, <i>ibi</i> .		xum, temperamentum, 204. diver-	
rum longiusculi factæ,	45	Cordis vasa quatuor ex basi erumpen-	274	est temperamenti, 205. sensu omni-	
Claviculæ in homine unde dictæ, 45. ca-		Cordis valvulæ, 274. earum differen-	278	prædita,	
rum figura, <i>ibid.</i> numerus, <i>ibid.</i> con-		tiæ, <i>ibid.</i> usus,	278	Cutis superficies,	
nexio, <i>ibid.</i> substantia, <i>ibid.</i> liga-		Cordis expers animal an vivere queat,	272	Cutis foramina, partim conspicua, partim	
menta, <i>ibid.</i> usus,	<i>ibid.</i>	Cordis facultas motrix an è cerebro per		tim inconspicua,	
Claviculæ si frangantur juxta sternum		nervos influat, ut censuit Picothomi-		Cutis tota in homine immobilis, 201.	
cur humerus subito cum scapula deci-		neus,	<i>ibid.</i>	sola in fronte mobilis,	
dat,	45. 107	Cordis actio & pulsus, 275. vide pulsus,		Cutis connexionem cum subjectis parti-	
Clitoris, 10. 255. ejus substantia, 255.		Cordis ferocibulus,	46	bis non ubivis æqualem habet,	
convenientia cum pene, 10. erigitur		Cor majus homini est, ac brutis, & qua-		Cutis ratione pilorum differens,	
in feminis ut viris penis, 255. liga-		re,	277	Cutis nervos nullos habet,	
menta, <i>ibid.</i> crura, <i>ibid.</i> glans, <i>ibid.</i>		Cordis figura pyramidalis quamobrem,	276	Cutis paucas habet arterias,	
glandem regens cutis, <i>ibid.</i> muscu-		Cordi pulsus innatus, arteriis influens,	272	Cutis actio & usus,	
li,	<i>ibid.</i>	Cordis vasorum unio in fœtu qualis, 279.		Cutis ab interna parte non exactè seu-	
Clitoris sæpe in magnitudinem eam in-		quomodo percat ex opinione Hiero-		nec inter calidum frigidumque disti-	
ntumescit, ut minus peritis Anatomiae		nymi Theobaldi,	<i>ibid.</i>	guit,	
mulieres in viros degenerasse creden-		Cordis consensus cum ventriculo,	192	Cutis an sit tactus organum, 208. in h-	
tur,	255	Corium,	202	mine cur pilis interpellata, nec uti-	
Clunes,	9	Corona,	9	alis animalibus continua,	
Clysteres totum corpus purgare, si ex		Corporis humani divisio, 1. figura, 13.		Cutis raritas quomodo ventris conspici-	
medicamentis purgantibus compo-		quam sit variabilis, 14. quantum re-		nionem inducat,	
nantur,	181	ferat ipsam scire, <i>ibid.</i>		Cutis contractio quomodo ad cranii	
Clysteres in ægris quibusdam ventricu-		Corporis humani magnitudo, 14. quan-		incrementum faciat,	
lum ascendere posse,	230	tum differat secundum ætatem, <i>ibid.</i>		Cutis temperamentum medium in om-	
Coarticulo,	28	sexum, <i>ibid.</i> regiones & morbos, 15.		nibus qualitatû excessibus, & cur, 20	
Coitus an ultimis gestationis mensibus		an sit minor hodie quam olim fuit, <i>ibi</i> .		Cutis sua temperie debilis, & cur, <i>ibid.</i>	
proficius necne,	263	Corporis transpiratio diligenter omni-		Cutis capitis crassa, 287. sensu rever-	
Colatorum nasi,	3	bis addiscenda,	226	prædita, sed obtulosa,	
Colli processus,	25	Corpus varicosum,	247	Cutis capitis cum crassissima sit, qui	
Collum refertur ad caput rectius, quam		Costæ thoracis, 53. earum numerus, <i>ibi</i> .		nissima cuticula tegatur, 204. at si	
thoracem,	6	divisio, <i>ibid.</i> substantia, <i>ibid.</i> carti-		calceæ densa cuticula vestiatur, <i>ibid.</i>	
Collum & ipsius partium appellatio-		lages, <i>ibi</i> . connexio, <i>ibi</i> . figura, 54.		Cutis quomodo iterum consolidetur, 20	
nes,	6	magnitudo, 54. remulus, <i>ibid.</i> pal-		mulæ, <i>ibid.</i> usus,	
Colli figura, 16. longitudo, <i>ibid.</i> lati-		Costæ legitimæ, 53. spuria, <i>ibid.</i>		Cyrticæ gemellæ,	
tudo processus,	17	Cotyledones uteri, 259. eorum usus, <i>ibi</i> .			
Colli vertebrae si crassæ & reliquæ erunt		Coxa, 12. ambigue significat, <i>ibid.</i>			
tales imo & reliqua ossa omnia,	17	Coxendix,	12		
Collum tenue, crassum,	<i>ibid.</i>	Cranium, 2. 31. ejus partes, 2. ejus			
Collum validum seu robustum robusti		ossa,	31		
corporis indicium est,	<i>ibid.</i>	Cranii usus, 32. substantia, <i>ibid.</i> crassi-			
Colli oblongi homines pævisi sunt ob-		ties, 33. figura, <i>ibid.</i> superficies, <i>ibi</i> .			
noxii,	49	laminæ, <i>ibid.</i>			
Colon intestinum, vide intestinum Colon.		Crasus quis dicatur,	<i>ibid.</i>		
Columbi error circa musculos abdomi-		Creas,	12		
nis,	101				
Columella quid,	255				
Concavum pedis,	13				
Concha,	37				
Connivere, quid Hippoc. significet, 259					
Consensus cordis & ventriculi unde, 192					
Consensus uteri cum mammis unde fiat,					
109. 155. qualis sit,	161				
Consensus inter pericranium & duram					
membranam,	288				

D.

Δάκτυλοι,

Δακτύλοι,

Deflorare virginæ phrasim unde nata, 25

Dens magnus Hippocratis,

Dentes eorumque appellationes, 5. 42.

etymologia, 5. divisio,

Dentium substantia,

Dentium figura, 42. non omnibus sim-

lis,

Dentes superiores differunt aliquaten-

ab inferioribus,

Dentium cavitas, 42. non ubique est fe-

juxta radicem tantum, *ibid.* membra-

na fuscungitur, *ibid.* differt ration-

ætatis & dentium,

Dentium vasa,

Dentium radices,

Dentium præsepia,

Der

I N D E X.

dentium alveoli, 42. dentibus figura & numero respondent, *ibid.* percunt cum dentibus, *ibid.*
 dentium articulatione est triplex, 42
 dentium superficies, 43
 dentium magnitudo, *ibid.*
 dentium numerus, 43. non est idem omnibus & cur, 5. 43. cur differens apud auctores, 44. magnus laudatur à Physiognomis, *ibid.*
 dentium ulus, 44
 dentium eruptio cur tot fecum symptomata ferat, 43
 dentes primas qualitates non item secundas sentiunt, 43. & cur, *ibid.*
 dentes quomodo sentiant, *ibid.*
 dentes incisores seu *πυλεις*, 43. usus, *ibid.*
 dentes canini seu *κυνιδοντες*, 43. figura eorum, *ibid.* munus, *ibid.* radices habent robustiores altiusque infixas, *ibid.* dentes oculares qui, 43. quare illis evulsis oculi laedantur, *ibid.*
 dentes molares, five *μυλιδοντες*, 43. numerus eorum, *ibid.* figura, 44. radices quot habeant, *ibid.*
 dentes sapientiae, 44
δεντες, 202
δεντα, *ibid.*
δεντον, 219
δεντομα, 8, 103
 diaphragmatis varia nomina, *ibid.*
 diaphragmatis historia, 103. magnitudo, *ibid.* situs, *ibid.* figura, *ibid.* in omnibus duplex, *ibid.* productiones, *ibid.* circuli, *ibid.* vasa & foramina, *ibid.*
 diaphragmatis motus duplex, 100. quomodo naturalis dici queat, *ibid.*
 diaphragmatis motus cur integer maneat resolutio corpore, 195
διαφραγματος, 103
 diarthrosis ossium quatuorplex, 28
 diarthrosis spuria, *ibid.*
διαρθρωσις, 9, 248
 digiti manuum, 11. pedis, 13. eorumque nomina, 11 & 13
 digitus magnus, minimus, auricularis, demonstratorius, index, medius, impudicus, obsecutus, annularis, medicus, 11
 digitorum *φάλαγγες*, 11. eorum internodia, *ibid.*
 digitorum manuum motus, 122. musculi, *ibid.*
 digitorum manuum ossa quindecim, 60. vide ossa digitorum.
 digitorum pedum motus, 131. musculi, *ibid.*
 digitorum pedis ossa quatuordecim, 66. eorum substantia, *ibid.* internodia, *ibid.*
διδυμοειδής, 2
διπλός, 95
διπλοειδής *πυλεις*, 292
διπλός, 33
 Dissepium, 103
διωκεσθαι *λαον* *νιπτον*, 228
 Dolores circa os facium & pubem post partum difficile unde, 56
 Dolores circa dorsum & lumbos tempore febris & quum menses instant, 140
 Doloribus capitis quinam obnoxii, 239
 Dormientibus quo in latere decubendum, 217
 Dorsum 7 & 48. ejus longitudo, 17
 Dorsum manus quid, 11
 Dorsum pedis, 13
 Duodenum intestinum, vide intestinum duodenum.

Dura mater, 288
 Dyspnæa perpetua ab arctis, quibus pleuræ pulmo alligatur fibris, interdum nascitur, 269
 E.
ΕΙΛΕΩΣ, 228
ΕΙΛΕΩΣ *πυλεις* qui dicantur, 15
ΕΙΛΕΩΣ *δεντες* membrana, 248
ΕΙΛΕΩΣ *δεντες* membrana, *ibid.*
 Emendatio loci x histoteli, 16 Aristotelis, 223
 Enarthrosis, 28
ΕΝΑΡΘΡΩΣΙΣ, 4
ΕΝΑΡΘΡΩΣΙΣ, 290
ΕΝΑΡΘΡΩΣΙΣ, 227
 Ephippium, 38
ΕΠΙΠΗΜΙΟΝ, 202
ΕΠΙΠΗΜΙΟΝ, 255
ΕΠΙΠΗΜΙΟΝ, 247
ΕΠΙΠΗΜΙΟΝ, 7, 8
 Epigastrii divisio in 3 regiones, 8
 Epiglottis, 72. figura, *ibid.* ulus, *ibid.*
 Epilepsie periodus unde, 290
 Epilepsie præludium quomodo in plebris, facieque quibusdam se offert, 190
ΕΠΙΛΗΨΙΑ, 12
 Epiphysis, 25. qua ratione ossibus adnata, *ibid.*
ΕΠΙΦΥΣΙΣ, 219
ΕΠΙΦΥΣΙΣ *δεντες* *πυλεις*, 219
ΕΠΙΦΥΣΙΣ, 255
ΕΠΙΦΥΣΙΣ, 6
ΕΠΙΦΥΣΙΣ, 6
 Errhina in oculorum affectibus fugienda, & quamobrem, 189
 Error medicorum notatur, qui agris de frigiditate conquerentibus frigidos humores causam statuunt, 209
ΕΡΡΗΝΑ, 3
ΕΡΡΗΝΑ, 8
 Explicatio loci Aristotelis, qui est x histoteli, 16. 223. Alterius, qui habetur 3 hist. anim. 11. 209. itemque alius, 2 de part. anim. 6. 30. & tandem, x de generatione anim. 2. 251
 Explicatio loci Hippocratis 6 Epid. sect. 3. text. 1. 208. Alterius 6 Epid. sect. 6. 226. item ex Coacis prænotionibus, 177. item lib. de natur. mulier. 255. item lib. de aëre, locis & aquis, 138
 Explicatio aliquot Aphorismorum Hippocr. difficultium, vide Hippocrates explicatur, &c.
 Exspiratio quid sit, 283. ejus usus, *ibid.*
 F.
 Fabæ quid, 9, 248
 Facies ejusque partes, 3. ejus divisio, 39
 Facultas animalis, 186
 Falx duræ cerebri membranæ, 289
 Fallopius inventor musculorum pyramidalium, 100
 Faucium musculi, 96. motus, *ibid.*
 Febris quartana gigantes interdum facit, 15
 Femem, 12
 Femur ejusque partium appellationes, 12. 61
 Femoris ambiguitas, 12. ejus os, 61
 Femoris motus, 126 musculi, *ibid.*
 Fibræ sanguinis, 139
 Fibræ meningis per cranii suturas tractæ, 32

Fibræ venarum triplices, 139. singularum usus, *ibid.* quomodo videntur possint, *ibid.*
 Fibræ pedunculiformes in pene, 249
 Fibula, 63. ejus appendices, *ibid.* magnitudo, *ibid.* lineæ tres, *ibid.* ligamentum, *ibid.*
 Figura alicujus partis externa & media quid sit, 80. media totius corporis, *ibid.* media singularum partium, *ibid.*
 Fissura magna vulvæ, 10
 Fistula asperæ arteriæ, 72. figura, *ibid.*
 cartilagine, *ibid.* ulus, *ibid.*
 Fistula lachrymalis, 4
 Fistula pulmonum, 282. vide Pulmonum fistula.
 Fistula urinaria, 240
 Foecunditatis signa, 19
 Foemina in humano genere minor mare, 15. & cur, *ibid.* in cæteris animalibus major & cur, *ibid.* crassior plerumque virgine, & cur, *ibid.*
 Folliculus felleus, 237
 Fonticuli brachii cur inter deltoideum & bicipitem musculum fiant, 157
 Foramen lachrymale, 4. in foeminis majus quam in viris, *ibid.*
 Fornix cerebri, 291
 Frænum penis, 250
 Fricatrices, 255
 Frigida cur noceant pectori, tussisque moveant, 174. item sanguinis profluvia excitent, *ibid.*
 Frigidæ potus cur gravior symptomata inducat, 174. quæ remedia sint, *ibid.*
 Frontis, 3. unde dicta, *ibid.* frontis rugæ, *ibid.* frontis os, 35. musculi, 89
 Frontis nubes, 3
 Frontis cutis sola in homine mobilis est, *ibid.*
 G.
ΓΑΣΤΡΟΝΕΜΙΟΣ, 8, 219
 Galeni sententia de principio, fine & ulu musculorum rectorum abdominis, 111
 Galenus venas statuit sanguificare, 143
 Galeni argumenta refutantur quibus probare voluit hepar principium venarum esse, 145
ΓΑΣΤΡΟΝΕΜΙΟΣ, 7, 224. quandoque pro utero lumitur, 256
ΓΑΣΤΡΟΝΕΜΙΟΣ, 12
 Gasteronemius muscularis, 129
 Gelasium, 5
 Genæ unde dictæ, 5. cur rubeant in peripneumonia, *ibid.*
 Genarum motus, 91. musculi, *ibid.*
ΓΕΝΑ, 5
ΓΕΝΑ, 6
 Generationi dicatæ partes viri cur duplices, 250
 Genitales partes viriles, 9, 247. muliebres, 10
 Genitalia marium, 9. foeminarum, 10
 Genitalia gravidarum in quibus a non gravidarum partibus & quomodo differant, 263
 Genu, 12
 Germani Italici cur pilosiores, 210
 Gibber, 58
ΓΙΝΓΙΒΑ, 23
 Gingiva, 5
 Glabella, 3
 Glandulæ vasorum divaricationi dicatæ, 140
 Glandulæ feminales, 248. earum substantia, 249. magnitudo, *ibid.*
 Q9 2 Glan-

I N D E X.

Glandularum feminalium tunica interior poris pervia innumeris, 249. quomodo hi pori deprehendantur, *ibid.*
 Glandula pituitaria cerebri, 291
 Glandulis Natura ad serofitates abluendas per totum corpus usa est, 253
 Glans, 9
 Glans pinealis, 292
 Glutæ musculi, 4 26
 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

H.

Hæmorrhoides cæcæ vel apertæ, 150. internæ vel externæ, 152
 Hæmorrhoides diuturnæ non claudendæ, 151. non inferunt necessario hydropem vel tabem sanatæ, sed ut plurimum tantum, *ibid.* non fiunt tantum à seculento sanguine sed & à bile & pituita, 152. nonnunquam infaniam inducunt, *ibid.* interdum dyfenteriam, *ibid.*
 Hæmorrhoidales venæ, 149. vide venæ hæmorrhoid.
 Hæmorrhoidales arteriæ, 180
 Harmonia, 28. exquisita raro datur, 29
 Hemitranæ causa, 289
 Hepar, 234. ejus etymologia, *ibid.* litus, *ibid.* connexio, *ibid.* figura, *ibid.* protuberantiæ, *ibid.* lobus, *ibid.* sinus, *ibid.* fissura, *ibid.* magnitudo, *ibid.* numerus, 235. substantia, *ibid.* vasa, *ibid.*
 Hepatis pars gibba, mollior parte cavâ, 148
 Hepatis lobi auctori sic dicti, 216
 Hepatis duo ligamenta, 214
 Hepatis portæ, 146
 Hepar ex carne quid sit, 148. quo modo faciendum, *ibid.*
 Hepatis situs naturalis, 216. non naturalis, *ibid.* præternaturalis, 217
 Hepar aliquando in lævo hypochondrio situm, 217
 Hepar in thorace situm qua ratione veteres dixerunt, 17
 Hepar cur in mortuis sub pueris cartilaginibus reconditum inveniat, *ibid.*
 Hepar quibus magnum, iis magnum quoque ventriculus, 235
 Hepar quibus magnum, ii quoque voraces, 217
 Hepatis magnitudo pro ratione ætatis differens, 235. magnitudo præternaturalis, 217
 Hepar plures venæ Portæ ramos, quam cavæ obtinet, 235. iidem per anastomoses junguntur, & cur, 236
 Hepatis actio, 235. usus, 236
 Hepatis manus quid, 147

Hepatis parenchyma quem usum præstet, 235
 Hepar cur homini maximum, 236
 Hepatis substantia cur parenchyma, *ibid.*
 Hepatis sanguificatio, 237. in quo differat à sanguificatione lienis, 241
 Hepar non sanguificat in suo parenchymate, 235
 Hepatis lobus per quem aqua hydropicorum in omentum interdum erumpit, 223. est ab Auctore primus inventus, *ibid.* in Hepatis inflammatione cur agri in lævo latere nequeant decumbere, 217
 Hernia quomodo fiat, 215. qui herniæ magis sunt obnoxii, *ibid.* cur stantibus magis quam decumbentibus fiunt, 218
 Herniæ causæ, 109
 Hieron. Theobaldi de perditione unionis vasorum cordis, quæ in foetu compareret, sententia elegantissima, 279. ejusdem de permutatione vasorum umbilicalium in ligamēta opinio, 280
 Hippocr. venam pro arteria posuit, 138
 Venarum principium nullum statuit, 142. carnem cum musculo confundit, 84
 Hippocrati libellus de glandulis falso ascribitur, 220
 Hippocrates explicatur, in Aph. 52. sect. 2. 14. in Aph. 14. sect. 1. 148. in Aph. 12. sect. 1. 151. in Aph. 37. 38. & 50. sect. 1. 161. in Aph. 24. sect. 1. 174. in Aph. 32. sectio- nis ejusdem, 187. in Aph. 55. sect. 1. 221. in Aph. 54. sect. 1. 226. in Aph. 51. sect. 1. 259
 Homo cur prope sui parte pilosior sit quam supina, 209
 Homo cur caput parte posteriore pilosum habeat, *ibid.*
 Homines nostri an breviores stature sint, ac prisca, 15
 Humerus, 6. 10. 57
 Humeri motus, 117. musculi, *ibid.* os, 57
 Humerus luxatus quomodo restitui debeat, 47
 Humerus summus, 48
 Humor articularis, 29
 Humor oleaginosus vesicularium seminales, 248 & 253. in coitu copiose effunditur, & qua de causa, 253
 Humor ossium, 29. aliquando deficit, *ibid.* aliquando abundat, *ibid.*
 Hydropicorum aqua per quas vias in omentum irrumpat, 222 & 223
 Hymen membrana, 10. 256. revera datur, *ibid.* cur interdum non reperiat, *ibid.* in maturis virginibus, quam junioribus crassior, *ibid.* raro perforata, *ibid.* forma florem refert, *ibid.*
 Hystericus affectus quomodo generetur, 258

I.

Iæterus non nascitur meatu cystico vesicæ bilariæ obstructo, sed aut utroque, aut certe commune, 239
 Iæcus, vide Hepar.
 Ileum, vide intestinum ileum.
 Iliæ, 8
 Iacus auditus ossiculum, 37. ejus caput, *ibid.* cavitas, *ibid.* crura, *ibid.*
 Index, 11
 Indi cranium habent crassissimum, 33

Infantes cur non obesi, 211
 Infimus venter, & ipsius partes exte- harumque appellationes, 7. magnitudo, & à quibus causis varietur, 18
 Infimi ventris motus, 107. musculi, *ibid.*
 Infimi ventris vicerum situs, 8. 216
 Infimi ventris partium divisio, 202
 Infundibulum cerebri, 293
 Ingaina, 8
 Inven. 2. ejus etymon, *ibid.*
 Inspirationis pulmonum usus, 283
 Intercostales musculi, 104. quot sint, *ibid.*
 eorum divisio, *ibid.*
 Intercostalia, 104
 Interfemina, 104
 Internodia digitorum, 104
 Interossei musculi, 104
 Intersepalium, 104
 Intersecciones musculorum rectorum abdominis, 104
 Intestina, 227. eorum synonymia, *ibid.* tus, *ibid.* connexio, *ibid.* initium, *ibid.* magnitudo, *ibid.* substantia, *ibid.* vasa, *ibid.* numerus, 228. varia differentia, *ibid.*
 Intestinorum longitudo, 227
 Intestinorum substantia mucosa, 227
 Intestinorum crista, 227
 Intestina interdum flavo colore tincta, 14
 Intestina foris pinguedinem adnatam habent, quod contra medicos quosdam notandum, 227
 Intestinorum variae divisiones, *ibid.*
 Intestina tenuia & crassa quæ, *ibid.*
 Intestinorum actio, 230. usus, *ibid.*
 Intestinorum obscuro motus quis, 231
 quomodo demonstrari queat, *ibid.*
 Intestinum duodenum, 228. ejus os, *ibid.* progressus, situs naturalis, 228
 Intestinum duodecim digitorum, 228
 Intestinum jejunum, *ibid.* ejus principium, *ibid.* vasa, *ibid.* longitudo, *ibid.* plicæ, *ibid.* meatus bilarius, *ibid.* situs naturalis, 218. præternaturalis, *ibid.* à ventriculo cibis repleto comprimitur, *ibid.*
 Intestinum venter, 228
 Intestinum ileum, *ibid.* ejus initium, *ibid.* etymologia, *ibid.* plicæ, *ibid.* substantia, 228
 Ilei situs naturalis, 218. non naturalis, *ibid.* præternaturalis, *ibid.*
 Intestinum cæcum, 229. ejus figura, *ibid.* magnitudo, *ibid.* in sano semper inveni- ne, *ibid.* aliquando inventum verum plenum, *ibid.* situs præternaturalis, 218. in quodam suspensio cur ileo & colo herniam fecit, *ibid.*
 Intestinum monocolum, 229
 Intestinum colon, 229. ejus ortus, *ibid.* connexio, *ibid.* longitudo, *ibid.* figura, *ibid.* cellulæ, *ibid.* ligamentum, *ibid.* appendiculæ, *ibid.* vasa, *ibid.*
 Intestini coli valvula, 229. interdum la- ditur, ut adeo feces ascendere queant, ut & clysteres, 229
 Intestini coli situs naturalis, 218. in quodam suspensio fecit herniam, *ibid.*
 Intestinum colon in quibusdam longius in aliis brevius, 218. mutat sicut ventriculo pleno, *ibid.* ambulanti- & sedentibus magis descendit, quasi decumbentibus, *ibid.* gravidis uter- aucto ascendit, *ibid.* lateralibus parti- bus situm nequaquam mutat, *ibid.*
 Intestinum rectum, 230. magnitudo ejus, *ibid.* & vasa, *ibid.* vulnera consolidatur, *ibid.*
 Intest

INDEX.

testina crassa cur tenuibus magis sint
obnoxia ulceribus, 218. & 179
oculi, 4. ejus colores unde &
quot, *ibid.*
9
12
ali Germani cur minus pilosi, 210
26
ves, 6. 46
gulum, 6. 46
K.
αἰθήρες, 234
μυῖον ἐν ἐνέφρῳ, 291
μυῖον ἐν ὀφθαλμῷ, 4
αἰθήρες, 8, & 46
αἰθήρες, 11
αἰθήρες, 5
αἰθήρες, 9
αἰθήρες, 8
αἰθήρες, 58
αἰθήρες, 2
αἰθήρες, 26
αἰθήρες, 25
αἰθήρες, 45
αἰθήρες, 10
αἰθήρες, 12, 62
αἰθήρες, 31
αἰθήρες vox ambigua, 2, 224
αἰθήρες, 4
αἰθήρες, *ibid.*
αἰθήρες, 257
αἰθήρες, 11, 26
αἰθήρες, 4
αἰθήρες, 2
αἰθήρες, 2, 285
αἰθήρες, 259
αἰθήρες, 26
αἰθήρες, 41
αἰθήρες, 2, 31
αἰθήρες, 115
αἰθήρες valvæ, 10 & 255
αἰθήρες, 2
αἰθήρες, 255
αἰθήρες, 9, 248
αἰθήρες, 5
αἰθήρες, 245
αἰθήρες, 237
αἰθήρες, 9
αἰθήρες, 1
αἰθήρες, 292
L.
αἰθήρες, 5. eorum motus, 92. musculi, *ibid.*
αἰθήρες valvæ, 10, 255
αἰθήρες, 5
αἰθήρες sinuum offium, 26
αἰθήρες acertosi quinam dicantur, 78
αἰθήρες acertus, *ibid.*
αἰθήρες, 232
αἰθήρες, 8
αἰθήρες, 6
αἰθήρες, 281
αἰθήρες, 281. ejus situs, *ibid.* vasa, *ibid.*
αἰθήρες glandulæ, 282. cur ex rima constet, 284
αἰθήρες, 72
αἰθήρες motus, 96. musculi, *ibid.*
αἰθήρες, 31
αἰθήρες, 17
αἰθήρες, 6
αἰθήρες, 11
αἰθήρες Herophili, 289
αἰθήρες ossa medullam non continent, 30

Lien, 239. ejus situs, *ibid.* numerus, 240.
connexio, *ibid.* magnitudo, *ibid.* fi-
gura, *ibid.* superficies, *ibid.* substan-
tia, *ibid.* membrana, *ibid.* color, *ibid.*
vasa, *ibid.* actio, 241. usus, 242
Lienis situs naturalis, 217. non natura-
lis, *ibid.* præternaturalis, *ibid.*
Lienis magnitudo præternaturalis vigin-
ti quatuor libras pendens, 217, 240
Lienis scirrhus ventriculum reddit im-
becillio rem, 217
Lienis futura, 240
Lienis caput & cauda quid Hippocr. 240
Lien acclivis & declivis quid eadem, *ibid.*
Lienis vasorum anastomosis diligenter
notanda, 242
Lien non dolet, *ibid.*
Lien ut attrahat crassum chylum, *ibid.*
Lien aliquando in dextro hypochondrio
situs, 217
Lien in sanis cur tactu non deprehenda-
tur, 240
Lien palpitare quandoque deprehendi-
tur, 179
Lienis viæ per quas expurgatur ad ven-
triculum, 241. aliæ ad nares, *ibid.* ad
urinas, *ibid.* ad podicem, *ibid.*
Lienosis cur diuretica ab Hippocr. præ-
scribantur, 241
Lienis usus ab Aristotele optime præpo-
situs, *ibid.*
Lien sanguinem purissimum generat, *ibid.*
Lien non potest esse receptaculum hu-
moris excrementitii, 241. multo mi-
nus melancholici, *ibid.*
Ligamentum quid, 72. ejus substantia,
usus, 73. differentia, *ibid.*
Ligamentum carent sensu, 73
Ligamentorum totius corporis histo-
ria, 74
Ligamentorum alia lata, alia teretia, 73.
alia membrana, alia cartilaginea, *ibid.*
Ligamenta capitis, 74. thoraces, *ibid.*
Ligami ventris, *ibid.* artuum, 75
Ligamenta annularia manus, 75. pe-
dis, 77
Ligamentum transversale carpi, 123
Ligamentum ossium, 29
Linea candida abdominis, 108. seu se-
milunaris, *ibid.*
Linea candida linguæ, 95
Linea mediana linguæ, *ibid.*
Lineæ manus, 11
Lineæ cerebri, *ibid.*
Lineæ menfalæ, *ibid.*
Lineæ vitæ in manu, vitæ longitudinem
monstrat, 11
Linguæ frenum, 74. motus, 95. mus-
culi, *ibid.* linea candida, 95. media-
na, *ibid.*
Lingua cur in ardentibus febribus ni-
grescat causa vera, 174
Loca muliebres quid, 255
Longus quis dicitur, 14
Lumbi, 8. 4
Lumborum motus, 114. musculi, *ibid.*
Lumborum vasa, 9. pulpa, *ibid.* verte-
bræ quinque, 51
λίσσινος ἢ τριχῶν, 2
M.
Macrocephali, 16
Malæ, 5. unde dicitur, *ibid.* cur rubeant
in peripneumoniaci, *ibid.*
Malleolus internus, 12. 63. externus, *ibid.*
Malleoli male Tali à medicis dicuntur, 12

Malleus auditus ossiculum, 37. ejus ca-
pitulum, *ibid.* processus, *ibid.* inven-
tor, *ibid.*
Mammæ, 7
Mammarum magnitudo, 18. quomodo
variet, *ibid.* in nutrice consideran-
da, *ibid.*
Mammæ cum utero consensus infi-
gnis, unde, 109, 161
Mammæ puellis infantibus non appa-
rent: pubescentibus erumpunt: men-
sibus aptis attolluntur: gravidis intum-
escunt: senioribus flaccescunt, 267
Mammillæ, 7
Mammillæ virorum, 266. ex quibus
confent, *ibid.* lac non habent, *ibid.*
Mammæ feminarum, 266. ex quibus
partibus confent, *ibid.* earum cana-
les lactiferi, *ibid.* vasa, 267. magni-
tudo, *ibid.* usus, *ibid.*
Mammosæ femine libidinosiores, 161
Mammillares cerebri processus, 193, 303
Manus & ejus partes, partiumque ap-
pellationes, 10. 57. ejus ambigui-
tas, 10
Manus extrema, 10. ejus divisio, 11.
ejus dorsum, *ibid.*
Manus lineæ, 11. monticuli, *ibid.* ex-
sura, *ibid.* de qua, *ibid.*
Manus five carpi motus, 121. musculi, *ibid.*
Manus ossa, 32. 59
Mas an plures habeat costas quam fœ-
mina, 53
Masticatoria in oculorum affectibus ad-
hibenda, non errhina, 189
μαστί, 7
μασγανίς, 6
Matrix, 257, 258
Maxilla inferior, 6. superior, 5, 39
Maxillæ inferioris os, 31, 41. homini
brevissimum & rotundum, *ibid.* ex
unico osse constat adultis, *ibid.* mo-
bile, durum, crassum, *ibid.*
Maxillæ inferioris motus, 93. muscu-
li, *ibid.* figura, 41. processus duo, *ibid.*
foramina duo, *ibid.* alperitates tres, 42.
cavitates, *ibid.*
Maxillæ superioris ossa, 31, 40. conne-
xio, 40. futura, *ibid.* substantia, 39
Meatus auditorius, 36
Meatus biliaris in jejunio, 228
Meatus urinarius, 9, 243
Mediastinum, vide membrana mediasti-
num.
Medius venter, 265. ejus cuticula, *ibid.*
cutis, *ibid.* pinguedo, 266. membra-
na carnosâ, *ibid.*
Medii ventris situs, 265. figura, *ibid.*
partes duplices continentes & con-
tentæ, *ibid.* musculi, 100
Medius venter calori influenti dica-
tus, 265
Medullam non esse ossium alimentum
probat, 30. quem usum præstet, *ibid.*
Medulla in capite contenta, 290
Medulla spinalis, 193. vide spinalis me-
dulla.
μῆλας, 5
Melancholiæ hypochondriacæ sedes, 179
Membrana carnosâ, 213. cur carnosâ
dicatur esse, cum revera sit nerva, *ibid.*
in multis animalibus musculi munere
fungitur, *ibid.* in quibusdam locis in
homine carnosâ quoque est, *ibid.* in
recens natis rubra, *ibid.* sensu exqui-
sito prædita, *ibid.* horrores vellicata
Q 9 3 exci-

I N D E X.

excitat, *ibid.* ejus usus, *ibid.* non ita bene a pinguedine distinguitur, *ibid.*
 Membrana Mediastinum dicta, 269. ejus etymologia, *ibid.* substantia, *ibid.* superficies, *ibid.* magnitudo, 270. varia, *ibid.* usus, *ibid.*
 Membrana pleura, 268. ejus appellationes, *ibid.* substantia, *ibid.* vasa, *ibid.* figura, *ibid.* superficies, *ibid.* magnitudo, *ibid.* foramina, *ibi.* exortus, *ibi.* usus, *ibid.*
 Membrana Peritoneum, 213. vide Peritoneum.
 Membranæ Matres, 288
 Membranæ Cerebri, vide Cerebri membranæ.
 Membrana $\delta\alpha\gamma\alpha\sigma$, 248. $\delta\alpha\gamma\alpha\sigma$, *ibid.* $\delta\alpha\gamma\alpha\sigma$, *ibid.* $\delta\alpha\gamma\alpha\sigma$, *ibid.*
 Membrana cerebri, ventriculos succingens, 291
 Membranæ viscerum imi ventris unde nascantur, 214. non ubique æqualis crassitie, sed crassiores, quorum viscerum arteriæ plures sunt, 215
 Memoria sedes, 35
 Menstrues, 288
 Menies per quas venas fluant ex observatione Auctoris, 101. 259
 Menfes pudenda laxant, 161
 Mentula, 9. magna itemque parva cur improbetur, 19
 Mentula muliebris, 255
 Mentum, 6
 Mies, 12. 61
 Mies, 232
 Mies, *ibid.*
 Mesenterium, 232. à Gaza lactes vertitur, *ibid.* divisio, *ibid.* figura, *ibid.* magnitudo, *ibid.* substantia, *ibid.* vasa, *ibid.* glandulæ, *ibi.* connexio, *ibi.* exortus, *ibid.* adeps, *ibid.* usus, 233
 Mesocolon, 232
 Mesocolon, 8
 Mesocolon, 3
 Metacarpus, 11. 59. ossa quatuor, *ibid.* figura, *ibid.* substantia, *ibid.* magnitudo, 60. appendices, *ibid.*
 Metacarpus, 11
 Metacarpus, 13
 Metatarsus, 13. 65. ejus ossa, *ibid.* horum magnitudo, *ibi.* appendices, *ibi.* connexio, *ibid.*
 Metatarsus, 7
 Metatarsus, 48
 Metatarsus, 257
 Metatarsus, 3
 Mola, 12. 62
 Mons Veneris, 255
 Monticuli manus, 11
 Morbi magnitudinem corporis immutare possunt, 15
 Motus duplex, naturalis & animalis, 79
 Motus animalis musculi beneficio fit, *ibi.*
 Motus musculi non est ejusdem actio, sed effectus actionis, 80
 Motus tonicus, *ibid.*
 Motus spontaneus, 79
 Motus voluntarius quis dicatur, *ibi.* & 186
 Mucus quid, 298
 Mulieri sanguinem vomenti erumpentibus membris cur solutio fiat, 182
 Mulieres ad conceptionē ineptæ quæ, 19
 Mulieres quænam difficulter pariant, *ibi.*
 Musculus unde dictus, 78. an Aristoteles cognoverit, 79. Hippocrati cognitus, *ibid.* apud Aristotelem caro dictus, *ibid.*

Musculi definitio secundū Galenum, 79.
 secundum Auctorem, 80
 Musculi divisio in principium, medium, & finem, 81
 Musculi principium seu caput, medium seu venter, finis seu cauda male vulgo definiuntur, 81. daturque alia eorum definitio, 82
 Musculorum finis male $\delta\alpha\gamma\alpha\sigma$, aut $\delta\alpha\gamma\alpha\sigma$, sive tendo dicitur, *ibid.*
 Musculorum partes dissimiles quæ, 81
 Musculorum partes similes septem, 82, quædam ex his communes, quædam propriæ, *ibid.*
 Musculus motus animalis instrumentum, 79
 Musculus pars dissimilis, 79. quomodo pars similis interdum dicatur, *ibi.*
 Musculi propria actio quæ, 80
 Musculorum doctrina quam utilis & necessaria, 78
 Musculorum motus quatuor sunt, 80
 Musculus unus interdum pluribus motibus est destinatus, 88
 Musculus tantum habet fibras rectas, 82
 Musculorum contractio quid denotet, 80
 Musculi pars primaria est tendo, probatur, 83
 Musculorum figuræ mediæ & extremæ, 80
 Musculi quidam semper sunt in media figura, *ibid.*
 Musculorum constructio, 81
 Musculus excarnandi modus, 83
 Musculorum differentia ex tribus classibus petita, primo ex iis, qui totum musculi corpus respiciunt, 85. secundo, quæ dissimiles partes concernunt, 86. tertio quæ similes, 87
 Musculorum variae formæ, 78. 85
 Musculorum quis maximus, 86. minimus, *ibid.* crassissimus, *ibid.*
 Musculorum numerus valde controversus, 86
 Musculorum caput quot differentias habeat ratione substantiæ, 86. figuræ, *ibid.* magnitudinis, *ibid.* numeri, 87. situs, *ibid.*
 Musculorum venter quot differentias habeat, ratione substantiæ, 87. figuræ, *ibid.* magnitudinis, *ibid.* numeri, *ibid.* situs, *ibid.*
 Musculorum finis quot differentias habeat ratione substantiæ, 87. figuræ, *ibid.* magnitudinis, *ibid.* numeri, *ibid.* situs, *ibid.*
 Musculorum tendo quot discrimina faciat ratione figuræ, 87. magnitudinis, *ibid.* numeri, *ibid.*
 Musculorum alii nervos habent, alii illis destituuntur, 81. 87
 Musculorum doctrina quantas difficultates habeat, & quomodo tollendæ, 88
 Musculorum divisio, *ibid.*
 Musculorum nomina & appellationes unde petendæ, *ibid.*
 Musculorum numerus imensus & incertus, 88. quomodo tamen facile addiscendus, *ibid.* & verus numerus inveniendus, *ibid.*
 Musculorum omnium totius corporis enumeratio seu catalogus, 133
 Musculorum usus in genere multiplex, 80
 Musculi Abdominis, vide Abdominis musculi.
 Musculus ani, 115. est duplex, *ibid.*
 Musculi auricularum, 94. aurium, *ibid.*

Musculi buccarum, 91
 Musculi capitis, 97. eorum numerus, 98
 Musculi carpi, 121
 Musculi cervicis, 99
 Musculi cruris, 124
 Musculi cubiti, 119. flectentes, *ibid.* extendentes, 120
 Musculi Fallopiiani, 108
 Musculi facium, 96
 Musculi femoris, 126. eorum numerus, *ibid.* situs, *ibid.*
 Musculi frontis, qui sunt, 98. rectus superior, periciliorum musculi dicendi, *ibid.* latus palpebræ decidit, 190
 Musculi genarum, 91
 Musculi humeri, 117. numerus, *ibid.*
 Musculi infimi ventris, vide Abdominis musculi.
 Musculi intercostales, 104. externi & interni, *ibid.* quot sunt, *ibid.* cur quidam plures ac author ponant, *ibid.*
 Musculi labiorum, 92. eorum numerus, *ibid.* situs, *ibid.*
 Musculi laryngis, 91
 Musculi linguae, 95. numerus, 88
 Musculi lumborum, 114. flectentes, *ibid.* extendentes, *ibid.*
 Musculi manus digitos flectentes, 122. extendentes, 124. oblique trahentes, 121
 Musculi maxillæ inferioris, 93. eorum numerus, *ibid.*
 Musculi nasi, 91. quatuor paria, 101
 Musculi oculorum sex, 90. eorum situs, *ibid.*
 Musculi ossis hyoidis, 91
 Musculi palmaris, 122. ejus descriptio, *ibid.* ejus tendo, *ibid.* caro quæ drata, *ibid.*
 Musculi palpebrarum, 114
 Musculi pedis, 114
 Musculi pedis digitos flectentes, 131. extendentes, 132. ad latera trahentes, *ibid.*
 Musculi penis, 116. usus, *ibid.* numerus, *ibid.*
 Musculus plantaris, 131. ejus descriptio, *ibid.*
 Musculi pyramidales, 108. an distincti par à rectis abdominis, 109
 Musculi radii, 121
 Musculi scapulæ, 107
 Musculi subclavi finis & principium, 107
 Musculi verus, *ibid.*
 Musculi succenturiati, 109
 Musculus $\delta\alpha\gamma\alpha\sigma$, 111
 Musculi tarsi, 121
 Musculi testium, 115. numerus, *ibid.*
 Musculi thoracis qui vocentur, 100. quot sint revera, 101
 Musculi tibiæ, 128. numerus, situs, *ibi.*
 Musculus trochlearis, 9
 Musculus flexor, 111
 Musculus $\delta\alpha\gamma\alpha\sigma$, 121
 Musculus, 12. 61
 Musculus, 301
 Musculus, 251
 Musculus, 271
 Musculus, 1

N.

Nanos ex morbo fieri,

I N D E X.

- Nares, 3. narium pinnae, *ibid.*
Nasus & ejus partium appellationes, 3
Nasi divisio, *ibid.* ejus spina, *ibid.* globulus, *ibid.* dorsum, *ibid.* Columna, *ibid.* alae, *ibid.* diaphragma, *ibid.*
Nasi motus quot, 91. musculi, *ibid.*
Nasus internus, ejusque partes, 303
Nasus externus, *ibid.* ejus partes, *ibid.* ejus membrana exquisita sentit, *ibid.*
Nates, 9
Naturalia, *ibid.*
Natura muliebris, 254
Naturæ artificium in fabrica musculorum rectorum abdominis, 113
Naviculare os, 64. ejus pars convexa & concava, *ibid.* situs, *ibid.*
Necquid unguium, 12
Nervi, 243
Nervus, 185. ejus homonymia, *ibid.* propria significatio, *ibi.* definitio, *ibi.* substantia, *ibi.* membrana duplex, *ibi.* venule exiles ipsum nutriendes, *ibid.*
Nervorum interior substantia medullaris, ubi conspicua, 186
Nervorum differentia, 187
Nervorum alii molles, alii duri, *ibid.*
Nervi omnes teretes, *ibid.*
Nervorum exortus diversus, 188
Nervosus primi, secundi, quinti, atque octavi paris verus ortus, 295
Nervorum doctrinae utilitas, 185
Nervi quasi omnibus musculis insunt, 84
Nervus in musculi aut principium, aut medium, nunquam in finem inferitur, 84. 101
Nervi in musculum insertio qualis, 84
Nervi in musculi distributio qualis, *ibid.*
Nervi ex innumeris funiculis contexti, 186
Nervi non sunt distincti in sensorios motoriosque, *ibid.*
Nervi olfactorii, 193. cur inter nervorum paria non recedantur, *ibid.*
Nervorum olfactoriorum verus ortus, *ib.* & 295
Nervorum aliqui tantum seorsum ferunt, alii sensum & motum, 186
Nervorum plexus sexti paris, 191
Nervorum paria triginta octo, 188. ex quibus octo cerebri dicta, *ibid.* septem medullæ cervicalis, *ibid.* & 193. duodecim dorsalis, 188. & 196. quinque lumborum, 188. & 197. sex ossis sacri, 188. & 198
Nervi cerebri qui dicantur, 188
Nervi spinalis medullæ qui dicantur, *ib.*
Nervorum cerebri historia, *ibid.* verus ortus, 295. & 188
Nervus auditorius, 191
Nervi brachiorum, 198. eorum plexus, *ibid.* ortus, *ibid.*
Nervi crurum, 200
Nervus fistularis, 9
Nervi optici revera perforati, 187. & 189
Nervi recurrentes, 192. iis præcis vox perit, & quamobrem, *ibid.*
Nervum à corde ad digitum annularem mitti fabula, 11
Nervum quid significet, 185
Neutra ossum articulatio, 28. quotuplex ea sit, *ibid.*
Nigrum oculi, 300
Nodi digitorum, 11
Nodus gattaris, 6
Nodus, 7
Nubeculae unguium, 12
Nubes frontis, 3
Nutritio an fiat humoribus excrementitiis, 167
Nutrix qualis eligenda, 18
Nymphæ, 10. 255
O.
Obesi cur difficiliter respirent decumbentes, 216. cur infecundi, 210
Observationes in Auctore passim occurrentes: de immutatione magnitudinis hominum in Belgio, 16. de subcavo oculi, 4. de mentala longa, 19. de pudendo muliebri, *ibid.* de pedibus longis, 20. de humore articulari, 29. de lenis affectibus, 18. obferv. in purgationibus præscribendis, 19. & 20. obferv. de futuris cranii, 32. de trepanifatione, 35. obferv. chirurg. circa dentium radices, 42. circa humeri luxati restitutionem, 47. observationes circa ossa pubis & os sacrum, 56. & 112. circa curationem unguium, 67. obferv. chirurg. circa restitutionem ossium fractorum & luxatorum, 80. obferv. anatom. circa distinctionem musculorum, 88. obf. chirurg. circa frontis abscissum, 89. obf. anat. circa motum diaphragmatis in vivis, quo viscera pellit & attrahit, 101. obf. nova de insertione nervorum in musculos rectos, 109. obferv. circa musculum palmarem, 122. circa tendinem magnum calcis, 130. circa venas, 140. obferv. anatom. circa intestina, 146. circa anastomoses venarum in hepate, 147. circa apertionem thoracis, 154. obf. practica circa calculi renum curationem, 160. circa sanguinis concretionem, 169. circa vermes in venis, 170. observationes duæ circa arterias, 173. circa frigida potum, 174. circa clysteres purgantes, 181. circa dolores colicos, *ibid.* obferv. practica circa oculorum affectus, 189. circa palpebras prolapsas, 190. circa veneno interfectos, 205. circa tumores internos qui frigidi apparent, 209. circa paracentesim, 218. circa Hepatis lobum tertium, 223. circa intestini coli valvulam, 230. circa sanguinis vomitum, 241. circa uteri ligamenta, 259. circa vulnera thoracis, 269. obferv. chirurg. circa pericranium, 287
Occiput, 2. ejus os, 35
Oculus & ejus partes, 4. & 299
Oculus internus, *ibi.* externus, 4. & 299
Oculorum motus, 90. musculi, *ibid.*
Oculi pars primaria, 301
Oculorum adeps, 299
Oculorum anguli, 4
Oculi cavum, *ibid.* subcavum, *ibid.*
Oculi subcavum, si intumuerit, quid significet, 4
Oculi pupilla, 300. ejus nigrum, *ibid.* album, 5
Oculorum vasa, 299
Oculorum tunica, 299. earum numerus apud auctores incertus, *ibid.* qui tam facile cognoscatur, *ibid.*
Oculorum tunica Dura, 300. Cornea, *ibi.* Vrea, *ibi.* Retina, *ibid.* Adnata, *ibid.* Innominata, *ibid.* Crystallina, *ibid.* Aranea, *ibid.* Vitrea, *ibid.*
Oculorum humores, 300. tres sunt, *ibid.*
Aqueus, *ibid.* Crystallinus, 301. Vitreus, *ibid.*
Oculi actio & usus, 301
Oculi orbita quot constituitur offibus, 41
Oculi femiaperitis dormire in acutis morbis cur lethale, 190
Oculorum affectus qua ratione curandi, 189
Oculus quo pacto extra orbitam possit protrudere, nervo optico integro, *ibid.*
Oculus uterque cur simul moveatur, 189
Oculus, 5
Oculus, 223
Oculus, 10. 58
Olfactus instrumenta, 303
Omentum, 219. ejus etymologia, *ibid.* substantia, *ibid.* magnitudo, *ibid.* figura, *ibid.* connexio, *ibid.* membranae sive alae duæ, 220. origo, *ibid.* vasa, *ibid.* usus, *ibid.*
Omentum homini sæpe pubis ossa attingit, 219
Omenti situs naturalis, 219. dum stamus, currimus, equitamus, descendit, *ibid.* quandoque superior membrana locum mutat, quandoque interior, *ibid.* obesi descendit ob pondus, *ibid.* obefum uterus comprimit, ut steriles fiant, *ibid.* intestinis flatibus repletis involvitur, *ibid.* in hernia descendit, *ibid.*
Omentum ex Galeni sententia connectitur ventriculo, lieni & colo, 219. imo vero & hepati, *ibi.* & quomodo, *ibid.*
Omentum quibus abscissum est, iis frustatur cibi concoctio, 220
Omentum concoctionem juvat, *ibid.*
Omenti ex Hippocr. sententia, usus improbat, *ibid.*
Omentum cur homini quam brutis majus, *ibid.*
Omentum, 6
Omentum, 7. 47
Omentum, 10
Omentum, 8
Omentum, 13. 66
Omentum, 4. 299
Omentum, 3. 26
Orbita oculi sex ossibus constituitur, 41
Orbita, 9. 248
Orbita, 6
Os, 21. unde dicatur, *ibid.* quid sit, *ibid.*
Ossium cognitio quam utilis & necessaria, 21
Ossium doctrina fundamentum Anatomiae, *ibid.*
Os pars simplex & quomodo, 21 & 22
Os quot usus præstet, *ibid.*
Ossium differentia, 22. à temperamento, *ibid.* ab ætate, *ibid.* à sexu, *ibid.* à figura, 23. à meatibus, *ibid.* à superficie, *ibid.* à magnitudine, *ibid.* à numero, *ibid.* à situ, 24. à sensu, *ibid.* à tempore generationis, *ibid.*
Ossa vitrorum duriora foeminarum offibus, 22
Ossa puerorum mollia, *ibid.*
Ossa non omnia æque dura, *ibid.*
Ossa cur plura, non unum, 23. 26
Ossium sit ne aliquid principium, quale venarum, 31. & quodnam sit, *ibid.*
Ossa ex duabus constant partibus, præcipua & adnata, 25
Ossium compositio, 27. quotuplex, *ibi.*
Ossium, 28
Ossium

I N D E X.

Offium nutrimentum quod, 29
 Offium appendix seu *ἄρτηρος*, 25. pro-
 cessus, *ibid.* sinus, *ibid.* capita, 26.
 cervices, 25. colla, *ibid.* *καρκαλα*, *ibid.*
καρκαλα, *ibid.*
 Offium appendicum usus, 25
 Offium omnium numerus, 31. 32. ol-
 fium capitis numerus, 32. offium cra-
 nii numerus, 31. cervicis, *ibid.* tho-
 racis, 31. 32. imi ventris, 32. ar-
 tuum, *ibid.*
 Officula tria auditui interuentia, 37.
 quis inventor eorum, *ibid.* eorum
 substantia, *ibid.* magnitudo, *ibid.* pe-
 riosio carent, *ibid.* perfecta sunt in
 infanti, 24
 Os Calcis, *vide* Calcaneus.
 Ossa carpi octo, 29. eorum substan-
 tia, *ibid.* figura, *ibid.* connexio, *ibid.*
ibid.
 Os coccygis, 52. ex pluribus officulis
 componitur, *ibid.* ejus substantia, *ibid.*
 connexio, 53. in mulieribus extor-
 sum nonnihil vergit, *ibid.* figura, *ibid.*
 usus, *ibid.*
 Os coxendicis, 55. ejus acetabulum, *ib.*
 sinus, *ibid.* appendix, *ibid.* duo tu-
 bercula, *ibid.* situs, *ibid.*
 Os cribriforme, 38. *vide* Os spongio-
 sum.
 Os cubiforme, 65
 Os cubiti vel Vlna, 58. quid commune
 cum radio habeat, *ibid.* quid proprii
 habeat, *ibid.* ejus gibber, *ibid.* ejus
 sinus signoides, *ibid.* processus sinus
 ejus, *ibid.* sinus lateralis, *ibid.* pro-
 cessus styliformis, *ibid.*
 Os cuneiforme, 37. connexio, 38. sub-
 stantia, *ibid.* processus, *ibid.* sinus, *ib.*
 foramina, *ibid.* *vide* plura Ossa cunei-
 forma.
 Ossa digitorum manus quinddecim, 60.
 eorum substantia, *ibid.* figura, *ibid.*
 magnitudo, *ibid.* appendices, *ibid.*
 Ossa digitorum pedis, 66. substantia, *ib.*
internodia, *ibid.*
 Os eniforme, 46
 Os *ἐξοειδές*, 38
 Os femoris, 61. ejus substantia, *ibid.* fi-
 gura, *ibid.* connexio, *ibid.* appendi-
 ces duæ, *ibid.* caput, *ibid.* processus
 duo, *ibid.* rotatores, *ibid.* sinus, *ibid.*
 impressiones, *ibid.* linea aspera, *ibid.*
 foramina, *ibid.*
 Os frontis, 34. ejus figura, *ibid.* con-
 nexio, *ibid.* substantia, *ibid.* caverna,
 35. foramina, *ib.* processus, *ibid.*
 Os frontis in pueris duplex, 35
 Os humeri, 57. situs, *ibid.* substantia, *ib.*
 figura, *ibid.* ejus appendix superior, *ib.*
 capita superiora & inferiora, *ib.* ap-
 pendix inferior, 62. trochlea, *ibid.*
 sinus duo, *ibid.* tubercula duo, *ibid.*
 foramina, *ibid.*
 Os hyoides, 44. unde dictum, *ibid.* ejus
 synonymia, *ibid.* est os multiplex, *ibid.*
 quot ossibus conflet, *ibid.* basis ossis
 hyoidis, *ibid.* cornua ossis hyoidis, *ib.*
 processus ejusdem, *ibid.* connexio, 45.
 usus, *ibid.*
 Os hyoidis similitudo cum osse inferioris
 maxillæ, 44. latera ejus humilio-
 ra, *ibid.* latera ejus superiora, *ibid.*
 Offis hyoidis motus, 55. musculi, *ibid.*
 Os isopis, 52
 Os ilium, 55. ejus spina, *ibid.* costa, *ibid.*
 dorsum, *ibid.* connexio, *ib.* situs, *ibid.*

Os *ἰσός*, 54
 Os inuominatum, 54. unde dictum, *ibid.*
 ex quibus ossibus componatur, *ibid.*
 differentia in utroque sexu, 55
 Os jugale, 39. ejus partes, *ibid.* situs, *ib.*
 ulus, *ibid.*
 Os *λαγύριον*, 54
 Os *λαμβδαιδές*, 44
 Os *λινθαιδές*, 36
 Os malæ, 40. ejus foramina, 41
 Ossa manus utriusque, octuaginta qua-
 tuor, 32
 Ossa manus extremæ, 59
 Ossa maxillæ superioris sex, 40. *vide* ma-
 xilla superior.
 Os maxillæ inferioris, *vide* Maxilla in-
 ferior.
 Ossa metacarpi quatuor, 59. eorum
 substantia, *ibid.* figura, *ibid.* magni-
 tudo, 60. appendices, *ibid.*
 Ossa metatarsi quinque, 65. eorum sub-
 stantia, *ibid.* magnitudo, *ibid.* appen-
 dices, *ibid.* connexio, *ibid.*
 Os multiforme, 38
 Os naviculare, *vide* Naviculare os,
 Os *ἐξοειδές*, 46
 Os occipitis, 35. ejus figura, *ibid.* nu-
 merus, *ibid.* substantia, *ibid.* superfi-
 cies, *ibid.* foramina quinque, 36. si-
 nus, 35. appendices, 36
 Os pectoris, 46. ex quot ossibus con-
 flet, *ibid.* substantia ejus, *ibid.* figu-
 ra, *ibid.* usus, *ibid.*
 Ossa pedis utriusque octuaginta qua-
 tuor, 32
 Ossa pedis extremi, 63
 Os *φασγόνιον*, 44
 Os petrosium, 36
 Os *πελμαγον*, 38
 Ossa pubis, 55. foramen eorum, *ibid.* si-
 tus, *ibid.* sinus, *ibid.* cavitas pelvis, *ib.*
 an dehiscant in partu, 56. an move-
 antur, 102. 112. qualiter movean-
 tur, 113
 Os sacrum, 52. unde dictum, *ibid.* non
 est unum, *ibid.* figura, *ibid.* foramina, *ib.*
 processus vertebrae, *ibid.* an dehiscat
 in partu, *ibid.*
 Ossa scapularum, 47. figura eorum, *ibid.*
 latera, *ibid.* dorsa, *ibid.* cavi-
 tates, *ibid.* anguli tres, *ibid.* basis, *ibid.*
 costæ, *ibid.* connexio, *ibid.* substan-
 tia, *ibid.* processus tres, *ibid.* cer-
 vix, *ibid.* spina, *ibid.* usus, 48
 Officula sesamoidea manuum, 60. situs
 eorum, *ibid.* substantia, *ibid.* figu-
 ra, *ibid.* numerus, *ibid.* connexio, *ib.*
 usus, *ibid.*
 Officula sesamoidea pedum, 66
 Os *σταφιδαιδές*, 64
 Os sphæroides, 37
 Os spongiosum, 38. ejus partes qua-
 tuor, *ibid.* & partium usus, 39. præ-
 ter naturam expurgat cerebri excre-
 menta, *ibid.*
 Os *στυλοειδές*, 39
 Ossa synsiphitis, 35. eorum numerus, *ibid.*
 figura, *ibid.* connexio, *ibid.* magni-
 tudo, *ibid.* superficies, *ibid.* substantia, *ib.*
 Os tali, 64
 Ossa tarsi, 63. quænam habeant inter se
 communia, *ibid.* numerus, 64. figu-
 ra, *ibid.* connexio, 65
 Ossa temporum, 36. eorum figura, *ibid.*
 magnitudo, *ibid.* connexio, *ibid.* sub-
 stantia, *ibid.* sinus duo, *ibid.* foramina
 quinque, *ibid.* processus quatuor, 40

Os tibie, 62. substantia, *ibid.* appen-
 dices duæ, *ibid.* sinus, *ibid.* tubercu-
 lum, *ibid.* cartilago, *ibid.* capitu-
 lum laterale, *ibid.* foraminula, *ibid.* tu-
 berculum anterius, *ibid.* tres linee, *ibid.*
 tria latera, *ibid.* spina, *ibid.* mallo-
 lus, 63
 Os verticis, *vide* os synsiphitis.
 Os *ὠλακοειδές*, 44
 Osculum externum uteri cervicis, 10
 Os *ὠμα* membrana, 9 248
 Os *ὠμα*, 8
 Os *ὠμα*, 21. unde dicatur, *ibid.*
 Offiola venarum, 149
 Os *ὠμα*, 6
 Os *ὠμα*, 28
 Os *ὠμα*, 6
 Os *ὠμα*, 9

P.

Palma, 11
 Palmaris musculus, 122. *vide* musculus
 palmaris.
 Palmula costarum, 54
 Palpebræ, 4. unde dictæ,
 Palpebræ si in somno conuiscant, mor-
 tem significant, at non semper, 4
 Palpebrarum crepidines, *ibid.*
 Palpebrarum motus, 89. musculi, *ibid.*
 Palpebra cur prolatabatur supercilii mu-
 sculo læso, 190
 Pancreas, 234. ejus substantia, *ibid.* fi-
 gura, *ibid.* situs, *ibid.* membrana, *ibid.*
 usus multiplex, *ibid.*
 Panniculus carnosus, 21
 Papilla, 7. 267. earum magnitudo, 18
 sensus exquisitus, *ibid.* usus, 268
περὶ τῆς, 12
 Paralytic imperfectæ quomodo inter-
 dum colicos dolores sequatur, 128
περὶ τῆς, 128
 Parastatæ, 247. eorum ortus, *ibid.* fi-
 tus, *ibid.* insertio, *ibid.* substantia, *ibid.*
 membrana, *ibid.* usus, 257
 Parastatæ semen elaborant, 252. & qui-
 dem vi propria, 257
περὶ τῆς, 81
περὶ τῆς, 29
περὶ τῆς, 28
 Partes omnes simul formantur, 14
 Partium externarum totius corporis ap-
 pellationes, 1 & sequæ
 Partes genitales earumque appella-
 nes, 1
 Partes genitales mulierum, 1
 Partes genitales viriles, 9. earum divi-
 sio, *ibid.* historia, 24
 Partium in infimo ventre situs, 11
 Partes imi ventris quæ sunt quas Ven-
 tæ, quæque cava nutrit, 22.
 Partes similes rectius dicuntur confu-
 miles, 2.
 Patella, 12. 62. ejus magnitudo, 62
 usus, *ibid.* substantia, *ibid.* connexio,
 xio, *ibid.*
 Parrus quis dicatur, 1
πάρους, 10, 5
 Pecten mulieris quid, 257
 Pecten pedis, 6
 Pectus, 7. ejus longitudo, 1
 Pedes, 1
 Pedis extremi motus, 129. musculi
ibid.
 Pedis planta, 6
 Pedis ossa, 3
 Pedis extremi ossa, 3 *ibid.* & 6
 Pedis

I N D E X.

Pedis dorsum, 13. ejus concavum, <i>ibid.</i>	φάτινα, 5	ginis, radicationis, & dispensatio-
digit, <i>ibid.</i> pedem, 65	φάτιον, 6	nis, <i>ibid.</i>
De pede, vide plura Pes, 12	φάτις, 138	Processus ossium, 25. quatuorplex, <i>ibid.</i>
Pedior, 13. 65	φάτις, 17	Processus aliformis, 38. anuroides, 25.
Πηλη, 4	φάτις, 7	48. coracoides, <i>ib.</i> graphyoides, 25.
Pellis, 202	φάτις, 103	36. mamillares cerebri, 295. & 303.
Pelvis quæ cavitas apud Anatomicos dicatur, 55	Ρα mater, 288	maïtoïdes, 25. Πιερρυοειδής, 38. σγ-
Pelvis cerebri, 291	Pilorum materia & causæ quæ, 209	μοειδής, 48. vermiformes cerebri, 292
Penis & ejus partium appellationes, 9.	Pilos nutriti, 165. & unde, <i>ibid.</i>	περρυλον, 5
homonymia, 249. situs, <i>ibid.</i> figura, <i>ibid.</i> magnitudo, <i>ibid.</i> partes externæ & internæ, <i>ibid.</i> actio, 253	πιμαλδ, 210	περρυμιον, 12
Penis muliebris, 10. ejus convenientia cum pene virili, <i>ibid.</i>	Pinguedo, <i>ibid.</i> ejus definitio, <i>ibid.</i> situs, 211	περρυδνλθ, 11
Penis masculi, 116. & 250	Pinguedinis materia sanguis, 211. non tamen quivis sed maxime elaboratus, <i>ibid.</i> & qui oleosus, <i>ibid.</i>	Promanus, <i>ibid.</i>
Penis vasa, <i>ibid.</i>	Pinguedinis efficiens, 211	περρυμωις, 3
Penis glans, 250. ejus sensus acris, <i>ibid.</i>	Pinguedinis generatio qualis, <i>ibid.</i> quas conditiones requirat, 212	Pronatores musculi, 120
substantia, <i>ibid.</i> foramen, <i>ibid.</i>	Pinguedinis usus duplex, <i>ibid.</i>	Prostatæ, 248
Penis frenum, <i>ibid.</i>	Pinguedinis temperamentum, <i>ibid.</i>	περρυμιον, 5
Penis septum lucidum, <i>ibid.</i>	Pinguedinis & sevi differentia, 210	περρυπον, 2
Penis duo nervosa corpora, 249	Pinguedinis differentia in copia ratione sexus, ætatis, temperamenti, regionis, vitæ generis, temporis anni & morborum, 212	Protuberantia ossis, 26
foramina, <i>ibid.</i> substantia, <i>ibid.</i> musculi, <i>ibid.</i>	Pinguedo circa membranas maximè concrevit & cur, 211	Ψάα lumborum, 9
Penis fibræ pecciniformes, 249	Pinguedo an sentiat, 212	Ψάα musculi, 126
Penis vagina, 257	Pinguedo musculis quibusdam adnascitur, 85	Ψάνα, 13. 64
Penis differt magnitudine pro ratione familiarum, frequentia coitus, &c. 249	Pinguedo an nutriet tempore inedie, 112	Ψάρις, 13
Penis non fit minor, ut vulgus putat si umbilicus brevis abscondatur, <i>ibid.</i>	Pinguedo iis est quæ utrinque dentata, 210	Ψάρις sub vulva, 10. 255
Πε, 9	Pinguedo cum sevo à Medicis quandoque confunditur, <i>ibid.</i> imò & à Galeno ipso, <i>ibid.</i>	Ψάρις qui dicti, 47
Perarticulatio, 28	Pinguedo capitis, 287	Ψάρι quinquam obnoxii, 14. 49
Pericardium, 270. ejus synonymia, <i>ibid.</i> substantia, <i>ibid.</i> figura, <i>ibid.</i> usus, 271	Pituita quomodo expurgetur, 38	Pubes, ejusque variae significationes, 8.
Pericardii humor, 270. ejus differentia ratione copiae & coloris, <i>ibid.</i> ejus generandi ratio, <i>ibid.</i>	Pituita collecta in cavitate quæ inter ventriculorum & diaphragma est, quomodo dolores concitet, 226	Pudenda, 9
Pericranium, 287. ejus substantia, <i>ibid.</i> numerus, <i>ibid.</i> crassities, <i>ibid.</i> sensus, <i>ibid.</i> connexio, <i>ibid.</i>	Planci qui dicantur, 13	Pudendum virile, 9. ejus proportio & magnitudo, 19
Pericranii confensus cum dura membrana, 288	Planta pedis, 65	Pudendum muliebre, 10. 254. ejus magnitudo, 19. periculose medicamentis attrahitur, <i>ibid.</i>
Pernæum, 9. 12	Plantaris musculus, 131. ejus descriptio, <i>ibid.</i>	Pudendi mulieris rima magna, 255.
Periostrum, 24. 287	Pleura, vide Membrana Pleura, 7. 268	labia, <i>ibid.</i> alæ seu nymphæ, <i>ibid.</i>
περρυοειδής, 281	Pleuritis, 269	clitoris, <i>ibid.</i> caruncula myrtiformes, 256. duo cæca foramina, 257. usus, 261
Peripneumaticus cur genæ rubeant, 5	Plexus choroides cerebri, 291	Pudendum muliebre in gravidis sæpe inflammatur & cur, 263
περρυοειδής, 213	Plexus nervorum sexti paris, 191	Pudenda mensium tempore valide laxantur, 161
Peritoneum, <i>ibid.</i> unde dicatur, 214. ejus figura, <i>ibid.</i> superficies, <i>ibid.</i> substantia, <i>ibid.</i> connexio, <i>ib.</i> origo, <i>ibid.</i> duplicatio, <i>ibid.</i> foramina, <i>ibid.</i> processus, 215. vasa, <i>ibid.</i> usus, <i>ibid.</i>	Plexus pampiniformis, 247	Pudenda mensium tempore valide laxantur, 161
Pentoneum non ubique eadem tenuitate prædictum, 214	Plexus rectiformis sub cerebro, 292	Pueri cur nequeant loqui, 22
Peritoneum non æqualem in omnibus quæ succingit visceribus, crassitiam habet, <i>ibid.</i>	Πιερρυοειδής & Πιερρυοειδής, 280	Pueri cur pingues non sint, 211
Peritonæi processus & quæ vasa vehant, 215	Πιερρυοειδής, 6	Pueris cur frequens adeo ani procidentia, 53
Peritoneum largitur membranas omnibus imi ventris membranis, 214. circa vesicam & uterum duplicatur, <i>ibid.</i>	Πιερρυοειδής, 9	Puerperarum dolores post partum difficilem circa os sacrum & pubis unde, 56
περρυοειδής, 103	Podex, 9	Pugnus, 11
Pes & ejus partium appellationes, 12. magnitudo in proportionato corpore, 20	Podicis musculi, 115	Pulmo, 280. etymologia ejus, <i>ibid.</i> synonymia, <i>ibid.</i> partes, <i>ibid.</i> linea dividens, 281. lobi, <i>ibid.</i> figura, <i>ibid.</i> magnitudo, <i>ibid.</i> connexio, <i>ibid.</i> substantia, <i>ibid.</i> membrana, <i>ibid.</i> vasa omnis generis, <i>ibid.</i> actio, 282
Pesma gnus quid, 12	Pollex, 11	Pulmonarii qui dicantur, 281
Pes parvus seu extremus, 13. 63. ejus partes, <i>ibid.</i>	Pollicis flexores, 123. extensores, 124. ad latera abductores, 125	Pulmo fætus rubicundior, durior, ac gravior, quàm adulti, statimque submergitur, isto natante, 279. 281
De pede vide plura supra in Pedes.	Pomum Adami, 6. 71	Pulmonum aspera arteria, 281. ejus partes, caput & Πιερρυοειδής, <i>ibid.</i>
Pessaria Virginibus danda non sunt, 256	Poples, 12	Pulmonum fistula, 282. ejus membrana duplex, <i>ibid.</i> cartilagineæ, <i>ibid.</i> truncus, <i>ibid.</i> divisio, <i>ibid.</i>
Phalanges digitorum, 11	Pori bilarii, 238	Pulmonum Canna, 281
Φάτις quandoque pro Larynge sumitur, 281. quid propriè significet, <i>ibid.</i>	Pori cutis, 206	Pulmonum bronchia, 282
	Πιερρυοειδής, 238	Pulmonum motus qualis, 283
	Πιερρυοειδής, 248	Pulmo sanguine ab aliarum partium sanguine diverso nutritur, 277. 279
	Πιερρυοειδής, 36	Pulmo cur non renoso sanguine nutrir debuerit, 277. neque arterioso, <i>ibid.</i>
	Πιερρυοειδής, 234. & 146	Pulmo inflammatus, quomodo resolutionem inferat, 178
	Πιερρυοειδής, 250	Pulpa lumborum, 9
	Πιερρυοειδής, 11	Pulsus quid, 172. ejus usus, <i>ibid.</i> cordi innatus, <i>ibid.</i> cordis arteriarumque sit simul, <i>ibid.</i>
	Πιερρυοειδής, 12	
	Πιερρυοειδής, 103	
	Πιερρυοειδής, 8. 103	
	Πιερρυοειδής, 9. 250	
	Πιερρυοειδής, 42	
	Præcæcia, 103	
	Præcordia, 8. 103	
	Præputium, 9. 250	
	Prælepiola dentium, 42	
	Principium partium triplex, 142. ori-	

INDEX.

Pulsus cordis actio, 275
 Pulsus ex dilatione, constrictione, & intermedia quiete constat, *ibid.*
 Pulsus efficiens causa, *ibid.* usus, *ibid.*
 Pupilla, 300
 Purgationes corporum per clysteres, optimè ad hoc institui posse, 181
 Pygmei an dentur, 15
 πύλας Hepatis, 146
 πύλας, 225

R.

ῥαγή, 7
 ῥαγή quid Hippocrati significet, 221
 Radius, 58. quid commune cum ulna habeat, *ibid.* quid proprii, *ibid.*
 Radii capitulum superius, 58. cervix, *ibid.* tuberculum, 59. capitulum inferius, *ibid.* sinus lateralis, *ibid.* connexio cum ulna, *ibid.* ligamentum longum, *ibid.*
 Radii motus, 120. musculi, *ibid.*
 ῥαχίς, 28
 ῥαχίς lienis, 240
 Rectum intestinum, *vide* intestinum rectum,
 Regio umbilicalis, 8
 Remulus costarum, 54
 Renes, 243. numerus eorum, *ibid.* situs, *ibid.* connexio, *ibid.* figura, *ibid.* magnitudo, *ibid.* partes, *ibid.* membrana, *ibid.* pinguedo, *ibid.* vasa, 244
 Renum fascia, 243
 Renes succenturiati, *ibid.* eorum historia, *ibid.*
 Renum carunculæ papillares, 245
 Renum glandulæ, 243. earum figura, substantia, *ibid.* vasa, *ibid.* usus, *ibid.*
 Renum actio, 245
 Renum usus, *ibid.*
 Renes ad se serum trahunt, *ibid.*
 Renum calculi ubi generentur, 159
 Ren sinister dextro superior, 145
 Ren sinister cur dextro magis calculo obnoxius, 160
 Respiratio, 282. ejus causa, *ibid.* partes, *ibid.* usus, 283
 Respiratio duplex, libera & coacta, item naturalis & voluntaria, 100
 Respiratio fit sine abdominis musculorum ope & probatur, 101
 Rete, 219
 Rete mirabile etiam in homine invenitur, 176
 ῥιζὸν, 12
 ῥιζὸν magna vulvæ muliebris, 10. 255
 ῥιζὸν, 3
 Rotatores femoris, 61. externus, *ibid.* internus, *ibid.*
 Rutula, 12. 62
 Rugæ, 3
 ῥυτίς, 3
 ῥυτίδες, *ibid.*

S.

Sacrolumbi musculi, & eorum usus ex sententia auctoris, 102. 104. 105
 Sacrum veteribus quid significarit, 52
 Særum, 210
 Sævi & pinguedinis differentia, *ibid.*
 σελήνη, 219
 Salvatella, *vide* vena Salvatella.
 Sanguis & sanguen, 164
 Sanguinis synonymia nulla, *ibid.* homonymia, *ibid.*

Sanguinis definitio, *ibid.* color, *ibid.*
 Sanguinis receptacula, 165
 Sanguinis materia, *ibid.* & 168
 Sanguinis efficiens causa, 165
 Sanguinis causa finalis, *ibid.*
 Sanguinis fibræ, 139
 Sanguis aspectu quidem homogeneus, at revera heterogeneus, 167
 Sanguinis partes quot & quæ sint, *ibid.*
 quas causas habeant, 168
 Sanguinis differentia quæ sint, *ibid.*
 Sanguis taurinus an sit venenum, 169
 Sanguis venæ Portæ crassior ac feculentior, *ibid.* & cur, *ibid.*
 Sanguis vasorum partium extremarum rubicundior quam aliarum, 169
 Sanguis qui ex manu evacuat, cur pulchrior & rubicundior, quam qui è brachio, 158
 Sanguis cur rubicundior per cucurbitulas, quam venæ sectionem educatur, 169
 Sanguinis ratione animalia duplicia, 165
 Sanguis alimentum omnium partium, 166
 Sanguis ad prudentiam confert, 166
 Sanguis ossium alimentum, 30
 Sanguis per quas vias ad ossa perveniat, *ibid.*
 Sanguis an possit in venis putrescere, 169, & 170
 Sanguis cur ex corde potendus, 276
 Sanguis venosus quomodo differat ab arterioso, 139
 Sanguinis arteriosi usus, *ibid.*
 Sanguinis venosi color, *ibid.* fibræ, *ibid.* crassities, *ibid.* usus, *ibid.*
 Sanguis quomodo perveniat ad partes, 141
 Sanguis trahitur à partibus non pellitur à venis, ex opinione auctoris, *ibid.*
 Sanguis conficitur in venis ex Galeni & auctoris sententia, 143
 Sanguinis ultima perfectio fit in dextro cordis ventriculo, 237
 Sanguis menstruus, *vide* Menfes.
 Sanguificationis historia, 237
 Sanguificationem nec in corde, nec in jecore fieri ut queat probari, 143
 Sanguificatio Hepatis, *vide* Hepatis sanguificatio.
 Scapulæ, 7. 47. *vide* & Os scapularum.
 Scapularum motus, 116. musculi, *ibid.*
 Sceleton, 26
 σφραγὶς vulvæ, 10. 255
 Scortum, 9
 Scrobiculus cordis, 46
 Scrotum, 9
 Sectio thoracis ubi facienda, 154
 Sella turcica, 38
 Semen virile corporis nostri materia non est, 251
 Seminis materia sanguis, *ibid.* non tamen quivis sed perfectissimus, *ibid.* cur non ex vena Portæ ducatur, *ibid.* cur arteriosus, *ibid.*
 Semen virile non abit in auras, ut quidam putant statuisse Aristotelem, 251. sed calidum influens ac innatum constituit, *ibid.*
 Semen virile, quomodo dicatur σπέρμα, *vide* σπέρμα apud Aristotelem, 251
 Semen virile non asseratur in testibus sed proflatus, 253
 Semen per quas vias, & quomodo in Vrethram coitus tempore deducatur, 249

Semen acedine perflum, cur, 251
 Senes an minores sint sepius juvenibus, 14
 Septum pellucidum in pene, 250
 Septum transversum, 103
 Serrati majoris musculi usus ex opinione Auctoris, 102. 117
 Serrati postici quem usum habeant, ex Auctoris sententia, 102. 105
 Selamoidæ officula, 60. *vide* Officula selamoidæ.
 σελήνη, 5
 Simia non habet nates, 9
 Sinus muliebris, 257
 Sinus ossium & eorum differentia, 25.
 Sinus duræ cerebri membrana, 289
 Sinus viscerum imi ventris, 8. 216
 σκαθόν, 31
 σκαλετών, 26
 σκίλη, 12
 σφαιροειδὲς ὄδον, 44
 σφαγὴ, 8. 46
 σφαίρα, 3
 σφραγιδὲς ὄδον, 37. *vide* Os cuneiforme.
 Sphincter ani, 115. usus, *ibid.*
 Sphincter musculi vesicæ, 115. ejus usus, *ibid.* & 246
 σφύρις, 172. 175
 σφύρις, 275
 σφύρις, 12
 Spina dorsæ, 7. 48. ossibus constat viginti quatuor, 48
 Spina tibiæ, 62
 Spinalis medulla, 193. ejus etymologia, 193. homonymia, *ibi.* origo, *ibi.* membrana, *ibid.* forma, *ibid.* nervi, *ibid.* usus, 194
 Spinalis medullæ verus ortus, 295
 Spiritus ex sanguinis desorbi fiunt, 173
 Spiritus vitales qui dicantur, 172. non generantur ex aere, *ibid.* refrigerantur, & cur in cerebro, 296. attenuantur in cerebro, *ibid.*
 Spiritus animales quomodo generantur, 296. ex qua materia, *ibid.*
 Spiritus animales nervos in substantia pervadere probatur, 189
 Spiritus animalis quomodo in oculo videat, in aure audiat, 252
 Spiritus proprii ad feminis virilis generationem non requiruntur, *ibid.*
 σπινθηρ, 271
 Splen *vide* Lien.
 Splenia quid, 240
 Spleniatum mentum quid, *ibid.*
 Splenica arteria, *vide* Arteria splenica.
 Splenica vena, *vide* vena splenica.
 σπινθηρ, 38
 Spondyli, 48
 Stapes auditus officulum, 37. ejus capitulum, *ibid.* basis, *ibid.* titus, *ibid.*
 στάσις, 21
 σπμα, 9. 249
 σπμα glandis, 9
 σπμα oculi, 8
 Sterilitatis signa, 19
 Sternum, 7. *vide* Os pectoris.
 στήθος, 9
 Sternutatio nimia quomodo quibusdam repentinam cæcitatem attulerit, 189
 Stilleidum pro ventriculo cur fatius sedentibus quam decumbentibus fiat, 218
 στήλες, 3
 σπμα, 5
 Sto-

I N D E X.

machus Græci quid, 224. apud Latinos pro ventriculo sumitur, *ibid.*
 por cruris in calculo unde, 243
 pelavi musculi usus ex Auctoris opinione, 102, 106
 pectus, 103
 men, 8
 pericilia quid, 3. horum caput & cauda, *ibid.*
 pericilia sinuum ossium, 26
 pinatores musculi, 120
 opofitoria ex helleboro albo, quomodo saepe gravia symptomata inferant, 181
 ra, 12
 edi nati cur etiam muti fiant, 191
 tura quid, 28, 33. ejus ambiguitas, 28
 usufus triplex, 32
 tura senibus abolentur, 33. & quæ prior ex ipsis, *ibid.*
 tura utrique sexui, & quidem numero pari sunt communes, *ibid.*
 tura quotuplices, *ibid.*
 tura in infantibus rectam lineam referunt, 33
 tura folis capitis offibus competant, *ibid.*
 tura coronalis, 33. sagittalis, *ibid.*
 lambdiformis, *ibid.*
 tura squamose, 34
 turarum quæ dicantur veræ, 33. & cur veræ dicantur, 34. quæ mendosæ, 33. quæ propriæ, *ibid.* quæ communes, *ibid.*
 turarum verarum historia, 33
 turarum mendosarum numerus, 34
 turarum Communium historia, *ibid.*
 pueri quid Hippocrati, 259
 mphytis ossium, 27. quotuplex, *ibid.*
 mphytis, 23. quotuplex, *ibid.*
 ncipit, 2. ejus etymon, *ibid.* ossa duo, 35
 mphytis, *ibid.*
 mphytis, 27
 mphytis, 3
 mphytis, 28
 mphytis, *ibid.* ab Authore inventa, 27
 mphytis, 27
 mphytis, *ibid.*
 mphytis, *ibid.*
 T.
 casus immediatum instrumentum caro, & quomodo, 209. 303
 casus, 12. 64. ejus figura, *ibid.* sex latera, *ibid.*
 casus alia quoque animalia habent, 64
 casus improprie de malleolis dicitur, 12
 casus, 4
 casus, 13. 63. ejus motus, 129. musculi, *ibid.* ossa, 64
 Temperamentum unde dijudicari queat, 2
 Tempora, *ibid.* unde dicta, *ibid.* ejus ossa, *ibid.*
 Tendo musculi quid sit, 82
 Tendo vox ambigua, 84
 Tendo pars similis, *ibid.*
 Tendo pars simplex & sui generis, *ibid.*
 Tendo per totum musculi corpus, & quidem secundum longitudinem diffunditur, *ibid.*
 Tendo divisus carne stipatur, *ibid.*
 Tendo contractioni maxime opportunus, 83
 Tendinis substantia, *ibid.*
 Tendinis temperies, *ibid.*
 Tendinis temperiem consequentia, *ibid.*

Tendinis materia, *ibid.*
 Tendo tantum secundum longitudinem musculi ducitur, 82
 Tendo non tantum in fine, sed & principio musculi reperitur, *ibid.*
 Tendo est primaria musculi pars, 83.
 probatur id quatuor rationibus, *ibid.*
 Tendo illa pars est per quam fit musculi contractio, 83
 Tendo modo unitus est modo divisus, 82. & cur, 83
 Tendo magnus ab Hippocrate ita dictus, 130
 Tentigo mulieris, 255
 Tergum, 7
 Testes, 9. unde dicantur Latinis, 248
 Testes viriles, 247. eorum substantia, *ibid.* partes, *ibid.* magnitudo, 248.
 figura, *ibid.* musculi, 115. & 248.
 tunica quatuor, 248
 Testes viriles nunquam semen in se continent, 252
 Testes viriles non generant semen, nec in se, neque in alio per irradiationem, 252. quibus argumentis id probari possit, *ibid.*
 Testes viriles non habent in se spiritus proprios, tanquam in fonte suo, 252
 Testes viriles non egent peculiari spiritu ad feminis generationem, *ibid.*
 Testibus virilibus ablati, aut læsi, cur generandi vis pereat, cum testes semen non generent, 253
 Testium virilium verus usus ex Auctoris sententia, 252
 Testes viriles quomodo ad feminis generationem secundario conferant, *ibid.*
 Testes viriles serosum humorem continent, *ibid.* & 253
 Testis sinister cur dextro major, 253
 Testes muliebres, 260. differentia eorum cum testibus virilibus in situ, substantia, figura, tunicarum numero, magnitudine, *ibid.*
 Testis, 7
 Testis, 11
 Thorax & ejus partium appellationes, 7
 Thoracis ambiguitas, *ibid.* etymologia, *ibid.* divisio, *ibid.*
 Thoracis figura, 17. magnitudo, *ibid.* unde sæpius immutetur, *ibid.*
 Thoracis motus primarius & secundarius, 100
 Thoracis motus sine animalis an naturalis, *ibid.*
 Thoracis musculi, *ibid.* horum numerus, *ibid.*
 Thoracis ossa, 31. 53. vertebræ quot, 50
 Thorax cur ex carne & pluribus offibus conficit, 53
 Thorax imprudenter stringitur infantibus, 17
 Thoracem dilatantes confringentesque musculi qui sunt, & quot, 102. Extendentes quot ex opinione aliorum, 104. ex Auctoris sententia unus tantum, 105. flectentes, 106. & 112. circumagentes, 106
 Tibia, & ejus partium appellationes, 12.
 62. ejus ambiguitas, *ibid.* ejus ossa, 62.
 ejus spina, *ibid.*
 Tibiæ motus, 128. musculi, *ibid.*
 Timpora, 2
 Timpanum, 7
 Tonillæ, 282
 Torcular Herophilii, 289
 Torcular, 6

Trochlea humeri, 57
 Trochlea oculi, 91. ejus musculus, *ibid.*
 inventor Fallopius, *ibid.*
 Tuba Fallopii, 164
 Tuba Fallopii, 261
 Tunica costalis, 268
 Tunica prætensa, 213
 Tussis quid, 282
 Tympanum, 9
 Tympanum auri, 302
 V.
 Valvulæ venarum, 140
 Valorum natura, 139
 Valorum tria sunt genera in corpore, *ibid.*
 Vas breve, *ibid.* ejus usus, 150
 Vas breve arteriolum, 179
 Vas breve venosum, 149
 Valorum cordis in foetu unio, 279. quomodo postea pereat, *ibid.*
 Vasa cæca muliebria, 261
 Vasa deferentia viri, 248. eorum substantia, *ibid.* ortus, *ibid.* progressus, *ibid.*
 Vasa deferentia muliebria, 260. non implantantur in utero cervicem, ut censuit Andr. Laurentius, *ibid.*
 Vasa emulgentia, 244
 Vasa præparantia virilia, 247
 Vasa præparantia muliebria, 260. in quo convenient cum virilibus & differant, *ibid.* qualia in gravidis sunt, 264
 Vasa umbilicalia in editis cavitatem suam amittunt, 279
 Vbera, 7
 Vena, 138. ejus ambiguitas, *ibid.*
 Vena quid significet apud veteres, 138
 Venarum cognitio quam necessaria, 140
 Venarum divisio, *ibid.* definitio, 139
 Vena est vas, 139
 Venarum sanguis qualis, *ibid.* in quibus ab arteriarum sanguine differat, *ibid.*
 Venarum substantia est membranosa & simplex, 139. non tamen ubique, 140
 Venarum fibræ, 139. quot earum genera, *ibid.*
 Venæ sensu carent, *ibid.* non tamen ubique, 140
 Venarum figura, *ibid.*
 Venarum magnitudo quotuplex, 140
 Venarum numerus, *ibid.*
 Venarum situs, *ibid.*
 Venarum color, 139
 Venarum valvulæ, 140. quis earum inventor primus, *ibid.*
 Venarum anastomoses, 147
 Venarum glandulæ, 140
 Venarum actio & usus, 141
 Venarum differentie, *ibid.* à substantia, *ibid.* magnitudine, *ibid.* figura, *ibid.* sede, *ibid.* connexione, *ibid.* usu, 142
 Venarum connexio varia, 141
 Venæ comites ferè ubique arterias habent, *ibid.*
 Venarum distributio non eadem in omnibus, 158
 Venæ olim nervi dictæ, 185
 Venæ, 12

I N D E X.

Venæ an pellant sanguinem ad par- tes, 141	Venæ lumbares, 160	communia inter se habeant, <i>ibid.</i>
Venarum principium nullum ex Hippo- cratis sententia, 142. quomodo pro- bati id possit, <i>ibid.</i>	Vena mediana, 157. ejus situs, <i>ibid.</i>	propria habeant, <i>ibid.</i>
Venarum principium male ab Aristotel. cor positum, 143. male item jecur à Galeno, 145	Vena μεσαία, 147	Vertebrae Cervicis prima quid pro- pria habeat, <i>ibid.</i>
Venæ sunt quæ in hepate sanguificant, non parenchyma, 235. quomodo id probetur, <i>ibid.</i>	Venæ mesaraicæ, 150	Vertebrae cervicis secunda quid pro- pria habeat, <i>ibid.</i>
Venarum cur duæ tantum sint factæ, 146	Vena micans, 138, 171	Vertebrae cervicis quatuor secunde subjacentes quid propria habeant, <i>ibid.</i>
Venarum electio in brachio dum secan- dæ sunt, non ita religiose observanda & cur, 158	Venæ magnæ, 141. mediæ, <i>ibid.</i> mini- mæ, <i>ibid.</i>	Vertebrae thoracis quot, 50. quid com- mune inter se habeant, <i>ibid.</i> quid pro- pria habeat, <i>ibid.</i>
Venæ unicam tantum habent tuni- cam, 136	Vena nervosa, 172	Vertebrae lumborum quinque, 51. quid commune inter se habeant, <i>ibid.</i>
Vena secunda dextri cordis ventriculi, cur arteriæ substantiam habeat, 278	Venæ parvæ, 141	Vertebrae communis canalis, <i>ibid.</i>
Venæ adiposæ, 159	Vena poplitea, 12. 162. celebris apud Medicos & cur, <i>ibid.</i> difficulter fe- cari potest, & cur, <i>ibid.</i> fonticulo in sura facto evacuat, 163	Vesicæ biliaris, 237. ejus connexio, & magnitudo, 238. figura, <i>ibid.</i> fan- tasia, <i>ibid.</i> substantia mucosa quæ intus oblinunt, <i>ibid.</i> vasa, <i>ibid.</i>
Venæ albæ Celsi dictæ, 243	Vena Portæ quæ dicatur, 146. & unde, <i>ibid.</i> quomodo apud Priscos vocetur, 147. est crassior cava, <i>ibid.</i> est minor cava, <i>ibid.</i> quas partes aliat, <i>ibid.</i> ad quas partes distribuatur, 148	Vesicæ biliaris partes dissimilares, fu- sus & cervix, 238. meatus bilia- rii, <i>ibid.</i> communis canalis, <i>ibid.</i>
Venæ arterialis historia, 184. ejus u- sus, <i>ibid.</i> cur arteriæ substantiam ha- beat, 278	Venæ Portæ divisio in radices, truncos ramos & furculos, <i>ibid.</i>	Vesicæ urinariæ situs naturalis, 219. mi- naturalis, <i>ibid.</i>
Venæ αρτηϊκή, 138	Venæ Portæ radices, <i>ibid.</i>	Vesicæ urinariæ fundus, 246. cervix, <i>ibid.</i> corpus, <i>ibid.</i> ejus vulnera quænam ha- beat, <i>ibid.</i>
Vena azygos, five sine pari, 154. 244. in ruminantibus gemina, 154. ejus ramus ad emulgentem sinistram abi- ens, 154. 244	Venæ Portæ truncus, <i>ibid.</i>	Vesicæ foramen in pudendo mulie- bri, 219
Vena basilica, 158. in dextro brachio hepatica dicitur, in sinistro splenica, <i>ibid.</i> in duos ramos dividitur, <i>ibid.</i>	Venæ Portæ rami duo insignes, 149	Via per quam colici dolores in paraly- si & epilepsiam degenerant, 181. in thritidem & contra commutantur, <i>ibid.</i>
Venæ capillares, 141	Venæ Portæ usus, 150	Via per quam thoracis empyema & aqua evacuatur, ex Fallopii primom sel- tentia, deinde & Auctoris, 244. <i>ibid.</i> & 154. & 171
Vena Cava quæ, 147. differentia inter hanc & Portæ, <i>ibid.</i> ejus historia, 153. usus, <i>ibid.</i>	Venæ Portæ cum Cava in hepate anasto- moses, 147	Via per quam humores pravi ad intesti- na deturbantur ex liene, 171
Venæ Cavæ descriptio sic tradenda est, ac si ex hepate oriatur, idque propter Auctores, 153	Venæ Portæ differentia, <i>ibid.</i>	Via per quam hydropicorum aquæ e- purgantur ad intestina, <i>ibid.</i> & 171
Vena Cava ratione hepatis, duos veluti truncos constituit, <i>ibid.</i>	Venæ præparantes viri, 247. dextra, <i>ibid.</i> sinistra, <i>ibid.</i>	Via per quam potus per universon cor- pus subito penetrat, 171
Venæ Cavæ truncus ascendens, 153. hujus rami subclavii, 154. axilla- res, 155	Venæ pullatiles quæ Veteribus, 138	Via per quam pravi humores ex lie- ni vomitu rejiciuntur, <i>ibid.</i>
Venæ Cavæ truncus descendens, 159. hujus prima divisio in ramos ilia- cos, 160	Venæ pulsus carentes quæ eisdem, <i>ibid.</i>	Via per quam atra bilis purgatur, 171
Vena Cephalica, 157. à Vesalio Hume- raria dicitur, <i>ibid.</i> cur sic dicatur, <i>ibid.</i> rami ejus, <i>ibid.</i>	Vena salvatella, 158. in affectibus me- lancholicis admodum commendatur, & qui possit prodesse ostenditur, <i>ibid.</i>	Vidus tenuis cur purgantibus assumptus præscribendus, 171
Vena Cephalica semper sine: at Basilica cum impetu secta sanguinem fundit, & quare, 157. 173	Vena Saphæna, 162. male vocatur vena tali, <i>ibid.</i>	Vinculum caninum, 171
Vena Cephalica manus, 158. magna cum utilitate in capitis dentiumque affectibus aperitur, <i>ibid.</i>	Venæ sanguinariæ, 138	Virginibus cur sanguis in coitu effluat, 251
Vena coronaria, 153	Venæ spermaticæ, 160	Vir pectus dorso pilosius habet, ut ver- tem ab umbilico ad usque per- næum, 201
Venæ crurales, 162	Venæ σφουγγη, 138	Virilis bursa, 201
Venæ cutaneæ quæ dicantur, 206. non habent sibi socias arterias, 142	Vena splenica, 149. quos ramos spar- gat, <i>ibid.</i>	Viscera omnia parenchymata habent, 241
Vena deferens viri sinistra cur ex emul- gente oriatur, 251	Vena tali, 162	Viscerum imi ventris situs, 8. 21.
Venæ emulgentes, 159	Vena umbilicalis, 163. non est truncus peculiaris, sed ramus tantum venæ Portæ, 140	Viscerum imi ventris divisio, 211
Venæ encephalicæ, 156	Venter quid, 1. ejus ambiguitas, 140	Viscerum obstructions quæ faciunt li- ani affectibus cordis palpitatio- nes, 271
Vena frontis, <i>ibid.</i> magna cum utilitate in insania aperitur, <i>ibid.</i>	Venter infimus, vide infimus venter.	Viscerum parvitas signum bonarum car- nium lanionibus, 241
Venæ hæmorrhoidalis late dictæ, 149. proprie dictæ, 150	Venter medius, vide medius venter.	Vilu
Vena hæmorrhoidalis interna, 149. ex- terna, 161	Venter primus & superior, 2	
Vena hepatica, 158	Venter supremus, 285. ejus situs, <i>ibid.</i> substantia, <i>ibid.</i> partes, <i>ibid.</i>	
Vena hypogastrica, 147	Ventriculus, 224. ejus figura, <i>ibid.</i> si- tus, <i>ibid.</i> annexio, <i>ibid.</i> magnitu- do, <i>ibid.</i> substantia, 225. orificia duo, <i>ibid.</i> vasa, <i>ibid.</i> actio, <i>ibid.</i>	
Vena jecoraria, 147	Ventriculi os ejusque situs, 8	
Venæ jugulares, 156	Ventriculi orificium superius Græcis καρδια, Latinis Cor dictum, 225	
Vena μεσολη, 147	Ventriculi situs naturalis, 217. non na- turalis, <i>ibid.</i> præternaturalis, 218	
Vena lactea quæ dicatur, 147	Ventriculi & cordis consensus unde, 225	
	Ventriculus ex vulnere Diaphragmatis in Thoracem ascendit, 218	
	Vermes in venis interdum generari, 170	
	Vertebrae, 48. earum usus, <i>ibid.</i> nume- rus, <i>ibid.</i> communia quæ habent, <i>ibid.</i> proportio & magnitudo earum, <i>ibid.</i>	
	Vertebrae cervicis, 49. interdum septem nonnunquam & octo sunt, <i>ibid.</i> quæ	

I N D E X.

is instrumentum, 301. objectum, *ibid.*
 medium, *ibid.*
 quid sit, 276
 era crassiorum intestinorum cur ulce-
 ribus tenuiorum frequentiora, 179. 218
 a 10. vide Os cubiti.
 bilicus, 8. centrā imi ventris, imo
 otius corporis, *ibid.* & 18
 bilialis regio, 8
 bilialis vena & arteria, quomodo
 ost editum foetum in ligamenta abe-
 nt, ex opinione Hieronymi Teo-
 baldi, 280
 tio supra umbilicalem regionem fa-
 tam qui purget, 181
 nes, 12, 66. eorum partium appel-
 lationes, 12
 guium radices, *ibid.* exortus, *ibid.*
 uncta alba, *ibid.* nubeculae, *ibid.*
 nes non sunt cartilagineae, 66. nec
 alia, *ibid.* sed partes sui generis, *ibid.*
 angentur secundum omnes dimensio-
 nes, *ibid.* nutriuntur, 165. & un-
 de, *ibid.*
 nes habent vasa omnis generis, 66.
 unt prae diti sensu, 67
 guium substantia, 67. magnitudo, *ib.*
 figura, *ibid.* numerus, *ibid.* con-
 nexio, *ibid.* color, *ibid.* usus, *ibid.*
 la, 11
 cis organum primum, 283
 mitus futuri signa in labiis unde, 224
 achus, 246
 teres, 243. eorum substantia, *ibid.*
 ortus, *ibid.* processus, *ibid.* membra-
 nae, *ibid.* inferio, *ib.* magnitudo, 244
 eterum tubuli, *ibid.*
 eterum pelvis, *ibid.*
 etra, 249. vide & penis canal.
 etra per medium proflatarum in ex-
 ortu incedit, 249
 etra feminis ac urinae communis
ibid.

Vter, 7
 Vterus, 257. ejus partes tres, Cervix,
 ofculum, & fundus, *ibid.*
 Vterus proprie dictus, 258
 Vteri substantia, 259
 Vteri membranae, *ibid.*
 Vteri cotyledones, sive acetabula, *ibid.*
 Vteri cornua, *ibid.*
 Vteri collum, 257
 Vteri cavitas, 259
 Vteri cellulae nullae sunt, *ibid.*
 Vteri sutura, sive linea, *ibid.*
 Vteri venae, arteriae & nervi, *ibid.*
 Vteri situs naturalis, 259. non natura-
 lis, *ibid.* praeternaturalis, *ibid.*
 Vteri ascensus, 258. descensus, *ibid.* in-
 clinatio, *ibid.* an verè locum mutet,
ibid.
 Vteri cervix, 257. ejus situs, *ibid.* sub-
 stantia, *ibid.* rugae interiores, *ibid.*
 connexio, *ibid.* contorta est, ubi non
 recipit penem virilem, *ibid.* usus, 261.
 in gravidis insigniter abbreviatur, 263
 Vteri os, 257
 Vteri cervicis ofculum externum, 10, 257.
 internum, *ibid.* utriusque usus, 261
 Vteri os internum, 257. ejus situs, *ibid.*
 figura, *ibid.* conniventia, perpetua, *ibi.*
 apertio in coitu & partu, *ibid.* con-
 strictio conceptionis tempore, *ibid.*
 Vteri os inferum, induratum, exulcera-
 tum, cicatrice obductum aut nimis hu-
 midum cur sterilitatem inducat, 257
 Vteri os in gravidis connivet, non exactè
 clauditur, ut alii censent, & quomodo
 id deprehendatur, 263
 Vteri fundus, 258. ejus synonymia, *ibid.*
 situs, *ibid.* magnitudo, *ibid.* figura
 naturalis, *ibid.* non naturalis dum ge-
 stat, *ibid.* connexio, *ibid.* ligamenta
 quatuor, *ibid.*
 Vteri in gravidis magnitudo, 261. figu-
 ra, *ibid.* situs, *ibid.* substantia, 264

Vteri ligamenta superiora, 258. uteri
 ligamenta inferiora, 259. in muliere,
 quae ex coitu nimio mortua dicebatur,
 plena femine reperta est, *ibid.* qualia
 in gravidis sunt, 264
 Vteri os internum mensium tempore
 hiat, 161. unde sciatur, *ibid.*
 Vteri os internum gravidis hiat, tanto-
 que magis, quanto sunt partui vici-
 niores, 263. ut id sciatur, *ibid.* oc-
 cluditur tamen crassa viscidaque ma-
 teria, *ibid.*
 Vtero ad medium coxae procidente cur
 convulsiones fiant, 182. item cur tunc
 menses supprimuntur & dolor fiat in
 imo ventre, & in laterum multitudi-
 ne, *ibid.*
 Vteri & mammarum consensus non ra-
 tione tantum venarum sed etiam ner-
 vorum sexti paris fit, 161
 Vteri consensus per arterias venasque
 potius, quam nervos in hysterico fit
 affectu, 260
 Vulva & ejus partes, 10. vide Puden-
 dam muliebrem.

Y.

ὕδαλδες, 235
 ὕμναι, 3, 6
 ὑπερμα, 103
 ὑποσπινθη, ejusque divisio, 8
 ὑπερμα, 4
 ὑπερμα, 5
 ὑπερμα, 6
 ὑπερμα, 249
 ὑπερμα, 8
 ὑπερμα, 257

Z.

Ziphac, 214
 Zirbus, 219

F I N I S.



I V L I I C A S S E R I I
P L A C E N T I N I

Olim in Patavino Gymnasio Anatomiae & Chirurgiae
Professoris celeberrimi

A B V L Æ
A N A T O M I C Æ
L X X V I I I ,

Cum supplemento XX Tabularum

D A N I E L I S B V C R E T I I

Vratislaviensis, Phil. & Med. Doct.

Qui & omnium Explicationes addidit.

ELENCHVS TABVLARVM,
Quæ opera
DANIELIS BVCRETII
Huic operi accesserunt.

DVE Tabule libri primi, quæ hominis nudi faciem utramque spectandam proponunt.

DECEM Tabule libri secundi, quæ ossium omnium delineationem exhibent.

PRIMA Tabula libri quarti, in qua figuris variis faciei musculi demonstrantur.

TERTIA Tabula libri quinti, quæ tamen ex Vesalio petita, Venæ Cavae integre, & ab omnibus partibus libera delineationem complectitur.


SECUNDA Tabula libri sexti, ab eodem Vesalio mutata, Arteriam magnam cum suis ramis ac propaginibus ostendit.

TRES Tabule libri septimi indidem desumptæ, quæ omnium totius corporis nervorum designationem comprehendunt.

TABVLA singularis libri noni, quæ partes medii ventris coercet.

TABVLA ultima ultimi libri, in qua visus auditusque organa delineantur.

BENEVOLO LECTORI.



DRIANI Spigellii Viri Clarissimi quæ de hu-
mani corporis fabrica literis consignarat ope-
ra, cum primum mihi, Benevole Lector, præ-
scripto testamenti traderentur, ut, qua lege
ea reliquerat, collecta in lucem proferrem :
commodum in Tabulas Anatomicas Iulii
Casserii Placentini, ob egregiam in diffecan-

do dexteritatem celeberrimi Authoris, nec, ut spero, sine Nu-
mine incidi. Has, cum multitudine primum nullis in hoc gene-
re adhuc editis cedere: artificio autem singulari & elegantia sic
omnes superare viderem, ut longo intervallo post se eas relin-
querent, rem maxime Reip. literariæ utilem me præstiturum
credebam, si una cum historia in publicum protraherem. At
enim vix levi lustratis lumine, quantum tam egregio operi de-
esset, mox animadverto: jamque præmaturum magni Viri obi-
tum, qui tam præclaram voluntatem nefande interceptit, ama-
rius multo deflebam, quam modo suavius de tanti thesauri in-
ventione mihi gratulatus eram. Siccine enim tam eximium
opus, sumptu incredibili, laboribus immensis, continuisque vi-
giliis partum, divino dehinc ingenio consummatum, vel æterna
jam premetur ignominiose nocte, vel olim infelici manui spe-
rata misere ad ruinam præda erit? Movere tamen plurimorum
paulo post preces, apud quos scilicet hanc tam lamentabilem
studiorum calamitatem deplorabam, ut si imperfecta quoque
hæc forent, exstare tamen paterer, cum magnæ etiam rei, quan-
tulumcunque possederis, participem tantum fuisse, non mini-
ma certe gloria videatur. Suscepi hunc animum, qui & prom-
ptus ipse jam erat, excitatus exemplo quorundam summorum
Virorum, quibus sciebam vitio nequaquam esse habitum, quod
industriam suam singulari tantum argumento locarint: tum,
quod sperarem, fore aliquando, si apud me premerem, ut ætate
crescente, vel ipse in hac re aliquid, (tametsi haud ita promptum
videbatur,) vel alii doctissimi Viri præstarent, neque adeo hoc

tam nobile opus tam miserabili fato sic impie exstingueretur. Interim multos de mea focordia, addo etiam fide mullitantes audio, negligere me rem tanti momenti, aut dolose supprimere quæ mihi commissa forent: quorum querelas, etsi, (ut expetebat injustas,) dissimulare, taciteque habere & pati statueram, eo tamen prorumpabant tandem, ut jam aperta vi nonnulli extorquere tentarent, consulerem utilitati publicæ, suo commodo, & de me conceptæ expectationi. Ego vero cum me hic in eas angustias conjectum viderem, ex quibus emergere, nisi quid experirer, difficile erat: jam serio mentem ad editionem componebam, cumque, miser animi, importunis aliorum votis ab instituto consilio, ut videbatur mihi, maturo satis; tum ab incepto, quod in commodius tempus rejeceram, me revocari, cruciarer; cogitare tamen cœpi, si quo pacto fieri posset, ut omnibus suis numeris absolutum hoc opus in publico compareret. Sane, si quid tentarem, innumeris difficultatibus, atque iis arduis plenum confore, haud imperite prospiciebam: laborem ad tanti momenti opus requiri improbum, sumptus immensos, longam temporis diuturnitatem, molestissimam denique diversorum artificum operam. Accedebat, evictis his omnibus, jam neque arrogantiae crimen apud cordatos Viros evictare me posse, si me sperarem doctissimi hominis, qui adfectum hoc dederat, conatibus paria facturum: neque temeritatis risum apud malevolos, si metuerem, ne quid deterius facerem. Speravi tamen nihil futurum mihi insuperabile, aut magnum, si Fortuna solum diffusa me facie respiceret, ut invenirem, qui meis conatibus egregiam operam præstaret. Laborem me elusurum facile alacri animo, atque industria: sumptus toleraturum, bonorum patrocinio: diuturnitatem temporis superaturum, constantia. Arrogantiam haudquaquam videri posse, quæ à metu præsentis ruinæ tam egregii operis nata erat juvandi quocunque modo bonum publicum voluntatem: minus vero temeritatem sapere, si præclarorum Virorum subsidium strenuum, citra quod agendum nihil decreveram, mihi comparafsem. Nec defuit felix cæptis augurium, cum ecce eosdem adhuc in vivis reperio, qui ante plures annos in hoc ipso opere, Placentino operam tulissent, Edoardum inquam Fialettum Bononiensem, & Franciscum Vallesium Venetum: illum picto-

rum,

rum, hunc gryptarum suæ tempestatis, & in urbium Regina, Phœnices. Iam nihil tam difficile futurum ratus, quod animus spe læta incensus non ferret, aggressus sum arduum hoc negotium, promissis utriusque inflammatus magis, qui studium omne sic prolixè pollicebantur, ut quæ juvenili industria inchoata à se essent, senili judicio perficerentur, & ostenderent, tot annorum curriculum à morte Placentini, non ignobili segnitie sibi tritum, sed magna artis accessione bene collocatum esse. Sic incitatus, supplevi quæ deesse videbantur, Tabulis, iisque magna ex parte novis, nec antehac visis, viginti, quarum Indicem, ut constare posset quid ab utroque factum, præfationi subijciemus. Cæterum ne augustius hoc opus in publico appareret, quam majore spectatorum utilitate tractaretur, & his, & illis, characteres insculpendos curavimus, quorum explicationem, ut promptius omnia succurrerent, è regione singulis adjecimus. In qua sane id cum primis nobis fuit propositum, ut in ipsa subito cujusque libri fronte demonstraretur, quid præ aliorum Tabulis in nostris his præclare præstitum fuerit, quidve in ipsa inspectione, majoris sive fructus, seu delectationis gratia, diligentius, cum se haud prompte fortassis offerret cuivis, observandum. Præter hæc, cum adversum sit à nobis, Historiæ Spigelii hanc non infructuose jungi posse, in eo omne industriæ nostræ curriculum elaboratum est, nihil uti illic pæne doceretur, quin hic depictum demonstratumque foret, quæ res ut felicius expeteret, easdem semper appellationes imo etiam verba sæpe omnia religiose servavimus. De reliquo, præter absolutam perfectionem harum Tabularum, præter etiam incomparabilem elegantiam, & perspicuam magnitudinem, illud hic impendio navatum fuit, ut sectionis ordo quam fieri potuit ubivis accuratissime teneretur, quem (maxime profecto utilem ac necessarium) in aliis omnibus desideramus. Proprio ergo jam, suoque cuivis (ut dicitur) Marte corporum dissectionibus licebit se committere, cum partium situs connexioque nulli jam possit ignota esse & obscura. Quod beneficium quantum sit, & quanti faciendum, Tu, æquissime Lector, grato agnosces animo, ac, unde profectum est, beatissimis manibus nostri Placentini, antiqua formula terram levem precaberis. Venetiis,

Anno M D C XXVII.

LIBRI PRIM I TABVLÆ I EXPLICATIO.

P *Ro demonstratione externarum humani corporis partium, duæ proponuntur nudi iuuenis figure, ex quibus prior anteriorem faciem: altera, posteriorem ostendit.*

FIGVRA I

A *NTERIOREM humani corporis faciem exhibet.*

- a n **FACIES.** *πρόσωπον.*
 b **Frons.** *μετωπία,* cuius cutis *προμετωπίς.*
 c **Rugæ.** *στρίδες. άμαυροι.*
 d **Supercilia.** *ὀφρύες.*
 e **Glabella.** *μεσθρον.*
 f **Nasus.** *ῥιν.* *μικτὴρ μὺςωπὴ.*
 g **Oculus.** *ὀφθαλμός. ὀμμα.*
 h **Maxilla superior.** *Mala,* ἡ *ἀνω γένυς.*
 i **Bucca.** *γνάθον.*
 k **Labia.** *χείλεα.*
 l **Myrtax.** *μύτις.*
 m **Philtrum.** *φιλτρον.*
 n **Maxilla inferior.** *Mentum.* *γένυν.*
 o **Collum.** *τράχηλον. ἀνχών.*
 p **Inguilum.** *ἀδαντία. λαυκαντία.*
 q **Scrobiculus cordis.** *Polluci σφραγή.* Antiquis Medicis *καρδίς,* aliis *σπυκαρδίον,* quali præcordium. *σῆμα τὸ καρδίης,* id est, orificium ventriculi, cum id potius subdistingatur, unde & hanc partem in affectibus orificii superioris stomachi Medici inungunt.
 p q r f **THORACIS** anterior pars, **P E C T V S,** *σῆθον.*
 p q **Sternum.** *στένον.*
 r t **Mammæ,** ad quarum sinistram, cordis epithemata à Medicis applicari solent. *τῆσι* generali voce, *μαστὶ* in specie feminarum mammæ dicuntur. In viris Mammillæ vocantur. In harum centro protuberans pars oblonga, Papilla, *θῆλη,* & circa hanc sedes, Areola, *φύς,* dicitur.
 f f **Latera.** *πλευρά.*
 t u a **INFIMVS VENTER,** improprè Abdomen dictus. Aristoteli *σπῆξ,* & *σπυκαδοντὴς, σπυκαδρον.*
 t **Hypochondria,** quorum dextrum in Hepatis; sinistrum in lienis affectibus inungi solet. *τὰ σπυκαδοντῆα.*
 u **Epigastrium.** *σπυκαδρον.*
 x **Vmbilicus,** circa quem sedes, Regio Vmbilicalis dicitur. *τὸ σπῆξ τὸν ὑμφαλον.*
 y **Sumen.** Abdomen propriè dictum. *ἥρπον.*
 z **Ilia.** *λαῖνες. κενώτες.*
 a **Pubes.** *Πεδν.* *ἥν.* *σπυκαδοντῆα, κτε.*
 β β **Inguina.** *βυβόνες,* unde & glandulæ ibi sitæ, & earundem inflammationes Bubones Latinis Medicis dicuntur.
 γ **Scrotum.** *Scortum,* Vulgò *Marisupium,* & *Bursa* virilis. *ἔρπον.*
 δ **Penis.** *Mentula,* *πύλον. καυλόν. σῆμα. πύλον.*
 ε **MANVS.** *χρῆ.* Aristoteles & *βραχίονα* vocat, quem secuti Latini Brachium appellant.
 ζ **Humerus.** *ὤμων.*
 ζ **Locus** ubi sunt fonticuli in brachio. estque inter Deltoidem, humerum attollentem musculum, tum bicipitem, siue primum cubiti flexorem, qui in utroque brachio, sub cute sua carnositate, prominentes perquam benè effigurati sunt, Eodem in loco Vena Cephalica transit.
 η **Flexura cubiti.** *ἀγκών.*
 θ **Cubiti** protuberantia, *ὠλεκρον.* Gibber quibusdam.
 ι **Cubitus.** *πῆχυς.*
 κ **Manus extrema.** vulgò *χρῆ.* Hippocrati *χρῆς ἄκρης,* Galeno *ἀκροχρον.*
 λ **Brachiale.** *Carpus.* *καρπός.*
 λ ο ξ **Postbrachiale.** *Palma.* *Metacarpus.* *μετακαρπον.*
 λ **Vola.** *ῥιναρ.*
 μ **Dorsum manus.** *ἀντιρῆαρ.*
 ν ξ ο **Lineæ manus.** ν, Vitæ lineam denotat. ξ, Cerebri, ο, Mensalem.
 π **Monticulus Veneris.**
 π σ τ υ φ **Quinque** digiti, οὗ *δάκτυλοι.* ε, Pollex, vel magnus, *ἀντιρῆαρ.* ε, Index, *δείκνυς.* τ, Medius, *ἰμπδικός,* & *ὀβικονος,* *μετ.* υ, Annularis. *πεσφμετ.* φ, *ἰατῆρας.* φ, Minimus, *Auricularis.* *ἐλάγχετ.*

- ζ **Femur.** *μυρῆς,* in cuius parte anteriore, & media, caractere insignivimus, cucurbitulæ solent apponi ad menses ciendos.
 5 **Locus,** cui fonticuli inuri solent in interna femoris tribus digitis transversis supra patellam, effugium illud inter musculos extendentes & flexores, circa quod & Vena malleoli interni, phæna, excurrit.
 ↓ **Genu,** *γόνυ,* ubi Patella jacet, Mola, & Rotula dictæ *μύλη, μύλη.*
 ω **Tibia,** *κνήμη,* cuius hæc anterior pars, *ἀντιρῆα* dicitur Antetibiale.
 ι **Malleolus internus.** male à Medicis Talus vocatus hunc Saphæna suppreffis menftris aperitur.
 2 **Malleolus externus.**
 3 **Pedum.** *πῆδον. πῆρα.* Calcaneus, & *πέσος.* T
 4 **Metapedium,** *μεταπῆδον.* Metatarsus, *μετατάρσος.*
 5 **Digiti.** *δάκτυλοι.*
 6 **Dorsum pedis.** *πῆδον. ὁ πῆδός.*
 7 8, & c. **Quinque** digiti pedis. Magnus, magno proximius, medio proximus, minimus.

C *Vramus hic depingendos omni diligentia, ut quæ sub cute protuberare videntur. E*
A *Masticoideos, flexentes caput, demonstrat. B,*
B *culas, C, Humerum attollentem, Deltoidem,*
C *num tubitum flexentem, Bicipitem. E, M,*
E *rectos abdominis. F, Primum tibiæ flexentem,*
F *Fascialem. G G, Secundum tibiæ exten-*
G *sum. H, Quartum tibiæ extendentium,*
H *internum. I I, Pedem extendentes, Gastero-*
I *quorum venter Suram constituit.*

FIGVRA II

O *culi externi partes omnes representat, cum a*
harum demonstrationem angustia primæ fig-
setur.

- a **Supercilia.** *ὀφρύες.*
 b **Superciliorum** caput. *ὀφρῶν κεφαλή.*
 c **Superciliorum** cauda. *ὀφρῶν ἔσος.*
 d **Palpebræ.** *βλέφαραι. ὀμματαφύλακα.*
 e **Pili palpebrarum.** *βλεφαρίδες.*
 f **Oculorum** angulus maior. *τὸ ὀφθαλμῶν καυτὸς καυτὸς.*
 g **Oculorum** angulus minor. *καυτὸς ἐλάττω.*
 h **Foramen lacrymale.**
 i **Cavum oculi.** *καῖνον.*
 k **Subcavum.** *ὑπὸ καῖνον.*
 l **Pupilla.** *κέρη. γλῆνη.*
 m **Iris.** *ἰρις.*
 n **Album oculi.** *τὸ λευκὸν τὸ ὀφθαλμῶ.*

FIGVRA III

A *rem externam, ejusque partes exprimit.*

- a **Auricula,** siue **Auris** externa. *ὠτίον.*
 a **Auriculæ** superior pars. *Pinna* *Gazzæ.*
 b **Auriculæ** inferior pars, *Fibra* *Gazzæ.* *λῆθον.*
 c **Helix.** *ἐλῆξ.*
 d **Anthelix.** *ἀντιελῆξ.*
 e **Concha.** *κώλη.*
 f **Hircus.** *τράχηλος.*
 g **Antitragus.** *ἀντιτράχυν.*
 h **Meatus auditorius.** *τὸ ὀφθαλμῶ.*

FIGVRA IV

N *asum, ejusque partes demonstrat.*

- a **Spina nasi.** *Dorsum.* *ἐσπῆς.*
 b **Colatorium.** *Vertex* nasi. *ῥῆμς.*
 c **Nares.** *ῥινία. ῥινῶνες.*
 d **Columna.** *κίον.*
 e **Alæ nasi.** *Narium* *pinnae.* *ῥινῶνα.*
 f **Nasi** globulus. *σφαίρα.*
 g **Vibrissæ,** & *Vibrissæ.*



LIBRI PRIM I TABVLÆ II DILVCIDATI

Posteriorem humani corporis faciem representat.

ab bcd **P**ARS capillata. περιχρωτός.
 a Synciput. βρεγχμα.
 æ Circa hanc partem sunt fonticuli suturæ coronalis, qui locus investigatur, posito carpo dextræ manus ipsius ægri, cui inurendus est, in nali globulum, & extensa manu versus synciput. Quo enim pertigerit apex medii digiti, confertur regio esse, in qua concurret sutura coronalis cum sagittali.

b b Tempora. κεφάλοι.
 c Occiput. ὀπίον.
 d Vertex. κορυφή.
 e k **P**ARS glabra. Facies. πρὸς ὤπον.
 e Frons. μέτωπον.
 f Oculus. ὀφθαλμός.
 g Nasus. ῥίς. μύστωτις.
 h Myrtax. μύρτις.
 i Os. σμα.
 k Mentum. γένυον.
 l Malæ. κύματα ἢ πρὸς ὤπον.
 m Barba. πώγων.
 n Auricula. ὠτίον.
 o Cervix. τραχήλος.
 p Humerus. ὤμων.
 q Axilla, & Ala. μαρμαίλη. In hac cavitas occurrit, quæ constituitur à tendinibus duorum musculorum humeri, anterioris quidem, Pectoralis dicti, posterius autem, Anisclaptois.

r f **T**HORACIS posterior pars, Dorsum. νῦτον.
 r f Spina. ῥαχίς.
 t Scapula. ὀμοπλάτης. Huic parti cucurbitulæ applicantur in capitis affectibus, pro revulsione.

u u Laterales partes. πλάγι.
 x x **I**NFIMI ventris posterior pars, Lumbi, ἰσφύες, quibus remedia pro renum affectibus applicantur.

y Nates. Clunes. γαστήρ. γαστήρ. ἰσφύς.
 z z Fissura natium. διχάλα. Circa hujus superiorem regionem, Os sacrum situm est, cui in morbis recti intestini cataplasmata, & unguenta apponi debent.

a Podex. Anus. ubi est coccygis regio.
 β Humerus. ὤμων.
 γ Cubiti protuberantia. Gibber. ὠλέθρον.
 δ Cubitus. πήχυς.
 e η Manus extrema. ἀκροχέρας.
 ε Brachiale. Carpus. καρπός.
 ζ Postbrachiale. Metacarpus, μετάρσιον.
 η Digiti. δάκτυλοι.

θ κ **D**igitorum internodia. φάλαγγες.
 θ ἄνθραξ.
 ι μετασθένδρα.
 κ μετασθένδρα.
 λ Femoris posterior pars, quibusdam Femem.
 μ Femoris pars interna. μεσημείον.
 ν Coxendix. ἰσχίον. huic regioni remedia contra ischiaticos applicantur.
 ξ πύλας. Perinæum, πρὸς ἰσχίον. Locus quem aperthotomi pro extractione calculi vesicæ.
 ο Sura. γαστροκνήμιον.
 π Locus ubi fonticuli in sura inuruntur maximo contra dolores ischiaticos, de qua re plura historia dicta sunt.
 ρ μεσημείον.
 σ μεσημείον.
 τ τ Poples. ἰγνύς. hic sita est vena Poplitea, quam magno cum successu in quibusdam morbis aperthotomi pro extractione calculi vesicæ.
 υ Malleolus internus.
 φ Malleolus externus.
 χ Calcaneus. πτερόν. Pedium. πτέρον. Tarsus, hicupie infestant Perniones, morbus ex nimio proveniens.
 ψ Metapedium, Metatarsus, μετάρσιον, μετάρσιον.
 ω Digiti. δάκτυλοι.
 ι Planta pedis. πύλας ἢ πύλας.
 2 Dorsum pedis, πύλας ἢ πύλας.

Ceterum & hanc Tabulam ex vivo nudo corpore depingi curavimus, musculisque omnes sub cute visui deprehendendi possunt literis inscriptis. Demonstrantur ergo,

A A Ii, qui Scapulæ dorsum occupant, & Superfasciæ sunt, humeri ossis circumagitationi dicantur.
 B B B Dorsi longissimus, tum Sacrolumbus, Thoracodentes, & hic prominentes representantur.
 C C Abducens humerus latissimus egregie ostenditur.
 D D Gasterocnemius externus musculus, qui primus extensor, & suram constituit, eleganter constitatur.
 E E Tendo ille insignis, qui ex concursu utriusque nemii musculi, sive duorum tarsum tendent constitatur. Est autem ille, quo fortissimum Trojæ Hectorem Achilles circa Trojæ moenia traxit. rus Poëtarum doctissimus testatur.
 F F Humerum attollens, Deltoideus.
 G Primus cubitus flectentium Biceps, Italici dictus.



LIBRI SECVNDI TABVLÆ I ET II EXPLICATIO.

TABVLÆ PRIMÆ ET SECVNDÆ.


D Tabus Tabulis tota ossium strues (quam Sceleton vulgo Anatomici vocant) hic exprimitur, ut mutuis omnium contextus, antequam singula demonstrarentur, appareat. Ex his Prima, faciem anteriorem: Secunda, posteriorem proponit: ipsa autem lateralis facies propterea à nobis omissa est, quod nihil continere videatur magnopere, quin vel ex his duabus, vel subsequis, à studioso Le-ctore, satis intelligi queat. Ceterum pro demonstratione utriusque, iidem serè characteribus usi sumus, quanquam si quis alterutri peculiaris fuerit, facili negotio innotescat ex numero, quem post characterem in explicatione subjecimus.

- Æ** 2 **C** Alvaria. Calva, Cranium, qua voce, etsi nonnulli totam capitis molem, quam colli vertebræ sustinent, intellectam velint, probatoribus tamen Authoribus eam duntaxat partem significare videtur, quæ superna sede Cerebrum tegit, & ipsa vicissim capillis tecta est. Græci κεφαλὴν vocant, quasi κεφαλήν, quod galeam militarem referat.
- h** 1 Os frontis. Coronale. πρὸ τοῦ μέτωπον ὀστέον.
- h** 2 Offa sincipitis, vel Verticis. βρεγματικόν ὄστος.
- c** 2 Os occipitis. Barbaris os proræ, memoriæ. τὸ κατ' ὀπίον, vel ὀπίον ὄστος.
- Offa temporum, ἑκατέρωθεν ὀστέον, à squammosa combinatione cum ossibus sincipitis, λεπτὸν δὲ: sed à processu petroso, λιγνὸν δὲ, lapidea, & lapidosa cognominata.
- e** 2 Meatus auditorius. τὸ πρὸς ἀκουστικόν.
- f** 2 Processus mammillaris. μαμμοειδής.
- g** 2 Foramina duo Verticis ossibus insculpta.
- h** 2 Sutura sagittalis. τὰς ἡ δελταία.
- i** 2 Sutura lambdiformis. α λ Græcorum majusculo, cuius formam exprimit, λαμβδουειδής: ab υ inverso, quod similiter refert, υψιλουειδής, & contractè λουειδής, dicta.
- k** 2 Sutura squamiformis. λεπτὸν δὲ ὀστέον σκεπτικόν.
- l** 2 Os cuneiforme, non tam à figura sua, quam situ inter alia ossa medio, Græcis similiter σφηνουειδής dicitur, & cum partibus pluribus confert diversam exprimentibus formam, πλὴν μορφῆς quoque vocatur, Multifforme. Hujus duo processus hic sunt conspicui, primus, quem lateralem vocant, litera l notatus: alter quem vespertilionum alis assimilant, σφίγγουειδής dictus, sive aliformis, characterem m insignitus.
- n** 1 Os jugale, conjugale. σφίγγουειδής ὄστος, ζυγωματικόν, ζυγωματικόν ὄστος.
- o** 1 Orbita oculi.
- p** 1 Duo nasi ossa. ἑξ ἑνὸς ὄστος.
- q** 1 Maxillæ superioris ossa, quorum duodecim sunt, quæ in sequentibus tabulis singula demonstrabuntur, cum tabulæ præsentis angustia accuratam delineationem non admittat. τὸ ἀνω ἡνίκον ὄστος.
- r** 1 Maxilla inferior. ἡ κατω ἡνίκον.
- f** 1 Dentis, ὀδόντες, quorum ut plurimum in utraque maxilla sedecim observantur, ex his quatuor medii & anteriores, Incisorii vocantur, ab usu: Anteriores, σφελειοειδής, à situ: Risorii, γλωσσικοί, quod ridentibus com-

pareant. Duo incisoribus utrinque proximi, Canini, κνωίδοντες, Oculares, ὀφθαλμικοί. Quinque utrinque his contermini, Molares, μύλοι, & μολοίται. Maxillares item, & à figura Meniales, Ciceroni Genuini. Duo extremi Molarium tardè crescunt, unde ὀφύγοι.

- u x y** Spina dorsii, ἀκάνθη, ἡ ἐξ στήλης, sacra fistula. Constituitur hæc ex 24 Vertebis, (σπονδυλοῖς) quæ in posteriore sede acutum educunt processum, qui Spina dicitur, unde tota hæc pars nomen mutuavit. hæc iterum in alias partes dividitur, in septem cervicis vertebrae, quas elementis (ε. u.) expressimus: duodecim thoracis, (θ. u.) & quinque lumborum, (λ. γ.)
- y z** 2 Os sacrum, amplum. ἱερὸν, πλάτυν.
- a** 2 Os coccygis. ὀστέον, σπονδυλοῖς, os caudæ.
- β** 1 Os pectoris. sternum, στήν.
- γ** 1 Cartilago mucronata, vel ensiformis. ξιφοειδής, χόνδρος.
- δ δ** 1 Claviculæ. κλάδιες.
- ε** 1 Clavicularum pars teres propè jugulum.
- ζ** 1 Clavicularum pars latiuscula propè humerum.
- ι, 2, 3, 4, 5, &c.** Duodecim thoracis costæ, στήναι, ex quibus superiores septem, Veræ dicuntur, & Legitimæ; inferiores quinque, Nothæ, Spuriæ, & Mendosæ. Constant ex parte ossæ, & cartilaginea: illa characteribus insignita est, hæc literis caret. Connexus autem utriusque lineola notatus est, quam in quinta costa (ν) litera significamus.
- θ. θ.** Scapulæ. Lata scapularum ossa. ὀμοσπλάται, σπῆναι à situ. In prima figura cavitas ipsarum, sive interior pars. In secunda, dorsum, sive exterior, cernitur. Habent Scapulæ tres processus, ex quibus (ι) Primus est, brevis, qui humeri caput excipit: (κ) Secundus, & Superior dictus, item summus humerus, Græcis ἀκρωμίων, Hippocrati interdum ἀκρωμίου ὄστος (λ) Tertius, sive inferior, à cognatione formæ, quam habet cum C Græcorum majusculo, σιγμοειδής, sigmiformis, ab aliis ab anchoræ figura ἀγκυροειδής, ancoriformis appellatus.
- μ ν ξ** Offa innominata, ἀνώνυμα Galeno dicta, quod suo tempore nomine carerent, quanquam hæc ipsa occasione nomen invenisse videntur. Homero in Iliade ἰσχυρὸν ὄστος, Latinis Ilium ossa vocantur. Sunt autem illa duo, quæ sacri ossis lateribus committuntur, utrinque unum, & in tres veluti sedes dividuntur ab Anatomicis, (etsi in adultis unum sit, & continuum,) quod in pueris separata cartilaginibus inveniuntur. Prima characterem μ insignitur, & os ilium à quibusdam vocatur, λαγύριον, ἢ κενεῖον: cuius quidem cavitas in prima; dorsum, in secunda cernitur. Secunda, mediæque sedes, litera ν designata, os Coxendicis, vel Coxæ; Græcis ἰσχίον, & ἀνώνυμον, quibus vocabulis totum etiam os, ut diximus, venit. Tertia, anterior, quam monstrat ξ, Pubis, vel Pedinis os, τὸ ἕθνος ὄστος.
- ο** Appendix circularis, totam superiorem ipsius regionem ambiens, quam aliqui Spinam ossis ilium appellant.
- π** 2 Acetabulum coxendicis, cui femoris caput committitur.
- ρ** Connexio ossium innominatorum cum ossæ sacro.

TAB. I.



Reliquum tabulae primae & secundae, libri secundi.

- σ τ Duo tubercula ossis coxendicis, σ internum, τ externum denotat.
- ι Cavitās illa, quam dissectionum Professores Pelvim appellant, & cujus frequens admodum in historia anatomica fit mentio, quod in ea intestinorum magna pars, vesica, & uterus contineatur. Circumscribitur hæc à pluribus ossibus, antèrius quidem Pubi: posterius sacro, & coccygis: ad latus verò, ilium & coxendicis.
- A Os humeri, & συνεχδοχικῶς interdum Humerus. βραχίον.
- B Superius, & internum caput ossis humeri, quod rotundum est, & in sinum ossium scapularum inferitur.
- C Superius, & externum caput humeri, quod gratia ligamentorum implantandorum creatum est.
- D Caput interius inferae ossis humeri appendicis, quod ἑνὶ ἁλβειᾷ dicitur, & Cubitum excipit.
- E Exterius caput ejusdem appendicis, quod Radium suscipit.
- F G Duo tubercula ossis humeri, Internum, F. Externum, G.
- H Cubiti os, & quibusdam Cubitus simpliciter, rectius Vlna. Barbaris Focile majus brachii. πῆχυς, ὠλένη, σελήχιον.
- I Radius. Barbaris Focile minus brachii. κερκίς, & ῥαχίον. à situ.

- K K Brachiale. Carpus. καρπός. hoc octo constat ossibus.
- L L Postbrachiale. Metacarpus, μετακάρπιον, hoc ex quatuor exstructum est ossibus.
- M M Quinque digitorum ossa. πέντε δακτύλων ὀστέα, quæ ungulis terna contingere.
- N Femoris os. τὸ μῦρον ὀστέον.
- O Cervix femoris.
- P Caput femoris superius, quod in Coxendicis acetabulum inferitur.
- Q Q Duo femoris inferiora capita.
- R S Duo processus femoris, quorum alter R. internus est, & minor: alter S. externus, & major.
- T 1 Patella. Mola, μύλη, ὀπμυλὶς, ὀπμοαπίς.
- V Tibiæ os. κνήμη.
- X Fibulae os. πτερόν.
- Y Talus. ἀπὸ κάλκου, ὀπριον.
- Z 2 Calcaneus, Calx, Os calcis. πτερόν.
- Γ Os naviculare, naviforme, cymbiforme. σκαφοειδές.
- Δ Θ Α Ξ Hæc pedis pars ex quatuor constat ossibus, uno, cubiformi dicto, Δ, & tribus cuneiformibus, Θ, Α, Ξ. Vocantur autem Tarsus, τάρσος, πτερίον.
- Σ Metatarsus, μετατάρσος, μεταπτερίον. hæc quinque ossa continet.
- Φ Φ Digitorum pedis ossa quatuordecim.

TAB. II.



LIBRI SECVNDI TABVLÆ III EXPOSITIO.

T Res seriatim modo sequentes Tabule, ea omnia, quam datum est accuratissimè, demonstrant, quæ in Capitis ossibus consideratione digna occurrunt. Imprimis verò præsens hæc, quæ duobus figuris, anteriorem & lateralem sedem exprimit, omnia penè calvarie propria ossa, frontis puta, sincipitis, occipitis, & temporum, tum maxilla etiam superioris exhibet: maximam quoque partem suturarum, quæ occurrunt. In quibus sanè demonstrandis, cum diversæ sint species, eam adhibuimus methodum, ut veras quidem, elementis Latinis majusculis designaremus: Mendosas verò proprias, numeris Romanis; Communes autem, cyphris barbaris: Proprias tandem ossium maxillæ superioris, literis parvis. Sic enim unicuique facile erit inter noscere, tum ad quam classem quævis suturarum pertineat, tum quota sit numero. Cæterum Characteres ascripti, utrique figuræ communes sunt: quod si quis proprius erit, id numerus, post characterem in explicatione additus, indicabit.

- A A A **P** Rima verarum suturarum, Coronalis, quæ frontis os circumscribit.
 B Secunda verarum suturarum, Sagittalis.
 C Os frontis.
 D D Foramina duo frontis ossis propria, ad mediam supercilii sedem exculpta, per quæ ramus primus tertiæ conjugationis nervorum Cerebri, ex orbita oculi in frontis, vel potius superciliorum mûculos, digeritur.
 E E Processus duo exteriores ossis frontis, sive majores.
 F F Processus duo interiores ossis frontis, sive minores.
 G G Ossa sincipitis, sive Verticis.
 H H Ossa temporum, utrinque singula.
 K L 2 Elatior, & circularis pars ossium temporum, qua ossium sincipitis exterioribus lateribus junguntur.
 M 2 Posterior pars ossium temporum, qua ossi occipitis futura tertia mendosa nequitur.
 N 2 Processus mammillaris ossis temporum.
 O 2 Meatus auditorius.
 o 2 Processus styloides.
 P 2 Processus ossis temporum, qui jugale os constituit.
 P Q Os jugale.
 R R Primum os maxillæ superioris.
 S S Secundum os maxillæ superioris, in quo adverte foramina in secunda figura diligenter expressa.
 T T Foramen hujus secundi ossis, satis amplum, in narium cavitatem rectè deorsum pertinens, cui glandula lacrymalis adjacet.

- V V Tertium os maxillæ superioris.
 X X Quartum os maxillæ superioris.
 Y Y Foramen primum hujus quarti ossis, per quod secundus ramus tertii nervorum cerebri paris, ex oculorum orbita in genas ad faciei mûculos mittitur.
 Z Z Quintum os maxillæ superioris.
 I I Primum } par suturarum mendosarum.
 I I Secundum }
 r 1 Primum }
 2 2 Secundum } par suturarum communium.
 3 3 Tertium }
 4 4 Quartum }
 a a Primum }
 b b Secundum } par suturarum propriarum maxillæ superioris.
 c c Tertium }
 d d Quartum }
 e e Quintum }
 f Tertia pars ossis spongiosi, narium interseptum constituens.
 g g Quatuor dentes Incisores.
 h h Duo dentes Canini.
 i i i i Decem dentes molares, utrinque quinque.
 k k Foramen primum ossis cuneiformis, in intimo oculi orbitæ recessu elatissimum, orbiculare profusius, per quod primum nervorum cerebri par, sive Opticum, cujus amplitudini exactè respondet, orbitam ex calvaria ingreditur.
 l l Foramen secundum ossis cuneiformis, dicto, triplo ferè amplius, per cujus humilior sedem, primo secundum nervorum cerebri par in orbitam prociat; deinde, tertium par eorundem: tertio, insignis quidam ramus arteriæ carotidis ad oculos secedens; tandem, pituita & humiditates aquosæ cerebri, in glandula pituitaria collectæ, unde lacrymæ fiunt. Per elatior autem regionem Vena ex oculi sede ad crassam cerebri membranam distribuitur.
 m m Foramen tertium ossis cuneiformis, per quod quarti paris nervorum ramus primus ad mûculos temporales, & in ore latitantes transmittitur.
 n n Foramen quartum ossis ejusdem ad externam oculi sedem positum, omniumque in orbita facile maximum, rimam potius, quam foramen exprimens. Per hoc ramus quartus tertii, & primus quarti nervorum cerebri paris, in temporales mûculos elabuntur, & pituita orbitam ingressa ad fauces descendit.

FIG. I.

TAB. III




FIG. II.



LIBRI SECVNDI TABVLÆ IV EXPLICATIO.

I *N hac Tabula superior calvaria pars, ab inferiore (quam in subsequente demonstrabimus) serra ablata delineatur, ut utraque ejus facies, iam externa, quam interior conficiatur, simulque illius levitas, hujus asperitas, sed imprimis suture veræ, & earum in utraque facie dispar ratio, adverti possint.*

- A A** **P** *Rima verarum suturarum, Coronalis, quam vide, ut in externa facie, seu prima figura veræ suture imaginem exprimit, illius inquam, quæ confutis filo pannis assimilatur; contra in interna, seu secunda figura, harmoniam potius, & lineam refert.*
- B** *Secundi verarum suturarum, Sagittalis. Circa hanc foramina quædam expressa sunt, quæ in quibusdam craniis inveniuntur.*
- C C** *Tertia verarum suturarum, Lambdiformis.*
- D** *Os frontis.*

- E E** *Ossa sincipitis.*
- F F** *Vestigia venarum jugularium crassam cerebri membranam perrepantium, quæ interiorem ossium sincipitis faciem, nonnihil inæqualem & asperam reddunt.*
- G** *Foramina duo, per quæ ad ossium sincipitis medullam, inter duas laminas interceptam, venulæ duæ à cutaneis capitis venis, pro eorundem ossium nutritione, ingrediuntur.*
- H** *2 Interior calvariae lamina.*
- I** *2 Exterior calvariae lamina.*
- K** *2 Medulla utriusque laminæ inclusa.*
- L** *2 Caverna satis ampla in frontis osse, inter utramque laminam, ad nasi radicem consistens, interdum una, ut hoc loco: nonnunquam (& magna quidem ex parte) gemina, quæ in narium amplitudinem pertinet.*
- a** *1 Linea anterior ossium sincipitis.*
- b** *1 Linea posterior ossium sincipitis.*

FIG. I.

TAB. IV.





FIG. II.



LIBRI SECVNDI TABVLÆ V EXPLICATIO.

I *nferior calvaria pars, siue basis, à superiore, (quam antecedente Tabula expressimus) ferra ablata hic ostenditur, ut utraque ejus facies conspicua fiat, & in prima quidem figura, imprimis interna: in altera, exterior.*

FIGVRA I.

- A P** Ars cavernæ ossis frontis tabula præcedente litera L insignita.
- B** Processus quidam ossis frontis, qui tertio crassæ cerebri membranæ sinui versus nares contendenti viam præbet.
- C** Foramen satis grande, per quod vena ad crassam cerebri membranam ex narium amplitudine ascendit.
- D** Processus ossis cribrosi, à forma cristæ galli, quam refert, Crista vocatus.
- E E** Os cribrosum, vel spongiosum infinitis foraminibus perforatum.
- F F** Pronuberantia ossis frontis, superiorem orbitæ oculi sedem utrinque constituit.
- G G** Processus interiores ossis cuneiformis, ex quibus **G, G**, anteriores: **H, H**, posteriores designant, qui simul omnes cum ephippium non inepte expriment, Sellæ turcicæ nomen toti illi ossis parti imposuerunt. His crassæ cerebri membrana firmissime adnascitur.
- I** Sinus in sellæ medio incisus, glandulam pituitariam continens. Ab hoc sinu utrinque duo ductus derivantur, ex quibus priores duo **K K** ad secundum foramen ossis cuneiformis tendunt, sicque pituitam in oculi sedem deducunt, à qua postea ad nares, faucesque, per foramina literis **T & n**, tabula tertia designatis, pellitur. Posteriores duo **L, L**, ad foramen alperum, siue quintum ossis cuneiformis **P, P**, ad palatum potissimum porrigunt.
- M M** Foramen primum ossis cuneiformis, nervorum opticorum ingressui dicatum, & Tabula tertia litera **K** expressum.
- N N** Foramen secundum ejusdem ossis, secundum nervorum pari destinatum, & Tabula tertia caractere **I** notatum.
- n** Rima longa, quam efficit hoc foramen superiora petens.
- O** Foramen tertium ejusdem ossis, Tabula tertia litera **m** notatum.
- P P** Foramen quintum ossis cuneiformis, alperum & longum, per quod arteriæ carotidis ramus major in caput ascendit.
- Q Q** Foramen sextum ossis cuneiformis, ovalem figuram exprimens, quartum nervorum cerebri par transmittens.
- R R** Foramen septimum ejusdem ossis, exiguum, Venæ jugularis internæ ramo secundo & minori, viam præbens, cujus vestigia ossibus synepitis impressa.
- S** Sinus cuneiformi ossi incisus, cui nervorum opticorum coitus innititur.
- T T** Vestigia venarum jugularium, per foramen litera **R** indicatum ascendunt.
- t t** Primum foramen ossis temporis, quod viam præbet nervo auditorio.
- X X** Processus petrosus ossium temporis.
- Y** Primum & maximum foramen ossis occipitii, per quod spinalis medulla elabitur.
- Z Z** Secundum & tertium ossis occipitii foramen, per quod Venæ jugularis internæ ramus major, & arteriæ carotidis minor intrant: egreditur autem sextum par nervorum cerebri.
- a a** Quartum & quintum foramen ossis occipitis, per quæ septimum par nervorum cerebri descendit.
- b b** Capita ossis occipitii, quibus cum prima cervicis vertebra necitur.
- c c** Medulla cranii.

d Additamentum ossis occipitii.

V V Designant quintam propriam, & mendosam futuram nec literæ hic vicem gerunt, sed numerum quinarium exprimunt Romanorum caractere, ut monuimus tabula tertia.

FIGVRA II.

- a a** Sutura sexta propria maxillæ superioris.
- b** Sutura septima propria maxillæ superioris.
- A** Foramen secundum quarti ossis maxillæ superioris.
- B B** Foramen quartum ossis cuneiformis, tabula tertia n insignitum.
- C C** Cavitas, quam os jugale constituit, pro transitu tendinis musculi temporalis ad maxillæ inferioris insertionem.
- D D** Os jugale.
- E E** Ossis primi maxillæ superioris interna facies.
- F F** Sextum par ossium maxillæ superioris, palatum efformans.
- G G** Foramina in narium amplitudinem dehiscencia.
- H** Septum narium.
- I** Septi narium inferior pars, vomerem referens.
- K K** Processus primus externus ossis cuneiformis, vespertilionum alas exprimens.
- L L** Processus horum cavitas.
- M M** Processus secundus externus ossis cuneiformis, duos acuminatos vertices educens.
- c d** Duo apices hujus processus, quibus versus styloideum processum extuberat.
- N N** Foramen in priore figura literis **Q Q** notatum.
- n n** Foramen ibidem litera **R, R**, designatum.
- O O** Foramen ibidem caractere **P, P**, insignitum.
- P P** Alperitas ossis petrosi expressa.
- Q Q** Secundum ossis temporis foramen, per quod carotidis arteriæ major ramus oblique ad ossis cuneiformis foramen quantum fertur, indeque cerebri ventriculos subit.
- R R** Foramina occipitii antea litera **Z, Z**, ostensa.
- S S** Processus ossis temporis styloides.
- T T** Sinus primus ossium temporis, caput maxillæ inferioris excipiens.
- X** Additamentum ossis occipitii.
- Y Y** Duo capita ossis occipitis.
- Z Z** Foramina in prima figura monstrata litera **a, a**.
- α α** Processus mammillares.
- β β** Sinus pro rectis musculis caput extendentibus in occipitio exculpti.
- γ γ** Sinus pro musculis Spleniis & Cucullaribus incisus.
- δ δ** Quartum foramen ossis temporis.
- ε ε** Quintum foramen ossis temporis.
- I** Sutarum communium primum par.
- I I** Tertium par futurarum mendosarum.
- I V** Quartum par futurarum mendosarum.

APPENDIX.

F Oraminum, per quæ septem nervorum cerebri paria prodeunt ex cranio, catalogum hic subijcere visum est, ut cuiusvis facile pateant. Conspicua autem hæc sunt in prima figura.

Primum par, per foramen primum ossis cuneiformis, figura prima, litera **M, M**, insignitum, egreditur.

Secundum & Tertium, per ejusdem ossis secundum, litera **N, N**.

Quartum par, ejusdem ossis sextum, litera **Q Q**.

Quintum, per foramen primum ossium temporis, **t t**.

Sextum, per secundum & tertium occipitii foramen, **Z Z**.


Septimum, per quartum & quintum occipitis foramen, **a, a**.

FIG. I.

TAB. V.



FIG. II.



LIBRI SECVNDI TABVLÆ VI EXPLICATIO.

P *Reponis spectanda primaria calvaria ossa, à se invicem separata.*

FIGVRA I

Frontis ossis anteriorem & convexam partem representat.

- A Ossis frontis convexa pars.
- a a Sutura coronalem eleganter exprimit.
- B B Lamina quæ superiore oculi orbitæ partem conficit.
- C Alperitas, cui nasi ossa agglutinantur.
- D Foramina per quæ ramus primus nervi tertie conjugationis cerebri in frontis muscolum egreditur.
- E E Processus interiores ossis frontis.
- F F Processus exteriores ossis frontis.

FIGVRA II

Ossis frontis posteriorem partem, sive cavam ostendit.

- A A Ossis frontis concava pars.
- B B Sinus insculptus ossi frontis ea regione, qua finis tertius membranæ crassæ cerebri descendit, ne comprimatur à duro osse.
- C Foramen, per quod vena ad crassam cerebri membranam, ex narium amplitudine ascendit.
- D Processus ossis cribrosi, Crista galli dictus.
- E E Os cribrosum, sive spongiosum.
- F F Processus exteriores & minores ossis frontis.
- G G Processus interiores & majores.
- H H Foramen optico nervo transitum præbens ad oculi orbitam.

FIGVRA III

Ossis syncipitis dextri lateris convexam superioremque partem monstrat.

- A Ipsa convexa pars ossis syncipitis designatur.
- a Anterior linea dimidiam partem suturæ coronalis constituens, qua ossi frontis committitur.
- b Posterior linea, mediam partem suturæ lambdiformis faciens, qua ossi occipitis jungitur.
- c Interna linea, futuram sagittalem conficiens, qua sibi ossa verticis invicem neantur.
- d Externa linea, qua temporalibus ossibus coarticulatur, squamiformem futuram constituens.
- e Elegantiissime à sculptore squamiformis combinatio expressa.

FIGVRA IV

Ossa syncipitis dextri lateris concavam partem, sive inferiorem ostendit.

- A Ossis syncipitis concava pars.
- a a Meditullum inter duas laminas interceptum.

- B B Principium vestigiorum, quæ jugulares venæ per crassam cerebri membranam disperit, relinquunt.
- b b b Rami horum vestigiorum.

FIGVRA V

Ossis occipitis exterior facies.

- A A Primum & secundum latus ossis occipitis.
- B B Tertium & quartum latus.
- C Quintum latus.
- D D Sinus superiores & insignes, qui sedem præstant musculis, tum iis, qui caput extendunt, tum his, qui scapulam dorso admovent.
- E E Sinus inferiores, pro musculis rectis caput extendentibus exsculpti.
- F F Capitula, quibus primæ cervicis vertebæ inarticulantur.
- G Foramen primum ossis occipitis, per quod spinalis medulla ex cranio descendit.
- H H Foramina pro septimo nervorum cerebri pari exsculpta.

FIGVRA VI

Ossis occipitis interior facies.

- A B C Eadem designant, quæ in præcedente figura.
- D D Sinus transversus excipiens sinum primum & secundum crassæ cerebri membranæ.
- E E Sinus rectus, sinui tertio crassæ cerebri membranæ dicatus.
- F F Duo sinus rotundi superiores, duas cerebri prominentias excipientes: sub quibus inferiores, G, G, cerebelli prominentiis destinati.
- G G Duo capita litera FF præcedente figura ostensa.
- I Foramen primum ossis occipitis.
- a a Foramina pro septimo pari nervorum cerebri exsculpta.

FIGVRA VII


Ossis temporum dextri lateris exteriorem partem exprimit.

- H Ossis temporum exterior facies.
- I K L Pars superior, qua ossium, syncipitis exterioribus lateribus junguntur.
- M M Pars posterior, qua ossi occipitis sutura tertia mendofo neclitur.
- N Processus mammillaris.
- O Meatus auditorius.
- P Processus ossis temporum qui cum processu primi ossis maxillæ superioris os jugale constituit.

FIGVRA VIII

Ossis temporum dextri lateris interiorem, & concavam partem proponit.

- Q Pars concava ossis temporum.
- R R Combinatio squamiformis eleganter conspicua.
- S S Processus ossis temporum petrosus.
- T Foramen quod viam præbet nervo auditorio.



LIBRI SECVNDI TABVLÆ VII EXPLICATIO.

FIGVRA I

Demonstrat tria anclm inferioria officula, primò iuncta inter se, deinde verò & foris, ut & necum eorum, & magnitudinem ac figuram naturalem intueretur. Ha additus est annulus ossis à petrolo offe intrinsecus.

- A B C Annulus ossis, cuius principium est A, finis, B, medium circumulare C.
D E F Malleus primum officulum, cuius caput D, Processus maior E, sed minor F est.
G H I Incus secundum officulum, cuius basis lata G est: Crus brevis & crassum H: longius & tenuius I.
K L M Stapes, cuius basis K est, duo crura L, L, Vertex, five capitulum M.

FIGVRA II, III, & IV.

Maxilla inferior tribus figuris ostenditur. Prima faciem anteriorem exhibet; Secunda, posteriorem; Tertia, lateralem.

- A A Processus anterior, vespèra dictus, cui tendo musculi temporalis inferius.
B B Processus posterior, qui in suum proprium temporum offi incisulæ suo capitulo inarticulatur.
a a Capitulum hoc, quo inarticulatur.
b b 3 4 Foramina duo in superficie interna ad dictorum processuum fundamenta exsculpit, per quæ ramus tertius quarti nervorum cerebri paris, comite vena & arteria, ad dentium cavitatem diffeminandus ingreditur.
c c 2 4 Foramina per quæ vasa dicta maxillam rursus, distributa in humiliori labrum, & eius loci musculos, egrediuntur.
d 2 4 Alperitas prima ossis, unde incipiunt musculi labium inferius detrahentes.
e 3 Alperitas secunda, cui inferitur tendo musculorum maxillam deprimentium, & unde alii lingue musculi oriuntur.
f 1 Alperitas tertia, unde oritur maxillæ abductor.
g h i Dentium triplex ordo notatur, g quatuor incisores denotat, h, duos caninos, i, decem molares.

FIGVRA V

Dentes tam superioris maxillæ, quam inferioris, evulsi à sua sede, alterius tamen duntaxat lateris, quod utriusque eadem sit ratio, demonstrat, ut radices curvis contemplari liceat, cum maxillæ adhuc inflexæ, in præcedentibus tribus figuris, tam duabus prima, tabula facie intueretur, & non fuerit.

- A A Dextri lateris octo superiores dentes.
B B Eiusdem lateris octo inferiores.
a b c Dentium genera denotantur, a enim Incisores, b Caninos, c Molares ostendit.
d d 1 Radices dentium.
C Cavitatis dentis molaris dissecti, quæ membranâ succingitur.
D Interior superficies dentis incisorii.
E Dens molaris, cuius mensuræ litera inscripta est.

FIGVRA VI, VII, & VIII.

Os hyoides præparatur tribus figuris. Prima anteriorem faciem exprimit, secunda posteriorem, tertia unâ mittere latera & officula, quibus cum styloide processu iungitur.

- A B Basis ossis hyoidis, five primum os.
a 6 8 Tuberculum anterioris sedis.
b 6 8 Sinus superior transversus, & oblongus, qui primum pars musculorum hyoidis, Attollens, excipit.
b Sinus inferior.
D 7 Concavitas basis ossis hyoidis.
E F Latera humiliora, five Cornua ossis hyoidis, quæ secundum & tertium officulum constituunt.
G G Connexus cornuum cum basi.
H H Apex cornuum, qui laryngis cutiformi cartilagini alligatur.
I K 8 Latera superiora ossis hyoidis, inferioribus tenuiora, magisque teretia.
L M N Tria alia officula, superioribus lateribus utrinque ut plurimum commissa.

FIGVRA IX, & X.

Clavicula sinistram exprimitur. Illa, superiorem ipsarum, & anteriorem partem: hac, inferiorem & posteriorem.

- A B Pars teres & gibba.
B C Pars lata.
D Capitulum quod sternum articulat.
E Capitulum quod superiori capulæ processui, five acromio, articulat.

FIGVRA XI, & XII.

Os pectoris gemina figurâ exprimitur, ut utraque ejus facies, anterior & posterior cernatur, illa in priore, hac posteriore.

- A 11 Primum os sterni, nonnulli in anteriore sede protuberans,

- a b 11 Sedes utrinque ad hanc protuberantiam depressa.
c 12 Posterior sedes primi ossis utrinque cava.
d Sedes primi ossis, cui primæ costæ cartilago innascitur.
e f Sinus primi ossis, cui claviculæ capitulum inarticulatur.
g Sedes inter duos hos sinus Lunæ modo excavata.
h Connexio primi ossis cum secundo.
i Secundum os pectoris.
h r Communis primi, & secundi ossis sinus, cui secundæ costæ cartilago inarticulatur.
k l m n o Sinus secundi ossis, quibus cartilagines tertie, quartæ, quintæ, sextæ, & septimæ costæ inarticulantur.
p q r His locis, in pueris secundi ossis distinctiones nonnunquam apparent, ac si secundum os ex tribus constaret.
r f Tertium os sterni.
t Cartilago mucronata tertio ossi adnata.

FIGVRA XIII, & XIV.

Scapula sinistram duabus figuris proponitur, ut priore exterior ejus facies, posteriorem internam conspiciatur.
Scapulæ processus primus, sed A B Scapulæ sinus est, cui humeri caput inarticulatur, C D Cervix.

- A B C D Basis scapulæ, five primum latus.
E F G Superior colla.
G D Inferior colla.
E G Duo scapulæ anguli. E superior, G inferior est.
H Appendix inferioris anguli cartilagineus.
I 13 Spina scapulæ.
L M Summus humerus, & æquior.
N Sinus levis cui claviculæ caput committitur.
O P Processus acromiiformis.
O Basis hujus processus.
P Vertex hujus processus.
Q R 13 Duo intercapitula, Q superius est; R, inferius.
S S S 4 Tubercula instar obliquoarum lineærum, sinus constituenda, ac si a costarum convexis impressi forent.
T T 13 Alper sinus, unde interior cubitum extendentium musculi pronascitur.
V V 14 Protuberans inferioris costæ pars, ob quam X X insignitæ cava cernitur.
X X

FIGVRA XV

Spinam universam ex latere ostendit, ut motus omnium dorso vertebrae tam contextus appareat.

- 1, 2, 3, &c. Hi numeri ostendunt quanta quæque vertebra sit in spina.
A B Septem collum constituentes vertebrae.
B C Duodecim thoracis vertebrae.
C D Quinque lumborum vertebrae.
D E Sex sacri ossis vertebrae.
E F Quatuor ossis coccygis vertebrae.
G Corpus vertebrae, in 4, 12, 23, vertebra notatum.
H Transversus processus, in eisdem insigniti.
I Obliqui ascendentes processus.
K Obliqui descendentes processus.
L Acuti processus.
M Foramen proprium vertebrae.
N Foramen commune vertebrae.
O Ligamentum cartilagineum, quo vertebrae colligantur.

FIGVRA XVI, & XVII.


Thoracis omnia ossa proponunt, exceptis claviculis, scapulisque: & priorem partem, posteriorem.

- A B 6 Os pectoris, five sternum.
C Cartilago ensiformis.
1, 2, 3, &c. Costæ duodecim, ex quibus septem superiores legitime vocantur; inferiores quinque, spurie.
D D D Costarum pars ossa.
E E E 16 Pars cartilaginea, cuius connexio cum ossa parte virgulae utriusque literæ D, & E, interjecta denotatur.
F Connexio costarum cum sternum.
G 16 Articulatio costarum cum vertebrae corpore.
H 17 Connexio cum transversis processibus vertebrae, a a, b b.
I a b 17 Vertebrae, quarum processus transversus a, a, posteriores, b b.

FIGVRA XVIII

Costa una foris demonstratur.

- A Capitulum quod costæ sternum committuntur.
B Capitulum rotundum, quo vertebrae sinui infiguntur.
C Tuberculum, quo costæ sinui transversus vertebrae processus inarticulatur.
D E Pars ossis, D, cartilaginea, E.
F Sinus oblongus & inferior, per quem vasa incedunt.




LIBRI SECVNDI

TABVLÆ VIII EXPLICATIO.

VT que de Vertebribus dici possunt omnia tabula oculis subiciantur, vertebrae cuius generis libet depingendas curauimus, & Cervicis quidem quatuor, unam vero Thoracis duntaxat, & lumborum. Qui enim unam ex his posterioribus viderit, omnes viderit: at in Cervice paulo aliter se habet, cum quatuor quasi diversa genera occurrant, prima, secunda, tertia & septima: nam quarta, quinta, & sexta cum tertia conveniunt. Ceterum ne & in his quidquam desideretur, cuiusvis tres figuras delineavimus, ex quibus prima faciem superiorem anterioremque continet: altera, superiorem posterioremque: tertia, inferiorem anterioremque demonstrat. Tres ergo prima figura primam cervicis vertebrae ostendunt: Tres secundae, secundam cervicis: Tres tertiae, tertiam cervicis: Tres quartae, septimam cervicis: Tres quintae, primam thoracis: Tres sextae, primam lumborum. Literae autem omnibus figuris communes ferè sunt; quod si qua habet proprias, numerus characteri additus facile id demonstrabit.

- A.** Corpus vertebrae ab anteriore parte ostendit; quod vide quomodo in prima cervicis vertebra tuberculum potius quoddam, ac corpus exprimat; praeterea quomodo cervicis vertebrae non ita rotundum anteriore in sede, sed potius quadrangulum oblongum habeant, secus ac thoracis & lumborum vertebrae.
- B.** Corpus vertebrae à posteriore parte.
- a** **I** 1 Sinus quadratus cartilagine tectus, in primae cervicis vertebrae corporis posteriore facie occurrens, qui dentiformem secundae vertebrae processum exigit.

- C.** Superior corporis vertebrae superficies, quam videtur quo pacto in cervicis vertebra sinuata est, at circa extremitates in thoracis & lumborum vertebrae extuberat.
- b b** **V, VI** Extuberantia superioris vertebrae corporis superficie.
- D** Inferior corporis vertebrae superficies.
- E** **II** 1 3 Processus dentiformis secundae vertebrae, cujus anterior facies hic ostenditur.
- F** **II** 2 Eiusdem processus facies posterior.
- G** Processus transversus, sive laterales vertebrae, qui in Cervicis vertebra perforati sunt, foramine (**c**) per quod venae & arteriae Cervicales dictae ad caput ascendunt: in thoracis vero, ac lumborum, vertebrae solidi, in illis tamen, thoracis inquam novem superioribus, sinum cartilagine incrustatum, cui costae inferuntur, & quasi affimantur, habent.
- H** Processus obliqui vertebrae ascendentes, qui sinuati sunt in prima Cervicis, & Lumborum vertebra, in reliquis omnibus capitulum leviter prominens obtinent.
- I** Processus obliqui descendentes, sinuati omnes, sed in Lumborum vertebra nonnihil protuberantes ut capitulum mentiantur.
- K** Processus posteriores, qui cum acuti sint Spinae dicuntur, in solis tamen cervicis vertebra, (excepta prima & septima) bifidi sunt.
- L** **I** Processus posterior vertebrae primae, qui cum acutus non sit, haud bene Spinae nomen meretur.
- M** Foramen proprium vertebrae, per quod Spinalis medulla descendit.
- N** Foramina quaedam exigua, quae praesertim in lumborum vertebra, ob earum porositatem, reperiuntur.



LIBER II TABVLÆ IX EXPLICATIO.

FIGVRA I, & II.

- O** *Sacrum prominet, ut in prima quidem figura anterior quæ facies, & concava, in secunda autem, posterior, & gibba spectatur.*
- A A A** 1 Quinque ossis sacri vertebrae, in quibus nota, a, a, a, quæ foramina sunt, ipsarum porositates demonstrantia.
- a & c.** 2 Connexio vertebrarum, quæ leviam quædam tantum lineæ rudimenta in adulationibus exprimit.
- b b b** 3 Foramen proprium vertebrarum, per quod spinalis medulla descendit.
- c c c** 4 Processus obliqui superiores primæ vertebrae, quorum sinus hac litera insignitur, in secunda figura exprimitur.
- D D D** 5 Connexus hic significatur, quo primi sacri ossis descendentes processus, cum ascendentes secundi, quemadmodum in lumborum vertebra, committi inter se videntur.
- E E E** 6 Processus posteriores.
- I F F** 7 Processus transversi omnes inter se uniti.
- G** 8 Corpus primæ vertebrae ossis sacri.
- I 2 3 4** 9 Foramina in utraque facie, tam anteriore, quam posteriore, majora tamen nonnulli in illa, conspicua.
- I H I K L** 10 Literæ hæc ossis sacri in dextro latere, eam partem significant, quæ dextro ilium ossi necitur, pluribusque tam ex sinistris, quam tuberculis extructa est. Ex hisce literis primum H H, finium anteriorem & oblongum denotant: I K duos posteriores fere rotundos, quorum superior I est, K inferior. Anteriores à posticis interdividit tuberculum L, instar amplæ cuspidam lineæ prominens; at duos posteriores, tuberculum M. Superior sinus in elatiori sede nonnulli prominet, quam ideo characterē N insignivimus.
- M N O** 11 Suprema ossis coccygis vertebra, quam in secunda figura exprimentiam curavimus, ut monstremus, quomodo dum ex quinque vertebra os sacrum constituitur, ipsa transversos processus c, c, utrinque exeat, qui sursum elati d, d, processus quatuor sacri ossis, vertebrae posteriori bifidæ e, e, per cartilagineam f valide coalescunt, ubi foramen sit g, per quod sextum par nervorum ossis sacri exit.

FIGVRA III, & IV.

- O** *Sacrum coccygis duabus figuris, eadem de causa atque os sacrum proprium.*
- I 2 3 4** 1 Officula quatuor ossis coccygis, ex quibus 1 supremum est situ, 4 infimum.
- A** Superior fides funni officuli latiori inferiore, quod & in reliquis cernitur.
- B** Inferior fides superiore angustior.
- C** Sinus primæ vertebrae, quo inferior pars postremæ sacri ossis vertebra excipitur.

FIGVRA V, VI, & VII.

- O** *Sacrum coccygis dextri lateris tribus figuris hic delineata proponitur. Prima figura anteriorem sedem: Secunda, externam: Tertia, internam.*
- I 2 3** 1 Sinus coxendicis, in quo superius femoris caput recipitur.
- I 2 3** 2 Tres lineæ cartilagineæ, quibus tria ossa, innuminata dicta confluentia, connectuntur, quarum ordinem ascriptus numerus ostendit. 1 enim, primam indicat: 2, secundam: 3, tertiam. Has in sexta & septima figura exprimentas curavimus, non item in quinta, ut demonstremus simul quomodo in adultis eo usque aboleantur, ut ne vestigium quidem hujus cartilaginis reliquum fiat.
- I 2 A B** 3 Os ilium his lineis circumscriptum.
- I 3 M** 4 Os pubis his lineis circumscriptum.
- 2 3 Q L** 5 Os coxendicis.
- A** 6 Spina ossis ilium, quæ est appendix aspera ob musculorum nexum.
- a** Linea, quæ spinam A A, & ilium os interfingunt.
- B** 7 Costa, sive cavitatis ossis ilium.
- C** 8 Dorsum, sive pars gibba ossis ilium.
- D I D 2 D 3** 9 Tres asperæ lineæ dorso ossis ilium insculptæ, pro exortu trium musculorum femur extendentium, quos Gluteos vocant, harum ordo numeris ascriptus indicatur.
- E E F** 10 Ea ossis ilium fedes notatur, quæ sacri ossis primi & secundi transversorum processuum tuberculis, sinibusque H H I K L M N, figura secunda depictis, & similiter alternatim his stipata, committitur. E E enim tuberculum est ob longum anterus: duo alia posteriora acuta b, & c. Hæc & illud sinus longus F, at ista, b inquam & c, sinus d interfingunt. Circa tamen superius b, sinus est alius e. Ex his E E quidem signum H H fuit, b vero I, & c, K, & N, ipsum E. Rursus sinus F, tuberculum L recipit, d vero M, & c, N.
- G** 11 Labra magni sinus coxendicis, quæ magis in posteriore parte, quam antica: & superiore, quam inferna conspiciuntur.
- H** 12 Hæc leve, cui fedes est, quæ sinus coxæ pubis ossa respicit, labralia denotant.
- I** 13 Anterior pars sinus coxendicis, cartilagine denudatus.
- K** 14 Sinus ossis coxendicis, pro tertio femur circumagendum musculo insculptus.
- L** 15 Appendix ossis coxendicis.
- f** 16 Linea appendicem ab offe coxendicis interdividens.
- M** 17 Linea aspera, & crassa, quæ pubis ossa invicem junguntur.

- N** Foramen ossium pubis.
- O** Sinus in pubis ossibus excelsus, pro transtu vasorum cruralium.
- P Q** Tubercula duo ossis coxendicis, P externum est, Q internum.
- R** Sinus in superiore coxendicis ossis fede calatus, siveur fecundum primum & secundo viam præbens.

FIGVRA VII, & IX.

- H** *Veneri os dextri brachii duabus figuris delineatur: prima, anteriorem faciem: secunda, posteriorem monstrat. Ceterum hæc ossa, quæ sequuntur, omnia, sic depingenda curavimus, ut simul appendices demonstraremus, quæ loci usui cum reliquo offe junguntur. Et in junioribus occurrere consueverunt.*
- A** Appendix superior ossis humeri.
- B B** Appendix inferior ossis humeri.
- a b** Capita duo superioris appendicis, a internum: b externum denotant.
- c** Capitis externi dux partes, c anterior: d posterior est.
- c** Sinus teres, qui externum caput in duas hæc partes dirimit, pro transtu primi capitis Bicipitis musculi, sive primi cubitum flectentis, excelsus.
- f** 8 Teres ossis humeri pars, sede anteriore demonstratur.
- g** 9 Lata ejusdem pars sede posteriore ostenditur.
- h** Pars ubi admodum humeri os latet.
- i** Inferius & internum caput ossis humeri, pro articulatione Cubiti, quod Trochleam vocant.
- l m** Duo sinus trochleæ, Bicipitis dictæ, ex quibus l anterior est, m posterior, ille inferiorior, hic superiorem processum appendicis cubiti superioris recipit.
- n** 8 Inferius & externum caput humeri, cui radius committitur.
- o p** Duo tubercula humeri, o internum, p externum.
- q r** Duo sinus ad latera tuberculorum, q ad externum est, r ad internum.
- f** Foramina exigua insculpta, pro ligamentorum humeri cum scapula inflectione.
- t** Foramen in medio longitudinis ossis humeri, pro vena ad intimiora penetrare, factum.

FIGVRA X, & XI.

- D** *Tri Cubiti ossa, Ulnam & Radius dextri brachii invicem iuncta colligunt, ut connexio musculi utriusque cernatur: sic tamen, ut prior figura anteriorem partem, altera, posteriorem ostendat. Literarum autem explicatio eadem est cum quatuor subsequentium figurarum enumeratione.*

FIGVRA XII, & XIII.

- Vna dextera anterior, & postica facies exprimitur.**
- A** Superior appendix ulnæ.
- a** Quibus pars ulnæ Hippocrati *ἀγκυρά*, Galeno *ἀγκυρά*.
- b** Sinus ulnæ, quem *εγγυρά* vocant sive signiformem.
- c d** Duo processus sinus b, ex his c posterior: d, anterior dicitur.
- 12** Sinus quartam cubiti partem conficiens, qui minus radii capitulum excipit.
- f** Inferior ulnæ appendix, hæc cum offe reliquo jungitur.
- g** Processus styloideus hujus appendicis.
- h** Acuta linea ulnæ.

FIGVRA XIV, & XV.


- Radius dextri posteriorem & anteriorem partem designant.**
- i** Cervix radii.
- l** Superior appendix radii.
- m** Sinus huic appendici insculptus.
- n** Pars ubi dicta appendix sinui ulnæ, quartam circuli partem conficiens infertur.
- o** Tuberculum oblongum, aspero sinu donatum, cui tendo primi cubitum flectentium, s. bicipitis, implantatur.
- p** Inferior radii appendix.
- q** Sinus in quo inferior ulnæ appendix recipitur.
- r** Linea aspera radii.

FIGVRA XVI, & XVII.

- Manus dextera pars externa & interna demonstratur.**
- A A** Carpi ossa octo, quorum ordinem ascripti numeri barbari ostendunt.
- I 2 3 & c.** Metacarpi ossa quatuor, quorum ordo adnotatis numeris majusculis Romanorum designatur.
- B B** 1 Metacarpi ossa quatuor, quorum ordo adnotatis numeris majusculis Romanorum designatur.
- C C** 2 Digitorum ossa quinquedecim.
- a b c** 3 Ossa pollicis, a primum, b secundum, c tertium.
- d e f** 4 Ossa indicis, d primum, e secundum, f tertium. Eodem modo reliquorum digitorum ossa numerantur.
- g h** Superficies ossium metacarpi, g externa & plana: h interna, & acuta est.
- i i** Intervalsa ossium metacarpi, in quibus musculi, interossei dicti, accedunt.
- l m** Appendices ossium metacarpi, ex quibus superior capitulum, inferior sinum excipit.
- n o** Appendices ossium digitorum, n superior est, o inferior.
- 1 1** Ossium sesamoidaeorum situs.

FIGVRA XVIII, & XIX.

- O** *Sinus sesamoidaeorum facies anterior & posterior exhibetur confistenda.*



LIBRI SECUNDI TABULÆ X EXPLICATIO.

O Sca cruris universa præsent Tabula demonstrat. In his appendicibus cum reliquo osse, ut in pueris apparet, coalitum diligenter exprimendum curavimus.

FIGURA I, II, & III.

F Emur sinistri lateris tribus figuris exprimitur, ut anterior ejus pars in prima, posterior in secunda, & lateralis tandem in tertia cernatur.

- A Cervix superioris femoris appendicis.
- B Caput femoris superioris, coxendicis acetabulum subiens.
- C 2 Foramen in medio hujus capitis insculptum, cui ligamentum teres, ex coxæ acetabulo enatum, inseritur.
- D Trochanter, five processus major, & externus.
- E 2 Trochanter, five processus minor, & interni.
- F 2 Sinus in processu externo, parte interna exculptus.
- 1, 2, 3, 4 Impressiones quatuor trochanterias, five processus externi, quarum ordinem numeri assignati demonstrant.
- F 2 Linea aspera à prima impressione dorsum tendens.
- G H Duo inferiora femoris capita. G internum est, H externum.
- I K 2 Duo sinus inter femoris duo inferiora capita incili, ex quibus I anterior est, patellam: K posterior, ligamentum teres, excipiens.
- b b Foramina circa appendicem inferiorem, pro ligamentorum validiore implantatione facta.
- c c Foramen in posteriore femoris sede insculptum, per quod vena ad ossis nutritionem transit.
- d d Aspera linea per posteriorem femoris regionem excurrents.
- e e c c Lineæ, quæ quatuor appendicum, duorum nempe capitum femoris, totidemque trochanterum coalitum ad reliquum os ostendit.

FIGURA IV.

T Ibi os sinistri lateris fibule junctum, anteriore parte representat, cuius latera in sequentium duarum figurarum explicatione declarabuntur.

FIGURA V, & VI.

T Ibi os duabus figuris delineatur: illa, parte sua laterali interna; hæc, posteriore.

- A Superior tibiae ossis appendix.
- B B 4 6 Duo superioris tibiae appendicis sinus, inferiora femoris capita excipientes.
- C 4 6 Tuberculum duobus his sinibus interjectum, cuius apici ligamentum teres ossis femoris implantatur.
- D 6 Capitulum quod superioris fibule appendicis sinum ingreditur.
- E E Foramina in utraque appendice ossis tibiae.
- F 4 8 Tuberculum, in quod tendo inferitur, ex tendinibus secundis, tertiis, ac quarti tibiae extendentium muscularum committus.
- G 6 Foramen in posteriore sede occurrent, per quod vena ad ossis nutrima admittitur.
- H Appendix inferior tibiae.
- K K 4 Sinus geminus huic appendici insculptus.
- L Processus inferioris tibiae appendicis, Malleolum internum constituens.
- M 6 Sinus ad externum latus inferiorem fibule appendicem adnatis.
- N 6 Linea in posteriore tibiae sede excurrents.
- 1, 2, 3 Tres tibiae ossis lineæ, ex quibus totidem latera conficiuntur.
- I 1, 2, 3 Tria latera ossis tibiae.
- a Coalitum docet appendicis utriusque, ad reliquum os.

FIGURA VII, & VIII.

F ibulam duabus figuris designavimus, ut anterior, posteriorque ejus facies conspicua fiat. Sed & appendices prout in pueris occurrunt exprimendum curavimus.

- M Superior fibule appendix.
- N Inferior fibule appendix, Malleolum externum constituens.
- O Reliqua fibule pars, trique appendici interjecta.
- P Sinus qui capitulum tibiae D suscipit.
- 1, 2, 3 Tres fibule lineæ.
- I 1, 2, 3 Tria fibule latera.
- a Coalitus appendicum cum reliquo osse.

FIGURA IX, & X.

P Atella utraque facies hic effigietur: anterior quidem, foraminibus plena, in nona; posterior autem, cartilagine lævis succinilla, in decima figura.

FIGURA XI, & XII.

P Edis dextri ossium invicem junctorum, illa superiorem, hæc inferiorem partem ostendit, ut mutua connectio cernatur.

- A A Tarsus, prima pedis pars.
- B B Metatarsus, secunda pedis pars.
- C C Digni, tertia pedis pars.
- D D Pars innominata, five quarta.
- E E Calcis os, five Calcaneus.
- F F Astragalus, five Talus.
- G G Os naviculare.
- H H Os cubiforme.
- I I Os cuneiforme medium.
- K K Os cuneiforme minus.
- L L Os cuneiforme majus.

- 1, 2, 3, 4, 5 Offa metatarsi.
- a b Duæ appendices ossium metatarsi. a, superiorem denotat: b, inferiorem.
- c c 12 Offa sesamoidea in suo situ.

FIGURA XIII, XIV, XV, & XVI.

Q Vatuor astragali dextri pedis latera representantur quatuor figuris, ita tamen ut reliqua duo etiam optime cernantur. Prima, superius latera: Secunda, inferius: Tertia, laterale externum: Quarta, internum.

- A B C Sex latera astragali, ex quibus A, superius est, & quæque dictum.
- D E F B, inferius. C, anterius. D, posterius. E, laterale internum. F, externum.
- a b 13 Duæ lineæ superioris lateris. a prior est, b posterior.
- c 13 Sinus levis superior lateri insculptus, in quem linea inferior tibiae sinum bifariam secans inferitur.
- d d Cartilago, qua laterales partes obducuntur, quæ malleolum utrumque excipiunt.
- e e 15 16 Sinus asperi duarum laterum partium, quibus ligamenta inferuntur, quæ duo ossa tibiae talo colligant.
- f Cervix oblonga partis anterioris.
- g Capitulum huic cervici obnatum, quod à sinu ossis navicularis excipitur.
- h Sinus inter cervicem & superius laterus occurrents.
- i 13 Sinus transversus per posterius laterus excurrents.
- l 13 Sinus inferius posterioris lateris.
- m 14 Sinus inferioris lateris.
- n 14 Caput inferioris lateris.
- o 14 Sinus longus & profundus inferioris lateris, in quo mucosa substantia coarctatur.
- p 14 Sinus levis capitis in latere inferiore insculptus admittens caput secundum calcanei.

FIGURA XVII, XVIII, & XIX.

T Ribum figuris dextri pedis calcanei exprimitur. Prima, superius latera, altera inferius, tertia internum representant.

- A B C Sex calcis latera. A superius est, B inferius, C anterius, D posterius, E internum, F externum.
- D E F a Sinus in anteriore parte supremi lateris.
- b Caput primum in eadem parte ejusdem lateris, sinum in quo subiens.
- c Caput alterum sinum ejusdem tali p ingreditens.
- d Sinus supremi lateris in parte posteriore, qui ligamentum accipit a tibia talum confringens.
- e Sinuli in posteriore latere, in quos tendo primi, & secundarii tendentium infinguntur.
- e Anterior pars ubi cubiformi ossi coarctatur.

FIGURA XX, & XXI.

Naviculare os parte posteriore in illa, in hac anteriore depingitur. Concauitas ossis navicularis, quam caput tali ingreditur.

- A Concauitas ossis navicularis, quam caput tali ingreditur.
- B Convexitas ejus, tribus sinibus distincta, quorum ordo numeratè designatur.
- 1, 2, 3

FIGURA XXII, & XXIII.

Cubiformis ossis superior & inferior pars effigietur.

FIGURA XXIV.

Ossis cuneiformis majoris formam declarat.

- a Sinus qui navicularis ossis processum internum suscipit.
- b Superius latus convexum.
- c Inferius latus cavum.

FIGURA XXV.

Ossis cuneiformis medii figuram complectitur. Latera ejus. a Superna sedes quadrilatera. b interna est acuminata, c posterior. d interior.

FIGURA XXVI.

Ossis cuneiformis minimi figura est, cuius latera, ut præcedentis eadem latera denotant.

LIBRI QVARTI TABVLÆ I EXPLICATIO.

In his Tabulis omnes totius corporis Musculi delineati conspiciuntur. Observatum autem hoc unice est, ut singuli tam in sede sua naturali, quam in corpore habent, atque extra situm remoti demonstrarentur, ex quo sit, ut non tantum externa ipsorum facies, sed interna quoque cernatur, & simul quis quemque ordine consequatur, innotescat. Est & hoc diligenter animadvertendum, ut eo ordine proponerentur, quo in Dissectionibus demonstrari debent. Tanto autem artificio omnia à Sculptore expressa sunt, ut curvis primis statim fronte apparent, quæ pars carnea sit, quæ tendinosa, quæ nervosa, aut membranosa: imò quanta sit cuiusque musculi crassities, aut gracilitas. Nos autem & ipsi, na nostro deservimus muneri in explicatione, diligenter omnia ad Spigelii historiam retulimus, cuius sapè propterea verba hic expressa invenies, ut nihil omnino sit ab ipso traditum, quin hic demonstretur. Imprimis verò magna industria principum, medium, & finem cuiusque ostendimus.

FIGURA I.

- F**rons, Palpebrarum, Nasi, Buccarum, Labiorum, Maxilla inferioris, & Auricula musculi, quos per omnes in situ suo proponit.
- A** Frontis, (vel potius Supercilii) musculi, in suo situ.
- a a** Principium ipsius, circa elatiorem frontis partem, ubi capillorum finis est.
- b b** Finis ejusdem qui in supercilia implantatur.
- B C** Musculi palpebrarum, quos Claudentes Spigelius vocat, ex quibus **B** superior est, **C** inferior, illius principium **x** est, finis **2**, huius **3**, insertio **4**.
- D** Primum par musculorum nasi, alas abducens, in suo situ.
- c d** Principium ejus ab osse maxillæ, (**c**) Finis circa nasi alam, (**d**)
- E** Secundum par musculorum nasi alas abducens, in situ.
- e f** Principium ejus acutum & carnosum circa nasi verticem, (**e**) Finis in ala, (**f**)
- F** Buccarum musculus secundus, Buccas contrahens, ab aliis Buccinator dictus, in situ suo.
- G** Primum par labiorum, five Attollens labium superius, in sua naturali sede.
- g h** Principium dicti musculi, à primo superioris maxillæ osse, (**g**) Finis circa latera superioris labii, (**h**)
- I** Secundum par labiorum, Abducens, naturalem situm occupans.
- i k** Principium carnosum à cavitate malis subiecta, (**i**) Finis circa concavum utriusque labii, (**k**)
- I** Tertium par deprimens inferius labium, quod ab infima sede inferioris maxillæ pronatum, in labii inferioris medium insertitur, situm suum hic obtinens.
- K K** Quartum par, Labia contringens, situm suum occupans.
- L** Primus maxillæ inferioris musculus, Attollens, vel Temporalis dictus, sua membrana denudatus, ut fibre carnes conspiciantur, in situ.
- M** Principium huius musculi femicircularæ.
- N I m** Secundus maxillæ inferioris musculus, Deprimens, five Biventer, extra situm, cuius tendo designatur caractere **N**. Ventres autem literis **l. m.** ex quibus **l** primus est, principium: in secundus, & finem constituens.
- O** Tertius maxillæ inferioris, Lateralis, extra situm.
- P P** Maxilla inferior a musculus, & carne denudata.
- n** Processus anterior maxillæ inferioris, in quem musculus ipsam Attollens, (**L**) insertitur.
- o** Processus ejusdem posterior, qui capitulum exigit, quod in sinum secundum osse temporum infculptum adaptatur.
- Q** Os jugale.
- R** Primum os maxillæ superioris.
- S** Primus auriculæ musculus, five Attollens, in suo situ.
- T T T** Secundus auriculæ musculus, five Detrahens, cuius triplex portio hic exprimitur.
- V** Auricula, five Aures externa.

FIGURA II.

- A** Vri interna primum, five externum musculum, in suo situ demonstrat.
- A** Musculus externus internæ aures, ex substantia cutanea, & fibris tenuissimis constans.
- B** Tendo ipsius subtilissimus, in membranz Tympanum dictæ, exteriori partem, ejusque fere centrum insertus, ea sede, qua malleus intus membranz adnæctitur.
- C** Locus insertionis, ubi dicti mallei processus ostenditur.
- D** Membrana, Tympanum dicta ambabrata sic artificiosè, ut malleus per ipsam transperere videatur.
- E** Circulus osseus, ossi petroso adhuc junctus.
- F** Processus mammillaris ossis temporum.
- G H** Os temporum undique effractum: **G** tamen ejus sedem superiorem, **H** inferiorem monstrat.

FIGURA III.

- A** Vri interna secundum, five internum musculum, in suo situ representat.
- A** Aures internæ externus musculus, figura secunda monstratus, hic quoque integrè depictus cernitur.
- B** Aures internæ internus musculus inter os petrosum, & canaliculum per proprium ductum in concham porrectus.
- C** Crus alterum incedus.
- D** Mallei processus.
- E** Circulus conchæ.

- F** Processus ossis temporum petrosus.
- G H** Os temporum.

FIGURA IV.

- P** Alpebrarum, Nasi, Labiorum, Maxilla inferioris, Ossis hyoidis & Capitis musculi, cum obiter, Vena jugularis distributionem in capiti, in suo situ ostendit.
- A A** Musculus frontis in suo situ.
- A** Primum par nasi alas contringentium, in suo situ.
- B** Secundum par musculorum nasi alas abducens, in situ.
- C** Primum par labiorum, five Attollens labium superius, similiter in situ.
- D** Secundum par labiorum, five Abducens, situm suum obtinens.
- E** Tertium par deprimens inferius labium, in suo situ.
- F F** Quartum par labia contringens, in situ naturali conspiciuntur.
- G** Os jugale.
- H** Primus maxillæ inferioris musculus, Attollens, five Temporalis in situ, sua membrana connectus.
- a a** Principium ipsius.
- b 1, b 2.** Principia ejus duo, quorum primum **b 1**, circa juncturam primi ossis maxillæ cum quarto est: alterum **b 2**, ab osse jugali oritur.
- c c** Inferio ejus in amplitudinem ossis maxillæ inferioris.
- K** Primum par musculorum capitis, five Flectens, Maltoidem, in situ.
- d d** Principium ejusdem à summo stemo, & ab elatiore sede claviculari.
- e e** Inferio in mammillarem processum ossis temporum.
- L L** Quartus musculus ossis hyoidis, Coracoidæus, cuius duplex venter his literis **L, L** designatur, in sua sede naturali depictus.
- f** Tendo ejusdem in quem abir, ut cedat maltoidem sibi incumbenti.
- g h** Principium ejusdem ex superiore scapulæ costa juxta cervicem, & processum coracoidem **f**. Inferio in cornua hyoidis **g**.
- M** Musculi quidam Capitis indistincti adhuc, ceterum sedem naturalem occupantes.
- N** Musculi quidam Laryngis.
- O** Vena jugularis externa, ejusdemque progressus in caput.
- P** Buccarum musculus secundus, fig. 1, litera **F** monstratus.
- Q Q** Maxilla inferior a musculus denudata.
- R** Corpus glandulosum, quod Thymum vocant, vasorum divaricationi additum.

FIGURA V.


- M** Vt oculorum una cum oculo in propria sede jacentes adumbramus, quemodo in orbita adhuc indistincti conspectui se offerant.
- A A A** Musculi.
- B B** Pinguetudo musculis interposita.
- C** Oculi.

FIGURA VI.

- M** Vt oculorum extra situm nominatim elevati demonstrarentur, ceterum principis adhuc inter se coherent.
- A** Secundus obliquo oculi musculorum, five Trochleæ musculi.
- a** Trochlea.
- B B B** Quatuor alii musculi oculorum recti.
- C** Nervus opticus.
- D** Oculi.
- E** Palpebram attollens, aut aperiens musculus.
- b c** Principium ejus **b**, finis in palpebra **c**.

FIGURA VII, & VIII.

- M** Vt oculorum omnes separati, & ex suo loco remoti ostendantur, sed ita ut figura septima portem superiorem, Oculum inferiorem exhibeat.
- A** Musculus rectus superior, five Attollens.
- B** Musculus rectus inferior, five Depressor.
- C** Musculus rectus internus, five Adducens.
- D** Musculus rectus externus, five Abducens.
- E** Musculus obliquus primus, five Circumagens inferior.
- F** Musculus obliquus secundus, five Circumagens superior, & Trochleæ musculi.
- G** Trochlea illa ab osse revulsa.
- a a a** Nervi motori in musculis hos inserti.
- H** Nervus opticus.
- I** Oculi.



LIBRI QVARTI TABVLÆ II EXPLICATIO.

FIGVRA I.

- M** *Musculus quosdam Maxillæ inferioris, Ossis hyoidis, & Laryngis, partem in suo situ, partem extra locatos proponit.*
- A A** Cutis quæ sub mento erat, revoluta, ut subjecti musculi cernantur.
- B B B B** Secundus maxillæ inferioris musculus, Deprimens, biventer, in suo fere situ hic conspicuus.
- C C** Tendo ipsius inter duos ventres medius, ubi membrana expressa est, quam veluti trochleam transit.
- D** Ossis hyoidis primum os, five basis.
- E E** Primus musculus Ossis hyoidis, Attollens, Geniohyoideus, in suo situ.
- a a** Principium ejus à mento, sed insertio circa **D**, & basin ossis hyoidis.
- F F b c** Tertiæ par Ossis hyoidis, obliquè sursum trahens, five Styloceratohyoideum, cujus principium **b**, in radice processus styloidei, finis **c**, in suo fere situ apparet.
- G G** Secundum par Ossis hyoidis, Detrahens, Sternohyoideum, extra situm.
- H H** Quartum par Ossis hyoidis, Obliquè detrahens, Coracohyoideum, extra situm.
- I I** Larynx, five caput asperæ arteriæ: proprie tamen ipsa Thyroides tantum hic cernitur, five ejus prima cartilago.
- K** Corpus glandulosum ad Laryngem situm, quod Thyrium vocant.
- L** Asperæ arteriæ fistula.
- M M** Musculus, Thyroidis flexor Spigelio dictus, five Hyothyroideus, cujus principium, quod ab ossis hyoidis inferiore parte oritur, abscessum est, finis autem literis **d, d** notatur.
- N N** Primus Thyroidem extendentium, Sternothyroideus, in situ: cujus principium circa Sternum, (**e**): Finis circa inferum latus Thyroidis. (**f**.)
- O O** Secundus Thyroidem cartilagineum extendens, five Cricothyroideus anticus, in situ.
- P P P** Musculi aliquamulti, utrinque, caput & cervicem moventes, in suo situ, ceterum adhuc indistincti.

FIGVRA II.

- O** *Ossis hyoidis, & Linguae quosdam musculos in situ ostendit.*
- A** Primus musculus ossis hyoidis, Attollens, præcedente figura notatus literis **E, E**, in suo situ.
- B B B b** Os hyoides. Sed **B** Basin: **b, b**, Cornua denotant.
- C** Quartus linguae musculus, Miloglossus, in situ.
- D** Quintus Linguae musculus, Ceratoglossus, in situ.
- E** Larynx, cujus tamen hic tantum Thyroides cartilago cernitur.
- F** Secundus Thyroidem cartilagineum extendentium, five Cricothyroideus anticus.
- G** Asperæ arteriæ fistula.
- H H** Musculi cervicis, & capitis motui destinati, adhuc indistincti, in situ.
- I I** Sternum, five Os pectoris.
- K K** Claviculae.
- L L L** Costæ.
- M M M** Musculi intercostales.

FIGVRA III.

- A** *Speram arteriam cum Larynge, Lingua, & Osse hyoidis exprimit, ut sita, & connexione eorum peripetia, quorundam musculorum ortu & insertiones facilius cognoscantur.*
- A** Lingua, ad cujus radicem Os hyoides situm est.
- B B B** Os hyoidis.
- C** Musculus Hyothyroides, figura prima literis **M, M**, designatus, in situ.
- D D** Cartilaginis scutiformis, five Thyroidis anterior pars.
- E E** Musculus Sternothyroideus, figura prima literis **N, N**, signatus.
- F** Duo musculi, figura prima literis **O, O**, ostensi.
- G G G** Musculus Oesophagi diversis fibris distinctus.

- H** Portio Oesophagi.
- I I** Asperæ arteriæ fistula.

FIGVRA IV.

- A** *Spera arteria nuda, ab omnibus musculis liberata, eadem de causa demonstratur.*
- A A B C** Asperæ arteriæ caput, five Larynx.
- A A** Cartilago Thyroides, five scutiformis.
- B** Fissura Thyroidis cartilaginis.
- C C** Processus ejus superiores, quibus cum osse hyoide jungitur.
- D** Extuberantia cartilaginis Cricoidis, five Annularis.
- E F F** Os hyoides: sed **E** Basin, **F, F**, Cornua ejus demonstrant.
- G** Vinculum ossi hyoidei epiglottidem annexens, ipsamque elevans, ac in situ tenens.
- H H** Cricothyroideus anticus, in situ.
- I I** Asperæ arteriæ fistula.
- a a a** Cartilaginei sigmoides hujus fistulæ.

FIGVRA V.

- P** *Posteriorem Laryngis faciem cum vicinis musculis repræsentat.*
- A A** Portio Pharyngis, five principii Oesophagi resecti.
- B B** Duo faucium musculi, ad superiora Oesophagum trahentes, extra situm.
- C C** Duo alii faucium musculi, similiter Oesophagum sursum trahentes, extra situm.
- D D D D** Revolutiones membranae, quæ os hyoides cum cartilagine scutiformi jungit.
- E** Cavitas quam hæc membrana efficit.
- F** Epiglottis.
- G** Cartilago Arytænoides, five Guttalis.
- H H H** Membrana Laryngem involvens pars inferior integra.
- I I** Asperæ arteriæ pars posterior.
- K** Membrana, quæ partem posteriorem asperæ arteriæ claudit.

FIGVRA VI.

- M** *Musculus Laryngis in posteriore parte situs proponitur.*
- A A A** Os hyoides, cum tribus extuberantibus, quas processus obiculares vocant.
- B** Epiglottis.
- C C** Cartilago Thyroides à parte posteriore cava.
- D D** Extendens recta arytenoidem cartilagineum, five Cricothyroideus posticus, in suo situ.
- E** Portio asperæ arteriæ.
- F F** Arytenoideum par, five Claudens rimulam, secundum situm.

FIGVRA VII.

- M** *Musculus Laryngis persequitur.*
- A** Epiglottis in suo situ, à parte posteriore conspicua.
- B B B** Os hyoides, cujus connexio cum processibus superioribus cartilaginis thyroidei (**a, a**) satis expressa.
- D C** Cartilago Arytænoides, five Guttalis.
- D D** Cricothyroidei postici, in suo situ.
- E** Spina Cricoidis cartilaginis.
- F a a** Thyroides cartilago, cujus processus superiores sunt.
- G** Asperæ arteriæ facies posterior.

FIGVRA VIII.

- O** *Mnes Laryngis musculos, qui propriis dicuntur, et situm remotos exhibet.*
- A** Posterior cricoidis cartilaginis facies lata, & crassa.
- B** Eiusdem cartilaginis pars anterior, angustior & tenuior.
- C C a a** Cartilago arytenoides cum duobus suis processibus, conspicua.
- D D** Cricothyroidei antici extra situm.
- E E** Cricothyroidei laterales extra situm.
- F F** Arytænoides extra situm.
- G G** Cricothyroidei postici extra situm.

FIG. I.

TAB. II.






FIG. II.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ III EXPLICATIO.

- P**rimum caput extendentium musculum in suo situ, duos item Serratos posticos, & totidem thoracem extendentes, Longissimum scilicet, & Sacrolumbum vocatos, proponit.
- A A B B** Musculi caput extendentes, quo pacto se visui offerunt in suo situ, nondum à se invicem distincti.
- A A** Primum par caput extendentium, Triangulare dictum, quibuldam Splenium, in suo situ.
- a c** Primum hujus musculi latus, ab exortu usque ad tertiam colli vertebra pertingens.
- a b** Secundum latus, ab hoc loco ad occipitum pertinens.
- b c** Tertium latus ab occipito ad exortum excurrans.
- B B** Secundum par caput extendentium, primo subiectum, cujus elatissima pars nonnihil eminet.
- C** Serratus posticus superior in suo situ, qui primo pari caput extendentium (A.) incumbit, ut in validis contractionibus ipsum cum cæteris caput moventibus contineat, ne forte de suo loco exiliant.
- d d** Principium ipsius membranosum ac tenue, à spinis vertebrarum trium inferiorum colli, & primæ thoracis exortum.
- e e e** Finis ejusdem serratus, tribus constans fibris, totidemque intervallis, quatuor superiorum costarum, (1.2.3.4.) insertus.
- D** Idem Serratus posticus extra situm motus, ut interiorum ejus faciem contempleris.
- E** Serratus posticus inferior, in suo loco, Longissimo dorsi (H) & Sacrolumbo (K K) quemadmodum & reliquis thoracem extendentibus, hic subfitalis, incumbens, ut eos similiter in violentis motibus contineat in loco.
- f f** Principium ejus membranosum, ex spinis vertebrarum duarum, aut trium inferiorum thoracis, enatum.
- g g g** Insertio ejus ferrata ad costarum inferiorum (7. 8. 9. 10. 11.) quatuor intervalla, quæ tamen rectius cernuntur in eodem extra locum moto (F)
- F** Serratus posticus inferior extra situm motus, cujus principium ff insertio ferrata, g g g g.
- G** Tertius scapulam movens, Rhomboides dictus, extra situm.
- h h** Principium ejus carnosum.
- i i** Finis ejusdem carnosus in totam Scapulæ basim (m m) insertus.
- H H** Primus thoracem extendentium, Dorsi Longissimus dictus, in suo situ.
- I I** Idem in dextro latere totus conspicuus, quem & Tabula sequenti, litteris G H I insignitum intuearis.
- K K** Tertius thoracem extendentium, Sacrolumbus dictus, in suo situ.
- L M N** Idem in dextro latere artificio anatomico explicatus, ut ejus ansulæ (k l.) earundemque in costas insertio, conspiciantur.
- L M** Ejus principium nonnihil ex suo loco remotum.
- k l** Ansulæ, ex quibus (K) interna est, & elatori costæ sedî insiguntur: (l.) externa, & inferiori regioni implantatur.
- N** Spina, sive appendix ossis ilium.
- 1 2 3 4 &c.** Duodecim costæ, quibus numeri sui ordinis ascripti sunt, ut ex quota quisque musculus oriatur, aut implantetur, facili negotio patere queat.
- O** Musculi quidam ossis ilium dorsum occupantes adhuc tecti.
- P** Cutis à dorso separata, & detracta.
- Q** Scapulæ in suo situ jacentis, dorsum.
- m m** Basî scapulæ.
- n** Costa inferior scapulæ.
- R** Scapulæ è suo situ motæ cavitatis.




LIBRI QVARTI

TABVLÆ IV ENODATIO.

S <i>Secundum caput, & primum thoracem extendentium musculum in situ: Tertium verò thoracis tensorem Sacrolumbum, extra suum locum remotum, ostendit.</i>		tebrarum lumborum (SS.) & ossis ilium (T) sede interna, qua sacro jungitur, enatum.	
A	Primum caput extendentium triangularis, sive Splenius, in suo situ.	H I I	Ejusdem finis, circa primam thoracis vertebram.
abc	Tria ipsius latera: ex quibus a c primum latus est: a b secundum: b c. tertium.	K K K	Tertius thoracem extendentium, Sacrolumbus, extratum, in quo elegantissimè ejus interna facies cum asulis, quas ad costas transmittit, conspicitur.
B	Idem musculus in dextro latere extra situm.	d d d	Ansulæ illæ representantur.
C D E	Secundus caput extendentium primo (A) subjectus, Trigemini, vel Complexus dictus, quod ita distincto triplici principio (c c D D E E) sit præditus, ut ex tribus musculis in unum coeuntibus conflatus esse videatur. Hæc principia ut ostenderentur, diversis litteris uti sumus.	L L L	Idem tertius thoracem extendentium in situ, ab externolatero primo, sive dorsi longissimo adjacens. Musculus hic principio suo per totam vertebrarum lumborum sedem cum primo, sive Dorsi longissimo sic commixtus est, ut unus esse prorsus omnibus videri queat. Licum autem ubi à se separantur, hac nota t designamus.
C C	Primum ipsius principium ex transverso processu, quartæ & quintæ thoracis vertebræ enatum, quod in medium occipitium (Q) inseritur.	t	
D D	Secundum principium, à septimæ cervicis vertebræ spinæ enatum, cum priore ante insertionem coiens, & similiter in occipitium (Q) implantatum.	M	Scapulæ, à suis musculis liberæ, dorsum.
E E	Tertium, ex transversis processibus primæ secundæque thoracis vertebræ exortum, ad radicem processus mammillaris cum secundo junctum, occipitio (Q) aligatur.	e	Scapulæ spina.
F	Secundi caput extendentium musculi, sub primo latentis pars elatior, nonnihil eminens.	f	Summus humerus, sive acromion.
G H I	Primus thoracem extendentium, sive Dorsi longissimus, perbelle in suo situ utrinque conspicuus.	g h i	Basis scapulæ, sed & duo anguli, ex quibus g superior h inferior est.
G G	Principium ipsius, ex ossi sacri (R) spinæ summo, secundum ipsius longitudinem, & ex spinis quinque vertebrarum lumborum (SS.)	l m	Duæ costæ scapulæ, l superior, m inferior est.
		N	Musculi quidam humero dicati, scapulam occupantes.
		O O O	Costæ quædam inferiores.
		P P	Musculi intercostales.
		Q	Occipitium, cui caput extendentes musculi inferri.
		R	Ossis sacri, ejusque spinarum regio.
		S S	Adumbratur regio quinque spinarum vertebrarum lumborum (SS.)
		T	Ossa ilium musculis adhuc recta, sed curvæ (V) denudata.
		V	Cutis, quæ ossa ilium, (T) infimamque dorsi sedem cõtegebat, detracta.

TAB. IV



LIBRI QVARTI


TABVLÆ V EXPLICATIO.

O Stenfos hactenus capitis musculos, ut in sua sede occurrunt, anatomico artificio nunc explicatos extra situm exhibet, simul nonnullos ipsi subiacentes demonstrare aggreditur. Primum quoque thoracem extendentium eodem pacto evolutum, distinctè proponit: secundum autem thoracis, & lumborum tensorem, in suo adhuc situ jacentes representat.

- A A Primum par caput extendentium, sive Triangulare, aut Splenium eleganter evolutum, ut ejus interna facies, & anfulæ, ex costis thoracis enatæ, conspiciantur.
- a a a Anfulæ illæ singulari artificio expressæ.
- B B Secundus caput extendentium, Trigeminus, in situ.
- C Idem extra situm.
- D D Primus cervicem extendentium in suo situ cernitur.
- E Tertius caput extendentium, sive Rectus major, in situ.
- F Circumagentium caput primum, sive Obliquorum superior, nonnihil in situ conspicuus.
- G Circumagentium caput secundus, sive Obliquus inferior, in sua sede.
- H H I Primus thoracem extendentium, sive Dorsi longissimus, extra situm, ubi interior ejus facies, & anfulæ (æ.æ.æ.) optimè exprimuntur.
- æ æ æ Idem totus extra situm, à suo principio dependens.
- K K Secundum par thoracem extendentium, semispinatum dictum, in suo situ.

- c c Principium horum musculorum ad infimam thoracis vertebram enatum.
- d Finis eorundem ad supremam, sive primam thoracis vertebram pertinens.
- e e e Duodecim thoracis vertebræ.
- L M N Extensor lumborum, sive lacer, in suo situ.
- L M Ipsi principium.
- N N Finis ejusdem in ultima thoracis vertebra.
- O Scapula à musculis liberata.
- f Spinæ scapulæ.
- g Summus humerus, sive Acromium, quod vide ut incumbit ipsi ossi humeri.
- h Superior Scapulæ angulus.
- i Inferior Scapulæ angulus.
- P P Scapulam occupantes muscoli, qui humerum circumgunt.
- Q Q Musculi intercostales.
- i 2 3 4 Costæ duodecim numeris sui ordinis designatæ, ut ex qua costæ musculi oriuntur conspicuum fiat.
- R R Flectentes lumbos Spigeli, aliis Quadrati dorsi vocati.
- l Principium ipsorum ab interiore sede spinæ ossis ilium.
- m Finis inferiori duodecimæ costæ regioni implantatus.
- S Occipitium, cui caput extendentes muscoli inferuntur.
- T Os humeri à musculis suis denuatum.
- V Os ilium, cui muscoli Glutæi nondum separati incumbunt.
- X Spina, sive appendix ossis ilium.

TAB. V.



LIBRI QVARTI TABVLÆ VI EXPLICATIO.

C <i>Apud morientium musculorum qui restant, demonstratio absolvitur: Semispinatus autem dorsi, & Sacer lumborum tensor, in suo situ nonnihil explicatus exhibetur.</i>		K L M Lumborum tensor, Sacer dictus, in suo situ nonnihil latus.
A Secundus caput extendentium, extrà situm.		K L Principium ejus, circa ossis sacri externam partem, ipsi spina cum ilium osse connascitur.
B B Primus cervicem extendens in suo loco, nonnihil evolutus.		M Ejusdem finis acutus, ad duodecimæ Thoracis vertebrae spinam.
a a a Transversi processus vertebrarum thoracis, à quibus an- sulis quibusdam nascitur.		æ Ansulæ quibus adnectitur vertebrae lumborum.
C C Tertium par caput extendentium (sive Recti majores) totum in suo situ conspicuum, cujus principium à spina secundæ vertebrae, nascitur.		N N Ossa ilium, à musculus sibi adnatis denudata.
D D Quartum par caput extendentium (sive Recti minores) ex parte, in situ tamen suo, conspicuum, cujus principium à tuberculo posteriore primæ cervicis vertebrae, spinæ aliarum analogo, f.		O O Scapularum ossa similiter à suis musculis libera.
E E Primum par caput circumagentium, sive Obliqui superiores, in situ.		P P Flectentes Lumbos Spigeli; aliis, Quadrati dorsi.
F F Secundum par caput circumagentium, sive Obliqui inferiores, in situ.		c c Origo eorum circa ossis ilium sedem elatiorem.
G H I Secundus thoracem extendentium, sive Semispinatus, in suo situ.		d d Inferio circa inferiorem duodecimæ costæ partem.
H Ejus principium ab ultima thoracis vertebra enatum.		Q Os sacrum.
I Ejusdem finis, insertus primæ thoracis vertebrae.		R Os coccygis.
b b b Spinæ vertebrarum thoracis, quibus ansulis suis hic musculus G. H. I. alligatur.		S S Ligamentum primum os sacrum cum coxendice gens.
		T T Ossa coxendicis.
		V V Ossa pubis.
		X X Foramina ossium pubis.
		Y Y Brachii ossa nuda à suis carnibus.
		Z Z Crurum ossa similiter liberata à partibus adnexis.
		1, 2, &c. Duodecim costæ Thoracis.
		e Spina secundæ cervicis vertebrae.
		f Tuberculum posterius primæ cervicis vertebrae, spinæ aliarum vertebrarum analogum.
		g Connexio ossis sacri cum osse ilium.

TAB. VI.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ VII EXPLICATIO.

O <i>Omibus, caput, thoracem, ac lambos extendentibus musculis, finem imponit.</i>		b	Finis eorundem ad primam thoracis vertebram.
A A	Tertium par caput extendentium, (sive Recti majores) extra situm dependens, ut quartum par huic subiacens (B B) integrum cernatur.	c c	Duodecim thoracis vertebrarum processus posteriores sive spinæ.
B B	Quartum par (sive Recti minores) integrè in situ conspiciui.	G G	Lumborum tensor, Sacer cognominatus, extra nonnihil ductus.
C	Circumagentium caput primum par, sive obliqui superiores, in situ.	d d	Ansulæ, quibus annectitur vertebris lumborum.
D D	Circumagentium caput secundum par, sive Obliqui inferiores. Ex his dexter in situ totus cernitur, sinister extra situm.	H H	Ossa ilium.
E	Quidam capitis ac cervicis musculi dissecti, nec sat bene evoluti.	e e	Spina, sive appendix ossis ilium.
F F	Secundum par thoracem extendentium, (sive semispinati, non nihil extra situm moti, in quibus eleganter ansulæ (æ æ) exprimuntur.	I I	Ossa scapularum.
æ æ		L	Ossa sacrum.
a a	Principiuta horum musculorum ad infimam thoracis vertebram.	M	Ossa coccygis.
		N N	Ossa coxendicis.
		O	Ossa pubis.
		P P	Foramina ossium pubis.
		Q Q	Ligamentum, os sacrum coxendicis ossi conjungens.
		R R	Flectentes Lumbos, Spigellii.
		f f	Principium horum.
		g g	Finis eorundem.
		1 2 3 4	Duodecim costæ.
		&c.	


TAB. VII.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ VIII ENODATIO.

		P ost Capitis ac Thoracis musculos, quinque tabulis, quinque musculorum abdominis paria nunc demonstrantur, in quibus in primis nervorum insertiones, ac fibrarum ductus, elegantissime exprimuntur. Ex his praesens, quae octava numero est, dextrum oblique descendendum in naturali suo situ representat, tanquam eum, qui ablati communibus integumentis primus se offerre solet.	
A A A	Refectis communibus integumentis à claviculis ad inguina usque hoc loco segmentum cutis in thorace relictæ proponitur.	K K K	Hic definit carnosa hujus musculi moles, incipit autem hujus musculi.
B	Portio abducentis humerum latissimi musculi, quem vulgo Aniscliptorem appellant.	b b	Tendo, qui usque in lineam candidam expanditur.
C	Ejusdem abducentis humerum alia portio, nonnihil ad ostendendum ductum suarum fibrarum inverla.	L L L	Tendo oblique descendens, supra rectos abdominis musculos, ad lineam candidam excurrentem, quem videtur ut artificiosè expressus est, quò subjacentes recti musculi, & eorum interfectiones transparentes conspiciuntur.
D	Humerum abducentis, Pectoralis dictus, in suo situ, in dextra parte totus conspicuus.	M M M	Linea candida vocata, in quam hic Tendo inferitur.
E	Hujus locius in sinistro latere, ex parte conspicuus.	NNNN	Interfectiones rectorum musculorum, quarum datur pra, una infra umbilicum (O) conspicuae sunt, hoc loco per tendinem obliquum eluentes.
F F	Quinti Scapulæ musculi, quem Serratum majorem appellant, portio. In hoc digitatus ille à costis exortus elegantissimè perspicitur.	O	Umbilicus, circa quem tendines musculorum tum quorum tum transverforum perforati sunt.
G H I K	Primus musculorum abdominis, quem ab obliquo fibrarum processu, oblique descendente vocant, in suo situ pulchrè expressus.	P P	Ossis ilium spina, sive appendix, à qua portio tertia oblique descendens (II) enascitur.
L M	Principium hujus musculi carnosum, è parte inferna costæ sextæ, septimæ, octavæ, & nonæ enatum, ac pectinatim (a a a) cum serrato majore connexum.	Q Q	Capita aliquot musculorum tibiae moventium, quæ eminent.
a a a a	H Pars altera principii ejusdem musculi, quæ à ligamento è transversis processibus vertebrarum lumborum enata, exoritur.	R	Glandulæ inguinales, quæ in lue venerea foleat intumescere, unde Bubones veneri dicuntur.
I	Pars tertia principii, quæ à dimidia ossis ilium appendice, sive spina, egreditur.	S S	Foramen in oblique descendente musculi tendine, quod processus peritonæi & in his contenta vasa spermatica utrinque prodeunt.
* N	Nervosa est illa exilitas musculi pectoralis, quæ sæpe describitur: cum verò adest, adnascitur foris principii hujus musculi.	T	Corpus penis.
		V V	Productiones duæ, seu processus peritonæi, vasa spermatica circum vestientes, ex abdomine in scrotum descendentes. Hæ sunt illæ, quibus dilatatis aut ruptis herniæ contingunt.
		X X	Cutis quæ summum crus investiebat, hoc loco reflexa



LIBRI QVARTI

TABVLÆ IX DECLARATIO.

O *Bligne descendente abdominis musculum, præcedente figura in suo situ exhibitum, præsens extra situm, & non nisi suo principio corpori adherentem, proponit, ut ejus interna facies conspiciatur. Præter hunc Oblique ascendente in dextro latere demonstrat, ejusque verum situm perbelle exprimit.*

- AAAA** Oblique descendente musculi, extra suum situm remoti, principium, in quo accurata elegantia plurium nervorum insertio (contra quorundam Authorum opinionem) ostenditur, & fibrarum obliquus ductus innuatur.
- B B B** Corpora costarum.
- 1. 2. 3.** Nervi qui sub singulis costis in oblique descendente musculum distribuendi egrediuntur.
- 4.**
- C C C** Pars carnea, sive Venter oblique descendente musculi hic definit, incipit autem ejusdem tendo, sive finis membraneus.
- D** Foramen in tendine hujus musculi, per quod vasa spermatica in testes, & scrotum transmittuntur.
- E E** Musculus Oblique ascendens, in suo situ, cujus fibras ad superiora excurrentes sculptor quam optime insinuat.
- F F** Principium carnosum oblique ascendente musculorum,

ab ossis ilii spina, sive appendice, (G.G.) enatum.

- G G** Spina, sive appendix illa ossis ilium, à cujus interna sede pars hujus musculi exoritur.
- a a** Fibræ oblique ascendente musculi sursum excurrentes.
- H H H** Linea semilunaris à Spigelio dicta, circa quam tendines obliquorum abdominis musculorum incipiunt.
- I I I** Recti musculi, sub tendinibus musculi oblique ascendente transparentes. Hic tamen his characteribus ipsorum carnea pars potissimum insignita cernitur.
- b b b** Intersecciones musculorum rectorum, ex quibus duæ supra umbilicum **N** reperiuntur, una, infra.
- K K** Productiones peritonæi vasa spermatica involventes, & in scrotum (P.P.) descendentes.
- L L** Perforationes, ut prius in Descendente musculi tendine, sic hic in Ascendente, & Recti fine cernuntur, ad vasorum spermaticorum egressum.
- M** Glandulæ inguinis hic omnino nudæ ac detectæ.
- N** Umbilicus.
- O O** Linea candida abdominis.
- P P** Scrotum.
- Q** Penis, sive Mentula.
- 9. 10. 11. 12.** Inferiores quatuor costæ, ex quibus duæ infimæ finem obliquorum ascendente musculorum suscipiunt.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ X ENODATIO.

- R** *Efflos & Pyramidales abdominis musculos, una cum oblique ascendentibus, in suo proprio situ positos, ad verum exprimit.*
- A A** Cutis cum pinguedine hoc loco resecta & elevata.
- B** Musculus pectoralis ex infima parte, sublata cute, in suo situ conspicuus.
- C** Extremitas pectoralis revoluta, ut recti muscoli, sub ipso latentis, summum principium rectius appareat.
- DDDD** Recti abdominis musculi, in suo situ, quorum carnosæ moles potissimum his literis insignita est.
- a a b b** Duo extrema horum musculorum, ex quibus a inferius est; b, superius.
- EEEE** Intersecciones rectorum musculorum, ex quibus duæ supra, una infra Vmbilicum (G) est.
- F F F** Linea candida, in qua distantia musculorum rectorum inter se notanda, infra, quam supra Vmbilicum, minor.
- G** Vmbilicus, in quem musculorum Pyramidalium tendo (d) huc usque interdum ascendens, inseritur.

- H** Locus in quo Pyramidalium musculorum tendo (d) plerumque desinere, & in transverforum tendinem implantari consuevit.
- II** Musculi Pyramidales.
- c** Principium eorum, quod ab externo pubis offe oritur.
- d** Tendo musculorum pyramidalium.
- K K** Productiones peritonæi, cum vasibus spermaticis, quæ in se continent, ad scrotum (Q, Q) descendentes.
- L L L L** Musculi oblique ascendentes, in suo situ conspicui.
- M M** Tendinis oblique ascendentis ea pars, quæ rectum musculum integebat, hic ab eo separata, & retrorsum reflexa ostenditur.
- NNN** In sinistro ascendente musculo tendo hic amputatus est.
- O O** Spina ossis ilium, unde oblique ascendentes enascuntur.
- P P** Musculi intercostales.
- Q Q** Scrotum.
- R** Musculi quidam ilium ossibus infrati.
- S** Ossa pubis.
- 8. 9. 10.** Quinque inferiores costæ.
- 11. 12.**


TAB. X.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XI EXPOSITIO.

<p>A Abdominis Oblique ascendentem, & Rectum dextri lateris musciculum extra suum locum remotos demonstrat, ut interna ipsorum facies nunc conspiciatur: simul Transversos ejusdem musculos, tum portionem peritonæi, ut in suo adhuc situ jacent, proponit.</p>	<p>N Exprimitur anastomosis illa notatu dignissima, quam vasa mammaria & epigastrica coeuntia hoc loco, invicem constituunt.</p>
<p>A A Musculi oblique ascendentis in altum extra suam sedem sublatis interior facies carnosæ.</p>	<p>O O O Ramuli harum venarum, quæ in subditas partes distribuantur.</p>
<p>B B Ejusdem musculi tendo, antequam ad rectos perveniat.</p>	<p>P P Earundem arteriarum soboles eodem tendentes.</p>
<p>C C D D Duplicatura tendinis modo dicti: cujus ea pars, quæ lictens D D, signata est, interiorem partem Recti musculi: ea vero, quæ C C pro signo habet, & revoluta est, exteriorem vestiebat.</p>	<p>Q Q Q Musculus transversalis abdominis in utroque latere in situ conspicuus.</p>
<p>E E Musculi pectoralis extremitas, una cum cute inversa.</p>	<p>R R R Dextri transversalis extrema portio, supernè (R) adhuc carnosæ, infernè (R R) jam in tendinem mutata.</p>
<p>F Cartilago ensiformis.</p>	<p>S S S Peritonæi tunica, quam intestina his locis attollunt, & inæqualem reddunt.</p>
<p>G H Vasa mammaria dicta, quæ à mammis sub sterno descendunt, & ad latera cartilaginis ensiformis egressa, per Rectos abdominis musculos excurrunt, G denorat venam; H verò arteriam.</p>	<p>T T Musculi Pyramidales in suo utrinque situ, b Tendo musculorum pyramidalium.</p>
<p>I I I I Rectus musculus in dextro latere è suo situ remotus, ut ejus interna facies conspiciatur.</p>	<p>V Designatur locus, circa quem ut plurimùm tendo hic finitur, nonnunquam tamen, (quemadmodum & hic expressum id est,) ad umbilicum usque ascendit.</p>
<p>K K K K Rectus musculus sinistri lateris, situm suum adhuc tenens.</p>	<p>X Umbilicus.</p>
<p>L M Intersecciones musculorum rectorum.</p>	<p>Y Y Spina, sive appendix ossis ilium.</p>
<p>a Rami Iliaci, tum Venæ cavæ, tum Arteriæ aortæ, à quibus propagines duæ prodeunt, (quas epigastricas appellant) per Rectorum musculorum internam faciem ascendentes, quæ mammariis obviam progrediuntur, & sic invicem anastomosis (N) faciunt, L. arteria est, M vena.</p>	<p>Z Z Testiculi, scrotum, & cæteris involucris exempti, à vasis spermaticis dependentes.</p> <p>c c Foramina tendinum musculorum abdominis, per quæ vasa spermatica ad testes vadunt.</p> <p>d d Productiones peritonæi vasa spermatica ad testes deducentes.</p> <p>e e e Costæ thoracis.</p> <p>f f Cutis ab infimi ventris sede abscissa, & dependens.</p>



LIBRI QVARTI


TABVLÆ XII EXPOSITIO.

Transversorum abdominis musculorum utramque faciem, tam eam quæ foris cernitur quam quæ intus latet, in conspectum proferit: magnam quoque Peritonæi partem proponit, & ea, quæ de rectis musculis reliqua erant demonstranda, absolvit.

- A A A Rectorum musculorum, inferiore suo extremo, C, à corpore dependentium, interior facies.
 B Alter rectorum dimidia parte abscissus.
 C Recti musculi inferius extremum, pubis ossi adhuc adherens, circa quod egregiè Vena & Arteria ex iliakis ramis in hos musculos derivata, cernitur.
 a b Vasa mammaria, quæ à pectore musculis rectis tribuuntur, a Vena est: b Arteria.
 c d Vasa epigastrica, à ramo iliaco orta, ex his c Venam: d Arteriam significat.
 D Conjunctio Valorum à mammaris & ramis iliakis prodeuntium, quales in maribus ut plurimum semper esse consuevit.
 E E E Pyramidales musculi abscisso tendine, à suo fine, ad ima reflexi, dependent.
 F F F F Totus transversalis musculus in suo situ adhuc positus, cuius externa facies, & transversæ fibræ admodum pulchrè videntur.
 e e Principium ejus primum, nervum ac membranosum, à ligamento è transversis vertebrarum lumborum pro-

- cessibus enato, exortum.
 f f Principium ejusdem secundum, carnosum, ab interioribus costarum notharum finibus educum.
 g g Tendo ejusdem peritonæo adnatus.
 G G G Nervi, quos Spinalis medulla transverso musculo imperit, hic quamoptimè expressi.
 H H H Propagines Venæ & Arteriæ rectorum musculorum, quæ transverso musculo transmittuntur, hoc loco, ob illorum remotionem necessariò abscissæ.
 I I I Idem transversus musculus extra situm ad latus tenditur, ut interior ejus structura pateat, in hoc similiter nervi G G expressi sunt.
 h h Tendo ejusdem musculi transversus extra situm locati.
 K K K Pars peritonæi, cui transversalis hic musculus immediatè adhærit.
 L Umbilicus.
 M M M Reliquæ linæ candidæ, in quam tendines utriusque lateris musculorum concurrentes, uniti inferebantur.
 N N N Costæ.
 O O O Musculi intercostales.
 P P P Segmentum partium costas integumentum.
 Q Spina ossis ilium.
 R Musculi quidam ossibus ilium adnati, indistinctè conspiciuntur.
 S Os pectoris, sive sternum.
 T Cutis, à partibus subjacentibus liberata, & à corpore dependens.

TAB. XII.




LIBRI QVARTI

TABVLÆ XIII DECLARATIO.

<i>D</i> iaphragma in suo seu proponitur, tum ossa, ac musculi, qui exemptis Visceribus, & intestinis, in imo ventre sub aspectum venire solent, simul omnes depicti ostenduntur.		I	Vnio duorum processuum G.G., & insertio in lumborum vertebra.
A α β	Ostenditur connexio Diaphragmatis. Anteriùs enim alligatur cartilagini ensiformi A: à lateribus, costarum spuriarum extremis, & toti duodecimæ costæ, α: posterius, undecimæ dorsi vertebræ. β	K K	Vasa phrenica, per diaphragma ab arteria magna, & vena cava dispersa.
α		L	Nervi à spinali medulla cervicis per diaphragma diminuti.
β		M M	Primum par musculorum scemur flectentium, quos Lumbales Anatomici vocant, Hippocrates ψέας.
B B	Circulus nerveus, qui Diaphragmatis principium est.	b c	Principium horum b. Finis, c.
a a	Fibræ ad circumferentiam excurrentes.	N N	Flectentes lumbos Spigeli, aliis Quadrati dorsi vocati.
C C	Circulus carneus diaphragmatis, qui circumcirca thoraci adnascitur.	d d	Principium eorum à spina (S) ossis ilium, (P)
D	Centrum Diaphragmatis.	e e	Finis eorumdem inferiori duodecimæ costæ sedi implantatus.
E	Foramen dextrum, per quod Vena cava ascendit.	O O	Os sacrum cum suis Vertebis.
F	Foramen sinistrum, dextro majus & posterius, quod Oesophago cum duobus nervis ad ventriculum descendenti, transitum præbet.	P P	Costa, siue interna cavitas ossium ilium.
G G	Processus duo diaphragmatis carnosus, hinc inde ad vertebrarum corpora inserti, per quorum medium arteria magna, & vena sine pari excurrunt.	Q Q	Ossa coxendicis, quibus caput femoris infernè connectitur.
H	Arteriæ magnæ truncus.	R	Ossa pubis, non omnino à cute libera.
		S S	Spina, siue appendix ossium ilii.
		T	Cavitas illa, ab Anatomicis Pelvis dicta, in qua vesica uteris sedem suam habent.
		V V	Lumbi.

TAB. XIII.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XIV EXPLICATIO.

Prima hæc est Tabula earum, quæ musculos ad Artus pertinentes demonstrant. Exhibet autem aliquot, sed in primis primum, secundum, & tertium Scapulæ musculum.

A A A Primus scapulæ musculus, Cucullaris dictus, in suo situ: a, b. primum ipsius latus est in occipitio, transversum: b. d. secundum, per spinam repens, adnatum omnibus colli, & octo superiorum thoracis spinis: a. c. tertium, quod per summum humerum descendit: c. d. quartum latus.

æ æ Fibrae, ex quibus æ rectas, æ æ obliquas denotat, partim ascendentes, partim descendentes.

B B Hujus musculi socius, in dextro latere extra situm positus, ut ejus interior facies compareat. In hoc notandus est Venter, his iisdem (B. B.) literis notatus, qui compluribus diversis fibris constat.

e e e Membranosum ipsius principium quam optime ostenditur.

f Tendo, & finis hujus musculi, qui in scapulam inferitur.

C Secundus scapulæ musculus, Levator dictus, à Spigelio patientiæ musculus. Hujus hic ventrem & inferionem nota: in decima septima verò figura (A) capita sigillatim è vertebra enata conspicies.

g Hujus musculi principium nondum evolutum.

h Ejusdem tendo, qui in superiorem scapulæ angulum (o) definit.

D D Tertius musculus scapulæ, Rhomboides dictus, cujus hic omnes partes, præter principium, apparent, quod tamen decima septima tabula distinctè patebit.

E F F Musculi quidam humeri, scapulæ incumbentes, hic indistinctè ostenduntur. E supericapularis superior: FF, inferior dicitur.

GGG Tertius humeri musculus abducens, sive Latissimus, & Aniscliptor vocatus, in situ suo positus, maximeque secundum principium & ventrem conspicuus.

H H Cutis, quæ dorsum tegebat, dependens.

I Musculi quidam caput extendentes, adhuc indistincti.

L Scapulæ spina.

M Pars spinæ scapulæ ea, quæ supra humerum fertur, & Acromion, vel summus humerus dicitur.


N Basis scapulæ.

O P Duo basis scapulæ anguli, ex quibus O superior est, P inferior.

Q Musculi primi cubitum extendentis, nonnulla portio.

R R Portio musculi tertii humerum abducantis, à primo scapulæ musculo. A. A. A. non tecta.

TAB. XIV.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XV EXPLICATIO.

Q <i>Quartum scapulae, & duos priores humeri musculos continet.</i>		L Primum caput hujus musculi, adhuc in suo canali delitescens.
A Quartus scapulae musculus, Abducens, in suo situ.		f g Ligamentum, quod osseo isti humeri canali obductum erat, ad primi capitis tutelam, in longum hic discissum, ut ipsum principium in canali positum cernatur.
a π Principium ipsius à secunda, tertia, quarta, & quinta costa.		M Venter Bicipitis cubiti musculi, hoc loco eminens.
α Tendo ejusdem, qui juxta processum ancoriformem scapulae implantatur.		NNN Alii cubiti musculi hoc loco detecti, omnes tamen in suo situ jacentes, sequentibus figuris explicandi.
B Primus humeri musculus, Adducens, sive Pectoralis, in suo situ existens.		O Dimidium claviculae, qua parte latior est.
a b c Fibræ ipsius diversæ, ex quibus a, ascendentes: b descendentes: & c, transversas, a tribus veluti principis exortas, demonstrat.		PPP Costæ veræ ea parte, qua in cartilagine singulae desinunt, conspicuæ.
C Dimidium scapulae, à qua pectoralis musculus parte superiore exoritur.		QQ Duo Recti abdominis musculi in suo situ.
DD Sterni extremitates, à quibus idem parte inferiore ortum trahit.		† † † intersectiones nervosæ rectorum. Sed nota expressas hic esse quatuor, ut solent inveniri quandoque in his, quibus est longus venter, cum alias tres tantum efficerent.
d Tendo ejusdem musculi, quem vide, ut inter Deltoidem (FFF) & Bicipitem (V) implantatur.		R Pars sinistri musculi Recti abdominis, elevata & reflexa, quæ primo humeri musculo incubuerat,
E E Idem musculus extra litum, tendine suo humero adhærens.		SSS Musculi intercostales.
F F F Secundus humeri musculus attollens, Deltoides, & Deltiformis dictus, qui hic in situ suo conspicitur.		T T Humeri os denudatum.
c Tendo ejusdem ossis humeri (T) medio, insertus.		h Sedes ea ossis humeri, circa quam musculi, ipsius motibus rectis dicati, inferuntur.
G Claviculae anterior pars, ad quam hic musculus non pervenit.		V Primus cubitum flectentium, Biceps, (in sinistro latere literis L. M. demonstratus,) nonnihil extra suum situm positus, representatur.
H H Idem musculus, sed extra situm, in quo notandæ sunt fibræ carneæ his literis designatæ.		i l Geminum ipsius caput i, primum est: l, secundum.
I Tendo hujus musculi brevis, sed rotundus.		m Finis ejusdem tendineus.
K Vena, Cephalica dicta, per has partes descendens, ob quam inter hunc secundum humeri musculum, & primum cubiti, fonticuli à Medicis inauruntur.		X Secundus cubitum flectentium, Brachii dictus, in sua sede.
L M Primus cubitum flectentium, Biceps dictus, in suo situ.		n Principium ejus circa ossis humeri sedem (h,) in quam tendines musculorum humeri desinunt.
		Y Primi cubitum extendentium nonnulla portio.
		Z Secundi cubitum extendentium quædam portio.
		o Umbilicus.

TAB. XV.



LIBRI QVARTI TABVLÆ XVI ENODATIO.

T <i>Ertium humeri musculum, sive abducentem & Latissimum ostendit: obiter tamen eleganter, primum per Scapulæ, Cucullare dictum, in suo situ demonstratur.</i>		F Tendo ipse humerum petens, jam jam ipsi inferendus.	
AAAB Primus scapulæ musculus Cucullaris, in suo situ utrinque eleganter expressus.		GGG Musculi quidam humorum circumagentes à scapula oriundi.	
B Ejusdem musculi in scapulam tendinosa insertio.		HHH Cutis à tergo & pectore excoriata, dependens.	
a b c Triplix hujus musculi fibræ, ex quibus a descendentes: b transversæ, c ascendentes denotat.		I Musculi nonnulli cruris hic ex parte denudati.	
C C D Tertius humeri musculus, abducens, sive Latissimus, qui hic in situ suo oppido quam bene effiguratus cernitur.		K Spina ossis ilium.	
C C Principium hujus musculi.		L Occipitium.	
D Locus ubi tendo ipsius exoritur.		MNO Scapulæ basis.	
E E E Pinæ ejusdem, quibus cum oblique descendente abdominis musculo jungitur.		M Angulus scapulæ superior.	
		O Angulus scapulæ inferior.	
		P Quartus scapulæ musculus extra situm dependens.	
		Q Musculi quidam capitis motui inservientes, adhuc indistincti.	
		R Cutis collum integens.	

TAB. XVI



LIBRI QVARTI TABVLÆ XVII DECLARATIO.

Continet quartum, quintum, & sextum humeri musculum. Item secundum, & tertium scapulæ paulo explicatius, quam Tabulæ superiores; tum cum, cuius inventionem Placentinus sibi tribuebat, & octavum humeri faciebat.

- A Secundus scapulæ musculus, Levator dictus, è situ proprio remotus, & à scapula, cui inferitur, abicissus, ut ejus principium evidentius compareat.
- 1 2 3 4 Principia quatuor hujus musculi.
- B B Tertius scapulæ musculus, Rhomboides, utrinque in suo situ totus conspicuus.
- CCCC Spinæ vertebrarum, à quibus Rhomboides oritur. Sunt autem tres inferiorum colli, totidemque superiorum thoracis.
- D D Basis scapulæ in quam idem inferitur.
- E Quartus humeri musculus, Rotundus, extra situm quidem, sed utrinque adhuc suis partibus hærens, cujus principium æ.
- F Quintus humeri musculus, sive Superfascularis superior, in situ.
- G Sextus humeri musculus, sive Superfascularis inferior, similiter in situ.
- a Musculus peculiaris, à nemine adhuc annotatus, cujus inventionem Placentinus sibi tribuebat, octavum humeri musculum constituens. Est autem totus carnosus, principio acuto, ex infimo scapulæ angulo enascens,

qui postea magis magisque ad medium usque ventrem crassescit: inde verò sensim gracilescens, acuto item fine in ligamentum, quo humeri caput obvolutum est, desinit. Hic in sinistro latere (a) in suo situ est: at in dextro (b) extra situm remotus.

- b Caput dextri humeri.
- H Scapula dextra, à qua omnes musculi remoti sunt, nuda comparcet.
- I I Spina Scapulæ.
- K K Summus humerus.
- c Superior scapulæ angulus.
- d Inferior scapulæ angulus.
- e Quintus humeri musculus extra situm.
- L Sextus humeri musculus extra situm.
- M Tertius humeri musculus abducens, extra situm.
- NN Ipsius principium latissimum membranosum.
- O Pinnæ quibus hic musculus cum musculo abdominis obliquo descendente jungitur.
- Q Finis, sive tendo ejusdem musculi, qui humero inferitur.
- R R Musculi quidam humero circumpositi.
- S S Musculi caput extendentes, in situ adhuc indistincti.
- T Primus cubitum extendentium nonnihil extra situm.
- V Os humeri.
- X X Cutis à dorso detracta.
- Y Y Membrana musculorum dorsum contegentium crassiuscula nonnihil.
- Z Clavicula, quæ summo humero c. annectitur,

TAB. XVII.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XVIII DILVCIDATIO.

C *mplures, ac diversos musculos Tabula hæc demonstrat. Septimum inquam humeri, Subscapulare dictum, quintum scapulæ, sive Serratum majorem, Subclavium, & Intercostales.*

- A B** Costa inferior scapulæ, à thorace & costis nonnihil elevata, ut musculus in cavitate scapularum latens, conspicitur.
- C C** Septimus humeri musculus, Subscapularis, totam scapulæ cavitatem, quæ costas respicit, adimplens.
- D D** Quintus scapulæ musculus, Serratus major vocatus, in quo fibræ ipsius (a. a. a. a. a.) ad similitudinem dentium serræ pectinatum spectant, à quibus etiam cognomen invenit, diligenter observandæ.
- b b** Scapulæ basis interior, cui serratus major inferitur.
- E** Quartus Scapulæ Adducens, sive Serratus minor, extrorsum conspicuus.

- F** Musculus Subclavius.
- c d** Hujus principium c, in prima costa est; d, finis in clavicula.
- G** Clavicula.
- HHHH** Costarum partes ossæ.
- 1. 2. &c.** Numeri costarum ordinem edocentes, ut à quibus serratus major exoritur, statim clarum fiat. Indiscriptum autem in ipsam intersectionem, ubi ossæ costarum pars H.H. cum cartilaginea I. I. jungitur.
- I I I I** Costarum partes cartilagines.
- KKKK** Musculi intercostales externi.
- L** Cutis à thorace separata dependens.
- M M** Sternum, sive os pectoris.
- N** Musculi cubitum flectentes, adhuc in suo situ, indistincti proponuntur.
- O** Summus humerus, cujus cum Clavicula Articulatio notanda.



LIBRI QVARTI


TABVLÆ XIX EXPLANATIO.

Quatuor cubiti musculos, tum eum, cujus inventionem Placentinus sibi vendicabat, nonnum humeri consiliuens, continet.

- A A Partes cutis quæ thoracem tegebant.
 B B B Costæ.
 a a a Musculi intercostales.
 C C Os pectoris sive Sternum.
 D D Claviculæ.
 E E Nervi à collo ad brachium descendentes, hoc loco abscissi sunt.
 F Processus ancoriformis scapulæ, à quo primus cubitum flectentium, Biceps vocatus, nascitur.
 b Sammus humerus.
 c Sinus scapulæ, humeri caput excipiens, à cujus elatiore supercilio primum, primi cubitum flectentium, (G) caput (H) nascitur.
 G Primus cubitum flectentium sinistri lateris, Biceps appellatus, quod gemino distincto capite, sive principio à scapula prodeat, in suo situ conspicuus.
 H Primum principium, sive caput Bicipitis, tendineum ac teres, quod à superiore acetabuli scapulæ supercilio enatum, fissuram in humeri osse, ejus gratia exsculptam, transit.
 d d Vide ut eleganter hoc loco sculptor ligamenta articuli humeri, & potissimum initum primi hujus capit, (H) sub ipsis descendens, & nonnihil transparent, inter duos hos characteres medio intervallo expresserit.
 e e Duo labia discessi illius ligamenti, quod ad tutelam hujus principii, fissuræ ossis humeri, sive canali, adnatum erat.
 I Alterum caput Bicipitis, priore latius, partim ex carne, partim ex tendine consistans, à processu ancoriformi (F) ortum.
 K Concurfus duorum capitum, ubi ventrem Bicipitis (G) efformant.
 f Tendo musculi Bicipitis, qui ab imperitis Chirurgis in Venæ sectione sæpè periculose vulneratur.
 L Interior secundi cubitum flectentium musculi extremitas, nonnihil eminens.
 M M Principia interiorum cubiti musculorū, ex parte detecta.
 N Portio carnosa, cujus mentio à Spigelio in historia Bicipitis facta est: quam Placentinus hujus Tabulæ auctor, pro peculiari musculo habuit, nonnumque humeri con-

- stituit, Perforatum appellans. Voluit enim oriri hunc ab scapulæ processu ancoriformi (F) & juxta Deltoidæ tendinem, & in humerum internum circa medium implantari. Principium (g) ipsi esse nervosum & breve ventrem (N) oblongum, satique corpulentum: tendinem denique (h) validum & robustum. Cæterum ejus venter (N) perforatus est, pro transitu nervi (O) qui ad cubiti mulculos distribuuntur, largiendo. Musculus hic in utroque latere littera N insignitus invenitur, sed in dextro latere distinctè cernitur, at extra situm: in sinistro autem, qualiter se in dissectionibus, antequam separatus est, offerre consuevit.
 O Nervus per dicti musculi ventrem transiens.
 P Primus cubitum flectentium, Biceps musculus, ex suo loco in dextro brachio in sublime nonnihil elevatus.
 i I Geminum ipsius principium, sive caput, i primum est, secundum.
 m Ejusdem tendo nervosus.
 Q Propago nervi quam musculus hic ad motum accepit.
 R Secundus cubitum flectentium, Brachialis, in suo situ.
 n Principium ejus carnosum latumque ab ossis humeri capite, cui humerum recto motu cientes musculi implantantur, hoc Tabula XV, littera h notatum invenies.
 o Tendo ejusdem in ulnæ ac radii partem (qua ambo colligantur) anteriorem, & articuli ligamentum, desinens.
 S S Primus cubitum extendentium musculus, deorsum ab humero dependens.
 p q Duo ipsius principia, sive capita, illud nerveum, hoc carnosum est.
 r Ejusdem tendo nerveus in posteriorum processum cubiti, sive olecranon (u) implantatus, sede interna.
 T Secundus cubitum extendentium, in suo situ.
 f Principium ejus nervosum à cervicis humeri sede posteriori.
 t Finis ejusdem in olecrani externam sedem desinens.
 u Processus cubiti posterior, olecranon dictus.
 V Quartus scapulæ musculus, Serratus minor, extra situm.
 X Portio tertii musculi humerum moventium, quem Abducentem ac Latissimum diximus, hoc loco ad humerum tendens.
 Z Quintus scapulæ musculus, Serratus major vocatus, cui musculus abdominis oblique descendens ferratim committitur, principio suo nonnihil conspicuus.

TAB. XVIII



LIBRI QVARTI TABVLÆ XX EXPLICATIO.

Quatuor cubiti musculos, quos præcedens Tabula demonstravit, præfens majori paulum forma depictos, exhibet. Sunt autem omnes extrà situm nonnihil moti, ut eorum origines, & insertiones rectius cernantur.

FIGVRA I.

- A A Scapula dextra ab omni carne libera, haud benè à pictore expressa.
 B Acromion, sive summus humerus.
 C Processus scapulæ ancoriformis.
 a Ligamentum rotundum, quod unum processum cum altero ligat.
 DDD Os humeri, à musculo liberum ac nudum.
 E Caput humeri superius.
 F Caput humeri inferius.
 CHI Primus cubitum flectentium, Biceps, extrà suum locum nonnihil remotus.
 G Primum ejus caput, ab elatiore sede acetabuli scapulæ enatum.
 H Alterum caput ejusdem musculi, à processu ancoriformi exortum.
 I Ejusdem Bicipitis venter carnosus.
 K Tendo ejusdem crassus, teres, ac nerveus.
 L Tuberculum oblongum sub capite superiore radii, in quod hic tendo Bicipitis inseritur.
 MNO Secundus cubitum flectentium musculus, Brachizus dictus, in situ.
 M Principium hujus musculi.
 N Venter ejusdem.
 O Tendo latus ac carnosus, quo in ligamentum articuli, & cubiti radique appendicem, anteriore sede hic musculus implantatur.
 PP Musculus, qui à Placentino inventus est, & pro nono humeri numeratus, cujus historiam in explicatione præcedentis Tabulæ complexi sumus.

- QQQ Nervus, qui hunc musculum transiens, in reliquos distribuitur.
 R R S S Primus cubitum extendens musculus, gemino constans principio, nonnihil extrà sedem naturalem locatus.
 R R Duo ipsius principia.
 S S Ejusdem geminus venter.
 T T Offis cubiti superior pars, inferiore abscissa.
 V V Radii dimidia & superior pars.
 X Ligamentum os cubiti radio connectens, & musculos cubitum occupantes externos ab internalis separans.

FIGVRA II.

- A A Os scapulæ nudum ab omnibus muscularis.
 B Caput humeri superius.
 C Cervix scapulæ.
 D Acromion, seu summus humerus.
 E Primus cubitum flectentium, sive Biceps, extrà situm à suo capitis dependens.
 F F Primus cubitum extendentium.
 G Humeri os.
 H H Vlnæ superior pars inferiore abscissa.
 I Radii superior pars.
 K Ligamentum ulnam radio connectens.
 L Flectentium cubitum secundus, extra sedem, & superiore parte abscissus.

FIGVRA III.

- AB C Musculus à Placentino positus, pro nono humeri numeratus, hic privatim conspicitur.
 A Ejus caput carnosum.
 B Foramen, seu fissura, in hujus musculi ventre, nervis brachii transitum concedens.
 C Tendo teres & nerveus ejusdem.

FIG. I.




FIG. II.



FIG. III.



LIBRI QVARTI TABVLÆ XXI DECLARATIO.

Sequuntur nunc octo tabule, in quibus omnes muscoli, qui tam in cubito quam summa manu locum habent, adumbrantur. In his diligenter animaduersum est, ut quo ordine se consequuntur in dissectione, perspicatur: tum etiam, ut in suo quisque sita, & extra sese offerat, ut non tantum externa ipsius facies, sed interna quoque cernatur. Proponuntur autem primum illi, qui internam culti sedem occupant.

Prima figura, ostendit duos carpum flectentes, & palmare vocatum musculum. Secunda, eisdem carpi musculos representat, sed in primis, cuius gratia potissimum facta est, latum illam tendinem in vola manus, quomodo is interdum carens musculo, à ligamento annulari oritur. In his, elementis utrique figure communibus usi sumus, ut discrimen utriusque curvis nullo negotio innotesceret.

A Pars brachii sinistri paulo suprà cubiti articulum abscissa.

BBB In prima figura, cutis una cum pinguedine, à subiectis musculis internæ faciei cubiti & manus, ad digitos utque detracta, & ad latus reflexa est.

C Internum humeri tuberculum, à quo ferè omnes interni cubiti muscoli oriuntur.

D In prima figura, musculus lati tendinis, Palmaris dictus, depictus ostenditur, quomodo se offerre solet cum à musculosa carne latus tendo originem ducit.

a Principium ipsius ab interno humeri tuberculo.

E Monstratur locus, in quo musculus Palmaris in tendinem degenerat.

F In prima figura designat locum, ubi tendo in membranam latissimam expandi incipit: at in secunda locum, ubi ex annulari ligamento enascitur, cum musculosa carne caret, similiter tamen, ac in aliis, qui musculum habent, in volam totam expanditur.

†† Annulare carpi ligamentum.

b Ipse Tendo latus per totam quasi manum expansus.

GGGG Fines huius lati tendinis, quomodo in radices, & prima digitorum internodia desinunt.

HIK L Quinque digiti, ex quibus H Index est, I Medius, K Annularis, L Minimus, M Pollex.

M

NOOO Representantur duæ partes in vola, quæ tendine lato non integuntur, quarum illa (N) minimus: hæc, (O.O.O.) maximo digito subiacet.

OOOO Flectentes pollicem, ex quibus O flectens primum pollicis internodium (I) est: reliqui, flectentes secundum O. 1. quidem primus, ab osse metacarpii indicem sustinente exortus. O. 2. verò, secundus, ex osse metacarpii medium digitum: O. 3. Tertius, ex osse metacarpii annularem sustinente pronatus.

P Est caro illa quadrata, siue musculus ille parvus, qui ad externum latus lati tendinis inferitur, ut ipsum cum manus aperitur, extendat, cuius finis est c.

c

QQ Flexor secundi digitorum internodii, qui in prima figura leviter conspicitur: at in secunda integer in suo situ, usque ad annulare ligamentum (F) apparet, quia Palmaris, (D.E.) ipsi incumbens, deest.

d Principium huius musculi ab interno humeri tuberculo (C) enatum.

e e Tendo ejus bivaricatus primum, mox in plures discissus.

R R Flexor carpi interior, in suo situ. Hic est ille musculus, qui cubito pulvinaris loco est, & cui, dum scribimus, innititur.

f Principium ejus ex carnea nerveaque substantia mixtum, ab interno humeri tuberculo (C) prodiens.

g h Finis ejusdem, partim carneus, g. partim nervus, h.

i Insertio hujus finis in carpi os quarum primi ordinis.

SS Flexor carpi exterior, in situ.

i Principium ejus ab eodem interno humeri tuberculo enatum.

m Finis ejusdem nervus ac teres, qui à carpo liberatus, in radicem ossis metacarpii, indicem sustinentis, inferitur.

T T Fines musculorum, qui ab humero ad cubitū descendunt.

V V Extensor carpi exterior in suo situ quoquo pacto apparens.


X Secundus, siue teres radii pronator.

n Principium ipsius ab humeri interiore tuberculo.

Y Tertium pollicis internodium flectentis nonnulla portio hic conspicua.

Z Flexoris tertii digitorum internodii portio quædam hic inter alios musculos emens.

I. II. III. Pollicis internodia, primum 1. secundum 11. tertium 111.



LIBRI QVARTI TABVLÆ XXII DILVCIDATIO.

Tabula hæc duas continet figuras, quæ partim quidem musculos, quos præcedens in situ monstrat, extrâ locum positos habent; partim etiam novos quosdam, prioribus subiectos, in conspectum præferunt; imprimis vero sex illos digitorum flexioni dicatos, representant.

FIGVRA I.

- AA Sinistri brachii abscissi, cum cubito & manu, effigies.
 B Internum humeri tuberculum, à quo omnes musculi longi internam cubiti partem occupantes, nascuntur.
 CCC Palmaris musculus extrâ suum situm elevatus, ut ejus interna facies inspiciatur.
 DDDD Flexor secundi digitorum internodii totus ferè detectus, in suo situ apparet, nisi quod annulare ligamentum I. adhuc ipsi incumbit.
 EEEE Quatuor rotundi tendines hujus musculi, qui usque ad primum digitorum os detecti sunt, in suo situ conspicui.
 FFFF Flectentes primum digitorum internodium, Lumbricales dicti, in suo situ.
 GGGG Quatuor tendines flectentes tertium digitorum internodium, sub tendinibus musculi secundum os flectentis locati.
 H Parvus ille musculus, lati tendinis palmaris musculi (C) externo lateri adnatus, hic ab ipso reflectus est, & extrâ situm locatus: hæret tamen adhuc ligamento volæ manus (a,) à quo originem ducit.
 a Ligamentum volæ manus, tendines digitorum hoc loco firmans.
 I Ligamentum annulare internum carpi.
 KK Carpi flexor internus, in situ suo integer conspicuus.
 b Principium ipsius circa humeri tuberculum interius.
 cd Finis ejusdem, partim nerveus, c. partim carneus, d.
 LI Carpi flexor externus, pari modo in vero situ totus apparrens.
 e Principium ipsius circa humeri tuberculum interius.
 ff Tendo ejusdem musculi.
 M Tendo flexoris tertii pollicis internodii adhuc latentis.
 N Portio flectentis tertium digitorum internodium, sub flexore secundi ossis eorundem (DDD) eminentis.
 O Secundus, sive teres radii pronator, cujus principii g est.
 pp Musculi pollicem flectentes, nondum explicati.
 Q Musculus parvum digitum abducens, ex parte conspicuus.

- R Musculus pollicem abducens.
 SS Carpum extendens exterior.

FIGVRA II.


- AA Sinistri brachii pars.
 E Internum humeri tuberculum.
 BB Flexor secundi digitorum internodii, è situ suo nonnihil levatus, amoto planè ligamento annulari.
 aaaa Quatuor carnosæ partes hujus musculi in quas dividitur, quæ totidem tendines faciunt.
 bbbb Designantur illi quatuor tendines.
 CCCC Locus ubi quatuor hi tendines, in secunda ossa desinunt, & fissuras habent (ccc c) per quas transiunt quatuor tendines flectentis tertium digitorum articulum.
 cccc & fissuras habent (ccc c) per quas transiunt quatuor tendines flectentis tertium digitorum articulum.
 D Tendinosa pars flectentis tertium digitorum internodii, in suo situ, flexori secundi eorundem internodii (BB) substrata.
 EEEE Tendines quatuor hujus musculi à se mutuo sejuncti, ad tertium internodium, (e) cui inferuntur, properantes. Signatur hic quoque locus, ubi ex ipsis nascuntur quatuor primum internodium flectentes Lumbricales dicti (ddd d).
 dddd Exprimuntur illi quatuor Lumbricales.
 FF Carpum flectens exterior aliquomodo extrâ suam sedem motus, propter elevationem flexoris secundi digitorum internodii (BB.)
 GG Carpum flectens interior, similiter extrâ locum nonnihil, superna sui parte, qua humero proximus est, locatus.
 e Principium ejus ab interno humeri tuberculo.
 fg Finis ejus, partim carnosus f. partim nerveus g. in quantum os carpi, primi ordinis insertus.
 HH Magna pars musculi illius, qui tertium pollicis articulum flectit.
 I Secundus, sive teres radii pronator.
 h Ejus principium ab humeri interno tuberculo E.
 K Musculi pollicis primum internodium flectentes.
 L Abductor minimi digiti.
 M Rima in flexore secundi internodii propè ejus principii, quod geminatum quasi caput constituit.
 N Pollicem abducens in suo situ.
 O Carpi extensor exterior, in situ.
 x 2 3 Tria digitorum internodia, quorum ordinem ascriptus numerus indicat.

FIG. II.



TAB. XXII.

FIG. I.



LIBRI QVARTI TABVLÆ XXIII EXPLANATIO.

P Prima figura musculum, qui tertium digitorum internodum flectit, sum quatuor primum articulum curvantes, quos lumbicales appellant, & a membrana ipsius nascuntur, nonnihil in nativitate positos, continet. S E C V N D A duos radium in primum agentes quoquo pacto demonstrat, & eos, qui in prima figura ostensi sunt, extra situm elevat.


FIGVRA I.

- A A A Brachium sinistrum.
B Internum humeri tuberculum, à quo omnes musculi longi internam cubiti partem tenentes prodeunt.
C C C Flexor secundi digitorum internodii, à principio suo resectus, & elevatus, ut ei subiectus tertii eorumdem ossis flexor D D, appareat.
D D Tertium internodii flexor, sub dicto latens, & ipse parum loco motus maximeque in vola manus ejus tendines, ut quatuor lumbicalium musculorum origines, quæ ab ipsis ducuntur, evidentius cernantur.
a a a a Quatuor carnosæ partes, in quas dividitur hic musculus.
E E E E Quatuor tendines ejusdem musculi, extra situm situm.
F F F F Flectentes primum internodum Lumbicales dicti, ab illis tendinibus orti, extra situm nonnihil diducti.
b b b b Principium horum musculorum deductum à membranis, quæ quatuor tertium digitorum internodum flectentes tendines involvunt.
G G Flectens tertium pollicis internodum, extra situm nonnihil remotus.
c Tendo ejus in tertium internodum, interna parte insertus.
H Portio brevis radii extra musculos prominens.
I Primus radii pronator, Quadratus dictus, in suo situ.
K Secundus radii pronator in suo situ.
d Principium ejus ab interno humeri tuberculo.
e Finis ejusdem carnes, in medium longitudinis radii desinens.
L L Ossa carpi indistinctè apparent.
M Ossis cubiti pars pauca, ex qua Quadratus radii pronator enascitur.
N Exterior, vel superior pars radii, in quam secundus radii pronator, Quadratus inseritur.
O Primus secundum pollicis articulum flectens in suo situ.
P Primi pollicis internodii flexor primus.
Q Pollicem abducens in suo situ.

FIGVRA II.

- A A Sinistrum brachium.

- B Internum humeri tuberculum.
C C C Quatuor tendines musculi, qui flectit secundum digitorum internodum, prope insertionem abscissi.
a a a a In his eleganter fissuræ expressæ sunt, per quas transeunt tendines flexoris tertium digitorum internodum.
D D Flexor tertii digitorum internodii, ab ortu suo planè abscissus & detractus ad superiora, ne subiacentium partium inspectionem impediatur.
E E E E Quatuor tendines hujus musculi prope illum locum, ubi quatuor lumbicalibus musculis F F F F originem largiuntur, resecti.
F F F F Quatuor Lumbicales musculi, primum articulum digitorum flectentes, & ipsi extra situm elevati.
G G G Sex musculi illorum octo, qui oblique digitos movent, & Interossei vocantur, in tribus interstitiis, quatuor ossium metacarpi IIII politis, primis digitorum ossibus implantati, in suo situ conspicui.
H Vnus ex octo muscularis interossei, minimum digitum abducens, in suo situ.
b Alius ex hisce octo muscularis, qui internum latus primi ossis metacarpi occupat, indicem abducens.
I I I I Quatuor ossa metacarpi aliqua ex parte apparentia.
K K Minimum digitum abducens in suo situ.
L L Secundum pollicis internodum flectens extra situm.
M M Tertium pollicis internodum flectens extra situm.
N N Exterior carpi flexor leviter ex suo situ remotus.
c Principium ipsius circa internum humeri tuberculum, B.
d Locus, ubi in tendinem teretem, & nerveum degenerat.
e Ostendit, quomodo hic tendo, à carpo liberatus, ejusque sedem internam prætergressus, & latior nonnihil redactus, in radicem ossis metacarpi, quod indici subternitur, implantatur.
O Interior carpi flexor undique conspicuus, licet parum extra naturalem situm ab osse cubiti distet.
f Principium ejus ab interno humeri tuberculo, B.
g h Finis teres ferè ejusdem, partium carnes, partium nerveus, quarto ossi carpi, primi ordinis h inferius.
p Secundus five teres radium pronans musculus.
i Principium ejus ab interno humeri tuberculo, B.
l Finis ejusdem carnes in medium longitudinis radii R R implantatus.
Q Q Os cubiti ferè totum detectum.
R R Radii os nudum.
S S Ligamentum radii cubito jungens, & externos in cubito sitos musculos ab internis dirimens.
T Primus, five Quadratus radii pronator, hujus principium m n est, ab osse cubiti Q Q finis n n, in radio R R.
mm nn Musculi primum pollicis internodum flectentes nondum adhuc distincti, in suo loco.
V Pollicem abducens in suo situ.
X



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XXIV EXPLICATIO.

P *PRIMA* figura, duos radium in pronum agentes musculos, plenè in conspectum offeri, quemadmodum & membraneum illud ligamentum, quod cubiti os radio connectit. *SECUNDA*, initium facit demonstrationis eorum, qui externam cubiti sedem occupant, primo, & secundo digitorum flexori, & ligamento annulari imprimis dicata.

FIGVRA I.

- A A Brachium.
 B Internum humeri tuberculum.
 C C Secundus radii pronator teres, integer in suo situ hic conspicuus.
 a Principium ipsius, ab interioris humeri tuberculi (B) radice, & ab interno latere ossis cubiti, qua humero junctur.
 b Finis ejusdem, sive insertio paulo ante medium longitudinis radii (H H.)
 DDD Carpi flexor & extensor internus extra situm, ut utriusque interna pars, qua ossi cubiti incumbebant, conspicitur.
 E Carpi os quartum, in quod carpi flexor internus definit.
 F F Os cubiti detectum.
 G Externus carpi flexor extra situm, in quo vide quomodo ipse tendo c c teres ac nerveus, super vectus carpum T, in os metacarpii primum Q. Indicem sustinens implantatur. (d.)
 H H Os radii denudatum ex inferiore parte.
 I Ligamentum membraneum, cubitum radio conjungens, & cubiti vocatos musculos externos, ab internis distinguens.
 K Primus radius pronans, Quadratus, hoc loco plene in suo situ cernitur.
 e c Principium hujus ab ossis cubiti F F inferiore & interna sede enatum.
 f f Finis ejusdem in radii H H inferiorem & internam partem membraneus definit.
 L Musculi quidam pollicem flectentes, adhuc in suo situ, sed non distincti.
 M M Secundum pollicis internodium flectentes, extra situm.
 N N N Interossei musculi, hoc est, ii qui inter ossa metacarpii latent.
 O Alius ex hisce, indicem abducens.
 P Musculus minimum digitum abducens.

- Q R S Tria metacarpii ossa denudata ab incumbentibus musculis tendibus, ex quibus, Q, Indicem, R, Medium, S, Annularem digitum sustinet.
 T Carpus interna manus parte conspicuus.
 V V Carpum extendens exterior, in suo situ.

FIGVRA II.

- A Brachium sinistrum exhibet, sed contraria, quam in prima figura ratione situm, nempe in pronum, ut musculi exteriores cubiti rectius appareant.
 Æ Internum humeri tuberculum.
 B Externum humeri tuberculum, à quo ferè omnes externi cubiti musculi originem suam ducunt: quemadmodum, ut diximus, interni ab interno nascuntur.
 C Processus cubiti, qui *ulné spavon* dicitur.
 D D Primus digitorum extensor, qui in secundum & tertium os, quatuor, præter pollicem, digitorum, inferitur in suo situ totus conspicuus.
 a Principium hujus ab externo humeri tuberculo B.
 b b b Divisio ejus in tres partes carnosas.
 E Externum carpi annulare ligamentum, sub quo, veluti quadam fornice, omnes externi cubiti musculi ad manum progrediuntur.
 F F F Tres hujus tendines, ad totidem digitos festinantes, qui in suo adhuc situ locati cernuntur. Antequam tamen ad hos appellent, vide quomodo circa carpum O, ligamentum ipsius annulare externum E pertranseant.
 G G G G Monstrant quatuor portiones, totidem tendinum, qui à Lumbicalibus orti, in exteriori fede digitorum, inferuntur.
 H Pollicem adducens in suo situ.
 K Pollex, sive magnus digitus.
 1 2 3 4 Quatuor præter pollicem digiti reliqui. 1 Index est, 2 Medius, 3 Annularis, 4 Minimus.
 I, II, III, Primum, secundum & tertium digitorum internodium.
 L M Duo carpum extendentes musculi, quorum ille L internus, hic M externus est.
 N N Secundus digitorum extensor in situ.
 c d Monstrat quomodo hic cum primo quoad principium (ut c) & ventrem (ut d) confundatur.
 e Tendo ejusdem musculi.
 O Carpus.
 P P Carpum flectens interior in suo situ.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XXV DECLARATIO.

H Acc tabula tres figuras continet, quibus musculus & tendines, qui in vola, aut extrema manus interna regione occurrunt, representantur. **PRIMA** in suo situ ipsos ostendit. **ALTERA**, quosdam in situ, quosdam extra situm exhibet. **TERTIA** fere omnes ex suo loco remotos.

FIGVRA I.

- A A** Extremitas cubiti abscissi.
Æ Pollicem abducens in suo situ.
B Pollicis primum articulum flectentes, in suo situ.
CC Abducens minimum digitum, in suo situ.
D D Portio tendinis musculi tertium pollicis articulum flectentis.
E Extremitas tendinis externi carpum flectentis.
eeee Tendines flectentis secunda digitorum internodia.
FFFF Flectentes primum digitorum internodium, siue musculi Lumbricales, à tendinibus dicti tertium digitorum articulum flectentis, exorti, in suo hic situ integri monstrantur.
ffff Principia horum musculorum.
EEEE Tendines eorundem in primum digitorum internodium inserti.
GGGG Quatuor tendines flectentis tertium digitorum articulum.
H I L Ossia metacarpii digitos sustentantia, **H** Indicem, **I** Medium, **L** Annularem.

FIGVRA II.

- A** Pollicem abducens musculus, extra situm remotus.
B B B Musculi interni minimum digitum abducentes, qui lateri externo ultimi ossis metacarpii adhærent, quorum duo subiecti in situ sunt, unus vero, siue tertius, extra situm.

- C** Quidam musculus pollicem flectentes in suo situ indistincti adhuc jacentes.
DDDD Quatuor lumbricales musculi.
aaaa Tendines horum, in primum digitorum internodium desinentes.
e Tendo externi carpum flectentis musculi.
FF Tendo pollicis tertium articulum flectentis musculi.
GGGG Tendines tertium digitorum internodium flectentis, ubi eleganter expressum est, quo pacto fissuras, (**b b b**) tendinum flectentis secundum os, siue perforati musculi, pertranseunt.
bbbb
HHHH Quatuor tendines secundum digitorum articulum flectentis musculi, siue perforati.
1 2 3 Tria digitorum internodia in indice & annulari signata, ut subito pateat cui quisque tendinum implantatus sit.
- ### FIGVRA III.
- A** Pollicem abducens musculus à subiectis aliquantulum separatus.
B B Finis tendinis interni carpum flectentis musculi.
C Tendines quatuor tertium digitorum articulum flectentis, à musculosa sua carne, dissecti, & adhuc uniti, eleganter conspicui.
DDDD Extremitates tendinum horum, à sua portione superiore, quam ad literas (**d d d**) videre est, dissectorum.
EEEE Tendines Perforati musculi dissecti, & sursum elevati, quò elegantius eorum foramen (**æ æ æ**) conspiciatur.
FFFF Quatuor Lumbricales musculi à tendinibus (**c**) producti.
aaaa Principium musculorum lumbricalium.
bbbb Ipsorum tendines, primis digitorum internodiis (**IIII**) inserti.
G Tendo musculi tertium pollicis articulum flectentis.
H Musculi quidam pollicem flectentes, in suo situ adhuc indistincti apparent.
I II III Prima digitorum internodia à tendinibus liberata, quorum externæ sedes tendines Lumbricalium musculorum **b b b** inferuntur.

FIG. I.



FIG. II.





FIG. III.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XXVI DILVCIDATIO.

T *Res similiter figuras complectitur, quibus in primis Lumbricales, & Interossei musculi, tum ipsa digitorum ossa proponuntur.*

FIGVRA I.

- A Pars cubiti abscissi.
 Æ Carpus.
 B Primum pollicis internodium flectens in suo adhuc situ.
 a Primum pollicis internodium abducens.
 C Primus secundum pollicis internodii flexor, extra situm.
 D D Secundus, & tertius, secundum pollicis articulum flectentes.
 E E Duo minimi digiti abductores, quorum alter in suo situ, alter à fine extra situm pendet.
 F Primus ex octo musculis interossei, qui primi ossis metacarpii I interolateri adhæret, & indicem abducit, in suo situ.
 G G G Tres alii musculi ex illis octo, indicem, medium, & annularem digitum abducentes.
 H H H Reliqui interossei, qui dictos digitos adducunt omnes in suo situ conspicui, excepto illo, qui adducit parvum digitum, qui dimidius tantum cernitur.
 b b b Tendines musculorum interosseorum.
 I K L M Quatuor ossa metacarpi, inter quæ prædicti musculi locantur, superioribus suis extremitatibus apparentia. Ex his I Indicem, K Medium, L Annularem, M. Minimum digitum sustinet.
 1 2 3 Tria digitorum internodia, quorum ordinem ascripti numeri edocent.

FIGVRA II.

- A Extremitas cubiti inferior.

- a Carpus.
 B Primus pollicis articulum abducens in situ suo, nondum separatus.
 b Primum pollicis internodium flectens.
 c Portio ligamenti annularis carpi ex quo dictus musculus nascitur.
 C Secundum pollicis os flectentes, extra situm nonnihil remoti.
 D Abducens minimum digitum in suo situ.
 E E E Musculi quidam interossei.
 F F F F Quatuor tendines tertium digitorum os flectentis musculi amputati ea sede, qua musculum respiciebant.
 G G G G Idem tendines eo loco abscissi, ubi ad digitos tendebant, relicta illorum ea solum portione, ex qua quatuor parvi musculi Lumbricales dicti, emergunt.
 H H H H Quatuor illi musculi Lumbricales dicti.
 I I I I Horum musculorum tendines ad externam digitorum fasciam pergentes.
 1 2 3 Idem quod in præcedenti figura significant.
 K L M N Ossa quatuor metacarpi.

FIGVRA III.

- A Cubiti pars abscissa.
 B Pollicem abducens extra situm.
 C C C C Quatuor ossa metacarpi nuda à musculis & tendinibus.
 D D D D 1 2 3 Digni & eorum tria internodia.
 E E E E Quatuor musculi interossei, quatuor digitos abducentes hoc loco sursum extra suum situm, quorum insertio in prima internodia notanda.
 F F F F Reliqui quatuor abducentes, similiter extra situm remoti.
 G G G Carpi ossa indistinctè apparent.

TAB. XXVI.

FIG. I.




FIG. II.





FIG. III.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XXVII EXPLANATIO.

FIGVRA I.

N *Omnes digitorum musculos in cubito jacentes demonstrat.*

- A Tuberculum externum ossis humeri, à quo omnes ferè externi cubiti musculi nascuntur.
 B Olecranon.
 C C Digitorum extensor primus, è suo loco motus.
 a a Interior ejus tendinola pars, quæ quatuor tendines committitur, & ne à se mutuo abeant, prohibet.
 D D Digitorum extensor secundus, in suo situ perfectè hic cernitur, nisi quod ejus tendo ad extremum parvi digiti denudatus non est.
 E Extendentium carpum exterior, sua tantum origine hic conspicuus, in suo situ.
 F Indicem abducens.
 G Pollicis extensor primus in suo situ.
 H Pollicis extensor secundus in suo situ.
 I Radius.
 K Cubiti os.
 L Vnus ex octo musculis internis interosseis, ut vocant, metacarpii ossi, quod indici præest, appenius.
 MMM Metacarpii ossa.
 N Tendo flexantis tertium pollicis internodium.
 O Radium supinans brevis.

FIGVRA II.

Duos carpi tensores demonstrat.

- A Externum humeri tuberculum.
 B B Extendentium carpum exterior in suo situ.
 a Principium ipsius in acie illa ossæ, quæ in humero est supra tuberculum exterius.
 b Finis ejusdem tendineus, qui in duos mox dividitur, quorum alter interior c c est: exterior d d.
 C C Extendentium carpum interior, utrinque quidem suis insertionibus adhærens, sed aliquantulum in medio elevatus, ut cubiti os videatur.
 e Principium ipsius à tuberculo humeri externo A.
 f f Finis ejusdem tendineus.
 D Secundus, sive brevis radii supinator.
 E E Os cubiti.
 g Inferior ossis cubiti appendix.
 h Styloides cubiti ossis processus.
 F F Os radii.
 G G Ligamentum membraneum cubiti radio jungens, & externos musculos ab internis distinguens.
 H Primus pollicis extensor extra situm.
 I Secundus pollicis extensor extra situm.
 K Carpus.
 L Os metacarpii quod indici subtenitur.
 M Os metacarpii medio digito substratum.
 N Os metacarpii minimum digitorum sustinens.
 O Pollicem adducens musculus.

FIG. II.




FIG. I.

TAB. XXVII.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XXVIII EXPLICATIO.

Duos Radii Supinatores musculos demonstrat.

FIGVRA I.

Situm duorum radii supinatorum edocet.

- A Olecranon.
 B Externum humeri tuberculum.
 C Primus radii supinator, sive longus.
 a Principium ipsius ab externi humeri tuberculi acie.
 d Tendo ejusdem appendici radii d alligatus.
 D Secundus radii supinator, sive brevis.
 c Inferio ejus in radium E.
 E Radius.
 d Radii appendix inferior, cujus interiori sedi, tendo primi radium supinantis inseritur.
 F Cubitus, sive Vlna.
 ° G G Ligamentum musculos distinguens.
 H Carpum extendens interior, extra situm.
 e Ipsius principium.
 f g Tendo ejusdem in ossis metacarpii, quod minimo digito subtenditur, superiorem partem g delinens.
 I K K Carpum extendens exterior, extra situm.
 I Ipsius principium.
 K K h h Duo quasi ventres hujus musculi, qui totidem tendines (h h) producant.
 L L L L Quatuor ossa metacarpii.
 M Carpus.

FIGVRA II.

Supinatorem brevem integrum demonstrat.


- A Externum humeri tuberculum.
 Æ Pars inferior humeri abscissa.
 B Internum tuberculum humeri.
 C Olecranon.
 D Primus radii supinator, sive longus extra situm.
 a Principium ipsius.

- b b Tendo ejusdem, radii F inferiori appendici e alligatus.
 E Secundus radii supinator, sive brevis, perfecte cernitur in suo situ.
 c Principium ipsius à posteriore cubiti processu carnosum.
 d Tendo ejusdem qui in radii fere medium implantatur.
 F Radius.
 e Appendix inferior radii.
 G Cubiti os.
 H H Ligamentum distinguens externos musculos ab internis.
 I Arteriæ, quæ ægris tangitur portio hic relicta est.
 K K K K Quatuor ossa metacarpii.
 L Carpus.

FIGVRA III.

Secundum sive brevem radii supinatorem extra sedem, & ossa omnibus musculis remotis nuda demonstrat.

- A Externum tuberculum humeri, osse jam penitus denudato, conspicuum.
 Æ Portio humeri inferior abscissa.
 B a b Radius à musculis liberatus. Hujus appendices duæ sunt: superior a: inferior b.
 C c d Cubiti os similiter denudatum. Hujus appendicum superior c est, inferior d.
 D Radii supinator brevis extra situm.
 E Ligamentum cubiti internos musculos ab externis distinguens.
 F Portio arteriæ subcutaneæ, quæ à Medicis tangitur.
 G Pollicis ossa nuda.
 H H H H Ossa metacarpii penitus jam denudata.
 I I I Interstitia ossium metacarpii, in quibus sex ex octo illis musculis interosseis apparent, membrana tamen obvelati.
 K K K K Prima ossa quatuor digitorum.
 L L L L Secunda ossa.
 M M M M Tertia & ultima ossa quatuor digitorum.
 N Carpus.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XXIX DECLARATIO.

Primum femur extendentiam musculum, sive Gluteum majorem, primo in sua sede, deinde extra situm demonstrat, ut utraque ipsius facies perfectè cernatur. Preter hunc secundum extendentium, & primum circumagentium femur ostendit.

A A Est dorsi pars circa lumbos cute adhuc tecta.

B B B B Cutis cum adipe hic à subditis partibus ablata & inversa.

C C C Primus femur extendentium musculus, Gluteus magnus vocatus, in suo situ.

D D Spina ossis ilium, à cujus circumferentia (a a) superior pars principii hujus primi musculi pronascitur.

E E Os sacrum nondum detectum, à cujus latere, altera pars hujus musculi (a b) exornitur.

F Os coccygis, à cujus latere similiter (b c) infima pars primi musculi prodit.

G Magnus rotator, quem supervehitur, & cui adhæret hic primus femoris musculus.

d Tendo hujus musculi validus ac latus.

H I K Musculus hic primus extra situm.

H H H Crassum & carnosum primi musculi principium, in quo hoc loco asperitates quædam videntur fibrarum ejus, quæ ossibus adnatæ erant.

I I I Venter hujus musculi, crassus quoque, sed paulatim an-

guatus, in quo considera insignes fibrarum hiatus, & quasi strias.

K K Tendinosa substantia hujus primi musculi magno rotatori adnata.

L L Secundus femur extendentium musculus, sive Gluteus medius, in suo situ.

e e Principium hujus musculi carnosum, latum, ac femicirculare.

M Circumagentium femur primus: sive Iliacus ex ernus, & Pyramiformis, in suo situ.

f Principium ipsius à tribus humilioribus ossis sacri vertebrais.

g Tendo ipsius teres, qui in majoris rotatoris quartam impressionem definit.

N Tuberculum ossis coxæ, à quo aliquot musculi tibiae (R R R) prodeunt, ut suo loco dicetur.

O Rotundum ligamentum ab osse sacro ad hoc tuberculum protensum.

P Inguinis nervus, qui ex lumborum & ossis sacri medulla huc delabitur, & in totum crus diffeminatur.

Q Q Tertius femur circumagentium, Marfupialis dictus, in suo situ, quem nervus ille ac ligamentum prætergrediuntur.

R R R Tertius, quartus, & quintus tibiae flectentes, parum distinctè adhuc apparentes.

TAB. XXIX.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XXX DILVCIDATIO.

*Secundum & tertium femur extendentium, itemque
primum & tertium circumagentium exhibet.*

A A A Spina, siue superior semicircularis extremitas ossis
ilium.

B B Secundus femur extendentium musculus, in suo situ.

C Magnus rotator, in quem hic musculus inferitur.

D E F Musculus hic extra suum situm dependens.

D D D Principium ejus, & asperitates, quæ in ipso conspiciun-
tur, inde ortæ, quod magna difficultate ab osse, ut
cui validissimè annectitur, separatur.

E E Ipsi venter carnosus.

F Tendo, qui in majorem rota vena inferitur.

G G Tertius femur extendentium musculus, siue Glutæus mi-
nimus, integer in suo situ, cui secundus & primus in-
strati erant, conspicuus.

a a Principium hujus musculi à posteriore, & inferiore sede
dorti ossis ilium,

II Primus femur circumagentium, Pyriformis dictus, in suo
situ.

I Ossis sacri inferior pars, à qua exoritur.

b Tendo ipsius teres, qui majoris rotatoris quartæ imple-
tioni inferitur.

K Idem extra situm.

L Ejus principium asperum quoque, ut ab osse, cui connec-
tum erat, resectum est.

M Tendo ejus longiusculus ac teres.

N Foramen quod hic musculus obtegebat.

O Circumagentium femur tertius, seu Marsupialis, in suo
situ.

P Ligamentum, quod externum ossis ilii tuberculum cum
osse sacro conjungit.

Q Q Tuberculum ossis ilium, à quo tres tibiae flectentes mus-
culi prodeunt.

R R Duo ex illis musculis tibiæ ab illo tuberculo orti.

S Os coccygis à cure jam nudatum.

TAB. XXX.



LIBRI QVARTI TABVLÆ XXXI EXPLANATIO.

- P** *Primum, secundum, & quartum femur flectentium, (præter ceteros) potissimum ostendit.*
- A A** Duæ infimæ Thoracis vertebrae.
- B B** Duodecima costa utrinque suæ vertebrae adhuc adnexa.
- CCCC** Quinque vertebrae lumborum.
- a a** Flectentes lumbos musculi, sive Quadrati, in suo situ.
- D D** Primus femur flectentium, *Idæus*, sive Lumbalis, in suo situ hic conspicuus.
- b b** Principium hujus musculi è vertebri duabus **A A** thoracis, & tribus **C C C** lumborum, enatum.
- E** Tendo ejusdem musculi carnosam substantiam asseiscens, sui & nervorum, (**F**), qui sub ipso è spina egrediuntur, tutelæ gratia: hic in minoris rotatoris superiorem partem desinit.
- F F** Nervi insignes, qui hoc loco unâ cum tendine ipsius super ossa pubis abdomen egressi, in crus distribui incipiunt.
- GGG** Idem musculus aliqua ex parte à vertebrae corpore, à quo oritur, separatus, & extrâ situm positus. Quo loco duo notanda sunt; primum, asperitates (**c c**) quæ signa sunt coherentiæ hujus musculi cum Vertebri: deinde insignes nervorum propagines, (**d d**) quæ eundem ingrediuntur.
- H** Ossa pubis, quæ hic musculus supergreditur.
- I I I** Secundus femur flectentium, sive Iliacus internus, in suo situ, totam ossium ilium cavitatem (**NN**) adimplens.
- K K** Spina, sive appendix ossis ilium, à qua hic secundus musculus oritur.
- e** Tendo ipsius, qui in minoris rotatoris humiliorem sedem inferitur.
- L L** Idem musculus extrâ situm, ut carnosam ejus substantiam observet.
- M M M** Principium ipsius carnosum ac semicirculare, quod in extrâ parte asperum apparet, quod citrà incisionem ab osse removeri non possit.
- N N** Costa, sive cavitates interna ossis ilium, quam hic musculus totam replet.
- O** Quartus femur flectentium musculus in situ.
- P** Idem musculus extrâ situm.
- Q** Principium præfati musculi latiusculum.
- R** Secundus tibiæ extendens.
- S** Tendinis primi, sive membranosi, tibiæ extendentis positiones dissectæ, quæ anteriorem cruris sedem totam investiant.
- T** Primus tibiæ flectentium in suo situ, Fascialis dictus, tertia ab hac tabula melius conspiciendus.

TAB. XXXI.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XXXII EXPLICATIO.

<i>Tertium femur flexentium proponit.</i>	
AAAA	Tertius femur flexentium, Triceps dictus, in suo situ.
B	Ejus principium.
CCC	Cohærentia hujus musculi cum osse femoris, secundum asperam illam lineam, quæ in posteriore ejus parte in longum eminet.
DDD	Idem musculus, femori quidem secundum totam longitudinem posteriori adhuc adnatus, sed extrorsum flexus.
E	Principium ipsius ab osse coxendicis refectum.
FG	Divisio tendinis hujus musculi, & fissura quasi, per quam feruntur vasa, Venæ, inquam, & arteriæ crurales.
H	Secundus femur circumagentium, aliis Obturator externus dictus, adhuc in suo situ.
I	Idem musculus extrà situm abscto principio.
K	Ejusdem tendo, qui angustior factus, in sinum magni rotatoris inseritur.
L	Primus femur circumagentium extrà situm.
M	Parvus rotator, quem tertius femur flexentium amplectitur.
N	Magnus rotator, ab omnibus, qui in ipsum inserti erant, musculus, denudatus.
OO	Quintus tibiæ flexentium, Biceps, extrà locum à crure dependens.
P	Carnosa illa moles, quæ secundum ipsius principium ab Anatomicis statuitur, & ipsi, postquam ultra femoris medium descendit, interna parte adnascitur.
QQ	Internum caput inferioris femoris appendicis.
RR	Externum ejus appendicis caput.
SSS	Principia musculorum pedi dicatorum, remota cute, detecta.
TT	Dorsum ossium innominatorum, à Glutæis musculis sibi adnatis prorsus liberatum.
V	Ossa pubis.
XX	Foramina ossium pubis, à musculis femoris Obturatoribus dictis, occupata.

TAB. XXXII



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XXXIII DECLARATIO.

Quartum femur flectentium, rùm secundum, tertium, Quac quartum circumagentium offendit; tres item posteriores tibiam flectentes representat.

- AAAA Quartus femur flectentium in suo situ. In hoc varias licet obſervare fibras,, ſic quidem diſtinctè, ut citra negotium in plures muſculos ſeparari poſſit.
- B Offis pubis pars anterior, ex qua muſculus hic originem ducit.
- CC Secundus femur circumagentium, quem Obturatorem externum vocant, quod ab exteriore parte foraminis offium pubis enaſcatur, hic in ſuo tranſverſo ſitu conſpicitur.
- DDE Tertius femur circumagentium, quem Obturatorem internum nonnulli, & Marſupialem appellant, hoc loco in ſuo ſitu apparet.
- DD Caput ipſius latum, & ſemicirculare.
- E Quatuor tendines muſculi marſupialis uniti, qui in marſupio carneo (FF) reconditi ſunt.
- FF Marſupium illud carneum in ſuo adhuc ſitu, unà cum contento tendine, nonnihil diſciſſum, ut tendinis in ipſum ingreſſus pateat.
- GG Idem muſculus Marſupialis dictus extrà ſitum, in quo carnoſam ipſius ſubſtantiam & principii aſperitatem obſervare licet.
- H Marſupium carneum & ipſum extrà ſitum remotum, ut exactius ſeſe conſpiciendum præbeat.
- I Quartus femur circumagentium in ſuo ſitu.
- K Tertius tibiam flectentium, Seminervofus dictus, in ſitu.
- L Quartus tibiam flectentium, Semimembraneus vocatus, in ſitu.
- M Quintus tibiam flectentium, ſive Biceps, in ſuo ſitu.
- N Appendix offis coxendicis, à qua tres iſti muſculi tibiz, originem ſuam habent.
- O Tertius tibiam flectentium extrà ſitum.

- P Principium ejus nerveum, teres, & longum.
- Q Ejuſdem muſculi tendo nerveus, qui ad anteriora tibiz reflexus, ſub genu terminatur.
- R Quartus tibiam flectentium extrà ſitum.
- S Hujus muſculi caput nerveum.
- T Tendo ejusdem latiaſculus, in latus internum tibiz anterioris inferius.
- V Quintus tibiam flectentium, Biceps, extrà ſitum.
- X Iplius principium, quod primò acutum eſt, ſed mox carnoſus redditur.
- Y Offenditur ſubſtantia tendinea hujus principii in facie interna.
- Z Carnea moles, quæ paulò quàm medietm longitudinis ipſius femoris ſuperavit, muſculo huic accedit, & pro altero capite habetur, unde & Biceps à nonnullis diſſectionum profeſſoribus dicitur.
- a a b b Tertius femur extendentium extrà ſitum ſitum.
- a a a Hujus muſculi aſperum principium.
- b b Ejuſdem muſculi finis, ſive tendo lividus.
- c Primus femur circumagentium extrà ſitum.
- d Foramen, quod ab hoc muſculo obturatur.
- e Poples.
- ff Offa ilium.
- gg Offa coxendicis.
- h Os ſacrum.
- i Os coccygis.
- l l Ligamentum, os ſacrum coxendicis offi utrinq; alligant.
- m m m Tertius femur flectentium, Triceps, in ſuo ſitu.
- n n Femur.
- o Rotator major,
- p Coxendicis acetabulum.
- q q Primi pedem extendentium, ſive Gaſterocnemii externi perſio, cujus duo capita r r eleganter comparent.
- r r Capita duo primi pedem extendentium muſculi.



TAB. XXXIII



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XXXIV DILVCIDATIO.


- D** *Elineantur primus, & secundus tibiā flectentium, & primus eandem extendentium, musculi.*
- AA** Primus tibiā flectentium musculus in suo situ, hic obliquo ducta ab externis, ad interiores femoris partes excurrit, in quo progressu æqualem ubivis latitudinem observat, ut non inepte à nonnullis fasciæ comparatus fuerit, & propterea Fascialis quoque dictus.
- B** Anterior pars spinæ, sive appendicis ossis ilium, à quo musculi hujus principium carnosum & nervuū oritur.
- C** Locus in anteriore tibiā, ubi tendine suo nervoso ac lato implantatur.
- DD** Idem musculus extrā situm.
- EE** Ossis ilii costa, sive cavitas interna.
- FF** Secundus tibiā flectentiū musculus, Gracilis dictus, in suo situ, qui recta per femoris interiora carneus decurrit.
- G** Commissura ossium pubis, propè quam hic musculus nervo & amplo principio enascitur.
- H** Locus designatur in quem hic musculus infra tendinem primi tibiā flectentium inferitur.
- IKL** Idem musculus extrā situm.
- I** Ejusdem principium nervosum & latum, ab osse pubis, unde nascitur, separatum.
- K** Ejusdem venter rotundus.
- L** Ejusdem finis & tendo subrotundus.
- MMOO** Primus tibiā extendentium, sive Membranofus, & latitendinis.
- MM** Principium & medium primi tibiā extendentium, partim carnosum intus, partim nervosum exterius.
- NN** Spina ossis ilium, à cujus ferè medio, hujus musculi principium emanat.
- OOOO** Tendo latissimus & fortis, aliquomodo extrā situm. Propè genu enim ab infertione liberatus est, ut reliqui musculi quos omnes ferè involvit, detegerentur.
- P** Portio pauca tendinis hujus musculi relicta, ut sectionis vestigium appareret.
- QRS** Idem musculus primus tibiā extendentium extrā situm, à tendine suo dependens.
- Q** Principium ejusdem musculi.
- R** Ejusdem venter brevis, sed crassiusculus.
- SSS** Insignis tendo hujus musculi, in quo fibras rectas elegantissimè à sculptore expressas diligenter advertite.
- T** Locus infra genu, ubi hic musculus in tibiā & fibulam inferitur.
- VV** Tertius femur flectentium, utrinque in suo situ existens.
- X** Secundus femur circumagentium in situ.
- Y** Quartus femur flectentium principio suo extrā situm revolutus.
- Z** Idem musculus in situ.
- aaaa** Secundus tibiā extendentium, in situ, sequenti tabula elegantius conspiciendus.
- bb** Quartus tibiā extendentiū, circa suum finem conspicuus.
- c** Caput superius femoris.



LIBRI QVARTI TABVLÆ XXXV EXPLICATIO.

<i>Secundum, tertium, & quartum tibiā extendentes musclos continet.</i>		KK	Locus est, per quem secundus tibiā extendentium descendit, ubi duo Vastī, externus & internus, sive tertius & quartus tibiā extendentes, connati sunt, plumbeo colore comparent.
AA	Secundus tibiā extendentium, sive Rectus, in suo situ, cujus venter carnosus & teres hoc loco inspicitur.	LLL	Quartus tibiā extendentium in suo situ, cujus ingentem mole, à qua Vastī interni nomen accepit, contemplare.
B	Tuberculum internum ossis ilium, à quo hic musculus originem habet.	MM	Principium hujus musculi, partim à cervice femoris, partim à magno rotatore prodians.
C	Tendo hujus musculi robustus & nervus.	N	Ipsius tendo membranofus.
DEF	Idem secundus tibiā extendentium extrā suum situm, partim carnosus, partim nervus.	O	Cervix femoris.
D	Principium ejus acutum & nerveum.	P	Magnum rotator.
EE	Medium ipsius carneum.	QQQ	Tertius femur flectentium, in suo utrinque situ.
F	Tendo ejusdem robustus, qui hoc loci sequentium duorum tendinibus miscetur, & patellam circumamplectitur.	RR	Costa, sive cavitas ossis ilium.
GGG	Tertius tibiā extendentium, Vastus externus vocatus, in suo situ.	S	Secundus femur circumagentium.
H	Principium hujus musculi, quod à radice majoris rotatoris, quem amplectitur, enascitur.	TTT	Corpora vertebrarum lumborum.
I	Tendo ejusdem membranofus, qui unā cum secundi, & quarti tibiā extendentium tendinibus patellam primum involvit, postea in tibiæ tuberculum anterius inferatur.	VVV	Cartilaginee Vertebrarum corporibus interjectæ.
		XXX	Transversus processus vertebrarum lumborum utrinque prominentes.
		Y	Commiffura ossium pubis.
		Z	Cavitas, quam Anatomici Pelvim appellant.
		a	Patella, genu præfixa.
		b	Anterior tibiæ sedes, Anticnemium dicta.
		c	Caput superius femoris.

TAB. XXXV.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XXXVI EXPLANATIO.

T ertium, & quartum tibiā extendentes musculos diligentiū examinat.		M	Substantia hujus musculi tendinosa & livida.
AAA	Corpora Vertebrarum lumborum.	NN	Quartus tibiā extendentium, sive Vastus internus, in suo situ.
BBBB	Transversi vertebrarum processus.	O	Adverte hic locum, ex quo originem hic musculus ducit, & quā validē femori adhæreat.
CCC	Cartilagine, quæ singulis vertebrarum corporibus interpositæ sunt ligamentorum vices obeuntes.	PP	Tertius femur flexentium utrinque ex aliqua parte conspicuus.
DD	Costa, sive interna ossium illi cavitās.	QQ	Secundus femur circumagentium hic obscurē cernitur.
E	Commisura ossium pubis.	RR	Quartus tibiā extendentium, à suo socio, tertio pariter musculo, & ab ipso osse, remotus.
FF	Caput femoris, quod coxendicis ossi committitur.	SS	Principium ipsius, quod à cervice femoris, & magni rotatore enatum est, hoc loco resectum cernitur.
GG	Cervix ossis femoris.	TT	Pars lateralis hujus musculi, quā in longum cum tertio tibiā extendentium coaluerat.
HH	Magnus femoris rotator.	VV	Os femoris, cui immediatē adherent tertius & quartus tibiā extendentes musculi.
I	Tertius tibiā extendentium, sive Vastus externus, suo principio ab osse femoris ex parte separatus, quemadmodum & à quarto in longum scissus, & ad exteriora flexus.	XX	Tertius tibiā extendens, cujus tendinosa, & livida substantia eleganter hic à sculptore expressa est.
K	Ejus principium, quod magnum rotatorem ampiebat, ossi adnatum, unde asperitates in abscissione factæ.	Y	Carnosum principium ejusdem tertii musculi, quod rotatori magno circumcirca adnatum erat.
LLL	Incisio in iis partibus hujus musculi, ubi is cum quarto tibiā extendentium coaluerat.		

TAB. XXXVI.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XXXVII DECLARATIO.

- Quæ res sunt ad exquisitam secundæ, tertiæ, & quartæ tibiæ extendentium cognitionem, pertexis.*
- AAAA** Lumborum vertebræ.
BBB Cartilagine vertebrarum ossibus interpositæ.
C Commissura ossium pubis.
DD Cavitas interna, sive costa ossium ilium.
EEE Transversi vertebrarum processus.
FF Caput femoris, quod cum coxendicis acetabulo committitur.
GG Cervix femoris.
HH Magnus rotator.
IIII Duo femoris ossa in antica sui parte à musculis denudata.
K Internum caput inferioris femoris appendicis detectum.
L Externum hujus appendicis caput.
M Tertius tibiæ extendentium musculus extrà situm interna parte conspicuus.
N Hujus principium à rotatore magno, magna ex parte ablatum.
OO Sectio in ea parte facta, ubi quarto tibiæ extendentium adnatum erat.
PP Eiusdem sectionis vestigium in quarto conspicuum.
QRR Quartus tibiæ extendentium musculus, extra suum situm nonnihil elevatus, ut interna ejus pars conspiciatur.
- Q** Principium hujus musculi, magno rotatori & femoris cervici circumcirca adnatum.
RR Venter ejusdem musculi, interiore sui parte, qua ossi femoris incumberebat, conspicuus. In hoc observa asperitates, quæ in sectione relicte sunt, quod valide ipsæ femori adnascatur.
S Tendo secundæ tibiæ extendentium musculi.
TT Tertii femur flexcentium magna pars hic cernitur.
V Secundus femur circumagentium extra situm.
XXXX Tertius femur flexcentium integer in naturali suo situ hic conspicuus.
Y Eiusdem tendo in internum femoris tuberculum insertus.
Z Foramen in hoc tendine, per quod venæ & arteriæ cruciales transeunt.
aa Secundus tibiæ extendentiū deorsum à tendine pendens.
bb Tertius tibiæ extendentium deorsum quoque pendens.
cc Quartus tibiæ extendentium similiter pendens.
dd Divisio tendinis hujus quarti musculi, cujus una pars in fibulam, altera in tibiæ inferitur.
ccc Concursum tendinum horum trium musculorum prope patellam.
f Foramen ossium pubis.
g Cavitas, quam Dissectionum Professores Pelvim appellant.

TAB. XXXVII.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XXXVIII DILVCIDATIO.

FIGVRA I.

Primum pedem extendentium demonstrat.


- A A A Tertius, quarti, & quinti tibiæ flectentium musculorum fines.
 B Genu posterior pars, quam Popliteam vocant.
 C C C C Cutis à tibiæ posteriore parte unà cum pinguedine separata.
 D E F G Primus pedem extendentium musculus, sive Gasterone-mius externus Spigelii, in suo situ.
 H I D Primum principium hujus musculi, quod ab interno femoris tuberculo originem ducit.
 E Alterum ejusdem principium ab externo femoris tuberculo pronatum.
 F Coitus horum duorum principiorum in unum ventrem.
 G G Venter insigniter carnosus hujus musculi, suram constituens.
 H Initium tendinis circa medium longitudinis tibiæ, qui descendens sensim fit angustior.
 I Notatur quo pacto secundum principium, in tendinem, paulò superiore, quam primum loco, degeneret.
 K Finis, sive insertio hujus tendinis in calcaneum.

FIGVRA II.

O Blaque Tibiam moventem, & secundum pedem extendentium, tum Plantarem musculum exhibet.

- A Genu ab interno latere conspicuum.
 B Portio quarti tibiæ extendentium musculi.

- C D E Tertius, quartus, & quintus tibiæ flectentium musculi propè popliteam unà cum toto femore abscissi.
 F Flexura genu, Poples vocata.
 G H Suppopliteus, sive obliquè tibiæ moventium musculus in suo situ.
 G Principium hujus musculi, quod latum ac nerveum, ab externo femoris capite, vel (ut aliis placet) à ligamento articuli genu posteriore, exoritur.
 H Finis ejusdem musculi, in posteriorem & internam superioris tibiæ appendicis partem definens.
 I K K Musculus, cujus latus tendo mediæ plantæ subnascitur, Plantaris propterea cognominatus.
 I Caput hujus musculi à tubere femoris externo enatum.
 K K K Tendo rotundus hujus musculi, obliquè ab externis in calcanei internum latus descendens.
 L M M N Secundus pedem extendentium musculus, sive Gasterone-mius internus (Spigelio sic dictus) in suo situ.
 L Caput hujus musculi nerveum validumque.
 M M Venter insigniter latus, à prædicto capite pendens.
 N Tendo hujus musculi, omnium qui in corpore sunt, fortissimus, hic ad medium tibiæ sensim angustatur, mixtusque cum primi pedem extendentium tendine, (Q) in calcem implantatur.
 O O P Q Primus pedem extendentium musculus, extrà locum huius prostratus jacet.
 O O Duo principia hujus musculi à se divulsa.
 P Designatur locus ubi duo hæc capita mutuo coeunt.
 Q Q R Tendo ejusdem musculi, cujus in calcanei posterius latus insertionem R denotat.
 S S Duo officula scissimoides, quæ principiis duobus hujus musculi præfixa sunt, ad eludendum impetum duorum inferiorum femoris capitum.



LIBRI QVARTI TABVLÆ XXXIX EXPLICATIO.

FIGVRA I.

Vtrumque pedem flectentium, & secundum digitorum internodium extendentem, in suo situ ostendit.

- A Genu latus internum.
 B Externum femoris tuberculum.
 C C Primus flectentium pedem, sive Tibiæ anticus, perfectè in suo situ cernitur.
 a Principium ipsius.
 b b Tendo ejusdem.
 D E Fibulæ appendices. D superior est, E inferior.
 F G Tibiæ appendix utraque. F superior est, G inferior.
 H H Secundus flectentium pedem, alius Peronæus secundus dictus.
 c Principium hujus musculi à fibula D E.
 h h i Ejusdem tendo h h, cujus insertio in os tarsi parvum digitorum sustinens, caractere i notatur.
 I I Extendens tertium digitorum internodium extra locum.
 K Quatuor tendines hujus musculi, ligamento adhuc connecti.
 L Extendens secundum digitorum internodium, à ligamento transverso enatus, in situ.
 MMM Quatuor tendines hujus musculi.
 N N Pollicis extensor extra situm.
 O Ejus finis duplici tendine hoc loco conspicuus, cum intertudo unicum tantum habeat.
 P Calcaneus.
 Q Dorsum pedis.
 R Flexura pedis, sive Tarsus.

FIGVRA II.

Oblique pedem moventium primum in situ representat.


- A Interius tuberculum femoris.
 B Exterius tuberculum femoris.
 C c c Os tibiæ, cujus superiorem appendicem C denotat.
 D d d Fibula, cujus superior appendix D litera signatur.
 E E Oblique pedem moventium primus, sive adducens pe-

- dem, Tibiæus posticus quorundam.
 e Principium ipsius carnosum, à Tibia fibulaque.
 f Tendo ejusdem musculi teres, cujus insertio f.
 G G Secundus flectentium pedem extra situm.
 H Ejus tendo, & locus ubi inseritur.
 I Internus Malleolus.
 K Externus Malleolus.
 L Calcaneus.
 M Musculus interosseus pollicem adducens extra situm.
 N O Duo musculi interossei.
 P Transversalis musculus Placentini, de quo postea plura in suo situ.
 Q Musculus interosseus minimum digitorum abducens.
 R Ligamentum latum ac transversum tibiam fibulamque connectens.

FIGVRA III.

Ostenfos musculos in hac tabula in situ, extra situm removet.

- A Externum latus genu.
 B b b Fibula, cujus appendix superior litera B notatur.
 C C C Tibiæ os.
 D D Ligamentum fibulam tibiæ jungens, & externos musculi ab internis distinguens.
 E Externus malleolus.
 F F Secundus flectentium pedem, sive Semifibuleus Spigellii extra situm.
 G G Primus flectentium pedem extra situm.
 H Extendens secundum digitorum internodium cum quatuor suis tendinibus, (a a a a) extra situm positus cernitur.
 a a a a Interossei decem musculi, quodammodo in externa pedis parte inter ossa pedii comparentes.
 IIIII Offa pedii.
 KKKK Radices digitorum, in quas Interossei musculi inseruntur.
 L L L L Radices digitorum, in quas Interossei musculi inseruntur.
 M Dorsum pedis.
 N Flexura pedis.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XL EXPLANATIO.

FIGVRA I.

- P** *Rimum oblique pedem moventium musculum in suo fere situ continet.*
- A A** Duo capita inferiora femoris.
BBB Tibiæ os.
C C C Fibula à musculis libera.
DDD Oblique pedem moventium, sive adducens, totus carnosus, usque ad internum ferè malleolum, hic non amplius in suo integro situ conspicuus.
E Tendo teres, quem hic musculus educit, & in pedem inferiorem inserit.
F Pars inferior ligamenti lati, tibiam fibulæ neçtentis, quod musculos in tibia jacentes in anteriores & posteriores dirimit.
G Processus ossis tibiæ, qui internum malleolum constituit.
H Calcaneus.
I I I Flecentium pedem secundus.
K Hujus tendo teres juxta medium longitudinis fibulæ incipiens, in ostarli parvum digitum sustinens insertus.
M Vnus ex interosseis musculis, pollicem ad interna ducens, in suo situ.
N Pollicem flectens extra situm.
O Vnus ex interosseis musculis.
P Transversalis Placentini musculus, cujus historiam postea tabula ultima trademus, in suo situ.
Q Alius ex interosseis musculis, in suo situ, minimum digitorum abducens.
R R T T Musculi lumbricales extra situm.
R R R Portio carnosà à qua lumbricales musculi enascuntur, extra plantam pedis, ubi situs ejus erat, tracta.
S S S S Quatuor tendines tertium digitorum internodium flectentis musculi, à quibus lumbricales oriuntur, hic abscissi sunt.
T T T T Quatuor musculorum lumbricalium tendines.
V Oblique pedem moventium secundus, extra situm.
X Planta pedis.


FIGVRA II.

- S** *Secundum oblique pedem moventium, & tertium digitorum internodium, ac pollicem extendentes, ostendit.*
- A** Externum latus genu in pede dextro.
B C D Oblique pedem moventium secundus, Spigelio Fibuleus, alius Peroneus primus vocatus, in suo situ conspicuus.
B Principium ejus validum nerveumque à superiore fibulæ appendice (V) prodians.
C d Venter ejusdem teres, carnosus, externa parte (C) lividus, interna (d) rubicundus.
DD Ejusdem tendo circa medium longitudinis fibulæ enatus.
E E Secundus flectentium pedem, alius Peroneus secundus dictus, Spigelio Semihibuleus.
F Tendo ejus teres, qui ad fibulæ posteriora reflexus, sub externo malleolo in ostarli parvum digitum sustinens inseritur.
G Extendens tertium digitorum internodium parte inferiore conspicuus.
HHHH Tendines quatuor ejusdem in digitos distributi.
I Quintus tendo ejusdem musculi, nonnunquam ad pollicem amandatus.
KKKK Membraneum quoddam ligamentum quatuor hos tendines conviciens.
L Pollicem extendens nondum ex omni parte detectus.
a Principium ipsius à medio fibulæ.
b Tendo ejusdem.
M N O Primus flectentium pedem, sive Tibiæ auticus aliorum.
M Principium ejus acutum & nerveum, antè tibiam fibulæque superioribus appendicibus enatum.
N Venter ipsius carnosus.
O Tendo ejusdem rotundus, qui nonnihil oblique inferius anticnemium superectus, prope pedis articulum, in internum latus ossis pedii, quod pollicis ossi præponitur, implantatur.
P Ligamentum transversum, sive annulare pedis.
Q Calcaneus.
R Malleolus externus.
S Extendens secundum digitorum internodium, magna ex parte adhuc tendinibus tectus.
T V Appendices superiores, T quidem Tibiæ, V autem Fibulæ.
X Ligamenti lati tibiam fibulæ alligantis nonnulla portio.

FIG. II

FIG. I.

TAB. XXXX.



LIBRI QVARTI TABVLÆ XLI DECLARATIO.

FIGVRA I.

- T** *Ertii digitorum internodii, tum pollicis flexores in suo situ ostendit.*
- Æ Portio infima femoris relicta adhuc, reliqua vero superiore abscissa.
- A Genu interna sui parte.
- B Internum femoris caput.
- C Externum femoris caput.
- D D Tibiæ os.
- E E Fibulæ dimidia pars nuda à musculis, cujus superiorem appendicem E superius designat.
- F G Suppopliteus musculus, siue Oblique tibiam mouens extra situm.
- F Principium huius latum & membranofum.
- G Finis ejusdem carnosus in interna parte ossis tibiæ.
- g g Locus in quo situs erat hic musculus.
- H Tertium digitorum pedis internodium flectens.
- I In hac parte quæ media est longitudinis tibiæ, incipit hic musculus tendinosus fieri.
- K Tendo exquisitus huius musculi in situ.
- L L Adducens pedem, siue Oblique pedem ad interiora mouens, nondum totus conspicuus.
- M Pollicis flexor.
- N Initium teretis tendinis prope malleolum internum, ubi oblique sub malleolum, eodem, quo flexor tertii internodii munitus ligamento, ad tertium pollicis articulum progreditur.
- O Pollicem adducens in suo situ.
- P P Secundus pedem extendentium musculus, siue Gasteronemius internus Spigeli extra situm.
- Q Plantaris musculus extra situm quoque hic in terram prostratus jacet.
- R R R Longissimus & rotundus tendo huius musculi.
- S Calcaneus, in quem hi duo musculi implantantur.

FIGVRA II.

- E** *Osdem musculos: sed una primum oblique pedem mouentem demonstrat.*
- Æ Femoris, abscissa superiore, infima pars adhuc relicta.
- A A Duo inferiora femoris capita.
- B B B Os tibiæ.
- C C C Fibula.
- D E E Tertium digitorum pedis internodium flectens musculus.
- D Acutum principium huius musculi quod à tibia exoritur.
- E E E Gracilis & carnosus venter ejusdem musculi, levatus aliquatenus, ut adducens pedem, quem tegebat, in apertum veniat.
- F F Tendo vnicus ejusdem musculi, qui prope internum malleolum (N) ad plantam pedis descendit, ubi † in quatuor alios tendines G G G G dirimitur, qui in tertium internodium, a a a a per fissuras secundum articulum flectentis, transeuntes, illigantur.
- GGGG Quatuor illi tendines ex uno huius musculi tendine orti, una cum musculis lumbricalibus ad interiora pedis ventum.
- H Carnea illa portio, quæ à calcaneo enata, una cum quatuor prædictis tendinibus musculos lumbricales constituit.
- I I Pollicis flexor in suo situ totus cernitur.
- K K Tendo teres pollicem flectentis, qui partim in primum pedii os, partim in ultimum pollicis internodium implantatur.
- L L Adducens pedem, siue Oblique pedem ad interiora mouens, in suo situ totus videtur. Hic observa, quomodo ab utroque osse, tibia & fibula, oritur, interque ipsa supra ligamentum, musculos distinguens, ad internum malleolum usque carnosus descendat.
- M Tendo teres, quem hic musculus producit.
- N Malleolus internus.
- O Calcaneus.
- P Minimum pedis digitum abducens extra situm.
- Q Secundum digitorum internodium flectens, extra situm.
- R Pollicem adducens extra situm.
- ††††† Tertium internodium digitorum pedis.



TABVLÆ XLII DILVCIDATIO.

FIGVRA I.

Latus musculi Plantaris tendinem demonstrat.

- A A Tibiæ portio in summo pede relicta.
 B Internus malleolus.
 C C Calcaneus.
 DDDD Tendo latus, qui à calcanei in ferna magisque interna parte prodit, & progrediendo semper fit latior, atque in singulos digitos (a a a a) inferitur, in suo situ.
 a a a a
 E E Pollicem adducens ab interna parte calcis exortus, & primo offi pedii, quod pollicem sustinet, adhærens, in suo situ.
 F F Minimum digitum abducens, musculus ab externa parte calcis enatus, & ultimo pedi offi, cui minimus digitus superstat, cohærens, in suo situ.
 G G Duo ex decem interosseis musculis, minimum digitum extendentes, in situ.
 H H Duo alii musculi ex his, pollicem extendentes.

FIGVRA II.

Flexorem secundi digitorum internodii, pollicem adducentem, & minimi abductorem continet.

- A A Calcaneus.
 Æ Tibiæ infima portio abscissa.
 B B B B Tendo latus Plantaris musculi, extra situm.
 C C C Flexor secundi digitorum internodii, siue Perforatus, ex calcis anteriore latere prodiens, in suo situ.
 D D D Quatuor teretes tendines ab hoc musculo equati, qui ad singulorum quatuor digitorum articulos secundos abeunt, & in fine perforantur (a a a a), omnes in proprio situ locali.
 a a a a
 E e Pollicem adducens in suo situ, cujus principium e est.
 F F Tendo ejusdem musculi, qui in primum os pollicis latere interno inferitur.
 G G Minimum pedis digitum abducens, à calce ad parvum digitum proficiscens.
 H H Tendo hujus musculi teres, in externum latus primi internodii minimi digiti insertus.
 I I Duo ex decem interosseis musculis externum latus ultimi offis pedii occupantes.
 K K K K Quatuor primum digitorum internodium flectentes, Lumbicales dicti, à quatuor tendinibus tertium digitorum internodium flectentis enati, in suo situ.
 L L L L Quatuor tendines tertium digitorum articulum flectentes, siue Perforantis.
 M M Portio tendinis, quam pollicis flexor mittit.



1 2 3 Tria digitorum internodia, quorum ordo ab adscripto numero indicatur.

FIGVRA III.

Quatuor primi digitorum internodii flexores, Lumbicales dictos, ostendit.

- Æ Tibia prope articulum abscissa.
 A A Calcaneus.
 B Tendo musculi tertium digitorum articulum flectentis, abscissus ea parte qua adhuc unitus est.
 C Tendo pollicem flectentis musculi.
 D D D Carnea portio, quæ à calcaneo exoritur, rectisque fibræ ad divisuram tendinis tertium digitorum articulum flectentis, accedit, ibique principis quatuor musculorum lumbicalium implantatur.
 E E E Quatuor tendines tertium digitorum articulum flectentis musculi, teretes, in suo situ denudati usque ad tertium os, in cujus medium aliquomodo dilatati desinunt.
 F F F F Musculi quatuor Lumbicales, primum internodium flectentes à tendine musculi tertium digitorum os flectentis, & à portione illa carnea à calcaneo enata, oriundi.
 G G G G Musculorum lumbicalium tendines, qui in interstitiis digitorum ipsos concidunt, & per eorum dorsum excurrunt.
 H H Duo ex decem interosseis musculis, externum latus ultimi offis metatarsi occupantes, in situ.
 I I Minimum pedis digitum abducens è suo situ remotus.
 K K Principium hujus musculi, quod offi calcis adnatum erat, latum, nervosum, & asperum.
 L Vnus tendo hujus musculi, qui in os metatarsi minimum digitum sustinens, inferitur.
 M M Alter tendo ejusdem musculi, in parvi digiti externum latus desinens.
 N Flexor secundi digitorum internodii siue Perforatus, extra situm.
 O Principium hujus musculi nerveum & acutum.
 P P P P Quatuor tendines ejusdem musculi teretes, in fine perforati.
 Q Q Pollicem adducens extra locum positus, sed suo adhuc tendine pollicis cohærens.
 R R Duo musculi ex illis decem interosseis pollicem flectentes.
 S Offi metatarsi minimum digitum sustinentis nonnulla portio.
 1 2 3 Idem quod in præcedente figura significant.

TAB. XLII.



LIBRI QVARTI

TABVLÆ XLIII EXPLICATIO.

Ostenduntur aliquos digitorum motores, sive Interosseos musculos, & Transversalem pedis à Placentino inventum proponit. PRIMA figura in situ eos spectandos exhibet: SECUNDA, extra situm pedis ossibus sibi adhuc connexis. TERTIA similiter à sede naturali remotos, sed & ossibus quibus adhaescentur à reliquo pede abscissis.

FIGVRA I.

- A Calcaneus.
 a Infima pars tibiae abscissa propè articulum.
 B Ligamentum robustum à calcaneo ad os pedii pertinens.
 C Duo interossei musculi ad indicem pertinentes.
 D Musculus ex interossei una cum sequente ad pollicem pertinentes.
 E Musculus ex decem interossei cum præcedente pollicis insertus in suo situ.
 FG Duo alii musculi interossei externum latus ultimi ossis pedii tenentes, ad parvum digitum pertinentes.
 HH HH Reliqui musculi interossei, in suo adhuc situ.
 IKL Musculum hunc princeps laboriosissimus Anatomicus D. Julius Casseus Placentinus invenit, id officii ipsi assignans, ut digitum magnum ad parvum ducens, cavum efficeret pedem. Ex hoc duplicem utilitatem nasci credidit, ut & in inæqualibus locis, & similiter in planis ejus beneficio commodissime ambulemus. In inæqualibus quidem, cum ipso se contrahente quasi apprehensio quædam fiat, quemadmodum certe observamus, dum per saxosa loca incedimus, pedem à nobis contrahi, ut tutior fiat & facilior gressus. In planis verò etiam non agens, pedi instar ligamenti est, prohibens ne digiti à se invicem nimis abducantur. Orietur autem hic musculus à ligamento articuli primi minimi, (nonnunquam etiam annularis) digiti, mox carnosus factus, transversim defertur, & supervectus primos digitorum articulos, in primum pollicis articulum nonnihil parte interna insertitur. Caput habet nerveum ac latiusculum; Ventrem mediocriter crassum: Tendinem brevem & latum. Hic musculus à Spigelio non est descriptus, si quis tamen referre in album musculorum

pedis cupiat, facile ex hac descriptione poterit. Ceterum ipse inventor ab obliquo progressu Transversalem nominabat.

- I Principium hujus transversalis musculi ex ligamento primi articuli minimi digiti emergens.
 K Venter mediocriter crassus.
 L Finis latus, & brevis, pollicis primo articulo parte interna insertus.
 M Carneæ portio à calce duobus acutis initiis, ad continuandos quatuor musculos lumbricales, enata, extrahit hic cernitur.
 N Extremitas tendinis tertium internodium flectentis musculi abscissa, ut videatur quo pacto unà cum carne prædicta Lumbricales musculos efficiat.
 O Musculi quatuor Lumbricales, sibi invicem adhuc juncti.
 PPPP Tendines quatuor musculorum lumbricalium.

FIGVRA II.

- A Os calcis.
 a Infima pars tibiae abscissa propè articulum.
 B Ligamentum illud à calce ad pedem abiens.
 CCCC Quinque musculi interossei, qui digitos adducunt, à pedis interiori parte, & in primum os digiti sui quilibet fere interiore iligatur.
 DDDD Quinque ceteri interossei musculi, digitos abducunt, sive oblique ad exteriora trahentes.
 E Transversalis musculus pedis Placentini, extra situm.
 FFFF Quatuor ossa pedii à musculis libera, & denudata.

FIGVRA III.

- ABC Ostenduntur primi articuli digitorum, quibus interossei musculi inseruntur. A, pollicis est; B, indicis; C, medii.
 DE D, annularis; E, minimi.
 FFFF Quinque interossei musculi digitos ad interiora adducunt, suis tendinibus extra situm pendentes.
 GGGG Reliqui quinque musculi interossei digitos abducunt, sive oblique extra situm ab ossibus pendentes.
 H Transversalis Placentini, & ipse suo tendine adhuc pollicis articulo annexus pendulus conspicitur.

TAB. XLIII

FIG. I.




FIG. II.





FIG. III.



TABVLÆ LIBRI QVINTI, EARVMQVE EXPLANATIO.


TABVLÆ I EXPLICATIO.

T Abula hac, sublato Ventriculo, & intestinis una cum omento ex naturali loco remotis, venæ portæ, & ramorum Arteriæ magnæ ipsam comitantium per inferum ventrem, distributionem proponit.

- A A Fundus Ventriculi ad Thoracem sublatus.
 B B B B Intestina extrâ naturalem situm posita.
 C Omentum, ea parte qua dorso nectitur.
 D D D Omentum, quâ parte intestina tegebat dependens.
 E Hepatis pars gibba prominens.
 F Hepatis pars cava, quæ pylorum tegebat.
 G Ventriculi orificium inferius, seu Pylorus.
 H Duodenam intestinum pyloro continuum.
 h Porus biliaris, à vesica fellis sub hepate latente ductus, & duodeno insertus.
 I I I Mesenterium intestinis cohærens, cum divaricatione venarum mesaraicarum.
 K Truncus Venæ portæ ex Hepatis cava parte emergens.
 L L Ramus sinister Venæ portæ, Splenica Vena dictus, qui ad Lienem tendit.
 M Ramus dexter, Mesenterica Vena dictus, qui in Mesenterium digeritur.

- N Gastrica major, à superiore splenicæ sede enata.
 O O Venæ portæ, & Arteriæ magnæ rami Gastrici, fundum Ventriculi perrepantes, & undiquaque propagines diffundentes.
 P P Rami Vasorum à splenica vena derivati, & per Ventriculolum sparsi.
 Q Sima Lienis superficies, & vasorum in eam insertio.
 a b Divisio venæ splenicæ (L L) propè finem lienis (Q) in duos ramos, unum, (a) superiorem, alterum, (b) inferiorem.
 R Vas breve à superiore ramo (a) derivatum, ubi Splenicæ vena (L L) lienem (E) ingreditur.
 S S Truncus arteriæ magnæ, comes trunci Venæ portæ.
 T Ramus Splenicus arteriæ magnæ.
 V Rami ab arteria splenica ad Ventriculolum digesti.
 X Ipsi in Lienem ingressus.
 Y Arteria Mesenterica, ad Mesenterium propagata.

Ceterum brachium sinistrum fasciæ veluti ad Venæ splenicæ ligatum exprimendum hic curavimus, (cum antea tale non esset) ut demonstraremus, quomodo valvulæ eo sic constructæ apparere soleant, quod in historia, lib. 5. cap. 1. Spigelius innuit. Hæc sigæ 1 insignimus.



LIBRI QVINTI

TABVLÆ II DECLARATIO.

Præfens Tabula in eum finem facta est, ut Venæ portæ ramus, qui Colon intestinum adit, potissimum conspiciatur.

AAA Omentum.

BB Colon intestinum.

C Ligamentum coli.

D Venæ portæ ramus, per totum colon derivatus.

E Arteriæ Celiacæ pars, Venæ comes.

F Nervi septimi paris, quod in Mesenterio reliquum est, filamenta sua spargit.

GGG Intestinorum tenuium gyri.

H Coli intestini principium.

I Intestinum cæcum.

LL Arteriæ umbilicales.

M Vrachus.

TAB. II.




TABVLÆ III DILVCIDATIO.

Vena Cavae integra, & ab omnibus partibus libera, delineationem exhibet. In hac Truncus, & insigniores Ramos majusculis literis insignivimus. Propagines vero, minusculis, & ubi hae defecerunt, cyphris barbaris.

- AD TRUNCVS ASCENDENS Venæ Cavae, cujus initium circa A, quod regionem designat, qua lecur in hujus figurae proportionem consisteret: finis circa D. Indivisus enim à convexa hepatis parte, circa quam spargit ramulos *aaa* usque ad jugulum progreditur, propagines tamen nonnullas, & quidē tres spargit. Ex his *Prima* est *aa* Vena Phrenica dicta, quæ utrinque in Diaphragma, & ipsi obnatum pericardium, tum mediastinum digeritur. *Altera*, Vena Coronaria, *bb*, quæ coronæ modo cordis balin amplectitur, ad mucronē furculis plurimis dispersis. *Tertia*, Vena Azygos, sive Conjugis expers, *cc*, quæ à Cavae dextro latere supra cor, circa quintā thoracis vertebrae prodians, juxta dextrum vertebrarum latus ad secundam fere lumborum usque descendit. Hujus propagines decem sunt, *ddd* costarum totidem intervallis obseis oblatae, quæ intercostales inferiores vocantur.
- B Demonstrat, quomodo truncus AD, propter cordis situm dextrorsum incurvetur.
- C Cavae Venæ officium in dextrum cordis ventriculū pertinet.
- DEE Trunci ascendens circa jugulū in duos ramos EE, qui s Subclaviæ venas appellant, divisio. Ex his plures nascuntur propagines, alia quidem ab inferiore, alia à superiore sede procedentes.
- Ex inferiore sede quinque nascuntur. *Prima*, Intercostalis superior dicitur, *e* & ad trium superiorū costarum intervalla furculos duos ff spargit. *Secunda*, Mammaria, *g*, quæ sub sterno descendens ad abdominis rectos usque, musculos, cum epigastrica ascendente 9 per anastomosis 10 jungitur, costarum verarum cartilagineis intervallis, ut & mediastino, & musculis pectori intratis furculos largiens. *Tertia*, Mediastina *h*, in mediastinum disscinditur. *Quarta*, Vertebralis, *i*, per foramina transversa vertebrarum cervicis processibus insculpta ascendit, musculis vertebribus intratis furculos digerens.
- Quinta*, Cervicalis, *l* in musculos cervicis inferiora, & thoracis summa occupantes, digesta.
- Ex superiore sede tres procedunt. *Prima*, *m* Iugularis interna, quæ ubi graciles furculos, faucibus, & auris regioni transmissit ramo exteriori, interno Carotidi arteriae semper commissa, propē Calvariam in duos ramos (Encephalicos Spigeli) dividitur, ex quibus posterior & major, *n* per occipiti foramen secundū calvariam ingressus, in membranae crassæ sinum primum, 1, & secundum, 2, inferitur, *oo*. Anterior verò, & minor, *p* per cuneiformis ossis foramen septimum ingressus per latera crassæ membranae dispergitur. *Secunda*, *q* Iugularis externa, per colli latera ascendens, juxta aures in duos ramos distribuitur, quorum alter *Profundus*, *v* variè in laryngis, & ossis hyoidis musculos, tum linguam, palatum, narium cavitatem, ac denum in cranium tribus propaginibus dissecinatur, ex quibus illa, quæ ex oculi sede anteriore per cuneiformis foramen secundum transit, *r* optimè hic expressa est. *Alter subcutaneus*, *u*, primum in faciei musculos & cutim anteriore ramo *x* dispergitur, qui circa nasi verticem cum conjuge suo coit, & Frontis venam constituit: deinde alii posteriorem promit, qui partim secundum tempora sursum repit, *z*, partim post aures ad occipitis cutim fertur, *a*. *Tertia*, Cervicalis superior, *β*, in posteriores cervicem occupantes musculos propagatur.
- Tres sunt sinus crassæ cerebri membranae, 1, primum, sive dextrum denotat: 2, secundum, sive sinistrum, 3, tertium. Hujus pars posterior, quæ occipitio propinquior, adumbrata cernitur: anterior, quæ fronti adstat, lucida est. Ab hoc multæ venulæ, quas ductus vocant, ad latera utrinque exporriguntur.
- F Axillaris venæ nomen subclavia hic induit, & in duos ramos dividitur, Cephalicum G, & Basilicum I. Ante divisionem tamen duos furculos spargit, *primum*, Scapularum internam dictum, 1, *alterum*, Scapulare

- externam, J. Sed & Basilica I, antequam brachium ingreditur, duos propagat, *unum*, Thoracicum superiorem dictum, *e*, qui per internam musculi pectoralis faciem, & in feminis, per mammam, digeritur: *alterum*, Thoracicum inferiorem, *ζ*, qui Aniscliptorem adiacens secundum thoracis latus descendens.
- Vena Cephalica, quæ antequam dividatur, furculum *n* in deltoideum, & alium *h*, in cubiti musculos, amandat.
- Vbi Cephalica ad articulum cubiti pervenit, ad externum humeri tuber in tres ramos fecatur. H. *Primum*, *i*, sive profundus, & medius ad musculos ab eodem tubere enatos abit. *Secundus*, *κ*, sive Interior, ad Medianam, *λ*, constituendam proficiscitur. *Tertius*, *μ*, sive Exterior, oblique *v*, per radiū ad brachium externum fertur, & ubi oblique sic semper repens, ad carpi radicem venit, cum basilica ramulo *τ* jungitur, & Salvatellam constituit.
- Vena Basilica, quæ à dextris Hepatica, à sinistris Lienaria dicitur. Hæc ante divisionem furculum *o* in capita musculorum cubiti digerit: deinde alium *π* infigem, quæ oblique delatus, musculis ab externo humeri tuberculo ortus furculos largitur.
- Divisio Basilica K in duos ramos, *unum* Profundum: *alterum*, subcutaneum. *Profundus* L, ubi ad cubiti flexuram pervenit, in duos dividitur, M, quorum alter ad radium. Radius dicitur N, alter ad cubitum, Cubiteus, O, ad manū accedit. *Subcutaneum* P, juxta humeri tuber internam dividitur Q, in anteriorem R, qui cum interiore Cephalicæ ramo *κ*, Medianam *λ* conicit, quæ similiter in duos dividitur ramos, quorum exterior *ε* Cephalica manus à quibudam dicitur, & ad pollicem abite: interior *σ* ad indicem, & medium, *Exterior*, *ς*, carpum petens, versus digitum minimum Cephalicæ exteriori juxta *τ*, jungitur.
- Valvula, quæ in artuum venis inveniuntur eleganter hinc, veluti transparentes, exculpatae.
- TRUNCVS DESCENDENS Cavae, qui circa regionem hepatis incipit, T, & quintam lumborum vertebram finit, V. Hujus furculi quatuor sunt: *Primum*, *υ*, Adiposā, ad membranarum renū digesta. *Secundus*, *φ*, Emulgens, ad renem secedens. *Tertius*, *ψ*, Preparans vas, quorum dextrum *χ* ex trunco T, V: sinistrum *ψ*, ex sinistra emulgente oritur: utrumque postea in testes, *ω*, secedens.
- Quartus*, Lumbares tres, 4, 4, 4.
- Bifurcatio trunci descendens V, in duos *Iliaicos* X, X, quorum uterque rursus in alios duos dividitur, *Interior*, *Y*, & *Exterior* Z. Ante tamen hanc divisionem, duæ promuntur, Quilba lumbalis, 5, & Sacra, 6.
- Interior* *Iliaica* antequam extrā peritonæum vadat, duas promit propagines, *primam*, Glutæam, 7, & *secundam*, Hypogastricam, 8. Reliquum eis in femoris internam partem peritonæum transiens absorbuntur.
- Exterior* *Iliaica* similiter ante egressum tres, *primam* Epigastricam, 9, in epigastrii & Rectos abdominis musculos spargit, ubi per anastomosis, 10, junguntur. *Alteram*, Pudendam, 11, in pudenda. *Tertiam*, Coxalem, 12, circa coxendicem occupantes musculos.
- Hic exterior *Iliaica* peritonæo superato crux ingreditur, & *Cervicalis Trunci*, T, vocari incipit, indivisus usque ad duo inferiora femoris capita. Porrigit autem quatuor propagines ante divisionem. *Prima*, 13, Saphæna est, quæ per cruris interiora sub cute ad lumbos digitos perreptat. *Altera*, 14, Ischia in cutim ossis coxendicis sparsa. *Tertia*, 15, Muscula, tibiā extendentibus transmittitur. *Quarta*, 16, Poplitea, in suram digeritur.
- Saphæna* quatuor furculos & ipsa spargit. *Primum*, 17, in superiorem cutem internæ femoris regionis. *Secundum*, 18, circa medium femoris. *Tertium*, 19, in genu. *Quartum*, 20, ad tibie mediū antorsum, & retrorsum ductur.
- Divisio trunci cruralis propē duo capita femoris inferiora, in raturum interiorum *Θ*, & exteriorum *Α*.
- Interior gasterocnemis musculus ramulos largitur, 21, deinde sub malleolo interno ad Pollicem descendit, 22.
- Exterior *Α* statim in duos ramos scinditur, internum *Ξ*, & externum *Π*. Ille in suræ musculos totus absorbuntur: hic juxta fibulam progreditur, per externam & posteriorem tibiæ partem.

TAB. III.




TABVLÆ LIBRI SEXTI, EARVMQVE EXPLANATIO.

TABVLÆ I EXPLICATIO.

P <i>Propagines Arteria magna, Venam Cavam, & Portæ, per infimum ventrem comitantes, aequaliter demonstrat.</i>		a b	terium progrediens.
A A	Hepatis pars cava, ex qua vena Portæ egreditur.		Mefenterici rami divitio in dextram, & finiftrum notatur.
B	Vesicula fellis.	N	Arteriæ magnæ ramus Celiacus, qui hic in dextrum & finiftrum subdividitur.
C	Cervix vesiculæ biliaris, qua parte ductus bilarios excipit.	O c d	Dexter ramus bifurcatus, cujus una pars in Vesiculam felleam, (c) altera in hepatis cavum inferitur (d)
D	Ductus bilarius ad duodenum intestinum tendens.	P	Sinister ramus, arteria Splenica dictus, qui in lienem implantatur.
E	Pars glandulosa intestini duodeni, in quam potus bilarius se ingerit.	Q	Lienis pars summa, in quam rami Splenici, tam Venæ Portæ, quam Arteriæ Celiacæ inferuntur.
FFFF	Intestinorum extra situm collocatorum varii gyri.	R	Venæ & Arteriæ Splenicæ rami Gastrici dicti, hic à Ventriculo seposito, abscissi.
GGG	Mefenterium cum propagatione vasorum, & intertextu glandularum.	S	Earundem ramus, qui ad intestinum rectum fertur, & Hæmorrhoides constituit.
H	Venæ portæ truncus ex cava hepatis prodiens.	T	Vena emulgens siniftra.
II	Venæ cavæ truncus descendens.	V	Arteria emulgens siniftra.
K K	Arteriæ magnæ truncus descendens.	X	Pars summa renis siniftri, cui vasa emulgentia inferuntur.
L	Venæ Portæ ramus sinifter, sive Splenicus, ad Lienem tendens.	Y	Arteria mesenterica.
M	Venæ Portæ ramus dexter, sive Mefentericus, ad Mefen-	Z	Vena spermatica siniftra.

TAB. I



LIBRI SEXTI

TABVLÆ II EXPLICATIO.

Arteria magna integra & ab omnibus partibus libera delineationem complectitur.

A Arteriae magnae, quo ex sinistro cordis ventriculo erumpit, amplum initium: mox autem ac enata est, & antequam pericardio adhuc excidat, duas Coronarias, *a, a*, basin cordis coronae modo cingentes educit.

B Pericardio vero mox superato, dividitur in duos truncos, quorum alter *Ascendens*, *C*, alter *Descendens*, *Q*.

C *ASCENDENS TRUNCVS* *C*, quamprimum in duas subclavas arterias *D, D*, dividitur: quarum utraque, ubi primam costam attingere, plures propagines spargit, partim ex elatiore, partim humiliori sede.

D *Ex inferiore sede* prodeit *Intercostalis superior b*, quatuor superiorum costarum intervallis singulas soboles communicans.

Ex superiore sede tres, *Prima*, *Vertebris*, *c*, per transversos cervicis vertebrarum processus ad calvariam usque proropens. *Secunda*, *Mammaria*, *d*, quae subferno descendens, ad umbilici usque sedem excurrit, & furculos in verarum costarum cartilaginum intervalla digerit, atque hinc in musculos pectori intrat, circa umbilicum tandem per anastomosis, *x*, epigastricae, & ascendenti conjungitur. *Tertia*, *Cervicalis*, *e*, musculis in cervicis regione politis ad occipitum usque propagatur.

E Ramis his ductis aliam adit, & *axillaris* nomen circa *E* induit, sicque in brachium diffunditur. Ante tamen quam ingrediatur, furculos nonnullos ex utraque sede educit. *Ex ex inferiore* quidem tres, quorum *primus*, *f*, *Scapularis interna* dicitur, quod in musculos scapulae cavam sedem integes absumatur. *Secundus*, *g*, *Thoracica superior*, in musculos anteriorem thoracis sedem occupantes, dispersus. *Tertius*, *h*, *Thoracica inferior*, quae secundum Thoracis latera descendens, in Anascapitorem humerum abducentem musculum, inferitur. Inter *g* & *h* ramulus occurrit, eorum unus, qui hic in alae glandulas diffeminatur. *Ex elatiore parte* eumpit una, *i*, quae *Scapularis externa* dicitur, in musculos scapulae externam sedem tenentes, digesta.

F *Hoc loco Axillaris* nomen mutat, & *Brachialis truncus* dicitur, usque ad *G* undivisus, duos spargens furculos *l*, & *m*, in musculos humeri osteges posteriore sede; aliosque duos *n, n*, utrinque unum circa cubiti flexuram.

G *Bipartitio Brachialis arteriae* sub cubiti flexura, in ramum anteriorem, *H*, & anteriorem *I*.

H *Exterior ramus* hujus bipartitionis, sive *Radiens*, recta secundum radium ad carpum excurrans, ramumque digerens, *o*, in musculos sitos inter os pollicis primum, & metacarpium indicem sustentis: alios deinde tres *p, p, p*, qui in primos exteriores digitos disperguntur.

I *Interior ramus*, sive *Cubitus*, secundum cubiti os incedens, in duos tandem interiores digitos gemino ramo abforbetur.

L *Ascendens trunci reliqua portio*, quae juxta superiorem sterni partem in duos ramos *M, M*, *Arterias Carotides* dictos, scinditur. hi recta sursum secundum colli latera tendunt, ac ubi ad fauces pervenerunt, in duos ramos circa *N* dividuntur, quorum alter externus est, *O*, alter, internus *P*.

O *Externa carotis*, ad buccas & faciei musculos soboles propagat, & circa aurem, in duos ramos secatur, *anterior*, *q*, qui per tempora fertur, & posterior, *r*, secundum aures posteriora sub cute diffeminatus.

P *Interna carotis*, calvariam petens, juxta cujus basin in duos ramos distribuitur, quorum alter, *S*, *minor*, *s*, qui durae membranae suum lateralem subit, hic qua in calvariam mergitur, abscissus est: alter & major, *t*, per foramen

proprium in osse temporum exsculptum cranium subit, cujus distributio, tab. 11. lib. 10. tradetur.

Q *DESCENDENS* magnae *ARTERIE TRUNCVS*, deorsum ad dorū vertebras explicatus. Ab huiusmodi ante divisionem *R* sparguntur soboles, quas ordine nunc recitabimus. Primum ergo sunt *Intercostales inferiores*, *u, u*, ad octo costarum inferiorum intervalla digestae, à quibus propagines medullae spinali, musculis dorso & thoraci adnatis, offeruntur. hinc progreditur *Truncus* alias duas digerit *Arterias Phrenicas*, *x, x*, dictas, quod in Diaphragma distribuuntur, hanc sequitur *Celiacae*, quae omissa est hic, praecedenti tabula ostensa, ne characterū copia delineationem magnae Arteriae penitus corrumpere. Inde *Mesenterica superior*, *y, y*, in Iejunum & Ilium intestinum, tum eam Coli regionem, quae à Cavo hepatis ad dextrum usque renem pertinet, expandit, *Emulgentes arteriae*, *z, z*, ad renes propagat: hinc *Spermatice*, *a*, ad testes abeuntes, sub quibus *Mesenterica inferior*, *β*, in Coli finitram partem, rectumque intestinum fecedens, Hemorrhoidales arteriae constituit. Tandem *Lumbares* *γ, γ, γ*, quae geniculatim lumborum vertebras accedunt, in peritonaeum, & musculos vertebris adnatis distribuitur.

R *Eductis* his ramis circa quintam lumborum vertebram *S* *Truncus* dividitur in duos ramos, *S, S*, *Iliacos* dictos, quorum uterque rursus in alios duos dirimitur, *Interior* *T*, & *Exterior* *V*. Ante tamen hanc divisionem in ipsa trunci bifurcatione enascitur *facta*, *δ*, in facioffis foramina ad medullam ejus digesta.

T *Interior Iliaca* duas propagines educit antequam peritonaeo excidat, ab exteriori sede *Gluteam*, *ε*, in natium musculos digestam: ab interiori, *Hypogastricam*, *ζ*, in veticam penemque, & in mulieribus quoque in uteri fundum. Inde descendit, *arterias umbilicales*, *η, η*, juxta Aorte longitudinem sursum tendentes educens, Reliquum sub *θ*, portionem ab externa Iliaca ascensens, per pubis offis foramen in crurum delabitur, suo termino cum musculo, crurali interiore, *γ*, circa *o* coiens.

V *Exterior Iliaca* similiter ante egressum duas producit. *Primam*, est *Epigastrica*, *ι*, in epigastrii, & rectos abdominis musculos digesta, ubi cum mammaria descendente, *d*, per anastomosis *x* jungitur. *Altera*, *κ*, *Pudenda* *λ*, *μ*, pudenda abit.

X *Hoc loco exterior Iliaca*, peritonaeo superato, *Crus* ingreditur, ac *Cruralis Truncus* vocari incipit, qui plures furculos propagat. *Primus* est, *Muscula cruralis exterior*, *μ*, in musculos propagatus, anteriorem offis femoris sedem amplexans. *Secundus*, *Muscula cruralis interior*, *ν*, per tertium femur flexentem, & eos quoque internam femoris sedem occupant, digestus, cujus extrema cum extremis Iliacae interioris circa *o* coeunt. *Tertius*, *Poplitea*, *ξ*, in musculos posteriorem femoris sedem occupantes, excurrans. *Quartus*, *Saralis arteria*, *ε, ε*, quae gemina est, eo loci ducta, ubi truncus cruralis inter duo inferiora femoris capita reconditur, utrinque in genu articuli, & capita duo musculi proximipedem extendentis protensa.

Y In poplite hic constitit magna arteria, ubi in ramos inaequales dirimitur.

σ *Surculus* ab externo latere ductus, & fibulae inter abducentem pedem, & secundum tarsum flexentium exporrectus.


Z *Truncus* per tibiam posteriora descendens.

τ *Ramus* ex posteriore sede trunci enatus, sed sublimior.

υ *Ramus* ex posteriore sede trunci enatus, inferior.

Γ *Trunci reliqua portio* per tibiam descendens, quae maleolo interno ramulum *φ* offert.

χ *Divisio* trunci *χ* in ramum anteriorem *ψ*, ad interiores tres digitos: & posteriorem *ω* ad exteriores tres propagatum.



TABVLÆ LIBRI SEPTIMI, EARVMQVE EXPLANATIO.


TABVLÆ I EXPLICATIO.

Nervorum à Cerebri medulla, dum adhuc calvaria continetur, enata oſſo paria, cum ſuis ramis, & propaginibus: Cerebrum item, ac Cerebellum, in dextro tamen omnia hac latere expreſſa, complectitur. Septimi autem ſextique conjugorum ſiniſtri nervi hic quoque delineati ſunt, propter variam ſexti paris in utroque latere ſeriem.

- A B Cerebrum A. Cerebellum B.
C Proceſſus cerebri, quos Mammillares vocant.
D Doſalis medulla, cranii amplitudinem egreſſura, ſed hic abtruncata.
1 Primum par nervorum Cerebri, ſive Nervus Opticus, qui in oculi tunica expanditur.
2 Secundum par nervorum Cerebri, ad palpebrarum & oculi muſculos, ſed quatuor tantum, quatuor ramis diſgeſtus.
3 Tertium par nervorum Cerebri, quod Veſalius tertii paris nervorum minorem & graciliorem ac durioſiorem radicem facit. Hoc quatuor ſpargit a ramos. *Primus*, b, obliquoſum oculi ſuperioris, inde per foramen oſſis frontis ſupra oculi orbitam excidens, ad muſculos ſuperioris (hæc frontis aliorum) diſtribuitur. *Secundus*, c, per quarti maxillæ ſuperioris oſſis foramen in faciei muſculos. *Tertius*, d, in narium tunicam intextitur. *Quartus*, e, temporali muſculo inferitur.
4 Quartum nervorum cerebri par, quod Veſalius tertii paris majorem craſſioremve radicem conſtituit. Hujus rami tres ſunt. *Primus*, f, qui contortus capreoli vitis inſtar, in temporalem muſculum inferitur, & duos à quinto pari, i, ramos, n & o notatos admittens, in maxillam inferiorem attollentem, & buccarum muſculos inferitur. *Secundus*, g, ſuperiorum molarium dentium gingivis, ipliſque adeo dentibus ſurculos ſeriatim diſtribuit. *Tertius*, h, in maxillam inferiorem proropens, & dentibus ſurculos iii ordinatim communicans, poſtea ramo, k, in labium inferius inferitur. Reliquum quod eſt hujus nervi, l, in linguæ tunicam diſſolvitur.
5 Quintum nervorum cerebri par, cujus portio litera m inſignita, in auriſ membranulam diſfunditur. At n anterior & ſuperior ramus eſt: o, poſterior & inferior: uterque autem cum quarti paris ramo i coit.
6 Sextum par nervorum cerebri, cujus utroſumque nervorum ſeries hic exprimitur. Ex his ſiniſter nervus eſt, qui ſub quinto pari, ſignatus I, delabitur: dexter, qui propè Cerebellum B conſiſtit. Deſcribemus primo dextrum, deinde quid ſiniſter peculiare habeat enarrabimus.

- p A DEXTRO ergo primo ſurculus p, ad cervicis muſculos ſpargitur, deinde alius q, ad Laryngem. Inde in duos ramos dividitur E, unum exteriorem F, alterum interiorem, G.
r r Exterior, ſtatim ſurculos r r ad muſculos à ſterno & claviculis enatos mittit, inde mox alios ſpargit i l, qui Recurrentem dexteri lateris nervum t efficiunt, mox in ſu lateris muſculos, laryngi inferientes, multis ramulis u, diſſuſus. hinc ſub jugulo oblique deſcendens F, pulmoniſ tunicam ſurculos x digerit, alioſque in pericardium y, ulterius autem delapius, in duos ramos ſcinditur z, qui nervum ſtomachicum dextrum conſtitunt, in plurimas propagines a a poſtea diſſuſi.
G Interior ramus ſecundum radices vertebrarum deſcendit, Coſtalis propterea dictus. Singulis hic ramus intercoſtalibus nervis ramulum largitur, β β inde diaphragma perforans uſque ad os ſacrum abit, ubi ternas proſpect propagines. *Prima* eſt H, quæ in tres iteum digerit, primam educit γ, in inferiorem omenti membranam ſparſam. *Secundam* δ, in teſtino duodeno & jejuni principio communicatam: *Tertiam* ε, in dextram fundi ventriculi ſedem excurrentem. Reliqua pars ζ ad jejunum cavam partem proſiſcit. *Secunda* I, in dextrum renem abit. *Tertia*, K, in dextram meſenterii regionem, & hujus ſedis teſtina frequenti ſobole diſſunditur. Reliquum hujus rami η, in veſicæ dextram ſedem implectitur.
6 t SINISTER ſexti paris nervus, cujus exterior ramus L, ubi aliquam multos ramos ad ſimilitudinem dextri propagaverit, circa δ quosdam ſurculos educit. Recurrentem nervum i conſicientes, qui dextri in morem progreditur. Reliquum x deſcendit, & ad dextrum oblique ſe inclinans, in ſuperioris ventriculi oriſicili dextram partem concedit. reliquum λ, in hepatis cavum abſumitur.
M Interior ramus ſuperato diaphragmate in tres propagines ſolvitur. *Prima* μ, tranſverſum ad lienem abit, ramo ν: in itinere autem hoc, duos ſurculos educit, unum α, qui in omenti membranam inferiorem, & coli teſtina partem ipliſ atteniam, digeritur: alterum, ω, in Ventrículi fundum, ſuperioremque omenti membranam. *Secunda* ρ, in ſiniſtram meſenterii ſedem, ejuſque loci teſtina excurrit. *Tertia* σ ſiniſtrum renem accedit. Quod reliquum eſt τ, in Veſicæ ſiniſtrum latus, & uteri fundum inferitur.
7 Septimum par nervorum cerebri. hoc cum ſexto par communi membrana involvitur, & ubi ad linguæ radicem pervenit, in omnes ejus muſculos ſurculos υ υ digerit.
8 Octavum par Spigelii, nervos olfactorios conſtituens.

TAB. I.



LIBRI SEPTIMI

TABVLÆ II & III DILVCIDATIO.

Cerebri medulle, dum per spinam fertur, nervorum
 triginta paria duabus tabulis, presenti inquam &
 subsequa, exprimentur. His, utrique communes caracte-
 res inscripsimus, quanquam & plerisque proprios, quibus
 tabula numerum confestim subiecit. Prima autem spi-
 nae vertebrae, & inde prodeuntes nervos anteriore facie
 complectitur: secunda, posteriore exhibet.

1. 2. &c. usque ad 7 septem cervicis vertebrae.
 8 usque ad 19. Duodecim cervicis vertebrae.
 20. usque ad 24. Quinque lumborum vertebrae.
 25. usque ad 30. Sex sacri ossis ossa. His iisdem numeris & spinalis
 medullae paria indicantur.

A 2. 3. Spinalis medullae, qua primum ea vertebrae ingreditur,
 1. 2. B C sedes. Primum par cervicis, cuius anterior propago B.
 posterior C.

2. 2. D Secundum par, cuius anterior propago D. posterior E. ab hoc
 duo rami oriuntur, alter tenuis, alter E signatus: alter
 E 3. F crassus, F, qui cum tertii paris ramo, M, circa C com-
 mifcetur. Series autem ejus ad verticis & occipiti cu-
 tem litera H designatur.

3. 2. I Tercium par cervicis, cuius ramus anterior, I, in quatuor di-
 viditur propagines. Prima, K, musculus cervicem flecten-
 K 2 tibus inscribitur. Secunda, L, cum furculo quarti pa-
 L 2 ris, Q, commifcetur. Tertia, M, Posterioris secundi
 M 2 parisi propagini crassiori, F, nechtur. Quarta, N, in-
 N 2 feritur musculus, qui transverfis vertebrae processu-
 bus committuntur. Posterior ramus, O.

O 3
 4. 2. P Quartum par cervicis, cuius ramus anterior, P, in tres findit-
 Q 2 ur propagines. Prima, Q, quae cum tertii propagine
 R 2 secunda, L, coit. Secunda, R, in transversalem cervi-
 T 3 cis abut. Tertia, S, posterior, T.

5. 2. V Quintum par cervicis, cuius ramus anterior, V, qui aliquot
 furculos educit. Primum, cervicis flexores adit, inter V,
 X 2 & numerum 6, in secunda figura conspicuus. Secundus,
 X nervi diaphragmatis maximam portionem consti-
 tuens. Tertius, Y, Deltoideum adit, cuius propago est,
 a, quae cutem, deltoideum & bicipitem integram accedit.
 a 2 Quartus, b, ad scapulae cervicem in duos scindit-
 b 2 ur ramos: unus, c, in deltoideum intrat, qua parte è cla-
 c 2 vicula oritur: alter, d, eidem implantatur, loco quo à
 d 2 scapulae spina nascitur. Posterior ramus, e.

6. 2. f. Sextum par cervicis, cuius ramus anterior, f, qui ubi furcu-
 g 2 lum, g, propagavit, qui cum quarto quintoque pari,
 S, & X, nervum diaphragmatis constituit, cum duo-
 bus sequentibus jungitur, h, sicque nervum diaphra-
 h 2 gmatis, i, efformat, ut adeo ex tribus sic ipse ena-
 i 2 scatur furculus, S, X, & g. Posterior l.

7. 2. m. 2. n. 3. Septimum par cervicis, cuius ramus anterior, m: po-
 8. 2. c. 2. sterior: Primum par thoracis, cuius anterior ramus, o,
 qui cum septimo pari cervicis, & secundo thoracis u-
 nitur, p, sparsa lobole, q, per superiorem primae costae
 p 2 q 2 sedem. Posterior, r.

9. 2. t. 2. Secundum par thoracis, cuius anterior ramus furculum edu-
 u 2 cit, r, per primum costarum spatium excurrentes: & fur-
 x 3 culos, u, ad thoracis musculos secedentes. Posterior, x.

10. 11. 12. usque ad 19 inclusivè. 2. Nervorum paria, à nono ad vi-
 gesimum usque, quibus eadem panè propaginum, & po-
 tiffimum ad costarum intervalla est series. Horum an-
 teriores soboles (fig. 2.) in musculos anteriorem thora-
 cis sedem occupantes sparguntur, partimque in corum

y 2 elatiorem regionem, ut, y: partim humiliorem, z, qui
 z 2 feminis mammas quoque adeunt: deinde alios in
 a 2 capita obliqui descendunt abdominis, a, & in hu-
 meri abducentem β. alius papillam adit γ. Posterior δ.
 β 2 γ 2 Primum nervus brachium accedens, qui in exte-
 δ 3 nae brachii
 s 2 sedes cutem dispergitur.

ζ 2 η 2 Secundum brachium petens, cuius primae duae propagines, θ, &
 ι, ad duo bicipitis capita abeunt: deinde cum tertio nervo
 ι 2 coit, furculo ζ: tertio propaginem longiori fert radium
 pronatori, θ. Circa flexuram autem in duos ramos di-
 viditur, externum, ι, & externum x. Ille, ι, secundum
 radium descendens, ad externam secundi pollicis in-
 ternodii sedem inferitur, λ, hic, x, in duos ramos moy
 μ 2 subdividitur, anteriorem, μ, & interiorem, ν. hic, ν, in
 o 2 terum in cubiti regione finditur in anteriorem ο, & in
 q 2 posteriorem π.

ρ 2 Tercium brachium subiens nervus, ρ, antequam brachium al-
 tingit, furculum ipargit inter pectoralem & deltoideum
 σ 2 σ, mox ubi brachium ingressus, in secundam cubiti
 τ 2 flectentem alium, τ, digerit. Inde descendens à secun-
 υ 2 do nervo ramum accipit υ, ubi flexuram superavit in
 φ 2 plurimos musculos digeritur, φ, tandem circa volam
 χ 2 manus in tres ramos dividitur, χ.

ψ 2 Quartum brachium ingrediens nervus, omnium brachium
 petentium maximus, in secunda figura literis inligat-
 us non est, sed in tertia tantum, ne secunda literis an-
 nimium obliteraretur. Hic subito ac brachium invasit,
 furculos exiguos, ω, in cubitum extendentes porrigit,
 unde alium in cutem internam sursum & dorsum, ξ, &
 Γ Δ Θ alium in humiliorem sedem, Δ, aliumque, Θ, qui ad
 carpum ulque progreditur. Inde juxta flexuram in
 duos dividitur ramos, externum, Δ, & internum, Π. Il-
 le, Δ, circa transversum ligamentum iterum bifariam
 dividitur, Ξ, hic, Π, secundum longitudinem cubi
 Σ φ ψ porrectus, soboles plures educit, primam, ζ, &
 Ω 1 secundam, φ, tertiam, Ψ. In progressu deinde aliam Ω. Re-
 liquum quod est, in carpum finit, 31.

32. 2. Quintus brachium invadens, qui circa humeri internum
 33. 33. tubum, ad tertii similitudinem diffeminatur: Hujus fur-
 34. 35. culus primus, 33. secundus, 34. tertius, 35.

36. 2. Sextus brachii nervus, qui sub cute incedit, plures multos im-
 37. 38. pertiens furculos, 37. 37. 37, cuius finis est 28.

20. 21. 22. 23, 24. 2. Quinque paria nervorum lumbalium, 20, pri-
 mus est: 21, secundus: 22, tertius: 23, quartus: 24,
 quintus.

39. 2. Ramus quidam à primo pari lumbali, 20, inchoans, &
 cum arteria praeparante ad testem plerumque descen-
 dens.


40. 2. Series nervorum per abdominis musculos: ab his rami
 41. 2. 41, ad abducentem humerum abeunt.

42. 3. Posteriores rami nervorum lumbalium.

25. 26. 27. 28, 29, 30. 2. Sex paria nervorum ossis sacri. Ex his 29,
 primum est: 26, secundum: 27, tertium: 28, quartum
 29, quintum: 30, sextum.

43. 2. Surculus ab anteriore ramo primi sacri ossis internae il-
 lum ossis, internae ilium ossis sedi, ipsique adeo ab-
 44. 2. dominis musculus ab ilium osse prodeuntibus, expor-
 rectus: alius deinde à posteriore ilium ossium dorsum
 occupantibus, expansus.

45. 2. Spinalis medullae terminus, absque conuge, & indivisus
 procidens.




- 46 2 *Primus cruris subscens nervus*. Enascitur hic ubi tertius lum-
 47 48 2 borum cum quarto coit 47. Hujus ramus 48, cutem
 49 2 accedit, at 49, musculis exteriorem femoris sedem oc-
 cupantibus implicatur.
- 50 51 2 *Secundus cruris nervus*, cujus propago insignis 51 cum sa-
 phena ad pedem extremum eadem fere excurrit, ubi-
 52 2 que circa 52 definit. Interim insignem alium furculum
 53 54 2 genu sedi profert 53, at reliquum trunci, 54, femoris
 55 2 profundiora subit, & ramulum 55, facile primarium,
 elargitur.
- 56 57 2 *Tertius cruris nervus*, cujus soboles 57 Obturatores muscu-
 58 59 2 los adit: & alter 58, cutem: reliqua portio 59, in al-
 to permanet, musculis implicata, cujus soboles præci-
 60 2 pua est 60, quæ in tibiam flectentem secundum ac ter-
 tium inferitur.
- 61 2 *Quartus*, idemque omnium crassissimus cruris nervus, cu-
 62 2 jus primus ramus est 62, qui in cutem natum inferitur:
 63 2 alter 63, in musculorum à coxendicis appendice enata
 64 2 capita digeritur: tertius 64, qui quinto tibiam flecten-
 65 2 ti tribuitur aliique 65, in gasterocnemium externum
 musculum, & plantarem euntes. Circa autem femoris
 66 2 capita inferiora, in duos ramos dividitur 66, exteri-
 67 2 rem scilicet 67, & interiorem 72.
- 68 2 *Exterior ramus*, cujus soboles 68, cuti subtenditur, externam

- 69 2 tibiam sedem, externumque pedis latus invellenti. Ali-
 70 2 ramus ipse 69, hbulæ cum tibiam ossæ connexum petens
 71 2 educens furculum alium 70, anteriorem tibiam sedem
 sub cute implicantem: reliquum ejus 71, secundum fi-
 bulam porrigitur.
- 72 73 2 *Interior ramus*, cujus soboles 73, internam tibiam sedem
 versus suram, & internum pedis latus sub cute peram-
 74 2 bulat: alia deinde 74, in cutem spargitur, suræ potissi-
 75 75 2 mum obductam. Alia item 75, 75, quæ in anteriore
 tibiam secedit, per ligamentum fibulam tibiam ossi com-
 mittens postea in superiori pedis sede absimitur. Po-
 76 2 strema 76 quæ inter gasterocnemium internum & ex-
 77 2 ternum excurrit. Reliquum trunci secundum interio-
 rem malleolum pedis humiliora petit, singulorum di-
 gitorum humiliori sedi binos furculos distribuens.

TAB. III FIG. II, & III.

HÆ dua figura nervos brachii crurisque ampliore,
 quam secunda tabula forma delineatis exhibens, ut
 accuratius in his omnia demonstrari queant. Cæterum
 utuntur communibus characteribus, eademque earundem
 explicatione.

TABLE III.




TABVLÆ LIBRI OCTAVI, EARVMQVE EXPLANATIO.

Proponuntur in his Tabulis omnes infimi Ventris partes, eo ordine, quo in Dissectionibus occurrunt conficiendæ, ut quilibet ex ipsis suo Marte & industria Anatomiam administrare, & universam imi ventris historiam queat addiscere. In his peculiariter observatum est, ut non tantum exterior singularum partium facies, quod ab aliis Anatomicis factum est: sed etiam intimiores particule omnes apertæ demonstrantur.

TABVLÆ I EXPLICATIO.

Q uatuor universalia nostri corporis tegumenta, Cuticulam, Cutim veram, Pinguedinem, & Membranam carnosam, quæ in abdominis regione potissimum ab Anatomicis demonstrari solent, ostendit.		FFF	Distributio quorundam ramorum Venæ cavæ per pinguedinem.
A	Cuticulæ portio, ea sui parte, qua subditæ cuti adherēbat, representatur.	GG	Copiosæ glandulæ hoc loco in inguine utrinque sitarum inflammationes à Medicis Bubones dicuntur, & frequentissimæ sunt in Peste, ac Lue venerea.
BBC	Cutis à cuticula, & pinguedine separata.	HHH	Linæ albæ (sic vocatæ) locus naturalis, quæ abdomen in dextram, & sinistram partem dirimit.
BBB	Cutis facies interior, quæ pinguedinem respicit.	I	Umbilicus, abdominis & universi corporis centrum.
C	Cutis facies exterior, cui cuticula adnata erat, in qua pori conspiciuntur.	KKK	Membrana musculorum abdominis propria.
D	Membrana carnosæ, quæ licet sub pinguedine situm suum habeat, hic tamen supra cutem reflexa, extra pinguedinem picta est.	LLL	Musculorum rectorum intersecciones nervæ, quæ hic subtendinibus musculorum obliquorum adhuc tectæ, & involutæ sunt, ita tamen artificiosè adumbratæ, ut transparenere videantur.
EEEE	Pinguedo in suo adhuc relicta situ, ut demonstretur, quomodo per totam abdominis regionem protendatur.	MMM	Nervi, quos cutis ex intimioribus partibus huc venientes sensus gratia accipit, in ipsa dissectione satis conspicui.
		NNN	Cutis cum membrana carnosâ extrorsum revoluta, ut prædictorum nervorum in ipsam ingressus cernatur.

TAB I.




LIBRI OCTAVI TABVLÆ II DECLARATIO.

R Emotis quatuor tegumentis communibus, quinque musculorum abdominis paria in conspectum se proferunt, quæ propterea benignus Lector huc, ex quarto libro, transferre potest, cum nobisco magis pertinere videbantur. His Peritonæum proximè subjacet, quod præsens tabula unà cum naturali sub ipso reconditorum Viscerum situ, quæ ob tenuitatem ipsius nonnihil transparent, representat.

- AAAA Quatuor communia tegumenta decussatim dissecta, & ab imo ventre in vicinas partes diducta.
 BBBB Musculi abdominis, eodem modo dissecti, & ex suo loco ad conterminas partes remoti.
 CC Os pectoris, quod Sternum communiter dicitur.
 D Cartilago eniformis, cui peritonæum adnecitur.
 EEEE Peritonæum universam imi ventris cavitatem obvelans, & ambiens, quod eleganti ingenioque artificio à crypta punctis lineisque alternatim se excipientibus sic expressum est, ut subiecta viscera transparenere videantur.
 FF Hepatis, sub peritonæo naturalem adhuc situm habentis, adumbratio.
 G Fistula in quam Vena umbilicalis L inferitur.
 GG Ventriculi, quantum ob incumbens Hepar videre licet, obscura effigies.
 HH Lienis, in sinistro hypochondrio siti imago.
 IIII Intestinorum multiplices anfractus, obscurè hic apparentes.

- K Vmbilicus.
 L Vena umbilicalis, quæ, ut exactius cerneretur, à peritonæo involucri liberata exhibetur.
 MM Arteriæ duæ umbilicales.
 N Vrachus, in medio arteriarum, à vesicæ fundo ad umbilicum ascendens.
 OO Venæ portæ propagines, quarum rami sursum & deorsum, partim ad Ventriculi fundum, partim ad Omentum distribuuntur, sub peritonæo transparentes.
 PP Processus peritonæi in quibus vasa præparantia continentur, tum cremasteres musculi, qui ad testes in scrotum descendunt. Hi si laxentur, aut rumpantur, Herniam inducunt, descendente omento aut intestino, vel ad inguina, aut scrotum, unde diversæ herniarum differentie nascuntur.
 QQ Testium musculi, Cremasteres, sive Suspensores dicti, quibus dexter in suo ferè situ cernitur, sinister verò suspensus dependet.
 RR Testes scroto exuti.
 S Os pubis.
 T Penis.
 V Exortus Venæ epigastricæ, quæ per Rectos abdominis musculos ad Vmbilicum ascendit.
 X Arteria epigastrica dictæ Venæ comes.
 Y Venæ epigastricæ propago quædam.
 Z Arteriæ epigastricæ propago quædam.


TAB. II.



LIBRI OCTAVI
TABVLÆ III DILVCIDATIO.

Abatis omnibus tmi ventris tegumentis, tam communibus, quam propriis, Omentum, & viscera in ipso contenta, in conspectum proferuntur.

- | | |
|--|--|
| <p>AAAA Peritonæi decussatim secti, & ad vicinas partes remoti, quatuor portiones, in quibus interiorem ejus faciem glabram ac lævem videre est.</p> <p>B Cartilago ensiformis.</p> <p>CC Iecoris gibba pars.</p> <p>DD Fundus Ventriculi, per quem multi Venæ portæ rami disperguntur: cæterum omento annexus.</p> <p>EEE Coli intestini ea pars quæ sub Ventriculi fundo sita est, & sub Omento, cui alligatur, hic eminet.</p> <p>FFFF Omentum ad Vesicam usque protensum, in quo numerosissimæ Venæ, tum connexio cum Ventriculi fundo, Lienisque & Hepatis cava parte observanda.</p> | <p>GG Lienis pars summa, extrorsum nonnihil mota, ut Omentum ipsa connexio rectius conspiciatur.</p> <p>H Umbilicus à peritonæo liberatus.</p> <p>II Vena Umbilicalis, quomodo ab umbilico sursum obliquè tendens Hepatis rimam in summa parte ingreditur.</p> <p>KK Arteriæ duæ umbilicales, ab umbilico sub vesicæ lateribus descendentes.</p> <p>L Vrachus, à Vesicæ fundo ad Umbilicum ascendens.</p> <p>M Vesicæ urinariæ fundus.</p> <p>N Os pubis ablata cute hic conspiciuntur.</p> <p>O Penis cum scroto, à corpore dependens.</p> <p>PP Pars intestinorum ab omento nuda.</p> <p>Q Glandulæ inguinales eleganter conspiciuntur.</p> <p>RR Portiones cutis, quæ abdomen tegebat, reflexæ.</p> |
|--|--|



LIBRI OCTAVI

TABVLÆ IV DILVCIDATIO.

Omentum, cum Ventriculo, & Colo intestino, quibus adnectitur, duabus hac Tabula figuris demonstrat. *P R I M A*, anteriorem Omenti partem, quemadmodum in corpore occurrit dissecantibus delineat: *A L T E R A*, in-
verso Ventriculo, & Colo, posteriorem partem conspicien-
dam exhibet.

*Elementorum utrique figuræ communium
Expositio.*

- A A A** Ventriculus, cum suis vasibus eleganter conspicuus.
B Superius Ventriculi orificium, ab œsophago abscissum,
& filo, Anatomicorum more, constrictum.
C Inferni orificii sive Pylori sedes.
DDD Fundus Ventriculi, ex quo superior Omenti membrana
enascitur.
E Ductus biliaris in duodenum intestinum insertio.
F Duodenum intestinum Ventriculo adhuc continuum, cæ-
terum à jejunio resectum.
G Nervorum stomachicorum soboles per ventriculum
sparsæ.


Reliqua elementa primæ figuræ.

- V**enæ portæ rami in secunda figura distinctius cernendi.
I I I Coli intestini ea pars, quæ sub Ventriculo sita, Omenti
membranae inferiori ortum largitur.
K K K Ligamentum illud in Coli elatiore regione situm, quod
impedit quo minus ejusdem cellulæ dissolvantur.
L L L Omenti membrana inferior, quæ à Colo intestino oritur.
M M M Omenti membrana superior, quæ à fundo Ventriculi
nascitur.
N N Venæ portæ rami, per Omenti membranam inferiorem
excurrentes.
O O Pinguedo Omenti magno artificio à sculptore expressa.

Reliqua elementa secundæ figuræ.

- H** Venæ portæ ramus, qui Coronalis vulgò dicitur.
I I Gastrica Vena major, Ventriculi fundum perreptans,
ramo Splenico enata.
K K Gastrica Arteria major, dictæ Venæ sociæ, à Cæliaco ra-
mo exorta.
L L L Colon intestinum sub Omento eminens.
M M M Omenti membrana superior, in qua frequentiores multo,
quàm in inferiore venæ observandæ.

TAB. IV.



LIBRI OCTAVI TABVLÆ V. EXPLICATIO.

T Abula hac omnia, quæ circa intestina notatu digna occurrunt, completiuntur.

FIGURA I.

I Ntestinorum situm, & cum vicinis partibus connexionem demonstrat.

- A A Ventriculus.
- B B B Hepatis pars cava.
- C Venuculæ biliaræ corpus, in hepatis cavo existens.
- D Venæ cavæ truncus, ex hepatis gibba sede emergens.
- E Venæ portæ truncus, ex hepatis limbo originem ducens.
- F Arteria Hepati & Venuculæ biliaræ ab Aortæ ramo Cæliaco concessa.
- G Nervulus in hepatis tunica à sexta nervorum cerebri conjugatione diffeminatus.
- H Pori bilarii in jejuni intestini principium insertio.
- I Duodenum intestinum è dextro ventriculi orificio enatum.
- K Jejuni intestini initium.
- L Ejusdem progressus.
- M M Ileum intestinum.
- N Locus ubi Ileum in Cæcum & Colon definit.
- O Intestinum Cæcum ad dextri renis regionem constitutum.
- P P P Intestinum Colon in naturali situ conspicuum.
- Q Rectum intestinum, & ipsum naturalem situm observans.
- R Musculus Sphincter, extremitatem recti intestini, quæ Podex dicitur, circulariter amplectens.
- S S Duo alii musculi, in rectum intestinum, ad id retrahendum inserti, unde Ani levatores vocati.
- T Anus, seu Podex.
- V Vena umbilicalis.

FIGURA II.

Portionem tenuium intestinorum ostendit, ut vasorum in ea insertio conspiciatur.

- A A A Portio intestini tenuis, mesenterio adhuc cohærens.
- B B B Portio mesenterii, in qua præter membranousam substantiam Pinguedo, Glandulæ, & Vasa expressa.
- C Venarum Melaraicarum foboles.
- D Arteriæ mesentericæ propago.
- E Nervulus ad intestina transmissus.

FIGURA III.

E Andem intestini portionem exhibet, sed exteriore, seu communi tunica alicubi sublata, ut interior in conspectum veniat, & vasa mesaraica nuda videantur.

- A A Intestini, quæ adhuc integra est, portio.
- B B Intestini portio, in qua communis, & externa tunica, à propriis, & internis tunicis divisa & elevata est, ut vasorum excursus, & internarum tunicarum substantia cernatur.
- C C C Media intestinorum tunica, sive propriarum exterior, communi sublata, nuda hic conspiciatur.
- D E F Vasa mesenterica, D. Vena est, E. Arteria, F. Nervus,

FIGURA IV.

I Ntestinorum tunicam intimam, & propriarum secundam, quæ in tertia figura nondum comparebat, oculis subicit, ut ejus rugæ circulares literis A A A notatæ observentur.

FIGURA V.

E Andem intestini tunicam intimam, sed à parte interiore ostendit, neque intestino, ut in quarta figura inflato, sed secundum longitudinem dissecto, & explicato. Placæ quoque literis A A A signantur.

FIGURA VI.

Coli intestini initium inflatum demonstrat.

- A Finis Ilei intestini.
- B Initium Cæci.
- C C Coli intestini principium.
- D Venæ portæ ramus quidam ad Colon, & Cæcum pertinet.

FIGURA VII.

E Andem Coli partem, sed inversam, ostendit, ut Valvula, quæ in principio est, conspiciatur.

- A Ilei intestini finis.
- B Valvula circularis, cujus cava pars, Coloni: convexa, Ileum respicit.
- C Cæcum intestinum.
- D D Colon intestinum.

FIGURA VIII.

E Andem intestinorum partem exhibet, sed dissectam, ut cavitatem internam conspiciens, Valvulam rectius intuearis.

- A Ilei finis interna superficies.
- B Valvula ad finem Ilei, & Coli principium sita.
- C Cæcum intestinum.
- D D Coli intestini dissectæ interior facies.

FIGURA IX.

I Ntestina crassiora in suo situ, majori paulo forma, quam prima figura, representat.

- A Ilei intestini extremitas.
- B Cæcum intestinum.
- CCCC Colon intestinum.
- D Intestinum rectum.
- E Vnus ex musculis anum elevantibus.
- F Sphincter.
- G Anus.

FIG. VII.




FIG. V.



TAB. V.

FIG. VI.




FIG. IIX.



FIG. III.




FIG. II.




FIG. IX.





FIG. IV.



LIBRI OCTAVI
TABVLÆ VI EXPLICATIO.

M <i>Mesenterium adhuc integrum, sed extra situm nonnihil diductum, monstrat.</i>			
A A A	Omenti membrana inferior, una cum Colo, ex quo nascitur, è propria & nativa sede versus superiora tracta.	F F F	Venæ, Arteriæ, & Nervi, mesenterii membrana adhuc involuti, & pinguedini immerſi, ut nonnihil eorum à centro ad circumferentiam progressus cernatur.
B B B	Coli pars, quæ post ventriculū latebat, suprà hypochondria hic tracta est, ut Mesenterium inspicatur.	GGG	Intestina, tam tenuia, quàm crassa, promiscuè hic à mesenterio dependentia.
C C C	Ligamentum illud Coli intestini, quod cellulas, quò minus dissolvantur, in suo situ continet.	H	Vesicæ urinariæ fundus.
DDDD	Integrum adhuc, sed in diversas partes diductum Mesenterium,	I I	Arteriæ umbilicales.
E E E	Glandulæ, & corpora glandosa, quæ hinc inde inter mesenterii membranas, & pinguedinem disseminata conspiciuntur.	K	Vrachus.
		L	Vmbilicus.


TAB. VI.



LIBRI OCTAVI TABVLÆ VII DILVCIDATIO.

V <i>Asa Mesenterii, & Glandulas à membranis ac pinguedine liberatas complectitur.</i>		K K Arteria Cæliaca, quæ venam portæ comitatur.
A A A Hepatis convexa pars.		L Venæ portæ soboles Cystica, ad Vesciculam fellis digesta.
B B B Hepatis cava pars.		M Venæ portæ ramus Splenicus, ad Lienem abiens.
C C C Lien in sua sede locatus.		N Arteriæ Cæliacæ ramus Splenicus, dictæ venæ comes.
D Duodenum intestinum à Ventriculo, & Iejuno ablatum, ac dextro hypochondrio impositum.		O O Nervus sexti paris una cum vena & arteria mesaraica, in mesenterium diffeminandus.
E Vesica fellis ex cavo hepatis adhuc suspensa.		P b Venæ portæ ramus Mesentericus, cujus insertio in Mesenterium, litera b notata est.
F Meatus bilarius, ex jecore prodiens, quem Spigelius Hepaticum vocat.		P P P Dicti rami, & arteriarum mesentericarum, à superiore membrana, & pinguedine liberatarum, distributio.
G Meatus bilarius, ex fellis vesicula prodiens, quem Spigelius Cysticum appellat, & cum priori jungitur, (a) canalem communem constituens, (a H) qui in duodenum cessat.		Q Q Q Mesenterii membrana inferior, in qua glandulæ hinc inde diffeminatæ conspiciuntur. Hujus principium à dorso est circa literam c.
H Canalis communis in duodenum intestinum insertio.		R R R Intestina mesenterii membranæ adhaerent, ut vasorum in ea terminatio observetur.
I I Venæ portæ truncus.		S Iejuni intestini principium.
		T Glandulæ hinc inde per mesenterium dispersæ.

TAB.VII.



LIBRI OCTAVI TABVLÆ VIII EXPLICATIO.

Ea, quæ circa jecur observanda sunt, proponit.

FIGVRA I.

H *Hepar integrum exhibet, ut quæ foris in ipso notanda veniunt, conspiciantur.*

- A A A** Hepar in sima parte, sua tunica vestitum, & omnino illatum ostendit.
B Vena portæ, & ejus ex sima hepatis sede egressus.
C C Duo trunci venæ cavæ, quæ juxta gibbam hepatis partem conspiciuntur.
D Venæ umbilicalis ex hepate egressus.
E E Vesica fellis in sima hepatis parte sita.
a Fundus est Vesicæ fellicæ qui extra hepar prominere.
b Cervix Vesicæ fellicæ, in cujus parte interna tres Valvulæ sitæ, quæ bilis regressum impediunt.
F Ductus biliaris, Cysticus dictus, quem Vesicula hæc ad intestina producit.
G Alter ductus biliaris, Hepaticus vocatus; cujus rami per hepatis cava dispersi, & in hunc caudicem collecti, ex hepate hic prodeunt, & priori uniuntur, (c) sicque communem canalem constituunt, (c d)
c d Arteria, quæ à ramo Cæliaco ad sima hepatis pervenit.
H Ramus hujus arteriæ, qui hepar ingreditur.
I I Alius ejusdem arteriæ ramus, qui ad vesicam fellicam abit, & Cystica arteria dicitur.
K K Nervus sexti paris cerebri, ad hepar delatus.
M Lobus exiguus, tenui ac subtili membrana cinctus, qui in omentum exporrigitur, & per quem hepar aqua plenum interdum evacuat.



N Eminentiæ hepatis, ab Antiquis Portæ dictæ, unde & Venæ B circa illas emergens, Portæ vena vocatur.

FIGVRA II.

H *Hepar ex carne, sive à parenchymate suo liberatum ostendit, ut vasa ipsius, & ductus bilarii, sive, in summam dicam, omnia quæ in Hepate abscondita latent, evidenter oculis subjiciantur.*

- A A** Venæ Cavæ portio.
B B Truncus Venæ Portæ, ex hepate egredientis.
C C Vesicula fellis.
a Cervix vesiculæ fellis abscissa.
DD Vena umbilicalis in ramum venæ portæ desinens.
E E E Venæ portæ ramos demonstrat, qui cum Cavæ ramis anastomosin junguntur.
E e E e Eos Venæ portæ ramos ostendunt, qui ad Cavæ ramos non accedunt.
F F F Ramos Venæ cavæ designant, qui cum Portæ ramis junguntur.
F f F f Ejusdem Cavæ ramos eos exhibet, qui ad Portæ venam non appellantur.
G G Anastomoses ramorum venæ cavæ, portæque, à nemine adhuc bene demonstratas, perbelle conspiciendas exhibet.
H H Venæ capillares dictæ, quod capillorum tenuitatem præ se ferant. Ex his sensim versus internam hepatis regionem ab ambitu exporreditis quinque insignes ramos E E E E E circa truncum B B consistentes, qui & ipsis conficiuntur, nascuntur.

TAB. IIX



LIBRI OCTAVI TABVLÆ IX EXPLICATIO.

Ea, quæ ad Lienem spectant, omnia ostendit.

FIGVRA I.

- L**ienis parenchyma integrum adhuc, in naturali magnitudine exhibet.
- A A A** Sima lienis pars, in qua vasorum ingressus notari debet.
- a a a** Linea recta, futura dicta, circa quam vasa ingrediuntur.
- B B** Venæ portæ ramus Splenicus ad lienem accedens.
- b** Divisio ejusdem rami Splenici in superiorem & inferiorem ramum, ante ingressum.
- C C** Arteriæ Celiacæ ramus Splenicus, tortuosè ad Lienem abiens.
- D** Anatomosis quædam arteriæ, & venæ Splenicæ, ante ingressum utriusque in Lienem facta, ab aliis Anatomicis nunquam depicta.
- E** Venæ Splenicæ ramus Hemorrhoidalis, quomodo nunquam ex ipso Splenicæ trunco enascitur.
- FF** Arteriæ quædam in pancreas descendentes.
- G G** Pancreas.
- H** Alius ramus venæ splenicæ.

FIGVRA II.

- P**ortionem Lienis sua tunica exutam ostendit, ut pori & laxitas parenchymatis ipsius conspiciantur.
- A A** Parenchyma Lienis detectum, suæ substantiæ porositatem monstrans.

- B B** Pars parenchymatis sua adhuc tunica vestita.
- C C** Portio Tunicæ Lienis à parenchymate liberatæ.

FIGVRA III.

- D** Iscissa per medium lienis portione, ostenditur ad venas nonnullos vasa per ejus substantiam distribui.
- A A A** Lienis portio per medium scissa, in qua melius etiam parenchymatis fungositas apparet.
- B B B** Transversim discissurarum arteriarum patentes oræ, (venæ enim ob tenuitatem tunicarum coincidunt) quarum obiter multitudinem quoque observes.

FIGVRA IV.

- D** Emonstrantur Venæ, & Arteria per Lienem sparsæ, & à parenchymate denudatæ.
- A** Vena Splenica jam jam lienis parenchyma ingressura.
- B** Arteria Splenica similiter parenchyma subiens.
- C** Utriusque anatomosis antequam parenchyma egrediantur maxime conspicua.
- DDD** Venæ, & Arteriæ in infinitos furculos disperisæ, qui omnes per lienis parenchyma feruntur.
- E E** Divisio Venæ & Arteriæ ante ingressum in duos ramos, superiorem & inferiorem.
- FFF** Vasa tenuissima capillorum in morem, in quæ rami majores tandem circa parenchymatis ambitum diffeminantur, quæ propterea ab Anatomicis vasa capillaria dicuntur.

TAB. IX.

FIG. IV.





FIG. I.



LIBRI OCTAVI TABVLÆ X EXPLICATIO.

R *Enem humanum, partim integrum, partim discifsum exhibet, ut ejus tam forma externa, quam vasa, ac partes interiores inspiciantur.*

FIGVRA I.

Renum formam externam, & emulgentia vasa exhibet.

- A A Portio trunci Venæ cavæ descenditis.
- a a Portio trunci Arteriæ magnæ descenditis.
- b b Foramen arteriæ Cæliacæ, quæ hic abscissa est.
- B B Venæ emulgentes.
- c Divisio venæ emulgentis in duos ramos antequam renes ingreditur.
- C C Arteriæ emulgentes.
- d Distributio arteriæ emulgentis in duos ramos.
- D D D Gibba renum pars.
- E E Sima renum pars.
- F Vena ad corpusculum reni incumbens distributa.
- G G Vreteres.

FIGVRA II.

V *Aforum emulgentium ingressum in sima Renum, & Vreteris egressum demonstrat.*

- A Renis pars nondum læsa.
- B B Interior renis tunica separata.
- C Pelvis, quæ ex concursa tubulorum ureteris, in finis renum extruitur.
- D D D Tubuli, sive canales ureteris.
- E Vena emulgens.
- F Arteria emulgens.

FIGVRA III.

P *Progressum eorundem emulgentium vasorum sima renis parte per longitudinem fissâ, ostendit.*

- A A A Labra interna incisione à se invicem divisa.
- B Pelvis Vreteris.

- C Vena emulgens, quæ jam in plures ramos divisa ad gibbæ renis tendit, in tres ramos divisa. a.
- D b Arteria emulgens, Venæ comes, multifariam divisa. b, tum extra locum remoti, ut ei subjacens vena cernatur liberius.

FIGVRA IV.

Vreteris ex sima renis parte exortum adumbrat.

- AAAA Reni sima discissa, & explicata representat.
- B Pelvis ureteris in renum substantia efformatus.
- C C C Tubuli, seu Canales carunculas papillares undique amplectentes, hoc loco de industria divisi, ut carunculae ipsæ rectius conspiciantur.
- D D D Carunculae papillares, quæ urinam in ureteres transcolant.
- E Portio ureteris sima renum egredientis.

FIGVRA V.

R *Ene aperto, Vreteris tubuli, non ut antea, secundum longitudinem, sed potius transversim discissi proponuntur, ut quomodo carunculas undique circumamplēctantur, ostendatur.*

- A A A Discissi renis interiores partes.
- B B B Vreterum, quæ carunculas ambiunt, oræ relictæ proponuntur.
- D D D Carunculae, quas undique ureteres circumamplēctantur.

FIGVRA VI.

R *En per gibbi sui longitudinem scissus est, divisus una carunculis, & ureterum tubulis usque ad finem.*

- A A A Renis in gibba parte diviso.
- B B B Carunculae per medium sectæ.
- C C C Tubuli, sive Canales Vreteris, aperti.
- D Vulus in ipsum usque finem penetrans.

TAB X.

FIG. I.




FIG. IV.



FIG. II.




FIG. V.




FIG. VI.





FIG. III.




LIBRI OCTAVI
TABVLÆ XI DILVCIDATIO.

I *Instrumenta urinaria, cum Genitalibus Viri partibus integris, & in suo situ relictis, ostendit.*

A A Hepatis summa pars.
B Vesica fellea.
C Ductus biliaris ab intestinis resectus, & sursum reflexus.
D Vena Cystica dicta, bilis vesiculam nutrienda.
E Arteria, partim in hepar, partim in dictam vesiculam distributa.
F Vena umbilicalis sursum è suo loco revoluta.
G G Venæ cavæ truncus descendens.
H H Arteriæ magnæ truncus descendens.
I I Venæ emulgentes.
K K Renes, in utroque latere conspicui.
L Arteria emulgens sinistra post venam locata.
M Corpusculum reni incumbens, quod Renem succenturiatum vocant.
N Propago ex vena emulgente in illud corpusculum distributa.
O O Vreteres ex summa renum parte ad vesicam descendentes.
P Vesicæ urinariæ fundus.

Q Q Vreterum ad latera vesicæ descensus.
R Vrachii è fundo vesicæ nascentis, portio.
S Rectum intestinum qua parte cum Colo intestino jungitur, abscessum, & hilo constrictum.
T T Venæ præparantes, quarum dextra ex trunco, sinistra ex vena emulgente nascitur.
V Arteriarum præparantium è trunco Arteriæ magnæ origo.
X X Venarum, & arteriarum præparantium, ubi corpora pyramidalia constituunt, unio.
Y Y Testes duobus communibus tegumentis exuti.
Z Z Vasa deferentia dicta, quæ à testibus ad abdomen ascendunt.
■ Penis, à sua, qua tegitur, cute liberatus, & à corpore dependens.
b b Scrotum quod testes integebat.
c c Illa.
d d Lumbi, per quos ureteres, & vasa præparantia descendunt.
e Ossa pubis.




LIBRI OCTAVI

TABVLÆ XII EXPLICATIO.

E *Adem instrumenta urinaria cum genitalibus Viri par-
tibus, sed extrâ situm naturalem nonnihil remota,
ostendit.*

- A** Hepar in suo situ.
B Vesica fellis in cavo hepatis sita.
C Vena umbilicalis in propriam hepatis rimam inserta, hic
 sursum retracta videtur.
DD Renes, ad quos utrinque vasa emulgentia feruntur.
EE Venæ cavæ truncus descendens.
FF Arteriæ magnæ, sive Aortæ truncus descendens.
G Hoc loco Arteria magna, quæ antè subiacebat, Venam
 cavam ascendit, & in duos ramos Iliacos dividitur.
HH Venæ emulgentes ad renes porrectæ, quarum sinistra lon-
 gior, & superior est.
I Arteria emulgens sinistra.
K Corpusculum reni incumbens, quod Renem succenturia-
 tum vocant.
L Vena, ab emulgente ad hoc corpusculum transmissa.
LL Vreteres à renibus ad vesicam descendentes.
MM Vasa præparantia, è quibus Vena sinistra ab emulgente,
 dextra verò ab ipso Cavæ trunco oritur, licet aliquan-

- do sinistra, & ab emulgente, & ab ipso trunco sinis-
 ter derivetur, quod hic expressum est.
N Intestinum rectum à Colo abscissum, & filo constrictum.
O Vesicæ fundus.
P Vrachii in Vesicæ fundum implantatio.
QQ Sphincter musculus vesicæ cervicem ambiens, & urine
 effluxum prohibens.
R Vrethra, sive canalis urinarius, à Vesica ad penem decli-
 nans.
S Penis.
T Glans penis.
VV Duo collaterales penis musculi, sive Penem erigentes.
XX Duo inferiores penis musculi, Vrethram dilatantes.
YY Arteriarum, & Venarum præparantium infinitæ anastomoses,
 rete referentes, ubi eæ, quæ sunt in parte deorsum,
 tra, magis explicate cernuntur.
ZZ Testiculi utrinque à corpore dependentes.
aa Vasa deferentia.
b Musculus Cremaster, sive Suspensorius, hoc loco è sinis-
 ter situ remotus.
cc Os pubis.
dd Ossis ilium cavitas, intestinorum sedes.
ee Lumbi, per quos Vreteres, & Vasa Spermatica descen-
 dunt.



LIBRI OCTAVI TABVLÆ XIII EXPLANATIO.

E Adem instrumenta urinaria cum viri Genitalibus, sed
de corpore extracta continet, ut horum cum illis con-
nexio, & potissimum testium substantia monstretur.

FIGVRA I.

Vrinatorum vasorum connexionem proponit.

- A A Portio trunci Venæ cavæ propè hēpar, & illa resecti.
- B B Portio trunci Aortæ descendens similiter resecti.
- C C Gibba pars renum.
- D D Sima pars renum.
- E E Venæ emulgentes.
- F F Arteriæ emulgentes.
- G G Corpusculum reni incumbens, sive Renes succenturiati.
- H H Vena adiposa, quæ emulgentis propago est, in illa corpu-
scula desinens.
- I Arteriola bifida, ex arteria emulgente idem corpusculum
dextrum ingreditur.
- K Vena quæ interdum ex rene in prædictum corpusculum
mittitur.
- L L Vreteres.
- MMM Vesicæ rotundum corpus ita positum, ac si fundo suo pro-
mineret. Detracta autem membrana communi, prima
ipsum propria hic expressa est, quam Spigelius pro
musculo habet, Detrusorem urinæ appellans. In hac
diligenter notandæ sunt fibræ a a recta per ipsum cor-
pus excurrentes.
- N Cervix vesicæ.
- O O Sphincter, cervici vesicæ circumdatus.
- P Recti intestini superior & Colo vicina pars, post vesicam
eminens.
- Q Penis.
- R R Duo muscoli penis, qui Vrethram dilatant, sive Penis infe-
riores musculi extra situm.
- S S Duo alii muscoli penis, qui ipsum erigunt, sive Penis col-
laterales musculi extra situm.
- T T Vasa præparantia.
- V V Testes, in suis propriis tunicis adhuc involuti.
- X X Vasa deferentia.

FIGVRA II.

T Estis tunica clythroides ab uno latere detracta est, ut
intima, quæ substantiam ejus immediate comprehen-
dit, (Albugineam vocant) cernatur.

- A Vasis præparantis pars.
- B Vasis deferentis pars.
- C C Testis, intima adhuc & albuginea tunica vestitus.
- D D Tunica clythroides à teste sublata.

FIGVRA III.

Testis ab erythroides in totam liberatus.

- A Vasorum præparantium portio.
- B Vasis deferentis, quod testi adhærebat, portio.
- C C Corpus testis interna propria tunica, sive Albuginea, ad-
huc investitum.

FIGVRA IV.


T Estis propria substantia, remotis omnibus tunicis,
tam propriis, quam communibus, ostenditur, simul-
que vasorum præparantium prope testem implicatio demon-
stratur.

- A A Testis substantia glandulosa.
- B B Albuginea tunica, quæ immediate testem involvebat.
- C C C Venæ & Arteriæ præparantis implicatio, & varia anasto-
mosis juxta ipsarum in testem ingressum, conspicua.
- D D Vas deferens.

FIGVRA V.


Demonstratur vasorum præparantium in testium sub-
stantiam distributio, simulque implicatio vasorum
deferentium hæc a in modum.

- A A Testium substantia glandulosa.
- B B Tunica testium albuginea.
- C C C Venæ & Arteriæ Spermaticæ in testes derivatæ.
- D D Vas deferens capreolorum vicium instar intortum.
- E Venæ, & Arteriæ Spermaticæ.



LIBRI OCTAVI
TABVLÆ XIV DILVCIDATIO.

<i>E</i> <i>Asdem partes, quas præcedens, exemplis è corpore, sed inuertas demonstrat.</i>		M	Glans penis.
AA	Truncus Venæ cavæ.	N	Foramen urethræ, per quod urina, & semen excernitur.
BB	Arteriæ magnæ truncus.	OO	Rectum intestinum.
CC	Venæ emulgentes.	P	Recti intestini foramen, quod Anus, seu Podex dicitur.
DD	Arteriæ emulgentes.	Q	Sphincterani.
EEEE	Renes.	RR	Duo musculi recti, rectum intestinum intrò retrahentes, siue Ani levatores.
FF	Rami vasorum emulgentium derivati in corpuscula renibus incumbentia.	SS	Musculi duo, qui dilatant Vrethram, siue Penis inferiores musculi extra situm.
GG	Vreteres.	TT	Alii duo penem erigentes, siue Penis collaterales musculi extra situm.
HHH	Vesicæ corpus.	VV	Vasa præparantia.
I	Vrethra, siue Canalis urinarius.	XXX	Exquisita demonstratio anastomoseon, & implicationum vasorum præparantium usque ad testem.
KK	Duo nervosa penis corpora, quæ cum Vrethra penem constituunt.	YY	Testis corpus.
L	Præputium.	ZZ	Vasa deferentia, siue Ejaculatoria.



LIBRI OCTAVI
TABVLÆ XV DECLARATIO.

*C*Adaver ossi sacro innisitur, femora verò sursum di-
ducta habet, ut penis & ani partes in suo situ conspi-
ciantur.

- A A Partes circa nates.
B B Pubis regio.
C Penis in naturali suo situ, sed tute nudatus, ut omnes ejus
partes videri queant.
D D Duo nervosa corpora unà cum urethra penem constitu-
entia.
E Urethra, seu meatus urinarius.
F F Duo muscoli urethram dilatantes, sive Inferiores penis
musculi.

- a Principium eorum ab ani sphinctere I.
b b Latus utriusque internum, quo mutuo se tangunt.
c Finis ad medii canalis latus insertus.
G G Duo alii musculi penem erigentes, sive Collaterales penis
musculi.
d d Principium eorum abscissum à coxendicis appendice.
e Finis circa extortum penis insertus.
H Anus, sive Podex.
I Anum constringens musculus, sive Sphincter.
K K Duo musculi rectum intestinum sursum trahentes, sive Ani
levatores.



LIBRI OCTAVI TABVLÆ XVI DILVCIDATIO.

*Ossenduntur in hac Tabula omnia quæ ad penem
pertinent.*

FIGURA I.

*Vesicam una cum pene à corpore exemptam exhibet, ut
absconditæ ejus partes videantur.*

- A A Vesicæ posterior facies, intestinum rectum respiciens.
- B B Vreteres in parte postica, & prope cervicem vesicæ inserti.
- C C Vasorum deferentium portio.
- DD Vesiculæ feminales, granorum mali punici cellulas ordine & figura imitantes, in quas prædicta vasa deferentia, postquam ad posteriorem vesicæ partem pervenerunt, degenerant.
- E E Prostata glandulosi urinarii meatui vel rectius cervici ipsius Vesicæ incumbentes.
- FF Vrethra, seu, Canalis urinarius.
- G G Duo masculi penem erigentes.
- H Glans penis.
- I Vrethrae finis in apice glandis.
- K Præputium.
- L L Duo corpora nervosa penem constituentia.

FIGURA II.

*Easdem partes quas prima, sed paulo explicatius,
ostendit.*

- A A Vesicæ facies posterior.
- B B B Vesicæ discissæ interna facies.
- C C Vreterum portio circa insertionem conspicua.
- D D Vesicæ feminales à membranis omnibus in sinistro latere denudatæ.
- E Membrana, quæ immediate vesiculas investiebat.
- F Vas deferens sinistrum, hoc loco integrum.
- G Idem vas hoc loco apertum, ut interna ejus cavitas appareat.
- H H Vesiculæ feminales dextri lateris non amplius integræ, sed per longum dissectæ.
- I I Cervix vesicæ, & urethræ initium.
- K K Prostatarum glandulosorum, qui urethræ impositi erant, hoc loco facta est incisio, & labra postea incisionis leviter diducta, ut urethra subius appareat.
- L L Duo penis nervosa corpora.
- M Glans.
- N Præputium.

FIGURA III.

Prostatas glandulosas, & his adnexas vesiculas feminales completitur.

- A Prostatarum ea pars, quæ urethræ erat circumposita.
- B Vesiculæ feminales discissæ.
- C C Vesiculæ eadem adhuc integræ, sed omnibus nudatæ tegumentis.

FIGURA IV.

Penis à tegumentis communibus liberatus, ibique abscissus, ubi extra corpus propendere incipit.

- A Dextri nervosi corporis nervosa substantia, transversim abscissa.
- B Spongiosa ejusdem corporis substantia, internam illius cavitatem replens.
- C Vrethra discissæ portio subtus apparens.
- D D D Dorsum penis.
- E E E Vena per idem dorsum excurrentes.
- F F Arteria, utrinque una, hoc loco dividitur, & altera sui parte, per externam penis longitudinem dispergitur; altera, interiora, & spongiosam substantiam pervadit.
- G G G Nervi partim quoque extra, partim intus in penem distributi.
- H Glans penis.
- I I Corona glandis.

FIGURA V.

Nervosum corpus Penis secundum longitudinem dissectum ostendit, ut interioris arterie, & nervi progressus innoscat.

- A A A Dorsum penis, vel superior ejus pars.
- B B B Corporis nervosi, in longum dissecti interna pars.
- C Arteria extra corpus nervosum adhuc existens, sed mox subintratura.
- D Nervus in penis partes internas mox distribuendus.
- E Ingressus arteriæ in spongiosam, & internam nervosi corporis substantiam.
- F Nervi ingressus.
- G G Arteriæ per substantiam spongiosam distributio.

FIGURA VI.

Vrethra situm in pene edocet.


- A A A Vrethra dissectæ interior superficies.
- B Pars urethræ quæ glandem perforat.
- C C Glans.
- D D Duo penis nervosa corpora.

FIGURA VII.

Corpus nervosum dissectum exhibet, ex quo spongiosa substantia ablata est, ut & septum, & pectiniformes fibrae conspiciantur.

- AAAA Interna pars nervosi corporis, à qua omnis spongiosa substantia detracta est.
- B Nervus hoc ipsum corpus ingrediens.
- C C C Arteria nervi comes.
- D D D Septum pellucidum, eique attentæ pectiniformes fibrae, quæ utrumque nervosum corpus intercedunt.
- E E E Rami arteriæ, qui ex hoc corpore nervoso in alterum transiunt per septum.

TAB. XVI.



LIBRI OCTAVI TABVLÆ XVII EXPLICATIO.

V Arius figuris genitales feminarum partes representat. Tribus quidem primis præcipue externas, sive Pudendum: duabus sequentibus, Cervicem; ultima, Os internum, & Fundum.

FIGVRA I.

- V** Efficam, & uterum, cum pudendo à reliquo corpore detraçta ostendit, in suo tamen omnia situ adhuc collocata.
- A A A Pubes, & in ea enati pili.
B Clitoris integra in suo situ.
C C C Labia vulvæ nonnihil diducta, ut subjacentes partes detegantur.
D D Alæ, seu pterygomata & Nymphæ similiter à se divulsæ.
E Foramen cervicis vesicæ, quæ hoc loco in pudendum inseritur.
F Externum cervicis osculum.
G Anus, sive Podex.
H H Vesicæ facies anterior.
I Fundus Vteri.
K K Partes cutaneæ circa anum.

FIGVRA II.

- C** Oninet crura cadaveris propè nates abscissa, & dissecta pudendi labia, ut Clitoridis structura innovetur.
- A A Os pubis detectum.
B B Labra pudendi supernè, dissecta, ut Clitoridis situs monstratur.
C Pars Clytoridis extrema, penis glandem referens.
D Membrana veluti præputium hanc partem contegens.
E Corpus Clitoridis.
F F Duo corpora nervosa, quibus veluti cruribus, Clitoris innititur.
C Externum cervicis osculum.

FIGVRA III.

- P** Aulo explicatus omnes Clitoridis partes, quàm præcedens, exhibet.
- H H Literæ idem hic denotant, quod in præcedenti figura. H, H, verò præter cætera, Venas, Arterias, & Nervos, qui ad Clitoridem propagantur, demonstrant.

FIGVRA IV.

V Terum, cum Pudendo conspiciendum exhibet: sic ut men, ut silius tantum partes externe, hujus internæ videantur.


- A A Pubes, & in ipsa enati pili.
B Clitoris.
C C Alæ, seu Nymphæ.
D Foramen cervicis vesicæ.
E Externum cervicis uteri osculum.
F F Cervicis totius externa facies.
G Regio in qua consistit internum uteri osculum.
H H Fundi uteri exterior superficies.

FIGVRA V.

- C** Cervicem uteri secundum longitudinem apertam, & cula subjicit.
- AAAA Cervix uteri in longum dissecta, cujus sectionis labra exteriorum reflectuntur, ut rugæ interioris membrana conspiciantur.
B Os uteri internum adhuc integrum.
C C Fundus uteri integer.
D D Labra pudendi.
E E Alæ, seu Nymphæ.

FIGVRA VI.

- V** Teri secundum longitudinem dissecta orificium internum, & fundum exhibet, ut ejus interna facies conspiciatur.
- A A Orificium Vteri dissectum.
B Craffities substantiæ uteri propè hoc orificium, cujus operam admiranda illa dilatatio & constricção perficitur.
C C Linea, sive futura, quæ uteri fundum in dextram & sinistram partem dirimit.
D D D Fundi uteri interna pars nullis distincta cellulis.
E E Ingressus & finis vasorum deferentium.
F F F F Sectio per uteri substantiam in longum facta, ut ejus craffities obiter notetur.
a a Rima, eique respondens tuperculum ad id facta, ut orificium uteri accuratus claudatur.
bbbbbb Striæ quædam, & transverse rugæ eidem usui dicatæ.




LIBRI OCTAVI

TABVLÆ XVIII EXPLICATIO.

P *Artes muliebres generationi inservientes in suo situ representat, earundemque à Virilibus differentias declarat.*

- A A Hepatis pars gibba.
- B Hepatis pars ima, seu cava.
- C Pancreas ad thoracem sublatum.
- D Lienis pars gibba.
- E Vena umbilicalis in rimam hepatis inserta.
- F Vesica fellis sub cavo hepatis sita.
- G Duodenum intestinum à Ventriculo, & Iejuno abscissum, ac sursum ad thoracem tractum.
- H Porus biliaris, à Vesicula fellis ad duodenum deductus.
- I I Venæ cavæ truncus descendens, & ejus divaricationes.
- K K Arteriæ magnæ, sive Aortæ truncus descendens.
- L L Venæ emulgentes, à Cava ad renes protensæ, quarum dextra brevior est.
- M M Renes, in quos Vasa emulgentia implantantur.
- N Reni incumbens corpusculum, quod Ren succenturiatus vocari solet.
- O Vena exigua ab emulgente ad illud corpusculum porrecta.
- P P Vreteres ex sima renum parte, ad Vescicam utrinque descendentes.
- Q Vescicæ urinariæ fundus,

- R Vrachi in fundum vesicæ insertio.
- S Intestinum rectum ea parte abscissum, qua cum Colo jungebatur.
- T T Venæ præparantes, quarum dextera, à trunco: sinistra, ab emulgente nascitur. Hæ in via in duos dividuntur ramos, quorum qui major est ad testes, minor ad uterum fertur, hic tamen incuria quadam non sunt expressi.
- V Arteriæ præparantes, ex trunco Aortæ deductæ, quæ similiter ut Venæ, quarum sunt comites, dividuntur, & distribuuntur.
- X Venæ cavæ, & Arteriæ magnæ divaricatio. ubi arteria venam supergreditur.
- Y Y Arteriæ umbilicales, quæ lateribus vesicæ adhærebant.
- Z Vteri fundus.
- a a Testes muliebres.
- b Vasa deferentia, à testibus ad uteri cornua transmissa.
- c c Duo cæca feminis vasa.
- d d Duo superiora uteri ligamenta, vespertilionum alis assimilata.
- e e Duo inferiora uteri ligamenta rotunda, ab inferiore parte, qua clitoridi inseruntur, abscissa.
- f f Cavitas ossium ilium, quæ in feminis amplior, quam in viris est.
- g g Lumbi, per quos Vreteres & Vasa spermatica descendunt.



LIBRI OCTAVI

TABVLÆ XIX EXPLICATIO.

- G** *Enitalia feminarum naturali loco posita continet, nisi quod uterus aliquantulum extra forream ostium illud foras tractus, pubi incumbit.*
- A A** Hepar, in suo naturali situ positum.
- B** Vesica fellea.
- C C** Meatus bilarii, ex hepate bilem in vesiculam convehentes.
- D** Meatus bilarius, per quem vesicula bilem in intestina exonerat.
- E E** Venæ cavæ truncus descendens.
- F F** Arteriæ magnæ truncus descendens.
- G G** Venæ emulgentes.
- H** Arteria emulgens dextera, post venam obscure apparens.
- II** Renes.
- K K** Vreteres.
- L** Dextra vasa præparantia, quæ utraque ex suis truncis oriuntur.
- M** Sinistra vasa præparantia, ex quibus Vena ex emulgente, Arteria ex trunco descendit.
- NN** Testes, in quos dicta vasa præparantia inferuntur.

- O O** Ligamentum uteri superius, nonnihil corrugatum.
- P P** Vasa cæca, quæ Fallopius Tubas uteri nominat.
- Q** Vteri fundus è loco naturali remotus.
- R** Rectum intestinum abscissum.
- S** Vesicæ fundus extra suum locum versus anteriora sepositus.
- T T** Duo inferiora uteri ligamenta, quæ alias in clitoridem desinunt, hic propè finem abscissa, deorsum pendent.
- V V** Arteriæ umbilicales.
- X X** Ossa ilium.
- Y Y** Vasa deferentia, à testibus in uterum inserta.
- Z** Vrachus.
- a a** Venæ iliacæ.
- b b** Arteriæ iliacæ.
- c c** Venæ, & Arteriæ epigastricæ, quæ ab iliacis oriuntur, & per rectos abdominis mûculos ascendentes, cum mammariis per anastomoses junguntur, hoc loco amputatæ.
- d d** Venarum Arteriarumque frequens anastomosis, in utero tandem desinens. Eadem in sinistro quoque latere conspicua est, sed Author in dextro solum demonstravit.


TAB. XIX.



LIBRI OCTAVI TABVLÆ XX EXPLICATIO.

- E** *Asdem partes, quas precedentes duas, sed extrâ corpus,
& paulo explicatius, proponit.*
- A A** Portio trunci Venæ cavæ descendētis.
B B Portio trunci Arteriæ magnæ descendētis.
C C Venæ emulgentes, ex quibus dextra brevior est.
D D Arteriæ emulgentes.
E E E Renes, quorum naturalis magnitudo hic ferè expressa.
F F Corpuscula illa renibus incumbētia, quæ Renes succenturiatos appellant.
 a Venula, quæ præter emulgentem, ad dextrum renem ire, in hoc cadavere inventa fuit, in aliis deesse solet.
G Vena præparans dextra, ex ipso trunco venæ Cavæ prodians.
H Arteria præparans sinistra, è trunco emergens.
I Vena præparans sinistra, ex sui lateris emulgente pronata.
 b Venæ hujus propago, Aortam ingrediens.
K Arteria præparans dextra, ex anteriore suo trunco enata.
L L Duo Vreteres à renibus ad vesicam descendentes.
M M Rami iliaci vena cavæ.
N N Rami iliaci Arteriæ magnæ.

- O O** Arteriæ umbilicales.
P P Dextra Vena, & Arteria epigastrica, quæ ab iliicis oriuntur, & per rectos abdominis musculos ascendunt, ubi cum mammariis per anastomosen junguntur, hoc loco abscisse.
Q Rectum intestinum, abscissum, & filo constrictum.
R R Vesicæ fundus versus inferiora reflexus.
 S Portiuncula Vrachii in vesicæ fundo relicta, ut ejus exitus conspicitur.
T Vteri fundus, è loco naturali remotus, & reflexus, ut ejus cum intestino recta connexio cernatur.
V V Testes.
X X Duo superiora & membranosa uteri ligamenta.
Y Y Vasa deferentia.
Z Z Vasa cæca, à Fallopio Vteri Tubæ cognominata.
 c c Duo inferiora & rotunda uteri ligamenta.
d d d Anastomoses arteriarum, & Venarum hypogastricarum, quæ hic exactè apparent, in sinistro quidem latere, in suo adhuc loco relicti vasis: in dextro verò, nonnulli è loco remotis, utrobique tamen eorum in utrumque gressus conspicue cernitur.



LIBRI OCTAVI TABVLÆ XXI EXPLICATIO.

FIGVRA I.

Vterum extra corpus positum, cum annexis testibus, vas deferentibus, & vesica urinaria exhibet.

- A Vteri fundus.
- B B Inferiora, & rotunda uteri ligamenta, hoc loco abscissa.
- C Regio, in qua uteri internum orificiū situm suum obtinet.
- D Teltis dexter, membrana sua adhuc investitus.
- E I Vasa deferentia ad uteri cornua à testibus porrecta.
- F Superius, & membranolum uteri ligamentum, vasa deferentia testibus alligans.
- G Membrana testis dextri ab ipsa substantia separata.
- H Glandulosa testis sinistri substantia eleganter conspicua.
- I I Vteri collum, seu Cervix, vulgo Vagina dicta, quæ à pundo externo ad os interius uteri protenditur.
- K Intestinum rectum abscissum.
- L L Cutis una cum pinguedine ab osse pubis detracta.
- M M Ligamentum, seu membrana uterum cum Vesica jungens.
- N Corpus vesicæ, omni fibrarum genere donatum, & ad inferiora reflexum, ut uterus, quo cum nequitur, videatur.
- O Vrachi portio.
- P Vreteres in vesicæ posteriorem sedem prope cervicem delincentes.

FIGVRA II.

Vterum, cum suis Vasis & Testibus annexis, demonstrat.

- A Vesica urinaria, ad inferiora revoluta, ut uterus, qui subiacet, conspiciatur.
- B B Vreterum in vesicam insertio.
- C C Cervix uteri, sive Vagina, in quam plurima vasa disseminantur.
- D Vteri fundus utrinque obscure protuberans.
- E E Duo inferiora, & rotunda uteri ligamenta abscissa.
- F F Vas cæcum ab utero ortum, hoc loco ligamento superiori & lato adhuc annexum ostenditur.
- G G Idem vas in sinistro latere à ligamento lato separatum.
- H H Vasa deferentia, utriusque lateris à testibus ad uteri fundum delincentia.
- I I Superius & membranolum uteri ligamentum, per quod complura vasa à præparantibus orta, disseminantur.
- K Vasa præparantia dextra, in substantiam testis digesta, nondum à ligamento membranoso liberata.
- L Vasa præparantia sinistra, à ligamento membranoso liberata, ut eorum in testem insertio conspiciatur.
- M M Testium corpus, quorum dexter membrana sua tectus, sinister omnino nudus ostenditur.
- N N Venæ, & Arteriæ, quæ multis anastomosibus in cervicem & fundum Vteri desinunt, expurgationi mēstruorum & nutritioni foetus famulantes.
- O O Nervi, per uteri corpus disseminati, qui partim à Spinali medulla, partim à sexta cerebri conjugatione oriuntur.

FIG. II.





FIG. I.



TABVLÆ VNICÆ LIB. NONI

D I L V C I D A T I O.

Persequitur partes medio ventri dicatas.

FIGVRA I.

Cor, & Pulmones, tum Venarum, Arteriarumque ex ipso egressum, ac Nervorum recurrentium circa has reflexionem demonstrat.

- A Caput asperæ arteriæ, five Larynx, cujus prima cartilago, five scutiformis, hic prominet.
- BB Processus superiores cartilaginis scutiformis.
- C Fissura cartilaginis scutiformis.
- DD Cricothyroides antici in suo situ.
- EE Fissula asperæ arteriæ, ex cartilaginibus, & membranis eas colligantibus, extracta.
- FG Cor in suo situ, ac forma pyramidalis depictum, per cujus superficiem externam levem Vena Coronaria a a diffeminatur, pinguedine copiosa b obfusa. Cæterum hic iisdem elementis sedes utriusque Ventriculi simul indicatur. nam F, dextro: G, autem, sinistro inscripti est.
- IIIH Cordis basis, ex qua, velut ex fonte quodam, quadrigemina valorum loboles emergit.
- I Apex, five mucro Cordis.
- K Auriculæ cordis dextræ nonnulla portio expressa.
- LM Venæ cavæ truncus ascendens. L autem, illam partem designat, quæ in Cor hiat, orificio admodum amplo: Mycro, quæ ad superiora excurrit.
- NOO Arteriæ magnæ truncus ascendens, qui mox in duos subclavios ramos OO dividitur, ex quibus postea propagantur Carotides arteriæ PP, quæ versus caput abeunt.
- Q Arteriæ magnæ truncus descendens, à postica pulmonum parte ad antiquam retracta, ut sinistri recurrentis nervi TT, circa eum reflexio demonstraretur.
- R Arteria venosa in pulmonum substantiam propagata.
- ST Nervi duo recurrentes, utrinque, à sexta cerebri conjugatione oriundi. Horum dexter SS, circa dextram subclaviarum arteriam O, tanquam trochileam, reflectitur (†) indeque versus superiora (unde & nomen obtinuit) recurrit, V.
- V Sinister contra TT, circa arteriæ magnæ truncum descendentem Q, reflectitur, (†) & similiter ascendit X.
- Y Ramus à dextro recurrente nervo SS, ad Diaphragma tendens.
- Z Ramus à sinistro nervo recurrente TT, ad Ventriculi orificium concedens.
- c d Pulmonis substantia, in suos lobos divisa, innumeris venularum propaginibus per externam superficiem sparsis, repleta. Demonstrantur autem his literis duæ ipsius partes, & dextra quidem caractere c, sinistra vero, elemento d.

FIGVRA II, III, &c.

Figura sequentes usque ad duodecimam omnes, cartilaginum laryngis demonstrationi sunt dicata. Ex his SECUNDA & TERTIA in situ suo, five Laryngem ipsam integram, & illam, representat: reliquæ, separatim singulas exhibent. QUARTA quidem, & QUINTA cartilaginem Thyroidem, five scutiformem. SEXTA & SEPTIMA, Cricoidem & Arytenoides simul junctas. OCTAVA & NONA Cricoidem solam separatam ab Arytenoidibus. DECIMA & DODECIMA, Arytenoides. Cum ergo singula duplici figura exprimentur, prior quidem semper anteriorem; posterior autem posticam

faciem ostendit. Vbi autem sumus communibus in omnibus literis.

- ABCD Asperæ arteriæ caput, five Larynx.
- AA Thyroides five scutiformis cartilago.
- B Fissura Thyroidis.
- CCDD Processus thyroidis cartilaginis, ex quibus CC superiores demonstrat: DD, inferiores.
- F Cricoides five Annularis cartilago.
- F Cricoidis cartilaginis pars anterior, gibba, semicircularis, ac tenuis.
- G Eiusdem pars posterior, lata, plana, ac major.
- IIH Linea aspera. Spina innominatæ cartilaginis Galeno dictæ.
- II Duæ arytenoides cartilagines, five Gutturales.
- LM Processus earum, superiores quidē L, inferiores autem M.
- N Epiglottis.
- OO Fissula asperæ arteriæ.
- PP Cartilagines fissulæ.
- Q Pars membranae fissulæ.
- R SS Os hyoides in suo situ. Sed R ipsam basin: SS autem cornua ejus demonstrant.
- TT Connexio cornuum ossis hyoidis SS cum processibus superioribus CC cartilaginis thyroidis AA.
- VV Cricothyroides antici musculi in suo situ.

FIGVRA XII.

Cordis dextrum ventriculorum, secundum ejusdem longitudinem incisum, una cum Valvulis signiformibus, demonstrat.

- AAA A Labra incisionis factæ secundum ventriculi longitudinem. His literis quiddam interjectum est, interioriorem ventriculi dextri superficiem exhibet.
- BB Basis cordis.
- C Mucro cordis.
- D Cavernulæ, quæ in superficie cordis interna occurrunt.
- E Protuberantiæ carneæ.
- FFF Valvulæ tres signiformes, Venæ arteriosæ orificio præpositæ, foris spectantes.

FIGVRA XIII.


Venæ Cavæ, & Arteriæ Venosæ, in situ nondum editæ, anastomosis in membranula rectam ostendit.

- A Cor, à posteriore sui sede, quæ vertebra respicit, depictum.
- BB Venæ Cavæ truncus, quæ cordi conterminus est.
- C Auricula cordis dextra.
- D Arteriæ magnæ truncus ascendens.
- E Ab hoc enata subclavia arteria.
- F Arteriæ magnæ truncus descendens.
- G Arteria Venosa.
- H Anastomosis, prout in vena cava apparet.
- I Membranula anastomosis huic præfixa, & valvulæ instar occudens.

FIGVRA XIV.

Arteriæ magnæ, & Venæ arteriosæ in situ unio, per tubulum facta.

- A Cor.
- B Pulmo.
- C Arteria magna ex corde emergens.
- DD Arteriæ magnæ truncus descendens.
- E Vena arteriosa.
- F Venæ arteriosæ ingressus in pulmones.
- G Tubulus, cujus beneficio hæc unio fit.
- HHH Rami quidam arteriæ magnæ abscissi.



TABVLÆ LIBRI DECIMI, EARVMQVE EXPLANATIO.

In his Tabulis ea omnia ostenduntur, quæ in capite cerni possunt, sed imprimis Cerebrum, cujus duplex demonstrandi ratio proponitur, quarum altera antiqua est, quam Galenus, ceterique Græci, ac inter Recentiores, Vesalius, & Fallopius secuti sunt: altera nova, & nostro primum seculo à Constantino Varolio, diligentissimo Anatômico anno 1570 inventa, & postea aliquam multis epistolis proposita. Vtrique singulari artificio & industria exhibetur, cum omnes partes eo ordine in conspectum proferantur, quo se mutuo sectionis serie consequuntur, adeo, ut his diligenter inspectis, suo quisque Marte ac studio anatomiam Capitis administrare valeat, singulasque sectiones & cultorum ductus nullo negotio addiscere.

TABVLÆ I DECLARATIO.

FIGURA I.

<p>Diffectis decussatim cuticula, & cute, externa primum capitis partes demonstrantur.</p> <p>AAA Cutis cum cuticula, ac radicibus pilorum, à membrana carnosâ detracta.</p> <p>B Cutis vera, cui pilî adhuc inhærent.</p> <p>C Cuticula à cute separata.</p> <p>DDD Membrana carnosâ, per cujus substantiam plures venulæ excurrunt.</p> <p>EEE Musculus supercilium attollens; (vulgò Frontis musculus dictus,) hic extrâ suum locum litus, in quem tres nervi inferuntur. (123.)</p> <p>FFF Pinguedo per cranium expansa.</p> <p>G Pericranium perioestio adhuc incumbens, in suo naturali situ cernitur.</p> <p>a Idem pericranium à perioestio separatum, ac inversum.</p> <p>H Perioestium suprâ cranium expansum, inque naturali situ conspicuum.</p> <p>b Idem perioestium à crânio divulsam, ac inversam.</p> <p>III Cranium, sive Os capitis, dictis omnibus partibus subiacens.</p> <p>K Sutura coronalis, per anteriorem cranii partem transversim excurrens.</p> <p>L L Sutura sagittalis, per capitis longitudinem decurrens.</p> <p>MMM Musculus temporalis pericranio adhuc tectus.</p>	<p>mentur, videndorum gratia, interne partes conspiciendæ exhibentur, sed imprimis Membrana crassa, tanquam quæ proxime crânio subjacet.</p> <p>AAA Vestigia refecti cranii, partiumque ipsum integritum.</p> <p>BBB Membranæ crassæ dextra pars, in qua venæ hinc inde dispersæ observantur.</p> <p>C Primus truncus harum venarum per os cuneiforme ascendens.</p> <p>D Alter truncus sub osse in diversas partes ramulos suos expandens.</p> <p>E Propagæ quædam venarum illarum, quæ adhuc sub osse latitant. Cæterum hi trunci omnes à secundo ramo, sive anteriore encephalico, qui ab inferiore ramo Internæ jugularis nascitur, & per cuneiformis ossis foramen septimum calvariam ingreditur, originem ducunt, suntque illi ipsi, quorum vestigia superius, tabula fig. 2 libri secundi, in cranii interiori facie, litera F, inlignivimus.</p> <p>FFF Denotatur locus, ubi sinas tertius membranæ crassæ excurrit, & cerebrum in dextram sinistramque partes secatur.</p> <p>GGG Aspera quædam vestigia fibrarum, quæ hoc loco è crânio membrana enata, per suturam sagittalem ad perioestium constitutionem, egrediebantur.</p> <p>HHH Vestigia fibrarum, quæ similiter, sed coronalem suturam transeuntes, crânio exciderant.</p> <p>II Divisio cerebelli à cerebro, quæ fit mediante membrana crassa, Vbi similiter vestigia apparent aspera fibrarum, quæ per suturam lambdiformem crânium egrediuntur.</p>
--	--

FIGURA II.

A Dempa orbiculatim ferra tanta calvarie parte, quantum auferri solet, eorum, quæ in cranii cavitate conti-

TAB. I.

FIG. I.





FIG. II.



LIBRI DECIMI

TABVLÆ II DILVCIDATIO.

FIGVRA I.

D *Dissecta decussatim membrana crassa, remotaque ad latera, tenuis, ipsi proximè subjacens, conspectui offertur.*

- A A A Membranæ crassæ decussatim dissectæ portiones tres à capite dependentes, ubi ejus interior superficies cernitur, & venulæ minutissimæ per ipsam dispersæ, notatæ literis b b b.
- B B Vestigium resecti crani.
- C C C Sinus tertius membranæ crassæ, cerebrum in dextram sinistramque partem dirimens.
- D D D Vasa ex hoc sinu deducta, & per superficiem tenuis membranæ disseminata, unde postea ad cerebri substantiam digeruntur.
- E E E Membrana tenuis cerebrum universum immediate ambiens, & tegens. In hac notabis primum vasa, mirifico quodam ordine, juxta seriem anfractuum cerebri excurrentia: deinde & ductum ipsius membranæ secundum illas circumvolutiones.
- F F F Anfractus cerebri sub membrana tenui nonnihil apparentes.
- G G G Sinus spirarum, seu circumvolutionum cerebri, nondum satis evidentes.

FIGVRA II.

R *Emota utraque cerebri membrana, tam crassa, quam tenuis, cerebrum ipsum conspiciendum exhibetur: tum processus membranæ crassæ, qui Falx dicitur, nonnihil à suo loco naturali elevatus ostenditur.*

- A A A Membrana tenuis à cerebro separata, & inversa, ut interna ipsius facies, per quam venulæ in omnes cerebri anfractus copiosissime excurrunt, conspiciatur.
- a a a a Propagines exilium venarum ex cerebri anfractibus eruptentium, per tenuem membranam sparsæ.
- b b b Venulæ exiles digestæ per tenuem membranam.
- B B B B B Portiones membranæ tenuis, quæ inter spiras serpentes, spiras undique investunt.
- C C C C C Anfractus cerebri, sive Spiræ, intestinorum ritu contortæ, atque ex loco naturali remotæ.
- D D D Spatium inter dextram, & sinistram cerebri partem, in qua Falx reconditur.
- E E Dextra cerebri pars.
- F F Sinistra cerebri pars.
- G G Processus membranæ crassæ superior, Falx dictus, copiosis venulis refertus, & inter dextram, sinistramque cerebri partem situs, qui ex loco naturali hic elevatus cernitur.
- H H H Superior falcis pars, per quam sinus tertius crassæ membranæ excurrit.
- I Extremitas falcis acuta, quæ ossi cristoso adnectitur.
- L L L Sinus tertius crassæ membranæ cerebri, falciformi processui superstratus.

TAB. II.

FIG. I.





FIG. II.



LIBRI DECIMI

TABVLÆ III EXPLICATIO.

FIGVRA I.

D Idulto leviter digitis ad latera, Cerebro, utraque membrana, qua tegebatur, denudato, remota etiam ex loco proprio Falce, corpus callosum & ductus per ipsam ad tenuem membranam ascendentes, demonstrantur.

- A A** Membrana crassa ab hoc Capite, tanquam novo, ad latera revoluta.
B Cutis dependens.
CCCC Cerebrum adhuc tenui membrana tectum, sed divisum, & separatum à se.
D D Cerebri pars dextra.
E E Cerebri pars sinistra.
FFFF Cerebri dextra, & sinistra pars antea juncta, nunc utrinque leviter digitis ad latera revoluta, ut tum ipsum corpus callosum, G, G, tum ductus H, H, per callosum corpus excurrentes, rectius compareant.
G G Corpus callosum cerebri.
H H Ductus, utrinque per callosi corporis substantiam diffeminati, quorum soboles ad latera tenuis membranæ dictas partes integritatis transmittuntur. hi à quarto sinu oriuntur.
I I I Falx, sive processus superior membranæ crassæ, qui spatium inter dextram sinistramque cerebri partem occupabat, è loco suo naturali elevatus cernitur, in qua venulæ, per ipsius substantiam dispersæ, observentur.
K K K Sinus tertius membranæ crassæ in superiore falcis parte positus.
L L Asperitas falcis, per quam annecti solet lateribus tenuis membrana.
M M Revolutio ad latera particulæ cujusdam falcis, ut duplicationem illam membranæ crassæ, & sinum in ea contentum faciliè quis animo assequatur.

N Extremitas falcis acuta, processui offis spongiosi cristarum galli referenti adnexa.

FIGVRA II.

A Blata, alta & transversa sectione, magna portione cerebri, intimiores partes, ipsique adeò ventriculi nunc ostenduntur.

- A A A** Cerebri secti per medium pars dextra.
B B B Eiusdem cerebri pars sinistra.
a a a Puncta rubra quæ apparere solent in cerebri administratione, nihilque sunt aliud, quam sanguis, ex venulis per cerebrum digestis & dissectis, exstillans.
C C C Linea est per medietatem corporis callosi arte ducta, ut vestigium divisionis illius cerebri in dextram sinistramque partem exprimat.
D D Dexter cerebri Ventriculi latera, parum digitis revoluta.
E E Sinistri Ventriculi latera, à se nonnihil diducta.
F F Duo trunci exigui venularum illarum, quas in præcedente figura (signatas literis H, H,) per callosum corpus expandi, & in tenuem membranam dispergi diximus.
GGHH Duo superiores cerebri Ventriculi, dexter & sinister, nondum perfectè aperti, oblique tamen anfractuosi semicirculares ac tenui membrana obtecti, in sequentibus Tabulis rectius conspiciendi.
I Plexus choroides, dextrum cerebri ventriculum percurrentes.
K K Venulæ graciles, à vasis plexum choroidem constituentibus deductæ, in sinistro ventriculo nonnihil evidentiiores.
L Plexus choroides sinistrum ventriculum percurrentes.
M Portiuncula falcis, versus posteriora retracta.

TAB. III.

FIG. I





FIG. II



LIBRI DECIMI

TABVLÆ IV EXPLICATIO.

FIGVRA I.

A Liore adhuc sectione facta, & ventriculorum labris nonnihil ad latera diductis, corpus callosum, & sub-
tus speculum, plexusque choroides, videndi exhibentur.

- A A A Cerebri per medium secti pars dextera.
B B B Ejusdem cerebri pars sinistra.
C C C Linea arte ducta per corpus callosum, ut vestigium appa-
reat divisionis cerebri.
D D Callosum corpus ad sinistram partem nonnihil vi ductum,
ut speculum, ventriculorum dextrum à sinistro separans,
aptius demonstratur.
E Portio speculi, quæ superius calloso corpori, inferius for-
nici adnectitur.
F F Latera utriusque Ventriculi, à propria cerebri substantia,
qua tegebantur, dissecti.
G G G Fundus, live inferior ventriculorum cerebri pars, in quo
venulæ, à vasis plexum choroidem constituentibus,
comparent.
H H Plexus Choroides, ex venis & arteriis constans.
I I Portio quædam fornicis, quæ in sequenti figura exactius
conspicietur.
K Portio falcis, ad posteriora reflexa, variis plexibus cor-
rugata.

FIGVRA II.

D Dissecto calloso corpore, & versus posteriora retracto,
plexus choroides integri, simulque ipsorum in cavi-
tatem parvam ingressus demonstratur. Fornix etiam, &

sub fornicis divisione in loco tenebroso vasa transcurrentia
ostenduntur.

- A A Corpus callosum versus posteriora reflexum, ut fornix,
subjectæque partes cernantur.
B B Ventriculi cerebri, sublati nunc omnibus ipsis incum-
bentibus partibus integrè, quoad fundum conspicui.
C C C Fornix, non tam Trianguli, quam duorum cornuum for-
mam, aut, (cui rectius comparaveris,) Y, literam py-
thagoricam referens.
D D Plexus Choroides utriusque ventriculi eleganter hic
conspicui.
E E Cavitates rotundæ, quas ad inferiora tendentes, plexus
Choroides ingrediuntur.
F F Rami venularum, quæ per superiorem callosi corporis
superficiem expandæ, Tabula tertia, figura prima, sub
literarum H H, signo monstratæ sunt, hoc loco à cor-
pore calloso ad anteriora retractæ: calloso dein cor-
pore ad posteriora reflexo, cernuntur, ut earum ex in-
ternis partibus ortus conspicitur. Egressæ enim ex
hac cavitate ad superiora ascendunt, & ad postero-
rem partem tendentes, in corpore calloso (ut diximus)
suos hinc inde ramulos spargunt, qui duobus in locis,
interventu venæ, per anastomolam, uti literæ a a a per-
bellè ostendunt, junguntur.
G G G Vas à quarto crassæ membranæ sinu prodiens, ac sub for-
nice in tenebroso hoc loco in tertium ventriculum
admodum implexè descendens, quod in sequentibus
multo melius patebit.
H Hæc fissura locum ad os cristoformem, nec non Spongoides
pertingentem, ope cujus excrementa cerebri eo des-
fluencia evacuari Placentinus credebat, designat.
I I I I I Puncta sanguinis ex venulis cerebri exsulantibus clarissimi
patent.

TAB. IV.

FIG. II.





FIG. I.



LIBRI DECIMI

TABVLÆ V EXPLICATIO.

FIGURA I

Separato nunc prorsus calloso corpore, & ejus loco elevata fornice versus posteriora vasa, quæ sub fornice latebant, tum ventriculi tertii situs, ac meatus ab ipso vena ad petuum sendens, demonstratur, plexus quoque choroides expansi ostenduntur.

- AAAA Vtriusque Ventriculi, tam dextri, quam sinistri fundus, & latera.
 B B B Fornix substantia versus posteriora sublevata, sub qua tamen propter plexum choroidem explicatum, nondum exacte tertius ventriculus conspicitur.
 C D Plexus choroides expansi, in posteriore sui parte lunarem figuram obtinentes, in anteriore apicem, quo ferme ad foramen anterius tertii ventriculi desinunt.
 E Vas in duos ramulos divisum, de quo figura secunda Tabulæ quartæ, litera GG dictum est, ad tertium ventriculum implicate admodum contendere, tum plexibus choroidis sese insinuans, tum ramulos per substantiam utriusque superioris ventriculi dispergens.
 F Foramen, seu meatus profundus tertii ventriculi, ex tenui membrana factus, initio amplo sensim in canalem angustato, quod hic facile videre licet, revolutis particulis tegentibus ad latera.
 G G Extremitates plexus choroidis.

FIGURA II

Elevato nunc etiam plexu choroidæ ad superiora, Ventriculus tertius ostenditur. Remota autem membra-

na, quæ contenta tegebat, uterque ipsius meatus, tam primus, quam posterior, & corpuscula quæ circumposita sunt, ut glandula pinealis, nates, testes, aptissime demonstrantur.

- AAAA Ventriculorum dextri, & sinistri fundus.
 B B Eorundem latera, sive Parietes.
 CCCC Rima, sive Canales leviter in substantia eorundem ventriculorum exculpti, ut etiam in aliis figuris apparet, & ad meatum anteriorem tertii ventriculi deducti.
 D Sub hoc corpore extuberante Vulva sita est.
 E Meatus anterior tertii ventriculi, in quem excrementa cerebri recepta, ad glandulam pituitariam transmittuntur.
 F F Rima, sive tertius Ventriculus cum duobus suis meatibus quibus ab anteriore & posteriore parte terminatur.
 G Meatus, seu foramen posterius, quod ano simile dicitur, & sub natibus ad quartum ventriculum abit.
 H H Eminentiæ duæ superiores ejusdem cum cerebro substantiæ, sola linea distinctæ, à forma Nates dictæ.
 I I Inferiores extuberantiæ ob proximam glandulam, quæ peni à nonnullis comparata, Testes nominantur.
 K Glandula pinealis, substantia dura constans, membrana tenui tecta, & dicti foraminis principio apposita.
 L L Plexus choroides ad superiora reflexi.
 M Falx ad posteriora revoluta.
 N N His angulis acutis figuræ lunaris, sive semicircularis, quæ anteriores ventriculi in parte posteriore vergunt, clarius patet.

TAB. V.

FIG. I.





FIG. II.



LIBRI DECIMI

TABVLÆ VI EXPLANATIO.

FIGURA I.

Remota posteriore cerebri parte, membrana crassa cerebellum involvens, & Torcular vocatum comparet, quo per medium dissecto, & membranæ ad latera revolutæ, interior quatuor sinuum facies conspicienda exhibetur.

- AA Os cranii, in quo medullarum optimè comparet.
 æ æ Spatium, quod inter cranium & duram matrem est, ostenditur.
 BBBB Reliquum substantiæ cerebri profunda sectione sublata.
 CC Fundus dextri & sinistri Ventriculi, copiosis venarum propagibus conspersus.
 D Tertius ventriculus, ad latera paululum deductus.
 E Foramen anterius tertii ventriculi ad pelvim, sive infundibulum descendens.
 FF Plexus choroides, sive retiformes, leviter extra sedem suam remoti, & expansi.
 GG Principium plexuum retiformium.
 HH Finis eorundem plexuum.
 II Portio cerebelli detecta.
 KK Processus posterior crassæ cerebri membranæ, cerebrum à cerebello dividens.
 LL Membranæ quarti sinus aperti, ad latera convolutæ.
 MM Membranæ primi sinus aperti, ad latera positæ.
 NN Membranæ secundi sinus dissecti, revolutæ.
 OO Primus crassæ membranæ sinus.
 PP Secundus crassæ membranæ sinus.
 QQ Quartus crassæ membranæ sinus, in quo innumera propemodum foraminula videntur.
 RRR Tertius sinus in superiore falcis regione positus, à crassa membrana, cui adnectebatur ad literam A, resectus.
 aaaaa Denotantur orificia vasorum, quæ ex tertio sinu in tenuem membranam propagantur, supra Tab. II, figura prima, literis D D D D D notata.
 S Principium, vel concursus quatuor dictorum sinuum, Torcular Herophilo, ex opinione quorundam, dictum.
 TTT Processus falciformis à cerebri substantia undique denudatus, & extra sinum positus, ut totus exadè cernatur.

- bbb Vasa minuta per falcis substantiam dispersa.
 V Cuspis processus falciformis acuta, & nonnihil incurvata ab ossis cristiformi nunc separata.
 XXXX Membranæ tertii sinus aperti revolutæ, ut ejus interior facies appareat.

FIGURA II.

Ablata crassa membrana cerebellum involvente, ipsius cerebelli substantia ostenditur: & rima, sive ventriculo tertio ad latera diducto, cavitates ejus, & in ipso contenta Vasa cum foramine anteriore apparet.

- AA AA Os cranii.
 B Medullarum cranii.
 CCC Spatium, quod inter cranium & crassam membranam ostenditur.
 D Eminencia quædam cranii dextram sinistramque cerebelli partem dirimens.
 EE Crassæ membranæ portio, quæ cerebellum investit, à posteriora retracta.
 FF Cerebelli substantia, per cujus superficiem externam plures venulæ sparguntur, (a a,) & lineæ excurrunt (c c.)
 a a c c Clunes nonnihil è loco suo motæ.
 GG Testes, similiter ad superiora ut clunes elevati, & divisi.
 HH Glandula pinealis testibus contigua.
 I Plexuum retiformium ingressus.
 KK Foramen, seu meatus posterior Ventriculi tertii, totum jam demonstratus.
 L Cavitas, quæ ventriculo tertio diducto cernitur.
 M Corpus figuram pudendi muliebris exprimens, Vultum anterius tertii ventriculi patet.
 N Ventriculorum dextri, & sinistri fundus.
 OOO Latera, seu parietes eorundem.
 PPP Plexus choroides studio extra ventriculos commoti.
 QQQ Cerebrum, cujus superior, & posterior pars cerebello incumbens, ablata est.
 RRRR

FIG. I.

TAB. VI.




FIG. II.



LIBRI DECIMI.

TABVLÆ VII EXPLICATIO.

FIGURA I

V Traque cerebri parte, tam dextra quam sinistra à se diducta, non tantum iuxta latera, sed etiam quo ad anteriorem partem, Os cristiforme, ad quod corpus falciforme annexum diximus, exacte apparet. Testibus autem, ac natibus per medium divisis, atque à se distensis, meatus ille, qui sub ipsis ex tertio ventriculo in quatuor abii, cernitur. Facta etiam profundiore sectione, vulva à se diducta videtur, meatusque ille, qui in pelvium definit, & prope quem exortus nervorum opticorum consistit.

- AA Cerebri portio dextra & sinistra, à se diducta, & nonnihil extra cranium levata.
 BB Portio dextræ atque anterioris cerebri partis paululum revoluti, ut cristiforme os D in conspectum prodeat.
 CC aa Pars cranii, anteriorem illam cerebri portionem BB sustinens.
 D Os cristiforme, in cuius verticem apex corporis falciformis definit.
 E Cerebri magna portio dissecta, ut calvaria CC cum osse cristoso D appareat.
 FFFF Vestigium illius sectionis, qua tota illa cerebri pars, quæ cerebellum tegebat, ablata fuit.
 G b b b Meditullium cranii inter duas laminas (b b b) conclusum.
 HH Calvariæ interna facies, cui cerebellum incumbit.
 II Cerebelli pars posterior in naturali situ locata, & multis venarum furculis conspersa.
 KK Cerebelli pars antica, ad superiora elevata.
 L Nervorum opticorum exortus.
 M Meatus primus tertii ventriculi, qui ad pelvim descendit, dilatatus.
 NN Vulva ad latera diducta.
 O Hic foramen, sive meatus tertii ventriculi, qui Anus dicebatur, situs erat, at nunc dissectus cernitur.
 PP Testes studio aperti, ut principium quarti ventriculi detegeretur.

- QQ Nates divisi, ut ductus, qui sub ipsis latebat, conspiceretur.
 R Ductus posterior tertii ventriculi, in quatuor tendens, apertus.
 S Vestigia fundi dextri & sinistri ventriculi cerebri.

FIGURA II

C Aput novum undique à cranio, carne, & crassa membrana separatum, atque in faciem positum, ut naturalis Cerebelli, tam situs, quam connexio cum cerebro, & spinalis medulla, compareat. Simul etiam spinalis medulla in vertebra processu ostenditur, qui tamè cum tenui quadam membranula sit ictus, non adeo aperte exprimitur.

- AA Caro musculorum à vertebra divulsa, ac separata.
 B Vertebra prima cervicis nondum à sua carne liberata.
 CCC Calvariæ resectæ vestigia.
 DDD Crassa membrana, tam à cerebro, quam à cerebello undique separata.
 EEE Cerebellum, per cuius superficiem innumeræ venulæ discurrunt.
 F Portio processus vermiformis anterioris.
 GG Membranula quædam, velaminis instar spinalem medullam, & cerebelli portionem, à quo ortum ducit, contegens.
 HH Nervi ex spina prodeuntes.
 I Portio medullæ spinalis sub cerebello egrediens, multatim cum nervulis exiguis à se propagatis, sub membrana consistens.
 K Corpus primæ colli vertebræ.
 LL Foramen vertebrarum colli, per quod spinalis medulla ex cranio ad dorsum transit.
 MM Cerebrum cerebello adhuc annexum, & membrana tenui tectum.
 NN Divisio cerebri satis evidens.

FIG. I.

TAB. VII.





FIG. II.



LIBRI DECIMI TABVLÆ VIII DILVCIDATIO.

FIGVRA I.

Demonstrantur ea, quæ sub membranula illa, in precedenti proxima figura spinalis medullam regente, latebant. Exempto enim cerebro, & capite in facie collocato, tum ad anteriora cerebello tracto, etiam spinalis medulla ex vertebribus tracta est, quæ hic jam aperte sua membranula quasi excoriata videtur, ipsa membranula ad latera tracta. Exortus etiam trium parium nervorum ex ejus principio adhuc obscure apparentes conspiciuntur.

- AA Vestigia resecti cranii.
- B Prima cervicis vertebra, sua carne adhuc stipata.
- CC Cerebelli duæ portiones laterales, tenui membrana tectæ, per quorum substantiam venulæ excurrunt.
- D Cerebelli media pars vermiformes processus constituens.
- I Cerebelli portio.
- FF Membranula spinalis medullæ ad latera tracta.
- GG Spinalis medullæ substantia detecta.
- H Quartus ventriculi cerebri pars maxima in principio spinalis medullæ exculpta, calami, quo scribimus, mucronem referens.
- IKL Quantum, (II) Sextum (KK) & Septimum, (LL) nervorum par.
- MM Craffa membrana cerebri inferiorem calvariae regionem tegens.
- NN Aures.

FIGVRA II.

Cerebello, & Cerebro ad anteriora cum spinali medulla revolutis, Vasa, ex quibus Rete mirabile contextitur, tum Infundibulum, una cum Glandula pituitaria cernitur.

- AA Vestigia resecti cranii.
- BB Cerebellum, cum vasis per ipsius substantiam perreptantibus, ad anteriora revolutum.
- CC Cerebri adhuc integri inferior portio similiter revoluta.
- D Spinalis medulla cerebello adhærens, cum suis arteriolis, & venulis, ad anteriora tracta.
- E Portio arteriarum Vertebrarum, in utroque sine bifurcata, ex qua arteriolæ illæ oriuntur, quæ per spinalis medullæ substantiam excurrunt, ac cum carotidis arteriæ ramo majore rete mirabile constituent.
- FF Portio retis mirabilis, ex dicta arteria conflati, & ruditer delineati.
- GGG Tenuis cerebri membrana extensa.
- H Infundibulum ex tenui membrana, cerebri substantia undique separata, constitutum.
- I Pars inferior, & teres infundibuli.
- K Eminencia hæc obscure glandulæ pituitariæ formam refert, in quam infundibulum desinit.
- LL Nervorum à spinali medulla resectorum portiones in prima hujus tabulæ figura, spinali medullæ adhuc adhærentes, obscure delineatæ.
- M Prima cervicis vertebra à sua carne nondum omnino libera.
- NN Aures.

FIGVRA III.

Dicta cerebri portione, in secunda figura expressa, tum cerebello cum spinali medulla ex cranio exenta, cerebri cum cerebello, itemque cerebelli cum spinali medulla connexio separatim ostenditur, in cujus principio jam exacte, ac integre quartus Ventriculus exprimitur.

- AA Cerebelli dextra, & sinistra pars, plurimis venulis perfusa.
- B Vermiformis cerebelli processus ad anteriorem partem retractus: cum quartum ventriculum tegere solet.
- C Ventriculus quartus in spinali medulla D, exculptus.
- D D Spinalis medulla.
- EE Cerebri portio cerebello adhærens.

FIGVRA IV.

Cerebellum hic à spinali medulla, & cerebro separatim, sigillatim ponitur, duæ tamen portiuncula spinalis medullæ cum glandula pineali relinquuntur, ut, quæ sui parte illi adnectantur, demonstraretur.

- AA Cerebelli substantia dura, transversis lineis intertexta.
- B Vermiformis processus.
- C Glandula pinealis.

DD Portiones spinalis medullæ, quibus cerebello in posteriore sui parte, ubi quartus ventriculus situm habet, adnectitur.

FIGVRA V.

Hæc figura separatio cerebelli à spinali medulla exprimitur.

- AA Duæ partes cerebelli latiores.
- B Processus vermiformis.
- CC Vestigium albicans spinalis medullæ à cerebello separata: hic enim Cerebellum spinali medullæ conjungebatur.

FIGVRA VI.

Cerebellum altera sui parte dissectum proponitur, & ejus substantia interna conspiciatur.

- AA Cerebelli substantia externa.
- B Cerebelli substantia interna dissecta, ejusque substantia albicans.
- CC Vermiformis processus annexus cerebello, hic separatim.

FIGVRA VII.

Sectio per medium cerebello, substantia ipsius interioris alba, litera A, ostenditur.

FIGVRA VIII.

Eodem Cerebello secto, ipsius interna substantia accuratius depingitur.

- AA Interna cerebelli & albicans substantia.
- BBB Eiusdem livida substantia, albæ substantiæ productione in se continens.

FIGVRA IX.

Spinalis medullæ principium separatim locatum, ut ipsius vera figura exprimitur.

- AA Membranula spinalem medullam tegens, hic ad latera ducta.
- BB Spinalis medullæ, quæ contineri solet in cranio, portio.
- CC Duæ ipsius portiones, quibus cerebello adhæreere solent.

FIGVRA X.

Eadem spinalis medulla proponitur, sed resectis portio- nibus illis quibus cerebello adhæret, itemque membranula. Inversa quoque est, ut ductus ille posterior, qui tertio ventriculo in quartum, sub natis, testibus, & pineali glandula tendit, ex hac parte, diducto quarto ventriculo, conspiciatur.

- AAA Spinalis medullæ substantia.
- B Quartus ventriculus non exacte expressus.
- C Ductus tertii ventriculi in quartum.
- D Glandula pinealis.
- E Rudis natus, & testium in spinali medulla sitorum, delineati.


FIGVRA XI.

Hæc figura, si quis recte secum perpendat, ad secundam figuram sextæ Tabulæ pertinet. Ostenditur enim Cerebellum, & Cerebri substantiæ portio, in qua tertius Ventriculus in omnes dimensiones ductus, cum utroque suo foramine tam anteriore, quod ad pelvim, quam posteriore, quod ad quartum ventriculum tendit, exprimitur.

- AA Cerebellum.
- BBB Cerebri substantia.
- C Ventriculus cerebri tertius.
- D Foramen posterius ventriculi tertii ad quartum tendens.
- E Glandula pinealis.
- F F Natus & testium locus.
- G Matus anterior ventriculi tertii ad glandulam pituitariam descendens.
- H Glandula pituitaria.
- II Principium nervorum opticorum.
- K Infundibuli pars.

FIGVRA XII, & XIII.

Prior figura Nervorum opticorum portionem A A, cum infundibuli parte, B, & glandula pituitaria C, Posterior, Vermiformem cerebelli processum monstrat.



LIBRI DECIMI

TABVLÆ IX DECLARATIO.

FIGVRA I.

Cerebri, ejusque partium delineatione ex communi Anatomiconum sententia propoſita, fabricam ejusdem, inverſa, ut vocant, ſectiōe, & nova, exprimere Placentinus ſequentibus Tabulis voluit. Cerebrum ergo in hac figura ab omnibus undique oſibus liberatum, cæterum craſſa adhuc membrana contectum, inverſum proponitur.

- AAAA Dura membrana, venulis conſperſa quamplurimis, undique cerebrum & cerebellum inveſtiens.
 B Spinalis medulla craſſa membrana contecta.
 CC Cerebellum craſſa membrana tectum ac circumſcriptum, aptiſſime hic comparens.
 D Glandula pituitaria, craſſa membrana adhuc inveſtita.
 EE Ramus major arteriæ carotidis.
 FF Duo oculi.
 GGG Muſculi oculorum, in ſuo ſitu jacentes.
 HH Muſculis his interpoſita pinguedo.
 II Hic parum exciſa craſſa membrana, Cerebrum, KK, & nervi olfactorii (I, I,) apparent.
 KK Portio quædam cerebri conſpicua.

FIGVRA II.

Idem Cerebrum in eodem ſitu relictum exhibitur: membrana autem craſſa decuſſatim ſecta, & ad latera revoluta, quale tum ipſum appareat tenui adhuc meninge inveſtitum, tum quæ ejus partes cernantur, proponitur.

- AAAA Craſſa cerebri membrana decuſſatim ſecta, & ad latera diducta.
 BBBB Cerebri ſubſtantia, tenui adhuc meninge tecta.
 CC Diviſio cerebri in ſiniſtram & dextram partem admodum conſpicua.
 DD Cerebellum tenui membrana adhuc tectum.

- EEE Spinalis medulla, tenui membrana adhuc inveſtita. Quo loco diligenter advertendum eſt, quanto artificio, & quam præclara induſtria ſculpior punctulis quibuſdam tenuem membranam expreſſerit, ut tranſparere ſubiacentia corpora magna quadam intuitum animi jucunditate videantur.
 FFF Venulæ per cerebellum ejusque membranam digeſtæ.
 GG Ramus major interioris arteriæ Carotidis, Rete mirabilis efficiens.
 HH a Interior hujus rami G, ſurculus, de quo tab. ſequenti plura. Enalcitur autem circa a, a.
 I Glandula pituitaria.
 KKL Ortus nervorum oculos moventium, ſive ſecundi par nervorum cerebri. Ex his dexter circa L, in muſculo oculi inferitur: ſiniſter circa b, abſciſſus eſt.
 MM Principium nervorum opticorum, ſive primi paris nervorum cerebri.
 NN Quantum par nervorum cerebri.
 OO Sextum par nervorum Cerebri.
 P Portio infundibuli, ſive pelvis.
 QQ Organa olfactus, ſive Octavum par nervorum cerebri.
 RR Nervi optici, ſive primum par nervorum cerebri, à conterminis muſculis liberum.
 S Muſculus palpebram attollens.
 T Trochlea, ſive cartilago trochlearis, muſculi ſuperioris oculum circumvolvantis.
 V Muſculus ille cum trochlea T conſpicuus.
 XXXX Alii quatuor muſculi oculum moventes, ac tendiniſus, ut & prior V, in oculi corneam tunicâ deſinentes.
 YY Oculi circulaſem figuram obtinentes, quorum dexter muſculis ſeparatus eſt.
 ZZ c Vertebrales arteriæ, quarum conjunctio circa c, progreſſus uſque ad d, ubi in duos ramos iterum dividuntur e, e. Sed harum demonſtratio perfectior in ſequenti Tabula, ubi literis R, R, inſignitæ ſunt, dabitur.
 ff Proceſſus cerebri mammillares dicti.

TAB. IX.

FIG. I.





FIG. II.



LIBRI DECIMI


TABVLÆ X EXPLICATIO.

Cerebro in eodem situ relicto, eadem sane qua præcedens figura representat, expressius tamen, nonnulla etiam singularia addit. Exactius quidem ostendit Spinalis medullam detectam, & liberatam à sua membranula cum omnibus quæ sub ea continebantur, infundibulo, inquam, glandula pituitaria, arteriis, & nervis. Nova autem demonstrat, tum excisa portiuncula cerebri in dextra parte, tum eadem ad superiora revoluta in sinistra, ut est Rete mirabile, & ejus cum plexu choroideæ connexus.

- AAAA Cerebri substantia tenui membrana tecta.
 B B Cerebellum.
 C Portiuncula Cerebri, quæ Rete mirabile L L contegebat in dextro latere ad superiora revoluta.
 a a Vestigium portionis Cerebri, in dextra parte excisæ.
 D D Spinalis medulla detecta jam & libera à sua membranula, in qua arteriola per ipsius superficiem excurrentes advertendæ.
 E E Nervorum opticorum, seu primi nervorum cerebri paris, portiones.
 F F Octavum par nervorum cerebri, sive Organa olfactus.
 G G Nervorum oculorum moventium, seu secundi paris, portiones.
 H H Nervorum quinti paris portiones.
 I I Nervorum sexti paris portiones.
 K K Ramus major interioris Carotidis arteriæ, qui sub dicta Cerebri portiuncula C latebat, utrinque conspicuus.
 b Ab hoc duo alii nascuntur: primus, interior b, qui cum suo conjuge alterius lateris b, unitur prope c, postea-

- d d que in plures arteriolas d d per tenuem cerebri membranam dispersas, absumitur. Secundus, exterior, c, reflexus, in cerebri priores ventriculos abit, divisus prius in multos furculos f f, qui cum furculis arteriæ Cervicalis h h uniuntur, i i.
 L L Rete, mirabile dictum, ab hoc arteriarum carotidum ramo constitutum.
 M Anterior tertii ventriculi pars vulvam referens, ad quæ foramen ad pelvim ex tertio ventriculo tendens, situm est.
 N Pelvis in glandulam definens.
 O Glandula pituitaria.
 P P Portio plexus choroideæ, in quam ramulus unus Retis mirabilis definit, & ipsi connectitur.
 Q Q Tubercula quædam (ut ita dicam) Cerebri, quæ plerique Anatomicis Processus mammillares dicuntur.
 R R Cervicales arteriæ ab aliis, à Spigelio Vertebrales dictæ, quod per vertebrarum colli transversorum processuum foramina ascendunt, hoc loco à suo principio abscissæ. Hæ ubi ad cranium ferè pervenerunt, per primum occipitis magnum foramen una ingrediuntur, moxque sub spinalis medullæ, quod in ipso est, principio, D D, uniuntur S, sicque sub media cerebri basi versus anteriora recta excurrunt: at ubi jam sellam ossis cuneiformis glandulæ pituitariæ dicatam, attingerunt, circa T, in duos ramos dividuntur, dextrum & sinistrum, g g, qui in furculos infinitos h h dirempti, cum arteriæ carotidis interioris furculis f f, uniti i i, plexum choroideum P P constituunt.

TAB. X.



LIBRI DECIMI

TABVLÆ XI EXPLICATIO.

FIGVRA I.

C Aperte in facie collocatō, posteriorem ipsius partem exprimit, ut videlicet venarum jugularum concurrsum, ac earundem in sinu crassa membrana desinentes terminos, demonstret. Eo nomine omnes quatuor sinus apertos, sanguisque in ipsis coniectum grumum representat. Adhuc ut venarum jugularium in calvariam ingressum ostendat, & vertebra partem, quam superior vena jugularis ramus superequivat, & ejusdem in sinistra parte per calvaria ossis foramen introitum, inferioris quin etiam & cnc. ad processum styloideum sinum demonstrat.

- A A Vestigia cranii Cerebrum cingentis.
- B Processus styloides in sinistra parte expressus.
- C C Cerebrum crassa membrana adhuc tectum.
- D D Cerebellum crassa membrana adhuc tectum.
- E Spinalis medullæ portiuncula exigua.
- F Portio calvaria in sinistra saltem parte relicta, ut Venæ jugularis & arteria carotidis in cranium per ipsam ingressus conspiciatur.
- G G Portio Vertebra eadem de causa relicta.
- H H H Portiones Venæ jugularis & arteria carotidis in dextra, sinistraque parte.
- K Conjunctio utriusque vas, venæ inquam & arteria in sinistra parte saltem assignata; at hic in dextra, demptis ossibus admodum diligenter expressa.
- L Facta jam ad litteram K horum vasorum conjunctione, factum etiam aliquo circa cerebellum progressu, hic in sinu crassæ membranæ Vasa illa desinunt.
- M Sinus primus, sive Dexter crassæ membranæ.
- N Grumus sanguinis in dicto sinu relictus.

O Secundus, sive sinister sinus crassæ membranæ.

P Tertius, sive Superior sinus crassæ membranæ in falce constitutus.

Q Quartus, sive Inferior crassæ membranæ sinus.

RRRR Area in medio harum litterarum sita, Torcular Anatomicis dicitur.

SS Arteriarum Carotidum sursum ascendentium portiones.

TT Palatum cum dentibus.

V Columella.

XX Cavitas ad columellam sita.

YY Foramina in narium amplitudinem ex palato desinentia.

FIGVRA II.

C Aperte undique ab ossibus liberato, Cerebelloque à posteriore, & naturali sua sede ad anteriora retracto, anteriore vero parte elevata, dictorum sinuum in tenuem membranam propagines demonstrantur, sinistraque cerebri parte resecta, ventriculus sinister, ex dictis anterioribus, spectandus offertur.

AA a a Cerebellum ad anteriora detractum, cujus partes laterales & globosæ literis A A insignuntur: at media, & Vermiformes processus, a a.

B B Pars cerebri tenui membrana tecti.

C Pars cerebri glabra, vestigium resectæ suæ portionis obtinens.

D D Ventriculus sinister, in quo plexus choroides continetur.

E E E Tria corpuscula, Nates, Testes, & Glandula pinealis.

FFFF Membrana crassa Cerebri vario modo secundum propagines sinuum ipsius incisa, & ad latera, ut sinus evidenter sint, revoluta.

G Vasa per cerebrum excurrentia.

TAB. XI.

FIG. I.





FIG. II



LIBRI DECIMI

TABVLÆ XII DILVCIDATIO.

Visus audisq; organa, siue Oculum, Autemque internam conspiciendam proponit.

FIGVRA I.

Membranarum, tum Humorum oculi orthographiam, quemadmodum Optici loquuntur, siue, ut clarius nos dicamus, delineationem linearem, quæ scilicet ipsis per longum se offert, exhibet.

- A A Nervus opticus ad oculum contendens, in quo triplex ipse substantia, quantum fieri potuit, accuratissime parte inferna expressa est, a, a, enim duram membranam foris cingentem ostendit: b, b, tenuem: c, c, substantiam medullarem à cerebri substantia pronatam.
- B B d d Dura oculi tunica, ex dura nervi optici membrana a, a, circa d, d, enata.
- C Cornea tunica, quæ pars est anterior Duræ membranæ B, B.
- DD e e Vvea tunica, ex tenui nervi optici membrana bb, juxta c, e, producta.
- E Foramen vveæ tunicæ, quod anteriore fede est, pupillam constituens.
- F f Rectiformis tunica, ex medullari nervi optici substantia exorta, quemadmodum id prope f cernere est.
- G Adnata oculi tunica, oculum orbitæ alligans.
- II I K Sedes trium oculi humorum. H, Aquei est: I, CrySTALLINI: K, Vitrei.

FIGVRA II.

Dura tunica facies exterior cum portione nervi optici exhibetur.

Explicatio literarum eadem est cum literis figuræ præcedentis, accuratius tamen hic, quomodo crassa optici nervi membrana in Duram oculi tunicam degeneret: simul quoque duram percurrentia Vasa demonstrantur.

FIGVRA III.

Dura tunica per transversum secta posteriorem partem continet, ut interna ipsius superficies, cum portione nervi optici, à quo oritur, conspiciatur.

- A Dura tunicæ facies exterior.
- B Ejusdem facies interior.
- C Nervi optici portio.
- D Locus ubi in duram tunicam exteriore sua membrana abit.

FIGVRA IV.

Vvea tunica, cum portione nervi optici, facies exterior.

- A A Nervus opticus, cujus tenuis membrana hic, dempta duriore, conspicua est, ut, quo pacto in vveam tunicam degeneret, videatur.
- B Medullaris nervi optici substantia.
- C Foramen, quod pupillam constituit.

FIGVRA V.

Vvea tunica interior superficies.

- A Nervii optici tenuis membrana.
- B B Vveæ tunicæ interna facies.
- C Pupilla.

FIGVRA VI.

CrySTALLINUM humorem ex latere conspiciendum præbet.

FIGVRA VII.

CRYSTALLINUM, vitreumque humorem monstrat, ut quo pacto ille ab hoc contineatur, pateat.

FIGVRA VIII.

Membranam tympani, siue primæ cavitati obtemperantem, in suo situ, effracto nonnihil meatu auditorio, cum vicinis ossium temporum partibus, ostendit.

- A Tympani membrana.
- B Meatus auditorius, ique, ut tympani membrana cerneretur, effractus.
- C Sedes ossis petrosi, in qua secunda, & tertia caverna latet.
- D Pars appendicis styloïdis.
- E Processus mammillaris ossium temporum.
- F Inferior cranii sedes.
- GG Superior cranii sedes.

FIGVRA IX.

Ablata membrana tympani, ipsum tympanum, siue primam cavernam, cum circulo osseo, ac tribus ossiculis auditui dicatis demonstratur.

- A Os temporum.
- B Processus ejus os jugale efformans.
- C Circulus osseus, cui tympani membrana alligatur.
- D E F Ossicula tria auditus, quorum exactior demonstratio libro secundo, tabula septima propolita.
- G Prima caverna, siue Tympanum.

FIGVRA X.

Effracto petroso osse, foramina ex prima caverna in reliquis duas penetrantia ostenduntur.

- A Foramen ad secundam cavernam, siue labyrinthum, tendens.
- B Foramen ad tertiam cavernam, siue Cochleam, abiens.
- C Processus mammillaris ossium temporum.
- D Interior effracti processus mammillaris cavernosa facies.
- E Cavitas sat ampla in mammillarem processum penetrans.
- F Processus ossium temporum os jugale constituens.

FIGVRA XI.

Duas cavernas, secundam inquam, ac tertiam, rupto petroso osse exhibet.

- A Labyrinthum, in quo duo duntaxat foramina ostendi poterunt.
- B Cochlea, cujus tortuositatem hic observa.

FIG. I.



FIG. II.




FIG. III.



FIG. IV.




FIG. V.




FIG. VI.



FIG. VII.



FIG. VIII.




FIG. IX.





FIG. X.



FIG. XI.



ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS

D E

F O R M A T O
F O E T V


Liber Singularis.

INDEX CAPITVM HVIVS LIBRI

CAP. I.	De divifione partium fetus ,	Pag. 1
II.	De partibus externis propriis feu fecundinis ,	ibid.
III.	De Placenta, & cotyledonibus ,	ibid.
IV.	De membranis fetum involventibus, & primo de chorio ,	3
V.	De allantoide ,	4
VI.	De amnio membrana ,	5
VII.	De fudore in amnio contento ,	6
VIII.	De cutis foridibus ,	ibid.
IX.	De umbilico, feu vafis umbilicalibus ,	7
X.	De praefione umbilici ,	9
XI.	De partibus internis propriis , ac primum de vafis umbilicalibus ,	11
XII.	De ftructura vaforum thoracis in fetu ,	14
XIII.	De excrementis fetus internis ,	15
XIV.	De partibus communibus , earumque divifione ,	18
XV.	De cute ,	ibid.
XVI.	De mammillis ,	19
XVII.	De oculis ,	ibid.
XVIII.	De ceteris partibus compofitis internis ,	ibid.
XIX.	De offibus ,	21
XX.	De partus tempore, modo & caufa ,	27

ADRIANI SPIGELII
AD LIBROS DE
FORMATO FOETV

Præfatio.

 Vi humani foetus Anatomem haftenus *Visitas
libri.* administrarunt, aut de eodem commentarios posteris in lucem protulerunt, tantum eas fere partes, quarum beneficio foetus in utero augetur atque nutritur, quæque à partu majore iam reddito homine oblitterantur aut vix amplius comparent, examinandas sibi proposuerunt; cum tamen aliæ sint in foetu partes, ex quibus ejus corpus componitur, plurimæ, quæ si quo tempore ex utero egreditur foetus, cum illis partibus, quæ in perfectis hominibus, natuque grandioribus visuntur, comparentur, multum discriminis habere videntur, quæque in tanta varietate morborum, quibus infantes & pueri obnoxii sunt, in tanto variarum corporis actionum discrimine, quod in primis ætatibus annisque teneris observare licet, non minus deberent inspicere, quam quæ illico post nativitatem ob usus vel actionis interitum auferuntur & oblitterantur. Bonus Agricola bonusque colonus non solum quomodo tritici granum prima germina radicesque tenellas ad sui nutritionem, postquam terræ injectum est, edat, scire cupit, aut quomodo & quando ad spicas proveniat; verum etiam ut à primo germine in terra mutetur, ut producat calamos, antequam spicas proferat, ad irrigandos commodo tempore agros, siccitates comparandas, nebulas arcendas, quo frumentum habitius & copiosius futuræ messi alat ac nutriat: sic egregii & prudentis medici est, ac naturalis scientiæ cupidi, præter illas partes, quibus foetui alimentum à matre suppeditatur, etiam alias diligentius intueri, quæ aliter se habent ac in perfecto homine natuque grandiore videntur, &
nos

nos ad necessariam cognitionem infantis naturæ perquam admirabilis deducere possunt, ut homines in hac tenella ætate constitutos à consuetis morbis quam maxime fieri potest tueamur, sanumque corpus atque decorum alamus juventuti. Quocirca omnes fœtus partes considerabimus. Primo autem eas, per quas fœtus in utero augetur atque nutritur. Secundo illas, per quas jam ex utero in lucem mature egressi, infantis & pueri naturam induit, ut plurimarum mutationum causam, quibus in primis ætatibus homo variat pene omnes corporis actiones, pernoscere queamus. Quoad ordinem sciendum est, me potius elegisse eum, quem nonnulli Anatomici observarunt, licet minus philosophiæ legibus consentaneum, quam eum qui à Clarissimo Viro Fabricio ab Aquapendente fuit observatus. Hic enim & fœtus & alterius cujuslibet organi humani corporis particulas singulas simpliciores per dissectionem examinans, figuram prius, connexionem, situm, numerum, & alia in partibus indaganda in conspectum profert, deinde artificiosa ratione ac methodo actiones totius organi declarans, mox usum singularum organi partium, deinde connexionis, figuræ, situs, ac numeri causas subjungit. Sic Arist. in Hist. de Animalibus, naturam, quomodo se in animalibus habeat, enarravit; deinde in cæteris libris de Partibus, motu ac generatione animalium, causas eorum, quæ seorsim in historiis enarrata sunt, diligenter & artificiose recensuit. At nos præsupponentes actionem fœtus in utero esse nutritionem & augmentum, ex utero vero egressi perfectionem hominis, enarratis partium singularum historiis, statim de actione, earum & usu verba faciemus: sperantes sic brevitati & legentium utilitati & memoriæ consulturos nos melius.

ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS,
DE
FORMATO FOETU
LIBER SINGULARIS.

CAPUT I.

De partium in fœtu divisione.



Artes igitur in fœtu inspiciendæ, aliæ propriæ sunt, aliæ communes. Voco partes fœtui proprias, quarum beneficio fœtus actio in utero exercetur, quæque post partum vel evanescent, vel auferuntur, vel nullius sunt usus amplius. Communes vero dico, quas post partum infans habet, & quæ nequam abolentur; sed grandiores fiunt crescente corpore, vel mutantur in substantia & qualitate. Rursus propriæ fœtus partes, aliæ externæ sunt, hoc est, extra fœtus corpus conspicuæ; aliæ, internæ, seu intra corpus positæ. Inter externas numerantur, carnea quædam moles (quam recentiores placenta vocant) vasa, membranæ, & excrementa: inter internas, vasa & excrementa tantum. Communes autem partes, tum internas, tum externas, in tertia parte considerabimus.

Divisio partium fœtus.

Extra fœtum quæ partes, & quæ intra.

CAPUT II.

De partibus externis propriis, seu secundinis.



Taque ab externis partibus propriis exorfi, dicimus illis quatuor enumeratis commune nomen à Græcis Latinisque datum fuisse: etenim Græci eas appellant *τὰ δ' ἄνω* & *ὕστερ*; Latini ad eorum imitationem secundas & secundinas; quod in partu primo quidem fœtus, deinde vero hæ omnes partes excludantur, tanquam secunda vice. Dicuntur quoque à veteribus *χρόνιον* & *χρόνιμα*, quod sint instar spatii & alvei, quo fœtus in utero concluditur: verum de hac voce plura, ubi de chorio membrana egero.

Spontanea partium ex-ternarum.

CAPUT III.

De placenta, & cotyledonibus.



Arnea* hæc moles ab Hippocrate lib. de Nat. pueri caro simpliciter nominatur, à recentioribus anatomicis placenta; quod, postquam in lucem fœtus prodiit, umbilico annexa id edulii genus referat, quod vulgus placentam vocat. Obstetricibus nonnullis hodie quoque dicitur secundina, quod hæc caro umbilico annexa & chorio, secundarum maximam partem constituat. Constat etiam apud Gal. lib. 11 de sem. venter quosdam cotyledonas seu acetabula appellasse, visumque nonnullis posterioribus fuit, apud Arist. lib. 11 de Gen. animal. nil aliud per cotyledonas intelligi: ubi inquit animalia utrinque dentata, quæ loco unius magnæ venæ per uterum dispersæ multas venulas habent ac frequentes, etiam habere in utero vocatas cotyledonas, parte convexa ad uterum, cava vero fœtum versus positas; has ubi fœtus accrescit atque perficitur, minores reddi; obliterari vero, ubi jam perfectus est fœtus, atque in ea, veluti mamma, reponi alimentum à natura sanguineum pro fœtu, & hoc alimentum paulatim ex multis collectum quasi tuberculum, vel *φλεγματίας* evadere, & sic fieri corpus

AA

acetabu-

acetabulorum. Sed ex hoc Arist. loco non intelligo cotyledonas cum appellasse hanc carnem vel eas carunculas, quas in ovillo foetu & vaccino observare semper licet, quasque Galenus agnovit indignas cotyledonis nomine, dum eas lib. xv de Vsu partium cap. iv, nominat carnes viscosas, veluti pinguedinem quandam; sed capita extrema venarum uteri, per quæ foetus in utero alimentum sanguineum capere solet, mulieribusque singulis mensibus sanguis expurgari consuevit: hæc enim vasorum oscilla intumescunt ubi foetus in utero alimentum capere incipit, augefcente foetu augentur, maturefcente vero paulatim abolentur; quod huic carneæ moli non ita accidit, neque enim evanescit, cum insigni hac mole carneæ substantia trahatur ex utero post partum una cum secundinis. Et quamquam in ovillo foetu hæc eadem caro cavitatem aliquam habere videatur, quæ foetum respicit, convexam vero qua utero connectitur; attamen in aliis animalibus gravidis hæc carnis hujus figura non ita apparet; vaccinus enim foetus adhæret utero carunculis multis, quæ fungos figurant (quos sponzolos vulgus hic Patavii vocat) quæ non habent partem concavam quemadmodum ea, quæ cotyledonis nomine digna sunt. Nam *κοιλεδόνες* Græci nuncuparunt cildam mensuræ generis insigni cavitatē prædito similes, quod & cotylam & *κόψαφις* nominabant, Romani acetabulum, ut herbam in calidarum regionum muris nascentem, quam Romæ umbilicum Veneris vocant; similiter coxendicis cavitatem in humanis ossibus, cui caput fœmoris inferitur; præterea cavitates quasdam in polyporum cirrhis seu brachiis, quibus validissime corpus quodcumque obvium amplexantur ac fugunt. His igitur cum vasorum uteri oscilla maxime similia sint, in quibusdam domesticis quadrupedibus, ut ove, vacca, capra, quas antiquos & priores Anatomicos prius quam mulierem inspexisse credibile est, quod ad cibum quotidie macerarentur, idcirco cotyledones & acetabula vasorum uteri oscilla appellata sunt licenter etiam in muliebri utero, etsi in hoc ora vasorum nullam cavitatem habeant; etenim interna uteri superficies in non gravidis mulieribus lævis & lubrica est, præterquam quo tempore menses fluunt, vel foetum continet & alere incipit, siquidem tunc asperior & inæqualior ea fit parte, qua utero carneæ hæc substantia adhærescit, & hanc inæqualitatem tunc constituunt ora vasorum uteri, cum sanguine turgant. Quocirca de capitibus vasorum uteri, non de carneæ substantia, & Arist. loc. cit. & Hippoc. Aphor. xlv, lib. v, sunt intelligendi, si aliquando cotyledonum uteri mentionem faciunt. Etenim Hipp. de mulieribus gravidis inquit: *Quæcumque mediocri corporis habitu præditæ secundo aut tertio mense sine causa manifesta abortiunt, iis acetabula uteri plena mucoris sunt, neque præ pondere foetum continere possunt, sed abrumpuntur.* Docens enim Hipp. causam, ob quam mulieres medicris habitus secundo vel tertio mense absque febre, erysipelate, casu, percussione, saltu, vel alia evidenti causa abortiunt, ait id contingere propter fines venarum in uteri interna superficie infarctas vel obstructas pituitosa materia, quibus finibus cum valide annecti nequeant extremitates venarum per placentam dispersarum, evenit ut pondere suo foetus facile fines vasorum umbilicalium à suis cotyledonibus abrumpat, atque una prohibetur, ne copia & qualitate conveniens alimentum foetui suppeditetur, præsertim grandiori, unde necesse est fieri abortum. Porro caro hujus placentæ lienis parenchymati prorsus similis esse videtur, mollis, rubra, ac nonnihil ad nigredinem vergens, innumeris ^a referta venis & arteriis, quæ postea per chorii substantiam disseminatæ ^b ramos grandiores constituunt, & in ^c umbilicalem venam & arteriam migrant; harum venularum ^d finibus fundo uteri firmissima & ^e inæquali basi annectitur placenta, foetusque à matre sibi sumit alimentum sanguineum; sed an arteriolarum oscula cum uteri arteriolarum osculis conjungantur, uti scripsit Gal. lib. de formato foetu & alii post eum celebres Anatomici, ab Arantio insigni olim Bononiæ Anatomico negatum est. Censet enim hic, findi tantum per placentam in minutissima filamenta: cui viro ego quoque assentior, sed de hoc plura cum de vasis umbilicalibus agam. Probabo enim sanguinem vitalem & spiritum nequaquam foetui à matre largiri; monstraboque postea usum harum arteriolarum. Annectitur autem hæc caro, seu adnascitur internæ uteri superficiei & primæ membranæ seu primo involucri, quod dronum appellant nonnulli; neque ubique, sed modo in dextro, modo in sinistro latere, & in utroque magis posterius, quam antè: unde animadvertendum, an foetui mæculo hæreat in dextro,

Cotyledonum
nomen, ut
foetum uteri
oscula tribu-
tum est licen-
ter.

Qualis pla-
centæ caro.

Auctore opi-
nio de continu-
atione vasa-
rum foetus
cum matre.

a, T. V.
b, E. V.
c, T. V.
d, T. V.
e, C. V.
f, B.

dextro, fœminæ in sinistro latere, juxta Hippoc. sententiam Aphor. XLVII, lib. v, ubi ait, *fœtus, mares quidem in dextris, fœminas in sinistris magis gestari*. Cæterum in usu hujus placenta non convenio cum Arantio : assignat enim huic insignem actionem depurandi sanguinem, qui ad fœtum fertur ; quæ sane actio tam longe ab hac carne abesse mihi videtur, quam hic egregius vir à veritate. Duæ enim sunt rationes, quæ maxime contra hanc opinionem pugnant : & prima est, quod si actionem depurandi sanguinem hæc caro obtinisset, cum tria à sanguine soleant plerumque segregari, bilis scilicet, pituita, atque serofus humor ; quærendum est ab ipso, quemnam humorem putet ex tribus placenta evacuare ; an, quia maxime videatur continere melancholicos humores, & substantia hujus parenchymati lienis similis sit, ut superius dixi, melancholiam ? at hæc in liene fœtus segregatur. An bilem, aut serofum humorem ? at ille in folliculo fellis in fœtu depuratur ; hic vero, in renibus. Secunda ratio est, si sanguis crassius & fœculentus proprietate substantiæ segregaretur, esset utique necesse, ut in omnibus animalibus, quorum fœtus hanc carnem habent, hæc caro ejusdem esset coloris & substantiæ, cujus est ipse lien ; sed in ovillo fœtu hæc substantia multo est liene candidior, viscosior & pinguior. Idcirco alium coactus sum invenire usum, adhibita prius distinctione nominis carnis, qua intelligimus totam massam carneam, prout est ex venis, arteriis, & carneo parenchymate constituta, vel parenchyma tantum, hoc est, carnem illam, quæ interjacet venulas & arteriolas ; dicimus itaque late sumpto carnis nomine, naturam eam in humano fœtu & aliorum quorundam animalium fabricasse ad firmiorem fœtus annexum cum utero ; parenchyma vero seu carnem, quæ interjacet vasa, ad commodiorem annexum, tutelam, & divisionem vasorum ; itaque verus usus est, ut sit radix fœtus, per quam sumat à matre alimentum, sitque tutum conceptaculum & veluti mesenterium alterum fœtus, quod à matrice tanquam terra trahit alimentum. Dicere tamen posset aliquis, equinus fœtus caret hac carne, & tamen firmiter annectitur utero ; respondeo alium esse uterum humanum, quam equinum, caprinum, vel ovillum. Nam interna hujus superficies non multis vasorum finibus in unum locum congregatis, ut muliebris, caprillus, ovillus, & equinus præditus est ; sed grandiores per uterum dispersas & rariores habet venas ; prout igitur vasa in diversis animalium uteris interius sunt constituta, ita etiam extremitates vasorum umbilicalium fœtus erant constituendæ, vel simplices & majores & sine carnis auxilio annectendæ, vel in multiplicibus ramulos findendæ & carnis ope cum utero copulandæ. Quoniam igitur uterus muliebris multis vasorum finibus præditus est interius, annectitur fœtus humanus utero mediante hac placenta, cujus quidem tantum venarum extremitates internæ uteri superficiei alligantur ; parenchyma vero multifidas extremitates venarum & arteriarum fulcet, fovet atque tuetur : quin etiam præstat, ut venulæ recta suis omnibus finibus vasorum uteri jungantur, ut recta ferri sanguis ad fœtum ab utero semper queat : alioquin si vasorum extremitates hac substantia carnea caruissent, in se ipsas concidissent, angescerentque & utero & fœtu periculum fuisset, ne tam exigui fines vasorum dilacerarentur.

Arantii opinio de usu placenta proponitur & rejicitur.

Auctoris opinio de usu placenta.

C A P V T I V.

De membranæ fœtum involventibus, & primo de Chorion.



Equuntur membranæ fœtum involventes : quarum duæ, fœtum totum involvunt ; ut chorion & amnion ; una vero, partem fœtus tantum tegere videtur, ut allantoïdes. Post carnem a chorion membrana conspicitur, quam Latini recentiores secundinam passim interpretantur. Sane apud Hipp. lib. de morbis mulierum, & aliis in locis per chorion nil aliud quam τὸ δεύτερον seu secundina intelligitur : postquam enim Hippoc. docuisset, quomodo mulier & à secundina deinceps liberari possit, & quid patiat ut ubi non statim à partu exierit, subjungit ; *Si mulieri chorion in utero relictum fuerit, hoc sic contingit. Si per vim ruptus fuerit umbilicus, aut per imperitiam ejus qua umbilicum secat, prius quam chorion ex utero exierit, secus fuerit uterus sursum retrahit δεύτερον, id est, secundam, utpote lubricam & madentem, eamque arctissime complectitur*. Idem Hippoc. jubet Aph. XLIX, lib. v, *Ad secundam*

A A 2

deurbandas,

Chorii nomen
dupl. acci-
piuntur.

Cur mem-
brana hac
chorion voc-
etur.

Qualis chorii
insistantia.

Vetus Vfus
Chorii.

deturbandas, sternutatorio appposito, nares & os comprimere; ὕστερον vocabulo usus. Et in epidemi-
cis lib. 11, sect. v, χυμὸς καὶ γαῖον, sive purgationem fieri sternutatorio naribus appposito di-
cit. Ex quibus patet, χυμὸς καὶ γαῖον unum idemque esse, ac duplici significatone accipi
apud scriptores: una, pro secundis proprie dictis, hoc est, omnibus partibus externis
fortis; altera vero, & propria, pro una ex tribus membranis, quam nunc examinandam
suscepimus. Apud Arist. lib. 11 de Gen. cap. vi 1, à membranis & secundis videtur distin-
cta vox chorii, dum chorion & ὕστερον dicit inter foetum & uterum positam esse; quasi per
chorion intelligere velit massam carneam annexam cum sua membrana chorion pro-
prie dicta, multisque venis & arteriis prædita: per membranas vero allantoidem &
amnion tunicas exangues, & ideo membranarum nomine dignas. Dicitur autem cho-
rion hæc prima membrana, quoniam teste Hippoc. per ipsam nutrimentum & sanguis
χυμὸς, id est, permeat ad foetum; vel uti putat Stephanus Atheniensis in commento su-
per lib. Gal. ad Glauconem, quia ad modum chori venæ & arteriæ in hac membrana
congregantur; vel etiam, ut cæteris placuit Anatomicis, quod sit chorion, hoc est, exi-
guus locus, quo foetus concluditur. Est autem chorion membrana crassa, alba, multis
venarum & arteriarum ramis in placentam definientibus in minimis furculos insignita;
parte qua foetus respicit interna, lubrica ac lævis; qua vero uterum spectat, & placen-
tæ carneæ annectitur, inæqualior. Vfus hujus membranæ est, ut non modo foetum uni-
usque tegat ac velet; sed etiam ut radices venarum & arteriarum, seu fines vasorum
umbilicalium tuto excipiat ac liget; & propterea crassam & duplicem eam fecit sum-
mus rerum Opifex. Est etiam externa parte inæqualis, ut placentæ firmius connasce-
retur & adhereret; internâ, lævis & lubrica, ne à subjectis membranis tenuissimis
separata, sua asperitate quidpiam damni iis adferret. Tribuunt nonnulli alium chorio
usum, qui allantoidem in foetu humano reperiri negant, nempe urinam pueri supra am-
nion continendi, hoc est, inter id spatium, quod est inter chorion & amnion: Scribit
enim Rufus Ephefius per urachum meatum urinæ similem humorem transfundi.

C A P V T V.

De allantoide.

Cur allantois
vocalur hac
membrana.

An reperitur
in humano
foetu.



Rufi Ephefii
opinio de al-
lantoide.

Authoris opi-
nio de allan-
toide.

Allantois, chorio subjecta membrana, nomen suum apud Græcos ac-
cepit, quod ἀλλαντὶς imitetur sua figura: nam hac voce Veteres tum
farciminis quoddam genus, quod Iucanicas vocat Apitius; tum intesti-
num nominabant. De hac autem membrana primo queritur, an in hu-
mano foetu reperitur? etenim negant contra Gal. & alios veteres do-
ctissimi atque in anatomicis dissectionibus exercitatissimi viri, qui eam
tantum in ovillo, vel vaccino, vel caprino foetu observasse se dicunt; putant idcirco ve-
teres anatomicos horum animalium foetum pro humano nobis depinxisse. Et merito
quispiam poterit conicere, veteres caprinum vel ovillum, vel vaccinum, vel hujus ge-
neris alterius animalis descripsisse, cum Theophilus in lib. de humani corporis fabrica,
capite xix, docere unumquemque volens partes, quæ ad foetum spectant, & tres ejus
tunicas, jubet dissecandam artificiose capram gravidam, & eam inspiciendam. Sic
Aëtius tetrabib. iv, ferm. xv, inquit; Si quis diligentius specularetur ea, quæ ad foetum per-
tinent voluerit, capram aut vaccam, aut cervam dissecare poterit. Horum igitur opi-
nio uti nova est, digna certe, quæ ad examen revocetur, præsertim cum ad eam com-
probendam nuper invenerim insignem Rufi Ephefii autoritatem. Hic enim Gal. anti-
quior & ab eodem aliquoties cum laude citatus, lib. 1 de partium appellationibus, capi-
te ultimo scribens de foetus humani partibus, & maxime de membranis, chorii & am-
nii tantum meminit, & autopsia sua declarat, urinæ similem humorem in chorion trans-
fundi, nulla facta allantoidis mentione. Reliqui porro omnes, qui hæcenus floruerunt,
allantoidem humano foetui assignant, aut veterum opinionibus aut celeberrimum auctorita-
tes secuti. Hac in tanta virorum clarorum disensione displicet me arbitrum factum
esse, qui minime ut illi in anatomicis dissectionibus consenserim: tamen his ductus
rationibus censeo, allantoidem in humano foetu reperiri. Prima, in humano foetu tanta
est hujus membranæ necessitas, quanta in foetibus aliorum quadrupedum: non enim
decebat

decebat tantum naturam urinam à sudoribus segregare, ac in proprio loco, quod est inter chorion & amnion collocare; sed & propria tunica tanquam conceptaculo continere, ne inter spatium quod est inter chorion & amnion satis amplum, per ambitum fetus, quemadmodum sudor, fluctuaret huc & illuc in omnem partem, præsertim cum exigua urinæ tam amplum & spatiosum locum dare, non videatur conveniens natura. Altera ratio est, quod Andreas Vesalius concivis meus in commentariis anatomicis vesicam quandam nobis depinxit in humano foetu intestino similem, ex quo farcimina fiunt, inter chorion & amnion positam, qua urina foetus in utero coasservatur. Quod spectat igitur ad solutiones contrariarum rationum, & ad eam primo, qua dicunt allantoidem in dissectionibus non reperiri; admonendi sunt, se eam reperturos, si à placenta prius in gravida muliere dissectionem auspicentur eo modo, quo ipse Vesalius aliter certe propter membranæ summam tenuitatem abrumpi statim hanc membranam levissimo negotio contingit. Rursus autem Ephesii auctoritas quamquam apud me magni sit momenti; tamen tanti non est, ut Gal. auctoritati in hac re sit anteponenda, etsi enim Gal. nunquam gravidam secuerit, quod esset ejus temporibus lege vetitum humana corpora dissecare; tamen multos insignes anatomicos, qui homines secuerant, ut Herophilum secutus, quæ ipse ex anatome fimiæ & aliorum quadrupedum non est assecutus, ex aliis fide dignis in suos retulit commentarios: sæpe etiam optimis rationibus ac demonstrationibus ductus, quæ ipse in dissectionibus humani corporis inspicere non potuit, credidit, atque aliorum diligentiam fidem præsupposuit, quemadmodum & in eo quod allantois in humano foetu reperiretur. Veteres ovillum vel caprinum foetum plerumque descripserunt, non quod mulierem gravidam nunquam inspexerint; sed quod eam secandi non facilis erat occasio, quodque prisca Anatomici antequam foetum humanum secuissent, in ovillo sese prius exercuerint, ejusque membranis ea indiderint nomina, quæ ipsis convenire videbantur; unde factum est, ut allantois membrana nomen suum acceperit à farcimine vel intestini, ex quo farcimina fiebant, figura. Si enim allantois ovilla infletur, plane lucanica farcimina imitatur; at humani foetus allantois, vesicam potius oblongam, quam farcimen vel oblongum intestinum refert: ut hac de causa lapsus Vesalius crediderit non huic vesicæ, sed chorio cum carnea placenta inverfo, sic ut eam undique complectatur, allantoidis nomen assignandum. Est autem allantois, membrana tenuissima, alba & mollis, in homine veluti in ovillo foetu exiguis admodum venis & arteriis ad nutrimentum prædita, inter chorion & amnion media, ea tantum parte tota conclusa, qua placenta cooperitur. Conneditur cum meatu uracho dicto, per quem & vesica urinam suscipit: hujusque munus est, urinam foetus à sudore separatam conservare.

Modus investigandi allantoidem in humana forma.

Qualis sit structura allantoidis.

Situs & usus allantoidis.

C A P V T V I.

De amnio membrana.



Vltima tunica dicitur ab Empedocle & cæteris posterioribus Græcis ἀμνιον & ἀμνιον, quasi ἀμνιον ὀψλιν, id est, *optima membrana*, per metaphoram transposita una littera. Interpretes apud Gal. amiculum interpretantur, cum Grammaticis plerisque ἀμνιον ab ἀμνιον nomen traxisse videatur, quod agnum sonat, quasi diceret agninam membranam; vel quod ut hætenus multis visum est, mollis & candida sit instar agni; vel uti ego interpretor, quod primi Anatomici, agninum foetum spectantes priusquam humanum, agno proximam hanc membranam viderint, ac ipsum agnum per eam translucentem, sic ut nulla membrana circumdatus esse videatur. Dicitur & à nonnullis conceptus armatura, & foetus vestis; ab Arabibus, *abigas*. Est autem substantia hujus lævis, alba, mollis, tenuis, translucentens, pauculis iisque exiguis venis & arteriis nutrita, totum foetum undique vestiens, chorioque tantum connata; facta non tantum ad tutelam foetus, more aliarum membrandarum; sed ut aquam clariorem urinam atque ab ea separatam recipiat, quæ aqua nil aliud est, quam sudor, quem dum in utero hæret foetus, continuo per cutis spiracula admodum patula cutimque tenellam ob sanguinem, quo alitur, copioso sero abundantem large suppeditat. Hæc illa mem-

Cor membrana hac amnios vocatur.

Qualis sit ejus substantia.

Situs & usus amnion.

*Unde orta
membrana
superflua de
amnio.*

brana est, cum qua si forte contingat ut fœtus humanus prodeat in lucem, maxime circa caput vel aliam partem velatus, si mas sit, galea vocatur & *helm* à Germanis obstetricibus; si femina, vitta, indusium, seu camisia, ut Itali loquuntur. Putant vero fœtum cum capite hoc involucri vestito genitum, mira facturum, fortuna prospera in vita usurum, si eam comederit vel secum portarit, ab armorum injuriis tutum ubique fore: addita non ignobili superstitione vel potius insigni mendacio, ut si forte ab obstetricibus clanculum auferatur, magnis infortuniis obnoxium futurum & miserrimam vitam ducturum; quod, quam sit ridiculum credere, ipsa anatome declarat. Sed quemadmodum nulla fabula, nulla superstitione, nullumque mendacium adest, quod non prius ex alicujus rei veritate originem traxit; sic etiam puto nonnullos olim existimasse velatos aliqua in parte pueros hac membranâ longe magis miseram vitam traducturos, quam qui more cæterorum sine hoc velamine pariuntur: & recte quidem: nam infantes cum amnio circa caput natos, puto sic nasci, vel propter robur membranæ, quam idcirco infans, dum præparat egressum ex utero, perumpere commode & undique non potest; vel propter fœtus imbecillitatem, qui se ab hoc involucri expedire probe non valeat. Novi aliquando Matronam in Belgio & novercæ meæ propinquam, quæ omnes filios & filias cum galea & vitta pepererat, singularique cura ac diligentia membranas asservarat, ne ab obstetricibus auferrentur, sua omni prole numquam pubertatis annum attingente, quod admodum debiles nascerentur, orbatam.

CAPUT VII.

De sudore in amnio contento.

Sudoris usus.



*Utinam cur à
sudore separata.*

Orro aqua illa clara atque limpida, quæ copiosa undique fœtus corpus circumfluit, ac secundum, post urinam in allantoidem contentam, excrementum est, inter externas fœtus partes proprias, non spernendos habet usus. Huic enim fœtus in utero innatans, non levior fit matri, utpote quæ & fœtum & aquam gestare debet, sed minus ponderis præbet acetabulis, quibus fœtus placenta annectitur, dum is suspensus est. Deinde, in movendo se & facilius movetur, & vertitur facilius ad os uteri, in tempore partus cum capite, quod alioquin ad fundum uteri versum habet fœtus. Tertio facilius fœtui ex membranis exitus præbetur amplo spatio à corpore semotis, & humore, quem continent, lubricis. Quarto, ante partum, jam ruptis membranis, à fluente hoc humore per os & cervicem uteri cuncta loca irrigantur ac lubrica fiunt, ad facilitandum exitum fœtus ex utero. Cæterum sudorem ab urina segregatum voluit natura, non permixtum, ne cuti tenellæ aliquod damnum urinæ acrimonia inferret.

CAPUT VIII.

De cutis sordibus.

Sordes quid.



*Recentiorum
opinio de his
sordibus.*

*Autoris opi-
nio de corrupto
demiglu.*

Ost urinam & sudorem, sordes apparent cuti corporis inhærentes: suntque tertium & ultimum excrementum, glutinosum crassumque, quod per cutis poros una cum sudoribus eductum, tamquam magis terrestre cuti adhærescit: ita quoque cernimus, nobis sudantibus crassiore excremento cuticulam obliniri, deinde ab indusiis lineis abstergi. Putant recentiores usum hujus excrementi esse, ut hujus obrustatione cutis ab acrimonia, quam sudor circumfluens longo tempore sibi nonnihil acquirit, vindicetur. Sed mihi adhuc succurrit aliud longe excellentior; ut scilicet vitales spiritus poris cutis nonnihil oclusis ab hoc glutine conserventur, ne diffuant à magno calore, quem cogitur fœtus in utero sustinere; neve sanguis qui in partibus exterioribus tenuior est, dimanet ichorofus, propter poros fœtus multo patentiores iis, qui jam nati sunt.

De umbilico seu vasis umbilicalibus.

Nunc inter partes externas agendum restat de iis vasis, quæ Vmbilicalia appellantur. Horum autem nomine intelligo id totum, quod ex ^a media abdominis parte egressum, ^b intestini formam adipiscitur; neque aliud est, quam quatuor vasorum, & duarum scilicet arteriarum, ^d unius venæ & ^e urachi ^c connexus, per ^e membranam à ^b chorio delatam atque in formam funiculi ex multis funibus, vel cereæ candelæ ex multis parvis candelis contortus. Qui quia intestini effigiem refert, à multis obstetricibus intestinum apud varios populos nominatur. Hippocrates, eoque posteriores Aristoteles & Galenus proprio nomine hanc partem fœtus, umbilicum appellant. Arist. lib. 11 de generatione animalium, cum dixisset, nonnulla animalia recta in uterum umbilicum tamquam radicem dimittere, addit; ^{ἡ δὲ ἐμφαλὸς ἐκ καλῶς φάειος, est autem umbilicus in putamine contenta vena,} ut Gaza interpretatur. Per venas intelligit, & venas communes dictas, & arterias; per putamen seu καλῶς, tegumentum membranofum, quod alibi καλῶς δερματὶδὸν nominavit. Hæc obiter dicere volui, ut sciatur, umbilici vocem æquivocam esse, & capi modo pro hoc intestino ex vasis quatuor constante; modo vero, & communiter pro mediâ abdominis ea cavitate, quæ post partum à reciso vel sponte prolapsò umbilico relinquitur in nobis per totum vitæ spatium. Apparent autem in umbilico ex intervallis maculæ quædam nigræ, veluti murium stercora continentes, quæ sunt à vena una cum arteriis urachō contorta ac circumvolvuta; modoque exterius sanguine atro, quem continet, transparenter per membranam; modo à reliquis duobus vasis occultata. Longus est tres circiter spithamas plus minuse, & crassus digitum fere, quando maturus est fœtus. Et quoad situm, à placenta incipiens per medium frontem paulatim pergit, circumflexendo se ad occiput; inde rursus oblique reductus ad sinistram cervicis & juguli partem, deorsum super pectus progreditur, donec in mediam abdominis partem inferatur. Nam ex furculis venarum & arteriarum, per placentam dispersis in chorio membrana fiunt majores rami, qui tandem in truncum coeunt, in duas arterias exiguas, sed unam magnam venam & amplam, per totum umbilicum capreolorum in morem convoluti progrediuntur, una cum urachō ab allantoide orto, donec abdomen pertingant. Porro substantia venarum, & arteriarum prorsus similis est venis & arteriis per totum corpus fœtus dispersis. Urachi vero substantia non est similis poris ureteribus, sed membranosa est parte ea qua ex vesica intrat in umbilicum, ubi paulo post trium circiter digitorum transverso longitudine supra abdomen egressus finitur, & obliteratur in medio umbilici. Ex quo patet non esse verum, umbilicum ex urachō constare, & umbilici humani tria tantum esse vasa, duas arterias & unam venam; urachum vero poris ureteribus, per quos urina è renibus in vesicam colatur, similem esse. Herodotus, vel Auctor illius libri, qui Introductorius inscribitur in operibus Gal. cap. 11, nervum ad compositionem umbilici concurrere putat, his verbis, interprete Andernac: *Ex venis uteri, quæ secundas implicant, binæ aliæ prodeunt venæ, ab arteriis ibidem sitis binæ arteriæ, & à nervis unus nervus, mutuo in unum congressa meatum, ὕερον appellantur, absorbunt, qui infantis umbilico inferuntur, ex quo & enascitur & suspensus est; ab umbilico autem venæ ad jecoris portam sanguinem ita fœtibus transmittunt. Arteriæ vero juxta vesicam crassiores arteriæ, nervus hic spina inferitur.* Hæc ille. Ex quibus colligere licet, non modo ex nervo umbilicum componi externum, fed etiam ὕερον ab eodem umbilicum hunc appellari. Cæterum quod umbilicus nervum habeat, probari etiam ratione potest, ex Veterum & Recentiorum monumentis desumpta: videntur enim omnes Anatomici sensisse umbilicum sensu præditum esse. Aëtius enim ad amputandum umbilicum recens nati magis laudat scalpellum acutum, quam aliam materiam arundineam vel vitream, ne atteratur umbilici pars puero annexa: deinde vetat cuminum præcisio umbilico inspergere propter acrimoniam, contra veterum nonnullorum consuetudinem, quasi umbilicum sentire putaret. Inter recentiores Pareus & alii, qui curam infantis recens nati præscripserunt, præfecto umbilico imponunt oleum

vel rosaceum, vel amygdalinum cum panno lino, ad sedationem doloris. Contra Gal. aliter sentit lib. vi de Decr. Hipp. & Plat. cap. vi. Scribit idem nullum apparere nervum ex utero in secundas provenire, neque in ipsis secundis, neque in umbilico, aut de foris intro subire, aut de interiori sede extra prominere, quod nulla omnino necessitas fuerit, ut origo nervorum concepti fœtus, veluti venarum & arteriarum, matri conjungeretur. Et revera nullus nervus in umbilico aut secundinis apparet; sed in urachi medio nervulus candidissimus ab interna vesicæ membrana ortus (de quo sorte in lib. Introductorio facta est mentio) invenitur: veruntamen et si nervi aliquam formam induat interna urachi pars, nervus non est; cum neque ullam communionem connexionemque cum nervo habeat, neque ullo modo in spinalem medullam, sed in fundum vesicæ inferatur: sed hæc nervo similis urachi pars, nil aliud est, quam pars urachi interna, quæ ubi fœtus jam ex utero egressus est, contrahitur veluti in nerveum funiculum, nullo per medium foramine præditum. Sed quod hæc pars non sentiat, patet; quoniam & umbilicus non sentit. At neque erat conveniens, ut sentiret. Primo, quia dum properat ad exitum fœtus, & post partum ab umbilico dependens huc & illuc moveatur, varie in hac circumagitatione distrahitur, contorquetur ac distenditur umbilicus. Itaque si sentiret, doleret ob solutionem continui: si doleret, nequiquam ex matris utero exire tentaret; sed quiesceret potius propter dolorem, quem sibi alias parit ex distorsione umbilici. Quocirca erat necesse, ut matri quidem in partu magnus dolor esset; fœtui vero, nullus aut saltem quam fieri poterat minimus. Exemplum habemus in iis, quæ ex ovo generantur. Omnia enim, putamine rupto, exeunt ex ovo absque dolore: at mater, quæ ovum enititur, percipit dolores. Secundo probatur umbilicum non sentire, quod ab amputato umbilico observatum sit infantes non vagiisse; imo ego aliquoties vidi puellas post partum optime se habentes dum præcinderetur umbilicus, neque post etiam per quadrantem horæ, non solum non plorasse, sed nec os quidem aperuisse. Vana igitur & inepta hæcenus medicorum est cautio, qua ad præcidendum umbilicum eligunt ferrum potius, quam vel arundinem, vel lignum præacutum, vel aliud quidpiam ad secundum aptum, & à præciso umbilico selecta quadam medicamenta imponi ad sedandos cruciatus jubent; cum certe si hæc pars urachi nervosa non sentiat, cæteras profecto ex quibus umbilicus constat, nullo modo sensum habere putandum sit, non venam, non arteriam, non etiam membranam, quæ illas involvit, cum hæc à chorio educatur, quod quam sit sensus experts, notant mulieres, quibus cum à partu secundæ extrahantur, nullus cruciatus excitatur. Quærit in problematibus Arist. cur homini magnus sit umbilicus (loquens de ea cavitate, quæ est vestigium in media abdominis parte resecti hujus umbilici) cæteris vero animalibus exiguus & non valde manifestus: putatque hoc contingere, quoniam umbilicus in cæteris animalibus in directum tendat, & cum diu in utero maneant, umbilicus interprete Gaza arescat ἀρδύσας; homo vero imperfectus prodeat cum humido & ἀρδύσας (sanguinolento male Gaza) exangui umbilico: sed vera ratio ex umbilici anatome capitur. Est enim multo major, proportionem considerata corporis humani fœtus, quam cæterorum animalium, propter amplitudinem vasorum.

Umbilicus
non habet
nervum.

Vana medicorum
cautio
dum supra
umbilicum
sectum medi-
camenta im-
ponunt.

Cur uterum
fœtusq. umbr-
licum.

Ufus umbilici
multiplex.

Cur longus sit
umbilicus.

Inferius um-
bilici.

Ufus hujus umbilici est multiplex: etenim per umbilicum fœtus nutritur, atque suspenditur, ut in omnem partem movere se queat; & urinam in allantoidem rejicit ex vesica. Convenit huic tanta longitudo ad commodiorem motum in utero, egressumque ex utero: etenim si breviorum umbilicum homini natura creasset una cum fœtu placenta & membranæ exire debuissent, quod partus facilitati obstetisset; nunc vero tam longum umbilicum natura fecit, ut prius fœtus totus exire possit absque secundis, quæ etiam alia de causâ debebant post egressum fœtus utero annecti, ne repentina dilaceratione vel abstractione oscula venarum placenta magnam copiam sanguinis funderent, cum vitæ infantis discrimine: & propterea tam longus est umbilicus, ut puer ex utero egressus nihilominus adhuc ipsi adhærere queat. Confert etiam hæc longitudo ad commodam educationem secundarum, in qua profecto insignis prudentia requiritur in obstetricibus. Inferitur autem umbilicus in inferiorem partem totius corporis, hoc est in medium abdominis: non enim decebat puerum ex æquilibrio ab umbilico dependere, sed superiores partes, ubi caput est & thorax, ponderosiores habere ab una parte; pedes

r. C.
h. 17.

pedes vero & mediam partem reliquam ventris ab altera, ut ex umbilico suspensus partibus superioribus tempore partus in caput versus uteri orificium facillime volveretur: nam partus naturalis tam homini, quam cæteris animantibus fit in caput. ^a Contorquentur autem in umbilico vasa in modum aciæ vel chordæ ex funibus binis vel pluribus constantis: non quia tanto longiora, & longiori mora sanguis præparator ad fœtum prodiret, ut somniant Anatomici; sed quia umbilicus erat circumducendus à parte dextra ad sinistram per frontem circa collum, donec ad abdomen perveniret, in qua circumvolutione si recta procederent umbilici vasa, profecto compressa nimium fuissent, nec pertransire commodè per arterias vitalis spiritus & calor, per venas sanguis, per urachum urina potuisset, quod per hanc vasorum tortuositatem mirabiliter evitavit natura. Adfert hæc tortuositas aliud quoque commodum in secando umbilico, ne illico sanguis fluere possit à præsectione umbilici cum vitæ discrimine. Circumducitur umbilicus à sinistro tempore in dextrum per mediam frontem, ut caput totumque fœtum commodè sustineat. Quod si forte fortuna in partu ab hoc umbilico per superiorem capitis partem, secundum naturæ leges non bene expediat se fœtus, sed umbilicus descendat, non solum periculosus & perdifficilis matri partus succedit, ut notavit etiam Hippocrates lib. de Septim. partu; sed etiam laqueatus prodit in lucem infans, & sic existimatur puerum miseram vitam traditurum, imo quorundam etiam experientia edoctorum iudicio, laqueo periturum. Nodos præterea seu rugas putant nonnulli annotandas in umbilico, dicunt enim mulieres multos deinceps parituras si umbilicus infantis, quem primo enixa est multos nodos ostenderit, eosque longo intervallo sejunctos per longa intervalla partus prædicere; addentes mendacio mendacium, rufos nodos masculos, albos vero femellas promittere; sterilemque futuram in posterum mulierem, si fœtum peperit umbilico connexum sine nodis. Quorum vanitas fatis declaratur iis fœtibus, qui jam provectis ætate mulieribus ultimo pariuntur: nam & horum umbilici quandoque magis, quam priores sunt nodosi.

Partus naturalis fit in caput.

Cuius causa in umbilico contorquentur.

Vasa superflua de nodis umbilici.

CAPUT X.

De præcisione umbilici.



Vic de umbilico tractationi necesse est subjungam, quanta prudentia peritiaque in secando à partu umbilico requiratur, quoniam in hoc obstetricum ars fere præcipua versatur, & nil utilius aut curiosius hoc loco dici queat. Obstetrix ut prudenter fecit umbilicum observare debet, tempus, locum, modum, tum quæ post sectionem peragenda sunt.

Que observanda in sectione umbilici.

Tempus secandi umbilicum.

Tempus est, cum infans ex utero egressus est, vel cum secundinis, vel absque iisdem. Hodie solum ex utero egresso relictis adhuc secundis statim præsecari solet umbilicus; at si fœtus bene valeat ac robustus sit, quo facilius & felicius partus alter sequatur, melius erit ante illius præcisionem tentare, num secundæ paulatim sequantur. Nam notatum est aliquoties, nascitis vetulis postquam umbilicum secuerant, casu reliquam ejus partem, quæ secundis adhuc in utero adhærentibus annexa est, è manu excidisse, moxque in uterum retractam in mortis periculum maximum puerperas conjecisse. Danda igitur est diligenter opera, ut ante umbilici sectionem secundæ quæ ex utero eximantur hoc pacto; sternutatorio medicamento naribus prius indito, nares & os constringenda, tum obstetrix manu sinistra abdomen superne deorsum comprimendo, dextraque umbilicum trahendo secundas ex utero eximat. Sed in utroque servandus modus, ne violenter fiat: ex violentia enim periculum instat, ne abruptatur in utero umbilicus cum periculo puerperæ: nam abruptitur facile, cum ex partibus admodum tenellis constet. Docet hunc trahendi modum, quem paucae obstetrices vel norunt, vel observant, optime Hippocrates lib. de superfœtatione, dum inquit: Si secundæ non facile exciderint sinenda sunt maxime ad fœtum appendere, ut paulatim absque ulla violentia trahantur. Mulierem in sella perforata collocabis, & fœtum super uterum humore tepido plenum impones, ut mucrone tenuissimo compunctus uter sensim concidat, & una fœtum & quæ ab eo dependent involucri deorsum trahat. Hæc Hippocrates. Quod si fœtui mature ex utero exeunti propter imbecillitatem vel ægriitudinem vitæ periculum immineat, statim egresso

Quomodo secundæ eximantur.

Hipp. modus in excutendo secundas.

Locus ubi
amputandus
est umbilicus
apertus.

Transversio
in ampu-
tando umbi-
lici.

Modus ampu-
tandi umbili-
cum.

Qualis deli-
gatio facienda
ante umbilici
præcisionem.

Præfectio um-
bilici quid im-
ponendum.

Cum soli homi-
ni ante ampu-
tationem lige-
tur umbilicus.

umbilicus præcidendus est: secundis vero, ut excidant, deinceps prospiciendum veluti à peritis præcipitur, ad coxam nimirum alligato umbilico cum filo. Locus autem ubi amputandus est umbilicus, sine ullo sexus discrimine is statuitur ab Aëtio lib. iv, cap. iiii, aliisque Veteribus, ubi quatuor circiter digitos ab abdomine infantis emer-
sit. Sed ne quidpiam à mulierculis & barbaris absque superstitione perageretur, sexus discrimen inventum est. Putant enim vulgo obstetrices longiorem partem umbilici præfecti masculis relinquendam esse, ut longam ipsis pubertatis annis mentulam alant; foeminis vero brevior, ut angustum pudendum forment, & verecundiores sint ac minus audaces: quasi vero ejusmodi pars umbilici, quæ quarto, quinto vel septimo die sponte sua decidit infra vinculum, aliquid posset ad immutandos animi mores, vel membri alicujus conformationem & augmentum; sed necesse est hanc rideam opinio-
nem. Nam si in mulierum potestate esset, prima umbilici cura pudenda majora vel minora effingere, profecto parturientes de obstetricibus jure merito conqueri debe-
rent, quod in prima nativitate iis magnam umbilici partem non reliquerint, ut foetus citius ex utero exire possit.

Ad modum perite secandi umbilicum requiruntur, deligatio, instrumentum, & ali-
qua ante deligationem peragenda. Prius enim quam præcidatur, si puer debilis sit, aut pene mortuus edatur, sinistra manu tenendus est umbilicus, & sanguis qui è cor-
pore foetus per venam umbilicalem refluere solet, & spiritus vitales qui per arterias um-
bilici è corpore foetus effluere nituntur, reprimendi sunt paulatim rursus in corpus: sic enim statim infans, qui modo exanguis deficiebat, recreatur vitæque restituitur. Sin
vero robustus sit infans qui prodit, statim sinistra manu apprehendendus est umbilicus;
tum protinus deligandus, ne sanguis è corpore infantis in umbilicum repat. Pro deli-
gatione locus tutior, est spatium quod distat duorum vel trium digitorum transverso-
rum latitudine ab abdomine, seu principio exitus umbilici à corpore infantis. Nam si
proxime umbilico ligetur, periculum est, ne trahantur in consensum partes abdomi-
nis sentientes, & sic dolor exciteretur, qui infancie matre vel nutrice causam præbere so-
let assidui ploratus. Ultra vero terminum, quem præscripsimus ligare nil vetat, cum
umbilicus non sentiat, & tota hæc pars, quæ à præcisione relinquitur, paucis ab ortu
diebus sponte decidat. Deligatio facienda est quam fortissima, duplicato & triplicato
filo serico, vel è lino aut cannabe confecto, reiteratis etiam nodis, ne vinculum solva-
tur vel relaxetur; tum demum supra vinculum unius vel alterius digiti transversæ spatio
erit amputandus; alioquin si prope ligamentum amputetur, metuendum est, ne solva-
tur vinculum antequam sua sponte umbilicus emoriatur & à corpore decidat, & sic
sanguine vitalique spiritu effuso ex arteriis, infans statim commoriatur. Caterum quo
instrumento amputes, an scilicet cultro, an forfice, an arundine, vitro, vel alia materia,
nil interest, cum non sentiat. A secto umbilico denique imponendum est gossipium,
qua parte vulnus est, pannisque lineis involvendus, ne sua frigidity ventri oblit, do-
nec sponte deciderit. Querere quispiam posset, cur homini ante sectionem umbilicus
ligetur; cæteris vero animalibus, quæ omnia umbilicum cum suis secundinis post par-
tum statim devorare solent, minime; neque his fere ullum videatur sequi incommo-
dum effusionis vel sanguinis vel spirituum vitalium. Hujus quæstioni duplex est apud me
ratio; & prima, quoniam in umbilico hominis vasa sunt majora & ampliora, præcipue
vena, quæ unica est, perque ea vasa & sanguis & spiritus facilius fluere possunt. Deinde
animalia dum dentibus abscindunt, à foetu proxime abdomini eum auferunt, sic ut nulla
pars de umbilico extet; postea lambendo reducunt cutem umbilici exortui circumfu-
sam supra extremitates vasorum umbilicalium, postea hæc cutis his vasorum finibus
connata & supernata nodulum tantum in quibusdam quadrupedibus efficit, pro vesti-
gio umbilici, in aliis parvum signum, in nonnullis etiam hard conspicuum. Hinc pa-
tet vera ratio, cur homini umbilicus magnus sit, cæteris vero animalibus exiguus vel
nullus; alia prorsus ab ea, quam attulit nobis Aristoteles in problematibus. Et sic qui-
dem ars circa sectionem umbilici ab obstetricibus exerceri debet.

CAPVT XL

De partibus internis propriis, ac primum de Vasis umbilicalibus.



Actenus partes fœtus externas proprias examinavimus, nunc autem i internarum propriarumque explicationem aggredi superest. Hæc duæ tantum sunt, vasa scilicet, & excrementa. Vascularum alia, in abdomine & ventre inferiore continentur, ut umbilicalia; alia vero, in thorace, ut ramus exiguus, quo vena cava cum arteria venosa conjungitur, & arteria magna cum vena arteriosa. Umbilicalia vasa ea dicuntur,

*Umbilicalia
vasa quæ.*

quæ per umbilicum ex chorio transgressa in ventris partes internas inferuntur. Suntque tot numero, quot in umbilico inveniri diximus: etenim vasa ista quatuor, quæ per umbilicum unita progrediuntur, ubi abdomen intrarunt, finduntur singula, ac à se invicem dissociantur, & diversa loca suis finibus adeunt, quibus terminantur. Vena enim peritonæo subtus per ejus membranam annexa, paulatim sursum in jecoris partem, quæ leviter in duas veluti alias divisa est atque homini propria, quamque nonnulli Anatomici² rimam jecoris vocant, ascendit; inde in cavam jecoris ulterius penetrando, ubi caudex seu truncus portæ à jecore surgit, bipartitur, ac in quemdam venæ portæ ramum inferitur. Sic in canibus & aliis quadrupedibus cernimus venam hanc umbilicalem, cum venæ portæ præcipuo trunco per mesenterium disperso, cumque cavæ quodam ramo ad mesenterii centrum conjungi. Similiter arteriæ umbilicales abdomen ingressæ, & peritonæo annexæ una cum uracho deorsum pergunt: postea vero à se invicem disjunctæ ad uteri ac vesicæ latera feruntur, & in^b ramos arteriæ magnæ iliacos ad crura descendentes inferuntur ea parte, qua per pubis ossium foramina transire incipiunt. Vrachus autem intermedius, peritonæo annexus, in^c fundum vesicæ terminatur. Omnia hæc vasa umbilicalia interna, statim ac in lucem venit fœtus, in funiculos abeunt, ob usum eorum maximi abolitionem. Etenim vena umbilicalis, destinata suscipiendo à matre sanguineo alimento, segregata carnea placenta, per cujus substantiam illud in venam umbilicalem per chorium & umbilicum ducitur, inutilis est. Similiter ablatis venis arteriæ umbilicales inutiles sunt. Vrachus quoque, qui à natura factus est, ut per eum ex vesica urina in allantoidem transluat, non amplius ex vesica suscipit urinam; cum allantoidem privatus seorsim excrementum vesicæ per aliam viam, nempe per pudendum excernatur. Neque enim est, quod refutem doctorum quorundam nuper inventum, qui putant fœtum, dum est in utero, per pudendum mingere, propterea quod urachum solidum nec ullo foramine præditum conspici dicant; cum monstrare debuissent viam, per quam fœtus, ubi minxerit urinam à sudoribus separatam, in allantoidem, vel spatium quod est inter chorium & amnion, transmittit; & rationem reddere, ob quam in cæteris quadrupedibus urina segregetur, cum & eadem mingere per pudendum poterant. Porro umbilicalis vena pertingit ad jecoris portam in cavam vel ramum cavæ, quod sanguis, qui fœtui à matre pro nutritione dabatur, alia egebat elaboratione, quam ea, quam à matre acceperat; & ut tenellæ partes commodius & citius nutrentur, erant segregandi serosi humores à renibus, biliosi à felle folliculo, melancholici à liene. Vnde clarum est, non bene hæcenus Anatomicos censuisse matris sanguine dulcissimo purissimoque fœtum uti pro alimento. Melius autem Galenum lib. 1 de Sympt. causis. cap. VII, opinatum, sanguine æque puro & impuro nutriri fœtum; sed tenellum, sanguine puriore ali; grandiore jam, puro atque impuro. Dixi superius arterias umbilicales ablatis venis umbilicalibus inutiles esse; nunc autem neces-

Vena umbilicalis inferior.

Arteria umbilicalis inferior.

Vrachus inferior.

Fœtus in utero non minxit.

se est, ut quibus rationibus à Veterum & recentiorum omnium sententia, qua putant per umbilicales arterias vitalem spiritum à matre fœtui subministrari, discedere movear, exactius ac dilucidius declarem; si prius hujus antiquæ opinionis rationes protulerim. Nam Hippocrates, sive auctor de natura pueri, dum inquit, fœtum per umbilicum spirare, & alimentum augmentumque capere; nil aliud intelligere videtur, quam quod per venas sanguis ad nutritionem, per arterias vero umbilicales (quas etiam sub communi venarum nomine complexus est) spiritus à matre ad cordis refrigerium & alimentum vitalis caloris traducatur. Et paulo post in eodem libro, cum duplicem in

Veterum & recentiorum opinio de usu arteriarum umbilicalium proponitur. Hipp. auctoritates de usu arteriarum umbilicalium.

semine ex quo formatur fetus, statuat spiritum, internum seu connatum & ingenuum, externumque, quo ingenuus nutritur; ac externum dicat esse aerem, qui per umbilicum attrahitur, frigidior paulo quam is, qui est internus; per aerem non intelligit eum, quem nos inspirando attrahimus, quippe qui ad fetum tam crudus veluti à nobis pulmonibus hauritur, pervenire non potest; sed à corde matris elaboratum, & per arterias matris ad uterum comportatum, & hinc per umbilicum in omnes partes fetus fusum. Gal. vero paulo clarius pluribus in locis usum arteriarum umbilicalium significavit, cum dicat spiritum ad vitam per has fetus dari, & quemadmodum per venas umbilicales sanguinem, sic per arterias non spiritum modo, sed etiam una cum eo subtiliorem & calidior quam is, qui in venis est, sanguinem accipere à matre, atque ex hoc omnium calidissimum viscus fabricari, nempe cor.

Gal. auctoritates de usu arteriarum umbilicalium.

Prima ratio pro Gal. de usu arteriarum umbilicalium.

Secunda ratio.

Tertia ratio.

Quarta ratio.

Auctoritas Spigeli de usu arteriarum umbilicalium argumentum primum argumentum.

Secundum argumentum.

Tertium argumentum.

Præter has auctoritates non desunt quoque validissimæ rationes ad hoc probandum. Prima autem est: Si spiritus vitalis non procederet à matre ad cor fetus, frustra factæ essent arteriæ umbilicales, & earum conjunctio per anastomosim cum arteriis uteri: sed frustra non sunt factæ arteriæ umbilicales, & earum anastomosis cum arteriis uteri; ergo vitalis spiritus procedit à matre ad fetum. Major probatur, quoniam ad nutriendum fetum vena est sufficiens, & ideo cum non haberent usum ferendi spiritum vitalem, essent superflua: minor patet à naturæ legibus, quæ sicuti in necessariis non deficit, ita in supervacaneis non abundat. Secunda ratio. Cuicumque parti non suppeditatur materia ad conficiendos spiritus vitales, in ea vitalis spiritus generari non potest: sed cordi fetus non suppeditatur materia pro generando spiritu vitali; ergo spiritus vitalis in corde fetus generari non potest, & per consequens, à matre procedit. Major probatur: in corpore animato aut in animali, in quo non fit respiratio externi aeris, in eorum corde vitalis spiritus generari non potest; sed in fetu in utero existente non fit respiratio externi aeris; ergo vitalis spiritus generari in eo non potest: Major est manifesta; nam aer externus in animali quod non respirat, ad cordis finistram ventriculum pervenire non potest per venosam arteriam, ut sic cum calore & sanguine permixtus fiat vitalis spiritus. Tertia ratio. Si vitalis spiritus non procederet à matre, fetus ante debitum tempus pariendi ex utero exemptus adhuc vivere posset; sed vivere non potest, cum statim moriatur; ergo vitalis spiritus procedit à matre ad cor fetus. Quarta ratio. Si in corde fetus generaretur spiritus vitalis, arteriis & venis umbilicalibus vinculo constrictis, cor fetus pulsi non destitueretur: sed arteriis & venis vinculo constrictis cor fetus pulsi destituitur; ergo in corde fetus non generatur spiritus vitalis, & sic eum à matre provenire sequitur. Ego vero contra, vitales spiritus per arterias nequaquam à matre ad fetus vitam transfundi existimo; sed potius à corde fetus ad propriarum partium externarum vitam, arteriis his immitti credo; quod multis argumentis probatur. Primo, si à matre vitalis spiritus cordi fetus suggereretur per arterias umbilici, cor fetus non pulsaret, quia non generaretur in suo corde spiritus vitalis. At cor fetus pulsare, & Galeni & Aristotelis, lib. de Spiritu, auctoritate convincitur, sensibusque demonstratur. Et profecto majorem propositionem usque adeo veram esse fatentur Anatomici, ut insignis inter eos Andreas Laurentius assumptionem negarit; sed legat Galenum lib. 1. de semine, cap. vii, ubi expresse dicit cor fetus, quod arteriæ permeant, ob nimiam caliditatem quasi flammam quandam, assidue non moveri, sed mutua reciprocatione. Vnde sequitur vitalem spiritum in corde fetus fieri, eoque vivere omnes fetus corporis partes, nequaquam vitam fetus à matre traduci. Secundo. Vnde procedit vitalis facultas, inde quoque procedit spiritus vitalis: sed à corde fetus procedit vitalis facultas, quæ fetum gubernat; ergo vitalis spiritus à corde fetus procedit. Major est manifesta; causa enim proxima posita, effectus sequitur. Minor probatur Galeni auctoritate dicentis lib. xv de Usu part. cap. iv, quod foetibus ex semine, non ex vulva facultatum ipsos gubernantium origo sit. Vitalis ergo facultas cordi fetus innata est ex semine, non à vulva, hoc est, à matre in ipsum missa, statimque ac formatus est fetus insunt omnibus partibus facultates corpus fetus gubernantes. Tercio. Si à matre vitalis spiritus procederet per arterias umbilicales, arteriis quæ ad umbilicum sunt vinculo constrictis, omnes quæ in chorio sunt arteriæ pulsi non destituerentur, sed tantum, quæ in cor fetus ingrediuntur: sed omnes, quæ in chorio

chorio sunt, pulsū destituuntur, corde nihilominus pulsante, ut ex lib. vi de Placit. Hipp. & Plat. cap. vi, apud Gal. habetur; ergo vitalis spiritus non procedit à matre per arterias umbilici. Quarto. Si à matre vitalis spiritus cordi fœtus suppeditaretur per arterias umbilici, aliis quoque animalibus idem accideret, quæ arterias umbilicales habent. Sed aliis animalibus idem non accidit: dum enim ex ovo generatur pullus, vitam non accipit à matre; sed à semine per incubationem formantur omnia pulli membra, statimque cor, quod palpat, & vitales spiritus in se genitos non modo per corpus pulli diffundit, sed etiam per partes externas, nempe umbilicum: ergo vitalis spiritus fœtus cordi non suppeditatur à matre. Quinto. Si à matre vitalis spiritus procederet per arterias umbilici ad fœtum, mortua matre non posset fieri partus Cæsareus, neque diutius fœtus quam mater vivere. Sed mortua matre fit partus cæsareus, & diutius quam mater vivit fœtus; ergo vitalis spiritus non procedit à matre per arterias ad cor fœtus. Minor probatur tum experientia, tum auctoritate. Experientia: quia nonnulli post matris obitum extracti supervixerunt. Auctoritate deinde Plinii lib. vii Natural. hist. cap. ix, cujus verba sunt hæc: *Auspiciatus enecata parente gignuntur: sicuti Scipio Africanus prior natus, primusque Cæsarum à cæso matris utero dictus.* Qua de causa & cæsiones appellati. Simili modo natus Manlius, qui Carthaginem cum exercitu intravit. Ego etiam aliquoties ostendi publice fœtum agninum à matris utero extractum per semihoram vivere. Denique favet nobis auctoritas Aristotelis, qui tantum ad alendum fœtum in utero factum esse umbilicum scribit lib. ii de Generatione animalium, cap. iv. Alibi etiam dicit, alimentum fœtui contingere per umbilicum eodem modo, quo plantis per radices: venas autem umbilici esse tanquam radices, per quas alimentum haurit fœtus. Neque alibi fecit unquam mentionem spiritus, qui per umbilicum ad vitam fœtui à matre datur. Reliquum est, ut ad argumenta pro Galeno adducta respondeam. Et ad primum dico; Iulium Cæsarem Arantium negasse hanc arteriarum umbilicalium cum uteri arteriolis conjunctionem, à Galeno propositam. At licet hoc concedatur, tamen non sequitur necessario, quod hac de causa fit facta, ut spiritus vitalis à matre fœtui communicetur, cum ad firmiorem annexum fœtus cum utero hanc arteriarum conjunctionem facere natura potuerit, & ut vitalis spiritus à corde fœtus elaboratus, melius à matris vitali spiritu foveretur, tamquam debilior; utque calore ad partes placentæ extimæ sanguinem crassum per angustas venulas attractum impelleret, attenuaret, & ad fœtum per umbilicum ferret. Ad secundum argumentum accedo. Cuicumque parti non suppeditatur materia ad spiritum vitalem generandum, in ea quoque non potest elaborari. Sed cordi non suppeditatur spiritus vitalis materia. Falsum hoc; quia suppeditatur per venam umbilicalem sanguis, qui sufficit ad spirituum vitalium generationem. Præterea probatio majoris propositionis, ubi non fit respiratio, ibi quoque non fit spiritus vitalis, falsa esse arguitur exemplo eorum animalium, quæ non respirant. Nam dum in ovo pullus generatur, cordis officio ac munere gubernatur, & perficitur mediante sui cordis calore & spiritu, eousque donec partes vitales ita habeat perfectas, ut externo aëre frui queat, vel debeat. Arist. quoque lib. de Respirat. cap. vi, negat internum ignem spiritu ali, illiusque alimenti gratia fieri respirationem; & respiranti quidem, tamquam super ignem accensum, fomitem adjici; alito autem igne, fieri expirationem. Etenim, inquit, oportebat in aliis animalibus hoc idem accidere, aut huic quid simile: nam omnia habent caliditatem vitalem; pisces tamen aquam trahunt, non aërem. Ad tertium. Porro vivere fœtum extra uterum exemptum non posse, partim verum est, partim falsum: verum est, quia non vivit diu, sicuti homo mature editus: falsum vero, quia diutius vivit, quam posset si à matre vitam per arterias continuo transmissam haberet. Nam abortivos per horas nonnullas vivere observatum est: & sex, septem, atque octo menses in utero portatos fœtus, quos matres maturius ob aliquem errorem externum erant enixæ, per septimanas aliquot adhibito conveniente fotu & alimento, vitales fuisse. Deinde aliam ob causam accidere potest, ut fœtus à matrice exemptus vivere nequeat, quam ob vitalis spiritus matris privationem: privatur enim ab utero separatus materno calore, qui fœtus omnem calorem in corde auget, sustinet, ac sua qualitate fovet. Vnde fœtus dicitur à fovendo, non aliter quam is qui incubitu ovorum à volucribus matribus editur.

Quartum argumentum.

Quintum argumentum.

Responsio ad argumenta pro Gal. adducta.

Responsio ad secundum.

Ad tertium.

Fœtus unde dicitur.

Reverso ad
quartum.

Vena arte-
rialem non
bilicalem
velo jecur
duo mitem
Auctore.

Circa hanc
umbilicalem
vena, & dua
sunt arteria.

Circa arteria
umbilicales
non erant
propter.

Quamquam enim pullus in ovo grandior sit, corque ejus vitalem spiritum & calorem generet, perque corporis omnia membra diffundat; tamen nisi blando matris ac tepido calore foveatur, propter cordis & vitalis ejus caloris imbecillitatem, & pororum corporis laxitatem statim rigens emoritur. Quamobrem ne rigeant foetus, maxime nuper nati, videmus matres frequenter apprimendo pectori eos fovere: pullos gallinarum sub alis matris quo teneriores sunt, eo frequentius se condere, materno tepore corpusculum conservantes. Ad quartum. Quod victo umbilico cor foetus pulsū destituatur, fit quia deest alimentum cordi, nempe sanguis, qui per venam umbilicalem copiosissime in dextrum cordis sinum fluit per venam cavam, ut ex eo nutriatur & vitales spiritus toti corpori conficiat. Ut igitur concludamus, credendum est contra omnium anatomicorum hactenus receptam sententiam, arterias has umbilicales factas esse, ut spiritus vitales à corde foetus transmitti possint ad externas partes foetus, nempe secundas, ad calorem vitalem illis partibus tribuendum, quo motum sanguinis per venam umbilicalem à matre in jecur foetus transfuentis acceleret, ac prohibeat attenuando, ne illis concreseat, sed debitum alimentum promptius ad minimas quasque externarum partium particulas nutriendas pervadat. Cæterum duas arterias umbilicales natura fecit, easque angustas; unam vero venam satis amplam. Decebat enim copiosum & crassum alimentum, qualis est sanguis, per amplum locum unite pertransire; tenuis vero sanguis & spiritus calidi per exiguos & angustos canales pertransire satis poterant. Sed & sollicita fuit de comodo & facili transitu sanguinis à matre ad foetum, ut duabus arteriis venam amplecti voluerit, nullusque per chorion esset ramus, cui non arteriarum aliquis ramulus comes esset. Terminantur arteriæ umbilicales in arterias ad crura descendentes; vel si mavis dicere, ex iis oriuntur; non autem ex corde vel prope cor ex arteria magna, ut vena umbilicalis prope jecur ex vena portæ. Non quidem ex corde, quod partes externæ foetus vitali spiritu bene præparato ac elaborato egebant, qui talis maxime in arteriis remotioribus à corde solet contineri. Neque prope cor ex arteria magna hos ramos prodire tutum erat, quod pertransire debuissent mesenterium & intestina, quæ cibo flatibusque onusta pulsum harum arteriarum poterant intercipere. Nec denique decebat duos ramos unitos semper prodire ex unico loco, cum unus ramus sufficere videbatur, siquidem ex arteria magna originem it traxisset; sed potius duos ramos prodire ex duobus locis distantibus.

C A P V T XII.

De structura vasorum Thoracis in fœtu.

Vasa thoracis
in fœtu
tuta.



Cum pulmones
fœtus in utero
nondum
nati sunt.

Vasa diversa
constituta
in fœtu
nati sunt.

Equuntur nunc vasa in thorace contenta circa cor, longe aliter constituta, quam in nobis aliquandiu natis. Etenim vena cava cum arteria venali conjungitur, & arteria magna cum vena arteriali; sed diversaratione. Nam vena cava cum arteria venosa contigua rotundo ac satis magno foramine, membrana itidem tenui & nonnihil pellucida sociatur: at arteria magna, quia paululum distabat à vena arteriali, vase arterioso tanquam novo ductu & canali, cum vena arteriali conjungitur oblique: quod in natis aliquandiu & perfectis hominibus non amplius conspicitur, non sine miraculo; exsiccat nempe hoc novo ductu, atque evanescente foramine, tanquam in natis jam non amplius necessariis. Quippe cum pulmones foetus in utero nondum cordi inservirent ad refrigerium caloris per aërem externum, erat necesse illos copioso sanguine nutriri; cum vero hunc sanguinem cor copiose per venam arterialem subministrare non posset, cum per foramen amplum ex vena cava in arteriam venalem refundit, ocluso nonnihil foramine tenui membrana, ne quippiam quod intrasset statim à vicino motu cordis coactum fuisset regredi: deinde, ut edito jam in lucem foetu hoc foramen facilius obtureretur, membrana tenui paulatim crassiore facta, & acquirente corpus arteriæ venalis, similiter arteriam magnam cum vena arteriali per valculum exiguum conjunxit, ut copiose sanguinem & spiritum vitalem pulmonibus largiretur per venam arterialem. Quia vero pulmonum substantia non amplius in jam natis copioso & crasso sanguine nutriebatur, propterea non adhuc opus fuit à partu, ut abundanter cor iis vitalem

vitalem spiritum & sanguinem impartiretur. Imo cum pulmones in natis aëri excipiendo destinatos propterea leves esse oporteret ac substantia rariore, voluit natura à partu horum vasorum usum & structuram transmutare, & per venam arterialem sanguinem paulo tenuiorem, quam qui in vena cava continetur (utpote nonnihil attenuatum in dextro cordis ventriculo) pulmonibus nutriendis præbere: per arteriam vero venalem, modicum spiritus vitalis è sinistro sinu cordis pulmonibus ad vitam impartiri.

Ex his igitur patet, explodendam esse Anatomicorum sententiam de usu propaginis, qua arteria magna cum vena arteriosa communionem habet. Putant enim per hunc ductum cor refrigerari, atque matre præberi sanguinem vitalem pulmonibus & cordi fœtus, propterea quod cum per arterias umbilicales, longo ductu, per arteriam magnam in cor spiritus vitalis transire non poterat, ob ostiola circa basim cordis initio magna arteria posita, ab his repulsus vitalis spiritus per hunc ductum in venam arterialem & dextrum cordis sinum pulmonesque permeare cogatur. Sed quod fœtus nequam vitalem spiritum à matre hauriat, jam videor supra satis probasse. Ratio autem cur in hanc erroneam opinionem lapsi sint omnes, qui usque adhuc fuerunt Anatomici, fuit administratio Anatomica fœtus formati; siquidem in hac viderunt prius eas partes, quibus utero fœtus annectitur, & ex hac venas & arterias umbilicales fœtus abdomen penetrare, unde sane probabiliter admodum & sanguinem & vitalem spiritum à matre in fœtum transire sibi persuaserunt, atque ex hoc fundamento in assignandis usibus horum vasorum erraverunt. Observavi quoque in corde & aliud, nondum ab aliis animadversum, nempe utrumque cordis ventriculum habere parietem æqualis crassitudinis, cum in adultis sinister habeat crassiores parietem dextro.

Pulmones in matre levissimi.

Anatomicorum sententia de usu diversis constituta, quæ eorum in fœtu regella.

Vnde etiam Anatomicorum sententia de usu arteriarum umbilicalium.

Observatio nova.

CAPUT XIII.

De excrementis fœtus internis.



Excrementa hæc duorum sunt generum; alia, solida; alia vero, liquida: illa, in intestinis crassioribus; hæc vero, in tenuibus & ventriculo conspiciuntur. Solida ac dura in crassis intestinis, Latinis papaver & papaverculum dicuntur, Græcis *μακρίδιον*. Suntque viridia, vel (ut Arist. describit) valde nigra ac picea, & calore sanguinea. Liquidiora vero in ventriculo, magis viscida & alba: in intestinis, viscida & pallida; atque ad flavedinem magis crassitiemque vergentia, quo propinquius intestinis crassis in ileo consistunt; magis vero albidia, quo viciniore sunt ventriculo. Notandum etiam est, quod intestinum jejunum, quod in nobis est fere vacuum, in fœtu est excrementis plenum. Excernit hæc omnia excrementa infans recens natus, vel statim à partu, vel ad summum intra unum diem naturalem; & prius papaverculum excernit, deinde vero reliqua, quæ in intestinis & ventriculo continentur. Sed multo plura excernere ait Arist. quam corporis magnitudo postulat. Veteres quidam, cum viderent post partum infantem hæc excrementa excernere una cum reliquiis urinæ in vesica relictis, crediderunt puerum in utero matris fugere & per os alimentum capere, nescientes undenam hæc excrementa provenirent. Recentiores omnes, & inter hos Andreas Laurentius, putant impuriore & crassioris sanguinis excrementa esse, quæ per splenicum & mesentericum ramum à liene in intestina amandantur, ibique diutina mora & calore exsiccantur. Alii vero, à toto corpore per venas mesaraicas in intestina fluere credunt. Ego autem, quamquam à liene & toto corpore amandari posse per venas mesenterii in intestina, non negem; tamen existimo non esse expurgationem ejusmodi sanguinis crassioris, qualis dum adhuc in utero est fœtus & bene valet, in venis continetur, & qualem natura semper conatur facere vel convenientem vel necessariam; quandoquidem sic ad sanguinis illius per venas expurgationem ora vasorum non sine noxa fœtus aperiri deberent, & multo commodius excrementa illa crassa cum tenuibus possent magna ex parte per patulos poros cutis expelli. Ideo potius dico, hæc excrementa crassa, nempe papaver, generari à liquidioribus in stomacho & intestinis tenuibus contentis, quæ partim sunt pituitosa, ut in ventriculo; partim biliosa & pituitosa, ut in intestino jejunum & ileo. Fluit autem hæc biliosa materia ex folliculo fellis, cujus porus in intestinum duodenum

Fœtus excrementa quomodo vocentur.

Vetus statim natus multa excrementa excernit.

Cur veteres crediderint fœtum in utero per os nutrire.

Recentiorum opinio de generatione excrementorum fœtus.

Auctoris opinio de generatione excrementorum fœtus.

Caput foetus
in utero ex-
purgetur.

Si opus multum
est de purga-
tione capitis
foetus in utero.

Si opus multum
est de purga-
tione capitis
foetus in utero.

Puer post ex-
purcatum caput
excreta in utero
excreta.

duodenum inseritur, ut in natu grandioribus apertissime conspiciere licet: pituitosa vero à ventriculo, sed maxime à capite, quod neque per nares, neque per os, oculis omnibus his meatibus in utero, expurgari potest; hinc necesse est, ut per oesophagum in ventriculum illa dilabatur. Agnovit hanc capitis expurgationem ex Veteribus & recentioribus, quod equidem sciam, nullus, præter Hippocratem vel eum Auctorem, qui de morbo sacro librum conscripsit in operibus Hippocratis. Probans enim is in eo libro, epilepsiam fieri foetu adhuc in utero existente, inquit; Purgatur enim & floreat cerebrum, veluti etiam alie partes, priusquam in lucem edantur. In hac autem purgatione, si quidem probe ac moderate purgatum fuerit, & neque plus, neque minus quam oportet defluerit, hic foetus sanissimum caput habebit. Si autem amplior colliquatio à toto cerebro facta fuerit, morbosum caput auferens foetus habebit, & sonitu plenum, & neque solem, neque frigus tolerabit. Si vero ab una aliqua parte colliquatio contigerit, aut ab oculo, aut ab aure, aut vena aliqua simul gracilis facta fuerit, ille sic afficitur, qualiter sane colliquatio contigerit: si vero colliquatio non contingat, sed in cerebro spissetur ac coagatur, sic necesse est factus pituitosus esse. Et quibuscumque quidem pueris existentibus erumpunt ulcera in caput, & in aures, ac in reliquum corpus, & qui salviosi fiunt ac mucosi, hi ipsi progressu ætatis facillime degunt: hic enim ab utero purgatur pituita, quam in utero purgari oportebat, & qui sic purgati fuerint, comitiali fide sacro morbo fere non apprehenduntur. Qui vero mundi sunt, & neque ulcus ulla, neque mucus, neque saliva ulla prodit, neque in utero purgationem fecerunt, talibus periculum imminet, ut ab hoc morbo corripiantur. Hæc Hippocrates. Igitur pituita à capite deturbata in ventriculum, & conjuncta cum tenui ea, quæ in ventriculo fuit genita, indeque in modum chyli semicocti ad intestina descendens cum bile permiscetur; in qua miscella quidquid utile est vel aptum alendo foetui, id omne per venas mesaraicas rapitur in jecur, ut ex eo sanguis fiat; quidquid vero inutile, per intestina tenuia præterlabens in crassa relegatur, paulatimque exsiccatum, quo intestinis crassis vicinior fit, eò crassius redditur, magisque durum ac viride, sic ut jam tanquam excrementum in intestinis crassis consistens prorsus durum reddatur, & ex viridi atrum; qui color ater hisce excrementis inditur, non quod sanguis sit crassus & ater, qui in intestina fluit (ut hætenus crediderunt Anatomi) sed quia bilis flava permixta cum pituita, crassioribus excrementis longa mora in corpore infantis conclusa, à calore uratur & exsiccat: tum quia hæc bilis flava à calore exusta, viridis reddatur & prassina initio minus, deinde magis, posteaque exsiccata & combusta, nigra evadat. Idcirco excrementa tenuia, quæ in intestino jejuno continentur, magis sunt flava; viridia vero & crassiora, quæ in ileo; nigra vero, quæ in colo & recto. Atque interea dum in utero est foetus hæc excrementa non spernendum habent usum. Nam prohibent, ne sibi invicem adhærescant intestina, vel in se ipsa concidant, quod evenisset, si ea omni humore vacua esse voluisset Natura; sic igitur patula manent; & apta excipiendo cibo, postquam in lucem prodit foetus. Sed à liquidioribus excrementis aliud quoque præstat. Nam à pituita quæ in ventriculo est, exercetur concoctrix licet languida ventriculi facultas, ut hanc in substantiam commutet, non quidem chylum vocatam, sed chylo analogam; quæ postea cum bile mixta per intestina tenuia simul meat, ut ea parte liquidior ac dulciore, quæ sanguini conficiendo idonea est, per venas mesaraicas ad jecur rapta, in alimentum cedat. Sic neque ventriculum, neque intestina, neque venas mesaraicas à suo munere, dum in utero est foetus, ocari videmus; sed naturam jam à primordiis conceptus affluere unumquodque membrum cernimus ad nutritionem vel augmentum, aliasve actiones in foetu ad quas singulum propriæ actioni destinatum est. Patet ex his optime causa, cur puer statim à partu, vel spatio vigintiquatuor horarum, excrementa varii coloris excernat, & prius nigra, picea ac dura; deinde vero, flava; postea liquida, & magis lactea. Non enim à lacte, quod puer fugit, excrementa albicantia, & flavedine permixta excernuntur (ut putant multi,) sed quia talia in intestinis foetus concludebantur. Observatione dignum est, quod notavit Aristoteles lib. vii Hist. de Animal. cap. x, plura excernere infantem recens natum, quam magnitudo corporis, vel proportio requirere videatur, hoc est, uti ego interpretor, quam intestina capere possunt. Hoc fit, quia puero in lucem prodeunte multa pituita à capite dilabatur, multaque excrementa biliola ad intestina propelluntur, concitatis in venis sanguinis humoribus, & expulsi per venas mesaraicas in intestina per modum criseos: quo motu non solum natura excernit superflua

superflua ad fufcipiendum alimentum, fed patulas quoque reddit venas mefaraicas, ut per eas deinceps melius & copiofius trahatur alimentum ex inteftinis in venas ad jecur. Hic non poffum non mirari obftetricum, ne dicam medicorum negligentiam, qua hæc commemorata in ventriculo & inteftinis puerorum recenter natorum excrementa expurganda putant vel pomo cum melle haufto, ut hic Patavii & in aliis Italiæ locis; vel fyrupo rofaceo ex rofis pallidis laxativo, ut in Gallia; vel alio quopiam laxante ac detergente medicamento, ut in aliis locis. Negligunt enim summam Naturæ providentiam, quæ in tam neceffaria re nascenti confultat puero fola medicina, à matris papillis haufte & gratiore ac tutiore multo, quam quæ ab obftetrice folet præberi. Nam coloftrum (lac eft quod in uberibus puerperæ primis diebus à partu generatur) fi ftatim natus fumat infans, commodius & fine ulla noxa ab hisce excrementis purgabitur. Alimentum enim eft medicamentofum, quod Natura ad eum finem produxit, ut modice nutriendo leviter pro infantis imbecillitate purget per aliquot dies. Si enim nos præbemus medicamentum, vel nimis debile, vel nimis validum effe poteft; at Natura dat, quod viribus convenit. Præterea nos femel, aut bis illud exhibere poffumus; at Natura largitur quod per plures dies dari poteft, & ufque ad perfectam corporis evacuationem, paulatim interim in lacte illo imminuens vim purgandi, & adaugens vim alendi. Nam falfo hæcenus æftimatum eft ab omnibus, hoc primum lac puerperæ coloftrato, quod dicitur, reddere infantes, iisque in ventriculo fpiffari ac coagulari, admiftumque cum prædictis illis excrementis corrumpi, & fufcitare vapores ad caput afcendentes & pravorum fymptomatum auctores; nullius effe nutrimenti vel pravi, quod eas omnes notas non habeat, quas bono lacti Auctores adfcribunt, nimirum non fit laudabilis confiftentiæ, calore album, odore fuave, fapore dulce; fed contra potius craffum, flavum, fapore minus fuave, afpectu virofum; adeoque ad evitanda omnia ifta incommoda non primis diebus hoc primum lac puerperæ dandum; cum videamus quotidie alios pueros illud fugentes, nihil damni accipere; fed alvo blande mota purgari ab iis excrementis, quæ non expurgata tempeftive revera cauffa funt malorum innocentis lacti temere adfcriptorum; cumque fciamus Naturam nihil in nobis generaffe, quod non cedat in noftrum ufum. Quocirca monendæ funt obftetrices atque puerperæ, ne in pofterum aut catulis coloftrum projiciant tanquam inutile & noxium; aut à mulierculis & aliis puellis tamdiu exfugi curent, donec melius lac ad nutrimentum pueri procedat, cum hoc primum lac fit ad totius corporis purgationem utilius omnibus aliis, quæ poffunt præberi; pueroque non conveniat ftatim lac, quod optime nutrit, dare, antequam coloftrum per aliquot dies fit purgatus. Quod fi contingat à partus primis diebus infantem non bene purgari (quod hic frequentiffime folet in Italia evenire, propterea quia matres, cum non lactent fuos fœtus, nutrices accerfant, quæ jam per quatuor vel plures menfes lactarunt, neque ut oportebat recens à partu lac five coloftrum infanti præbere queant) plerumque accidit, valetudinarios magis educari, & in febres longas facilius, aut convulfiones, aut abceffus incidere tum magnos, tum adeo interdum frequentes, ut uno curato alius atque alius oboritur: nam quo lac eft vetuftius, eo fit magis diureticum, & magis nutriens & minus purgans, ita ut alvum infantis adftrictam reddat. Itaque ut hoc caveatur, accerfitus ad tales infantes interrogare folco, qualis fit nutrix, quæ primum lactaverit; & alvum infans lubricam ferve, necne? nam fi ab initio ufus fuerit nutrice, quæ jam ante per medium annum, vel duos, tresve menfes lactaverit, & alvo fit dura, etiamfi fana fit femina, jubeo tamen illam mutari, & eligi aliam, quæ recens lac habeat: vel fi talis non fuerit ad manus, purganda nutrix, atque etiam infans frequenter cum caffia lacti commifta.

*Infantes poft
ortum non
funt medica-
menta pur-
ganda.*

*Coloftrum
quid.*

*Primum pueri
per lac in-
fantibus dan-
dum.*

*Nota boni lac-
tis.*

*Infantium
medicina à
matris uberibus
fuerenda.*

*Quibus mor-
bis obnoxii
infantes qui
non purgan-
tur.*

CAPVT XIV.

De partibus communibus, earumque diuisione.

*Artium com-
mune di-
uisione.*



Artibus fœtus propriis diligenter consideratis succedunt communes inspicendæ, hoc est, eæ, quas fœtus cum homine perfectiore vel natu grandiore communes quidem habet, sed tamen aliter conformatas. Harum aliæ externæ sunt, & vel similes, ut cutis; vel compositæ, ut oculus, mammillæ: aliæ internæ, atque etiam eæ vel simplices, ut ossa, cartilagines, membranæ ossibus annexæ; vel compositæ, ut jecur, cor, pulmo, intestinum cæcum, cerebrum, renes, vesica.

CAPVT XV.

De Cute.

*Cuti fœtus ab
adultorum cu-
te differre.*



*Cutis tenuis in
fœtu cutis.*

*Morbis puero-
rum.*

*Quomodo in-
tertrigines cu-
randa.*

Vtis inter externas primo inspicienda est, quod sit colore quam in perfectis rubicundior, substantia rarior, poris laxioribus, & tactu mollior. Etenim cuticula cuti superposita tenuissima est, & simplex; at in perfectis natuque grandioribus longe crassior, ut aliquando duplici tunica constare videatur, propter crassorum excrementorum copiam, quæ per poros cutis exhalant, & frigus ambientis, quo ejusdem pori constringuntur. At cutis fœtus laxior, rarior, ac rubicundior, tenuiorque est, quia continuo madore calido seu sudoribus tepentibus in utero proluitur undique, perque raros ejus poros sanguis copiosus ac rubicundior ad extremitates pororum permeare potest. Decebat autem ejusmodi cutem fœtui dare, ut corpus, quod excrementa primæ, secundæ, & tertiæ coctionis generat, viasque eas habet interclusas, per quas hæc in nobis jam natis expurgari solent, in utero per cutis meatus & tenue & crassum excrementum è corpore amandaret. Ob talem cutis in fœtu constitutionem infantia propriis quibusdam morbis corripitur, ut aliquando aphthis, hoc est oris ulceribus à lacte acri vel materia biliosa tenellam cutem oris erodente pronatis: quorum ulcerum mentionem fecit Hippocrates in Aphor. xxiv, lib. iiii. Sed sæpissime intertriginibus, quorum mirum est Hippocratem in Aphorismis mentionem non fecisse. Oriuntur autem intertrigines modo in inguinibus & plicis femorum, modo sub axillis, modo in cervice & collo, rarius aliis in locis, quando Natura copiam materiæ biliosæ, quam per aliam viam, nempe per urinam & alvum expellere commode non potest, ad glandulas sub axillis vel inguine transmittit, vel ad collum ducit, ubi ob cutis tenuitatem facile per poros laxiores expellit, non sine cuticulæ ablatione primum, deinde etiam ulcere, si negligenter infans à nutrice regatur. Veteres qui de regimine infantis scripserunt, atque etiam recentiores, siccis pulvisculis & adstringentibus eas curare suadent, nulla adhibita cautela, quæ mihi videtur summopere necessaria in infante educando ad sanitatem. Cum enim scirem Naturam per motum criscos hujusmodi intertriginem moliri, expulsa materia ad partem minus nobilem, aliter quidem ego eas curavi, & curare docui nutrices, scilicet ut in posterum intertriginibus obortis non statim mederi conarentur siccis adstringentibus & repellentibus medicamentis, sed sinerent manare ichorem per paucos dies, donec cessare fluxio materiæ ichorosæ incipiat, intereaque prohiberent, ne nimio dolore infantes vexarentur, ac nimia acrimonia & longo tempore ulcera profunda fierent, imposito tantum cerato ex oleo & cera simplici, vel ablutione frequenti aquæ tepidæ, vel linteis subtilibus madefactis in oleo lini & impositis; quibus effeci, ut infantes neque epilepsia, neque convulsione, neque febribus acutissimis, neque ullis aliis gravioribus morbis fuerint unquam correpti.

CAPVT XVI.

De Mammillis.

Mammillæ quoque non sine ratione inspiciendæ sunt tam in masculeo, quam foemineo fœtu: non enim figura, aut duritie, vel magnitudine differunt; sed venis, quas patentiores habent; & virtute singulari, quæ tertio vel quarto die, postquam sugere incœperunt infantes, fundere lac videntur, quod hætenus à doctissimis naturæ indagatoribus observatum non est, vel neglectum. Forte propterea, quod non in omnibus infantibus id appareat, sed tantum in iis, qui admodum obesi sunt & sanguinei; cæteris vero macilentioribus, vel nihil vel paucum ex uberibus manet. At obesis in tanta copia fluit, ut pressæ papillæ non sêcus atque nutricum procul ejaculentur ipsum lac, ac quotiescumque conglobatum est vel coagulatum, in apostema tendat. Iure igitur inquirendum, quæ vi id contingat, an à mammis lac generandi virtutem habentibus; an lac jam recenter suctum ad mammas illico, & per quos ductus fluat; & in quem finem Natura lac in hac ætate generet. Sane æstimandum est, ipsum illud lac quod recenter à matre aut nutrice suctum, & nondum venarum ac hepatis beneficio valde alteratum est & mutatum in sanguinem, ne copia sua aggraves naturales facultates, tum per insensibiles meatus, quibus universum corpus, maxime infantis recens nati propter laxitatem & raritatem partium, perspirabile est, tum per venas patentiores in mammillis propulsus fluere, ut sic aliqua copia nutrimenti pauciore indigens corpus liberetur. Mammillas vero vim generandi lac non habere; quoniam omnium infantum mammillis hæc vis innata esse deberet, videamus tamen macilentioribus nullum in iis lac generari, quod sanguine & nutrimento non abundant.

*Mammilla.
raro in fœtu
insulto ne-
cessaria.*

*Cor fœtus lac
in mammas
abundat.*

CAPVT XVII.

De Oculis.

DE oculis infantum recens natorum quæritur, an distincte videant à partu? quemadmodum constat nonnulla animalia distinctissime cernere, veluti agnum. Quod autem statim à partu videant, possumus experimento cognoscere: si enim infanti nuper nato ostendatur lumen, videbimus eum oculos in illud intendere, & quoquo versum movetur lumen, eo oculos quoque movere. Signum satis manifestum, quod videat infans. Sed unum altero distinctiorem visum habere credendum est, propter oculorum variantem temperiem: omnes vero confuse ac veluti per nebulam cuncta intueri, quod imagines non bene discernantur, propter humiditatem nimiam cerebri; nec bene recipiantur à pupilla, propter summam oculorum & præcipue corneæ ac aliarum pupillarum constituentium partium humiditatem; quæ cum paulatim accrescente ætate mutetur ad temperamentum siccus, vel oculo perfectio magis proprium, in causa est, cur toties in infantia oculorum colores mutantur, & ex nigris flavi & cæsi fiant.

*Infantes na-
per natus vi-
dera.*

*Cur infantes
distincte vide-
re non possint.*

*Cur in infan-
tia sæpe oculo-
rum colores
mutentur.*

CAPVT XVIII.

De cæteris partibus compositis internis.

Inter internas partes, compositæ prius occurrunt; atque inter has, omnia fere viscera, & cerebrum cum intestino cæco. Quarum quædam magnitudine sola differunt, ut jecur, cor, & intestinum cæcum: quædam figura, ut renes: nonnulla utroque modo, ut cerebrum, quod proportionem corporis fœtus majus est, quam in adultis, & duos ventriculos priores patentiores habet. Cæterum quemadmodum Natura tres partes principes, cor, jecur, cerebrum majores fecit in fœtu, quam proportionem corporis adultorum; sic etiam voluit esse magis sollicita de jecore, quam de aliis partibus.

*Partes princi-
pes in fœtu
magis.*

tibus. Quippe tam magnum jecur foetui dare voluit, ut utrumque hypochondrion sua mole occuparet. Nec immerito; quoniam non modo partes totum corpus gubernantes validas habere decebat, sed robustissimam ac validissimam, maximamque eam partem, per quam conveniebat & cerebro & cordi, totique corpori alimentum præbere, idque longe celerius & copiosius quam in adultis, propter celerrimum & maxime admirabile augmentum, quod non solum natura in foetu adhuc in utero contento machinatur, sed & in infante statim ex utero egresso. Videmus enim primum natum infantem in tantam molem statim excrefcere & augeri, ut paucorum mensium spatio fiat duplo grandior; quod non contingit in natu majoribus, minus in adultis. Imo unusquisque observare potest pueros, quo ortui sunt viciniore ætate, eo singulis annis grandiores evadere, ita quidem ut non solum quinto, sicut Arist. observavit lib. 1. de Gen. anim. cap. xviii, sed jam tertio anno plerique dimidium virilis staturæ suæ sint adepti; ultra pueritiam vero progressos non ita valde, uti antea excrefcere.

Cerebrum & cor jecore minora sunt, quod iisdem jecur materiam quoque subministrare debeat copiosissimam, non ad augmentum nutrimentumque tantum, verum etiam ad animales vitalesque spiritus generandos. Sed & cerebrum corde est majus, comparatis utriusque partis magnitudinibus cum iis, quæ sunt in adultis; non quod foetus copiosioribus spiritibus egeat, quam homo perfectior, sed quod cerebrum ex parte spermatica maxime consuetur, cujus copia in prima conformatione foetus erat maxima, & hæc pars spermatica ad ampliandum se non multum admodum egeat alimento sanguineo. Habet præterea cerebrum ventriculos duos priores qua parte nasum spectant ita patulos, ut ad foramina ethmoidea pervii sint, proculdubio ad purgandum cerebrum à pituitoso excremento per nares commodius, quod in humido cerebro copiosissime in infantibus & pueris generatur: & inde nobis innotescit ratio, cur nares infantium & puerorum plurimo semper muco stillent usque ad octo vel decem annos, raro autem plures. Nam & in plurimis pueris, aliarum vero ætatum paucis, ventriculi cerebri versus nares ita sunt patuli. Patet etiam quod aliqui non facile purgantur per nares cum jam adoleverint, esse rationem posse, quod nimis clausos habeant hosce meatus. Datum est etiam à Natura foetui, propter cerebri magnitudinem caput magnum: hæcque magnitudo peculiarem usum obtinet ad faciliorem exitum foetus ex utero. Nam cum hominis, veluti cæterorum animalium partus naturalis fiat in caput, decebat hominem grande caput habere, ut ejus pondere, dum sudoribus vel aquæ innatat in utero & se ad partum præparat & circumvolvitur, hæc pars prius cæteris ima peteret & ad collum cervicis uterinæ provolveretur; deinde egresso capite & amplissima pro cæteris partibus reddita via, reliquum corpus facilius sequeretur. Aliis autem animalibus plurimis non contingit caput tam magnum quam homini, dum utero geruntur, quod ea non ut homines conglobati in utero gestentur & capite ad fundum matricis sito & remoto ab uteri cervice; sed quod eorum caput prope uteri os positum sit, nec situs eorum ante partum, ut in homine transmutetur.

Cui parvi muto abutitur.

Caput magnum quia prope uterum situm.

Pulmones foetus rubicundi & ponderosi.

Pulmones rubicundi & ponderosi in foetu sunt, propter alimentum, sanguinem nimis crassum & copiosum, quem à vena cava per foramen in venali arteria ad nutriendos pulmones fundi diximus: in adultis vero leves & subalbidi, quod occæcato horum vasorum foramine, paucus ac tenuis sanguis ad pulmones permeet, admirabili naturæ providentiâ, quæ quo tempore quiescebant pulmones ab officio spiritum ætheremve externum hauriendi, nutrirî eos copiosiore & crasso alimento voluit; ubi vero jam ad respirationem destinati sunt in natis, ut facilius esset dilatatio, atque restrictio pulmonum substantiam gravem & densam in leviorē paulatim transmutavit, & alimentum levius ac spirituosius ob eandem causam ipsis subministrari voluit. Hanc igitur ob causam substantia pulmonum foetus gravis, densa, rubraque, in levem, raram, atque subalbidam natis jam transmutatur. Atque hic mirari nos summo opere cum Galeno oportet Naturam, quod, cum nos venam vel arteriam aliquam magnam præcisam aut majori in parte amputatam nunquam aut vix ullis medicamentis glutinare possumus, quod sint spermaticæ partes; illa tamen trium vel quatuor dierum spatio foramen, quod in vena cava & arteria venosa est, ita glutinet, ut primis quidem annis nihil, præterquam membrana; perfectio vero homine, ne vestigium quidem compareat. Sed

reat. Sed arteriæ portionem, quæ arteriam magnam cum arteriali vena conjungit, ita obliteret, ut cum cæteræ partes nato homini augeantur & crescant, illam prius quidem in funiculos mutet, deinde & hos quoque ne adesse quidem sinat.

Renibus quoque fœtus peculiaris figura est, quam Bartholomæus Eustachius glandulosam, & instar pineæ nucis ex pluribus glandulis conglobatam recte observavit. Sic & vesica duplo major in fœtu apparet, quam in adultis: in quibus contraria ratione ventriculus triplo minor. Erat enim necesse, ut quæ pars copiosam humiditatem recipere debebat, amplius quoque spatium, in quo contineretur, haberet. Cum autem fœtus nil per os humidi, quo ventriculum impleat, acciperet; copiam autem serosi humoris per venas umbilicales una cum sanguine hauriret, eratque necesse hanc per renes in vesicam & allantoidem deturbare, ideo voluit longe ampliorem vesicam stomacho esse.

Inter intestina nullum aliud dissimile in fœtu à natu majoribus reperitur nisi cæcum, est enim longe grandius quam in adultis, & eadem materia, quæ in ileo continetur, repletum, ac idcirco circumplexans initium intestini coli. Et ratio magnitudinis est, quoniam fœtus in utero conglobatus jacet & pronus, fere more quadrupedum & avium, quæ propterea cæcum intestinum amplum & longum adepta sunt, ut chylus vel cibus, qui in intestinis tenuibus est, contineatur.

CAPUT XIX.

De Ossibus.



Ossa autem recens nati quantopere ab adultorum ossibus variant, tum demum cognoscimus, cum ea cum adulti sceleto comparamus, & per singula membra. A capite igitur incipiamus, cujus ossa non modo figura, ac numero, & substantia, sed etiam connexionem ab adultorum ossibus variant. Quippe connectuntur sibi mutuo fere cuncta, & ubique laxa quadam harmonia, quæ in adultis futura est; atque in quibusdam locis extrema ossium se nullo modo tangunt, ut in adultis per futuram, sed mediante membrana sibi adherent, ut in basi & vertice capitis apertissime licet cerneretur. Quo enim loco futura coronalis cum sagittali in adultis concurrunt, ossis vice membrana quædam videtur forma triangulari, ob quam in infantibus recens natis motum cerebri super verticem percipimus, & oculis, & ad tactum: ideo hic locus à nonnullis palpitans vertex dictus est; ab Arist. *δοτον ὑπεροφθης*, id est, os ultimo genitum, non enim antequam loqui puer incipit, hic locus osseus prorsus evadit. In Gallia vulgo dicitur la fontanelle. Notandus diligenter hic locus ab iis qui medicam praxim exercent, quod quando infantes malo quodam corripiuntur, quod syriacis veteres dixere, Latini fiderationem, quæ nil aliud est quam insignis cerebri & meningum fervor cum febre continua ardenti, ad tantam caliditatem & siccitatem cerebrum perveniat, ut teste Moschione ejusmodi occipitium (ita enim appellat finciput) concavum fiat. Nam cum in infantia finciput non sit osseum, sed membranofum, non mirum est, quod ab insigni siccitate contractum cavitatem monstret.

Sed ad ossa pergamus, ex quibus sese nobis offert frontis os non unicum, ut in adultis, sed in duas partes fissum, dextram nimirum & sinistram, quæ sibi invicem annectuntur per rimam seu harmoniam, quæ à media parte suturæ coronalis, qua cum sagittali jungitur incipiens recta per longitudinem faciei pergit ad narium radicem, qua frontis os terminatur. Sed & ulterius per nasi medium transiens ad extremitatem maxillæ superioris, ossa hujus maxillæ dividit in dextram & sinistram partem, & tandem inferiorem quoque maxillam partitur in duas partes; quæ quidem harmonia vel fissura, tendente ad pubertatem homine, ita paulatim obliteratur, ut in adulto cranio non amplius compareat. Ossa autem fincipitis integra cernuntur, sed juxta verticem, ubi membrana triangularis est, nonnihil abbreviata. In hisce ossibus nempe frontis & fincipitis, cum in adultis sanguine extra venas inter pericranium & duram meningem ex contusione vel lapsu fluente, celebris sit chirurgia, qua, trepano dicto instrumento, perforatur cranium, ut sanguini ex propriis conceptaculis fluxu detur exitus, notare debent

Renem figuræ qualis.

Vesica major ventriculo in fœtu.

Intestini cæcum in fœtu cur magnum.

Capitis ossa in fœtu quomodo connectuntur.

Os ultimo genitum.

Frontis os duplex in nuper nato.

*Infantes ita
pino tractari
non debent.*

debent Chirurgi, ne vel infantibus vel pueris tale remedii genus adhibeant: periculosum enim est, propter ossium tenuitatem; nec necessarium, quoniam Natura sanguinem extra venas effusum inter cranium & duram matrem (nisi copia summopere abundet) per laxa spatia, quæ ossium coagulationibus intercedunt, & ossium cranii rimas ac meatus, porosque patulos cutis facile discutiat; quodque ex lapsu difficillime patiantur infantes vasorum ruptionem, propter cerebri & ossium molliciem, quæ ictui facile cedit.

*Occipitis os
quadruplex
in infante.*

Os occipitis, quod in adulto unicum est, in infante nuper nato & fœtu ex quatuor partibus constat, quarum pars maxima triangularis est; ubi enim lambdoides sutura in adultis fines habet duorum veluti crurum, & additamenta incipiunt suturæ lambdoidis, rima quadam per transversum ab una cruris suturæ hujus extremitate ad alteram, eaque admodum laxa circumscribitur, & à reliquis tribus ossibus segregatur, quorum duo capitula occipitii continent, quæ *ῥοπίαι* Galenus appellavit, quibusque primæ cervicis vertebræ annectuntur; tertium vero, seu quarta pars occipitis est, quæ veluti additamentum sphænoidi ossi annectitur. Hæc occipitis ossis in infantibus in multas partes divisio efficit, ut crescente homine atque unico facto osse occipitis, ut plurimum tamen in plerisque subjectis ex pluribus quam uno osse os occipitis constare videamus, & suturam lambdoidem plurimum variare, ita ut consueto termino relicto, interdum per os occipitis excurrat, & peculiaribus futuris in nonnullas partes occipitis quoque os dirimat, ac si ex pluribus quam uno osse constaret. Eadem hæc ossium in infantibus constitutio satis manifestat causam, ob quam pueri post partum per aliquot menses caput erigere nequeant, etiamsi habeant omnes illos musculos, quibus caput flectitur & extenditur, ac circumagitur: omnes namque hi muscoli annectuntur ossibus, quæ nondum sunt firmata.

*Cur sutura
lambdoides
fit variis.*

*Quæ sutura
maxime caput
erigere neque-
ant.*

*Ossa tempo-
rum diversa in
infante.*

Ossa temporum in duas partes divisa sunt: major pars processum illum continet, qui alteram partem ossis jugalis constituit, & squamosis futuris vel conglutinationibus, ossibus utrinque sphænoidi & sincipitis committuntur. Ideoque squamosum os ea pars dicitur, & separatur per harmoniam ab osse petroso; quæ minor est pars ossium temporum. Vbi quoque observandum est, intra calvariam os squamosum processum habere, quem temporum quartum nonnulli ex ordine enumerant, facile, imo tantum cultri acie à suo osse, cui adhæret, separabilem, cujus divisionis rudimentum etiam in adultis sæpe apparet. Cæterum minor pars ossis temporum, quod petrosum appellari diximus, meatum habet auditorium in fœtu prorsus cartilagineum, osseum circum intus habentem, cui tympanum alligatur; insuper & ossicula, stapedem, malleum & incudem, siccissima, ac duritie & magnitudine pari, ut in adultis; verum mammillari processu atque styloide prorsus destituitur.

*Os ethmoides
cartilagineum.*

Os ethmoides cartilagineum quoque est, cujus medium, quod cristatum est, prius osseum fieri à curiosis Anatomicis fuit observatum. Præclara quoque est ea observatio, quam Fallopius de sphænoide osse fœtus scribit, quæ ab aliis Anatomicis omissa est. Constare namque dicit hoc os ex quatuor partibus, atque eas sensum brevi ita connasci, ut post septimum ab ortu mensem vix distincte appareant. Prima pars hujus ossis est, quæ sellam equinam dictam continet: secunda pars, quæ primæ copiosa cartilagine copulatur, ea est, cui visorii nervi simul copulati primo adhærent, atque disjuncti, dum oculos petunt, foramina incurrunt; quæque alas geminas possidet, dextram & sinistram rimam efficientes, quæ maxime in intima oculi cavitate apparent, & transitum secundæ nervorum conjugationi, dum oculos petunt, atque aliquot aliis tertiæ, quartæ atque octavæ propaginibus ministrant. In hac secunda parte (ut ait Fallopius) in pueris quamvis spongiosa sit, nulla adest cavitas aut sinus usque ad integrum annum; in adultis vero geminus reperitur & satis amplus, qui post primum exactum annum fieri incipit, & pro ossium incremento magnus aut parvus adest. Hic sinus vestitur tenuissima quadam membrana aut pellicula, veluti vestiuntur etiam cavitates geminæ, quæ in osse frontis & malis contentæ sunt, quæque pariter in nuper natorum calvariis non reperiuntur; sed interea dum adolefcunt ossa, fiunt. In hac eadem parte, qua respicit palatum, quidam clavus seu palus osseus inest, cui affigitur os satis longum & latum, in ortu cartilagineum, vomeri vel cultri potius in aratro vomer præeunti simile, quod

(ab aliquot

(ab aliquot Anatomicis neglectum) magnam operam in distinguenda narium cavitate dextra & sinistra præstat. Tertia & quarta pars, continet processus alatos, dextra dextrum, sinistra sinistrum, & quidquid inter illam rimam oblongam in oculorum cavitate positum, atque ossa temporum continetur. In dictis partibus etiam sunt illa foramina, per quæ minor propago quinti paris nervorum deferitur ad temporum musculos, item major portio tertii paris, & totum quartum par, & ramuli arteriæ soporalis per membranam duram distribuendi feruntur. Colligantur sibi invicem hæ partes cartilagine, quæ in os evadens unicum os efficit, quod à formæ varietate à Græcis merito *πυλόμερον* appellatum fuit.

In palato tres reperiuntur futuræ. Præter enim illam communem in adultis, qua dextra palati pars à sinistra dividitur, duæ sunt aliæ in utraque parte, quæ ad utrumque caninum dentem, à medio termino sexti ossis maxillæ superioris procedunt; ut hac ratione palatum ex sex ossibus constitutum esse videatur.

Maxillam inferiorem duas partes continere, seu duo ossa propter harmoniam, quæ in infantibus per ejus maxillæ medium excurrit, jam dictum est.

Dentes autem, ut unicuique notum est, in infantibus desunt, & post ortum generantur. In cavitatibus enim utriusque maxillæ infantis reperiuntur folliculi quidam membranosi, in quibus materiam quamdam mucosam cernere licet, quæ paulatim indurata auctiorque reddita foras egreditur, & folliculum gingivæque perforans evadit candida squama, instar favi tenuis, & excavata. Bartholomæus Eustachius in lib. de dentibus observavit, hanc cavitatem ad septennium, & plures etiam annos insigniter amplam perdurare, albo quodam humore refertam, qui procedente tempore durior factus, ossis naturam suscipit, & totam fere cavitatem opplet; & deinde fieri putat, ut dentes in adultis duplici substantia (quemadmodum arbores cortice & medulla) constare videantur; externa nempe, tersa, densa & alba instar marmoris, atque interna subobscura & nigricante. Dentis inferior pars in maxillis infantium recondita, etsi mollis appareat, durior tamen est ea parte, quæ extra gingivas prorumpit, cui tantum in puncto adhærens facile trahitur & educitur: folliculus vero in perfecto dente veluti glutine præsepiolis ac gingivis dentem alligat.

Tanta igitur capitis infantium ab adultorum capitibus dissimilitudo causam nobis reddit, ob quam in infantia & pueritia toties facies humana mutatur; caput modo oblongum, modo rotundum cernatur; modo depressum, modo acuminatum, præcipue in nonnullis quando dentes eruperint; cur item in adultis apud varios populos variorum capitum figuræ cernantur, prout tenella hæc infantium capita à nutricibus varie gubernantur. Nam Belgis & Parisiensibus capita sunt oblonga, quoniam in cunis pueros super alterutrum tempus dormire matres sinunt, & capita ad frigus depellendum constringunt nonnullis tegumentis, quæ baginas vocant. Germani compresso capite donantur ac lato, quod matres in cunis puerulos locent super dorsum, ac manibus, citra sæpe fasciarum usum, lateribus cunarum alligent, ne in quatiendo è cunis excidant. In eruptione porro dentium peculiaris ordo à Natura servatur, ne omnes illico emergant, aut molares ante caninos aut incisores. Non enim conveniebat dentes omnes simul prodire, quod cum membranam perforant sensu præditam, nimis magnos dolores, inflammationes, ac totius corporis perturbationes, febresque intolerabiles excitassent, quodque non oportebat cibum solidum statim, ac uno eodemque tempore tenero lacti affuetum puerum assumere; sed paulatim cibo solidiori assuescere conveniebat, & propterea prius incisores, deinde molares produci voluit Natura, quod usu in mandendo cibum solidiorem incisores præcedant molares. Prioribus enim dentibus apprehendimus ac incidimus; deinde cum buccis & lingua ad latera in ore cibum præhensum ac incisum protrudimus molaribus, ut eum in minimas partes confringant. Sed & in superiori maxilla ut plurimum in infantibus dentes prius erumpunt, raro in inferiori; quia papillis uberum superior maxilla magis atteritur ac proritatur, quam inferior: gingivis autem attritis facilius dentes erumpere argumento est dens lupi vel apri, vel corallum vel aliud quippiam durum, quod pueris à collo suspenditur dentientibus, ut in manu teneant & ori admoveant, quo atterant gingivas, & sic faciliorent ac accelerent dentium ortum. Arist. in Hist. de animal. scribit lac nutricum calidius citius dentes procreare:

In palato infanti tres futuræ.

Maxilla inferior duplex.

Dentes infanti desunt.

Quomodo dentes generantur.

Dentes duplici substantia.

Facies humana cur toties prius animus mutetur.

Cur varia sint capitum figura.

Dentes cur simul omnes non oriuntur.

Prius superiores dentes cur nascantur.

Lac calidius citius dentes generat.

procreare: cujus rei duplex succurrit ratio. Prima. Quod alimentum hoc, quo calidius est, eo citius per omnes corporis partes penetrando, alit partes solidas, hoc est, ossa & dentes. Secunda. Quod cum infans lactat, calidum lac calfacit gingivas, & laxat membranas, sub quibus dentes latent. Cæterum ex hac dentium procreatione, quæ & paulatim fit & ex ordine, docemur solo lacte pascendos esse pueros, usquequo dentes anteriores producant, nec citius ablaetandos, quam omnes produxerint, ac prout multi dentes prodeunt, pro eo pueris solidiora alimenta esse præbenda. Quocirca lubet summam obstetricum & nutricum stultitiam reprehendere, quæ paucis post ortum non dicam mensibus, sed etiam diebus, una cum lacte panem vino maceratum vel panatellam infantibus præbent, cum sic plurimas in tenello corpore generent cruditates, morbosque pariant sæpe perdifficiles, sæpissime funestos. Novi olim Bononiæ Typographi uxorem, quæ cum multos filios feliciter pareret, omnes incaute occidebat, quod cibum solidiorem, nempe panem cum vino maceratum suis infantibus nimis cito præberet, meminique cunctos hydrope cachexia, magnisque lienibus consumptos ante biennium fuisse. Quamobrem curandum est, ut filii solo lacte usque ad tempus dentitionis nutrantur, quantum fieri potest primis mensibus. Hoc enim alimentum quam citissime per totum corpus distribuitur, ac teneras quasque partes nutrit, ossa perficit, firmat, augetque velociter pro naturæ decreto primis mensibus.

Quamdiu
pueri solo lacte
nutriendi.

Obstruere
notanda.

Os hyoides
quale.

Cor pueri post
ortum non le-
guatur.

Vertebrae ex
pluribus ossi-
bus constant.

Et spina ca-
rent.

Pueri cur pos-
sint in poste-
riorum par-
tem se flectere.

Scapulae qua-
les in infan-
te.

Sternum qua-
le.

Pueri carent
articulis.

Cor pueri post
ortum articu-
la non pos-
sunt.

Prosequamur deinceps differentiam reliquorum ossium capiti subjeetorum. Os hyoides osseam basim habet, cornua vero sunt cartilaginea; quia basi hyoidis firmatur lingua ad deglutionem, quæ in lactando pueris erat maxime necessaria; cornibus vero vocis modulatio perficitur, quam antequam solidiora vel ossea evadant, formare recens natus homo nequit.

Vertebrae omnes non sunt unicum os, ut in adultis; sed singulae ex pluribus ossibus constant. Observavit aliquando Fallopius, primam vertebrae colli ex quinque partibus constare; reliquæ omnes vertebrae tum cervicis, tum dorsi & lumborum usque ad os coccygis, in tres partes divisa sunt, præter cervicis secundam, quæ cum odontoide epiphyisi in quatuor portiones divisa est. In cæteris namque pars prima est vertebrae corpus, reliquæ duæ continent foramina in lateribus, & processus cartilagineos. Carent autem omnes processu, quem spinam vocant Anatomici; unde fit, ut dum infans est homo vel puellus, in posteriorem partem mirabiliter flecti possit, ita ut occiput calcaneo tangere queat. Quocirca non sunt mirandi funambulorum, agyrtarum & circumforaneorum monstrifici flexus in omnem partem, saltusque formidabiles. Hi enim scientes hanc infantium dorsi constitutionem, à teneris assuescunt facile flectere in omnem partem tenellos puerorum artus absque dolore, sed maxime ad posteriorem, qua consuetudine vertebrae iste processus paulatim succrescit decuratus vel obtusus acumine suo recto aut caput versus tendente.

Scapularum ossa processum ancyroidem cartilagineum habent, oraque basis cartilaginea, & angulum inferiorem basis multo majori quam in adultis cartilagine præditum. Superior quoque scapulae processus appendice sua caret, quæ cum sensim succrescat in pueris, ex plurimis officulis cartilaginibus intervntu coalescentibus conformatur, ut Vesalius annotavit.

Sternum os ex multis constat ossibus à se invicem separatis: maximum os id est, quod primarum costarum cartilaginibus est vicinius; minus huic est subjeetum; deinceps reliqua, quo magis xyphoidi cartilagini sunt viciniora, eo minora existunt. Ejusmodi ossa in pueris usque ad septem annos divisa sunt, paulatimque grandescunt & solida fiunt, sed prius ea, quæ nunc sunt majora; deinde, minora.

Artus denique, nempe brachia & crura, articulis, extremitatibus seu appendicibus ossium carent & destituuntur, manifestius autem humerus, cubitus, manus articuli, coxæ, femoris, genus seu tibiae, & pedis: obscurius vero, quod exiguas habent appendices, metacarpi cum ossibus carpi & pedii, seu tarsi cum ossibus metatarsi: & ossa digitorum, quod careant appendicibus laxa compagine, eaque membranosa hærent. Hinc patet causa cur pueri non statim ab ortu saltent, vel ambulent, vel repant in terram sicuti agni, vituli, vel catuli. Cunctis enim his animalibus articuli & ossa conformata sunt, antequam in lucem prodeant; at homo ossa cuncta imperfecta obtinet dum nascitur,

nascitur,

nascitur, nulloque modo articulate prodit. Carpi & tarsi ossa omnino cartilaginea sunt, præter os calcis, in cuius medio quid ossei apparet. Octavum carpi os ultimum omnium ossæam acquiri substantiam, quod os Galenus *ἀρὸνυρον* appellavit, idest, inominatum; Celsò vero, os coxæ dicitur. Constat autem ex tribus ossibus, nempe osse ilium, coxendicis & pubis; cum tamen in adultis unicum sit os, cognosciturque inde causa, ob quam hoc os, quod in adultis unicum est, ab Anatomicis in tres partes (propriis jam dictis nominibus nobilitatas) dividatur. Non enim in infantibus & fœtu tantum, sed etiam in pueris usque ad septem annos ejusmodi os in tres partes separari potest: at in infante amplioribus intervallis, quam in puero distinguuntur. Iam satis ni fallor explicavi hanc ossium infantum & fœtum imperfectam constructionem; cui triplex subiungenda est ratio; una, situs fœtus in utero; altera, partus facilitas; tertia, hominis imperfectio. Dico primum, situm in utero causam esse, ob quam in fœtu humano ossa imperfecta à summo rerum opifice creata sunt. Nam aliter in utero humanus fœtus situs est, quam cæterorum animalium. Horum namque fœtus capite semper uteri orificium, per quod exituri sunt spectant, nec aliter situm mutant: at homo in matris utero contra capite ab uteri orificio averfus spectatur, & octavo mense, vel paucis diebus ante partum situm mutat capite deorsum ad uteri orificium declinans, quæ quidem mutatio situs non poterat fieri, nisi cum maximo dolore matris, ruptione membranarum chorii, & vitæ discrimine, si ossibus perfectis homo esset in utero. Præterea cum animalia expansa in utero sint, propter uteri oblongam formam, & ampla cornua; homo vero in unum suis articulis conglobatus, ob rotundam uteri internam capacitatem, non poterat in globum flecti totum corpus, nec in omnem partem se movere in utero, si ossa articulis, uti in adultis, donata fuissent. Iam quoque & partus facilitas commoditasque fecit hanc ossium imperfectiorem. Nam cum in partu exire oporteret per angustum uteri foramen tanta moles, & caput ejus prius prodire, id ex pluribus ossibus conformavit, laxis futuris & membranosis nexibus sibi invicem adhærentibus, ut hac ratione totum caput, quod amplissima pars est, in fastigium & oblongam formam comprimere posset ad faciliorem exitum. Idcirco erat quoque necessarium, ut neque humeri articuli, neque coxæ perfecti essent. Nam humerorum & articulorum coxæ latitudo commodiori partui, propter latas eminentias, prorsus restitissent. Tertia causa cur ossa in puero sint imperfecta jam dixi, quod sit hominis imperfectio. Posset tamen aliquis me redarguere, cum à magnis naturæ indagatoribus statutum sit, Naturam nil magis expetere, quam cujusque rei perfectionem. Dico tamen imperfectiorem cæteris animalibus Deum hominem creasse, ut omnium fieret perfectissimus, quod & in nostro sexu observare licet. Nam mas inter homines ut fœminâ fieret perfectior sapientiâ, & omnibus membris fortior, à fœmina imperfectiori in tenella ætate, in loquendo expeditius, in gignendo semen citius, & alias corporis actiones peragendo vincitur. Sic homo, ut omnium animalium fieret perfectissimum, nascitur imperfectus. Ambulandi enim &prehendendi quippiam manu impotens est, præter ejulatum nullam vocem edit; & cum multa animalia statim nata herbam comedant, vel fœnum, vel grana tritici & milii, ut volucres: homo præter lac nil assumere, nil deglutire potest. At oportebat hominem ita nasci, ut esset rationis omniumque disciplinarum capax & aptus ad docendum: ideoque matris industriâ loquendi & ambulandi promptitudo, & paulatim ipsa ratio infunduntur; deinde crescente ingenio sapientiæ, artes & scientiæ variae à præceptoribus hauriuntur, quæ cuncta non fuissent tam egregie consecuta, si sine auxilio illico, more animalium, post partum ambulare potuisset. Propterea unicuique observare licet, infantes quo frequentius eos matres alloquuntur, eo citius & expeditius loqui incipere, & quo sæpius cum pluribus hominibus versantur, aut eos loquentes audiunt, eo & mores eorum varios & loquendi modos facilius addiscere. Itaque ad educandos infantes diligenter præcipiunt sapientes viri, ut nutrices eligantur non taciturnæ vel stultæ, vel pravorum morum; sed quæ expedite prudenterque loquantur, & bonis moribus sint præditæ.

Porro propter hanc eandem ossium dissolutam connexionem & imperfectiorem, consuetudo invaluit in omni terrarum regione, præterquam Scytharum Nomadum, ut scribit Hipp. Infantes statim natos fasciis ligandi per annum unum vel alterum; non

Os inominatum infantis triplex.

Cur puero-
rum ossa non
perfectantur
in utero.

Secunda cau-
sa.

Tertia causa.

Fœmina mare
perfectior na-
scitur.

Cur fasciandi
tenetis infan-
tes.

tantum, ne lata fiant corpora & fluida, veluti Nomadum, quos Tartaros hodie vocant; verum etiam, ut ossa paulatim corroborentur, & ipsis articuli adnascantur. At quod in fasciando infantes obstetricum & nutricum non modica requiratur peritia, ne vel pedes ligent fasciis, vel brachia contorqueant, ut vaci & valgi cruribus imposterum evadant, brachiiisque mutili, vel claudi cruribus, docet hæc Anatome; quæ etiam similiter demonstrat sæpe evenire, ut claudicent imposterum quando ante debitam ossium consolidationem matres vel nutrices, ut se ab onere gestandi pueros quam citissime liberent, post sex vel septem menses docent infantes ambulare vel pedibus se firmare. Propterea si mater vel nutrix scire cupiat tempus, quo ambulatio docenda est, triplici modo hoc docebo. Primò, si ea parte cranii, qua caput apertum esse solet, ac sola membrana loco ossis velatum videtur, percipiatur cerebrum vix amplius pulsare. Signum enim est,incipitis hoc os, quod omnium ultimo generatur, jam natum esse, ideoque etiam reliqua ossa cum suis articulis jam esse firmata satis ad principium ambulationis. Secundò, si fasciis exutus infans, pedibus insistere potest. Tertiò, si cum post tres quatuorve menses manus à fasciis liberantur, infantes brachia & manus bene moveant, & firmiter manu teneant. Semper enim contingit, ut quo tempore brachiorum ossa perficiuntur, etiam perficiantur & crurum & aliorum, nisi aliquo fortassis naturæ impedimento aliquod os à prima conformatione debiliter sit formatum. Nam apud Forestum legi aliquando infantem natum brachio uno exosse, altero vero osse prædito, atque hunc ad mortis plagulis, & fasciis constrictis, ut in fracturis fieri solet, sanitati restitutum, admirantibus cunctis medicis & chirurgis, qui hanc curationem audierant vel viderant, quod os generaretur, ubi numquam erat conspectum. Nesciebant autem isti in cunctis nuper natis puerulis quædam plus ossis in membris ac perfectius, quædam vero minus habere, cunctisque fere apophyses & articulos deesse, qui deinceps ætate succrescere ac indurari consueverunt. Rursus ex hac ossium conformatione quomodo infantes fasciis ligati sint in cunis collocandi docetur. Non enim in latius, ut adulti vel pueri, sed dorso incumbere sinendi sunt; capite nonnihil elevato, ut è naribus & ore pituita profluat; quod ut fiat commodius, nonnulli caput leviter in alterutrum latus declinant. Cæterum quoniam constat ex his, quæ diximus, infirmas partes infantium infirmas satis edere actiones respectu adultorum, ut oculum infirmum infirmam visionem; querere quispiam merito potest, quamobrem, cum ossa puero- rum minus robusta sint, nihilominus citius celeriusque ambulent, quam viri. Videtur enim celeritas motus ad demonstrandum cuiusque partis robur conferre, & propterea dicendum crura esse robustiora puerorum, quam adultorum; quod Anatomix repugnat. Ad hanc dubitationem dico, celeritatem ambulandi in pueris procedere à debilitate crurum. Cum enim ambulatio fiat unius cruris translatione & alterius pedis firmatione, propter ossium vero & articulorum imbecillitatem non bene firmari pes possit tamdiu, donec alter sensum transferatur, sit ut pes alter qui transfertur pedi firmato cogatur quam citissime auxiliari, quod nequeat diutius totum corporis pondus sustinere; idcirco homo, quo ætate sit provecior, eo tardiore gradu procedit, ad sua munera obeunda; quo vero infantix aut pueritix vicinior, eo celeriori cursu suas res peragit. Est etiam notabilis omnino ossis coxendicis vel ejus articuli imperfectio iis, qui ad infantes vel herniosos puerulos accersuntur, ne vel ferreos cingulos, quibus omentum vel intestinum in scrotum prolapsum & in suum locum repositum prohibere solemus ne denuo ex abdomine prolabatur in scrotum, illis, neve cingulos duos, eosque fortiter strictos nondum septimum annum attingentibus præscribant: metuendum enim est ne à duro & constricto sub cingulo ita coarctata hæc ossa reddantur in suo augmento, ut propter horum ossium angustiam inferius corpus indecorum evadat. Querat autem quispiam ultimo loco, quomodo ossa seu eorum extremitates, quæ desiderantur in infantibus paulatim perficiantur, vel succrescant. Nonnulli existimantur eam, quæ ossa ossibus annectit, membranam in os verti, & antequam in os vertatur in nonnullis partibus verti in cartilaginem, quod falsum est. Si enim ex membrana duriore facta os fieret, proculdubio non pars aliqua membranæ, sed tota simul mutaretur in duriorum substantiam, nempe cartilaginem prius, cujus natura media est inter os & duram membranam, quod non ita apparet. Nam ossium omnium eadem generatio non est: etenim

Cor ossis
claudicant.

Quomodo
ambulant
infantes
ossium
fasciis.

Quomodo
infantes
in cunis
loquendi.

Celeritas
ambulandi
in
pueris
a debilitate
crurum.

Fortem
cingulum
in pueris
hermosos
malum.

Quomodo
generatur
ossa
ex fascia
post
natum.

etenim processus inferni femoris tibiæ & fibulæ, & cubiti duo, qui trochlea obvolvuntur, prius toti gignuntur cartilaginei, antequam ossei evadant: alia vero ossa perfectionem suarum extremitatum acquirunt per appositionem, ut superius vidimus in capite, ubi fit concursus futuræ coronalis & sagittalis membranofus. Non enim illico membrana in os tota mutatur, uti hæcenus existimarunt Anatomici, sed paulatim materia alimentalis, quæ in os vertitur apponitur ossium sincipitis & frontis extremitatibus tandem, donec omnes fines per futuræ medium coeant, eo pene modo, quo glacies concrevit in aquæ superficie. Fiunt namque prius tenuia veluti stamina seu filamenta circa oras fluvii vel vasis aquam continentis, deinde his alia glacies accrescit, & sic tandem aquæ tota superficies congelascit. In calcis osse quamvis in superficie cartilagineum appareat, antequam ex membrana os fiat, in medio tamen natura aliquod osseum jacet fundamentum, ex quo per appositionem calcis os paulatim grandescens conformatur.

Auctoris opinio de generat. tunc ossium.

CAPUT XX.

De Partus tempore, modo, & causa.

AD formati fœtus exactiorem cognitionem scire etiam necesse plurimis videtur partus tempus, modum, & causam; quibus ego quoque non reclamabo, præsertim cum videam hanc disputationem non tantum medicinæ studiosis utilem fore, sed etiam legum peritis. Cum enim legibus eorum imperatoris recte sit, propter summam Hippocratis nostri auctoritatem sancitum, septimo mense natos fœtus vitales esse legitimosque censeri debere, non secus atque eos, qui octavo, nono, decimoque mense nascuntur: tum noscere quoque debent etiam ultra prænominatos menses, nempe undecimo, duodecimo, decimotertio, ac decimoquarto legitime nasci posse, Vlpianumque reprehendendum, qui post decimum mensem editum nullum ad legitimam hæreditatem admisit. Nam ut ex præteream, quæ à Veteribus recentioribusque adducuntur, olim novi hominem, qui tabellarium agebat in Belgio, litterasque ferebat ex Zelandia in Bataviam, Urbis Medioburgensis testimonio publico omnibus commonstrasse, se sexti mensis initio editum, corpore exiguum ac viribus ita debilem & ossibus infirmum, ut mater coacta fuerit per tres menses in sinu ac inter ubera gossipio circumductum ad frigora fovere, donec robur acquisiverat, quo posset fasciis circumligari, erat autem hic homo dimidius pumilio quadraginta annorum. Atque nuper, ne ab externis repetam exempla, neve historias recitem, quibus Schenckius probavit duodecimo, decimotertio, decimoquarto, & decimoquinto mense gestari posse, in manu scriptis observationibus legi, Bellocatum hic Patavii excellentissimum medicum aliquoties enarrasse discipulis suis in lectionibus, sororem eruditissimi viri Buccellæ Patavini per menses sexdecim uterum gestasse, & cum molam omnes eam in utero habere suspicarentur, peperisse filium optime formatum. Cum igitur tam varium incertumque sit pariendi tempus, inquirenda causa, quam videntur hæcenus omnes docti viri vel omisisse, vel satis jejune obscure investigasse ac tradidisse. Etenim existimarunt nonnulli, quod homo non haberet ad coitum designatum tempus, multiplici victus ratione uteretur, phantasie quoque & pathematum variis alterationibus obnoxius esset omni hora, & propterea incerto tempore pareret. Sed hæc omnes causæ nimis sunt remotæ; quæro ego aliquam proximiorē. Hæc nulla alia esse potest, quam maturatio & perfectio fœtus, quæ fit in utero incerto tempore & variis interdum mensibus, ob facultates corpus fœtus gubernantes vel debiliores, vel robustiores. Facultas autem debilis vel robusta fit vel per se, ex semine nempe, cui inhæret tamquam suo principio; vel debilis validave fit ex accidenti, nempe apti alimenti penuria, ob quam nequeunt ossa firmari, & corroborari spiritales animalesque partes, adeo ut debito tempore, cum jam in lucem prodire debebat fœtus, neque flectere movereque se in utero, neque lac fugere, aut spiritum ore naribusque ducere queat. Contingit autem hæc penuria alimenti vel matris vitio, nempe morbo, inedia, aliave causa externa; vel fœtus ægritudine, quam sibi à pravo matris alimento, vel copioso nimium acquisivit. Nam plurimis quoque morbis in utero matris fœtum corripit, & Veterum auctoritate didicimus, & nuper fœtum

Vlpiani reprehendendum.

Fœtus sexto mense natus vitalis.

Mulier quæ per sexdecim menses uterum gestavit.

Nonnullorum opinio de incerto tempore partus.

Auctoris opinio de incerto tempore partus.

Fœtus morbo in utero corruptus laborare potest.

diffec-tione experti sumus. Quod si in nobis jam natis videamus sæpe ægrum corpusculum parum, interdum vero nil augeri, præsertim si diuturno malo fuerit conflictatum, nisi vires recolligat; nonne similiter nobis licebit opinari, fœtui ob morbum posse differri maturationis suæ tempus & exitus ex utero, usquequo debitam, confirmatis facultatibus particulas quasque corporis gubernantibus, perfectionem acquisiverit. Videmus eos, quibus corporis potentia robustiores sunt, citius quoque perfici ac nasci; septimoque mense natos fœtus plerumque mares esse, raro fœminas, aut minus vitales. Præterea cernere licet in pomiferis aut alterius generis arboribus, non omnes eos fructus, qui uno eodemque tempore florebant veris initio, illico cunctos simul mature-scere ac decidere; sed aliquot vel solis calore privatos, vel ventis aquilonaribus expostos, vel grandine & nebula læsos, vel facultate attrahendi & concoquendi sibi alimen-tum languidos diu adhuc arboribus post alios hære-re, donec maturentur. Quocirca existimandum est, maturationis tarditatem vel celeritatem partum accelerare vel tar-dare: causamque quod fœtus in lucem prodeat, non esse ejus magnitudinem, aut ino-piam alimenti, Vt veteres nonnulli somniarunt; sed ipsam perfectionem, seu matura-tionem fœtus, quæ præsertim circa partes spirituales & naturales talis est, ut in lucem prodiens naribus & ore spiritum trahere, & lac ex matris uberibus fugere queat. Nam videmus multas matres sæpe minimos fœtus parere, & tamen magnum incrementum corporis crescente ætate acquirere; aliquando maximos fœtus parere & gemellos; de-inde post partum, & gemellos, & parvos, & magnos fœtus solo lacte, quod in uberi-bus generatur nutrire, non dicam per mensem unum vel alterum, sed etiam per annum fere integram: quod non contingeret si mulier pareret vel fœtus ex utero exiret ob magnitudinem corporis, & penuriam alimenti. Nam ille sanguis, qui fluit tanta copia post partum ad ubera, nonne ad uterum fluere quoque poterat ad nutriendum amplius fœtum? Porro qui superius causam incerti partus hominum retulerunt in coitus incer-ta tempora, varias victus rationes, phantasias, & varios animi affectus, hac opinione decepti sunt, quod putarent alia animalia quadrupeda, vivipara, & quæ unum vel al-terum tantum pariunt fœtum, ut equam, elephantem, vaccam, asinam, certo tempo-re parere, equam uno, elephantem secundo anno, atque hoc esse præfinitum ipsis tempus pariendi; quod falsum esse ratio & auctoritates ostendunt. Etenim tarditatis & celeritatis partus eandem causam hæc animalia habere possunt cum homine com-munem. Ideoque Absyrtus Veterinarius præstantissimus et si equam undecim mensium curriculo decemque dierum uterum gerere scribat; Varro tamen lib. de Re rustica in-quit, duodecimo mense, die decimo nasci; quæ post id tempus nascuntur, fere inuti-lia & vitiosa existere. Sic Aristoteles elephantem biennio uterum gerere scripsit. At Strabo, Diodorus Siculus, Arrianus in Indicis menses ut minimum sexdecim, ut pluri-mum octodecim.

F I N I S.



I V L I I C A S S E R I I
P L A C E N T I N I

D E

F O R M A T O F O E T V

T A B V L Æ,

Earumque Explanatio.

T A B V L Æ P R I M Æ
E X P L A N A T I O.

Figura hæc mulieris gravidæ uterum, communibus tegumen-
tis ablatis, ostendit.

AAAA. *Tegumenta communia in abdomine decussatim dissecta,
& foras projecta.*

BBB. *Vterus grævida, qui tunc temporis multum à membranosa
natura degenerat, & spongiosam quamdam substan-
tiam induit.*

CC. *Vasa per uterum totum disseminata.*

DD. *Intestina, quæ utero intumescenti nonnihil cedunt.*

*

Tab. I



TABVLÆ SECUNDÆ
EXPLANATIO.

HÆc Tabula secunda foeminæ parturientis uterum offert,
& foetum exitum molientem sub tunicis chorio & amnio de-
monstrat.

AAAA. *Membrana uteri foras reflexa.*

BBB. *Chorion tunica foetui propria exterius, sub qua foetus hic
obscurè apparet.*

CC. *Foetus prout ad exitum disponitur sub chorio.*

Tab. ii



EE

T A B V L Æ T E R T I Æ
E X P L I C A T I O.

Tertia tabula, dissectis tunicis uteri & chorio, puellum in eodem situ, amnio adhuc involutum, ostendit.

AA. *Cutis exterior abdominis.*

BBB. *Vteri dissecti membrana.*

CCCC. *Membrana exterior fetum involvens dissecta, qua Chorion dicitur.*

DDD. *Puellus amnio involutus exitum parans.*

Tab. III.



E E 2

T A B V L Æ Q V A R T Æ
E X P L A N A T I O.

Q Varta tabula ostendit puellum nudum, tunicis omnibus, tam propriis, quàm communibus divis. *is.*

AA. *Chorii dissecti portiones à suo loco remote.*

B. *Amnii portio.*

CC. *Vteri dissecti membrana.*

DD. *Placenta, seu hepar uterinum, mole quadam carnea & pluribus vasis donata, per qua infans nutrimentum capit.*

E. *Diraricatio vasorum, qua hic unum vinculum constituunt ad umbilicalia vasa contegenda.*

FF. *Vinculum, per quod vasa umbilicalia à placenta ad umbilicum feruntur.*

GG. *Puelli perfecti & partui proximi situs in utero.*

H. *Insertio vasorum umbilicalium in ipsum umbilicum.*

Tab. III.



E E 3

T A B V L Æ Q V I N T Æ E X P L I C A T I O.

TAbulæ quintæ figura prima continet chorii internam faciem, quâ foetum respicit, unâ cum amnio tunica.

- AAAA. *Chorion, hoc est, exterior foetum involvens tunica, in modum crucis divisa, usque ad carneam suam placentam; est autem hac ejus superficies, quâ foetum respicit.*
 BBB. *Carnea placenta ipsa interiori quoque sui parte, ubi rami vasorum umbilicalium magno numero conspiciuntur, et ubi vasa umbilicalia ipsa emergunt.*
 CCC. *Rami vasorum umbilicalium per placentam errantes.*
 DDD. *Vasa umbilicalia sua membrana inclusa.*
 EEE. *Altera membrana interior, amnios vocata.*

Figura secunda repræsentat idem chorion extrinsecus, quâ uterum respicit.

- AAAA. *Membranea pars chorii, ad carnem crucis modo itidem incisa.*
 BBBB. *Placenta carnea, qua parte utero connascitur: et observetur obiter ejus inaequalitatem.*
 CC. *Vasorum umbilicalium extrema radices, quæ cum uteri vasis unitæ foetui alimentum advehunt.*
 DDD. *Funiculus vasorum umbilicalium, ex opposita interna parte chorii, unde pronascitur eminens.*

Tab V

Fig. I.





Fig. II.



T A B V L Æ S E X T Æ
E X P L A N A T I O.

T Abula Sexta exhibet hæc umbilicalia vasa à chorii placenta liberata.

AAAA. *Vasorum umbilicalium chorda, suo adhuc involucro, quod intestinum vocatur, excepta.*

B. *Initium divisionis vasorum umbilicalium in chorii carnem.*

CC. *Vena umbilicalis prima, sed insignis ramificatio.*

DDDD. *Horum ramorum vene umbilicalis anastomasis inter sese.*

EE. *Progressus reliqui trunci vene umbilicalis.*

FFFFF. *Insigniores rami vene umbilicalis.*


GG. *Truncus arteriarum umbilicalium.*

HHHH. *Rami arteriarum umbilicalium.*

IIII. *Conjunctio venarum, & arteriarum umbilicalium.*

KKKKK. *Vasa umbilicalia in minutissima filamenta divisa, & à carnea placenta liberata.*

Tab. VI



FF

T A B V L Æ S E P T I M Æ

E X P L I C A T I O .

TAbula hæc septima vasa umbilicalia, & membranas, five involucra foetus explicat.

- AAAA. *Abdominis musculi, & peritonæum, ipsaque cutis crucis modo dissecta, & retrorsum flexa.*
- B. *Hepar foetus gibba sua parte prominens.*
- C. *Vesica urinaria.*
- D. *Rima seu fissura hepatis, in quam vena umbilicalis ingreditur.*
- E. *Vena umbilicalis ipsa.*
- FF. *Due arterie umbilicales deorsum ad iliacas arterias tendentes.*
- G. *Vrachus ex vesica fundo prodiens.*
- H. *Vasa umbilicalia extra corpus foetus existentia quomodo conjuncta sint.*
- I. *Membrana, quæ vasa umbilicalia extra ventrem involvit.*
- KKKK. *Intestina foetus.*
- LLL. *Vasa umbilicalia à chorio ad fetum extensa, & in modum funis longa, ac intorta.*
- M. *Locus ubi rami vasorum umbilicalium in truncos collecti primum sunt.*
- NNNN. *Ramus vene umbilicalis per carnosam placentam chorii sparsus.*
- OOOO. *Ramus arterie umbilicalis.*
- PPPPP. *Conjunctio ipsius vene & arterie umbilicalis per placentam disseminata.*
- QQQQ. *Extrema ora venarum, & arteriarum umbilicalium desinentium in circumferentiam placentæ chorii.*
- RRR. *Chorium.*
- aaaa. *Umbra, quam quatuor vasa umbilicalia in altum elevata in subjectis partibus efficiunt.*

Tab. VII




TABVLÆ OCTAVÆ EXPLANATIO.

IN hac octava tabula videtur foetus foemineus, cujus abdomine pariter discisso uterus, diductusque cruribus & vulva, hymen apparet.

- AAAA. *Cutis, musculi abdominis, & peritoneum crucis modo dissecta, & reflexa.*
 B. *Cartilago Ensiformis.*
 C. *Vena umbilicalis abscissa.*
 DD. *Gibba pars hepatis.*
 E. *Rima, in quam umbilicalis vena se ingerit.*
 FFFF. *Intestina.*
 G. *Uteri fundus.*
 H. *Uteri cervix.*
 I. *Vesica.*
 K. *Trachus.*
 L. *Umbilicus.*
 MM. *Ligamenta superiora uteri coxis annexa.*
 NN. *Arteria duae umbilicales ab umbilico resecta.*
 O. *Clitoris.*
 PP. *Labra pudendi.*
 Q. *Hymen membrana transverse vulvam occupans, in medio perforata.*
 RR. *Alae seu pterygomata.*
 S. *Foramen hymenis, per quod menstrua in adultis fluunt.*

Tab. VIII.




T A B V L Æ N O N Æ E X P L A N A T I O.

T Abula hæc nona continet muliebria omnia genitalia in foetu.

- AAAA. Totum abdomen, hoc est quatuor tegumenta communia una cum musculus abdominis, & peritoneo crucis modo discissum, reflexumque.
- B. Vena umbilicalis.
- CC. Rima hepatis quam vena umbilicalis ingreditur.
- DD. Sima pars hepatis.
- E. Rima ad sima hepatis usque pertingens.
- F. Vesica fellis.
- G. Dexter ren.
- H. Ren sinister.
- IIII. Utriusque renis ureteres.
- KK. Vena emulgens sinistra.
- LL. Divisio venæ emulgentis ante ingressum.
- MM. Duæ venula, dextra emulgentis vena vicem in hoc corpore gerentes.
- N. Arteria spermatica dextra.
- O. Vena spermatica dextra.
- QQQ. Truncus venæ cavæ.
- RRR. Truncus arteriæ aortæ.
- SS. Arteriæ iliacæ à quibus oriuntur arteriæ umbilicales.
- T. Alius ramus arteriæ aortæ.
- V. Ramus arteriæ iliacæ ad uterum pergens.
- XXXX. Arteriæ umbilicales.
- YY. Arteria spermatica sinistra.
- Z. Uterus.
- Vena sinistra spermatica cum arteria se jungens, & ad sinistrum testem descendens.
- a a. Duo testes.
- b. Cervix uteri.
- c c. Ligamenta uteri.
- d. Vesica, & ex ea prodiens urachus.
- f. Rectum intestinum.
- g g. Gibba pars hepatis.


Tab. VIII



In hac Figurâ diductis cruribus pudenda muliebria cum HYMENE depinguntur.

- A. *Clitoris.*
- B B. *Labra pudendi.*
- C C. *Ala, sive Nympha.*
- D. *Orificium Vrethrae.*
- EFFH. *Caruncula myrtiformes quatuor, pudoris sinum, sive externum cervicis uteri orificium angustantes, & membranosis fibris colligata Hymenem constituentes.*
- E. *Caruncularum summa & bifida Vrethrae orificium occludens.*
- G. *Hymenis foramen, expurgandis menstruis exitum praebens.*
- H. *Caruncularum infima fissum pudoris sinum ad orbicularem virginalis claustri formam contrahens.*
- I. *Anus.*
- K. *Perinaeum.*

49.



GG.

INDEX R E R V M D E F O R M A T O F O E T V

<p>A.</p> <p>Allantoidem in humano fetu reperiri probatur, <i>ibid.</i></p> <p>Allantoidis humanæ figura qualis, <i>ibid.</i></p> <p>Allantoidis ovilis figura, <i>ibid.</i></p> <p>Allantoidis fœtus & viſus qualis, <i>ibid.</i></p> <p>Allantoidis ſubſtantia, <i>ibid.</i></p> <p>A. <i>hæc</i> ſæciminis genus, <i>ibid.</i></p> <p>Allantoi quæ membrana, <i>ibid.</i></p> <p>Allantoi unde nomen acceperit, <i>ibid.</i></p> <p>Aa reperitur in humano fetu, <i>ibid.</i></p> <p>Auſtoris opinio de allantoidæ, quod ſcilicet reperitur in humano fetu, <i>ibid.</i></p> <p>Amni ſitus & uſus, <i>ibid.</i></p> <p>Amni ſubſtantia qualis, <i>ibid.</i></p> <p>Amni varia nomina, <i>ibid.</i></p> <p>Amnios membrana unde dicta, <i>ibid.</i></p> <p>Amnios quæ membrana, <i>ibid.</i></p> <p>Mulier ſuperficiuſ de amnio unde orta, <i>ibid.</i></p> <p>Aphorismi cuſſidiam explicatio, <i>ibid.</i></p> <p>Ariſt. ſententia de arteriarum umbilicalium uſu, <i>ibid.</i></p> <p>Arteriz umbilicalis inferio, <i>ibid.</i></p> <p>Arteriz umbilic. cur prope cor non oriatur, <i>ibid.</i></p> <p>Arteriarum umbilicalium uſus ex Gal. mente argumentis probatur, <i>ibid.</i></p> <p>Arteriarum umbilicalium uſus ex mente auſtoris contra alios omnes anatomicos multos argumentis probatur, <i>ibid.</i></p> <p>Arteriarum umbilicalium uſus ex mente auſtoris propoſitur, <i>ibid.</i></p>	<p>G.</p> <p>Gal. argumenta de uſu arteriarum umbilicalium reſutata, <i>ibid.</i></p> <p>Galen. auſtoritates de uſu arteriarum umbilicalium, <i>ibid.</i></p> <p>H.</p> <p>Herodoti ſententia de partibus umbilicum conſtituentibus, <i>ibid.</i></p> <p>Hipp. auſtoritates de uſu arteriarum umbilicalium, <i>ibid.</i></p> <p>Hipp. loci de chorio explicatur, <i>ibid.</i></p> <p>Hipp. modus in eximentis ſecundus, <i>ibid.</i></p> <p>Hippocr. ſententia de purgatione capitis fœtus in utero, <i>ibid.</i></p> <p>I.</p> <p>Incertum eſt omnibus animalibus pariendi tempus, <i>ibid.</i></p> <p>Infantes cur ſtatim ſati caput erigere nequeant, <i>ibid.</i></p> <p>Infantes cur trepano tractari non debeant, <i>ibid.</i></p> <p>Infantes poſt ortum cur non ambulant ut agni & vituli, <i>ibid.</i></p> <p>Infantes quando ambulationi aſſueſcendi, <i>ibid.</i></p> <p>Infantes quomodo in cunis locandi, <i>ibid.</i></p> <p>Infantes ſolo lacte uſque ad tempus dentitionis nutriendi, <i>ibid.</i></p> <p>Infantes ſtatim poſt ortum medicamentis non ſunt purgandi, <i>ibid.</i></p> <p>Inſtantum medicina unde ſumenda, <i>ibid.</i></p> <p>Inſtantia cur ſepe oculorum colores mutantur, <i>ibid.</i></p> <p>Interna uteri ſuperficies in non gravidis levis & lubrica eſt, ſi mentes non ſiunt, <i>ibid.</i></p> <p>Interrigines quomodo curandæ, <i>ibid.</i></p> <p>Intellum cæcum in fetu cur magnum, <i>ibid.</i></p>	<p>Partes principes in fetu magnæ & cur, <i>ibid.</i></p> <p>Partium communium diviſio, <i>ibid.</i></p> <p>Partium externarum ſortis enumeratio, <i>ibid.</i></p> <p>Partium externarum ſynonyma, <i>ibid.</i></p> <p>Partium ſortis diviſio, <i>ibid.</i></p> <p>Partus temporis incertitudo ex quibus proveniſſe cauſis ex mente aliquorum, <i>ibid.</i></p> <p>Ex mente auſtoris, <i>ibid.</i></p> <p>Placenta cui annexatur, <i>ibid.</i></p> <p>Placentæ caro qualis, <i>ibid.</i></p> <p>Placentæ uſus ſecundum Arantium propoſitur, <i>ibid.</i></p> <p>reſicitur, <i>ibid.</i></p> <p>Ex mente auſtoris, <i>ibid.</i></p> <p>Pueri carent articulis, <i>ibid.</i></p> <p>Pueri cur celeriter ambulent, <i>ibid.</i></p> <p>Pueri cur ſaſciandi, <i>ibid.</i></p> <p>Pueri cur plurimo moco abundent, <i>ibid.</i></p> <p>Pueri cur poſſint in poſtteriorem partem ſe ſteſcere, <i>ibid.</i></p> <p>Pueri cur ſtatim poſt ortum non loquantur, <i>ibid.</i></p> <p>Pulmones ſortis cur ſanguine copioſo nutrantur, <i>ibid.</i></p> <p>Pulmones in fetu cur ponderoſi, & in natiſſimis, <i>ibid.</i></p>
<p>C.</p> <p>Capitis cur variæ ſint figuræ, <i>ibid.</i></p> <p>Capitis ſortis magnitudo quem habet uſum, <i>ibid.</i></p> <p>Capitis oſſa in fetu quomodo conſequentur, <i>ibid.</i></p> <p>Caput ſortis in utero expurgatur, <i>ibid.</i></p> <p>Chorii nomen dupliciter accipitur, <i>ibid.</i></p> <p>Chorii qualis ſubſtantia, <i>ibid.</i></p> <p>Chorii verus & falſus propoſitur uſus, <i>ibid.</i></p> <p>Chorion quæ membrana, <i>ibid.</i></p> <p>Chorion totum ambiſ ſortem, <i>ibid.</i></p> <p>Claudicatio multorum unde, <i>ibid.</i></p> <p>Coloſtrum pueris dandum, <i>ibid.</i></p> <p>Coloſtrum quid, <i>ibid.</i></p> <p>Conſequentia vaſorum ſortis cum utero ex mente auſtoris, <i>ibid.</i></p> <p>Cotyledonum nomen vaſorum uteri oſſibus tributum eſt licet, <i>ibid.</i></p> <p>Cotyledonum vox apud Græcos æquivoca, <i>ibid.</i></p> <p>Cutis ſortis ab adultorum cute diverſa, <i>ibid.</i></p> <p>Cutis in fetu cur tenuis, <i>ibid.</i></p>	<p>L.</p> <p>Lac calidius citius dentes generat, <i>ibid.</i></p> <p>Lumbosæ factura cur locum ſepe mutat, <i>ibid.</i></p> <p>Loci Ariſt. & Hipp. de cotyledonibus explicatur, <i>ibid.</i></p> <p>Locus ad amputandum umbilicum aptus, <i>ibid.</i></p> <p>M.</p> <p>Mammæ ſortis cur lac habeant, <i>ibid.</i></p> <p>Mammularum in fetu uſpectio neceſſaria, <i>ibid.</i></p> <p>Maxille inferior duplex, <i>ibid.</i></p> <p>Meatus auditorius in fetu cartilagineus, <i>ibid.</i></p> <p>Modus amputandi umbilicum, <i>ibid.</i></p> <p>Modus invenendi allantoidem in humano fetu, <i>ibid.</i></p> <p>Morbi quibus pueri qui non purgantur ſunt obnoxii, <i>ibid.</i></p> <p>Mulier quæ per ſexdecim meſes uterum geſtavit, <i>ibid.</i></p>	<p>Q.</p> <p>Quæ obſervanda in ſeſſione umbilici, <i>ibid.</i></p> <p>Quamdiu pueri ſolo lacte nutriendi, <i>ibid.</i></p> <p>Quomodo ligandus umbilicus & ubi, <i>ibid.</i></p> <p>R.</p> <p>Renum ſortis figura, <i>ibid.</i></p> <p>Ruſi Epheſii opinio de allantoidæ, <i>ibid.</i></p> <p>S.</p> <p>Scapulæ quales in infante, <i>ibid.</i></p> <p>Secundæ quomodo ex utero eximendæ, <i>ibid.</i></p> <p>Sordium ſortis uſus ex mente aliquorum, <i>ibid.</i></p> <p>Ex mente auſtoris, <i>ibid.</i></p> <p>Sternum in infante quale, <i>ibid.</i></p> <p>Sudor in fetu cur ab urna ſeparatur, <i>ibid.</i></p> <p>Sudoris variæ uſus, <i>ibid.</i></p> <p>T.</p> <p>Tempus docendi pueros ambulare, <i>ibid.</i></p> <p>Tempus ſecandi umbilicum, <i>ibid.</i></p> <p>V.</p> <p>Vaccinus ſortis quomodo utero adheret, <i>ibid.</i></p> <p>Vana medicorum cautio in ſecando umbilico, <i>ibid.</i></p> <p>Vena ſuperficiuſ de modo umbilici, <i>ibid.</i></p> <p>Vena ſuperficiuſ in amputando umbilico, <i>ibid.</i></p> <p>Vafa thoracis in fetu quomodo conſtituta, <i>ibid.</i></p> <p>Vaforum umbilicalium qualis ſubſtantia, <i>ibid.</i></p> <p>Venæ umbilicalis inferio, <i>ibid.</i></p> <p>Vertebæ ex pluribus oſſibus conſtant, <i>ibid.</i></p> <p>Vertebæ puerorum ex pluribus oſſibus conſtant ſpina caret, <i>ibid.</i></p> <p>Vefica major ventriculo in fetu, <i>ibid.</i></p> <p>Veteres cur crediderunt ſortem in utero per os inuicem capere, <i>ibid.</i></p> <p>Vetorum & recentiorum opinio de arteriarum umbilicalium uſu propoſitur, <i>ibid.</i></p> <p>Vipſianus cur reprehendendus, <i>ibid.</i></p> <p>Vmbilicalis vaſa cur orto ſortu in ſaniculos abſorant, <i>ibid.</i></p>
<p>D.</p> <p>Dentes cur ſimul omnes non oriuntur, <i>ibid.</i></p> <p>Dentes duplici conſtante ſubſtantia, <i>ibid.</i></p> <p>Dentes infanti deſunt, <i>ibid.</i></p> <p>Dentes quomodo generantur, <i>ibid.</i></p> <p>Dentes ſuperiores cur prius naſcantur, <i>ibid.</i></p> <p>E.</p> <p>Equinoſis ſortis quomodo utero annexatur abſque placenta, <i>ibid.</i></p> <p>Excrementa ſortis cralla cur atra, <i>ibid.</i></p> <p>Excrementa ſortis quomodo generantur ex mente auſtoris, <i>ibid.</i></p> <p>Excrementa ſortis quomodo vocentur à Græcis & Latinis, <i>ibid.</i></p> <p>Excrementorum ſortis interiorum uſus, <i>ibid.</i></p> <p>F.</p> <p>Facies humana cur toties primis annis mutantur, <i>ibid.</i></p> <p>Færum cingulum in pueris bernioſis cur adminiſtrare non conveniat, <i>ibid.</i></p> <p>Fætina mare perfectior naſcitur, <i>ibid.</i></p> <p>Fœtus cur aliquando laqueatus naſcitur, <i>ibid.</i></p> <p>Fœtus cur ſtatim natus diſſimile videre non poſſit, <i>ibid.</i></p> <p>Fœtus in utero non mingit, <i>ibid.</i></p> <p>Fœtus ſanguine æque puro ac impuro nutritur, <i>ibid.</i></p> <p>Fœtus ſexto meſe natus vitalis, <i>ibid.</i></p> <p>Fœtus ſtatim natus cur tot excrementa excreat, <i>ibid.</i></p> <p>Fœtus variis in utero moribus laborare poſſe, <i>ibid.</i></p> <p>Frontis oſ duplex in ſuper nati, <i>ibid.</i></p>	<p>N.</p> <p>Nervum ad umbilici compoſitionem concurrere probatur, <i>ibid.</i></p> <p>Nervus ad umbilici compoſitionem non concurrere ex Gal. mente, <i>ibid.</i></p> <p>Noxæ boni lactis, <i>ibid.</i></p> <p>Nutrices quales eligendæ, <i>ibid.</i></p> <p>O.</p> <p>Oſ <i>diverſas</i> cur in adulto tria habeant nomina, <i>ibid.</i></p> <p>Oſ ethmoides cartilagineum, <i>ibid.</i></p> <p>Oſ frontis quomodo in fetu conſtitutum, <i>ibid.</i></p> <p>Oſ hyoides uſale, <i>ibid.</i></p> <p>Oſ innominatum inſanti triplex, <i>ibid.</i></p> <p>Oſſa in pueris quomodo poſt ortum generantur ex aliorum ſententia, <i>ibid.</i></p> <p>Ex auſtoris ſententia, <i>ibid.</i></p> <p>Oſſa puerorum cur in utero non perficiantur ſic ut cæterorum animalium, <i>ibid.</i></p> <p>Oſſa temporum diviſa in infante, <i>ibid.</i></p> <p>Oſ ſphenoides quadruplex, <i>ibid.</i></p> <p>Oſ olimbæ genitum, <i>ibid.</i></p> <p>Ovillus ſortis quomodo utero adheret, <i>ibid.</i></p> <p>P.</p> <p>Partes ſortis interne propriæ quæ, <i>ibid.</i></p> <p>Partes ſortis propriæ quæ dicendæ, & quæ communes, <i>ibid.</i></p>	<p>Vaccinus ſortis quomodo utero adheret, <i>ibid.</i></p> <p>Vana medicorum cautio in ſecando umbilico, <i>ibid.</i></p> <p>Vena ſuperficiuſ de modo umbilici, <i>ibid.</i></p> <p>Vena ſuperficiuſ in amputando umbilico, <i>ibid.</i></p> <p>Vafa thoracis in fetu quomodo conſtituta, <i>ibid.</i></p> <p>Vaforum umbilicalium qualis ſubſtantia, <i>ibid.</i></p> <p>Venæ umbilicalis inferio, <i>ibid.</i></p> <p>Vertebæ ex pluribus oſſibus conſtant, <i>ibid.</i></p> <p>Vertebæ puerorum ex pluribus oſſibus conſtant ſpina caret, <i>ibid.</i></p> <p>Vefica major ventriculo in fetu, <i>ibid.</i></p> <p>Veteres cur crediderunt ſortem in utero per os inuicem capere, <i>ibid.</i></p> <p>Vetorum & recentiorum opinio de arteriarum umbilicalium uſu propoſitur, <i>ibid.</i></p> <p>Vipſianus cur reprehendendus, <i>ibid.</i></p> <p>Vmbilicalis vaſa cur orto ſortu in ſaniculos abſorant, <i>ibid.</i></p> <p>Vmbilicalia vaſa quæ, <i>ibid.</i></p> <p>Vmbilicalis vena cur unica, & duæ arteriz, <i>ibid.</i></p> <p>Vmbilici longitudo & craſſities quanta, <i>ibid.</i></p> <p>Vmbilici ſitus, <i>ibid.</i></p> <p>Vmbilici vox æquivoca, <i>ibid.</i></p> <p>Vmbilicum non habere nervum probatur, <i>ibid.</i></p> <p>Vmbilicus cur in inferiorem abdominis partem ſeratur, <i>ibid.</i></p> <p>Vmbilicus cur longus, <i>ibid.</i></p> <p>Vnde orta Anatomicorum ſententia de uſu arteriarum umbilicalium, <i>ibid.</i></p> <p>Vrachi inferio, <i>ibid.</i></p> <p>Vius diverſe conſtitutionis vaſorum thoracis ſortis ſecundum alios anatomicos, <i>ibid.</i></p> <p>Ex mente auſtoris, <i>ibid.</i></p> <p>Vius umbilici multiplex, <i>ibid.</i></p> <p>Vterque cordis ventriculus in pueris habet partem æqualis craſſitudinis, in adultis ſimiliter inæqualis, <i>ibid.</i></p>

F I N I S.

T R A C T A T V S
eorum, qui post SPIGELIVM
A N A T O M I A M
INVENTO ALIQVO
Majoris usus adauxerunt.

G A S P A R I S A S E L L I I Itali.

G V I L I E L M I H A R V E I I Angli.

I O H A N N I S W A L Æ I Belgæ.

Recenfente

I O H A N N E A N T O N I D E
V A N D E R L I N D E N

Medicinæ Professore.

G A S P A R I S A S E L L I I
C R E M O N E N S I S ,

T A B V L Æ

De Venis lacteis.

L E C T O R I S .


Dissertationi Gasparis Asellii de Venis Lacteis, figuras quatuor, formis æneis elegantioribus expressas, subjunximus; quibus author earum Originem, Progressum, & Insertionem repræsentare conatus est, ut Venæ illæ aliquatenus legentium, Anatomicorum præsertim, oculis exponerentur, & certius cognoscerentur. Vale & utere.

T A B V L A P R I M A

Ventriculum, Intestina & Mesenterium, cum Vasis Mesaraicis quatuor generum per illa hinc inde distributis, exhibet.


- A. *Vena Mesaraica vulgata, Porta rami, cum Arteriis mesaraicis.*
- B. *Vena Lactæa discurrentes per mesenterium ad intestina.*
- C. *Mesenterii portionem: una etiam Nervorum Mesaraicorum per eam distributionem signat.*
- D. *Ventriculi fundus.*
- E. *Inferius Ventriculi orificium πύλωσος vocatum.*
- F. *Intestinum duodenum.*
- G. *Iejunum intestinum.*
- H. *Ileum intestinum.*
- I. *Vena & arteria fundum ventriculi perreptans.*
- K. *Omenti pars.*
- L. *μεγάλαια portiuncula: in quam Vena lactea, inter se implexe insinuantur, formâ capreolorum.*

De Venis Lacteis. Tabula I.



TABVLÆ SECVNDÆ
EXPLICATIO.


- A. *Vena Mesaraica vulgate cum Arteriis.*
- B. *Vena Lactæ.*
- C. *Mesenterium.*
- G. *Iejunum intestinum.*
- H. *Ileum intestinum.*
- L. *Implicatio Lactearum in pancreate.*
- M. *Ramus Vena cavæ.*
- N. *Progressus Lactearum ex Pancreate ad Hepar.*
- O. *Hepatis fibra.*
- P. *Vesica fellis.*
- Q. *Pars quædam carnosæ, glandulosæ & adiposæ, canibus peculiaris.*



TABVLÆ TERTIÆ
EXPLICATIO.


- A. *Vena & Arteria Mesaraica.*
B. *Lactæ venæ.*
C. *Mesenterium.*
G. *Intestinum jejunum.*
H. *Ileum intestinum.*
M. *Vena cava.*
N. *Lactea juxta Cavam ascendens ad Hepar.*
N. † *Eadem Lactea ad venam Porta propagata, eamque coronans.*
O. *Hepatis fibra.*
P. *Vesica fellis.*
R. *Vena Porta.*
S. *Colon intestinum.*
T. *Origo Mesenterii.*

De Venis Lacteis. Tabula III.



TABVLÆ QVARTÆ
EXPOSITIO.

- M. *Vena Porta.*
N. *Lactearum in Hepar insertio.*
O. *Hepar.*
P. *Vesicula fellis.*
V. *Ductus Cholodochus ad intestina.*



GASPARIS ASELLII
CREMONENSIS,

DE

LACTIBVS,

SIVE

LACTEIS VENIS

quarto vasorum mesaraicorum genere.

DISSERTATIO:

Qua sententiæ Anatomicæ multæ vel perperam receptæ
convelluntur, vel parum perceptæ illustrantur.

Ex recensione

IOHANNIS ANTONIDÆ van der LINDEN
Med. Prof.

L E C T O R I S. M.



Nexhausti sunt Naturæ thesauri, & recondita adeo Conditoris humani corporis est sapientia, ut licet tanti viri, studio incredibili, tandiu naturam ejus inquisiverint, omnem tamen necdum invenerint: quin multa majoribus inguſtata ſubinde etas detegit, & plura adhuc ventura ad-
inveniendæ veſtant. Hinc **GASPAR ASELLIUS** Anatomica cathedra in Ticinenſi Aca-
demia olim Profeſſor publicus, præter alia rara & ſingularia ſecando indies corpora, a ſe obſervata,
novum hætenus incompertum venarum Meſaraicarum genus, quas lacteas appellavit, primus
Anno **CIO IDC XXII** ſibi notavit & alijs patefecit. Verum quæ ſuper illas, dum vive-
ret adhuc, in commentarios retulit idem ipſe, ad **Alexandrum Tadinum**, & Senatorem Septalium, viros Medicos
illuſtres & Phyſicos de Collegio Nobil. Mediol. morte auctoris, pervenerunt: qui etiam eadem publicis typis deſcripta
Italia nuper exhibuerunt. **Galenus de Difficul. Reſp. lib. II, cap. I.** juſtum & decens præmium eorum, qui quod-
cunque tandem in vita bonum invenerunt, eſſe ait, ut inventa ipſorum non occultentur, neque hominibus ſint igno-
ta: quare ut alijs quoque novum hoc inventum appareat, hunc de Venis lacteis tractatum omni fide ac diligentia reviv-
ſum, & à multis quibus ſcatebat in citatorum præcipue falſa annotatione, commiſſi **Φαλματός** reſtitutum, noſtris
dare conſtitui, & quidem ea forma, qua ſpectatiſſimum **Adriani Spigelii** opus Anatomicum expreſſum eſt: ut
qui ei operi adungere voluerit, nihil amplius ad ejus perfectionem deſideret. Hoc meum ſtudium probis Anatomis
ſtudioſis tam Philoſophis quam Medicis non ingratum fore conſido: quo interea utere benigne Lector, donec quæ de
Venis acris ſtudio & admirabiliſ judicio, idem **Aſellius** congeſſit, in primis verò Obſervationes ejus Chirurgice
prodeant. Vale.

GASPARIS ASELLII
CREMONENSIS

I N

DISSERTATIONEM
DE LACTIBVS,

SIVE

VENIS LACTEIS,

PRÆFATIO.

In qua 1. Quæstionis de chyli vasis utilitas. 11. Difficul-
tas. 111. Scriptionis argumentum & causa. 14. Sum-
ma capita proponuntur.

INter multas Scholarum
Anatomicarum controver-
sias necdum aut explicatas
fatis, aut plane perceptas,
illa mihi semper & gravis
& perquam digna scitu vi-
fa est, quæ viâ perquirun-
tur, per quas secretus à
ventre & intestinis cibus,
veluti è promptuaria cella ad Iecoris, quas vo-
cant, portas, tanquam ad communem, ut loquitur
Gal. coctionis officinam comportatur. Nec id
temere, opinor.

Primum, ea hujus quæstionis indoles est, ea
vis, ut, quantum illius nos fugerit præterieritque,
tantundem nescire nos oporteat tum in nutritio-
nis universo negotio, quæ una animantium vita
continetur, iidem, quibus illa, terminis circum-
scripta; tum ignorare, de naturæ omni, in fabrica
nostri corporis, arte, consilio, providentia, quæ ut
nullibi magis quam in minimis tota est, ita infini-
tam hanc animæ vim ac potestatem incredibili
plane præter ceteras instrumentorum quæ appa-
ratu, quæ numero instruxit. Neque id satis. Mul-
tæ & magnæ quæstiones aliæ, quadam sive socie-
tatis, sive artis communione ac serie colligatæ in-
ter sese ac nexæ, ita ab hujus notitia aptæ sunt ac
pendent, nullum ut sine ea rectum explicatum in-
veniant. Quo succo alatur venter, quo intestina:
ab his solis, an ab illo etiam communiter tradu-
cendus ad hepar succus hauriatur: arteriarum,
quæ per Mesenterium & intestina magna copia
ac pari prope cum venis numero incedunt, quis
sit usus, quæ conditio ac ratio: quod munus ac
officium Lienis: Venæ unde primam sui originem
sumant, quem numerum faciant; tum sanguinem
contineant solum, an etiam procreent, quod *αἷμα
τομιέν* vocant: quanta in disceptatione dissiden-
tium inter se ac discrepantium medicorum ver-
santur? At nihil de his omnibus constituere recte
aut definire est, nisi hac ipsa, quæ de agimus, quæ-
stione constituta prius ac definita.

11 Certat cum hac tam multiplici utilitate,

quæstionis ejusdem difficultas & obscuritas. Nec
facile enim aliam reperias, quæ aut majori labo-
ret opinionum varietate, aut acrioribus conten-
tionibus agitetur. Prope quor capita totidem sen-
tentia sunt. Esti enim de hoc facile inter omnes
convenit, per vasa, quæ crebra multa que toto
Mesenterii corpore sunt intertexta, trajici, quem
dicimus, ad hepar succum; quæ tamen sint ea va-
sa; & hæc, solum hoc negocium agant, in nullo
altero dedita; an aliud præterea munus fungantur
expleantque: tum, si alteri præterea vacant, uno
ne eodemque tempore, an ejus intermissione ac
intervallo, facta quadam veluti reciprocatione
utrique vacent? denique, quod maxime rem to-
tam & causam continet, quo modo, quæ descri-
ptionis lege ac ordine, quo proposito fine id agant,
quod agunt: hæc omnia tanta in ambiguitate ver-
santur, tam perplexe, tam dubia & suspensa ora-
tione à vulgatis Anatomicis explicantur, ut uni
omnium, hac quidem in re, verissime illud Galeni
usurpare posse videantur, *λαβὴς μὲν δὲν, ἡ κερὰσι* d. 2. de pla.
καλῶς. cap. 4.

Accedit huc maximum illud incommodum,
quod, ut quisque ad veritatem accedit propius,
ita insanire maxime & vaticinari ab iis creditur,
qui rei omnis medicæ ad se censuram olim jam,
fama nominis & exstimationis, revocarunt. Sic
non modo *τὸ δοκεῖν*, ut dicebat Simonides, *τὴν ἀλή-
θειαν βιάσασθαι*, id est, auctoritate obruitur veritas: sed
etiam via ipsa perveniendi ad eam præcluditur, &
ire cogimur ritu precorum, qua itur, non qua eun-
dum est. Hæc omnes causæ facile persuaserunt,
minime mihi perituram operam, si quam in rei hu-
jus tam multum ac sæpe quæsitæ, necdum exqui-
sitæ perquisitionem per investigationemque confer-
rem; & quo minus ingenio possum, subsidio mihi
diligentiam compararem. Ita igitur feci, & in eo
totis viribus elaboravi, quæ literis super ea re ma-
gnis ab ingeniis fuere prodita evolvi, accurate &
sedendo, quod ajunt, expendi, cum summis viris,
quotiescunque fuit occasio, sententiam meam
contuli; denique, quod rei caput est, quodque
unum opus, unum studium Anatomici esse Gale-
nus voluit, Autopsiam in consilium adhibui, ut,
de ejusdem Galeni hortatu, propriis oculis, non
libris crederem, hoc est, oculata fide, seu mani-
bus potius assequer, quod quaererem. Favet tan-
dem

A a 2

e 1. Ana.
admon. cap. 2.
e 2. de part. 3.

dem Fortuna coëptis, & post multos magnosque labores, cum jam prope difficultati cederem, desponderemque, præter spem, & tantum notū aliud agenti vias eas objecit, hoc est, quantum Vaso- rum Mesariorum genus, quod omnem ad hoc ævi superiorem Anatomicorum effugit diligen- tiam ac industriam, aperuit.

De hoc Vasorum genere agere in præsen- tia, eorum historiam, fabricam, usum, & alia, si quæ observavi, ponere in medio mihi propositum est. Nulla alia id causa, quam ut, quantum in me est, ipse quoque & juvem Anatomes studiosos, & per majorum vestigia incedens communis scien- tiæ fines pro virili propagem proferamque, quo major ac major semper accepta ista ab ejus paren- tibus hæreditas ad posteros transeat: simul, quoad fieri potest * *τὴν αὐτοδιδασκίαν ἀπελευθερῶ τῷ Φύσει* *αὐτοδιδασκίαν, per se doctam indolis naturæ sapientiam hæc* quoque in parte asseram atque illustrem, quod facere nihil aliud est, vel Galeno¹ teste, quam ve- rissimum hymnum conditori ac molitori rerum Deo optimo, sapientissimo, potentissimo canere.

Hæc duo, an, quemadmodum sequutum me esse certe scio, ita affectus etiam sim, alii vide- rint. Nec enim unquam inducar, ut pompam mu- neri meo ipse addam, qui illud aperte & vere pro- fiteor, nec laudis studio, nec gratiæ spe quicquam scripsisse: quarum alteram jam olim contempsi; alteram ne sperem quidem, hoc sane ævo, quo facile *Omnes inveniunt jam inventa*; plerique quo- rum ipsis in mentem non venerit, ea non tam ju- dicant, quam carpunt aut in invidiam, vel, si ita libet, calumniam vocant. Quæ tamen nequa- quam ita accipi velim, tanquam deprecandæ ca- lumnia: aut invidiæ a me dicta, quam tantum ab- est ut pertimescam, ut gavifurus etiam sim ma- gnopere, si communi cum bonis & doctis ævi om- nis ac memoriæ sive fortuna, sive fato frui mihi li- ceat. Nullus unquam liber, inquit Plato, calum- niæ vim effugit. Et rectissime Cicero, vitari non posse ne reprehendatur, nisi nihil scribendo. Est autem profecto angusti & abjecti & humilis ani- mi, quæ facere debeas, quæque recte & ordine facere scias, in iis nescio quem cujus reprehensi- uncula metum, aut publicæ utilitati aut officio prævertere. Nec vero Hæctori laudi illud datum fuit,

Ἰδίομαι τρώας ἔπεισας ἑ πεσάδας ἰλίου πύλας
Trojanos veneror & Trojanum firmam trahentes;
aut quod idem solebat,
πρῶτα δ' αὖ μοι πρῶτον ἐλπευχέω ἀναγῆσαι.
Prædamas mihi primus probro ducet.

Multo verius, rectius, generosius istud, quod apud Horatium Stoicus Damasippus.

Invidiam placare parat virtute relicta?
Contemnere miser. Vitanda est improba Siren
Desidia, aut quicquid vitæ meliore parasti,
Ponendum æquo animo.

Ita est, *Invidiam ac Calumniam is demum vincit ma- xime, qui contemnit maxime.* Sed hæc ἐν περὶ ὁδοῦ.

De re ipsa & dissertatione nostra.
xv Ea ve vel nullis, vel incertis limitibus fera- tur, erunt illius duo omnino capita; quorum al- tero ea considerabuntur examinabunturque, quæ de vasis Mesaricis ab ipsâ infantia Anatomes ad hoc ætatis comperta in literas ab aliis relata sunt:

alterum ea habebit, quæcunque ad novum Vaso- rum, quod diximus, genus & inobservatum hæ- tæus, explicandum stabilendumque pertine- bunt. His enim duobus veram omnem & legiti- mam approbandarum novarum sententiarum Con- tineri rationem, jam olim Aristoteles & verbo docuit & exemplo ostendit. Iam utrumque ho- rum, pro re nata, minutius iterum ac minutius in progressu concidetur, ne quicquam vel minimum prætereatur. Ita enim, præter obscuritatem, no- vitas quoque rei videtur postulare, & tanquam jure quodam suo exposcere. Quippe in re tali nulla diligentia aut supervacua esse potest, aut minuta videri debet. Sed pedem ad rem ipsam faci- amus. Nam illa, quæ dixi, minutiora opportu- nius rei series, ac consequens ipsa tractatio, quam hæc, quæ forte processit jam longius ac debuit Præfatio, dixerit.

C A P. I.

Considerantur, quæ toti Mesenterio communia. 1. No- men. Notati Cicero, & Macrobius. *μυωέγειον quid,* & unde sic dictum? *μυωέλημα.* 11. Figura. 111. Si- tus. 1v. Origo. Hippocrates enarratus. Lumbo- rum & Mesenterii consensus. A' *ἐμπυα* quid Galeno. v. Connexus. vi. Magnitudo. *Πlica Mesenterii.* vii. Divisio. Hippocr. præter Galeni mentem ex- plicatus. Item Avicenna, Theophrastus, Fallopius. viii. Compositio. Omento, & tenui cerebri me- mygi quomodo simile Mesenterium?

DE Vasis Mesaricis acturo, nullo modo præ- tereundum Mesenterium est. Quippe id illis non nomen modo largitur, sed firmamenti quo- que *ἰσπαίς* vicem præstat, quod sustentur: & pro ponte est, quo^a allevata tuto à jecinore ad intestina & vicissim commeat. Quare nos quo- que iis, quæ de ipso nota vulgo sunt & litteris con- signata, perpendendis primum locum dabimus.

1. Mesenterium igitur, si Galeno¹ credimus, à e c. *ἄ* situ ita dictum est, quia ἐν μέσῳ τῶν ἐντέρων, id est, in medio intestinorum positum est. Vnde² Cicero, & eum secutus³ Macrobius parum recte *medium* *intestinum* vertisse creduntur: rectius alii *medianum* seu *medium* intestinorum reddidisse. Gaza apud Ari- stotelem⁴ passim *Latētes* transtulit. Qua de re suo loco dicemus uberius. Alio nomine *μυωέγειον* di- citur, ex eodem⁵ Galeno, à propria ejus substan- tia, vel quia, ubi vasa, quæ per ipsum incedunt, & cum his intestina in orbem complectitur, ibi ra- rius est: vel rectius⁶ à raritate media corporum glandosorum, quæ in eo cernuntur. Rufius⁷, & Hefychius⁸ dictum volunt eadem fere ratione, quia Mesenterium, quia scilicet in medio est ven- tris & intestinorum. Ventrem enim, inquit, & in- testina veteres *ἀεγυλιὰ* sive *ἀεγυλῶν* appellabant. Alii⁹ ex eo nomen posuit dicitur, quod medium at- tollatur inter vasa, quæ ad intestina. Videtur idem Veteres *μυωέλημα* quoque appellasse, si modo certa est lectio apud¹⁰ Galenum, *μυωέλημα ὁ ὑποσπέντερον ἔλεγον.* de qua re videri potest, si quis ita volet, ¹¹ Foësius.

11. Figura est circulari, plana, in plicas contra- cta; circa primum exortum angusta; in medio, ampliore; in lateribus, potissimum sinistro, ubi ad rectum descendit, oblonga.

De Lactibus, seu Venis Lacteis.

III. De Situ liquet ex iis, quæ de nomine jam dicta sunt.

IV. Originem ejus Hippocrates^a deducit ex nervis è dorio in ventrem, id est (ut Galenus^b interpretatur) ex una lumborum vertebra post diaphragma posita, quod loci ventriculus est.

Accuratius rem totam explicavit^c Fallopius, qui docet à duplici principio oriri, altero & superiori circa primam, altero & inferiori circa tertiam lumborum vertebra, ad duos illos, quos describit idem copiose, nervosus plexus: idque à peritonæo (à quo etiam Galenus ipsum^d deducit) productis ab eo membranis fibris, quæ paulatim in duas Mesenterii membranas abeant. Atque hæc causa creditur magni illius lumborum & intestinorum consensus. Fibras illas membraneas, vel certe primum Mesenterii exortum Gal.^e ἀρτηρία^f vocare videtur, quod alii *vinculum*, alii *appendicula* vertunt. Hippocrates nervos simpliciter appellat, quod, ut Gal.^g ait, quæcunque ex ossibus orta exanguia corpora, ea νῆρες αἰσθητικά, veteribus medicis appellare mos fuit, ut sic ea à nervis, voluntarii motus principis, appellationis modo fecerement.

V. Connectitur ex Galeno: non solum cum subjecta illi spina, & iis, quæ ad illam, de quibus jam diximus: sed etiam cum intestinis & vasis, quæ ad intestina feruntur, ac præterea cum aliis omnibus circumfusus corporibus.

VI. Magnitudo, si ad intestinorum longitudinem compares, quæ colligat, nimis quam parva videatur. Cum enim intestina duodecim aut quatuordecim ulnarum longitudinem æquent, ipsum vix ulnæ mensura est. Fit autem, ut tam parvum cum sit, nihilominus facile tantæ longitudinis intestina comprehendat, propter plicas illas, similes iis, quas in indusis vulgo ninfas vocant, quibus obliquo, reduplicaturque. Quæ nequaquam frustra à natura factæ, sed eum in finem, ut tam proximam intestinorum longitudinem, non difficulter, exigua, si cum illis conferas, abdominis capacitatis includeret, caperetur.

VII. Numero etiam unum & continuum est, Galeno etiam: tamen ab eodemmet Galeno^h, ratione venarum & articularum, quæ per illud excurrunt partim ad tenuia, partim ad crassa intestina pertinentes, distinguitur in id, quod gracilia intestina inter se committit, & appellatione generica Mesenterium dicitur: & in aliud, quod crassa complectitur, & peculiari nomine *μαστικαλον* appellatur. Quin idem Galenusⁱ triplex facit, eadem causa & ratione; unum, quod ad dextram situm, primum est coli partium; aliud, quod est * τῷ λατῶν, tertium intestinorum medium; tertium, quod prope sedem pertingit, in sinistra situm: ex quibus duo priora arterias accipiant, à magna illa, quæ per dorsum procedit, in tertium exigua quædam inferatur de imis partibus, quæ propter venæ à magna arteria, in jugis & ipsa nascitur. Hæc Galenus. Qua tamen in re, ut nihil dissimulem, quod ad Hippocratem attinet, equidem puto, eum loco à Galeno citato *κῶλα* non gracilia modo, sed omnia intestina, & quod hinc consequitur, *μαστικαλον* generatim, non secus ac Mesenterium intelligere. Sic enim lib. de corporum refectione accipit, & lib. de nat. ostium quoque usurpat, cum inquit, *κῶλα* (pudendo errore vulgo *κῶλα*

vertunt artus) homo habet, quam canis majora. Ex *μαστικαλον* autem pendet. Quod inde etiam redditur credibilis, quia eodem libro, quod hic *μαστικαλον*, idem Mesenterium paulo post nominat. Avicenna duplex ipse quoque Mesenterium, quod appellat Mirach, constituit, Sed profecto non tam Mesenterium ibi dividit, quam ipsum & Pancreas confundit, sicut alii quoque, inter quos Theophilus^m Protospatharius, & ipse Fallopius, qui Pancreas maximam esse Mesenterii glandulam dicit. Primum enim Avicennæ Mirach nihil aliud esse quam pancreas, tum ex situ, quem ei tribuit, tum tota cætera descriptione cuius vel perfunctorie locum illum legenti notissimum esse potest. Ita quæcunque de illo dicit, Pancreati ad amissum conveniunt.

VIII. Componitur Mesenterium præcipue & propria ratione ex membranæ, glandulis, & adipe. Vnde Arist.ⁿ Ex membrana, inquit, latiore & pinguedine constat, sub pinguedine glandulas etiam complexus: secundo loco, & ratione velut populari, ex vasis præterea, quæ per ipsum feruntur potius, quam ut ad ejus substantiam (saltem omnia) pertineant. Atque horum valorum inprimis respectu, à Gal.^o substantia Mesenterii Omenti substantiæ similis dicitur, quippe quod ipsum quoque ex eisdem compositum exsistit, etsi ea substantiæ similitudo, propter adipis copiam, qui omentum infarcit, in animalibus præsertim pinguioribus, minus est ad sensum manifesta. Eadem causa ab eodem Gal.^o tenui menyngi tegenti & stabilienti cerebrum assimilatur, quod, sic uti hoc ex multis arteriis & venis sibi propinquis, ac præterea tenui membrana inter has interjecta conflatum est; ita menyngis illa ex similibus omnibus, & tantum non geminis, constitutionis suæ habet modum.

C A P. II.

Explicantur propria Mesenterii partes singulatim. I. Membrana. Cur duæ? Sectione quemadmodum duasprehendas? Cui usus? Auctor libri de utilitate respir. expositus. Riolanus rejectus. II. Adeps. Ejus generatio. In pennatis peculiaris usus. III. Glandulae. Earum numerus, magnitudo, divisio, usus. Marinus & Galenus idem sentiunt. Auctor libri de utilitate respir. laudatus. Varolii Hippocratis explicatio obiter notata. Fallopius & Archangelus reprehensi. A scirrhus glandularum atrophia.

Inter Mesenterii partes proprias primum locum absque dubio tenent ejus membranae.

I. Hæ, duæ sunt; firma utraque^a ac densa ad robur, quo illis multo opus erat. unde fere duplex peritonæum, id quod etiam est, mesenterium appellatur. Galenus^b simplex esse ait, quia vasis & intestinis in orbem obtenditur (potes addere, ubi adeps medius intercedit; quæ vero in medio interjacet istorum, non amplius tunica usum, sed copula seu ligamenti præbens, duplex. Quo loco^c etiam accurate docet, quo modo duplicitas hæc (ut ita loquar) & simplicitas sectione & sensu ipso deprehendi possit. Est autem modus isto, ut acuto scalpello pars cuiusque intestinorum anfractus, maxime gibba ita incidatur, ut exterior tunica dividatur, interiori illa, & inde utrinque usque ad partem firmam excorietur. In canibus, quæ vasa me-

ignorat, cuius hæc sunt verba. *Pender Mesenterium ex vena majori, & aorta, venaque permixtas frequentis cursu defert, ex pari illo venarum grandium ad intestina de summis adimam usque spargens.* Quibus familia alibi¹ etiam habet, ubi Mesenterium plenam venarum multarum ac frequentium membranam appellat. Meminit & Hipp.² venarum, & nervorum per septum ad Mesenterium tendentium. Sed & Iul. Pollux³ Mesenterium definit *ὄμιννα ἐκ φλεβῶν ἐνέων συμπολοῦς, membranam ē venarum nervorumque implexu conflaram.* Agamus de his singulis, & primum de venis, ut quæ majoribus & pluribus præter cætera difficultatibus laborant atque arguerentur.

1. Venæ ergo Mesaraicæ, quas Medianas⁴ nonnulli appellant, prope innumeræ sunt. Originem eis esse ab hepate, tanquam à principio distributionis venarum, ut Gal.⁵ loquitur, seu ut⁶ Hippocr.⁷ radicationis, *ῥιζώσεως* (h modo aliud est hoc principium ab eo, quod *ῥιζώσεως* generationis dicunt, quæ de re alibi *ὀνείω*) ne Aristoteles quidem negaverit, autopsiam sequutus. Omnes siquidem, vel sensu ipso teste, deducuntur ab ejus venæ, quæ ex hepatis inferiori cavitate emergit, & quam omnis Afclepiadarum⁸ familia *τὴν πρὸς πύλιν* id est *ad portas venam* appellat, humiliori ramo, qui & mesentericus ideo dictus est. Vnde fit etiam Gal.⁹ auctore, ut hepatis *cæva phlegmone obfesso, protinus etiam ipsa laborent, & quæcumque osculis earum incidunt, vim suam jecori ostendant.* Quidam ab intestinis earum originis principium arceffunt. Quorum sententiam eo argumento¹⁰ Carpus probat, quia radicum vices obtineant. Principium autem arboris, radices dicimus. Addunt alii, vias esse ab intestinis ad hepar directas, & inde igitur, hoc est, ab intestinis principium earum esse ducendum. perperam. Ut enim recte dici possint viæ ab intestinis ad portas, quod tamen vno loco contra esse ostendam) ne sic tamen originis illarum principium recte intestinis dederis. Nec enim potest esse idem venarum principium & finis, eo modo, quo principium viæ. De radicibus quod pount, falsum & inane est. Nihil minus radices quam principium arboris sunt, sed tum radicum, tum ramorum principium sive truncus ipse est; si verius id, quod inter truncum, & radicem medium Gal.¹¹ jecori, Aristoteles¹² cordi vult esse analogum. Semen enim simul ac germinascit, eodem ex principio & radices deorsum jacit, & truncum cum ramis suis sursum porrigit. Vesalius¹³, & eum secuti Paræus¹⁴, Salomon¹⁵ Albertus, & alii infimulant Gal. quasi voluerit etiam à cava venas Mesaraicas quasdam derivari. Eo quod alicubi¹⁶ loci, à magna vena sub ventriculo ducta, inter cæteras, mesenterio quoque distribui venas scriptum reliquit. & alio loco¹⁷ venas quasdam eidem mesenterio tribuit, nutritioni tantum destinatas, & ad hepar non trajicientes, sed in glandulas finientes, quarum ipsarum etiam mentio habetur lib. de¹⁸ semine. Sed turpiter lapsus, an deceptus? est Vesalius. Galenus primo loco magnam venam, nequaquam cavam, sed portam intelligit, ut ipse se alibi declarat, quam magnam¹⁹ vocat. (*μεγάλην*) ad discrimen cavæ, quæ illi maxima est²⁰ (*μεγίστη*). Secundo vero loco cum Herophilo, id tantum vult, venas illas ad hepar succum non trajicere,

non autem ab hepate non prognasci. Id quod ex Græco textu clarissimum est. Duplices enim ibi Gal. mesenterii venas proponit ex Herophili sententia, quam ne ipse quidem improbat; alias, quæ tantum deferunt materiam ab hepate; alias quæ & deferunt, & referunt. In illis simpliciter ab hepate ad mesenterium progressum considerat. Vnde finiri dicit²¹ in glandulas *μὴ μεταμιμῶναι εἰς τὸ ἥπαρ* id est, non trajicientes iterum ad hepar. In aliis duplici usu, duplicem etiam progressum perpendit, & illum scilicet ab hepate ad intestina, & vicissim. Vnde eas ait²² non simpliciter *Φέρεται*, sed *ἀναΦέρεται*, id est, *versum ferri ad hepar.* Quæ annotare diligentius placuit, quod hoc in loco mirifice & inutiliter Puteus²³, & Cuneus²⁴ se torquent, & quod dicitur fluctus in simpulo movent.

11. Inferuntur omnes mesaraicæ, id est, quæ per mesenterium incedunt, in intestina, si unum duodenum excipias, quod à ramo ipso, antequam dividatur in mesenterium, sæpe etiam ex truncado adeo venas accipit, secundum ejus longitudinem excurrentes. Qua in re erravit Massa²⁵, qui ei Mesaraicas, sed paucas tribuit. Ac in jejunum quidem, ileon, cæcum, & coli partem dextram Mesenterica dextra: in reliquam vero coli regionem, & in rectum, sinistra absumitur. Plurimis vero inter omnia intestina scatet jejunum. Vnde solum aliquando²⁶ nominatur, cum de venis propagatis per intestina agitur. Atque hæc multitudo venarum in jejunum, præter nervosam ejus substantiam, potissima²⁷ causa est, cur vulneratum curationem non admittat. Auctor lib. de Anatomia²⁸ vivorum, mesaraicas etiam in ventriculo inferi pronunciat, manifestò errore, si mesaraicas, ut debet, pro illis sumit, quæ per Mesaraion feruntur. Nullam enim ab iis ad ventrem ferri, sensus judicio certum est. Quin nec à Mesenterico ramo, præter unam, ad eum²⁹ mittitur: quæ quod ipsi cum omento communis est, Gastro Hepiploica; à situ vero, dextra dicitur.

De modo insertionis Gal. *ἀνασπείρειται* dicit cum intestinis, id est oscillis suis hiare in intestina, id est in ipsam anfractuum eorum cavitatem, modo hirudinibus³⁰ simili, spongiosis, & obliquis capitulis, ut auctor lib. de Compag.³¹ membrorum loquitur, eaque causa cum radicibus arborum³² comparat. Ego, ut facile concedo aperiri ad intestinorum tunicas, imo etiam ad cavitates (quomodo enim, ut nihil interim dicam de alentis succi in intestina distributione transpositioneque, quem plerique negant, nisi laxatis venarum oscillis, ullo modo posse induci, quomodo inquam aliter ita confertum totius corporis noxii humores in illa, foras inde exigendi, deponerentur?) ita illud plane & simpliciter inficior hirudinum instar habere, aut radicum locum obtinere, qui ramis similes esse experientia deprehendo, Galenoque scio omnis deceptionis causam fuisse, quod exsectioni chyli deputatas crediderit, ut ostendam infra fusius. Interim mirari libet Avicennam³³, & eum sequutos, Laurentium³⁴, Archangelum³⁵, Columbū³⁶, Riolanum³⁷, alios, qui, cum nobiscum ipsi quoque radices esse negent, functioni tamen nihilominus eas destinant. Magis etiam miror Bauhinum³⁸, qui commento antiquo Jacobi de Partibus, & Zerbii³⁹ simul & radices & ramos posse dici autumat;

mat; ramos, si originem ab hepate; radices, si
opus spectet. * Inanissimum enim esse hanc di-
stinctionem, periphrase similitudo arboris docet,
qua passim hac in re Galenus * & Hippocrates vi-
deri confluenter. Columbus * civis meus singulis
suum valvulam apponit, qua intestinis commitan-
tur, quem totis viribus oppugnant Archangelus *,
Laurentius *, & alii. Ego quam recte, quam non
recte id fecerit, mox in loco reddam.

III. Progressum Mefaraicarum Gal. sic describit: *Plurima venarum oscula ad quodque intestinum penetrant, veluti arboris cujusdam extremi ac tenues fines.*

Hæc vero ut in arboribus radices, exiguas in craffiores & majores fenfim natura cosìque colligit, dum in unum rorantur, & denique in unum omnes trancunt, venam felicet quæ ad portas est hepatis, coeunt, à qua etiam tum quod ad ventriculum, tum quod ad splenem feruntur, progrediuntur. Et similia aliis quoque locis habentur, ubi notandum est, Galenum eorum progressum ab intestinis ad hepar, hoc est, à fine ad principium profectum, non contra. Sed parum refert. Eadem enim est, ut Aristoteles dicebat, via à Athenis Thebas, & Thebis Athenas. Porro ramus ille, in quem omnes coalescunt, ex eodem Galeno ad Pancreas est. Ibi enim ut docet, principium est omnium valorum melaëricorum divisionis. Ob quam divisionem, ut commode & sine periculo fieret, duo, inquit, solertissime natura machinata est; primum, quod pancreas illi venis tum substruit, tum in orbem circumposuit; alterum, quod intestinum duodenum non in anfractus reflexit, sed rectum fecit: illud, ut divisiones fulciret, quod maxime panatutur vasa, ubi divisa in plura & minora abeunt; hoc, ut iustum spaciū his ac progressum suppeditaret, quod involucrâ, quæ ac parvas faciunt angustias, impedivissent. Cui autem unieritas ad portas, cum rursus videre oportuerit in hepate, ejus rei caula videri potest apud Galenum ipsum. Clara enim est & longiori explicatione non eget.

C A P. I V.

*Agitur de venarum Mesariacarum actionibus. Et usibus.
li tres Galeno, Et vulgo Medicorum, avadonis, ai-
wadonis, Δαδωνος. Ex iis duo primi rejeſti, tertio alius
Et novus additus ex ipſo Galeno. Galenus nullibi dixit
avadonem Et Διδωνem fieri eodem tempore. Laurentius
Hippocratis non recte cepit.*

Quod præcipue quavis in parte spectatur, id
ejus est actio, in quam omnis ejus molitio ap-
paratuque conspirent necesse est. Ea causa de-
venarum Mesaraicarum actione seorsum & suo ac-
proprio citam agere nobis visum. Id quod in ar-
teritis etiam servabimus.

Actiōnem hanc five ufum (nec enim hic accuratus libet hæc diftinguere) triplicem omnino Galenus, & cum eo plerique omnes, venis Mefarai-
cis affignant. Primus & præcipuus, eft *diadafis*, five Chyli, poftquam is ab inteftinis direptus, &
ab arduioribus recrementis fecretus eft, ad hep-
atraduſio, unde illas manus hepatitis idem Galenus

^a *de locis*,
^c *7*,
^a *part.*

Alter ufus eft præparatio Chyli, & in fanguine mutatio, de quo ifta idem Galenus^s habet. *Yena non deducunt folum nutrimentum ex ventriculo, fed attrahunt fimul, ac hepatis præparat, modo, quo ipfius, fimilimo, quippe quæ natura æpi funt æfimiles, & ex eo germē ducunt, &c.* Et alio^o loco. *Quapropter & venis, inquit, quæ ad ventriculum & uerojæ intestine pertinent, inefi facultas quædam fanguinis effectrix, quæ fuccum, qui ex cibis diftribuitur venis, in fanguinem mutare naturale efi,* prius etiam quam ad hepatis perveniat. Et fimilia plane leguntur in volumine de Plac. Hipp. & Platonis^s. Idem fentiunt auctor Ifagoges^s, & auctor lib. de Compag. membrorum^s.

Tertius usus, est *Ἀλγίδος*, id est, distributio sanguinis ad hepate ad mesenterium, ventrem & intestina, eorum nutritioni. Hanc *Ἀλγίδος* ajunt vulgo fieri velle Galeaum³ partim, & id plerumque diverso ab *ανδροσίου* chyli tempore, cum scilicet vacue chylo venez fuit, & nutriti avent: partim, sed rarius, eodem quoque: adeoque qui id negant ignaros vocari ab illo, ut aliorum naturæ operum, ita roboris in attrahendo instrumentorum nutritione egentium. Dixi⁴ vulgo. Nam ex verbis, quæ adducunt, *Admiratur nonnulli*, &c. nihil tale, imo contrarium convincitur. Atque priorem modum præter auctorem lib.² de Anatom. vivorum, qui venas mearicas determinatis horis & aperire sua officia, & claudere affirmat, etiam Hippocrates⁵ (si modo is est auctor librorum de morbis) agnoscere videtur, cum sic ait: *Ποτὴν cibis & potus in ventrem incidunt, frui corpus de ventre, & una cum fontibus impletur. Vbi vero alvus vacuatur, rursus humor retro ab ipsa redditur, quemadmodum susceperat, velati ex aliis ad unum vasculum, & quæ sequuntur.*

Ex his vero tribus uſibus, ego non niſi ultimum
agnoſco, qui, ut dicam in quarto uſuſum genere,
primo uſui longe alia uenas ſeruare atopia ipſe
didicerim. Illo uero ſublato, ruit etiam ſecundus
uſus. Quomodo enim chylum præparabunt, id eſt
rudi, ut Galenus amat loqui, ſanguinis ſpecie in-
buenz uenæ melaſtaicæ, quem non continent? ut
omittam interim quaerere, an uenis aliqua *αιμα-
τωσις*, id eſt, ſanguificatio, ut vocant, competat,
de qua re ipſa quoque agam poſtmodum. Porro
illi ultimo uſui adjuſſum aliud*, qui eſt humorum
è toto corpore per eas uenas protruiſus atque ex-
purgatio, ſive illa ſponte natura fiat, ſive uſi & ope-
ra medicamentorum procuretur. Atque hoc eſt,
cur inter loca conferentia inteſtina ab Hippocra-
te numerantur. Addunt alii alii, ex*, Hippocra-
te iniquunt, qui eſt deſerre ad inteſtina ca-
lorem & ſpiritum, quem Laurentius tum vita-
lem, tum naturalem intelligit. Cæterum puto ego,

hunc

hunc usum cum venis Hippocrates tribuit, venis pro arteriis, ut solet more priscæ medicinæ, abusu. Et hæc de venis mesaraicis, superest de arteriis videamus.

C A P. V.

De arteriis mesaraicis. Earum i. Nomen. Cur *ēgagru* Brasistrato. ii. Situs. Numerus. Magnitudo. Aristotelis hic error. iii. Origo. iv. Infortio. Galenus in hac explicanda omnibus recentioribus accuratior. Aristotelis hic quoque allucinatio. v. Progressus. Arteriarum quam venarum principium obscurius.

Arterias Mesaraicas Brasistratus *ēgagrus*, id est, extremas appellavit; comparando illas, ut Gal.⁶ explicat ad eas, quæ insunt Epigastrio. Nec enim ut situ, ita continuitate & exortu proximæ sunt, sed longissimo originis intervallo se contingunt, exemplo tangentium se aliquando in arboribus foliorum, quæ ex diversissimis ramis exoriuntur.

ii. Adjacent fere venis, iis comites, earumque numerum æquant.

Aristoteles ⁴longe minores esse vult, quam venas, perangustas & fibris nervorum proximas, cavas tamen. Papat enim aortam ita semper progrediendo extenuari & angustum redigi, ut tandem in extremis partibus ex toto nervi naturam accipiat. Quæ sententia alibi à nobis considerata est.

iii. Origo iis omnibus ab arteria magna, quæ spinæ incumbit, hoc est, à trunco arteriæ magnæ, quæ per inferiorem ventrem, venæ portæ attigua defertur, ex illo ejus ramo, qui mesentericus à recentioribus dicitur, & in superiorem ac inferiorem dividitur.

iv. Infortio nihil diverſi habet à venis. Inferuntur enim non secus ac illæ in concavam anfractum intestinorum partem, totamque longitudinem eorum omnium, excepto duodeno & jejuni principio, in quæ à coeliaco ramo vocato arteriæ intestinales dictæ mittuntur. Recentiores Anatomi à ramo ⁵mesenterico superiori arterias in Jejunum, Ileum, & Colum quæ ad dextrum renem situm est, deducunt: inferiorem, potissimum in coli finitram partem, tum in rectum intestinum absumi ajunt. Sed haud scio an rectius diligentiusque Galenus qui totam arteriæ, quæ venæ portæ contigua est, distributionem accuratissime simul ac brevissime his verbis ⁶exsequitur. Arteria magna deorsum procedens, ex una statim radice bifariam deducta, ventriculo quidem & hepatis & lienis alteram partem; cæteram vero, intestinis distribuit per duo mesenteria, tum id, quod ad dextram situm primarium est coli partium, tum id, quod est dextrum, id est, tenuium intestinorum medium. Nam tertium Mesenterium, quod prope sedem pertingit, in sinistra situm, nullam inde assumit arteriam, sed de imis partibus quædam in ipsum exigua inferitur, quæ post venas à magna arteria in jugis nascitur. Interdum statim ab initio duplex apparet, & è duabus in jugibus alteram, hoc est, altiore in ventriculum & lienem; alteram, hoc est, humiliorem in jecur & mesenteria dispergit. Vbi obiter rursus notandus error Aristotelis, ⁷qui sicut etiam auctor lib. de respir. utilitate ⁸observavit, negat ab aorta arteriam ullam ad hepar pervenire. Nec satisfaciunt, qui aut de hepatis gibba parte in eodem modo locutum

ajunt, aut id tantum velle affirmant, non transire per hepar arteriam, sicut transit vena. Simpliciter enim, Nulla, inquit, ab aorta ad hepar vena pervenit.

v. Progressum istarum arteriarum recte idem Galenus ⁹venarum progressui comparat, & vult ¹⁰idem modo ut illas, ex tenuissimis & minimis in majores semper ac majores coire, donec in unum omnes principium conveniant. Illud tantum discriminis adfert, ¹¹quod venarum principium facile comperitur, quippe quæ ad jecoris portas in unam omnes colligantur; arteriarum non ita facile, quia magis exangues & crassiori tunica principium habent contiguum exanguis corpori, à quo mesenterium est cum intestinis aptum, quodque mesenterii æquetna vocant, id est, suspensorium, vinculi naturam habens. Est autem principium illud ad dorsum. Dividenda, inquit idem ¹²Gal. in Mesarum arteria, principium divisionis sue habet medio loco inter ventriculum ac intestina, & incumbit spine subjacentibus vertebrae, tum quia vena portæ ibi dividitur, venis autem natura, ubicunque nihil prohibet, adjungit arterias; tum quia ad jecur ab hac ipsa arteria prædaci ramum oportuit.

C A P. VI.

In actiones arteriarum & usum inquirunt. An chyli quippiam in se alliciant. Galeni & Hippocratis in eam rem sententia expensa, & in medio relicta. Auctori lib. de utilitate respirationis, & Varolius accurate confutati. Sanguis per quas vias è dextro cordis sinu in sinistram subeat. Caci ductus in corpore.

De actione & usu arteriarum Mesaraicarum in eo plerique omnes consentiunt, datas intestinis & mesenterio non magis, ut vitali calore frigoris eorum nativi vim temperent foveantque, quam ut assiduo suo motu, ceu verberc ventilando illa & irrigando salutari spiritu, à putredine & corruptione, cui inprimis tanquam receptacula quædam superfluorum & emissaria sunt obnoxia, vindicent.

Sed præter hunc usum videtur etiam velle Galenus ¹³chyli aliquid ex intestinis exhaurire trahendo, eo tempore, quo fatiatus ventriculus quod reliquum habet, in ipsa exonerat. Id vero ex eo demonstrare conatur, quod omne dilatatum necessario trahatur à vicinis, arteriæ autem perpetuo dilatentur & constringantur.

Cæterum ostendit, id quod trahunt esse primo permodicum omnino, & cujus vix sit habenda ratio: secundo, exquisitissime confectum & levissimum.

Posterioris rationem hanc adfert, quia tractus hic non formæ aut qualitatis sit similitudine, cuiusmodi aut ad nutritionem aut oblectationem refertur trahentis, sed successione ad vacuum, quæ necessitate quadam nititur, cum, ut dictum est, dilatio ejus sit causa. At in ejusmodi tractu semper id primo, quod levissimum est, sequitur, exemplo siphonis trahentis de aqua, cui permixtum sabulum. Is enim semper, inquit, aquam prius quam sabulum ad se rapit. Prioris causam istam statuit, quod necessario cum dilatantur arteriæ, ante implentur levioribus, hoc est, iis, quæ trahunt à corde & ex venis.

Longe ulterius, quam Galenus, progressus est hac in re Auctor ¹⁴lib. de utilit. respir. qui perti-

naciter contendit, attrahere succum sibi cor, non solum à cava hepatis, sed etiam ab intestinis per medias has arterias, frivolo plane argumento, quia arteriæ hæc mesenterio continentur, & hepar tamen non transeant. Atque hujus suæ sententiæ fundum & auctorem facit Aristotelem. Nec sine justa causa fortassis. Quippe non solum lib. de spiritu^a, qui inter Aristotelicos ambigæ auctoritatis est, diserte ita loquitur: *Ad intestina & ventrem vene & arteria committuntur, quas par est alimentum attrahere à venis in carnes mox distribuendum*: sed loco etiam minime dubio^b, tam venas, quas ab aorta five minore, quam quas à magna, id est, cava in mesenterium deducit, nullo discrimine radices facit, quibus à ventre ad venas cibus deferatur. Quam sententiam prope jam inter mortuam nostro ævo non revocare modo, omnibus ingenii viribus, sed maguo quoque cumulo magnaque accessione augere conatus est Anatomicus aliqui ingeniosissimus, Constantius Varolius^c, qui præcipuum arteriarum istarum munus esse contendit, portionem chyli purissimam exugere ex intestinis, & procreando inde subtiliori & arterioso sanguini ad cor comportare. Nititur his argumentis.

Primum, Nulla alia via pervenire in sinistrum ventriculum, sanguinis hujus officinam, materia giguendo illi sanguini potest, cum nullus in illum à dextro pateat aditus. Secundo, Duæ arteriæ umbilicales in foetu aortam ingrediuntur, quæ sanguinem arterialem comportant ad cor infantis. At in nato, quemadmodum chylus sanguini materno, ita arteriæ mesaraicæ respondent umbilicalibus. Denique, Frustra esset absque hoc usu tanta arteriarum copia frigidis partibus concessa. Poterat his addere ex Gal. experimentum Erasistrati^d, qui in hæcdis lactentibus refertas lacte arterias imi ventris conspexisse sæpius, testatur.

Ego hac in re, ut non difficulter dederim, quod præter Galenum^e Hippocrati quoque visum est, successione ad vacuum concedere tantillum chyli in arterias, ob allatas à Galeno rationes: ita eas ex instituto trahere chylum & corrivare in cor, id vero nullo modo dandum puto. Quis enim unquam credat subtilissimum sanguinem ex rudi, crudo & incocto chylo posse existeri? Quis etiam non videat repugnare è diametro ingressui in cor chyli, valvulas principio aortæ affixas, quæ viam omnem reciprocā ab arteria in cor præcludunt? Quæ utraque ratio nequaquam aut recens aut mea est, sed tum ipsius Hippocr.^f, qui naturam ideo valvas magnæ arteriæ applicuisse scripsit, ne impurum alimentum, quo arteriæ circumfluunt, in cor veheretur, quod purissimo sanguine nutriri oportebat. Quod si illud quærat quispiam, si nec nutrantur eo, quod sic trahunt arteriæ, nec in cor ipsum deferant, quo illud concedat? facile ei Galenus^g responderit, arterias, quemadmodum, cum dilatantur, trahunt quod vicinum est sibi, ita dum contrahuntur, vicissim quod sic traxere, expellere. Quam responsionem, præter alia, vel aër in pulmonem per itata diaholes & systoles intervalla inductus vicissim & redditus, nec absurdo fortassis, nec levissimo indicio confirmet.

Argumenta Varoli leviora sunt, quam ut negocium facessere cuiquam merito debeant. Per

vias inconspicuas & cæcas multa alia, eaque non minus, quam hoc, quod de agimus, miranda moliri naturam, tum exemplis pluribus Galenus^h ostendit, tum Hippocratesⁱ auctoritate, cui totum corpus nostrum *συναντῶν* est *ἡ ἰσχυρὸς*, docemur. Quid igitur prohibet tales quoque è dextro cordis sinu in sinistrum per septum ejus cum Galeno eo eas, quas adducit^k rationes, statueret. Accedit, quod istæ viæ etiam in mortuis, ut alia plurimæ, parum cernuntur, quod in his, ut Galenus ibidem ait, omnia sunt perfrigerata & densata; in vivis tamen, quis præstabit, aut nullas eas esse, aut non manifestas ac patentes? Sed fac esse etiam, nulla sint hæc Gal. in septo cordis foramina, neque sic tamen deerit fortassis alia & commodior via sanguini venoso à dextro in sinistram ventriculū traducendo? Mihi sane nequaquam absurdum videtur, cum sanguinem, qui per venam arteriosam in pulmones è dextro cordis sinu effunditur, ibi assiduo eorum verberare extenuatum cum aëre, altera vitalis spiritus materia, in ventriculum sinistram relabi. quam viam forte nec Galenus ignoravit. Sed hæc examinare fufius non est hujus loci.

Quæ de umbilicalibus arteriis adferuntur, ea nihil prorsus aut veri aut faui habent, & qua affirmantur facilitate, eadem negantur. Nec enim materni sanguinis ullam rationem habere chylus potest, quem concedere in sanguinem demum oportet; nec mesaraicæ arteriæ umbilicalibus ullo modo aut succedunt aut respondent. Quomodo enim succedant sibi respondeantque tam diversi succi, quales sunt chylus & maternus spiritus, ad tam diversum locum, quales sunt pulmo & cordis sinus, delatrices arteriæ? Nam, ut semel rem dicam, ad cordis ventres (quos plane in foetu ociosos esse, & nec pulsare per se, nec ullos spiritus aut sanguinem progignere ostendam, Deo volente, alibi fule) nihil prorsus per arteriam aortam, cui continuæ sunt umbilicales, deferuntur; sed ad pulmones tantum, fabricato eam in rem à natura de industria canali, qui arteriam magnam cum vena arteriosa committit, ne quippiam, quod pulmonibus debebatur, in ventriculos cordis effundatur, ut præclare nos jam olim Galenus^l docuit.

Arteriarum vero illa copia, quæ ultimi argumenti loco erat, cur opus habuerint intestina, jam supra in communi earum usu declaratum est.

De Erasistrati observatione dicam mox loco aptiore. Nunc id satis est nosse, deceptum eum, non arterias, habuisse pro arteriis.

C A P. VII.

Pauca de Nervis Mesaraicis, Eorum Numerus. Magnitudo. Progressus. Insertio. Principium quæ originis, quæ divisionis. Vfus. Laudatus Fallopius. Fernelius reprehensus. Arteriis cur contigui isti nervi.

DE Nervis Mesaraicis pauca dicenda sunt. Quare hoc capite omni eorum negotio defungemur. Multos eos esse, & venis, præcipue autem arteriis adjacere membranæ modo dilatatos, autopsia docet. Sed & exiguos esse, præter Galeni^a auctoritatem, eadem autopsia perspicue ostendit. Constat præterea non secus ac venas & arterias custodiæ causa, inter duas mesenterii tunicas, in intestina quinque propagari (nam duodenum,

a c. 4. alius.

b 4. de part. c. 4.

c l. 3. sua anatomia, c. 4.

d lib. An. sanguis c. 5. & 7. Anat. l. 6. in fin.

e l. de corde.

f lib. jam citato.

g 3. Fac. Nat. l. 3. in fine, & de usu pulm. c. 4. & 5.

h 7. apud i lib. de mensura.

k 3. Fac. Nat. l. 3. c. 17.

l 6. usque & 17. in partibus.

a 5. Anat. adm. 6. s. 1. part. 2. c. 17.

dendum, si quos habet, à nervis habet oris ventriculi inferioris) & singulos singulis revolutionibus inferi.

Principium in iis duplex considerari potest, aliud divisionis, aliud originis. De illo Galenus⁴, & recte, idem sortitus esse cum principio arteriarum & venarum melsaraicarum. *Causa*, inquit, *quia multum ab illo habebat locum aptiorem alium nervus, unde germen, quod ad hepar erat propagandum, tutius emitteretur*. De isto aliquid disputationis est. Galenus simpliciter à sexto nervorum pari deducit. Vesalius⁴, & cum eo Paræus⁴, ac alii plures, paulo distinctius ab iis sexti paris derivant, qui à cervice orti costarum radicibus exporriguntur. Sed recte advertit Fallopius⁵, & ab illis & aliis præterea ejusdem sexti paris, qua ad diaphragma, qua ad ventriculi os superius pertinentibus, auctis tamen in progressu cum ab aliis, tum à lumborum nervis, propagari atque profeminari.

Vius eorum quatenus Mesenterio & intestinis inferuntur, unus & communis est, animale, hoc est, sentientem vim à cerebro manantem iis com-

municare. Qua egere illa & præsertim intestina, quicquid alii dicant, si non exquisita, at multiplicitate, satis illud ostendit, quod excretioni non solum modo, sed etiam totius corporis expurgationi destinata, eo officio fungi nullo modo possent destituta sensus ope atque adminiculo. Et hoc facit, quo minus Fernelius⁶ assentiar, putanti mesenterii inflammationes sine magno dolore consistere, cum solo gravitatis & ponderis aliquo sensu. Profecto enim tanta copia nervorum, qualis ibi est, tam obtusum sensum minime admittit. Qui à lumbis adjunguntur, ii, præter hunc usum particularem, illum quoque præbent, ut lumborum partes eorum beneficio quæ molestia afficiunt sentientes, irritata expultrice ea in intestina ablegant ac tempestive deponant. Arteriis vero contiguos esse eos natura voluit, ut sic contactu earum reddituri calidiores melius illam, quam diximus, vim frigidis & exanguibus partibus communicarent. Atque de tribus Mesaraicarum vasorum generibus vulgo notis, eorumque consideratione hæcenus.

g. 6. Pathol.
log. c. 7.

P A R S S E C U N D A,

D E

Q U A R T O E T N O V O V A S O R V M

M E S A R A I C O R V M G E N E R E.

C A P. V I I I.

Dicendorum propositio, & ordo. Antecepra rei informatio, quæ Ciceroni?



Ræter tria illa vasorum genera Mesenterium peragrantium, quæ ad recensum jam duximus excussimusque, reliquum aliud est genus quartum, novum ac ignotum hæcenus, & à me primo (quod relegata omni ambitione dixerim) ab hinc fere triennium, hoc est anno adeo C I C I C X X I I casu magis (ut verum fatear) quam consilio aut data in id peculiari opera observatum. De hoc, pro eo, ac ab initio constitutum, agendum nobis in præsens est. Ageatur autem quam fieri potest accurate & diligenter, quod & inventi novitas postulat, & vi cogit, quæ novis comitari semper amat, rei ipsius difficultas. Quæ tota ut simul fiat quam planissima, simul via ac ordine procedat, quem ego rerum tractandarum animam usurpare atque appellare soleo, præmittam primum tanquam omnium, quæ disputabuntur deinceps sedem, seminarium ac fundamentum, inventionis illorum historiam, tum modice ea attingam, quæ ad absolutam eorundem perceptionem explicatamque scientiam, & ut Stoicorum verbo utar, comprehensionem oportet habere præcognita & veluti præscita, quod genus περίγνωσις Aristoteles⁷, aut πρόγνωσις dicere consuevit, Cicero⁸ antceptam, sive anticipatam animo rei informationem reddidit. Demum ad illa veniam, quæ Anatomicæ contemplationis con-

siderationisque, sua ac propria rem totam continent, definiunt, & ad scientiam cognitionemque adducunt.

H I S T O R I A V A S O R V M C H Y L L

C A P. I X.

Historia prima vasorum istorum inventionis cum fide narrata. Obiter multa notata ad illa recte sectione perquirendum.

Qvod igitur ad historiam attinet, res hunc in modum acta est. Canem ad diem Julii X X I I I , ejusdem anni bene habitum, beneque pastum incidendum vivum sumperam, amicorum quorundam rogatu, quibus recurrentes nervos videre forte placuerat. Ea nervorum demonstratione perfunctus cum essem, visum est eodem in cane eadem opera diaphragmatis quoque motum observare. Hoc dum conor, & eam in rem abdomen aperio, intestinaque cum ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, eosque tenuissimos candidissimosque, ceu funiculos per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse ratus, non magnopere moratus sum. Sed mox falsum me cognovi, dum nervos, qui ad intestina pertinent, distinctos à funiculis illis & longe diversos esse, ac seorsim præterea ferri animadverti. Quare rei novitate percussus, hæsi aliquandiu tacitus, cum menti varia occurrerent, quæ inter anatomicos versantur, de venis melsaraicis & eorum officio, plenæ non

Ioan. Costum.

Alexander
Tulianus
Senator
Stipend.V. Celsus in
Proemia
Ar-
tu Med.

litium minus, quam verborum controversia. Et forte fortuna congruerat, ut paucis ante diebus, quandam de hoc argumento proprie scriptum, à Ioanne Costeo libellum evolverem. Vt me collegi experiundi causa, adacto acutissimo scalpello unum ex illis, & majorem funiculum pertundo. Vix bene ferieram, & confestim liquorem album lactis aut cremoris instar proflire video. Quo viso, cum tenere latitudinem non possem, conversus ad eos, qui aderant, ALEXANDRUM TADIANUM & SENATOREM SEPTALIUM imprimis, utrumque de amplissimo Medicorum Ordinis Collegio, & cum hac scriberent tuenda publica fanitati Praefectum, *εὐρηκα*, inquam cum Archimede, & simul ad rei tam insolitae tam jucundum spectaculum invito ejus novitate ipsos quoque commotos. Verum eo diu frui non licuit. Expiravit mox inter haec canis, & una (dictu mirum) omnis illa tot vasorum series congerielque defecta candore suo, defecta succo, inter manus ipsas nostras ac pene inter oculos ita evanuit, vix ut vestigia sui relinqueret. Eare permotus, rem iterata sectione experiri statui. Conquisitus ergo canis alius in diem postero, & nulla interposita mora die eodem apertus. Porro minime ut spes, ita successus fuit. Nullum prorsus vel minimum album vasculum, quantacunque etiam diligentia perquirenti, in conspectum se se dabat. Et jam abjici animo ceperam, ac cogitare apud me, ne, quae in caneo illo primo se obtulissent mihi, ex illis essent, quae raro spectari in Anatome solebat Galenus nosse dicere. Verum in memoriam revocans ficum & impactum fuisse canem, quem secundum arripueram, suspicatusque quod res erat, ne intestinorum inanitas, causa fuisset vasorum obliterationis, etiam tertio rem periclitari volui, alio rursus in id comparato cane. Is sectus est ad diem vigesimum sextum, hora circiter sexta postquam cibis illi adhibitus assatum fuerat, & dum ultro satietas caperet. Nihil fecellit expectatio. Omnia quae primus luculenter & adamussim exhibuit, nisi quod citius etiam, quam in illo, ac vivo dum, & candor vasorum obsolevit, & ipsa obscurata sunt. Confirmatus gemino hoc experimento, & nihil amplius de re ipsa ambigens, totum me dedi ad perquirendam eam, percipiendamque accuratius. In quam curam ita incubui, nulla ut temere hebdomada, certe nullus mensis abierit sine viva una aut altera sectione. Nec vero in canibus tantum, in brutis plurimis aliis factum periculum, in felibus, in agnis, qua lactentibus adhuc, qua herbam jam pascentibus. In vaccis praeterea & porcis, aliisque veritas exquisita. Quin equus etiam huic uni rei emptus & vivus exenteratus. Hominem vivum, quod tamen Erasistratus olim & Herophilus non timere, non incidi (fateor) nec incidam, qui nefas & piandum morte cum Celfo existimo, praesidem salutis humanae artem, pestem alicui, eamque atrocissimam inferre. Ita nihilominus, idque pro certo statuo, quae in tot brutis visa mihi sunt, iis fieri nullo modo posse, unus & solus homo ut deficiatur. Quis enim unquam credat in re tam necessaria plus de bestis, quam hominibus naturam, communem omnium parentem, laborasse, & illis matrem, nobis novercam fuisse? In iis, quae incidere licuit, nunquam spes mihi impoluit. In

cunctis recte antea passis & convenienti à pastu hora apertis perpetuo vasa ista inveni, si non in mesenterio aut intestinis, at in pancreate saltem, & qua venae portae illa sociantur. Clarissime autem semper in iis mesenteris conspexi, quae adeps nullus obfarcit, qualia canum sunt, & felium & agnorum, atque equorum etiam. Nam in ceteris, quae adipe circumfluant, saepius illo, ut sub quo fere delitescunt, divulso tantisper diltraçtoque, dum compareant, opus est. Tam in his vero, quam in reliquis, quae praeterea digna memoria alia, ut fit, ex aliis usu ac tractatione observata mihi sunt, ea suis in locis posterius reddentur. Hic enim brevem solummodo inventionis istorum vasorum historiam dare libuit, quam verissimam esse testes dare locupletissimos possum, & vero do quotquot fecant adfuere. Adficere autem plures semper, ac saepius viri graves cumprimis, & cum cetera: omnis eruditionis commendatione ac gloria, tum Medicinae laude praestantes. Inter eos, quod gloriari liceat, cujus solum nudumque nomen ut ad veram omnem laudem, ita ad fidem omnem abunde esse potest, LUDOVICUS SEPTALIUS, Medicorum aevi nostri absque controversia Princeps: & quem libenter ei jungo, ANDREAS TREVISIUS, Serenissimae Infantis Archiater, nominis fama & doctrinae abundantia nulli clarissimorum Medicorum secundus. Nunquam autem non adfuit, quem paulo ante nominavi, & nunc honoris causa iterum nomino, SENATOR SEPTALIUS, non paternis magis quam suis artibus clarior. Cui accessit postea in pari assiduitate ac animadversione QUIRINUS CNOGERUS AUSTRIUS, domesticus meus multis mihi nominibus carissimus, & nulli per Italiam celebriorum in literis & omni scientiarum genere virorum ignotus.

PRÆNOSCENDA DE HIS VASIS.

CAP. X.

Prænoscenda ad absolutam horum vasorum perceptionem. Ea duo esse in re presenti, non plura. Notionem nominis, & eorum unæquæ. Προγνώσκεις ad verum scientiam necessitas. Προληψίς non est vox Epicuro propria. τὸ ἐν potestate est tota scientia.

Plurimum passim Aristoteles τῇ προγνώσει five τῇ προληψί (nec enim, ut Cicero* putat, primo Epicuro hoc nominis debemus) idque merito suo tribuit. Etsi enim nullam scientiae partem per se illa facit, nec in ejus nomen venit, tantam vim tamen habet & tanti momenti est, ut cum omnis ab illa ceu à fonte scientia manet, tum sine illa nulla, ne inchoata quidem & rudis possit existeret. Πάντα διδασκαλία καὶ πᾶσι μάθησι διδασκόντων ἐν προγνώσει γίνεται γνῶσις, Omnis doctrina & omnis disciplina didactica fit ex antecedente cognitione, ait Aristoteles*. Quin Cicero* longius etiam proventus, Sine ea (προληψί) inquit, nec intelligi quicquam, nec queri, nec disputari potest. Haec vero tanta cum sit ejus necessitas, tanta vis ac potestas, ne nobis quidem in re ista novorum vasorum, quae veluti materia ad cognoscendum nobis proponuntur, infuper habenda est.

Verfabitur haec in duobus tota, in explicanda evolventique nominis ipsorum notione, tum monstranda

In quibus
plura
sunt
vasa
184.Eustochius
SeptaliusSenator
praelatusQuirinus
Cnogerus
Austriusa 1 de
Deor.b 1 de
t. 1.
c 1 de
Deor.

stranda testificandaque τῇ ὑμῶν, quam existentiam melioris nos vocis inopia cogit appellare. Est enim præter rem & materiam scientiæ subjectam (τὴν ὑποκείμενον οὐσίαν), ea quoque quæ illi attribuantur (τὰ πρὸς αὐτὴν) & principia præterea, quorum vi & efficientia hæc de illo concluduntur (τὰ ἀξιωματικά) prænotasse necesse est, tamen postiora duo, quod nihil habeant in re præsentī nostra vel præcipuum, vel indigens propriæ animadversionis, ea malumus παραρῶν & præterire cum Aristotele, & cogitatione ac animo fumere, quam verbo & voce ponere, hoc est, frustra in nobis notis & per vulgatis tempus conterere.

Duo autem solum de primo prænotenda proponimus, quod præter summam, quam habent necessitatem, & præcipuum, quam adferunt utilitatem, omnis de re quacunque scientiæ subjecta prænotio, duobus illis absolvitur & continetur. Ita Aristoteles^b, *In omni re, que ad cognoscendum subjicitur, & quod sit* (τὸ τί ἐστι), seu ut alibi ἐστὶν & quid significet (τί σημαίνει) seu τί ἐστὶ τὸ λεγόμενον) præcipere animo & anticipare oportet; quorum illud ad τὴν ὑμῶν, hoc ad nominis notionem refertur. Iam Plato^c verba de re nova, & sensibus antehac incomperita facturum, ne ferendum quidem censuit, nisi prius & esse eam doceret, & suo ac certo nomine appellaret. Nec Galenus noster dissentit, furere eos dicere^d solitus, qui aut nominis omīssa notatione, aut non firmiter præcepto τὸ τί ἐστι, ad reliquum cognitionis ordinem aggredi auderent. Nec injuria id. Nam & à nominis notatione non parum sapie in rei ipsius notitiam provehimur: & τὸ τί ἐστι omnis cognitionis primum, ac principium^e est; hoc est, ut placet principibus Philosophorum totum ipsum^f potestate, vel dimidium saltem rotius, aut etiam plus^g dimidio. Sed rem ipsam videamus, ab informatione seu appellatione nominis exoriri.

C A P. XI.

Data his vasis sua nomina. Eadem explicata, & stabilita consensu qua veterum, quarecentiorum. Novis rebus nova nomina quos modis poni possint. Vena alba Celsi. Vena lactea Arabum. Rhasis rejectus. Vena verbum bonis & antiquis auctoribus latissime patet. Ejus etymon. Lactes vox in rebus diversissimis usurpata ævo qua prisco, qua nostro. In eam rem compluscula adnotata. Plinii vulgata lectio defensa contra Dalechampium. Persio, & Horatio lux. Laporum lactes apud Lampridium. Ex Hippocrate Probi locus declaratus. Lactium Etymon non unum. Cicero obiter correctus. Scaliger laudatus. Gaza præter morem suum à Plinio dissidet.

N Ovis rebus nova ponere nomina & licuit semper, & vero plane necessarium est. Id vero cum fieri posset modis imprimis tribus^a, ut aut ipsi nova inauditaque condamus; aut ea ex jam conditis, quæ nativæ^b Cicero vocat, transferamus reperimusve derivatu, flexu, adjunctione; aut denique à re simili mutuemur. Postremus modus quod nobis ponere aliqua, ut cum Quintilianus^c loquar, quod prisca illi ac rudes homines fecerunt, non perinde fas est, absque omni controversia, cum melior est cæteris, tum securior. Hunc igitur sequutus ego vasa hæc aut lacteas, sive al-

bas venas, aut lactes etiam appellare soleo, nihil impediturus inter m, si quis commodius nomen invenerit.

Appello venas albas, & lacteas. Si enim Celsus^d Veteres, hoc est, urinæ vasa, sive quod non ru-berent, nigricarent ut venæ cæteræ, sive quod succum albo proximum veherent venas albas appellare licuit; si^e Arabibus, si auctori^f de Anativorum, venam, quam vulgo ad portam dicunt, in qua ne vestigium quidem ullius alboris unquam cernitur, lacteam venam vocare concessum fuit, eo solum, quod sibi persuaderent, lacteam succum è ventriculo allicere; non video, cur nostris his, quæ & verissime al bent sive candent potius & succum continent per omnia lacti simillimum, impertire hoc nomen nequeamus? Nequaquam enim Rhasis^g assentior, qui à venarum genere ac appellatione omnes rejicit ac excludit, quæ aut sanguine non circumfluunt, aut de Iecoris gibbo originem non capiunt. A substantia, structura, compositione, non ab eo quod continet, cuiusque partis ratio petenda est. At hæc in nostris his venis omnia cum venis cæteris ita similia sunt, ut eadem possis dicere, si per se ipsas spectes sine succo, quem gerunt inclusum. Ut taceam interim, quod non secus ac illæ, motu, quo attollunt se subinde & submitunt arteriæ, sunt destitutæ. Non ea religio veteres in usu hujus nominis habuit, Hippocratem^h, Platonemⁱ, Aristotelem^k, qui venarum vocabulo arterias etiam ipsas complexi sunt ausi: non item alios notæ optimæ auctores, qui & venam genitalem^l dixere, & venas^m arborum, venas aquar, auri, & argenti, venas denique ingeniiⁿ venas cuiusque generis hominum, ætatis, ordinis, & quas non? Adde quod nec τρομαυ huic significationi repugnat. Ex eo quippe dictam venam Grammatici volunt, quod quippiam per eam veniat, sive quod via^o quædam sit, per quam aliquid commeat. Græci^p Φλέβα vocant τὸν τὸν Φλέβων, quod est redundare re aliqua, seu plenum esse. Nec enim quicquam horum est, quod non in nostras quoque apte cadat & conveniat.

Lactium non idem est apud veteres & recentiores significatum. Veteres dupliciter fere usurpant. Plerique & majoris nominis auctores, pro intestinis gracilibus capiunt. Sic Plinius^q, *Aventriculo lactes in homine & ove, per quas labitur chylus, in cæteris ile.* Quo loco, ut obiter id notem, dupliciter errat Dalechampius^r, & quod idem esse lactes ac pantes contendit (qua in re panticum, etsi diverso à Dalechampiono modo, Scaliger quoque ipse falsus est, vix alias aut falli solitus, aut fallere) & quod è textu Pliniano expungit tanquam glossema, verba illa *in homine & ove*. Sic Plautus^s, *fic Titinius* Plauto antiquior agninas lactes dixere: & de homine idem Plautus^t, *Venio laxus lactibus*: ac Pomponius^u, *Oro te Basse per lactes tuas.* Glossæ veteres, Lactes *λακτὰ ἐν τῇ ἐντρίψει*, id est, *tenuia intestina hædorum*. Neque aliud Persius^v voluit, cum lactes unctas, id est, pingues dixit. Quo respexit & Horatius fortassis^w illo versu,

Ut canis à corio nunquam abstergebitur unctio.

Nam corium, *διεμα* Græce, capi pro omni corpore membraneo, satis ex^x Aristotele mihi acceptum est, qui venarum tunicam hac ipsa causa coreaceam appellavit.

a in Medico-
galydo.
b id.
c in Vita
Vitelii.

d notio ad
Plen. 11. c. 37.

e in aph. 18.

f 1. Hist. 16.
3 Hist. 4.4.
de part. 4.
g 1. 11. Anat.
c. 6.
h 1. 1. Anat.
8.
i 1. 1. c. 7.
k Com. 3. in
Mithrid.

l 1. Suppl.
c. 1.

m 11. Nat.
Hist. 1. 1. 1.
etiam per quos
labitur cibum.

Sunt alii veterum, qui audacioris significato, fed-
tandem nostris quoque temporibus plerisque lin-
guis familiari, pro eo succo accipiunt, quem per-
similem lacti in piscium marium ventriculis cer-
nimus, quemque genitalem succum seu rorem ap-
pellare possumus, imo debemus. In hunc sensum
apud Lampridium * Laporum (ineptiant hic, qui
Lupos quadrupedes somniant, λαβρογαστρος intelli-
git, quos nos Varolos dicimus) & apud * eundem,
ac praterea apud * Suetonium Murænarum lactes
legimus, quo loci sermo illi est de Vitellii pati-
na, patinarum maxima omnium quot fuerunt un-
quam, sunt, aut erunt, ut ille ait. Addit his duo-
bus significatis * Hermolaus, usurpari interdum
eisdem veteribus pro locis, *qua sub umbilico sunt in
lateribus pubetentis, delicata adeo, ut ferre plagam ne-
queant.* Atque hujus rei Probum laudat auctorem.
Sed ego apud Probum locum istum adhuc quero.
Quod si est etiam, nihil tamen me movet, qui jam
olim ex Hippocrate * didici, eam esse gracilium
intestinelorum conditionem, ut omnis in illis *24. se-
nari* sit *γυναικώδης*, id est, lethalis. Hæc igitur Pro-
bus intellexerit, pro ipsis, loco, quo jacent, per
Metonymiam, descripto.

Iam recentiores multo etiam magis sunt in re
hac Lactium, quam veteres varii. Alii Mesente-
rium esse Lactes volunt, quorum princeps Gaza
est, qui ubicunque apud Arist. *ἡ μεσεντερία* legitur,
Lactes interpretatur. Columbus sic * appellat,
quod Græcis *παγκρεας* est, sive *καλιδίον*. Carolus
* Stephanus glandulas, quæ passim Mesente-
rium interfingunt, hoc nomine afficit. Qui * idem
tamen, & cum eo * Carpus, vulgares Mesaraicas
ita nominari volunt, & sunt fortassis, qui alia quo-
que omnia sentiant.

Nos in ista tot significationum varietate ita cen-
semus inter cætera, ad nullam rem aptius nomen
hoc, quam ad venas nostras accommodari. Quid
mirum autem, cum infinitæ sint res, ut ait Aristote-
les *, finita vero nomina, si unum nomen ad plu-
ra significanda transferatur? Cur vero ita sentiam,
duo imprimis faciunt, Etymon, id est, notatio hu-
jus nominis, quam Etymologiam quoque & inter-
pretationem usurpamus; Cicero verbiloquium
vocat (quod male vulgo veriloquium legunt.) De-
inde veterum in appellandis hoc verbo intestinis
gracilibus institutum, consilium atque ratio.

De Etymo. Volunt alii à labendo sic dictas,
quod per eas chylus labatur, quæ notio vocis Plin-
io * videtur placuisse. Alii à lacte deducunt, cu-
jus similitudinem gerant in candore, mollietate &
pinguitudine. Quidam, & meo sensu rectissime,
ab exoleto verbo lacio, quod idem est ac allicio,
derivant. Nulla harum est interpretationum, quæ
in nostras istas venas non adamussim quadret ac
expetat. Nam verissime, ut suo loco constabit,
chylus per eas labitur; verissime idem ex intestinis
ab iis lacitur, hoc est, sorbetur exhauriturque; de-
nique, non lac ipsum magis simile lacti est, quam
liquor, qui in illis cernitur. Iam veteres quis non
facile existimet notissimo loquendi modo usos,
quo quod continet, pro eo quod continetur, vul-
go usurpamus, non alia causa magis donasse hoc
nomine intestina gracilia, quam quod conferta
illa lactescentibus istis venis, ignotis sibi, viderent
in agnis præsertim & hoedus, per quorum intestina

ea copia ac ubertate conspiciuntur fusæ ac propa-
gatæ, ut tota non nisi ex lactei cuiusdam roris
velut aspergine consistere videantur. Vnde non
leviter meo quidem animo, etiam alio quam nos sen-
su, maximus & admirabilissimus * Scaliger primum
in agnitis positum hoc nomen suspicatur, & inde
ad hominem opinione quadam similitudinis, ut
solet, tractatum. De recentioribus non est quod
multum laboremus. Nihil nostræ sententiæ offi-
ciunt, & facile adigi ad concordiam possunt. Qui
enim vulgares Mesaraicas Lactes appellant, etiam
non ferendum errant errorem, ut dicetur suo &
proprio loco ac tempore, hoc ipso tamen pro no-
bis sunt. Nimirum enim ideo sic vocandas put-
ant, quod allicere in sese ab intestinis chylum sibi
persuadent. At qui eo ipso ostendunt, in nostras
venas, quæ vere id muneris obeunt, & non in alias
hoc nomen quam apte cadat & conveniat. Co-
lumbo vero ac Stephano facile largiemur, dici
Lactes posse quæ illi volunt hæctenus, si qua usos
veteres diximus, eadem dicendi figura se ipsi quo-
que uti fateantur. Nam & glandulæ Mesenterii, &
inprimis Pancreas, adeo Lactibus nostris scætant,
ut vel levissimo tractatu compressæque digitorum
magnam in vivis animalibus lactei liquoris copiam
velut imbre profundant. Atque eadem inter-
pretationis benignitate Gaza quoque attolli po-
test, cum Lactibus nostris Mesenterium nihilo quam
Pancreas minus, fors magis etiam abundet. Quan-
quam ille fortassis non debuit à Plinio suo hic dis-
cedere, quem sibi in aliis veluti Cynosuram, quam
sequeretur, constituerat. Nam quod Hermolaus
in ejus excusationem adfert, Metonymia abusum
continentis pro eo, quod continetur, nihil est.
Nec enim in Mesenterio, sed à Mesenterio intesti-
na continentur. Sed de nomine tantum est.

C A P. XII.

*Quæstio de vasorum nostrorum existentia. Primum,
vere sint nec ne? Esse, monstratum fide sensus, &
conclusum ratione. Sensuum veritas & evidentia præ
omni ratione est. In eam rem Aristotelis & Galeni tes-
timonia. Anatomicus non nisi oculis suis credere debet.*

Post explanatam enodatamque rationem no-
minis, restat ea videamus, quæ ad *τὸ ἐν* five ad
τὴν ὁμαλὴν, id est, existentiam attinent. De ea
perquirenda nobis duo sunt. Primum, *vere ne de-
tur, & constat in re quantum hoc vasorum genus?* Alter-
um, *si deur, vetus inventum sit, an novum?* Diver-
sa hæc sunt, & genere à se disjuncta. Nec enim
aut ex illo hoc efficitur, ut scilicet, si sint, etiam
nota antiquioribus Medicis fuerint: aut vicissim
ex hoc illud concluditur, ut non sint, si fuerint
ignota.

Primum horum minime difficilem habet ex-
plicatum, & abunde jam Historiæ fide probatum
* est. Sensu enim eget, ut Aristoteles * loquitur,
qui id negat, & haud scio an poena etiam. Docet
oculorum fides atque consuetudo plurimas (Vide
fig. 1, 2, 3, B.) per omnem Mesenterii, abusus
centro ejus, regionem, dispergi ramulos candenti-
um vasorum, inde in intestina deferri, ad ipsa scin-
di in propagines pene infinitas, his propaginibus
undique intestina ambiri ac comprehendendi. Docet
eadem manifeste distingui, dispararique à vasorum
reliquo-

* apud
in 1. Hist.

* (sup. e.)
in 1. Hist.

reliquorum singulis; cavitate, à nervis; tenuitate tunicarum, ab arteriis; à venis, candore; ab omnibus simul, tum succo, quem includunt, qui in nervis nullus, in venis & arteriis tota substantia & colore dispar est, tum locis per quae feruntur. Ut enim saepe tria illa comitantur, attiguius aut contigua, ita non raro ab iis incedunt seorsim, & sola. (fig. 1, 2, 3, litera E.) Denique unum argumentum rem omnem conficit; VENI, VIDE: quae duo in similitudine, hoc est, novo invento sic olim Galenus^a iussit. Quicumque vult operum naturae esse contemplator, cum propriis oculis credere oportet, & aut ad nos accedere, aut cum aliquo eorum, qui nobiscum versati sunt, versari, aut ipsum per se diligenter exercitari anatomis manu obsequenda.

Quid referemus^b enim, quod nobis sensibus ipsis

Certum esse queat, quæ vera & falsa notamus:

Qui nisi sint veri, ratio quoque claudicat omnis.

Invaluetudo quædam mentis est, inquit Aristoteles^c, reputata sensuum auctoritate, ac constantia rationem requirere. Et alibi^d; Sensui magis, quam rationi standum est: rationi haecenus fidendum, si qua demonstrantur, cum iis consentiant, quæ nobis sunt à sensu indita & impressa. Atque hæc Aristoteles. Quid Galenus

noster^e? Ille vero multo etiam luculentius. Nec enim id solum, quod Aristoteles dicit^f, quam longissime prævertere rationis fidei, sensuum evidentiam: sed

illa præterea plane insignia^g; Qui sensibus antefert rationem, eos omni ad demonstrandum principio de-

fici^h, nullam habere posse ullius magnarum artium scientiam, risum ac ludibrium omnibus debereⁱ. quid multa? stupidos esse^j, ἀνασώφους, & Sophistas^k, hoc est, homines ex fraudibus & fallaciis compositos. Et estne aliquid his amplius? Est vero. Plus quam

extreme insanire atque vaticinari. Quin in re ipsa nostra^l, ludicium, inquit, circa venarum sectionem non

est demonstrationis, sed sensus.

Quod si omnino ratione tamen agendum sit, hæc unica instar omnium fuerit. Necessarium est hoc vasorum genus præter reliqua. Est igitur. Consecutio clara & notissima. Nec enim in necessariis deficere natura potest, quæ utilitatem omnium opportunitatunque provida affatim, etiam in minus necessariis, quibus est opus suppediat. Quod præsumitur, id vero vincit consequens omnis disputatio. Ita facile & brevi de primo confecta res est.

C A P. XIII.

Quæstio alterum, Novum inventum sint, necne? Re-
cte vidisse veteres alia chylo; alia sanguini deberi va-
sa; illa tamen ignorasse. Erassistratum novisse, nec
agnovisse. Hippocrates, Plato, Aristoteles, Stoici, He-
rophilius, ipse Galenus, varie illustrati, & explicati.
Item Pollux, Rhafis, quidam recentiores.

MAjoris operæ & negotii videri potest, de quo secundo loco quæsitum est. Quis enim facile credat tam expositam sensui rem, tam obviam, ita omnibus ante hunc diem, tanquam se-
pulta in tenebris esset, latuisse? Accedit, quod in hoc genere, & in hoc negotio ac pulvere nostro nihil frequentius, quam pessimo more & exem-
plo, novare de veteribus. Quod utinam paucioribus, quam expedit exemplis testatum possit fieri. Hæc tamen nihil moratus, ita breviter de re

hac tota censeo. Non fuisse quidem veteres, vasa alia chylo, alia & diversa sanguini continendo, deferendoque debere: Ceterum, vera ipsa chyli vasa, hoc est, nostras venas esse vixas quibusdam eorum, neminem tamen unquam agnovisse. Quæ à me una comprehensione, semel & generatim dicta, sigillatim & per partes plana sic facio.

Quod sua quædam & propria chylo vasa tribuerint veteres, docet primum omnium Hippocrates, sive quisquis est, auctor lib. de Humana natura^a. Is enim postquam venas omnes, quas crassas appellat, in quatuor diduxisset paria, earum denique omnem divisionem distributionemque per corpus abfolvisset, diserte, quod ipse quoque Galenus in comm. animadvertit, præter eas, alias reperiri dicit, ad deferendum & ventriculo alimentum comparatas. Et eadem habentur lib. de ossium natura^b, quem Hippocrati omnes attribuant tanquam genuinum. Et possunt non dissimilia ex lib. de morbo sacro, & de loc. in hom. colligi.

Sequitur Hippocratem Plato. Quidni? imitator ejus si quis alius, modò Galeno^c credamus, & perpetuus inventorum omnium æmulus^d, ac confector. Quid igitur ille? Eadem. Audi hæc ejus de Timæo^e ἐν τῷ πρῶτῳ κεφάλαιῳ, τὸ ἀναπνεύοντες ἰδ-
οντες, τὸ πῦρ καὶ τὸς ζυμωμένον ἐπιταί, διακορμίζοντες δὲ αἷα,
αἷα δὲ καὶ κελύδας ἐκτελὲν τὰ σπύα καὶ πηλὰ λάβουσι, τῆς δὲ
δύ. καὶ κατὰ σπινθὴρα διαρῶν, αἷα δὲ ἐξήδων, ἥπερ παρὲν-
εία, αἷαρον, οὗον ὅτι κρήνης ἐπὶ οὐχέως ὅτι πᾶς φλέως
αἰλῶν αἰτῆ, πέν ὡσπερ αἰλῶν, αἷα δὲ σπινθῶν, τὰ
φλέων πᾶσι πινυμένα. Quando enim expirante & res-
pirante halitu, ignis simul interior sequitur, per ventrem
diffusus poculenta & esculenta offendit, liquefacit proxi-
mus ista, partitur in minima, per exitus, quæ progressio
patet, tanquam ex fonte quodam educit, in meatui (ὡς-
τὴς, id est, rivus) venarum trajicit quacunque exhausta,
atque per corpus quasi vallem, venarum fluentia deducta.
Vides manifeste exitus, per quos traducitur cibus
ut è fonte, ex alvo in rivus venarum, à rivis ipsis,
id est venis, per quos, ut per canales in totum corpus
confluit, distinctos.

Atqui idem multo clarius alio mox eodem in Timæo^f loco repetit, quo à rivis alimenti per totum corpus pertinentibus (ὡς πᾶσι τοῖς vocat) distinguit, dividitque non jam exitus (ἐξόδους) sed venas expletas iis, quæ è ventre efferuntur.

Platoni Aristotelem jungere libet, magistro discipulum. Ipse quoque consentit, & Mesenterii seu chyli venas palam à venis sanguinis separat ac fecernit. Tendunt^g, inquit, ab intestinis in venam magnam & aortam. Ecce tendunt in illas, non sunt ab illis. Rursus: Per eas in venas è ventre tanquam per radices pervadit alimentum. Non potuit apertius. Ait tanquam radices cibum de ventre ad venas deferre, ab his porro venis cibum illum in alimentum, id est sanguinem mutari, & in omnes totius partes ad eas nutriendum dispergi ac dissipari.

Eadem quæ Hippocratis, Platonis, & Aristote-
lis, Stoicorum quoque apud Ciceronem^h fuit sen-
tentia. Quadruplices enim illi alimenti vias facie-
bant, prorsus inter se distinctas; alias à medio in-
testino (sic Mesenterium Cicero vocat) ad portas
jecoris ductas directasque, per quas permanet fucus
à reliquo cibo in ventre ac intestinis secretus:
alias inde pertinentes, per quas cadat cibus à je-
core delapsus: alias, per quas versus in sanguinem
ad partes

a. sect. 2. ejus-
lib. 10. 6.

b. 2. 1. p. 6. 8.
c. lib. cetera
lib. 10. 6.

d. in edit. Ser-
rani com. 3.
fol. 78. m. 15.
com. in Ti-
mæo 16.

e. apud Ser-
ran. fol. 80.

f. 2. de Nat.
Diet.

ad partes easdem jecoris vicissim confluat, & in cavam venam confundatur: postremas denique, ipsam venam cavam, per quam ad cor perlatus idem sanguis in totum corpus ei nutriendo dividatur. Vbi notandum illud in primis est, priores illas vias ne venarum quidem nomine eos dignatos.

Iam Herophilus^a antiquus medicus, (& qui tantum Gal.^b in Anatome tribuit, ut ad exquisitissimam ejus cognitionem pervenisse dicat; quemque Tertullianus^c, ut hominis naturam cognosceret, septingenta cadavera incidisse scriptum reliquit,) duplex in Mesenterio venarum genus, ut supra etiam diximus, constituit, alias tendentes versus jecoris portas, cujus manus sint; alias proprias intestinis ipsis alendis, haud quaquam ad hepar trajicientes, sed in glandulosa quædam corpora finientes.

Cum quo è recentiorum numero multis, Vassero, Paræo, aliis, ac forte Galeno ipsi convenit. Quin affirmat idem Galenus^d, suo quoque tempore non defuisse qui mirarentur, si audirent per quas venas prius distributio ad hepar facta esset, per easdem rursus benignum sanguinem recurrere. Atque ad hos omnes aggregari possunt, quotquot vulgatas Mesaraicas soli ducendo comportandoque ad hepar chylo dicatas contendunt. E quorum numero inter Græcos Pollux est^e, qui Mesenterium definit *ὁ μὲν τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐν τῇ κοιλίᾳ, ἢ ἰνὴν, ἢ ἰσθμὸν*, id est, *membranam cibum transmittentem ad hepar*: inter Arabes Rhafis^f, qui ea ipsa causa, ne venas quidem esse concedit, sed canales tantum nominat: inter recentiores Theophilus Protospatharius^g, Stephanus^h, Benedictusⁱ, & alii plures apud Costæum^k, Laurentium^l, Mercatum^m.

Iam vero, quod secundo loco dixi, neminem horum agnovisse vera chyli vasa, hoc est, venas nostras, id multo facilius etiam ad probandum est. Constat siquidem ex iis quæ dicta sunt, plerosque eorum à vasis communibus illa sua derivare. Hippocratem à vena cava, Aristotelem ab eadem & præterea ab aorta: Herophilum, Rhafin, & qui cum eo sunt, ab ea, quæ ad portas dicitur; alios ut Stoicos, et si sui generis ductus, five vias constituere videntur, quales tamen sint, aut quæ iis origo, ne verbo quidem attingere. Quo ita explicato, ruat necesse est eorum opinio, qui saltem Rhafi non ignota fuisse existimant, eo quod à venarum numero illas, quæ chylo operantur, excludunt. Certissimum enim est, quas à venarum genere rejecit, eas non alias fuisse, quam quæ ad portas veteribus fuerunt indigittæ. Quæ Rhafis sententia præter alia, hoc vel maximo urgetur incommodo, quod semel constituto, soli chylo ferendo vacare portæ venas, nullo modo doceri potest, quibus venis intestinorum & aliorum, quæ iis vicina sunt, viscerum nutritioni succurratur, cum à cava nullas prorsus pertinere ad illa vincat autopsia. Quæ autem de Lactea Arabum vena quidam adferunt, scire licet, neque illam à portæ venis aliam fuisse ab ipsis habitam, qui Lacteam non alia causa dixere, quam quod, falsa quadam veri opinione, lacteum è ventriculo ac intestinis ad se pellicere succum sunt arbitrati.

Denique nec minus verum illud est, quod addidi, visa quibusdam eorum fuisse, nec tamen cognita. Erasistratum enim & ejus affectas intelligo,

quem vidisse nostras venas, & suis ostendisse, ex duobus Galeni locis manifestum mihi est; quorum alter libro an sanguisⁿ, alter inde. Anatom. adm.^o legitur. Ex utroque enim liquet, ad probandum solum Spiritum in arteriis attingeri, confluere autem post sanguinem vel aliam naturam quancunque, experimento hoc Anatomico usum esse, quod in hædis nuper lactatis, si venter inus & interior membrana dividantur, initio simul scilicet ac nudatum mesenterium fuerit, arteriæ depresso, id est, *aeræ*, mox plenæ lacte conspiciantur. Vidit igitur omnino Lactea hæc vasa, nec agnovit tamen, quippe quæ pro arteriis, deceptus veri quadam inani similitudine, habuerit. Ex quibus omnibus satis opinor patet, ignorata fuisse hæcenus vasa, quæ primi invenisse profitemur.

C A P. XIV.

Ex occasione quasiuncula duæ. Prima: Quæ causa sit tandem latuerit? Triplicem videri. Excusati veteres, non Galenus, qui videtur nasse omnino debuisse. Secunda: Cur ita repente obliterantur & exolefiant. Post plures causas allatas, res in medio relinca.

Videri jam poterat ad exitum Prænotionis omnine negotium perductum, nisi velut in limite occurrerent, quæ sisterent adhuc & morarentur. Quærent enim plerique, Quæ fieri tandem posuerit, ut tandem latuerit vasorum istud genus, veteribus præsertim; eo usque in scitionibus deducit, nihil ut ad diligentiam nobis fecisse reliqui videantur? Hæc quaestio omnino amolenda est, cum præsertim comitem aliam trahat longe obscurissimam & maxime arduam, Quonam modo tam repente vasa illa exolefiant & obliterentur.

I. Igitur ignorationis veterum causam si quis petat, eam ego puto non difficulter ex Aristotele^x posse colligi, bonorum omnium nobis auctore, ut de Hippocrate dicebat Galenus. Hic enim perquirens, cur venarum ratio, natura & origo ita philosophorum veterum cognitionem fugisset? causam inter cæteras reddit, quod in jugulatis animalibus examen earum instituerint. In his enim, inquit, quod effuso sanguine languescant & collabantur, natura principaliorum venarum abolita, pleraque occurrant & obscurari necesse est. Quare ipse in strangulationis potius perpendendas explorandasque præcipit. Simile quid nos dicere possumus, evenisse illis, de quibus agimus, ignoracionem hanc, quod non in vivis, sed demortuis animalibus anatomes suas instituerint, in quibus has venas experientia docet ita confestim vanescere, ut omnem aspectum etiam attentissimum fallant atque effugiant. Potest etiam fieri ut viva secuerint, sed non suo tempore aut scilicet absoluta jam perfecta, aut nedum tentata inchoataque chyli distributione atque ad hepar appulsu. Forte illud quoque iis imposuerit, quod me quoque primo intuitu induxit, quod nervorum implicationes arbitrati sunt, quæ erant Lactium. Quæ causa (aut ego vehementer decipior) recentiorum quibusdam fraudi fuit, qui nescio miram quam in Mesenterio ac intestinis congeriem, & tantum non infinitatem plurimorum eorumque insignium nervorum vidisse autumant; cum Galenus^y vix exiguis, imo plane exiguis eis tribuat.

Ac pro aliis quidem hæc dici possunt. De Galeno

a. a. 16. p. 10.

b. lib. de diff.

c. com. de an.

d. 4. n. p. 19.

e. in Onom.

f. 1. ad Al.

g. 1. ad Al.

h. 1. ad Al.

i. 1. ad Al.

k. 1. ad Al.

l. 1. ad Al.

m. 1. ad Al.

n. 1. ad Al.

o. 1. ad Al.

p. 1. ad Al.

q. 1. ad Al.

r. 1. ad Al.

s. 1. ad Al.

t. 1. ad Al.

u. 1. ad Al.

v. 1. ad Al.

w. 1. ad Al.

x. 1. ad Al.

y. 1. ad Al.

leno autem quid cogitem, prorsus ignoro. Qui enim sectiones vivas amplius sexcentas dederit, ut ipse quidem gloriatur, & plurima animalia à pascu tam sæpe incidit, ei fieri posse putandum est, ut nunquam sese venæ illæ in conspectum dederint? ut nunquam eas obvias habuerit, imo nunquam pervestigarit, cum præsertim exquirendæ totius rei maximam illi causam Erasistratus, de quo supra, præbuisset? Contra quem ita frigide ille disputat ac perplexe, ut judicare vix possis, quid ajat negat, & detrahe illi quod in experimentum fumit, an abnuat? Certe quidem nihil adfert, quo merito illum convincat. Id quod facile viderit, quicumque locum illum rotam sedendo, quod ajunt, perlegerit expenderitque. In promptu enim est, & à quolibet inspicere potest. At facillima ei palma erat futura, si exploratæ ipsi venæ illæ fuissent, quas perperam arteriarum in loco Erasistratus habuerat.

II. Cur vero in mortuis, aut morientibus etiam, ita repente exhausti, qui in eis est, succo obliterentur vena istæ, ac sensum exolescentes destituant, quemadmodum supra in exemplo canis dixi? Id in iis, qui fato suo aut vi morbi pereant, non magnopere fortassis mirandum sit, quod in illis constet gestiones omnes functionesque nutriendi animæ, quæ naturales medicis dicuntur, & inter quas nec minima illa chyli est coactio ac distributio, exoleat; jacent, & cum ipsis veluti emoriuntur. At cur idem iis quoque usui veniat, qui vel sectione viva citra morbum, vel alias violente occumbunt, ejus rei rationem malim ab alio quovis discere, quam ipse temere quicquam tam obscura in re decernere. Est enim, ut de rebus cæteris plerisque, ita de hac longe verissimum illud Cottæ apud Cicero-nem, multo esse facilius dicere quid non sentias, aut quare falsum sit quippiam, quam quid sentias, aut quare verum aliquid putes. I. Suspensus sum aliquando eo istud evenire, quod lacteo illo humore in auras mox abeunte sui tenuitate, dissipatoque concidant, collabanturque perexiles venulæ, & ita sensum frustrentur. Quam in sententiam ideo veneram, quod legisse apud Galenum memineram, roris tenuissimi instar rapi in Mesaricas, quidquid esset in omni chylo subtilissimum. Sed coegit me res ipsa mutare sententiam. Cum enim periclitandi gratia, perrupta cultello una ex majoribus illis venis, liquorem, quinde promanarat, in cochleare collegissem, animadverti non horas modo, sed diem etiam solito cum candore durasse. II. Quare alio animum divisi, & cogitare coepi, ne ideo forsitan id fieret, quod, qui in venis illis stabulatur succus, is ad hepar mox diriperetur, tractu illius valido, five etiam impulsu venarum, tum violento præterea motu, quo tunc animal agitur, novus vero alius nullus in locum ejus reponeretur, & sic venis perexiguus periret, quod videndas antea præstitisset. III. Alius quidam, nec indoctus & mihi peramicus existimavit simile quid esse hic ei, quod pulmonibus quoque videmus usui venire. Nam & illos, quo ad vita steterit, plurimo sanguine circumfluere; mortuo animali, omni repente defici, vanescente illo, velut in spongia, in visceris raritatis. Etenim & Mesenterium, inquebat ille, rarissimæ texturæ est (unde Mesaricæ quoque nomen Galeno auctore invenit

& glandulæ, quæ plurimæ in eo cernuntur, facile possunt diditum in venas succum in sese combere, quo illæ privatæ, necessario se sui tenuitate sensui subducant.

Quas sententias proponere volui, non quod probarem omnino, sed ut sic, dato veluti signo aut posita in medio palma, quod ajunt, meliores aliorum elicerem,

„—functus vice cordis, acutum

„Reddere quæ ferrum valet, exors ipsa secandi.

Sed de prænotendis ad horum vasorum Anatomiam perceptionem, quæ dicenda erant, hunc habeant terminum.

ANATOME HORVM VASORVM.

CAP. XV.

Transitum ad ea, quæ Anatomies propria. Quid ea nobis? Tribus eam rebus absolvi. Quarum prima historia partium. Quæ quatuor quævis in parte perpendit. Aristoteles in his omnibus Galeno quævis in partibus.

Ultima nos ad se vocat laboris nostri pars, sed præcipua & longe maxima, vasorum nostrorum Anatomie. Intelligo autem Anatomem, non quod nomen prima ipsa sui notione præfert, artificiosam partium corporis nostri sectionem: sed illud, cui præcipue significando Sapientum consilio, traductum paululum immutatumque à nativo suo significato, positum datumque est; habitum puta, seu scientiam, si ita mavis, quæ sectione adjuncta quicquid proprie inest in quaque parte, eamque complet & absolvit, via ac ratione perquirat, aperit, explicat. Sunt ea, quæ in parte quavis ita spectantur, tria omnino, et si paucis plane aut, si verum amamus, nemini adhuc observata satis & perspecta. Ex his primum Structura est, quæ condita pars quæque seu fabricata conspiciuntur: eam Galenus sectionem, Aristoteles Historiam, Cicero partis descriptionem appellat: alterum, Actio seu functio gestiove, quæ ea ex se promittit: postremum usus, quem ad rite obeundum affert. Horum enim trium notitia Galenus omnem, ut ipse loquitur, naturæ membri ipsiusque peritiam definit. Nec in omni Aristotelis de animalibus tam varia & multiplex disputatione, quicquam reperire est, quod non ad horum trium aliquod referatur. Videamus breviter in re nostra præsentem singula, & ante omnia Historiam.

Huic enim principem esse præ reliquis locum, idem Galenus ex eo docet, quod vel functionem ipsa ostendit, vel ratiocinationes ad ejus inventionem exhibet. Et idem quoque Aristoteles sentit, cujus hæc sunt: Præcedere oportere, si methodo tractande sint partes animalium, historiam singularum. Hinc enim patere quibus de rebus, & ex quibus effici demonstrationes debeant. Et alibi: Debere Physicum, non secus ac Astronomum, primum ea intueri, quæ apparent in animalium genere, partesque singulas explorare; deinde vero quamobrem ita hæc sint, causas reddere. Explicat autem Historia ex eodem Galeno naturam membri. Natura autem intelligitur, cum hæc quatuor perspecta fuerint, id est, Substantia partis (quam & substantiæ proprietatem appellat;) Temperies ejusdem; Quæ temperies consequuntur; Quæ accidunt, id est, Conformatio, Magnitudo, Nu-

Cc

merus,

Hærat. in

Lacte

a. ad Glau.
L. 1. de loc.
aff. 1.
b. lib. de hist.
anim.
c. 1. de Nat.
Deor.
d. ubi supra.

e. lib. hist. de
anim. de par-
tibus, anim.
de gener.

f. 1. de loc. 1.
8. Anat.
adm. 1.
g. 1. hist. 6.

h. 1. de par. 1.

i. 1. ad Glau.
1.
k. 9. Anat.
adm. 1. 1. de
loc. 1.
l. 4. de par. 12.
6. de plac. 8.
1. Fac. Nat. 6.
3. de Symp.
caus. 1.
m. 1. de p. 9.

merus, & Situs. Quæ omnia nos quoque singillatim in his venis nostris perpendemus.

L A C T I V M,

seu

V E N A R V M L A C T E A R V M

Historia, sive Fabrica & Structura.

C A P. XVI.

Perpenditur horum vasorum Substantia: Sunt è genere venarum. Sunt partes compositæ & dissimilares, non similes & simplices. De Galeni & Aristotelis hac in re sententia cum cura inquisitum. Tuschit, Sylvio, Fallopius explorat. Partes componentes venam tres, Membrana, Fibra, Caro. Aristoteles iterum explicatus, notatus Capivaccius, rursus Fallopius, & cum eo Vesalius.

Substantia horum vasorum absque controversia venæ est, seu venosa, ut Anatomici loqui malunt (tab. 1, 2, 3, B. 4. N.) Cum venis enim & structuram & cætera, unum succum si demas qui per eas perlabitur, habere eadem jam supra diximus. Illud hic quæstionem habet diu jactatam illam quidem, nunquam tamen satis explicatam. Substantia ista simplex sit & uniusmodi tota, an composita & diversis è partibus concreta? Ego posterius amplector, qui diu jam (nihil moratus quædam Galeni in contrarium loca, quibus non ex suo, sed veterum sensu agere eum perspicue ostendit loquendi modus & forma, qua plerisque eorum utitur, Similes dicuntur, similes appellantur, &c.) omnem venam, ut alibi docui pluribus, dissimilarem eodem cum Galeno statuo. Qui primum compositis manifeste annumerat, & partes etiam quæ componentur, recenset. Deinde organa corporis humani passim appellat; imo & organicas partes (ne quis argutari cum Fuchio, Sylvio possit aliud esse organum, aliud organum præparatum.) Sunt autem opposita & adversa plane parti similari, & simplici non magis composita, quam organum, ac organum & præparatum: & ex Aristotele, omne organum etiam dissimilare est ac compositum, & vicissim. Quod totidem verbis quoad compositionem etiam Galenus affirmat. Tercio ea illis tribuit, quæ non possunt tribui, nisi parti dissimilari ac compositæ; cuiusmodi sunt, edere perfectam functionem; tentari per se morbis in compositione, figura, meatibus: tenere suam figuram & magnitudinem etiam extra omnem compositionem.

Quibus addi potest coronidis loco, ratio nunquam soluta, nunquam solvenda, & quam effugere conati sunt multi nullus effugit. Non qualibet pars vena est vena nomine ac definitione. Ergo dissimilari pars vena est & composita. Hæc enim ipsissima est dissimilari partis apud Aristotelem, & Galenum definitio. Nam quod post omnes responder Fallopius, esse quamlibet partem venæ venam, si venam sumas pro substantia venosa, ex qua formatur organum, non si pro organo ex eo formato, id est, sanguinis conceptaculo, id vero vanissimum commentum est, neque huius fieri debet & τὸ ἀκρίβως ἀποκρίνεται, digitorum crepitus.

Primum hæc ipsa substantia & natura venæ est, esse organum distribuendi sanguinis, vel esse san-

guinis conceptaculum. Deinde substantia, ex qua constat vena organum, nequaquam vena est, sed venæ materia. Quomodo igitur dicitur, pars ejus quælibet vena? Sed nimirum faciendum, quod Chirurgo Fallopio fuit, ut in desperato ulcere regeter linteo, quæ sanare non possit.

Porro, cum partes dissimilares dupliciter ita dicantur ex Aristotele, vel causa solius figuræ, et si una sola constent parte similari (quo modo alibi idem Aristoteles figuram securis aitiplam esse securis substantiam; vel præterea ratione substantiæ ex pluribus similibus conditæ. Venæ nostræ, ut & cæteræ, utroque modo dissimilares sunt. Nam & figura sua ac propria sunt præditæ, quod nemo negat; & præterea ex pluribus similibus constat; habentur Automes, hoc est, ipsius sensus testimonio. Sunt autem partes istæ: venam componentes tres omnino; fibra, membrana, & super istas caro.

Membrana una iis & simplex est, qualis reliquis etiam venis ad arteriarum discrimen. Vna dico, si eam spectes, quæ ipsi peculiaris est ac propria. Nam qua extra hepar feruntur per Mesenterium ad intestina, aliam insuper ab eodem Mesenterio sibi adsciscunt, non secus ac Mesaraica vulgaris. Atque huc Aristoteles opinor respexit, cum venam dixit membrana & cute constare; intellecta membranæ nomine exteriori hac, cutis, interiori & propria. Sed & Galenus notat Anatomicos veteres interiorem & peculiarem membranam venæ tunicam propriam, exteriorem hanc & quæ istam ambit, membranam simpliciter nuncupasse. Capivaccius existimat adsciscit hanc membranam Galenum spectasse, cum partem dissimilarem venam appellavit. Qua in re quantum ratio illam fugerit, & quam longe à Galeni mente abierit ex jam dictis planum est.

Fibras intelligimus, non quales in animalium quorundam sanguine reperiuntur, quas Aristoteles describit, & post eum Galenus etiam proponit: sed quas in genere substantiæ partium similium idem Galenus connumerat, ex semine primum constitutas. Has venis omnibus negare videtur Fallopius, & ei, quod mireris, suffragatur tandem Vesalius, is qui in magno suo opere non solum eas descripsit quam accuratissime, sed etiam pictura expressit. Quorum rationes ad recensumducemus, cum agemus de venarum nostrarum usu. Eo enim pertineat. Nos ut in cæteris venis omnibus cum Galeno, ita in his quoque agnoscimus; easque omnium generum, rectas, transversas, obliquas, omnes in una illa venæ propria tunica, perquam tenui licet & subtili collocatas, seu ut Galenus loquitur, araneosis quibusdam extensionibus aptas inter se & nexas, ita tamen, ut rectis & transversis oblique sint pauciores.

Caro fibris circumjecta est, & tunica seu membrana adnascitur, quæque inter illa sunt spacia, implet & infarcit. Est autem caro hæc ex eo carnis genere, quod inominatum Galenus dicit, & è quo singularum particularum substantiæ moles completur, quæ & perire & regigni potest.

C A P. XVII.

Explicata Temperies, & quæ eam consequuntur. Iouber-
tus obiter perscriptus. Galenus explicatus.

IN explicanda venarum nostrarum Temperie nihil est cur multi simus. Abique dubio frigida sunt (docet id earum color, de quo mox: docet expers sanguinis omnis natura, & præter ac ante hæc omnia, prima ex femine constitutio. Quippe frigida pars omnis *æquevalens*), quicquid turbet Ioubertus, & qui ab eo sunt. Qua de re alibi Deo præsentem) & quidem venis vulgaris frigidiore; quod illæ contactu sanguinis, qui chylo citra controuersiam calidior est, incalescunt, & tantum non ad medium temperamenti statum ^a veniunt. Id quod Galenus ^b sibi voluit, cum venam cute calidiorē dixit, quem locum frustra vexant, quibus id unum propositum, ne quicquam sani unquam Galenus dixisse videatur. Sunt etiam sicca, sed hæcenus, ut quanto, recte Galeno ^c, venæ vulgaræ arteriis, tanto prope venis ipsis sicca sint minus. Si tamen inter se comparantur partes, ex quibus componuntur, membrana, fibra, & caro, frigidiore duæ priores, calidior caro censenda fuerit.

Consequitur hanc Temperiem primum albor, qui etiam remoto ab eis succo, major est quam in venis cæteris. Sunt enim venæ omnes exanguæ & albæ, quemadmodum cunctæ partes, quibus ex femine est origo. Sequitur item materiæ naturæque tenuitas ac subtilitas ubique insignis illa quidem, sed in hepatis ipso viscere multo etiam insignior. Comitantur præterea teneritas, leuitas, raritas hæcenus, ut quanto vena portæ, cava, tanto venis mesaraicis; quæ à porta communiter dicta derivantur, laxiores, rariore, leuiore videantur. Nec plura hic observare est, & horum ipsorum pleraque ad ea, quæ accidunt, referri quoque possunt.

C A P. XVIII.

Ex iis, quæ accidunt examinata I. Conformatio.

II. Magnitudo: est si minores portæ ramis, apparent tamen plenius. III. Numerus. Valvule in his vasis. Pro Columbo adversus Archangelum strenue propugnatum, cum cautione tamen addita.

IN iis, quæ accidunt cuique parti, prima occurrit Conformatio, quæ in Figura, Asperitate & Lævitate, demum in Cavis & Meatibus cernitur.

I. Figura venæ hæ nostræ tereti sunt & oblonga (tab. 1, 2, 3, 4.) communi ipsis cum venis cæteris & arteriis etiam.

Sunt præterea Læves in extima superficie præferta. Nam interior ob fibrarum, quem diximus, implexum textumque ad inæquabilitatem quandam & tanquam asperitatem accedere videtur non contemnendo usu, ut suo loco aperiemus.

Cavæ quoque sunt & meatus suos habent atque canales in fistulæ modum (cum qua non in-
epte comparari possunt,) est per angustos, præ-
cipue qua ad intestina pertinent & per hepar in-
cendunt. In his illud admiratione dignum, quod plu-
ribus valvulis sive ostioliis interfecti sunt sive in-
terfici, quas ego valvulas sæpius vanescente jam

chylo, instar minutissimorum veluti marisupio-
rum, aut concretarum guttularum stillarumve de-
pendere ex illis, non modo qua committuntur in-
testinis, sed etiam in reliquo ductu animadverti.
Quæ res facit, ut quas extrema ora unicuique me-
saraicarum alterius & vulgati generis, qua in in-
testina finiunt, Columbus ^a apposuit, rejiciendas
temere nequaquam existimem: hæc tamen inter
utrasque constituta dissimilitudine & differentia,
ut illæ Columbi foris intro ferantur, nostræ con-
tra intus foras spectent. In qua sententia eo con-
firmor magis, quo acrius illas & validius oppugna-
ri ab Archangelo ^b intelligo. Ait enim ille. In pun-
ctum venæ illæ definunt. Puncto autem, quæ val-
vula adfigi potest? Addit, si dentur hæ valvulæ,
fore ut nec sanguis ad alenda intestina egredi è ve-
nis illis possit, nec depurgari per illas, & depleri
noxii humoribus corpus. Tandem, cur non sunt,
inquit, additæ venis etiam partium singularum, ne
semel haustum alimentum remeet ab illis & re-
fundatur? Nihil proflus, si quid ego modo judico,
hæc argumenta conficiunt. Folia farfari, ait ille.

Primum, quæro ego ex Archangelo, si in punctum
finiunt illæ venæ, quomodo cavæ sunt? quomodo
chylum accipiunt? Si hæc possunt, imo si hæc ha-
bent, quid impedit habere etiam valvulam? Quod
secundo loco contradicit, Columbum quidem re-
cte premit, qui & ferre ab intestinis venas illas, &
ad eadem deferre existimat. Nobis nihil negotii
exhibet, qui solum posterius illis tribuimus. Sic
enim recte simul sanguis & humoris recrementa
transponi per eas in intestina possunt, & valvula
tamen foris intro spectante arceri, ne regredian-
tur aut regurgitent. Nec tertia ratio melior est,
deterior etiam, & ἀδύνατον καὶ ὁλὴ, male coheren-
tia nescit. Primum enim quis certiores nos fecit
illarum partium venulis valvulas nullas adesse?
Quin tu Archangele, gallinæ fili albæ, cui obire
plusquam lynceis oculis, quæcunque vis quavis ho-
ra licet, id protinus nos doces. Deinde scit natu-
ra, etsi à nullo docta & artificiose tamen ambulans,
quibus locis opus sit appositis valvulis, quibus non.
Denique per fidem tuam, quid iis Archangele tibi
usus est, qui partes omnes nutriris vis τῆ ἀσπιδοῦς.
Possent dici plura. Sed ἐν ἧς τὸ τῶς ἐν ἧς τῶ δό-
γων λῆαν ἐξελάν, stultum est stultas opiniones admo-
dum agitare. & vere Galenus ^d, τὰ ἐξ ἧς τῶς ἡλίσθια
καὶ φρονέοντες μάλλον, ἢ ἐλάνχοντες προσηλόν, extreme
solida contemnere magis, quam refutare expedit.

II. Quoad quantitatem perpetuæ & sibi con-
tinentes sunt omnes, nihil usquam abjunctum in
iis aut deijunctum. Nempe omnes partes sunt
trunci unius, non secus ac venæ alteræ & etiam
arteriæ, ut jam olim Aristoteles ^e advertit. Magni-
tudinem tamen æqualem non habent, aliis majo-
ribus, aliis minoribus (tab. 2, 3, B, 4, N.) ut solet.
Si tamen cum iis compares, quæ à porta, sive trun-
cum, sive ramos spectes, non parum ab illis ma-
gnitudine vincuntur.

Illud observabile, quod etsi minores, in intesti-
nis tamen longe plenius, quam illæ apparent (ibid.
G, H.) Quod ego puto in chyli sive copiam, qua
turgent, sive potius candorem referendum. Est
enim candidi sive albi inprimis, visum commove-
re ac percutere. Copiam autem illam simul cum
candore sæpe observavi plurimum augeri, utrin-
que

que intestinis, dum chylo adhuc tument, sursum deorsum compressis. Duplo enim fere quam antea & majores sic & candidiores cernebantur.

III. Ut vero magnitudine facile superantur à vulgatis, ita vicissim numero non parum illas excedunt, adeo ut prope altero tanto plures videantur. Quippe non solum eas comitantur, ubicunque sunt: sed pluribus locis, ubi illarum nulla cernitur, spatiis intermediis (tab. 1, 2, 3, B,) ipsæ nihilominus, & copiosis furculis veluti fruticant.

C A P. XIX.

Dictum distincte de harum venarum situ (anastomosis) Considerata illarum tum Pectus (Hæm.) tum communio cum partibus cæteris (anastomosis). In hac seorsum. Origo, Finis, Insertio, Progressus. An portis forata? Videri. Nontamen anastomosis cum arteriis. Principium jecori, an Pancreati debeant? An venæ sint sui generis? Iugis jejuni intestini inanitatis vera causa. Galenus hic refutatus, & ex occasione Fallopius, Crusta intestinorum. Ventrículos his venis caret.

Itus nomine (anastomosis Græce) duo Galenus ^a complectitur: Hæm., quam cum Cicerone ^b positionem, seu positum cum Cello (Gellius ^c posituram dicere ausus est;) & anastomosis, quam communionem seu communitatem reddere possumus.

Positionem simpliciter si spectes, in ventre inferiori (quemadmodum ipsa quoque quæ à portis jecoris nomen invenit) venæ istæ sitæ sunt, ita ut nullibi illas extra eum, sicut nec eas, quæ à porta proficiscuntur, sit invenire. Sin compares ad Mesaraicas vulgares, sic quemadmodum arteriæ magis quam illæ, quod majoris sint momenti; ita, eadem causa, istæ magis quam vasa nostra in profundo sunt abdita. Vnde non paucis locis videntur transcendere vulgatas, & super illas incedere, (tab. 1, 2, 3, B.) An vero quod de vulgatis Galenus, jungi eas per poros, quos vocant, arteriis, ut spiritu ab iis augeantur, id in has quoque nostras conveniat, ejus nihil adhuc observavi. Putem tamen, saltem qua junctam cum arteriis ferri videntur, eorum participes, aut potius non expertes, quod rei natura postulare illos videatur. Occultas autem illas anastomosis cum arteriis, quas idem Galenus suis venis tribuit, & quorum beneficio fieri ait, ut ab illis in has sanguis transfumatur, ac ultro citroque commeat, in nostris non agnosco, solo albo humore semper confertis.

Communio tria comprehendit, principium, finem, & intermedium utrinque ab illo ad hunc progressum. Cum triplici enim partium genere intercedere communio & consociatio parti cuilibet potest; cum iis, à quibus ducit originem; cum iis, in quas finit; cum iis, per quas progreditur.

De Origine horum vasorum (intelligo autem semper originem seu dispensationis, seu eam quam Hippocrates de alim. appellat radicationis, *πύξιν*) nihil quod firmiter adhuc dicam, habeo, nisi illud generatim, ibi necessario esse hoc originis principium, ubi truncus sit, five earum stipes aut caudex. At hic ubi sit loci, mihi adhuc incompertum est, etsi ut comperire possem nihil non haudenus feci. Possit quis non inepte fortassis à Pancreate earum originem petere, quod ibi in unum

omnes coire, indeque tum deorsum, tum sursum ad hepar porrigi appareant (tab. 1, & 2, C.) Maxima sane glandula est Pancreas, & colore istis venis, haut ab simili. Tum venæ ipsæ hæc, nescio quid ibi habent præcipui propriæque, miris anfractibus, gyris, flexibus toto ejus corpore intextæ, & quibusdam veluti five cancellis five reticulis, ut in transfennis solet, aliæ in alias impeditæ ac implicatæ, quemadmodum plenius mox dicetur. Adde, quod majoris momenti est, duos ramos, interdum plures, qui ab illo seorsum ad ipsum usque hepatis fissum ascendunt (tab. 2, M, N,) in nullum unum, qui mihi quidem cognitus adhuc sit, coalescentes. In contrarium tamen facit, quod omnino videntur in jecoris gratiam extitisse; cujus manus sunt, ut de suis Mesaraicis Galenus dicebat, cui h. s. denique materiam subministrant ab eo in omne corpus dividendam, non secus ac in fœtu vena umbilicalis, quam constat plane jecoris esse germen & propaginem. Sed hæc in medio relinquuntur.

Faciliori negotio, ni fallor, illud expediri potest, quo quaritur; An, posito, originem à jecore ducere, sui generis venæ sint an portæ quadam *anastomosis* five *anastomosis*, ad eum modum, quo umbilicalis ex veriori sententia. Omnino enim rectius est prius, sui generis esse venas. Nam & cum porta, utrinque latera ejus stipantes, à Pancreate ad hepatis finem usque diversæ semper & distinctæ ab ejus trunco incedunt (tab. 3, & 4, M, N;) & inde in hepar receptæ, per ejus carnes, nullo profusus cum eadem porta commercio, nulla confusione, dissipantur absumenturque (tab. 4, N, O,) ut in equi jocinore non obscure observare memini.

Finis horum vasorum ibi est, ubi & insertio. Inferuntur in omnia intestina, etiam duodenum, ad discrimen vulgatarum, nulla interim penitus ex eis vel minima ad ventriculum delata. Plurimæ in gracilia insunt, præsertim in jejunum, quod hilam five hiram Varronem dixisse existimant. Quæ præter succi in eo tenuitatem, nondum (ut in fluxus sui principio) spissati satis coactique, una & vera causa est, cur id vacuum semper cibo & inane dissecantibus offeratur. Nam quam aliam ^a proponunt, jecoris viciniam, ea quem locum habere possit, nullus video. Ut enim loco vicinum ei jecur sit, nihil tamen ab eo, ut nec à cæteris intestinis nisi per Mesenterium & quæ in eo sunt, Lactes potest accipere. At hæc, si non longiori, pari utique ac gracilium cæterorum tractu diffite sunt ab hepate & remote. Quid quod æque aut magis etiam propinquum est hepati duodenum, in quo tamen inanitas illa nequaquam cernitur. Qui vero acumen quoque & acrimoniam affluens in intestini ejus tunicam bilis, incitantem ad ea excernenda, quæ in ipsum illabuntur, pro causa advocant, minus etiam ferendi sunt. Nec enim unquam, nisi perfecta prorsus chyli distributione, cum scilicet depellendæ detergendæque cibi reliquæ sunt, in intestina bilis excidit, dum incorrupta sanitæ corpus est, nec à statu suo motum. In quo hic perpetuus est ordo, ut primum percoquatur in chylum cibis, mox dividatur in hepar, ibi verat in sanguinem secretus ab excrementis, demum sanguis per univærsum corpus didatur, & in suum locum excrementa quæque decedant.

Atque

a de diff.
part. 1.
de ss. m.
aff. 1.
b 3 de Nat.
Dier.
c lib. 9.
d 4. Noct.
Actu. 1.

e Gal. 16. ut
part. 11.

f de diff.
cæter. 1.

g 16. ut par
11. & 12.

i 4. de
Lutina

k Gal.
part. 3.

l Gal.
part. 1.

RV.

Progreſſus earum, quantum mihi cognoscere datum fuit hæcenus, hic eſt. Ab inteſtiniſ (hunc enim progrefſum fumo, ut mihi notiorẽ) per Meſenterium (*tab. 1, 2,*) obliquo ductu inter duas ejus tunicas, partim ſeorfum à vaſis reliquis, partim cum illis una, modo recto ductu, modo eadem tranſcendentes & veluti decuſſantes, per plures glandulas in diremptuſ ramoruſ præſertim collocatas, in Pancreas uſque perferuntur. In Pancreate varie cancelloruſ (*tab. 1, & 2, L,*) in modum, vel ſi ita mavis, ſpecie reſtium aut capreoloruſ implexæ ſibi mutuo & corpore conſuſæ, in plurimoſ illoſque inexplicabiles gyros anfracuſque hac illac, fere ut in labyrinthis aut mæandriſ intorquentur. Ab eo rurſuſ majoribuſ jam ramis per portæ latera, quam quibuſdam locis corollæ iſtaſ, ſive annuli incingunt (*tab. 3, R,*) ambiuntque, miſſis quandoque etiam ad cavam propaginibuſ (*tab. 3, M,*) in jecoriſ caſa ſubent. Inde illatæ in hepar ipſum, & diſciſſæ in minutiffimaſ fibras, veluti quedam capillamenta (*tab. 4, M, O,*) in ejuſ carneſ quaquaverſum tandiu diſperguntur diſſeminanturque, dum proſuſ obliterentur. Atque hæc quidem hiſtoriæ & deſcriptio haruſ partium eſt.

C A P. XX.

est ipsa profectio, non ab alio: (id enim vere agere dicitur, quod ex se ipso motum^o obtinet) cæterum non id solum, sed cum hoc addito, ut sit naturæ conjuncta, quod vulgo dicunt esse secundum naturam. Quæ enim talis non est, ut immo-
doratus artieriarum motus, quem pulsuum vocant, vitiosus crurum incessus, & similia, affectio magis quam actio^o censenda est. De hac diligenter cum primis agendum nobis. Vt enim recte Galeus
in essentiam cunctislibi instrumenti deducimus, non tam
ex fabrica, quam ex actione. Et sine actione, inquit
Aristoteles^h, nulla pars recte definitur. Unde quæ
actione privata est pars, nisi quævis^o pars non
appellatur. Iam cum duplex actio^o partium sit,
una communis omnibus, quæ & principalis dicitur,
& prima, & per se actio, Nutritio puta, quæ
sibi ipsi pars quæque^o consiliat, familiaria attra-
hendo adjuccendoque, alienta pellendo & abjicien-
do: altera propria^o instrumentorum, quam se-
cundariam vocant & consequentem, quasi quæ
ad illam primam accedat^o, ad totius utilitatem
comparata; nobis utique, qui venas has in instru-
mentorum numero collocaverimus, utraq; exa-
minanda est.

C A P. XXI.

*De actione Lactium communis, quæ Nutritio est. Non ali-
eus chylo, sed sanguine. Galeni in declaranda nutritio-
ne ventriculi & intestinorum magna inconstantia, &
quæ frustra excutitur. Recentiores qui chylo volunt ali-
um, cum suis ratiocinationibus expoliti. Nutritio perfecta, imper-
fecta, & solvens, saturatus quid? Massa, & Archangelus notati. Magni cuiusdam Anatomici novum in-
venium examinatum. Qui sanguis aliat, qui non? quis
ille, qui ultimum alimentum Aristoteli? Molesta fam-
ina, quæ mox ab ingestis cibo desinat? Ventriculus quo-
modo fibi laborat, quomodo partibus aliis.*

Ali Lactes sive Lacteas nostras, quæ prima est
& communis omnium partium functio, nemo
opinor in dubium revocaverit, oculorum fidem ac
veritatem secutus.

Vivunt nimirum, vigentque vasa omnia animalis naturæ. Quod autem vivit, id omne etiam alitur, imo quia alitur, ideo vivit nunquam, nisi alatur, victurum, ut rectissime negaverit Aristote-

a de ref. r. 17.

les*, quicquam à nutritione vitam interesse, aut si quid interfuit, illud totum non in re magis, quam in verbo & cogitatione seu ἐν τῷ λόγῳ esse positum. Hoc igitur cum certum ratumque sit, nec controversiam habet ullam, nec eget disputatione longiori: quemadmodum nec illud, alias præterea omnes functiones edere, quæ nutritioni continentes ac continuæ nec separari ab illa possunt, & naturam ejus omnem absolunt; cujusmodi sunt alimentum in se prolicere, idem arcere, & continere; quod ejus purum probumque est, sibi adjungere; quod huic diversum ac contrarium prius secernere, mox etiam excernere.

Illud in quæstione esse potest. Quod sit istud, quo alentur, cibuse, seu, ut vulgo loqui amant, chylus, an sanguis, an utrumque? Si enim verum habet, ventriculū & intestina, quod in coquendo chylō digerendoque occupantur, chylō quoque naturæ lege atque ordine semper, sanguine vero non nisi per longiores inedias ali atque educari; eadem utique harum partium ratio fuerit, ut quæ ipsæ quoque chylī procuratori sunt addictæ. At enim chylō, quo diximus modo, nutrirī ventriculū & intestina, ita certum acceptumque est Galeno, ut prodigia videri simile queat, esse qui aliter pronunciare audeant. Pluribus locis^b, & quidem totidem verbis, id affirmat. Nec momentum habet, quod regerunt quidam & contra disputant, nequaquam quod nos, sed id tantum velle Galenū, δὲ λαύω, id est, voluptatis quendam levem nec duraturum fructum ex chylō capere, quod, inquirunt, vetus interpret volupitari interpretatus est, Archangelus^c imperfecte, Massa^d secundario nutrirī. ἀδὲν ὄντος, nihil sanum. Fracta vitæ, & somniorum interpretamenta.

Primum quæro, quemadmodum appellant imperfectam nutritionem & secundariam, an ut passim dicimus esse puerum imperfectum hominem; & rei magnitudinem, figuram, intervallum, alia his similia, secundo loco seu ut ipsi, secundario videntibus nobis percipi. At sic nihil minus quam quæ volunt, effecerint, ut scilicet vere & proprie nutritio non sit illa ex chylō Galenica δὲ λαύω. Quin vera maxime & germana prorsus ita fuerit, non secus quam & puer verus est ac germanus homo; & vere ac proprie rei magnitudo & cætera, quæ diximus, aspectu oculorum accipiuntur. At enim non hoc inquirunt, volumus, quod tu insimulas; aliud est, quod intelligimus. Quin mittunt igitur ænigmata & humane, hoc est, plane & aperte loquantur, nosque participes faciunt suæ sapientię? Quo (malum!) griphi & scrupi in re clara? Non omnes Hortensij sumus, aut sphingem domi habemus, & inique injurius est, ait ille^e, qui suæ intelligentiæ interpretari alios æquum censet.

Iam de δὲ λαύω quæ jactant, Cui non notus Hyalus? Esi enim voluptas interdum, seu voluptaria oblectatio, subiecta notio huic verbo est, non minus tamen & sapius nutritionem, eamque veram & perfectam significat, Medicis præsertim & Philosophis, in his Hippocrati, Aristoteli, Theophrasto, Alexandro & aliis. Quorum in hanc rem testimonia & auctoritates quamvis magno numero & vero adferri possent, si id opera sit precium. Non est. Abunde ipse, quid velit sibi Galenus aperit nobis, si nostri modo juris, nec opinionibus

mancipati sumus, qui ea omnia isti ex chylō δὲ λαύω tribuit, quæ nisi in exactam & absolutam omnibus numeris nutritionem convenire nullo modo possunt. Ait, saturari ventriculū chylō. Ait, sua ipsius causa cibum suscipere^f, ut eo tum fruatur, tum suppleat, quod sibi desit. Ait, Constringi ad cibos ventrem^g, ut accommodatum sibi ex iis alimentum eliciat. Ait, trahere & retinere, ut ejus, quod in^h qualitate conveniens consentiensque sibi est, aliquam partem capiat. Ait, quod in cibo optimum est, id halitus specie paulatim in se allicere, sugendo in tunicas suas reponereⁱ, iis adjungere, agglutinare, denique assimilare^j. Nihil potuit clarius, nihil explicatius. Non urgeo verba toties inculcata iterataque, nutrimenti, alimenti, ejus quod in qualitate conveniens est, quæ ut extorqueri nulla ratione possint, torquent tamen possunt. Illud petere libet à Medicis istis δὲ λαύω, nutritionem qui tandem definiant? Nulla re alia puto, si Galenū modo suum audire volent, quam vel ejus^m, quod nutrit ad id, quod nutritur assimilatione: vel ejus quod evacuaturⁿ, repletionē. Illius enim ista sunt. At utrumque horum, ut perspicuum ex dictis est, τῇ δὲ λαύω idem tribuit, & quod repletur per eam, quod decessit parti, & quod simile eidem reddat, quod ex chylō accessit. Peto amplius saturari quid esse putent? Idem ait Galenus^o, quod apponi & affigi. Recte. Iam vero appositio & quæ huic naturæ lege semper comitatur, five affixio five agglutinatio quid sunt? Naturæ opera, respondet idem Galenus^p, assimilationi proxima, hoc est ejusmodi, quæ perpetuo cum ordine & modo natura agit, excipit ea, quæ genuina est nutritioni, assimiliatio. At enim apponi chylum ventriculo & intestinis, affigi item & agglutinari pertendit Galenus. Quidni igitur assimilatur quoque? & si hoc, quidni nutriat? Rursus igitur vera & perfecta nutritio erit δὲ λαύω.

Ita brevi & evidenter de Galeni sententia, simul tota nutritionis ventriculi & intestinorum conclusas atque ratio est; simul patet, nihil in δὲ λαύω voce aut arguitur aut effugij esse loci.

Quid tu igitur, inquiet aliquis, ita sentis? Ego vero alia omnia, & hac sententia nihil esse vanius, nihil levius. An ergo ad Aristotelem abeo & Galenū ut clamant illi, prodo? Ne id quidem. (Esi quæ proditio esse potest, duos armatos cum videas^q, si ad fortiorem confugas?) Galenū hac quoque de re fumo judicem, ad ipsum provoco, sed ut anus illa à Rege^r Philippo, à dormiente ad vigilantem, hoc est, rectius alibi, ut solet, nec parum sæpe, & ad rationis præscriptum cum Aristotele philosophantem. Cum eo doceo, ut ceteras omnes partes, ita ventriculū quoque & intestina, & quod consequens his est, Laticas nostras non nisi sanguine ali, educari, sustentari. Si enim aliter est, & si chylō naturæ perpetuo instituto ventriculus & intestina aluntur, quid est ὁ Galene (liceat enim mihi tuis^s verbis convenire, & tanquam in re præsentī tecum agere) quid est, inquam, quod alibi Aristotelem laudas, qui sanguinem^t dixerit verum commune ultimum partium omnium alimentum, & totius corporis^u materiam? quid quod ipse tu toties, sine ulla exceptione repetis, & ferri describique in omnes animalis partes ex jecore^v sanguinem, & ex eo sic descripto divisique, suam & propriam nutrimentum^w singulis accedere? quod hepar principium

b de atra bile e. 7. G. A. m. p. 19. 3. Fac. Nat. 13. m.

c lef. 1. 6. l. 1. d. An. 1. 14.

e P. uoc.

f 3. Fac. m. 12. 13. de plac. 82. op. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

g 3. Fac. m. 12. 13. de plac. 82. op. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

h 3. Fac. m. 12. 13. de plac. 82. op. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

i 3. Fac. m. 12. 13. de plac. 82. op. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

j 3. Fac. m. 12. 13. de plac. 82. op. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

k 3. Fac. m. 12. 13. de plac. 82. op. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

l 3. Fac. m. 12. 13. de plac. 82. op. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

m 3. Fac. m. 12. 13. de plac. 82. op. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

n 3. Fac. m. 12. 13. de plac. 82. op. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

loc. x. nutritientis facultatis constituitur quod sanguinis trans-
 mutationem eam, quae simpliciter optima est, ipsam partium
 animalis nutritionem definitis quod sanguine animalis omnes partes & conditus primitus docet, &
 idem non negas, quod dicitur Philosophus, ipsam alii nos,
 quibus compagis nostra prima origo debetur? Rursus si
 ali chylus ulla partium potest, quo ista pertinent
 tua, nihil nutrire posse, ne vinum quidem, etsi id, ut nutri-
 tris minimam omnium mutationem desiderat, nisi in
 ventriculo & jecore moram traxerit, nisi omnes, quae in
 medio sunt mutationes transferit non ex iis, quae de-
 gerantur, sed ex iis, quae confecta subactaque in ventre,
 in jecore mutata in sanguinem sunt, alimentum toti cor-
 poris suppeditari? Cur denique, ut ad rem nostram
 veniamus propius, nutrimentum, quod in ventre est,
 non nutrimentum, nec veluti nutrimentum, sed futurum
 modo nutrimentum, si concoquatur, cum Hippocrate pronun-
 tias, hoc est, ut tu explicas, maxime omnium
 aquivoce, & non re, sed nomine nutrimentum. Quid
 ista sibi volunt? Hi possi cibi sumptionem, ut & vena
 simul ad cibos se convertant, & ventriculus ex iis, quan-
 tum prius per venas est exhaustum, in se ipsum trahat?

Non enim hic manifeste alii sanguine ventriculorum,
 & quidem perpetuo fateris? Nam & trahere ais
 ex venis (at quid trahat nisi sanguinem?) & fieri
 hoc postquam exuccatus est alii chylus, siue
 ulla temporis aut necessitatis majoris praescriptio-
 ne. Possent adferri docenda huic rei ex Galeno
 multo plura, nisi ipsa haec, quae allata sunt, & multa
 jam essent, & satis superque quid sentiendum
 de Lactearum nostrarum nutritione ostenderent.
 Si enim chylus alii nulla prorsus corporis pars po-
 test, ne illae quidem, quae naturae veluti cognatione
 quadam jungi cum ipso videntur, dispensationi
 ejus procuratorum praefectae, ventriculus scilicet
 ac intestina; cur solas Lactearum, quae neutiquam
 dispari cum ventre & intestinis tenentur servitutis
 lege, succus ille pascat, nulli parti reficienda re-
 parandaque comparatus? Sanguine igitur ipsae
 quoque alentur. Id quod praeter dicta magis etiam
 venae docent, quas junctas iis videmus, non solum,
 qua reliquis vasis attingit, sunt, sed etiam qua seorsim
 progrediuntur, etsi has exiles admodum, &
 prope capillares. (tab. x, & 2, B, C. Est autem id
 quoque unum ex Galeni placitis, ad quam vene
 pertineant partem, ei necessario pro nutrimento sangui-
 nem esse.

Haec vero omnia cum ita sint, nihil moror; mi-
 nor potius recentioris cujusdam & maximi viri
 nuperam cogitationem, quam tanquam novum
 & praeclarum inventum, tanta ille copia verbo-
 rum, tanto apparatu proponit, ut non quod in fa-
 ba pueri, sed Batti Sylphium putes reperisse, ea sci-
 licet re frigida, exangui, tenuia, a natura procreata in-
 resissina, ut pauceulo iis esset opus chylus, quo alerentur, ne
 multo maxima ejus portio, si carnosae essent, si calida cras-
 saque, hepatis & caetero corporis usui subduceretur, inter-
 cepta ab iis, & in suam rem conversa. Est enim pro-
 fecto hoc quoque novitium commentum unum
 ex multis, quae vulgo hodie jactantur, de quibus
 usurpare illud Comici possis;

Qui utuntur vino vetere Sapientes puto,
 Et qui libenter veteres spectant fabulas.
 Nam nunc novae, quae produnt, Comediae
 Multo sunt nequiores, quam nummi novi.

Atque de nutritione Lactium res dictum in mo-

dum habet. Quomodo autem n Galenus purgari in-
 constantiae, & manifesta contradictione vindicari
 possit, alii viderint, quibus Galenus non minus omnia
 est, idemque ἀναμάρτυς. Lubi nescius, quique, quic-
 quid ille dicit id Delphis sibi responsum putant.

Οὐδὲ Φέρεται τοῖς νοήσαι τε καὶ νοῦν τε,
 Namque melius illi intelligunt & judicant.

Mihi ut ingenue fatear, aqua hic haeret. Quare ea
 de re καὶ Φημι καὶ ἀποΦημι, & οὐκ ἔχω τὴν Φῶν, & ajo &
 nego, & quod dicam non habeo. Ego nihil scio, nisi
 nescio. Et certe non hac stat aut cadit Galeni exi-
 stimatio. Quod enim adferri a quibusdam solet,
 velle quidem Galenum omnes partes nutrir sanguine,
 sed non lolo omnes, ἀπερὸ δὲ ὁρῶντων imperi-
 mens est, & τῇ ἀποΦησὶ δὲ ἀλλὰ μὴν, hypothesis infer-
 vit tantum. Non enim id solum dicit, nutrir om-
 nes partes sanguine; sed alia quoque & hoc inprimis,
 nihil nutrire posse, quod non per omnia conditionis
 instrumenta proventum, excrementa omnia abiecit ad
 deposuerit. Quod Galeni pronuntiatum mirari subit,
 qui venire in mentem potuerit principi Anatomico-
 rum nostri aevi, ut negare & auderet? eo solo
 argumento, quod nec ipse sanguis excrementis
 suis vacet, & tamen nutriet. Nihil potest dici le-
 vius, nihil dilutius. Nec enim unquam, aut qui
 vere alit sanguis, hoc est, qui parti jam inolefcentis
 speciem ejus & naturam induit, excrementis ullis
 permixtus est; aut qui permixtus est, id est, qui vel
 in venis adhuc coercetur, vel alenda parti circum-
 funditur, vere alit. Atque hoc est, quod istum ali-
 menti nomine Hippocrates & Galenus non au-
 dent afficere, sed veluti alimentum aut futurum
 alimentum appellant; illum vero Aristoteles ultimi-
 mum alimentum nuncupat. Quae qui minus intel-
 lexerunt, multis se salebris implicuere, quas com-
 planare alibi conati sumus.

Verum hic error hujus viri alteri geminus est,
 quo ventriculorum alii non sanguine, sed chylus
 coactus est efficere. Ita enim colligit. Fit chylus a to-
 ta ventriculi substantia. Ergo totum quoque nutrit. Hoc
 enim si placet, efficiam id quoque, ut nec cere-
 brum, nec cor alantur sanguine. Ejus enim vesti-
 giis, hoc modo rationem concludam. Fiunt vitales
 & animales spiritus a tota cordis & cerebri sub-
 stantia. Spiritibus ergo cor & cerebrum aluntur,
 non sanguine. Simile in testibus, simile in utero
 audebo. Denique permitte semel mihi hanc con-
 cludendi licentiam, non minorem in agris nutri-
 tionis, quam olim in Arcadia aper Erymanthius
 stragem dederim.

Nec illae ejus rationes meliores sunt, quamvis
 cum aliis ipsi communes. Prima. Ignobiliora sunt
 carne ventriculus & intestina. Chylus igitur debent alii.
 Non puto tam ignobilem ventriculorum. Fac ta-
 men esse. Quid fiet cartilaginibus, membranis, &
 ossibus? Imo, quid utrique vesicae, omento, ute-
 ro, aliis? Cur illa quoque nutrir chylus non oportebit?

Altera quae tamen, ne quid dissimulem, Aver-
 roës quoque est. Cessat fames statim à cibo assumpto.
 Chylus igitur nutritur venter. Quid enim hic propo-
 sito consequens, quid consentaneum? Desinit à
 cibo oblato famis molestia confestim, necdum
 tantillo chyli genito. Quomodo igitur ventre nu-
 triendo famem chylus sedat, qui nondum est? Non
 ergo, quia nutritur mox à cibo venter, eo fames
 eximitur

o 3. de Tem-
 per. l. 1. Fac.
 nat. 11.

q Hipp. lib. de
 alim. Gal. l.
 Fac. nat.
 l. 1. Cere.
 l. 1. de gen.
 anim. 4.

q Hipp. lib. de
 alim. Gal. l.
 Fac. nat.
 l. 1. Cere.
 l. 1. de gen.
 anim. 4.

l. Vega, &
 recentioribus
 quibusdam
 aliis.

l. 1. Collige
 69.

eximitur aut depellitur; sed ideo oblitescit tantisper, & veluti placatur mitigaturve, quia alio distractus ille & operi incumbens suo, non sentit succum, famis causam. Quod non inelegerant quidam, etsi obscurius & sine apposita causa, dixerunt cessare famem animalem, non naturalem. Quid autem mirandum si, cum dolor dolorem^a, genere sibi similem, obscuret; voluptas, eaque major, dolorem sibi contrarium, eumque minorem extinguat? cum ita comparatum natura videamus, ut quemadmodum omnis detractio voluptatis consecutionem adfert doloris; ita omnis successio voluptatis, adferat amotionem doloris.

Tertia, quæ tamen Galeni^b quoque putatur. Nisi chylo alatur venter; efficitur agere illum ratione & consilio: Nec enim sibi laborabit, aut feret, sed aliis partibus. Hic quoque plumbeo pugione pugnat. Multum abest, ut hoc efficiatur. Laborat albis partibus publice, & Naturæ consilio, quæ provida cum sit utilitatum opportunitatumque omnium, incredibiliter hoc, ut cætera, quo scilicet totius necessitatibus ita consuleretur, est fabricata. Laborat sibi privatim & consilio suo, dum voluptati studet, quam ex ingesti cibi commercio & mutua tanquam cognatione percipere sentit.

Atque hoc est admirabile illud *μυχαίνμα* seu *μύσος* quæ potius (qua licet indocta, nihil tamen est callidius) Naturæ, quo in delinendis & velut inescandis per illecebras & nescio quæ lenocinia partibus illa utitur, quas alienis parere, quam suis visibus maluit, quibus detractis aut e rerum natura exemptis, nec stirpium genus ullum, nec animalium stare queat. Sed diu jam longior sum in explicanda Lactium hac communi actione, quam volui. Ad propriam venire tempus est.

C A P. XXII.

De Propria Lactearum actione. Eam esse distributionem chyli ad jecur. Hanc componi ex tractu & pulsu. Quæ uterque motus, & quæ utriusque cause principes, instrumentales? *διὰ δὲ τὸν & ἀνάδουτος* quid differant? Trahentium duplex genus, item pellentium. Tractum, qui fiat successione ad vacuum, nullum esse. Calor an instrumentum tractus? Hippocrates, auctor Finitimum Medicarum, alii, explicati. Avicenna laudatus. *Διὰ τὸν & τὸν* quidam obiter perscrutus.

Actio propria venarum nostrarum absque omni dubitatione chyli distributio est, & quidem distributio ad jecur. Quæ ut notat Galenus^a, *ἀνάδουτος* quibusdam dicitur, ad discrimen ejus distributionis, qua in totum sanguis describitur, quam iidem *ἀνάδουτος* nominare malunt. Est distributio. Quidni? Vasa enim sunt. Omnia autem vasa^b distributionis instrumenta sunt. Sic venæ sanguinem distribuunt^c; arteriæ sanguinem^d cum spiritu vitali permixtum; nervi animale^e spiritum. Est distributio chyli ad jecur. Docet hoc sensus, qui chylo scature deprehendit, & ad jecur recta ferri. Docet ratio, quod, ubi chylus nullus conficitur, ut in foetu, ibi hæ venæ non cernuntur, quia ociantur. Sed quid est hæc distributio? Nihil aliud, quam compositus ex tractu^f & pulsu motus. Trahere venas hæc ostendit earum cum intestinis commissio. Nec id minus ex valvulis, quæ affixæ iis sunt, perspicuum est.

Hiare enim ad intestina hirundinum more, ac esse radicum instar, jam diximus. Et hoc Galenus suis tribuit, quas falso ille deducendo chylo præfecerat. Quin Hippocrates^g omnem distributionem simpliciter tractu fieri docuit. Sed & pellere, sive transmittere, ex eodem Galeno^h intelligere est. Et vincit idem ratio, quod absque omni controversia chylus ille redundat in iis, ac superfluit. Est autem iste genius cujusque partis, ea vis, nihil redundans, nihil supervacuum unquam ut toleretⁱ, sed quantum conitti viribus ac robore potest, spernat à sese, & amoliatur, & pellat. Nec obstat dictis, quod intestina pellere dicuntur in Mesaraicas^j, & jecur per eas trahere, iisque tanquam manibus^k uti. Quid enim prohibet, quominus simul omnia ista consistant? Exemplo juxta & argumento cephagus esse potest, quem trahere & pellere, quis negare audeat, nisi idem sensum quoque neget? Et tamen non ipse minus ventriculi, quam jecoris Mesaraicæ venæ, manus appellatur, depulsumque à lingua accipere in se succum dicitur. Atque hinc illud Galeni^l est, *ventriculi expressione* (tu adde intestinorum) *distributioni chyli principium præstare, reliquum progressum, tum venarum contractionem, tum partis, ad quam mittitur, tractum perficere*. Quocirca recte, meo animo, Iacobus de Partibus^m quadruplicem ex Avicenna motum ponit, quo chylus ad jecur promovetur, impulsione intestinorum, tractum Mesaraicarum, impulsu earundem, & tractum hepatis.

Porro cum duplex sit apud Aristotelemⁿ trahentium omnium & pellentium genus; unum, quod motum trahit, aut pellit, aliud, quod immotum & quiescens; sane si sensus testimonio standum sit, posterioris utique generis tractus hic & pulsus, nostrarum venarum videri poterit. Sin ratio quoque in partem vocetur, consulaturque è structura earum deprompta, forte nec prior, est nobis perobscurus, denegandusvis fuerit, de qua re mox in usu dicturus sum.

Quomodo autem & à qua causa fiunt duo motus isti? De tractu antiqua est controversia, & multis ultro citroque rationibus agitata. Ut omittam Epicuri sententiam (quam apud Galenum^o, & apud Lucretium^p, etsi à Galeno discrepantem aliquantulum, legere unusquisque per se potest) Galenus, cum duplicem tractum statuisse^q, alium qui successione ad id quod vacuatur, alium qui qualitatibus, ut ipse loquitur convenientia fieret; cumque graviter Erasistratum reprehendisset, qui priore digestionem alimenti perpetrari contendere, ipse posteriore amplectitur. Rectissime. Etsi in eo non parum peccat, aut certe valde populariter loquitur, cum successione ad id quod vacuatur, cum scilicet, ut quidque cesserit aliud illico subsequitur, tractus speciem putat constitui. Nam profecto, si verum quærimus, & rem totam limamus subtilius, atque ad libellam philosophicam exigimus, tantum abest, ut id, quod succedit ei quod vacuatum inanitumve est, trahi possit dici, ut ne cogitari quidem facile id queat. Quis enim aut vacuum trahere sine irrisu affirmet, aut, ab hoc si discedat, aliam hujus tractus causam manifesta sine vanitate comminiscatur? Verum non est nostrum ista *κτλ* *μύσος* hic prosequi, quæ vel ad salum spectant, quem propositum sibi habet id, quod trahit;

trahit; vel certe dotes quædam sunt seu conditiones in eo, quod trahitur, quibus aut tracturo se commendat, aut ad agendum necessitate quadam compellat.

Efficientem enim seu conscientem tractus nostri causam quærimus. De qua, ut breve faciam & præcidam, ita sentio, duplicem esse, principem aliam, seu principalem; aliam, ut instrumentum. Illa facultas est, ut fuse Galenus toto primo libro de Facultatibus Naturalibus demonstrat. Instrumentum fibræ sunt rectæ, quibus venas has cum cæteris intertexti superius jam diximus. His vero si quis ex Galeno calorem quoque adscribere, & veluti succenturiare voluerit, tum insitum ipsarum venarum, tum circumstantium partium, id me non ilibente fecerit. Video enim nec Hippocratem^a ab ea sententia esse alienum, qui *venas postquam incaluerint, è ventre quod tenuissimum est trahere jam olim scriptum reliquit*. Cum quo auctor quoque Finit. medicarum^b consentit, dum digestionem definit *alimentum in totum corpus attractionem, quam naturalis calor molitur*. Auctor item libri de Utilitate respirationis^c, qui glandulas per Mesenterium sparsas, in causis caloris succum ab intestinis trahentis connumerat. Quin ipsum hepar ideo trahere vult, quia calidum sit & spongiosum. Quod vero de tractu dictum est, idem suo quodam modo, de pulsu dicendum fuerit. Nam & hic, ut à principe causa, ab vi expultrice peragitur; ut ab instrumento, à fibris transversis.

Erat mihi animus quædam adjicere his, veluti coronidem, de posteriore tractus genere, qui sit quiescente, quod trahit. Negat enim hunc dari Neophytus quidam à Mexico *denotatio* & eoque nomine erroris dicam Aristoteli impingit. Verum & longior necessario, quam pro instituto, erat disputatio & paucis absolvi non poterat homo ex eorum genere, qui cum primis se esse omnium rerum velint, nec sint, & tamen non omnium scientiarum modo, sed jurum quoque & morum dicturarum ad sese revocant, alios præ se omnes & ipsum adeo Aristotelem esse fecerunt oportere putant. Quare satius visum est, integram rem servare, & alibi suis ex virtutibus philosophum tam capitalem ornare, qui etiam pro eo, qui est in ipso, sale, ipsam hanc Lactearum nostrarum inventionis laudem, si qua est modo, in se & socienos suos transmovere est conatus, semper alienus, nunquam suus, & ipæ hanc ipsam Aristotelem de tractu inventiva Plagiarus.

CAP. XXIII.

Remote duæ objectiones. Cossæi, & Laurentii rationes in nos nullæ. Chylus an sanguis crassior? Cur tot vene rubræ ad intestina? Non semper verum, quæ frigida & exanguia pauco egere alimento. Intestina cur multis egeant? Totius per illa expurgatio. Renibus cur amplissima vene?

Non minor est virtus, quam querere parta tueri, ait Poëta^a. Plane ita est. Non diligentius investiganda veritas est, quam defendenda, cum investigaris, contra hominum ingenia, calliditatem, argutias. Id hoc capite facere visum est, & removere argumenta, si quæ negotium facessant. Ea duo sunt, quibus quidem momenti aliquid insit,

aut ponderis. Nam quibus aliis Costarus^b, & Laurentius^c, in eos pugnant, qui diversas in Mesaræo venas chylo, diversas sanguini ducendo tribuunt (quod nos quoque facimus, dicimus, licet longe; ac illi, aliter) ea sponte & ipsa sui vanitate, ex jam dictis ruunt; nec dicta fuissent ab ipsis unquam, si, ut ille ait, aut sensu cum labore aliquo uti voluissent, aut temperare potuissent sine fide sensuum in casum rationes acervare. Nam vel explorato falsa sumunt, cujusmodi ista sunt, *sensum nullum inter Mesaræicas discrimen facere, omnes similes, exortu, colore, contentu*: vel ea, quæ ipsa in quæstione & controversia versantur, quale istud est, *omnes eadem lege ac conditione teneri, isdem operibus perfungi*. Alia ita frivola sunt & inania, & ἀνορθότατα & ἀνὰ λόγον, rationis ac consequentia expertia, ut opera sit abuti, dare operam iis refellendis.

Ergo omitto, & ad illa venio, quæ dixi majoris roboris, & saltem cum specie aliqua argumenti. Eorum primum hoc est. *Tenuissima & angustissima sunt hæc vene, ut vincit sensus. Chylus sanguine etiam crassior est. Quomodo igitur recte aut recipitur in eas, aut per eas permanabit?* Alterum. *Vene Mesaræicæ vulgatæ sive rubræ, plurimæ sunt ad intestina & tantum non infinitæ. At quo tanta copia venarum & sanguinis, nutriendu corporibus frigidis & exanguibus? Alius igitur præterea earum sit usus oportet. At quis ille, nisi chyli transmissio & traductio ad jecur?* Firmatur hæc ratio. *Vene hæc plures in gracilibus numerantur intestinis, quam in crassioribus. At contra fieri oportebat, si nutritionis illis provincia foret delegata. Quis enim nescit pluri alimento egere, eodem in genere, quæ sunt majora, pleniora, pinguiora, quam quæ varia his & diversa?*

Ad primum in proclivi est responsio. Quidquid sit de chyli crassitie, de qua non disputo (nam alii^d sanguine tenuiorem faciunt, quia minus inquinant est, quam ille excoctus. Crassescit autem omne, quod coquitur. Galenus^e contra, Nihil, ait, ex ventre & intestinis in arterias, ut ex ventris, subit. Quomodo enim ex tam crasso gravique nutrimento quippiam in se, cujus habenda sit ratio, ille transferrent?) Quicquid sit, inquam, de hac crassitie, nihil ea distributionem impedire potest. Ita enim ab aqueoso cibi vehiculo diluitur, in eam rem à natura comparato, ut vel arctiores venas subire posse videatur, si opus sit. Taceo, quod hoc argumenti genus, non nos magis quam eos urget, qui obijciunt, & inverti ac retorqueri nullo negotio potest. Nec enim venæ, per quas ipsi chylum derivant, nostris sunt patientiores, arctiores etiam fortassis & angustiores, ad intestina certe.

Magis premere argumentum alterum videtur. Verum huic quoque responderi, & multimodis potest. Primum, non est ea multitudo istarum venarum, quam videri isti volunt, si longissima intestinorum corpora perpendas: sed usu venit hic, quod is solet, ut docent Astrologi, qui in Cœlum uno aspectu & quasi prætereuntes suspiciunt. Innumeræ enim his stellæ videntur, quæ tamen, si distinctis oculorum obtutibus obeantur, mille numerum non multum excedunt. Secundo, compensa multitudinem cum tenuitate & parvitate. Capillares enim propemodum omnes sunt, & minimi sanguinis includunt. Tertio non est perperum, ut si exaugue sit quippiam & frigidum, idem quoque statim paucas venas habeat & exi-

b Idell de usu
tenuium 85.
faves.
c 4. Hyst. A.
nat. 9. 5.

d Zorhu, &
Carpi f. 145.
e 3. Fac. nat.
14. ar. 10.

quo nutrimento egeat. Cerebrum in argumen-
tuo infpice. Metropolis frigidi est, fi Hippocrati
a credimus, & tamen non venis modo plurimis sca-
a lit. ff. de re-
nib. cor. met.
4. de morb.
tis, quæ a jugularibus in illud subeunt, qua inter-
nis, qua externis: sed sinubus etiam sanguinis, tan-
quam aquæductibus quatuor ingentibus irrigatur.
De frigidiore vero ventriculo quis nescit tritum il-
lud & pervulgatum, plus multo appetere cibi sem-
per, quam possit peragere? Nihil frigidis istis je-
juniohus. Fames illis mater est. Quin & aqua
b 4. in d.
Epid. 50.
vorax, ait Hippocrates¹. Cur? nisi quia refrige-
rat. Et novi ego aquæ potorem non ignobilem,
qui facile duos capos uno prandio conficeret, nec
sine pulmento, inficio, calci quadra, & locum ta-
men relinqueret, ubi reliquiarum reliquias recon-
deret. Quid multa? Nemo habuit majorem eden-
di experientiam. Et an non hoc illud est, quod
Horatius² asserit,

*Nulla placere diu, neque vivere carmina possunt,
Quæ scribuntur aqua potioribus.*

Non alit poeticos spiritus plenus venter. Quar-
to, copioso alimento præter partes reliquas opus
intestinis est, quod ad excernendum influentis bi-
lis acrimonia continuo proritantur tenuia præfer-
tim, quæ & primam vim ejus excipiunt, & sui te-
nuitate gravius etiam ab eo quam crassa feriuntur.
Sane tam difficili cum humore non minimum de-
fluere alentis & utilis fucci est credibile, & opus
ergo esse alium subinde ac alium suffici in locum
ejus, & reponi. Quæ affatim & celeriter evacuan-
tur, dicebat Hippocrates³, affatim quoque & ce-
lenter oportet reficere. Denique non nutritioni
solum, sed expurgationi etiam corpori destinatæ
c 3. Fac. nat.
3. de nat.
bile 6. 7.
f. 16. usq.
c. ult.
venæ illæ sunt. Is vero usus, quam non parvas
venas aut paucas requirat præclare Galenus in
exemplo renum⁴ ostendit, ad quas maximas in-
quit, venas perducit, non quod multo alimento illi ege-
ant, sed quod seroso recremento purgando è corpore vacare
illos oportebat. Suppleverit igitur hic quoque Na-
tura magnitudinem multitudinem. Atque hæc cau-
sa inter cæteras, quas dedi, familiam fortassis duc-
cat. Quod autem contra adferunt aliqui, purga-
tionem illam per inferiora maxime intestina obiri,
& ideo illis potius quam tenuibus venarum istarum
copiam dandam fuisse, si datæ expurgationis
causa fuissent, id malim docere illos, quam ita nu-
de affirmare. Galenus quidem⁵ nihil tale excipit,
loco, quo cum usum proponit & suadet, præter
sensus testimonium; omnis ratio, multo propiore
via per tenuia protrudi quod molestiam toti creat.

C A P. XXIV.

*Lactæ an chylum præparent jecori, & quo id modo?
Galenus & Fernelius reprehensi. Præparare non est
præformare, seu conferre quippiam formæ future. Sen-
sus Lactearum.*

Nondum ad exitum suum venit de propria
Lactearum actione disputatio, nec diu tamen
nos tenebit. Queritur præter chyli distributionem, alio-
ne munere sive opere teneantur? Quæstionis hujus in
causa Galenus⁶ est, & qui ab eo sunt. Volunt hi om-
nes, quas chylo ipsi præficiunt Mesaraicas, prælu-
dere veluti jecori, hoc est, quem dispensant suc-
cum, eundem præterea præparare & tanquam præ-
colere ad sanguinis futuram formam ac speciem.

*An ergo nostræ idem præstant? Res paucissimis ab-
solvitur potest. Si præparare, intelligas ita afficere
chylum, qua insita vi, qua partium vicinarum au-
xilium, ut aptior semper ac aptior fiat ad sanguinis
formam induendam in jecore, non video cur id
muneris denegari eis debeat? Est enim, ut recte
Galenus⁷ animadvertit, nihil quicquam in corpore no-
stro ociosum aut immobile: sed mobilia omnia, & varium
expeditumque opus efficientia, cum decenti structura, non
secus ac Vulcani instrumenta apud Homerum. Sin illud
velis, quod Galenus dicit, præparare modo jecori⁸ si-
milimo: mutare in sanguinem priusquam⁹ ad hepar per-
veniat: vel ut Fernelius, conferre rudimentum san-
guinis, quale per diffusionem in rubris venis, quæ ante he-
par sunt, deprehendatur, eundem, loquor libere, fi-
gmentum id puto. Docuit me sensus evidenter,
nihil in colore mutatum chylum ad hepar usque
per venas istas ferri: ibi demum antequam scilicet
in ipsum excidat, modo subpallidum, modo
subrufum conspici. Id in equo & in vacca præ-
gnante mihi notavi.*

Sed profecto nec hoc sonuit unquam præpara-
tionis nomen, quod isti perpendunt: nec vis ejus
& potestas eam ullo pacto trahit necessitatem,
quam isti somniant. Præparantes artes Aristote-
les¹, & Galenus² statuunt: & nos omnes novi-
mus Coriariam Sutoriæ, Ferrariam fabrilis mate-
riam præstruere. An igitur illa, calcei rudem for-
mam corio, hæc securis verbi gratia ferro im-
ponit? Nihil minus. Illud modo præstant, ut in eas
materias figuræ illæ facilius ab propriis artificibus
induci queant. Sed est hæc tota res multo in ipso
humano corpore manifestior. Præparat cibum ven-
triculo gula, & chyli tamen nihil unquam vel le-
viter simile in illa reperias. Præparant vasa semi-
nalia semen testibus: quis unquam in iis, antequam
cum testibus committantur, vestigium aliquid semi-
nis conspexit? Præparat dexter cordis ventri-
culus sanguinem sinistro, in vitalem ibi spiritum
exornandum, nec tamen vitalis spiritus speciem
ullam aut imaginem, aut rudimentum illi unquam
imprimit. Atque idem est, ne sim longior, de plexu
choroide, qui in anterioribus cerebri ventriculis.

Quomodo autem fiat hæc præparatio, & qui-
bus causis atque auxiliis, ex iis, quæ de usu dictu-
rus sum, fiet perspicuum. ubi & de venarum, quam
sugunt *dispartitio*, id est, conficiendi sanguinis vi
ac potestate. Illud hic obiter observo, cum præ-
parare succum hepatis venæ nostræ dicuntur, non
id illas agere in hepatis gratiam. ratione enim sic
& consilio ducerentur. Sed primo & per se sui
oblectamenti causa, tum necessitate quadam, qua
fit, ut cum duo corpora congregiuntur, unum in
aliud non possit non agendo vim suam exerere.

Refertur ad actionem partis etiam *Sensus*, de
quo ipso quoque ambigi potest, insit necne venis
nostris? Non multis verbis opus est. Quod de
aliis venis Galenus³, idem de his cense, per se &
natura sua sensus omnino esse expertes, sive fran-
gere velis, sive arere, sive incidere, sive laqueo excipe-
re. Quod si sentire aliquando dicuntur, aut etiam
sentire videntur, id non aliter⁴ profecto, quam
aut membranz, quam sibi aliunde addiscunt, ope
aut beneficio adjuncti proxime nervi consequun-
tur. Id quod nec Aristoteli⁵ latuit, qui & ipse,
Nervus, inquit, ignem non patitur, cum vena patitur.

LACTIVM SEV VENARVM

Lactearum Vfus.

C A P. XXV.

Explicatio usus Lactearum bipartita. Partis usus alius qua pars, alius qua pars cognita, Galeni liberum de usu partium duo summa capitula. Actio, & usus partium, est vñvñvñ norma, ac regula. Disciplinarum inter se nexu, & connexu.

Restat ut declarata actione Lactearum, agrediamur ad explicationem illarum usus. Erit hæc omnis bipartita. Exponetur primum ad fungendum recte atque ordine munus suum, quemadmodum affectæ sint, seu quam opportune probeque comparatæ & composita, qui est usus partis proprie & simpliciter. Tum docebitur, quantum earundem inventio, cognitio & explicatio ad rem omnem medicam & philosophicam momentum habeat, & utrique quantum lucis adferat, qui usus ipse quoque partis est, sed cognita à nobis ac perceptæ, quique ni fallor, Utilitas rectius, quam usus dicitur.

Vtrumque Galeni adeo imitatione fiet, qui ipse quoque in de usu partium, cum sexdecim totis libris, Vfus omnes singulorum membrorum, edendis actionibus destinatos fuisset prosequutus quam exactissime ultimo tandem, quantum doctrina ista usum ad rationem omnem explicationemque naturæ ad ethologiam, ad medicam ἀλγιωσιν, ἀναισθησιν, ἰατρικὴν confert, demonstrandum sibi, explanandumque putavit. Sapienter, ut sæpe solet. Est enim certe non parti modo cuique suus quidam usus proprius, quem, ceu κεκληρωτοῦ fufè doctæque idem Galenus actione metimur, non secus ac membri ipsam ὑπόστασιν (quod quam ad actionem est appositum maxime, tam maxime suos omnes numeros obtinet;) sed habet ipsa quoque cognitio, ut rerum cæterarum, ita partium humani corporis suas utilitates, qua scilicet vel ad actionem aliquam necessariam humanis usus illa refertur, vel in aliarum & aliarum rerum cognitionem vicissim nos inducit, non in eadem modo disciplina, sed sæpe in diversis & toto genere à se abjunctis.

Habent siquidem hoc omnes artes, & scientia; ut, tanquam in catena articuli, nexæ inter se aptæque, communibus quibuldam vinculis jungantur, & quasi cognitione quadam inter se continentur. Quod adeo verum est, ut, si Ciceroni credimus, ne virtutis quidem philosophia, etsi in alio plane ac dissimili genere, absque naturæ consideratione contemplationeque ad vitam beate & cum ratione degendam aut sufficere sibi possit, aut satis suam dignitatem tueri. Sed utrumque ipsum usum explicemus.

C A P. XXVI.

Vfus partis ab actione, quibus differat? Galenus à contradictione vindicatus. Vfus qui, qua actione, præstantior? Actionis perfectio duo in parte requirit, non plura. Partium organi actionem edentis quadruplex varietas. Partes singule Lactearum, quemadmodum

ad actionem conspirent, Fibra, Caro Membrana. De venarum fibræ consuetudine Fallopii opinio.

Antequam de primo Lactearum usu decernamus, quem usum diximus proprie & simpliciter, statuenda nobis differentia est, qua ab actione ille se jungitur. Ea Galeno auctore in hoc posita est, quod ille partibus adest semper, etiam ociosis & cessantibus: hæc, nisi negociosis & agentibus nunquam. Recte. Est enim nihil aliud usus, quam quod vulgo ἐνέργεια appellatur, id est, ad utendum quædam aptitudo: actio autem semper κίνησις est ἀεὶ κίνησις, id est, efficiens motio, modo, quo supra jam explicatum est. Oritur vero ex hac alia differentia, quæ est, quod idem usus, etsi parte, in qua inest, non secus quam actio ipsa, natura & dignitate prior est, ut præclare Galenus contra Epicurum, & Asclepiadem disputat, actione tamen his omnibus modis est posterior. Quomodo enim posterior ea non sit, in quam totus refertur: cujus inprimis gratia membris à natura est datus atque ingentis: qua tanquam regula & norma omnis cum illius, tum partis ipsius perfectio iudicatur?

Quod si quando Galenus dixit, tempore quidem, seu ut ipse loquitur, τῇ γενέσει posteriorem actione; dignitate vero priorem, præstantioremque Vsum illum, nihil id nobis officit. Nequaquam enim cum hæc ita dixit, intellexit usum, de quo nos hic agimus, qui ad actionem comparatur; sed actionis ipsius finem, id est, usum, qui ab actione partis toti corpori accedit. Et merito actioni suæ hunc usum anteposit, non ea solum causa, quia in eum actio, ut in finem fertur, eoque indepto cessat (est autem finis natura sua iis semper, quæ fiunt ejus gratia, præstabilior:) sed illa etiam, quod latius ipse multo, quam ista patet, & ad plura pertinet, non unam partem, sed universum corpus complexus.

Hoc vero ita explicato constitutoque, actionis perfectione partis omnem cum usum tum ὑπόστασιν iudicari æstimarique: & repetito præterea ex jam dictis propriam & præcipuam Lactearum functionem in chyli versari distributione, minime difficile, opinor, fuerit, de omni earum tum usu, tum ὑπόστασιν pronunciare. Nimirum duo, non plura, actionis omnis perfectio in debito illi membro requirit; alterum, ut singulæ ejus particulæ; alterum, ut quæ in eo & in illis insunt omnia ad colendum efficiendumque munus suum, tanquam collatis in commune viribus conspirent ac consentiant.

His enim ceu limitibus rem hanc totam jam olim Galenus, natura duce definivit; & illud præterea, partem cui adfunt ista, ea esse absolutione perfectioneque; ut si vel tantillum ejus aut perimere aut commutare conere, totam ipsam tollas aut pervertas. An igitur habent ista omnia Lactæ nostræ? Habent vero, nec id cuiquam obscurum esse potest aut dubium, quisquis diligentius aliquando de iis consideraverit. At de illis quidem, quæ insunt in ipsis, mox videbimus; de partium vero singularum è quibus conditæ constant, contentu, consensione, concordia, qua, ut continuata quadam cognitione conspiciant in suam functionem, inde æstimari poterit.

D d 2 Partium

a 4. n. d. 12.
b 4. n. d. 12.
c 4. n. d. 12.
d 4. n. d. 12.

Partium organi, inquit Galenus*, unam & certam ex se actionem promentis, alia sunt in ipsa actionis causa (partes principes has alibi vocat:) alia ita se habent, ut sine iis non fiat actio: alia faciunt, ut earum ope melius fiat: alia denique ad harum omnium spectant conservationem. Nulla harum, quod mireris in tanta paucitate (tres enim omnino sunt) Lacteis nostris deest. Vis causam distributionis principem? Ecce tibi fibras rectas, & transversas. Vis alias? en fibras obliquas, Carnem, Membranas.

b 4. n. d. 12.
c 4. n. d. 12.
d 4. n. d. 12.

De fibris non me fugit, quod etiam supra monui, eas venis Vesalium omnino negare: Fallopi-um, etsi admittit (quamvis agere id quoque,) nihil tamen prorsus eorum quae nos, iis tribuere. Sed rectas transversasque his venis nostris, ut & aliis, principis partis in vicem esse, facile ratio vincit. Nam nec partem ullam aliam similem illis reperire in corpore est; quae una est & praecipua principis partis prerogativa. Et jam ante ostensum est, rectas tractui, transversas pulsi praesse. At enim tractu & pulsu omne, quantum est, distributionis munus perficitur. Accedit Galeni* auctoritas, qui commune id ait naturae alibus instrumentis, ut non nisi fibrarum ministerio beneficioque moveant: tum arteriis, quarum (quod quidem hanc ad rem pertinet) eadem plane est quae venarum ratio, perspicue fibras, quibus transmittant, attribuit.

d 4. n. d. 12.

Quibus omnibus sit, ut facile seorsim à Fallopio sentiam. Quid enim contra ille? Vult ad solam *δοσάδεναι* datas venis, ne rumpantur à violentis sanguinis occubibus, extenta illarum ope in omnes partes venae tunica. Trahere autem, aut pellere duplici argumento negat. Alterò à *structura eorum* petito. Quia ita, inquit, latent in membrana, ut potestate potius, quam actu inesse videantur; tum ita intertextae sunt & in sese mutuo implicatae innexaeque, ut moveri nullo modo possint. Alterò à *sensu*. Quia nec contractio in illis, nec dilatio cernitur. At cerni debebat, si traherent pel-lerentque, exemplo gulae, uteri, aliorum. Atque ex his illud tandem concludit, tractum illum earum & pulsum, quia fiat illis quietis, non nisi æquivoce ita dici posse. Nolo hic illud negare, ad *δοσάδεναι* etiam facere. Illud ajo, quas contra tractum pulsumque istarum fibrarum adfert rationes, minime mihi videri militare. Etenim fibrae istae, etsi non ita conspicuae sunt, tamen conspiciuntur, & vere ac reipsa sunt, nequaquam potestate tantum. Id quod fateri ipse Fallopius cogitur, modo constare sibi velit. Quomodo enim earum ope extendi membrana potest, si non sunt? Illud de motu sensui conspicuo *μενδεν πρὸς ἑαυτὰς*, nihil ad rhombum. Non omnium fibrarum, sed carnosarum tantum, quales in gula sunt, ut ipse fatetur Fallopius, proprium est manifeste & perspicuo cum motu trahere aut pellere. Nec de textura quod dicit, quidquam cogit. Cordis quoque fibrae varie & multipliciter intertextae sunt, an ideo moveri earum opera cor definit? Iam quod eum tractum, qui sit parte non mota, ex Averrho, ut inquit, æquivoce tantum tractum esse affirmat, in eo, ut nihil hic dicam aliud, aperte Aristoteli contradicit, cuius haec sunt*, *τὸ δὲ δένει ἀπὸ τοῦ κινεῖναι τὸ ἐλκεῖν, ὡς καὶ τὸ ἐλκεῖν. Cum sit tractus,*

e 7. Ph. 1. 10.

nihil refert, quiescat id, quod trahit, an moveatur. Atque de fibris rectis simul ac transversis ita res est. Quid de fibris obliquis, de carne, membranis? Illarum quoque singularum, quod suum est, agunt.

Fibrae obliquae ad meliorem distributionem faciunt. Vetant praecipitare chylum ad jecur, dum contendunt se vicissim & explicant. Eadem ejusdem praeparationi serviunt, qualem quidem explicavimus. Nam inter moras castigatur. Privatam quoque partis coctionem promovent, cum elabi non sinunt, quod semel suae nutritioni, fuisseque necessitatibus illa seposuit.

Caro fibrarum spaciis interfusa, vice causae est sine qua non. Quippe explens, quae inter illas inanitates; tum ipsas jungens ac uniens simul, spacium eis praebet contrahendi se, laxandique; simul contractioni opitulatur, quam disjunctae a se & divulsae, quomodo recte obirent? Eadem praeparatio chyli debetur, & prope tota. Nam & carnis cujusque partis proprium est coquere, quod in ea est: & fibris ac membranis ipsa calore praestat, ut jam ostendimus.

Membrana, quae venis propria est, tutelae inprimis ac custodiae comparata est, non carnis modo & fibrarum, sed & coercitae conclusisque intra illas succi. Id quoque adfert commodum, omnibus membranis commune, ut cum distendi promte, & rursus contrahi apta nata sit, sine periculo nunc minorem, nunc multo majorem chyli copiam admittat, prout res scilicet & usus ac necessitas postulant. Membrana ascititia & exterior, qua vestita extra jecur venae istae sunt, ad custodiam ipsa quoque refertur. Data ideo est, sicut venis ceteris quoque? ut longo illo quod est ab hepate ad intestina itinere tuto eas deducat, fulciat & cum Mesenterio ac vicinis partibus colliget. Eo quoque prodest, quod sensum eis praebet, quo extra hepar constitutis, non minimum ad provisum propulsusque noxiorum ac molestorum illis erat opus.

C A P. XXVII.

Ex iis, quae insunt, Temperies quid Lactearum actioni accommodat? quid item, quae consequuntur, albor, levitas, tenuitas, & rarietas tunicarum, fibrarum durities? Temperies frigida & sicca robur parti & constantiam imprimis tribuit. Albor materiae necessitatem sequitur, fors etiam levitas.

Non satis est, ut diximus, si partium organi singularum suas quaeque ad promovendam illius actionem vires intendat ac conferat: oportet hoc amplius, ut ea quoque, quae in parte qualibet insunt, Temperies puta, Quae consequuntur, Quae accidunt, mutuas eandem in rem operas tradant. Haec enim illa sunt, inquit Galenus*, per quae & agit pars quaelibet quod debet, & praestat quae agentis sunt ex usu. Et ista igitur nobis videntur.

Ac in Temperie quidem non est, quod diu immoremur. Sive enim ipsamet facultas illa est, sive facultatis primum & proximum instrumentum, quantum ad omnem actionem vim habeat, ignorari nullo modo potest. Per Temperiem, inquit idem Galenus*, quae propria substantia est cujusque partis, magna ex parte organum quodvis suam actionem namiscit.

b 1. n. d. 12.

nancisci invenies, si ratione & suis ponderibus rem examines. Et sane frigiditas & siccitas, ut cujus proprium est contendere partes, adducere & in unum cogere, tum isdem præstare stabilitatem ac firmitudinem, non potest non plurimum præter cætera, & fibrarum augere robur & ad omnem actionis constantiam proficere. Scitum illud est, plus posse vires junctas & unitas. Sed refertur in primis ad privatam nutritionem ejus vis, quæ actio est, ut ostendimus, singulis partibus communis. Temperies enim illa est, ait Galenus, quæ pars quælibet tum familiaria sibi allicit, complectitur, coquit: tum aliena a se segregat atque expellit.

Inter ea, quæ consequuntur, eminent & præcipuam animadversionem requirunt, Tenuitas & Raritas, quæ in tunicis istarum venarum cernitur, quæ in jecur se inferunt potissimum, sed & extra jecur. Vtrobique usum præbent non contemnendum. In hepate in causa sunt, ut & citius in ipsum & pluribus modis chylus transfundatur, quem usum Galenus suis quoque Melaraicis tribuit, etsi falso. Extra jecur id præstant, ut facilius ejus beneficio in corpora ipsis subistrata, quicquid inest chylo cœnosæ humiditatis, ut Hippocrates loquitur, deponatur, & sic quod reliquum ejus est purius defæcatiusque ad hepar perveniat.

Non eadem in cæteris hujus generis dignitas, & explicatus habet faciliore.

Fibrarum illa mediocris durities, quæ frigida & siccæ parti, & ex lenta materia condita affidet tantum non necessario, quem habeat usum notius est quam ut pluribus dici debeat.

Album earum, sive ut Plautus albitudo, ut Varro, albor, nihil habet ad usum peculiare. Nempe materie, ex qua condita primum venæ istæ sunt, id est, feminis necessitatem sequitur, ut in cæteris omnibus partibus, quibus origo ex illo est.

Simile de lævitate est, si Galeno modo fides est. Et ipsa enim materie comitatur, ubi æqualiter scilicet percocta à natura fuerit, ita ut nulla pars ejus effugerit vim ac facultatem. Si tamen ex his quoque usum omnino velis, non decuit per lavia viscera intestina & jecur venas nisi læves & æquabiles undique perducere.

C A P. XXVIII.

Quæ accidunt Lactei, quos ex se usus in actionis commodum promant? I. Figura. II. Asperitas. III. Cava, & Meatus. IV. Valvule in meatibus. V. Angustia. VI. Continuitas. VII. Numerus, & Magnitudo. VIII. Situs. IX. Inversio. X. Modus insertionis. XI. Crusta quæ in intestinis. XII. Adeps. XIII. Glan-
dule, quæ in Mesenterio. Hippocrati lux. τὸ πλεονάζον quid? Fallopi meatus oleaginosi. Bolum, seu buccæ dulcis.

AD partis integritatem, plenamque & perfectam absolutionem non necessaria minus sunt. Quæ illi accidunt, & communi Compositionis nomine à Medicis comprehenduntur, quam aut ipsa Temperies aut quæ Temperiem consequuntur. Nimirum non per illa, quam per hæc secius aut agunt partes id ipsum, quod agere apte nata sunt, aut ad suos & necessarios usus opportunitatesque instruuntur. Organum apprehensionis manus sunt. Qui actionem tam insignem, tam homini neces-

sariam & tantum non propriam moluntur? Per conformationem, respondent, post Hippocratem, Aristoteles, & Galenus. Nisi sic divisa esset in digitos, nisi digiti ita distincti articulis, ita sibi invicem oppositi, nil complecteretur, nil teneret. Chylum, ut ad rem nostram veniamus, distribuunt Lactæ. Quemadmodum peragitur distributio ista? A fibris per Temperiem suam; sed ne vacillet quid aut claudicat titubetve, præter cætera, imo supra cætera, præstante suos usus & tanquam operas reliqua totius venæ compositione. Et hos ergo Vfus explicare oportet, qui soli adhuc ex iis supersunt, quos proprie & simpliciter partis Vfus diximus. Fiet id hoc capite & ordine ipso illo, quem supra proponendis, quæ Lacteis accidunt, in Historia tenuimus. Nam quot sint, & qualia, quam varia item & multiplicia, satis jam ibi dictum declaratumque est.

I. Figuram habent Lactæ teretem & oblongam, quia ad remotam partem distribui succum, quem vehunt, oportebat. Est enim supra cæteras omnes ejusmodi distributioni figura hæc accommodatissima, quæ & ideo Valorum reliqua omnia genera, arteria; puta, venæ & nervi sunt donata.

II. De Lævitate, quæ in extima tunica, jam egimus. Inæqualitas vero illa & veluti asperitas interior ad chyli moram non nihil facit, & per eam ad meliorem quandam, qualiscunque ea sit, præparationem. Quo enim quid moram trahit in parte diutius, eo coquitur ab ea rectius & felicius, ut illud non male huc poetæ conveniat,

Habent parvæ commoda magna moræ.

III. Cavis suis & veluti meatibus destitutæ si essent, ne distributio quidem chyli ulla esset. Hinc fieri adeo videmus, ut occlusis obstructisque his cæ canaliculis, aboleatur quoque continuo accpereat ipsa distributio. Et recte Galenus, ἀνάδοτος νεύε συνήθιο est, non quæ corpus illa est, sed quæ meatum habet. Præcipuus hic usus est. Sed eum alius excipit, nec ipse levis, quod in iis meatibus tanquam ex Φυλακῇ, id est, in custodia chylus non continetur modo, sed incorruptus etiam ac integer præstatur conservaturque. Ut enim extra venas effusus sanguis in quamcunque partem, uno

excepto corde, concrevit mox putrescitque; ita chylo quoque usu venit, si ex vasis suis alio, quam in hepar excidat. Scilicet vim quandam, nec mediocrem habet locus conservandi, quod collocatum in eo est, ut docet Philosophus.

IV. Valvularum, quas obditas meatibus intus foras diximus, unus idemque hic, qui cæteris omnibus in partibus, quibus adsident illæ, usus est; impedire scilicet, ne quod semel haustum est materie, inani atque irritò labore remeet vicissim ac restagnet in partem, unde haustum est. Id quod adeo exacte hic præstant, ut nec digitorum compressu nec alio nisi ullo retro cogere unquam semel conceptum in iis liquorem etsi varie id conatus potuerim.

V. Perangustæ sunt in hepate & ad intestina. Vtrobique, ut quam fieri potest in minutissimas partes divisus distractusque chylus, illic trahatur, hic alteretur commodius minima quaque sui parte à vi hepatis contactus.

VI. Continuæ sunt omnes, & partes unius, seorsim nulla usquam, quod, ut recte Aristoteles de

a Hipp. de
viresc. 1. 2. 0.
b Aristot. 4.
c Gal. 1. 1. 1.
d 1. 2. 1. 0.

d sup. e. 18.

e de differ.
morb. 3.

f de differ.
morb. 7.

g Anst. 3.
Hipp. 19.

h A. Phys.
1. 1. 1.

i V. Gal. 4. 1. 1.
par. 17. Avi-
cem. 1. 1. 1. 1.
v. 2. 1.
k 2. 1. 1. 1.

venis animadvertit, nisi suæ origini continuæ tenderent succum, quem vehunt, conservare illæsum inviolatumque nequaquam possent. Quippe profuens ab origine calor is demum est, qui fovens tutanque succum facit, ne aut concreseat inutiliter, aut etiam putrescat.

VII. Plurimæ sunt, & fusæ per omnia intestina, eæque parvæ, non una aliqua & ampla. Primum, ne crassæ & inutiles chyli partes simul cum inutilibus temere in eas subeant. Deinde, ne quid succi utilis eas præterlabatur, & si quid illius unum^a earum aut alterum ordinem subterfugiat, id comprehendatur in aliis. Tum, ut citissime quidem^b, quemadmodum oportebat, non tamen confertim & tumultuarie fiat distributio. Denique, ut ne continuo cibo ingerendo^c vacare cogamur. quod si esset, hominem *ἀμνοτον* & *ineptum* faceret, raptim & abunde quod ingestum ejus est, per viam amplam exhaulso. Numero Mesaraicas vulgares multum ac multum superant. Non injuria. Plus multo chyli ad totius providentiam jecori, quam sanguinis intestinis in privatam nutritionem debetur. Plurimæ ad gracilia, pauciores aut fere nullæ ad crassa pertinent. Id quoque recte. Illa nempe, distributioni; ista, excretioni inprimis serviunt. Illa, succi alibilis, ista, sacum & purgamentorum inutilium sunt receptacula.

VIII. Locum imo in ventre obtinuerunt. Culinæ enim corporis & nutrimenti officinæ, cujus ibi sedes est, famulari eas oportebat, bajulorum^d instar, qui triticum ex agris ad communem aliquem urbis locum seu furnum coquendum ibi, mitigandumque in panem deferunt.

Quod venis & arteriis minus in abdito sitæ, & magis in propatulo sunt, id valorem illorum dignitati tributum est^e. Vt enim, necessitate nihil fortassis, ita dignitate minime parum illis utrisque concedunt, sive succum spectes, quem dispensant; sive munus etiam officii, quod per se & prima ratione in solius jecoris gratiam comparatum videtur. Consuevit autem natura semper quod dignius est, ei de tutiori quoque ac digniori loco providere^f.

IX. Inferuntur in intestina omnes, nulla in ventriculom, nec minima quidem. Ratio. Quia, ut recte Galenus^g, etsi sibi parum in hac re constans (nam ventriculo quoque suas Mesaraicas alibi addicit, etsi pauciores) digestionis organum est ventriculus, non distributionis. Fieri nullo modo poterat, cum agant necessitate naturæ quicquid agunt, quin crudum & rudem adhuc chylum, si ad ventrem etiam pertinerent, direptum ex eo ad hepar traducerent, non sine ingenti œconomix totius corporis confusione, & irreparabili coctionum succedentium detrimento, quarum nulli reintegrare datur quod peccavit quæ præcessit.

X. Ad intestina nisi hiarent oscillis suis hirudinum instar, sicut diximus, nec trahere possent ad se chylum; & promiscue pellentibus in ea intestinis, non chylus magis, quam quæ mixta ipsi sunt recrementa atque reliquæ confecti cibi ad hepar per ipsas concederent, nunquam ibi sanguinis specie recte exornanda. Quod probe Galenus vidit, & ideo suis quoque Mesaraicis eum, quem vere nostris damus, insertionis modum adscripsit, ut supra laudatis ipsius in eam rem locis docuimus.

XI. A Crusta oblinente gracilia intestina, in quam finiunt, duplex commodum illis accedit. Primum, vicem tanquam operimenti exhibet oscillis earum ad anteriorem intestinorum capacitatem hiantibus, ne oblitteratis illis occæcatisve à sordibus chyli aut pereat distributio aboleascatque, aut frustretur saltem ac interpelletur. Deinde, veluti pro filtro est, per quod sensim & ceu guttatim chylus ad eadem oscilla, fugendus ab iis, appellit sese atque insinuat.

XII. Adeps, præterquam quod usum præbet ceu mollis strati, cui incumbant, calorem quoque earum fovet, quo sic ejus ope tum tractio ipsa, tum preparatio felicius absolvatur.

XIII. Ad eandem caloris rem Glandulæ quoque faciunt, ut jam olim observatum auctori libri de utilitate respirationis^h. Præstant eandem istis venis illos quoque usus, quos præstare cæteris Mesaraicis vasis diximus ex communi sententia; qui erant, instar propugnaculi firmare eas, qua dividuntur & in divortia varie abeunt; mox fulcire in reliquo progressu ac tuto deducere. Qui usus earum ut non sunt contemnendi, ita meo judicio maximus & Pancreatis præcipue (si tamen hoc non principii magis, quam simplicis glandulæ subit vicem, de quo supra dubitavimus) ille est, quem facile candor illarum insignis & substantiæ ipsæ modus arguunt, cœnosiofrem, crudiofrem & pinguiorem chyli partem in sese corrivare ac combibere (modo non dissimili, quo in foetu jecur seu placenta uteri nuncupata, quod in materno sanguine sæculentum est exhaurit in sese & absorbet,) quo sic quod restat illius purius liquidiusque ad hepar, in sanguinis ibi formam induendum, subeat & permaneat. Atque hoc omnino illud esse mihi persuadeo, quod Hippocratesⁱ dixit, *ἡ πνεύματι δόξα, ὅτι καὶ ἀδένες*. Hoc enim *πνεύματι δόξα* nihil aliud mihi est, quam chyli illa, quam dixi cœnosiof & impurius portio. Quos enim Fallopius^k ponit in sima hepatis meatus, qui in Glandulas & Pancreas inde porrecti, oleaginosum quandam succum flavum & subamarum in illas eructent deponantque, mihi videre nondum contingit. Et quod de succi amarore dicitur, id satis Pancreatis caro convinct falsi, ita palato grata, ut inde vulgo etiam nomen invenerit, Dulcis boli, seu Dulcis buccæ, ut quidem Carpus annotavit.

C A P. XXIX.

De Viscibus, qui ex Lactearum cognitione Medico & Philosopho accedunt. Eorum præ prioribus dignitas. Duplices esse, alios communes utrique, alios Medico magis proprios. Illi Physiologici appellati. Ex iis primus explicatus. Sublata gravissima controversia de officio Mesaraicarum. Oïo omnes de illo sententiæ falsi convicti. Vena hermaphrodita. Iacobus de Partibus, Zerbui, Carpus, Massa, Laurentius, alii, varie notati, aut confutati.

Q Vos hætenus recensuimus Lactearum Vtus, ex eorum numero omnes sunt, quos simpliciter ac proprie esse usus diximus, qui in Actionem scilicet referuntur toti corpori utilem ac necessariam. Superest de iis videre, qui ex earum cognitione, ut Galenus loquitur, Philosophis & Medicis accedunt. Qui etsi in secundum locum ac ordinem

a Gal. A. 1. 1. p. 17. Antior lib. de anat. quæ. quæ de intestinis.

b Gal. ibid.

c ibi & c. 18.

d A. 1. 1. p. 17.

e 16. 1. 1. p. 11.

f Gal. 1. 1. p. 17. 1. 1. p. 17.

g A. 1. 1. p. 17. 1. 1. p. 17.

h Spm.

i lib. 1. d. 1.

k de m. obferv.

ordinem conjecti a nobis sunt, nihil tamen videri debent primis illis, si ratione modo rem scrutari placeat, inferiores; superiores etiam fortassis & præstantiores. Galenus quidem certe ita hujus generis Vfus magnificat, ut cum^a perfectissimæ Theologiæ principia contineri iis dicat; tum solis naturæ totius comparari scientiam affirmet. Quin idem eorundem explicationem cum *tradit*^b comparat, qui ante Deorum aras à stantibus concinitur: alibi vero etiam^c hymnis ipsis sacris præfert, & majori dignam attentione ait, quam^d omnia Eleusiniorum aut Samothraciorum sacrorum mysteria. Quicquid sit, non est opus vino vendibili suspensa hederæ. Ipsi, quanti sunt, facile per se loquentur. Nos eos, cum multi plane sint nec eodem omnes referantur, ad duo summa sive capita sive genera redigemus, ut alii sint Philosopho cum Medico magis communes: alii huic quam illi magis proprii. Adferemus ex utroque genere aliquos, qui scilicet in mentem nobis venient, è multis paucos: (nam omnes quis possit?) à prioribus adeo capto initio, quos Physiologicos tantisper appellabimus, dum vocis aptioris nobis copia suppeditet. Ex his

PRIMUS facile iste est; quod illa per eam controverfia & nullo prope negotio tollitur, qua illud tam sæpe multumque questum hæcenus est, *Chyli ad jecur, & vicissim, sanguinis à jecore ad loca chyli distributionis, per quas vias obeatur*; seu ut alii proponunt, *Per easdem venas Mesaraicas tum nutritio, tum distributio sit, an alia nutritioni apte & constituta sint, alia distributioni*. Nihil est amplius, quod ambigere nos sinat, inventis semel & conspiciatis Lacteis. Patet luce clarius, alias ducendo sanguini, alias ac toto generè ab istis diversas vehendo chylo allegatas. Patet item, quoties opus est posse & chylum nihil impediende sanguine, & hunc vicissim nihil obstant illo, quo oportet tuto ac certo itinere commeari. Hic vero Vfus sive utilitas quanta sit & quantum habeat ad rem medicam & philosophicam momentum, docere potest inprimis ipsa quæstionis istius difficultas; tum sententiarum varietas, qua laborat ut difficultatis semper, ita vanitatis ac falsitatis prope semper index ac argumentum: denique, ac clarissime omnium, incommoda & difficultates, quibus maximis & plurimis urgentur, qui secus sentiunt. Ac de difficultate quidem hujus quæstionis quid attinet plura dicere? Tam ardua, tam obscura & lubrica, maximis etiam ingenii visa est, ut nec sensu satis, nec ratione quid statuendum esset, pervideri aut dispici posse profecti ingenue complures fuerint. Varietas sententiarum tanta est, nulla ut in omni medicina majori in contentione verleret. Octo, aut pluribus etiam opinionibus agitur.

Sunt qui per solas ventriculi^f venas perferri ad hepar chylum velint; per Mesaraicas nutriti tantum intestina. Contra alii utrasque utrique muneri destinant^g, in numero solum factò discrimine. Plerique de solis Mesaraicas disceptant, (vulgatas semper intellige) quorum quatuor factiones sunt. Volunt alii solum chylum^h vehere: alii, & hunc & sanguinem præterea, sed divisim veluti & partitis inter se operis, ita ut diversæ sint quædam huic, quædam illi perferendo delegatæ. Rursus alii contenduntⁱ, utroque pariter omnes officio

fungi, sed diversis temporibus & descriptis intervallis, nunc in uno, nunc in altero deditas: alii contra, una & eadem omnes conditione frui, idque nolla vicissitudine temporum, una eademque simul humorum confectione. Nec isti inter se satis convenit, dum quidam^k, præcipue & primo loco deferendo chylo, secundo loco & minus sanguini operam dare pugnant. Denique, ne quid desit ad ineptiarum cumulum, reperias, qui in dubium vocent, eodemne ductu^l promiscue feratur humor uterque, an secundum latus suum quisque, quasi dimidium loci, icto ceu feedere, cum altero pactus.

Iam difficultates, quibus conflictantur hæc omnes sententiæ, quantæ sunt, quam inexplicabiles? Omitto illam de ventriculi venis opinionem, de qua mox suo loco. Quæ circa Mesaraicas veriantur, inprimis quotquot sunt apertissime sensui adversantur, qui soli nutritioni destinatas ita perspicue arguit vincitque, ut ne Fernelius quidem inficiari id ausus fuerit. *Sensus, inquit, docet soli nutritioni delegatas, sive succum speciem, quem intra se coercent, sive ipsam in intestina insertionem*. Naturæ quoque faciunt injuriam, cujus dignitatem magis quocunque Erasistrato eunt imminutum. Quid enim alienius ab ejus artificio, solertia, providentia, quam una eademque particula ad functiones duas, tam inter se distitas, tam repugnantes sibi & nullo aptas ordine, tanta cum rerum perturbatione abuti? *Natura, inquit Aristoteles*^m Naturæ genius, *uno non nisi ad unum utitur, & nunquam quicquam tale facit, quale Delphicus gladius est*.

Nec vero minus per se singula laborant. Qui solum chylum vehere contendunt, nunquam explicabunt, per quas alias sive vias sive venas indigentia intestinorum subveniat. Qui præter chylum sanguinem quoque ferre affeverant, sed alias eas atque alias, ecquod dant discrimen inter illas, ut ita esse credamus? Nam differre oportere, ut nullo alio aut colore certe, & contentis quis non intelligit? Atque idem incommodum eos quoque manet nihilo minus, qui utrunque omnes facere autumant, sed tempore alio atque alio. Nam quod ajunt dilutiorem in iis sanguinem videri, nihil est, imo falsum est. Nullus prope aliis in venis ut crassior appareat aut nigrior.

At maximis omnibus difficultatibus obruuntur, qui quarta in opinione sunt. Coguntur hi dare (quod & dant ultroⁿ nonnulli) nulla tractus; nulla coctionis, nulla nutritatus omnis certa esse aut definita aut rata tempora. Quod quid aliud est, quam potissimum, idemque primum naturæ munus, quo continetur animantium omnium salus, sine quo non est vitam vivere, nulla lege stata aut præscripto regi, nullum modum, nullum ordinem tenere; omnia casu, omnia vi ac impetu, & atomorum tanquam incurfione geri atque administrari; tum vero insatiabili, sacraque & obsecra fame perpetuo partes omnes attineri absumique; hoc est in morbo continenter & sine intermissione, tanquam in Bulimo aut Diabete jacere? Coguntur dare, eandem venas ad eadem intestina relatas, simul radices esse, simul ramos: ramos, qua ferunt ad illa; radices, qua ab iisdem figunt. Coguntur dare, quamque venarum istarum partem simul trahere, simul pellere: pellere ad hepar, trahere

k Jaco. de
parib. ad 1.
l Avic. de
f. sum. l. c. 1.
Missa Anat.
c. 14.
m Zerbis ex
Concludatore
deff. 27.

m 1. Polit. 1.

n Laurent.
A Hist. q. 1.

trahere ab intestinis. Coguntur dare, eadem earundem venarum oscilla simul dilatari laxarique simul contrahi ac adstringi: illud, dum sanguinem deponunt & veluti vomunt in intestina; hoc, dum chylum ab eis exsorbent & hauriunt. Denique, cum in eo nobis omnes assentiant, fibrarum opem totum distributionis opus perfici, coguntur illud quoque dare, rectas omnes fibras, quæ tractui serviunt, trahi rapique simul & semel non in diversa modo, sed plane etiam in contraria.

a m. 7. 7. A.
v. c. d. d. 7. 7.
sum. 1. 6. 7.

Quod argumentum ita Iacobum* de Partibus, Zerbum, Carpum, alios toris adfixitque ac percussit, ut comminisci hermaphroditas nescio quas & androgynas in istis venis fibras, sine certo principio, sine capite (puto etiam sine cauda) coacti fuerint, quibus ut sanguifugis promiscue utrinque ad omnem tractum facultas, quæ præfideret, abuteretur. Cujus commenti absurditas, puto, in causa fuit, cur hoc argumentum à Laurentio et si propositum, sine tamen omni responsione, prudenti, ut opinor, silentio præteritum fuerit. Scilicet religiofiora sunt sacra tacita.

C A P. XXX.

*Vfus Physiologicus secundus. Exploditur vis aīμαδισμῶν-
nec venarum extra jecur. Galenus hic sibi non con-
sentit. Recentiores mire disselli, omnia miscent, omnia
movenet, nihil promovenet. Fibræ venarum carneæ ru-
braeque. Mercati somnium. Alia ejus ἀνομή. Pituita
in venis quomodo in sanguinem facessat? Musum in
dolito, qua se vi ad perfectionem vini promoveat?*

Sequitur secunda utilitas, quæ ad eam contro-
versiam pertinet, quæ de venarum extra jecur
aīμαδισμῶν, id est, sanguinis consecræ vi disce-
ptatur, tam incertam illam, dubiam & impedi-
tam, ut ne Galenus quidem ipse satis ea in re sibi
constiterit. Qui cum passim venis istis eam, de
qua agimus, vim concessisset*, tandem doctus
meliora (puto ab Æsculapio suo, qui dormienti
quoties libitum est, adstitit, & somnia pituita quam
purgati (sima misit) erroris eos arguit manifesti qui
ita sentirent.

a 1. ut par. 6.
16. 4. ut par.
17. 14. ut par.
c. 1. 2. 3. 4. 5.
nat. 2. 3. 4. 5.
Temper. de
diff. mor. 7.
b. 6. de plac. 8.

Quæ res, & Galeni inconstancia in diversissimas
sententias & contrarias adeo posteros distraxit,
aliis vim omnem ejusmodi* removenentibus à venis:
aliis omnem^d tribuentibus, & quidem solis: cæte-
ris dividendibus veluti sententiam, & ut Iupiter ille
Homericus, partem negantibus, partem dantibus.
Ajunt hi, vi & natura sua nihil tale potesse venas,
posse adjutas hepatis in eas influxu. Quem influ-
xum ita varie rursus interpretantur, facile ut vi-
deas omnia movere & nihil promovere, aut, quod
est verius, omnia dicere, & nihil dicere. Quid
enim varium magis, imo varum, dum alii, quod
influxit vim & facultatem esse pertendunt: cæteri
nequaquam, sed instrumentum tantum, calorem
scilicet, cujus ea vis sit, ut quamcunque succi in
venis partem proxime contingat, eam, quasi vir-
gula divina, aptam confestim reddat, ad formam
sanguinis induendum; eidemque ruborem indat,
qui primus est, inquit, actus caloris in dulci &
alba materia. Scilicet ut quondam^f,

c C. Simb. 6.
V. de v. c. 1. 2.
Argentarius.
d 1. de v. c. 1.
f 1. de v. c. 1.
f. 1. 2.

e 1. de Lav-
rentium.

f 1. de v. c. 1.
f. 1. 2.

*Grex totus in agris,
Tinus scabie cadit, & porrigine porci,
Inaque livorem conspecta ducti ab una.*

Quæ sententia Mercati est^g, qui ut nihil absurdi
prætermittat, nescio quas præterea nulli visas un-
quam, nulli videndas, nisi cui ipse oculos suos uten-
dos dederit, carneas in venis fibras comminisci-
tur, quarum rubro colore ita præafficiatur præ-
tingaturque idem succus, ut nullo negotio calefa-
ctus in sanguinem vertat: & ob quas fieri, inquit,
dum coquantur in venis humores, ut rubrum in
urinis sedimentum appareat. Præterea de sangui-
ne dicere in his genito, quem nonnullis eorum lan-
guinis rudimentum magis, quam sanguinem, seu,
ut Epicurus diceret, quasi sanguinem: nonnullis,
sanguinem quidem, sed imperfectum: cæteris, ab-
solutum expletumque omnibus suis numeris & pla-
ne sanguinem appellare placet.

Dirimunt totam controversiam venæ nostræ, &
secundum eos pronunciant, qui sunt à parte ne-
gante. Quippe docemur autopsia, vulgatis qui-
dem Mefaraicis abunde sanguinis esse, sed ab he-
pate immixti: in venis chyli, ne volam quidem ejus
aut vestigium extare, quæ tamen præcipuo pro-
fundamento erant adversæ sententiæ. Vnde idem
Mercatus, Ineptum, inquit, est dubitare, in sine venis
sanguinis vis effectrix & signum ignorantia. Clarum id
in Mefaraicis, quæ affluunt sanguine. Quam inaniter
quis non videt? Imo Mercate, ut servem illud
vetus,

λόγος ἀμείβει τὸ λόγος πρὸς τὴν αἵμα,
hoc est, ut pro verbis responsum verba, par pari, Ægri
syncipitis & cucurbitam quarentis signum est,
quod Mefaraicæ vulgatæ sanguine affluunt, ex eo
concludere illas aīμαδισμῶν, sanguificare. Nec vero
illud te juvare potest, quod Galenum alicubi di-
xisse adfers, pituitam in sanguinem verum fassese-
re iis in venis, quæ à cava perducuntur. Nihil hic
subsidii est, & in caducum parietem inclinans. Per
pituitam, crudorem sanguinis partem ille intelli-
git. Quomodo autem is in sanguinem perfectum
migret istis in venis, idem explicavit clarissime &
docuit, non venarum id ope, sed caloris in san-
guine insiti evenire, qui ubique in melius promo-
veat illud, cui insidet. Id quod egregie exemplo
musti in vase bullientis declaravit^h, non vasis be-
neficio (quis enim tam vacui capitis, hoc ut cre-
dat?) sed sui caloris ad sinceri vini perfectionem
provehentis sese ac promoventis. Quem locum
pulcherrimum à nemine hæcenus expositum dili-
gentius, id unum est ex illis, quæ vehementer &
sæpius miror. ἀλλὰ καθ' ὅσον ἔχει πρὸς τοὺς, sed dor-
mimus in majoribus.

C A P. XXXI.

*Vfus Physiologicus tertius. αἱματώσις in jecore ubi fiat,
& quomodo. Opiniones quinque. Quatuor aliorum
ea de re opiniones nihili. Latetis nulla cum venis hepa-
tis cæteris communio. Fissum jecoris.*

Non minus, quam de venarum extra jecur
aīμαδισμῶν, sanguificatione de ea, quæ perpe-
tratur in ipso jecore, vulgo litium & altercationis
est. Ut consulto eos præcream, qui hepati om-
nem plane αἱματώσις sanguificationem adimunt (nec
enim est hujus loci talis executio) adhuc quinque
minimum inter opiniones, tanquam totidem inter
scopulos jactamur, et si credere possumus, tantum
non ad scopulos imus.

Prima est, fieri sanguinem in venis hepatis folis, à vi innata illis atque ingenita. Quid hepar in- quies? Nihil magnum aut memorabile, & tamen aliquid. credo ne prorsus nihil sit & intellabile. Abundat venis, ut stabilis eas: ut veter coale- scere & in se mutuo confidere; ut calore suo vim earum ajuasomusulul, sanguificatricem promoveat.*

Secunda, absolvi in jecoris finis, quod jecoris fissum vocant, in quæ e portæ ramis excidat chy- lus, venis nihil ad eam penitus aut operæ aut vi- rum conferentibus.*

*Tertia, * perfici in portæ radicibus, non vi ipsis insita, sed accersita ab hepatis carne; perfectum, omnem in ejusdem hepatis carnem, nutriendæ illi deponi; inde, quod nutritioni superest, pelli & in cavæ radices abripi.*

Quarta, absolvi quidem in portæ radicibus, ut vult prior opinio, subeunte in eas per tenuissimas venarum tunicas vi, à carne hepatis derivata: cæ- terum absolutum nequaquam omnem, sed par- tem solum ejus, quanta scilicet alendæ sat est, ef- fundi in carnem, reliquum recta per anastomoses transsumi in radices cavæ.*

Quinta, naturam, & qualitates cæteras san- guinis à venis; ruborem ab hepatis carne, in quam efferatur, trahere, idque momento.*

Ex his quoque tot opinionum scopulis venæ no- stræ nos expediunt. Nam pro secunda pronun- ciant, quantum quidem mihi oculorum argumen- to & conjectura deprehendere adhuc licuit. Per carnem enim hepatis dispergi, in eam definire obliteraque usque animadverti, nulla interim no- tata deprehensaque cum vas ejus cæteris com- munionem muneris aut societatis. Quod sita est, quis non videt, in ipsam carnem hepatis exonerari chylum, elaborandum ibi in sanguinis formam at- que speciem, inde crassiorum ejus partem in ra- mos portæ, subtiliorem utilioremque in cavæ ra- dices excipere. Sed hæc clariora tempus faciet, & à nobis ipsis fusius alibi explicatur.

C A P. XXXII.

Vsus Physiologicus quartus. Stabilita Galeni de Lienis of- ficio sententia, Varolii nova, & antiqua Aristoteli- corum refutata. Lien nihil prorsus trahere à venis chyli potest. De Lacteis nulla ad eum pertinent.

Q Vartam cognitionis Lactearum nostrarum uti- litatem eam statuo vel maximam, quod de Lienis munere atque officio ejus ope ac beneficio explorato, scire aliquid nobis & judicare licet. Cujus rei ignoratio volumina jam nobis peperit, & pariet, nisi amicum aliquid fidus in tempore nos respiciat. Scribendum enim hodie est, & hoc tan- tum. Sed de re. Galeni constans* sententia est *ἀντιστροφὴν* esse, id est, respondere ex adverso Ve- sicæ felleæ, & ut illa tenuem ac igneam, quam bile- lem, ita hunc crassam & terrestrem sanguinis par- tem, quam melancholicam vocant, ab hepate in sese rapere, eandem mitigare in alimentum sui, & quod ejus edomari non potest, per constituta ei rei vasa abjicere.

Huic ejus sententiæ duæ ex adverso sunt. *Alte- ra*, quæ de officio quidem Lienis nihil mutat, id solum negat, ab hepate allicere succum, quem conficiat. Illud siquidem contendit, antequam ad

hepar perveniat chylus, segregatam jam à venis ejus per Splenicum ramum melancholicam ejus portionem, ad Lienem perferri, qui non alia quam hac causa infra jecur locatus sit, qua in unum Me- saraicæ coeunt ac congregiuntur. Hæc sententia recentior est, & Varolium* habet auctorem. *Al- tera*, socium hepati dat ad sanguinem conficien- dum, aut certe vicarium subdit, eaque re ferri ad ipsum non minus quam ad hepar chylum per Me- saraicas autumat. Antiquior hæc est, sed quam multi recentiores aut sequuntur, aut saltem dam- nare non audent. Putantur in ea Plato & Aristo- teles fuisse, quorum ille*, Lienem *ἐμπαρυσίον*, id est, expressam hepatis imaginem, ut quidem ver- tit Ficinus (nam Galenus aliter); hic*, *ἀντιχολόν* & *ἡπαρδύον*, id est, velut *ἡπαρ*, id est, hepati opposi- tum & velut adulterinum seu spurium hepar dixit: nec id tantum, sed vapores etiam vagantes diver- tere, attrahere ex ventriculo & concoquere, ut qui sanguineus sit. Quin Hippocrates quoque & Galenus authores laudantur, nec sine causa for- tasse. Hippocrates* quidem certe *ἡπατε ἀφείστο*, inquit, *Λιὲν ἐλαβόρει* sanguinem. Apud Galenum* hæc leguntur, *Λιὲν ἀττράβει* chylum à *στόμαχο* & *ἐν- τερσίμῳ*, ut hepar. Taceo Alexandrum*, Aretæum*, & alios.

Vtramque sententiam falsi damnant venæ no- stræ veræ chyli distributrices, & Galeni stabiliunt. Nulla enim vel minima de illis ad splenem perti- net, à qua chyli aliquam partem possit capere. Quod autem Archangelus commentus est, per vas venosum è ventriculo chylum rapere Lienem, vi- derit ipse, qui neganti hoc Aventhoi* & ejus ratio- nibus satisfaciatur.

C A P. XXXIII.

Vsus Physiologicus quintus. Reselluntur, qui putant è ventriculo quoque chylum exsugere per Mesaraicas. Pro- strata per morbos vires quo modo tam celeriter ab as- sumpto cibo resciantur? Cur in xanthochylis quoque tam cito reddant per urinas quæ bibere. Lactearum ne minima ad ventriculum.

S Vccedit quinta utilitas. Ea ad quandam de chylo, qui in ventriculo adhuc est, discepta- tionculam refertur. Tenet communis omnium opinio, ejus quoque nonnihil ad hepar recta abri- pi. Ac videtur id præter Galeni*, & Hippocra- tis* auctoritates, quas supra dedimus, experimen- tis quoque firmari. Videmus quotidie agros pro- stratos morbi vi exhaustosque, ab assumpto cibo tantum non momento vires recipere. Sed & ple- rique *ἡ xanthochylia*, id est eorum, qui immodico sese potu prolunt sive mergunt potius *δοσολυμῶν* *ἡ δαλίων*, amphorarum tempestates ac barathra ocysime quod biberunt*, idque paulo minus to- tum per urinas reddunt. At utrobique profecto longe propiore & compendiariorum magis via opus est dividendis in venas, quæ ingesta fuere, quanti sit ea, quæ per intestinorum & Mesaraicarum tan- tum tractum, & tot ambages ad hepar usque cir- cumagitur. Addunt his quidam multo per ven- triculum rectius tutiusque deduci chylum, quam per intestina, quæ perpetua bile infestantur, hu- more chyli benignitati inimicissimo & maxime adverso.

Hujus quoque opinionis figmentum delent venæ nostræ, quas & chylum trajicere ad hepar constat, & ventriculo tamen ne unica quidem vel minima sui propagine misceri.

Quæ in experimentum adducta sunt, nihil dicta labela aut veritatem infirmant. Nequaquam, ut agris vires mox à cibo redeant, præcipitatio eo ad hepar, & inde ad partes cæteras opus est. Vaporum id beneficio fit, qui excitati ab ingesto cibo instaurant, reficiunt ac recreant spiritus, quibus animantium vita tenetur & viget vegetque, ac confirmatur corpus. Illius vero tam celeris eorum quæ bibuntur, ad urinae vias præterlapsus longe alia sunt, quam quæ adfertur ab iis, causæ, quas diligenter Galenus^a exequitur: convenientia scilicet qualitatibus, humorum tenuitas, valorum laxitas ac amplitudo, robor trahentis facultatis; quibus conspirantibus, nulla tam longa esse via potest, quæ non facile acceleretur. Quod ita esse satis illud ostendit, quod in quibus alia ista sunt, ii nec per urinas semper quæ bibere, & sæpe longo post tempore profundunt. De bilis in intestina prolapsu, quod satis fit supra dictum est. Hinc repetantur. Mihi non placet *πυλωγάν*, id est, actum agere.

Occidit miseros crambe repetita magistros.

C A P. XXXIV.

Vsus Physiologicus sextus, cum aliis quibusdam. De venarum generibus, & numero nondum recte constitutum esse. Lacteis nostras vere esse portæ venas, non illas alias. VII. Famis causam non videri suctum venarum à ventre. VIII. Anasquæosis venarum in hepate, si modo sunt aliquæ, non cum usum præbere, quem vulgo volunt. IX. Cavitas cur nulla in jecore.

E Sto jam Sexta utilitas, ad *σέμμα* & commentum illud Anatomicum spectans, quo de venarum numero, ortu, nominibus constituitur. Aristoteles^a unicam venam numerat, quam magnam vocat, & cujus primum ortum à corde repetit. Medici duas agnoscunt, quas è jecore dispensant; quarum alteram, cavam nominant; alteram, portæ. Planum faciunt nostræ, nec numerum venarum recte adhuc initum vulgo, quarum tertium genus ipsæ sunt: & dari venas, quibus nulla proflus intercedat cum corde societas conjunctiove, præter illam, quæ ut cum principio, cum partibus omnibus illis est communis.

Illud præterea docent, quam portæ vulgo usurpamus, quamvis tueri id nomen possit, si primum ejus spectemus è hisso jecoris inter duos veluti sulcos progressum, quos *πύλας*, id est, portas vocavit Hippocrates^b etsi non primus, & alibi *καρτερ* *καρτερ*, si munus tamen æstimetur, cui destinata illa est, & à quo præcipue peti nominis ratio solet, nequaquam amplius eo recte appellari. Si enim verum est, quod ex Hippocratis & Asclepiadarum omnium sententia, nos monet Galenus^c, non alia re portæ venæ hoc nomen obvenisse, quam quod, ut bajuli perpurgatum in promptuario frumentum in communem Civitatis officinam percoquendum mitificandumque deferunt; ita ipsa per propagines suas Melaraicas directum ab alvo & intestinis secretumque à recrementis crassioribus alimentum ad hepar, locum coctionis

totius animalis communem comportat, quis est omnium qui ignorare possit, quanto in nostras rectius, quam in ullas alias nominis istius notio conveniat?

VII. De fame passim ita philosophantur, ut ejus causam statuant^d suctum venarum à ventre, qui veluti pro terra sit animalibus. Monent hæ venæ nostræ, nequaquam ita simpliciter & promiscue dici id posse. Si enim venas intelligimus illas exsiccando chylo delegatas (ut videntur intelligere qui eam, quam diximus, rationem famis ineunt, dum terræ ventriculum comparant,) scire licet, cum nullæ proflus earum ad ventriculum pertineant, nullo modo posse suctum eorum poni in famis causis. Sin accipimus alias illas, quas dispersas per omnem ventriculi regionem, à porta ex splenico maxime ramo videmus, amplius quaerendum & per otium considerandum, venæ quæ nutritioni & sanguinis ad ventrem traductioni dicatæ solum videntur, quemadmodum vel sugi ab aliis (ut ita loquar) vel ipsæ sugere à ventriculo recte dici possint.

VIII. Qui ingenio uti volent, is occasione nactus venas istas fortæ ad anastomosi quoque illa venarum per hepar, quam pingunt quidam an fingunt? aliquid conjiciat. Ut enim dentur, quod tamen perobscurum & incertum est, negatque Galenus^e, at certe non eum ulum præstiterint, quem populariter iis assignant, ut eorum commercio, excocto in radicibus portæ chylo, ad cavam aditus aperitur.

IX. Poterit idem nec difficile fortassis causam five reddere, five venari saltem ac indagare, cur nulla in hepate sit, ut in corde & ventriculo cavitas. Quæ res non parum tum Galenum^f ipsum, tum post ipsum Iacobum de Partibus^g, Carpum^h, Archangelumⁱ, Laurentium^j, alios exercuit & sollicitos habuit. Atque usus doctrinæ de Lacteis Medico cum Philosopho communes, quod adhuc sciam, hunc habent numerum. Sequuntur qui sunt Medico, quam Philosopho magis proprii.

C A P. XXXV.

De Vribus Medico magis propriis. Qui sint ii? Complura novorum morborum genera hæc venas nobis aperire. Chylosum fluxum, quem vocant, non fieri nisi harum venarum vitio. Easdem in causa esse Atrophie scirvi, quæ ab infestis Scirrho Mesenterii glandulis. De Melancholia hypochondriaca, & intermittentibus febribus quadam. Conclusio operis.

V Sus Medico magis quam Philosopho proprios, eos intelligo, qui ad Pathologiam & reliquam *πικρατον* Medicam magis attinent. Nam nec isti nullum utilitatis fructum præbet ista istarum venarum cognitio, quam inprimis novis Partium morbis augent quorum nihil minus, quam aliorum & causæ perquirendæ sunt, & habenda in promptu ac numerato signa, & instituenda curatio. Cui enim dubium esse potest, si dentur istæ venæ, quin ut in cæteris, ita in illis quoque omne tum Intemperiei, tum solutæ unitatis genus, locum suum habeant: & præter ista, etiam quæ in Compositione insunt vitia, illa præstent, quæ ad Figuram, & canales plus justo five laxatos patefactosque, five adstrictos clausosque referuntur.

Sed

^a 2. diff. nat. 1. ca. 5. a.

^a 1. diff. 1. 2. part. 5. cap. 3. part. 5.

^b 4. diff. 1. 2. c. 5. part. 5. libri de anatome.

^d 4. diff. 1. 2.

^e Galen. 13. comp. 1. 2.

^f 4. diff. 1. 2.

^g 4. diff. 1. 2.

^h in 1. 2. c. 5. part. 5. libri de anatome.

ⁱ in 1. 2. c. 5. part. 5. libri de anatome.

^j in 1. 2. c. 5. part. 5. libri de anatome.

^k in 1. 2. c. 5. part. 5. libri de anatome.

^l in 1. 2. c. 5. part. 5. libri de anatome.

^m in 1. 2. c. 5. part. 5. libri de anatome.

ⁿ in 1. 2. c. 5. part. 5. libri de anatome.

Sed hæc communiora sunt. illa singularia & præcipua, quod causas nobis aperiant, corporis affectuum non parum multorum vel ignoratas habentus, vel certe non plane satis & explorate cognititas ac perceptas.

De chyloso five albo, ut vocant, intestinorum fluxu quam varie disputetur apud Medicorum filios, quis est cui lateat? Nihil dubitationis res habet, si has venas semel videas. Certum & constitutum esse debet, cum is vitio venarum incidit chylum fugientium, ut est apud Galenum *, five vitium illud intemperies sit trahendi vim exolvens, five angustia viam intercipient, non nisi istarum venarum vitio incidere, præsertim cum medium canalem angustia occupat, unde vi perruptis valvulis & dilatatis, patefactisque oscillis in intestina (quod fieri quandoque minime est incredibile,) chylus refunditur. Secus, quemadmodum è Mesaraicis vulgatis rubro perpetuo succo interfusis possit albus purusque chylus in intestina excidere, ne suspicione quidem attingere possum.

Non dissimilis ratio illius Atrophiz est, in qua sentire cibum moles corporis vetatur, ob infestas Scirrho Mesenterii glandulas, arctatis inde stipatissimeque vas, quibus illæ objacent; cujus exempla apud Altmarum, Schenkium, & alios legere est. Non nisi adstrictione compressuque Lactearumstrarum incidere putanda est. Hæ enim solæ sunt, per quas utilis & necessaria toti corpori materia perlabitur, cujusque intercluso com meatu

necessario id defectum cibo, confectum penuria extabescit. Cæteris Mesaraicis si quid tale accidat, cum ad privatum solum intestinorum commodum comparatæ illæ sint, par profecto est, ut sola quoque intestina incommodum inde accipiant contrahantque.

De intermittentibus febribus, quarum sedem in Mesaræo non ignobiles Scriptores collocant: de Melancholia itidem, quam Hypochondriacam vocant & *Φυσώδη* flatulentam, an hæc quoque mala comitari affectis his venis possint, quærendum aliis relinquo; quemadmodum alia multa, quæ dici de iis quæque posse præclare intelligo. Non omnia aurora statim prima sua luce distinguit; & vetus verbum est, *Plus oculos videre, quam oculum*. Multa quotidie sua volenti cuique observatio subijciat: nec mihi sane aut quærendi labor, aut proficiendi cura deerit in posterum.

Nunc quidem ista habui, quæ & afferri in communem fructum, & proferri in lucem aspectumque posse putavi. Quæ si viris bonis & doctis (his scribimus) non improbata omnino fuerint, magno id in lucro deputabo: sin, istud ipsum quoque in rem meam vertet. Discam meliora, errasse admonitus. Quod quam facile fieri à me poterit, in re præsertim nova, non sum nescius. Homo sum, humani à me nihil alienum puto⁴. Nihil hu-

^b Termina
Hæmorrhoidum.

F I N I S.



Index Capitem de Venis Lacteis.

- CAP. I. Considerantur quæ toti Mefenteris communia. Nomen, &c. Pag. iij
II. Explicatur proprie Mefenteris partes fingularem, Membrana, &c. v
III. Ad enarrationem Vaforum Mefaricarum aggregis. Quot ea vulgo? Primo de vasis explicatum. Eorum Origo, &c. vj
IV. Agitur de venarum Mefaricarum aliorumque, & vifum, li tres Galeno, & vulgo Medicorum, aduentus, aquarum, Adgents. Ex vii duo primi relictis, tertio alius & novus additus ex ipfo Galeno, Galenus nullibi dixit aduentum & Adgents fieri eodem tempore. Laurentius Hippocrati non recte cepit. viij
V. De arteriis Mefaricis. Eorum Nomen, &c. viij
VI. In actione arteriarum & vifus inquitur. An Chyli quippiam in fe aliantur. Galeni & Hippocrati in eam rem fententia expofita, & in medio reftituta. Antior lib. de vilitate refpiratorum, & Parvulus accurate confultus. Sanguis per quas vias e dextro cordis fin in finiftrum fubeat. Cui dicitur in corpore. ibid.
VII. Paucæ de Nervis Mefaricis. Eorum Numerus. Magnitudo. Progreffus. Inferio. Principium qua originis, qua divifionis. Vfus. Laudatus Fallopius. Fernelius reprehenfus. Arterius cur contigui xfi nervi.
VIII. Dicendum propofitio, & ordo. Antecæpta rei informatio, que Ciceroni? xj
IX. Hiftoria prime vaforum illorum inventionis cum fide narrata. Obiter multa notata ad illarum fectione perquirendum. ibid.
X. Præfentenda ad abfoluta horum vaforum perceptionem. Ea duo effe in re præfenti, non hypoth. Notionem nominis, & eorum vifum, Pægo-vifum ad verum fcientiam neceffitas. Pægo-vifum non effe vox Epicuro propria. vñ illi poteflate effi tota fcientia. xij
XI. Data hic vafis fua nomina. Eadem explicata, & ftabilitas confenfus qua veterum, qua recentiorum. Novis rebus nova nomina quot modis poni poffint. Vene alibi Celfi. Fala Mæla Arabum. Rhaſis rejectis. Vene verbum bonis & antiquis auctoribus laudiffime patet. Ejus eymon. La- &tes vox in rebus diverſiffimis uſurpata ævo qua præſens, qua noſtra. In eam rem compulſa adnotata. Plinii vaſula lectio deſenſa contra Da-lechempium. Perſio, & Horatio lux. Laporum laltes apud Lamprid-ium. Ex Hippocrate Probi locus declaratur. Laſitum Erymon non-ium. Cicero obiter correctus. Scaliger laudatus. Quæ præter morem fuum à Platino diſſidet. xij
XII. Quæſitum de vaforum noſtrorum exiſtentia. Primum, verè fin neſſe Effi, monſtratum diſſe ſenſus, & conſequentur ratione. Senſum veritas & evidentiæ præ omni ratione eſt. In eam rem Ariſtoteles & Galeni teſtimonia. Anatomicum non niſi oculis fui credere debet. xiiij
XIII. Quæſitum alterum. Novum inventum fin, nec ne? Recte viſſe veteres alia chylis, alia ſanguini deberi vaſa; illa tamen ignorare. Era-ſiſtratum noſſiſſe, nec agnoſſiſſe. Hippocratis, Plaoi, Ariſtoteles, Stocis, Herophilus, ipſe Galenus, variè illuſtrati, & explicati. Item Pollux, Rhaſis, quidam recentiores. xv
XIV. Ex occaſione quæſiſſimæ dicitur. Prima: Quæ cauſa in ſanctis laſuerit? Triplex videtur. Excufati veteres, non Galenus, qui videtur nufſe omnino deſiſſe. Secunda: Cur ita repente obiterent & exole-ſcent? Plores cauſas allatas, res in medio reſtituta. xvj
XV. Tranſiſſum ad ea, que Anatomes propria. Quid ea nobis? Tribus eam rebus abſolutis. Quorum prima hiſtoria patet. Que quatuor quaſi in parte perpendit. Ariſtoteles in his omnibus Galeno quæſiſſimæ. xvij
XVI. Perpenditur horum vaſorum ſubſtantia. Sunt & genere venarum. Sunt partes compoſite & diſſimilares, non ſimilares & ſimplices. De Ga-leni & Ariſtoteles hac in re ſententia cum cura inſpectum. Iuſſus, Syl-ſus, Fallopij expofita. Partes componentes venam reſt. Membrane, Fi-bre, Caro. Ariſtoteles iterum explicatum, notatus Caprivacius, ruiſus Fallopij, & cum eo Feſalius. xvij
XVII. Explicata Tempories, & que eam confequentur. Iomertus obiter perſtrictus. Galenus explicatus. xvij
XVIII. Ex is, que accidunt examinata. Conformatio, &c. ibid.
XIX. Diſtium diſtincte de horum venarum ſiu (anſiſſimæ) Conſiderata illarum tum Poſito (ſenſu), tum communis cum partibus cæteris (anſi-ſſimæ). In hac ſerſum, Origo, Finis, Inferio, Progreſſus. An poris forata? Videt. Non tamen ad vaſis, & cum arteriis. Principium le-ſori, an Pancreti debeant? An vena ſui ſui generis? Inſus jejuni in-ſenti manituri vena cauſa. Galenus hic reſtitutus, & ex occaſione Fallo-pij. Cruiſta inſeſſimorum. Ventruculus hic vena caret. xx
XX. Actio partis antecedit uſum. Quid ea nobis in re præſenti? Quoſi-plex? Agendum de ea Anatomico quomodo diſſigentiſſimæ, & cur? xxi

GVILIELMI HARVEI
ANGLI
EXERCITATIO
ANATOMICA,
DE
MOTV CORDIS
ET SANGVINIS
IN ANIMALIBVS.

Ex recensione

IOHANNIS ANTONIDÆ
van der LINDEN, Med. Prof.

Serenissimo & Iuvicissimo

C A R O L O,
MAGNÆ BRITANNIÆ,

Franciæ & Hybernix Regi,

Fidei Defensori.



Erenissime REX,

COR animalium, fundamentum est vitæ, princeps omnium, Microcosmi Sol, à quo omnis vegetatio dependet, vigor omnis & robur emanat. Rex pariter regnorum suorum fundamentum, & Microcosmi sui Sol, Reipublicæ Cor est, à quo omnis emanat potestas, omnis gratia provenit. Quæ de motu cordis hîc scripta sunt, Majestati tuæ (uti hujus seculi mos est) offerre eo magis ausus sum, quod ad hominis exemplum humana pene omnia. & ad cordis, Regis plurima. Regi itaque non inutilis cordis sui notitia, tanquam actionum divinum Exemplarium: (sic parvis componere magna solebant.) Poteris saltem Regum optime, in fastigio rerum humanarum positus, una opera & humani corporis principium & Regiæ simul potestatis Tuæ effigiem contemplari. Suscipe itaque, humilime precor, Serenissime Rex, usitata benignitate & clementia de corde nova hæc, qui ipse novus splendor hujus seculi, & totum vere cor es, princeps virtute abundans, ac gratia; cui acceptum jure merito referimus, quicquid nostra Anglia boni, quicquid vita nostra jucundi, habet.

Augustissime Majestatis Tue

devotissimus servus

GVILIELMVS HARVEVS.

Excellentissimo & Ornatissimo Viro D.

D. A R G E N T,

Collegii Medicorum Londinensium Præfidi Amico
 suo singulari cæterisque Doctissimis Medi-
 cis Collegis suis amantissimis.

S. P. D.



Meam de motu & usu cordis, & circuitu sanguinis sententiam E. D. D. antea sapius in prælectionibus meis Anatomicis aperui novam. Sed jam per novem & amplius annos multis ocularibus demonstrationibus in conspectu vestro confirmatam, rationibus & argumentis illustratam, & ab objectionibus doctissimorum & peritissimorum Anatomicorum liberatam, toties ab omnibus desideratam, à quibusdam efflagitatam, in lucem & conspectum omnium hoc libello produximus. Quem nisi vobis transmissum E. D. D. minus sperarem prodire posse integrum & tutum; cum pene omnium illarum observationum, ex quibus aut veritatem colligo, aut errores redarguo, è vobis plurimos & fide dignos appellare possum testes; qui dissectiones meas vidistis, & ocularibus demonstrationibus eorum, quæ hic ad sensum palam assevero, assistere candide & astipulari consuevistis. Et cum, contra receptam viam, per tot secula annorum ab innumeris, iisque clarissimis doctissimisque viris tritam & illustratam; sanguinem iter novum metiri suum & revolvere solus iste liber affirmaret; ne arroganter nimis factum videretur, si libellum istum, per aliquot abhinc retro annos alioquin perfectum, vel in publicum exire vel transiret permississem, summopere verebar; nisi prius vobis proposuissem, & per autopsiam confirmassem, vestris dubiis & objectionibus respondissem, & Præfidi ornatissimi censuram in favorem accepissem. Persuasissimum veruntamen habui, quod si coram vobis nostro Collegio tot tantisque viris doctissimis nobilitato, propositum sustinere potuerim, ab aliis tum demum minus pertimescendum fore, & jam illud, quod mihi à vobis, ob amorem veritatis, contigit unicum solatium, ab omnibus aliis, qui similiter sint philosophati, non minus esse sperandum. Philosophi enim veri, qui amore veritatis & sapientiæ flagrant, nunquam se tam *oſes*, sapientia plenos reperiunt, aut suo sensu abundant, quin veritati, à quocunque & quodocunque venerit, locum dent. Nec tam angusti animi ut credant quamvis artem aut scientiam adeo omnibus numeris absolutam & perfectam à veteribus traditam, ut aliorum industria,

& diligentia nihil sit reliquum: cum profiteantur plurimi, maximam partem eorum quæ scimus, eorum quæ ignoramus minimam esse, nec ita traditionibus & præceptis quorumcunque addicti, inservire se patiuntur Philosophi, & libertatem perdunt, ne oculis propriis fidem adhibeant, nec ita in verba jurant antiquitatis magistræ, ut veritatem amicam in apertis relinquunt, & in conspectu omnium deferant. Sed sicut credulos & vanos, omnia prima facie admittere & credere, ita manifesta sensui non videre, & Luce meridiana diem non agnoscere, stupidos & insensatos pariter existimant. Et non minus poetarum fabulas, & vulgi deliramenta, quam Scepticorum epochen in via philosophica declinare docent. Omnes item studiosi, boni, honestique, nunquam ita passionibus indignationis, invidia, obrui mentem sount, quo minus audiant æquo animo quæ pro veritate proferantur, aut rem vere demonstratam intelligant. nec turpe putant mutare sententiam si veritas suadet & aperta demonstratio: nec errores, licet antiquissimos deferere arbitrantur inhonestum. Cum optime norint quod humanum sit errare, decipi, & quod casu multa reperta esse contingat quæ discere quisvis à quovis possit, à juvene senex, à stulto intelligens.

Verum isto tractatu, Collegæ Amantissimi, in authorum & scriptorum Anatomicorum nominibus, operibus & sententiis recensendis, exagrandis memoriam meam, & lucubrationes, multamque lectionem & magnum volumen ostentare nolebam. Tum quod non ex libris, sed ex dissectionibus, non ex placitis Philosophorum, sed fabrica naturæ discere & docere Anatomem profitear. Tum quod neque è veteribus quemquam debito honore defraudare, neque è posterioribus quemquam irritari æquum censeam, aut moliar. Neque cum iis qui in Anatomicis antecelluerunt, & me docuerunt, manus conferere, aut dimicari honestum putem. Accedit, quod nec falsitatis crimen, in quampiam veritatis studiosum mea sponte inurere vellem, nec quenquam erroris labe infumare. Sed solam veritatem sector, & omnem tum operam, tum oleum ed contuli, ut aliquid bonis gratum, doctis commodum, & rei literariæ utile in medium proferre possim. Valete Domini D. Excellentis, & Anatomico vestro favete

GVILIELMO HARVEO.

Quo demonstratur, quæ hæcenus scripta sunt de motu
& usu cordis & arteriarum, minus firma esse.



DE cordis arteriarumque motu, pulsu, actione, usu, & utilitatibus cogitanti operapretium est, quæ prius ab aliis mandata sunt literis evolvere, quæ vulgo jactata & tradita animadvertere, ut quæ recte dicta confirmetur: quæ falsa, diffinitione anatomica, multiplici experientia, diligenti, & accurata observatione emendantur.

Pene omnes huc usque Anatomici, Medici, & Philosophi supponunt cum Galeno, eundem usum esse pulsu, quem respirationis, & una re tantum differre, quod ille ab animali, hæc à vitali facultate emanet: reliquis, vel quod ad utilitatem, vel quod ad motus modum spectat, similiter se habentibus; unde affirmant (ut Hieron. Fabr. ab Aquapendente libro suo de respiratione nuperime edito) quod quoniam non sufficit pulsu cordis & arteriarum ad eventandum & refrigerandum; ideo à Natura pulmones circa cor fabricatos esse. Hinc patet quod quæcumque dixerint priores de Systole & Diastole, de motu cordis & arteriarum, hæc omnia ad pulmones respicientes eos tradidisse.

Cum vero aliter se habeat motus & constitutio cordis, quam pulmonum; aliter arteriarum, quam pectoris, alios exinde usus & utilitates exoriri verisimile est, differreque plurimum cordis & similiter Arteriarum pulsu & usui, à pectoris & pulmonum. Si enim ipsam usibus inserviant pulsu ac respiratio, & in Diastole introsument aërem in cavitates suas arterie (uti vulgo dicunt,) & in Systole per eosdem poros carnis & cutis fulgines emittant, nec non medio tempore inter Systolem & Diastolem aërem continent; & quovis tempore aut aërem, aut spiritum, aut fulgines. Quid itaque respondeant Galeno, qui librum scripsit, Natura sanguinem contineri in arteriis, & nihil præter sanguinem, nimirum neque spiritum, neque aërem, sicut ab experimentis & rationibus in eodem libro facile colligere licet. Et si in Diastole replentur arterie ab aëre introsumpto in majore pulsu, majore subeunte aeris copia: ergo magno existente pulsu, si totum corpus in balneum immergeris vel aquæ vel olei, necesse est pulsum statim aut minorem esse, aut tardioorem multo; cum per corpus ambientis balnei aërem intra arterias permeare difficilius sit, si non impossibile. Similiter, cum omnes arterie tam profundæ, quam cutaneæ, eodem tempore & pari velocitate distendantur; quomodo poterit aer tam libere & celeriter per cutem, carnem, habitumque corporis in profundum pertransire, quam per cuticulam solam. Et quomodo Embryonum arterie forinsecus in cavitates suas aërem per ventrem maternum, & per corpus uteri atrahant? Vel quomodo Phoca, Balæna, Delphines, cetaceum omne genus & pisces omnes in profundo maris arteriarum suarum Diastole & Systole per immersum aquæ massam celeri pulsu aërem introsument & emittunt? Dicere vero quod aërem implantatum in aqua absorbent, & in aquam fulgines suas reddant, figmento haud ab simile. Et si in Systole arterie per poros carnis & cutis fulgines à cavitatibus illorum expellunt, cur non

item spiritus? quos dicunt etiam in illis contineri, cum spiritus multo tenuiores fuliginibus sint. Et si cum in Systole, tum in Diastole aërem arterie accipiunt & reddunt, uti pulmones in respiratione; cur non & hoc faciunt inflicto per arteriotomiam vulnere? Secta trachea per vulnus aërem ingredit & regredit, duobus contrariis motibus, palam est. Secta vero arteria statim uno continuo motu sanguinem vi protrudit, & non aërem vel ingredit vel regredit, manifestum est. Si pulsus arteriarum partes corporis refrigerant & eventant, uti pulmones ipsum cor; quomodo dicunt vulgo arterias à corde in partes singulas vitalem sanguinem differre remotissimum spiritibus vitalibus? qui partium calorem soveant, sopitum suscitent, & quasi absumptum resarciant, & quomodo (si ligaveris arterias) statim partes non modo torpent, frigent, & quasi pallide cernuntur, sed & alii tandem desinunt, quod secundum Galenum contingit, quia calore, qui per omnes partes superne à corde confusus erat, privatae sint: cum hinc pateat arterias magis calorem partibus deferre, quam refrigerium & eventationem. Præterea, quomodo Diastole simul spiritus à corde atrahantur ad calefaciendas partes, simulque ab externo refrigerium? Amplius tametsi iisdem usibus pulmones, arterias, & cor inservire aliqui affirmant, tamen cor spirituum officinam esse, & arterias spiritus continere, transmissere etiam dicunt: Pulmones autem spiritus facere aut retinere, contra Columbi opinionem negant. Quin & cum Galeno, quod sanguis continetur in arteriis, & non spiritus, contra Erasistratum asseverant. Videntur istæ opiniones ita inter se pugnare & sese invicem refellere, ut omnes non immerito sint suspensæ. Sanguinem in arteriis contineri; & arterias solum sanguinem deferre tum experimento Galeni, tum in arteriotomia, tum in vulnerebus, manifestum est, quoniam una arteria dissecata, quod etiam Galenus affirmat plurimis in locis, unius semihora spatio totam massam sanguinis ab universo corpore magna & impetuosa profusione exhaustiur. Experimentum Galeni tale est. Si, inquis, lib. quod sang. cont. in arter. funiculo arteriam utriusque ligaveris & medio rescisso secundum longitudinem, quod inter duas ligaturas in arteriis comprehensum erit, nihil præter sanguinem esse reperies. Et sic probat, sanguinem solum continere. Unde etiam similiter nobis ratiocinari licet: Si eundem sanguinem, qui venis similiter ligatis & rescissis inest, inveneris in arteriis (quem in mortuis & aliis animalibus sæpius ego expertus sum) eadem ratione similiter concludere nos possumus, arterias eundem sanguinem, quem vena, & nihil præter eundem sanguinem continere. Aliqui dum dissolvere difficultatem sentiant, spirituosum & arteriosum esse sanguinem affirmantes, tacite concedunt, arteriarum munus esse sanguinem à corde in universum corpus deferre, & repletas sanguine arterias esse. Spirituosus enim sanguis, non minus sanguis est. Etiam sanguis prout sanguis, & qui in venis fluit, eum spiritibus imbuti nemo negat. Quod si, qui in arteriis est, sanguis uberiori spirituum copia turgens, tamen existimandum est hos spiritus à sanguine inseparabiles esse, sicut illi in venis, & quod sanguis & spiritus unum corpus constituant (ut serum & butyrum in lacte, aut calor in aqua calida)

calida) quo corpore replentur arteria & cuius corporis distributionem à corde arteria prestant, & hoc corpus nihil aliud, quam sanguis est. Si vero hunc sanguinem in arteriis, è corde per arteriarum Diafolem attrahi dicunt, videntur asserere, quod arteria sua distentione sanguine isto replentur, & non aëre ambiente, uti prius. Nam si etiam aëre ab ambiente repleri dicant, quomodo & quando recipient è corde sanguinem? Si in Systole id fiat, continget impossibile, repleri arterias, cum contrahantur, vel repleri & non distendi. Sin autem in Diafole, in duos usus contrarios, & sanguinem & aërem, & calorem & frigus simul recipient; quod est improbabile. Amplius cum affirmant, simul Diafolem cordis & arteriarum esse, & simul Systolem, alterum est inconveniens. Quomodo enim cum simul distendantur duo corpora, sic invicem connata, alterum ab altero attrahat, vel cum simul contrahantur, alterum ab altero recipiat aliquid? Insuper forsitan impossibile est, aliquid posse aliud corpus ita in seipsum attrahere ut distendatur, cum distendi sit pari, nisi ut spongia prius vi ab externis confrita, dum redeat ad constitutionem suam naturalem. Tale autem aliquid in arteriis posse esse, difficile est fingere. Sed arterias distendi, quia replentur, ut sacculi & utres, atque non repleri, quia distenduntur ut folles, facile & aperte demonstrare me posse, & palam antehac demonstrasse existimo. Attamen libt. quod lang. cont. in arter. Galeni experimentum in contrarium sic se habet. Arteriam nudam secundum longitudinem incidit, calammumque vel concavam peritiam fistulam immittit, quo & sanguis exire non possit, & vulnus obtinetur. Quoad usque (inguit) sic se habet, arteria tota pulsabit: cum primum vero obductum filum super arteriam, & fistulam in laqueum contrahens arteria tunica calamo obstrinxeris, non amplius arteriam ultra laqueum palpitare videbis. Nec ego feci experimentum Galeni, nec recte posse fieri vivo corpori ob impetuosi sanguinis ex arteriis eruptionem puto, nec obtinebit sine ligatura vulnus fistula; & per fistulam cavitatem ulterius profunde sanguinem non dubito, tamen hoc experimento & probare videtur Galenus facultatem pulsficam per tunicas arteriarum, à corde manare, & quod arteria dum distendatur, ab illa facultate pulsfica replentur, quia distenduntur ut folles, non distenduntur, quia replentur, ut utres. Sed & in arteriotomia & vulneribus contrarium manifestum est: sanguis enim saliendo ab arteriis profunditur cum impetu, modo longius, modo propius vicissim proficundo; & salus semper est in arteria Diafole & non in Systole. Quo clare apparet, impulsu sanguinis arteriam distendi. Ipsa enim dum distenditur, non potest sanguinem tanta vi projicere potius aërem in se per vulnus attrahere deberet, secundum ea, que vulgo de arteriarum usu iactata sunt. Nec crassities tunicarum arteria nobis imponat, facultatem pulsficam provenire à corde per ipsas tunicas. Nam quibudam animalibus arteria à venis nihil differunt, & extremis partibus hominis & parvis disseminationibus arteriarum, quales in cerebro, manu, &c. nemo per tunicas, arterias à venis poterit distinguere: eadem enim utrique tunica. In aneurismate præterea ex incisa vel exesa arteria genito, eadem omnino pulsatio cum reliquis arteriis, & tamen non habet tunicam arteria. Hoc mecum doctissimus Riolanus lib. VII attestatur. Neque eundem usum pulsus ac respirationis quis existimet, quod ipsidem causis quibus respiratio, crebriores, majores, celeriores fieri cernat, vel uti cursum, iram, balneo, aut quovis calfaciente, ut dicit Galenus. Nam non solum illud experimentum est in contra-

rium (quod solvere Galenus nititur) cum ab immediata repletionem pulsus existant majores, respiraciones minores; sed & in pueris pulsus frequentes, cum respiratio interim rara. Similiter in timore & curis & anxietate animi, imo aliquibus in febribus pulsus celeres, frequentes; respiraciones vero tardiores. Hac & huiusmodi incommoda positas opiniones de pulsu & usu arteriarum consequuntur: non minus forsitan etiam ea, que de usu & pulsu cordis affirmantur, difficultatibus plurimis & inextricabilibus implexa sunt. Cor affirmant vulgo fontem & officinam vitalis spiritus esse, quibus vitam singulis partibus largiatur; & tamen negant dextram ventriculorum spiritus facere, sed præbere duntaxat alimentum pulmonibus, unde dicunt piscibus deesse dextrum ventriculorum cordis, & omnino omnibus deesse quibus non sunt pulmones: & quod dexter ventriculus cordis, pulmonum gratia sit.

I. Cur, quæso, cum eadem pene constitutio sit utriusque ventriculi, eadem fabrica fibrarum, lacertulorum, valvularum, vasorum, auricularum, & eodem uterque in dissectionibus refarciatur sanguine, similiter nigricante, similiter grumescente; cur, inquam, cum eadem sit utriusque actio, motus pulsus, variis eos usibus tam differentibus existimemus destinatos fuisse? Si valvule tricuspidales tres sub dextri ventriculi ingressu impedimento sint sanguinis regressui in venam cavam; & si semilunares tres ille in orificio arteriosa vena ut sanguinis regressum impeirent facta sint, cur, cum similiter se habeant, sinistro ventriculo similiter sanguinis tum egressus, tum regressus impediendo factas esse negemus?

II. Et cum magnitudine, forma, situ, omnino eodem pene modo sinistro se habeant ventriculo, quo in dextro, cur dicunt hic spiritum egressui & regressui impedimento esse, in dextro vero sanguinis? Idem org an non simile non videtur sanguini, & spirituum motus similiter impedire apte posse.

III. Et cum meatus & vasa sibi invicem respondeant magnitudine, videlicet vena arteriosa & arteria venosa, cur unum privato usui destinatur: videlicet alendis pulmonibus, alterum publico?

IV. Et quomodo probabile est, uti notavit Realdus Columbus, tanto sanguine opus esse ad nutritionem pulmonum, cum hoc vas, vena videlicet arteriosa, exuperet magnitudine utrumque ramum distributionis vena cava descendens cruralem?

V. Et, quæso, cum pulmones tam prope sint, & vas tam amplum existat, & ipsi continuo motu agitentur, quid est quod dextri ventriculi pulsus opus sit? & quid est quod Natura, gratia alendorum pulmonum, alterum ventriculorum cordi adungere necesse habeat?

VI. Cum dicunt sinistrum ventriculorum & dextro cordis sinu materiam attrahere ad spiritus condendos, aërem videlicet & sanguinem, & pariter in aortam spirituosum sanguinem distribuere, & hinc fuliginem, videlicet retro per arteriam venalem remitti in pulmones, illinc spiritus in aortam: quid est quod separationem facit, & quomodo hac illuc spiritus fuliginem citra permissionem aut confusionem committant? Si tricuspidales mitrales non impediunt egressum fuliginum ad pulmones, quomodo impediunt aëris? Et quomodo semilunares prohibebunt regressum spirituum, subsequente Diafole cordis, ab aorta? Et omnino, quomodo dicunt per arteriam venalem spirituosum sanguinem distribui à ventriculo sinistro in pulmones, nec interim impediunt tricuspidales? cum affirmant aërem per idem vas à pulmonibus in ventriculorum sinistrum ingredi, cuius regressui tricuspidales

ille valvula impedimento esse voluerunt. Deus bone! Quomodo tricuspides impediunt aëris egressum, & non sanguinis?

VII. Amplius, cum venam arteriosam, vas amplum, magnum cum tunica arterie factum, non nisi privato & uni usui, videlicet alendis pulmonibus destinaret; cur arteriam venalem vix pari magnitudine cum tunica vena molli & laxa, pluribus usibus, tribus vel quatuor videlicet fabricatam asseverant? Volunt enim per ipsam aërem & pulmonibus in sinistram ventriculū permeare: volunt similiter & corde in pulmones fulgines per ipsam remeare: volunt spirituosū sanguinis portionem à corde per ipsam in pulmones ad ipsos refocillandos distribui.

VIII. Si fulgines & aërem à corde illas, ad cor hunc per eundem tubulum volunt transmitti; tam contrariū motibus & usibus unum vas & unam viam fabricare Natura solita non est, nec videre uspiam contigit.

IX. Si fulgines & aërem hac via permeare & remeare contendunt, ut per Bronchia pulmonum, quare exsecta vel incisa arteria venosa, neque aërem, neque fulgines reperire in dissectione possumus, & unde semper referant crasso sanguine arteriam venosam istam videmus, & nunquam aëre, cum in pulmonibus & aërem remanentem cernimus?

X. Si quis experimentum Galeni faceret, & cani adhuc viventi tracheam incidere, & foliis pulmones aëre implet per vim, & distensos ligaret fortiter, idem mox dissecto pectore multam aëris copiam in pulmonibus usque ad extremam illorum tunicam invenerit, sed neque in arteria venosa, neque in sinistro ventriculo cordis quidquam. Si aërem & pulmonibus in cane vivente aut cor attraheret, aut pulmones transmitterent, multo magis hoc experimento id facere deberent. Imo in administratione Anatomica inflatis cadaveris pulmonibus, etiam aërem statim huc ingredi, si ulli essent meatus, quis dubitaret? Tam magni vero faciunt hunc usum arteria venose, videlicet ad aërem & pulmonibus cordi deferendum, ut Hier. Fabr. ab Aquapendente huius vasis causa pulmones facios fuisse, & hanc esse præcipuam pulmonum particulam contendat.

XI. Sed amabo, si aëri deferendo arteria venosa condita sit, cur ejus constitutio est vena?

XII. Fissiliū potius opus esset Natura & quidem quales Bronchia sunt annularibus, ut semper pateant & neque concidant, & ut omnino vacua sanguine permancant, ne humor aëris transitum impediatur, ut manifestum est, quando pulmones punita Bronchia vel infarcta vel paululum admissa laborant, sibilō & strepitu oborto dum respiramus.

Minus toleranda illa opinio, quæ cum duplicem materiam, aëream & sanguineam necessariam esse ad spiritus vitales efficiendos supponit, sanguinem per mediastini cordis cacas porositates de dextro in sinistram ventriculū transfundere, aërem per magnam vas Arteriam venosam & pulmonibus attrahi contendit, & proinde in septo cordis porositates plures esse producendo sanguini accommodatas. Sed, me hercule! porositates nullæ sunt, neque demonstrari possunt.

Septi enim cordis substantia densior & compactior est quavis altera corporis particula, exceptis ossibus & nervis. Sed si adfessens foramina, quomodo (cum simul uterque ventriculus distenditur & dilatatur) alterum ab altero quidpiam, aut sinistram sanguinem de dextro exhaurire possibile est? Et cur non potius dextrum spiritus ex sinistro, quam sinistram sanguinem de dextro ventriculo per eadem foramina evocare crediderim? At mirum & incongruum certe, sanguinem per cacos obscurosque ductus, & aërem per patentissimos eodem instanti commodius attrahi. Et cur quæso pro sanguinis transitu in sinistram ventriculū ad cacas & invisibiles porositates incertas obscurasque confugiunt, quando adfess per arteriam venosam tam patens iter? mirum mihi certe est, quod per cordis septum crassum, durum, densum, compactissimum viam facere vel fingere potius maluerunt, quam per patens vas venosum, aut etiam per pulmonum substantiam raram, laxam, molliissimam, spongiosam. Præterea si per septi substantiam sanguis permeare potuisset, aut & ventriculū imbiri, quid opus esset vena & arteria coronalis ramulis ad ipsius septi nutritionem divaricatis? Quod notatu dignissimum, si in factu (quando omnia rariora, molliora) Natura coacta fuit per foramen ovale sanguinem in sinistram ventriculū & vena cava per arteriam venosam traducere; quomodo verisimile positi esse quod in adulto per cordis septum jam densius atate factum tam commode nulloque negotio transfundat?

Andreas Laurentius lib. ix, cap. xi, Quæstione xii, authoritate Galeni de loc. affect. lib. vi, cap. vii, & experientia Hollerii sulis, asserit & probat & cavitate pectoris serositates & pus Empyricorum in arteriam venosam absorptum per sinistram ventriculū cordis, & per arterias cum urina vel cum facibus alvi posse expelli: recenset quinetiam in confirmationem casum cujusdam Melancholici, qui sæpius deliquitum animi passus à paroxysmo liberatus fuit emissionē urine turbide, fetide, aëris; quo genere morbi tandem confectus, dissecto cadavere talis substantia, qualem mingebat, neque in vesica, neque in renibus uspiam apparebat, sed in cordis sinistro ventriculo & cavitate pectoris plurima: unde gloriatur se horum affectuum talem prædixisse causam. Ego autem non possum non mirari, cum ipse materiam heterogeneam posse eodem tractu evacuari arduarar & prædicaverat; quod iidem viis sanguinem & pulmonibus in sinistram ventriculū secundum naturam deduci convenienter cernere aut asseverare non potuit aut noluit.

Itaque ex his & hujusmodi plurimis patet, quam ea quæ dicta antebac à prioribus de motu & usu cordis & arteriarum, aut inconvenientia, aut obscura, aut impossibilia diligentius consideranti apparant: utile proinde admodum erit paulo penitus rem introspicere, arteriarum & cordis motus non solum in homine, sed & aliis universis animalibus cor habentibus contemplari: quinetiam vivorum dissectione frequenti multaque autopsia veritatem discernere & investigare.

G V I L I E L M I H A R V E I
A N G L I
D E M O T V
C O R D I S E T S A N G V I N I S
I N A N I M A L I B V S,

Exercitatio anatomica.

C A P. I.

Causa, quibus ad scribendum Author permotus fuerit.



Vim multis vivorum dissectionibus (uti ad manum dabantur) animum ad observandum primum appuli, quo cordis motus usum & utilitates in animalibus per autopsiam, & non per libros aliorumque scripta invenirem: Rem arduam plane & difficultatibus ita plenam continuo reperi, ut cum Fracastorio motum cordis soli Deo cognitum esse pene opinarer. Nec enim quomodo Systole aut Diastole fieret, nec quando aut ubi dilatatio & contractio existeret, recte potui internoscere, propter celeritatem scilicet motus qui in multis animalibus nictu oculi, quasi trajecto fulgure, se in conspectum exhibuit & subtraxit illico, ita ut modo hinc Systolen, illinc Diastolen, modo è contra; modo varios, modo confusos fieri motus me existimarem cernere: unde animus mihi fluctuabat, nec quid vel ipse statuerem, vel aliis crederem habebam, & motum cordis esse qualis Euripi fluxus & refluxus Aristoteli, Andream Laurentium scripsisse non mirabar.

Tandem majori indies & disquisitione & diligentia usus, multa frequenter & varia animalia viva introspectando, multis observationibus collatis, & rem attigisse, & ex hoc labyrintho me extricatum evasisse, simulque motum & usum cordis & arteriarum, quæ desiderabam, comperta habere me existimabam. Ex quo non solum privatim amicis, sed etiam publice in prælectionibus meis anatomicis, Academico more, proponere meam in hac re sententiam non verebar.

Quæ cum aliis, uti fit, placeret, aliis minus: hi convellere, calumniari & vitio vertere cœperunt, quod à præceptis & fide omnium Anatomicorum discefferim: illi rem novam cum inquisitu dignam, tum maxime utilem fore confirmantes, plenius sibi explicari poscebant. Tandem amicorum precibus, ut omnes meorum laborum participes fierent, partim etiam aliorum permotus invidia, qui dicta mea iniquo animo accipientes & minus intelligentes, me publice traducere conabantur, ut omnes de me & de re ipsa iudicium ferant, hæc typis mandare publice coactus fui. Sed & eo libentius, quod Hieronymus Fabr. ab Aquapendente cum singulas pene animalium particulas accurate & doctè peculiari tractatu delineaverat,

solum cor intactum reliquit. Denique ut si quid reipub. literariæ ex opera mea utile & commodum hac in parte accederet, forsitan rectè fecisse me constaret, nec alii omnino inertem me vixisse viderent. Et quod Senex ait in Comœdia,

Nunquam quisquam ita bene subducta ratione ad vitam fuit,

Quin res, etas, usus aliquid apportet novi;

Aliquid admoncat, ut illa quæ te scire credes, nescias:

Et quæ tibi putaris prima, in experiundo repudies;

illud forsitan in cordis motu eveniat nunc, aut alii hinc saltem, hac data via & felicioribus freti ingenii, rei rectius gerendæ & melius inquirendæ occasionem capient.

C A P. II.

Ex vivorum dissectione, qualis sit Cordis motus.

Primum itaque in Cordibus omnium adhuc viventium animalium, aperto pectore & dissecta capsula, quæ cor immediate circumcludit, observare licet, Cor aliquando moveri, aliquando quiescere, & esse tempus in quo movetur, & in quo motu destituitur.

Hæc manifestiora in cordibus frigidorum animalium, ut bufone, serpentibus, ranis, cochleis, gammaris, crutatis, conchis, squillis, & pisciculis omnibus. Fiunt etiam omnia manifestiora in cordibus aliorum, ut canis, porci, si eo usque attente observaveris, quoad emori cor & languidius moveri, & quasi extingui incipiat: tum etenim tardiores & rariores ipsius motus fieri, & longiores quietes cernere aperte & clare poteris, & motus qualis sit, & quomodo fiat, commodius intueri & dijudicare licet. In quiete, ut in morte cor laxum, flaccidum, enervatum, inclinatum quasi jacet.

In motu & eo, quo movetur, tempore tria præ cæteris animadvertenda.

I. Quod erigitur cor & in macronem se sursum elevat, sic ut illo tempore ferire pectus, & foris sentiri pulsatio possit.

II. Vndique contrahi, magis vero secundum latera, ita ut minoris magnitudinis, & longiusculum, & collectum appareat. Cor anguillæ exemptum & super tabulam aut manum positum hoc facit manifestum. Æque etiam apparet in corde pisciculorum, & illis frigidioribus animalibus, quibus cor conforme aut longiusculum est.

III. Compræhensum manu cor eo quo movetur tempore, diutiusculum fieri, à tentione autem illa

illa durities est, quemadmodum si quis lacertos in cubito manu comprehendat, dum movent digitos, illos tendi & magis renitentes fieri percipiet.

xv. Notandum insuper in piscibus & frigidioribus sanguineis animalibus, ut serpentibus, ranis, &c. illo tempore, quo movetur cor, albidioris coloris esse; cum quiescit à motu, coloris sanguinei saturum cerni.

Ex his mihi videbatur manifestum, Motum cordis esse tensionem quandam ex omni parte & secundum ductum omnium fibrarum, & constrictionem undique, quoniam erigi, vigorari, minorari, & durescere in omni motu videtur; ipsiusque motum esse, qualem musculorum, dum contractio fit secundum ductum partium nervosarum & fibrarum; musculi enim cum moventur & in actu sunt, vigorantur, tenduntur, ex mollibus duri fiunt, attolluntur, incrassantur; similiter quoque Cor.

Ex quibus observatis rationi consentaneum est, Cor eo, quo movetur tempore, & undique constringitur & secundum parietes incrassescit, secundum ventriculos coarctari & contentum sanguinem protrudere. Quod ex quarta observatione satis patet, cum in ipsa tensione sua, propterea quod sanguinem in se prius contentum exprimens albecat; & denuo in laxatione & quiete, subingrediente de novo sanguine in ventriculum, redeat color purpureus & sanguineus cordi. Verum nemo amplius dubitare poterit, cum usque in ventriculi cavitatem inflicto vulnere, singulis motibus sive pulsationibus cordis in ipsa tensione profilire cum impetu foras contentum sanguinem viderit.

Simul itaque hæc & eodem tempore contingunt, tensio cordis, mucronis erectio, pulsus, qui foris sentitur ex allusione ejus ad pectus, parietum incrassatio & contenti sanguinis protrusio cum impetu à constrictione ventriculorum.

Hinc contrarium vulgariter receptis opinionibus apparet, cum eo tempore, quo cor pectus ferit & pulsus foris sentitur, una cor distendi secundum ventriculos & repleri sanguine putetur; quam contra rem se habere intelligas, videlicet cor dum contrahitur, inaniri. Vnde qui motus vulgo cordis Diastole existimatur, revera Systole est. Et similiter motus proprius cordis, Diastole non est, sed Systole; neque in Diastole vigoratur cor, sed in Systole; tum enim tenditur, movetur, vigoratur.

Neque omnino admittendum illud (tamen magni Vesalii adducto exemplo confirmatum) de vimineo circulo ex multis juncis pyramidalim junctis, cor secundum fibras rectas tantum moveri, & sic dum apex ad basin appropinquat, latera in orbem distendi, & cavitates dilatari, & ventriculos cucurbitulæ formam acquirere, & sanguinem intromittere; nam secundum omnem quem habet ductum fibrarum cor eodem tempore tenditur, constringitur, & potius incrassatur & dilatantur parietes & substantia, quam ventriculi; & dum tenduntur fibræ à cono ab basin, & cor una ad basin trahunt, non in orbem latera cordis inclinant, sed potius contrarium, uti omnis fibra in circulari positione dum contrahitur versus rectitudinem. Et sicut omnes musculorum fibræ dum contrahuntur, & in longitudine abbreviantur, ita

secundum latera distenduntur; & eodem modo quo in musculorum ventribus incrassantur. Adde, quod non solum in motu cordis per directionem & incrassationem parietum contingit ventriculos coarctari; sed ulterius eo quod fibræ illæ sive laertuli, in quibus solum fibræ rectæ (in pariete enim omnes fibræ sunt circulares) ab Aristotele Nervi dictæ, quæ varie in ventriculis cordis majorum animalium, dum una contrahuntur admirabili apparatu, omnia interiora latera veluti laqueo invicem compelluntur ad contentum sanguinem majori robore expellendum.

Neque verum est similiter quod vulgo creditur, cor ullo suo motu aut distentione sanguinem in ventriculis attrahere, dum enim movetur & tenditur, expellit; dum laxatur & concidit, recipit sanguinem eo modo, quo postea patebit.

C A P. III.

Arteriarum motus qualis ex vicorum dissectione.

V Lterius in cordis motu observanda veniunt hæc, quæ ad arteriarum motus & pulsationes spectant.

i. Eo tempore quo cordis fit tensio, contractio, percussio pectoris, & omnino Systole, Arteriæ dilatantur, pulsus edunt, & in sua sunt Diastole. Similiter eo tempore quo dexter ventriculus contrahitur, & protrudit contentum sanguinem, vena arteriosa pulsatur & dilatatur simul cum reliquis arteriis corporis.

ii. Quando sinister ventriculus cessat moveri pulsare & contrahi, cessat pulsus arteriarum; imo quando languidius tenditur, pulsus in arteriis vix perceptibilis; & similiter cessante dextro, in vena arteriosa.

iii. Item secta quavis arteria vel perforata in ipsa tensione ventriculi sinistri propellitur foras sanguis ex vulnere cum impetu. Similiter secta vena arteriosa eodem tempore, quo dexter ventriculus tenditur & contrahitur, exinde cum impetu sanguinem profilire videbis.

Similiter etiam in piscibus secta fistula, quæ è corde in branchias ducit, quo tempore cor tendit & contrahi videbis, eo una etiam sanguinem exinde pertrudi cum impetu.

Similiter denique cum in omni arteriotomia sanguis profliendo exeat modo longius, modo propius, saltum fieri in arteriarum Diastole & quo tempore cor pectus ferit, comperies: atque hoc nimirum eo tempore quo cor tendit & contrahi apparet, & in sua esse Systole erectione, unaque sanguis expellitur eodem motu.

Ex his videtur manifestum contra communia dogmata, quod arteriarum Diastole fit eo tempore, quo cordis Systole: & arterias repleri & distendi propter sanguinis à constrictione ventriculorum cordis immissionem & intrusionem. Quin etiam distendi arterias, quia replentur ut utres aut vesica; non repleri, quia distenduntur ut folles. Et eadem de causa universi corporis arteriæ pulsant, videlicet à tensione sinistri cordis ventriculi; sicut vena arteriosa, à dextro.

Denique arteriarum pulsus fieri ab impulsu sanguinis è ventriculo sinistro; eodem pacto, quo cum quis in chirothecam inflat, omnes digitos simul

mul & una distendi videt, & pulsum æmulari. Et enim secundum cordis tensionem pariter pulsus sunt majores, vehementiores, frequentes, celeres, rhythmicum & quantitatem & ordinem servant. Nec est expectandum, ut propter motum sanguinis tempus inter constrictionem cordis & articularum (præcipue magis distantium) dilatationem intercedat, ne fiant simul, cum eodem modo se habeat, ut in inflatione chirothecæ aut vesicæ; quod per plenum (ut per tympanum & in longis lignis) ictus & motus simul sunt in utroque extremo, & quod Aristoteles lib. xii Hist. de Anim. cap. ix, & lib. de respir. cap. xv: *Palpitat intravenas* (arterias intelligit) *sanguis omnium animalium, pulsusque simul undique movetur, sic pulsant venæ omnes & simul invicem, propterea quod pendunt omnes à corde; movet autem semper, quare & illa semper & simul invicem quando movet.* Notandum obiter cum Galeno, à veteribus Philosophis venas pro arteriis appellatas fuisse.

Accidit aliquando me vidisse & præ manibus habuisse casum quemdam, qui mihi hanc veritatem apertissime confirmabat. Habuit quidam tumorem ingentem pulsantem, Aneurisma dictum, in dextra parte juguli prope descensum arteriæ subclaviæ in axillas, ab ipsius arteriæ exsione prognatum. Is summum indies incrementum capebat propter immisionem sanguinis ab arteria, singulis pulsationibus distendens, quod secto post mortem cadavere deprehensum erat. In illo pulsus ejusdem brachii exilis admodum erat, eo quod major sanguinis portio in tumorem divertebatur & influxus in brachium interceptus fuit.

Quare, sive per compressionem, sive per infarctum vel interceptionem, ubicunque sanguinis motus per arterias præditur, ibi posteriores arteriæ minus pulsant; cum pulsus articularum, nil nisi impulsus sit sanguinis in arterias.

C A P. I V.

Motus cordis & articularum qualis ex vivorum distensione.

PRæter hæc circa motum cordis observanda sunt, quæ ad articularum usum spectant.

Quod Gaspar Bauhinus lib. xi, cap. xxi, & Ioannes Riolanus lib. viii, cap. i, viri doctissimi & Anatomici peritissimi observarunt & admonent, quod si in viva sectione alicujus animalis cordis motum studiose observet, quatuor motus loco & tempore distinctos aspiciet: quorum duo sunt proprii articularum, ventriculorum duo. Pace tantorum virorum, quatuor sunt motus, loco, non verò tempore distincti. Simul enim ambæ auriculæ movent, & simul ambo ventriculi, ut quatuor loco distincti sint motus, duobus tantum temporibus, atque hoc se habent modo.

Duo sunt quasi eodem tempore motus, unus articularum, alter ipsorum ventriculorum: nec enim simul omnino fiunt, sed præcedit motus articularum, & subsequitur cordis; & motus ab auriculis incipere & in ventriculos progredi videtur. Cum jam languidiora omnia emoriente corde fiunt, & in piscibus & in frigidioribus sanguineis animalibus inter hos duos motus tempus aliquod quietis intercedit, & cor quasi sulcatum motui

respondere videtur, aliquando citius, aliquando tardius, ac tandem ad mortem inclinans cessat motu suo respondere, & quasi capite duntaxat leviter annuit, & obscure adeo movetur, ut potius motus signum præbere pulsanti auriculæ videatur. Sic prius definit cor pulsare, quam auriculæ, ut auriculæ supervivere dicantur; & primus omnium definit pulsare sinister ventriculus; deinde ejus auricula, demum dexter ventriculus; ultimo, quod etiam notavit Galenus, reliquis omnibus cessantibus & mortuis pulsat usque dextra auricula, uti ultimo in dextra auricula vita remanere videatur. Et dum sensum emoritur cor, videre licet post duas vel tres pulsationes articularum, aliquando quasi expergefactum cor respondere, & unum pulsum lente & agre peragere & moliri.

Sed & præcipue notandum, quod, postquam cessavit cor pulsare, adhuc auricula pulsante, digito super ventriculum cordis posito singulæ pulsationes percipiuntur in ventriculis, eodem plane modo, quo ventriculorum pulsationes in arteriis sentiri antea diximus, à sanguinis impulsu nimirum distensione facta. Et hoc tempore, pulsante solum auricula, si fornice cordis mucronem absceueris, exinde singulis auriculæ pulsationibus sanguinem effluere conspicias: ut hinc pateat, quomodo in ventriculos sanguis ingreditur, non attractione aut distensione cordis, sed ex pulsu articularum immixtus.

Notandum est, ubique omnes, quas voco & in auriculis & in corde pulsationes, contractiones esse: & plane primo contrahi auriculas videbis, & in consequentia, cor ipsum. Auriculæ enim dum moventur & pulsant, albidiores fiunt; præsertim ubi paucò sanguine replentur. Replentur autem tanquam promptuarium & lacuna sanguinis, declinante sponte sanguine, & venarum motu compresso ad centrum. Quin etiam in finibus & extremitatibus ipsarum hæc albedo à contractione fieri vel maxime apparet.

In piscibus & ranis, & similibus, quæ unum ventriculum habent cordis & pro auricula vesicam quandam in basi cordis positam & refertissimam sanguine, videbis hanc vesicam primo contrahi, & subsequi postea cordis contractionem apertissime.

At vero etiam quæ his contrario modo se habent à me observata ascribere huc visum est. Cor anguillæ, & quorundam piscium, & animalium etiam exemptum sine auriculis pulsant. Immo si in frustra disseueris, partes ejus divisas separatim sese contrahere & laxare videbis ita, ut in his post cessationem motus articularum, cordis corpus pulsum faciat & palpitet. Sed an hoc proprium vivacioribus animalibus, quorum radicale humidum glutinosum magis aut pingue & lentum est, & non ita facile dissolubile? Quod etiam apparet in carne anguillarum, quæ post excoriationem, exenterationem & in frustra dissectionem, motum retinet.

In columba certe experimento facto, postquam cor desierat omnino moveri, & nunc etiam auriculæ motum reliquerant, per aliquod spatium digitum saliva madefactum & calidum cordi superimpositum deinui; quo fomento quasi vires & vitam posthinc recuperasset, cor & ejus auricula

cula moveri & sese contrahere atque laxare, & quasi ab orco revocari videbantur.

Sed & præter hæc aliquoties à me observatum fuit, postquam cor ipsum & ejus auricula etiam dextra à pulsatione, quasi mortis articulo quiescebant, in ipso sanguine qui in dextra auricula continetur, obscurum motum & inundationem ac palpitationem quandam manifesto superfuisse, tandiu scilicet, quam calore & spiritu imbui videretur.

Tale quiddam evidentissime in prima animalis generatione intra septem dies ab incubatione, in ovo Gallinaceo cernitur. Inest primum ante omnia gutta sanguinis, quæ palpitat, quod etiam annotavit Aristoteles; ex qua, incremento facto & pullo aliqua ex parte formato, sunt cordis auriculæ, quibus pulsantibus perpetuo inest vita: cum postea corpus delineari intermissis aliquot diebus inceperit, tum etiam cordis corpus procreatur, & per aliquod tempus albidum apparet & exangue, ut reliquum corpus, nec pulsum edit, nec motum. Quin etiam in fœtu humano vidi, circa principium tertii mensis similiter cor formatum, sed albidum & exangue; cujus tamen auriculis sanguis inerat uberrimus & purpureus. Sed enim in ovo, jam adaucto & conformato fœtu, simul & cor adaugeri, & ventriculos habere, quibus sanguinem tunc recipere & transmittere occipit.

Ita ut si penitus introspicere quis velit, non solum cor esse primum vivens & ultimum moriens dixerit, sed auriculas & quæ in serpentibus, piscibus & hujusmodi animalibus pars pro auricula est, & prius quam cor ipsum vivere, & post etiam emori.

Imo an prius adhuc ipse sanguis vel spiritus habeat in se obscuram palpitationem, quam post mortem retinere mihi visus est; & an cum palpitatione vitam incipere dicendum sit, dubitare contingit, quandoquidem & sperma animalium omnium (ut notavit Aristoteles) & spiritus prolificus palpitando exit, velut animal quoddam. Ita Natura in morte, quasi decursione facta, reducem (ut Aristoteles de motu animalium cap. vii) agit motu retrogrado à calce ad carceres, & eo unde proruit sese recipit: & cum animalis generatio ex non animali procedat in animal, tanquam ex non ente in ens, iisdem retro gradibus corruptio ex ente revolvitur in non ens, unde quod in animalibus ultimo fit, deficit primum; & quod primo, ultimum.

Observavi quoque in omnibus pene animalibus cor vere inesse, & non solum, ut Aristoteles dicit, in majoribus & sanguineis, sed in minoribus, exangueis, crustatis & testaceis quibuldam, ut limacibus, cochleis, conchis, astacis, gammaris, squillis, multisque aliis; imo vespis & crabronibus & muscis (ope perspicilli ad res minimas discernendas) in summitate illius particulæ quæ cauda dicitur, & vidi pulsans cor, & aliis videndum exhibui.

In exangueis vero Cor lente admodum, rarissime ictibus pulsat, & sicuti in aliis jam moribundis contingit, tarde sese contrahit, ut facile in cochleis est cernere. Quorum cor deprehendes in fundo illius orificii in latere dextro; quod se aperire & claudere eventationis causa videtur, & unde salivam expuit, sectione facta in summitatem iuxta partem jecori analogam.

Sed notandum & illud, quod hyeme & frigidioribus tempestatibus exanguia aliqua (qualis est Cochlea) nihil pulsans habent, sed vitam magis plantæ agere videntur, ut etiam reliqua quæ Zoophyta five plantanimalia ideo dicuntur.

Notandum insuper in omnibus animalibus ubi cor inest, ibi etiam auriculas esse vel auriculis ali-quid analogum: Et ubicunque cor duplici ventriculo donatur, ibi duas semper aditare auriculas, non contra. Sed si in ovo pulli conformationem advertas, primum inest, ut dixi, tantum vesicula, vel auricula, vel gutta sanguinis pulsans, postea incremento facto absolvitur cor. Ita quibuldam animalibus (quasi ulteriore perfectionem non adipiscentibus) pulsans vesicula quædam instar puncti cujusdam rubri vel albi duntaxat inest, quasi principium vitæ; uti apibus, vespis, cochleis, squillis, gammaris, &c.

Est hic apud nos minima Squilla (quæ Anglice dicitur a Shrimp, Belgice een Garneel) in mari & Thamesi capi solita, corpore prorsus pellucido; hanc aquæ impostam sæpius præbui spectandam amicissimis quibuldam meis, ut cordis illius animalculi motus liquidissime perspiceremus, dum exteriores illius corporis partes visui nihil officerent, quo minus cordis palpitationem quasi per fenestram intueremur.

In ovo gallinaceo, post quatuor vel quinque dies ab incubatione, primum rudimentum pulli instar nubeculæ videndum exhibui, nimirum ovo, cui cortex adimebatur, in aquam limpidam tepidamque immisso, in cujus nubeculæ medio punctum sanguineum palpitans tam exiguum erat, ut in contractione dispareret & visum aufugeret; in laxatione instar summitatis acus appareret rubicundum; ita ut inter ipsum videri & non videri, quasi inter esse & non esse, palpitationem & vitæ principium ageret.

C A P. V.

Cordis motus actio, & functio.

Go vero ex his tandem & hujusmodi observationibus repertum iri confido, motum cordis ad hunc modum fieri.

Primum sese contrahit auricula, & in illa contractione sanguinem contentum (quo abundat tanquam venarum caput, & sanguinis promptuarium & cisterna) in ventriculorum cordis conjicit, quo repleto cor sese erigit, continuo omnes nervos tendit, contrahit ventriculos, & pulsum facit, quo pulsu immisum ab auricula sanguinem continenter protrudit in arterias, dexter ventriculus in pulmones per vas illud, quod vena arteriosa nominatur, sed re vera & constitutione & officio & in omnibus arteria est: sinister ventriculus in aortam, & per arterias in universum corpus.

Isti duo motus, auricularum unus, alter ventriculorum, ita per consecutionem fiunt, servata quasi harmonia & rhythmo, ut ambo simul fiant & unicus tantum motus appareat, præsertim in calidioribus animalibus, dum illa celeri agitantur motu. Nec alia ratione id fit, quam cum in machinis una rota aliam movente, omnes simul movere videantur; & in mechanico illo artificio, quod sclopetis adaptant, ubi compressione alicujus ligulæ cadit

cadit flex, percutit chalybem & propellit, ignis elicitur, qui in pulverem cadit, igitur pulvis, interius prorept, dispenditur, evolat globulus, metam penetrat, & omnes isti motus propter celeritatem quasi in nictu oculi simul fieri apparent. Sic etiam in deglutitione, radicis linguæ elevatione & oris compressione cibus vel potus in fauces deturbatur, larynx à musculis suis & epiglottide clauditur, elevatur & aperitur, fummitas gulæ à musculis suis haud aliter quam saccus ad implendum attollitur, & ad recipiendum dilatatur, & cibum vel potum acceptum transversis musculis deprimat, & longioribus attrahit: & tamen omnes isti motus à diversis & contradistinctis organis facti, cum harmonia & ordine dum fiunt, unum efficere motum videntur & actionem unam, quam deglutitionem vocamus.

Sic contingit plane in motione & actione Cordis, quæ deglutitio quædam est & transfusio sanguinis è venis in arterias. Et si quis (dum hæc habuerit in animo) cordis motum diligenter in viva dissectione animadvertit, videbit non solum, quod dixi, cor sese erigere, & motum unum fieri cum auriculis continuum, sed inundationem quandam, & lateralem inclinationem obscuram secundum ductum ventriculi dextri, & quasi sese leviter contorquere, & hoc opus peragere. Et quemadmodum cernere licet, cum equus potat & aquam deglutit, singulis gulæ tractibus absorberi aquam & in ventriculum demitti, qui motus sonitum facit & pulsus quendam auscultantibus & tangentibus exhibet; ita dum istis cordis motibus sit portio sanguinis è venis in arterias traductio, pulsus fieri & exaudiri in pectore contingit.

Motus itaque cordis omnino ad hunc se habet modum, & una actio cordis est, ipsa sanguinis transfusio & in extrema usque mediantibus arteriis propulsio; ut pulsus, quem nos sentimus in arteriis, nil nisi sanguinis à corde impulsus sit.

Au vero cor sanguini præter transpositionem & motum localem, & distributionem aliquid aliud addat, five calorem, five spiritum, five perfectionem, posterius inquirendum & ex aliis observationibus colligendum. Hoc in præsentia sufficiat, factis ostensum esse in pulsû cordis sanguinem transfundi, & deduci è venis in arterias per cordis ventriculos, & distribui in universum corpus.

Sed & hoc omnes aliquo modo concedunt, & ex cordis fabrica & valvularum artificio, positione, & usu colligunt. Verum tanquam in loco obscuro titubantes cæcutire videntur, & varia, subcontraria & non cohærentia componunt, & ex conjectura plurima pronunciant, ut ante demonstratum est.

Causa maxima hac in parte hæsitandi & errandi una fuisse mihi videtur, cordis cum pulmone in homine contextus: cum venam ibi arteriosam in pulmones obliterari, & similiter arteriam venosam confpexissent, unde aut quomodo dexter ventriculus in corpus distribueret sanguinem, aut sinister è vena cava exhauriret, obscurum admodum illis erat. Hoc attestantur Galeni, contra Erasistratum de venarum origine & usu & sanguinis cõctione invehentis verba lib. vi de Plac. Hipp. & Plat. cap. vi: *Responderebunt, inquit, ita esse effectum, ut in jecore sanguis præparetur, atque inde in cor deferatur*, ibi postea reliquam propriam perfectionem absolutam accepturus. Quod profecto ratione vacare non videtur. Nullum enim perfectum & magnum opus repente una aggressionem fieri, totamque suam expolitionem ab uno instrumento acquirere potest. Quod si ita est, ostendit nobis vas aliud, quod è corde sanguinem absolute perfectum educat, atque ipsum ut arteria spiritum, in totum corpus dispenset. Ecce opinionem rationabilem non approbasse & reliquisse Galenum, quia præterquam quod viam transitus non videbat, vas reperire non poterat, quod in totum corpus è Corde sanguinem dispenset.

Si quis vero ibidem pro Erasistrato, vel pro illa & nunc nostra opinione (ipsius confessione Galeni) alias rationi consentanea institisset, & arteriam magnam sanguinem è corde in universum corpus dispenfantem digito commonstrasset; quid divinus ille vir ingeniosissimus & doctissimus responsum fuisset, miror. Si arteriam spiritus dispenfare & non sanguinem diceret, profecto Erasistratum refelleret satis, qui in arteriis spiritus duntaxat contineri arbitrabatur; sed sibi ipsi contradiceret interea, & id esse turpiter negaret, quod libro proprio acriter esse contenderat contra eundem Erasistratum: & multis & validis argumentis comprobaverat, & experimentis demonstraverat, nimirum sanguinem contineri in arteriis natura, & non spiritum.

Sin vero divinus vir (uti facit eodem loco sæpius) concederet, omnes arterias corporis à magna arteria oriri, & hanc à corde: quin etiam in ipsis omnibus sanguinem naturam contineri & deferri, & valvulas illas tres signoides orificio aortæ appositæ regressum sanguinis in cor prohibere professus, & quod hæc Natura nequaquam præstantissimo visceri appolisset, nisi maximum aliquod ministerium fuisset exhibitura. Si, inquam, hæc omnia & his ipsissimis verbis concederet Pater Medicorum, uti facit recitato libro, quomodo negare possit arteriam magnam istiusmodi vas esse, quod sanguinem (jam absolutam suam perfectionem adeptum) è corde in universum corpus dispenset, non video. An adhuc forsitan hæsitaret, ut omnes in hunc usque diem post ipsum, quod propter contextum, ut dixi, cordis cum pulmone non videat vias, per quas sanguis è venis in arterias transferri possit.

Quod dubium etiam anatomicos (dum semper in dissectionibus inveniunt arteriam venosam & sinistram ventriculum cordis repletos sanguine, eoque crasso, grumefcente, atro) non mediocriter perturbat cum sanguinem è dextro ventriculo in sinistram per septum cordis transfundere coacti sint affirmare. Sed hanc viam antea refutavi. Iam ideo via paranda est & aperienda, qua inventa nulla amplius sit difficultas, quæ quempiam, credo, inhibeat, quo minus quæ ante proposui de pulsû cordis & arteriarum, de transfusione sanguinis è venis in arterias, & de dispensatione in universum corpus per arterias concedere & agnoscere facile possit.

C A P. V I.

Quibus viis sanguis è venâ Cava in arterias, vel è dextro ventriculo cordis in sinistram deferatur.

Cum errandi occasione præbuisse probabile sit, quam in homine vident, ut dixi, cordis

cum pulmone connexionem: in hoc peccant, quidum de partibus animalium (uti vulgo omnes Anatomici faciunt) pronunciare, & demonstrare aut cognoscere volunt, unum tantum hominem, eumque mortuum introspiciunt, & sic tanquam, qui una reipub. forma perspecta disciplinam politicam componere, aut unius agri naturam cognoscere agriculturam se scire opinantur; nihilo plus agunt, quam si ex una particulari propositione de universali per syllogismum concludere niterentur.

Veruntamen, si in dissectione animalium æque versati essent ac in humani cadaveris anatomicæ exercitati, res hæc, quæ omnes perplexos retinet, indubie palam absque omni difficultate mea sententia eluceceret.

In piscibus, in quibus unus tantum ventriculus cordis (ut non habentibus pulmones) res primum satis manifesta est, vesicam enim sanguinis in basi Cordis positam, auriculæ nimirum analogam, sanguinem in cor immittit, quem cor de novo per arteriam vel fistulam arteriæ analogam aperte transmittit tum visu, tum secta arteria (exinde sanguine singula pulsatione cordis proficiente) oculis palam confirmari posse constat.

Idem etiam deinde in omnibus animalibus, in quibus unus duntaxat ventriculus vel quasi unus est, non difficile est cernere, ut in bufone, rana, serpentibus, lacertis, quæ etsi pulmones aliquo modo habere dicuntur, ut quæ vocem habent (de quorum pulmonum artificio admirando & ceteris ejusmodi permultas apud me observationes habeo, quæ non sunt hujus loci;) tamen ex autopsia eodem modo in illis è venis in arterias sanguinem pulsu cordis tractum esse palam est, & via patens, aperta, manifesta, nulla difficultas, nullus hæsitandi locus. In his enim perinde se res habet atque in homine; in quo si septum cordis perforatum aut ademptum esset, aut unus ex utrisque fieret ventriculus, nemo credo dubitabit, quæ via sanguis è venis in arterias transire possit.

Cum vero major numerus animalium non habentium pulmones sit, quam habentium; & similiter major numerus sit unum tantum ventriculum cordis, quam habentium duos, proclive est statuere in animalibus *ἢν τι μὲν*, ut plurimum & in universum sanguinem aperta via è venis in arterias per cordis sinum transmitti.

Consideravi autem mecum, quod etiam in embryonum eorum quæ pulmones habent, sectione apertissime constat, in fœtu vasa cordis quatuor (videlicet venam cavam, venam arteriosam, arteriam venalem, & Aortam sive arteriam magnam) alio modo uniri, quam in adulto, id quod omnes Anatomici norunt satis.

Primus contactus & unio venæ cavæ cum arteria venosa (quæ sit priusquam cava in dextrum ventriculum cordis se aperit, aut venam coronalem emittit, paululum supra egressum ab hepate) anatomosin lateralem exhibet, hoc est, foramen amplum patens, ovali figura, pertusum è cava in arteriam illam pervium, ita ut per illud foramen tanquam per unum vas sanguis è vena cava in arteriam venosam & auriculam cordis sinistram usque in ventriculum sinistram liberrime & copiosissime dimanare possit. Insuper in illo foramine ovali è

regione, quæ arteriam venosam respicit, operculi instar membrana tenuis dura est, foramine major, quæ postea in adultis operiens hoc foramen & coalescens undique istud foramen omnino obstruit & prope obliterat. Hæc inquam membrana sic constituta est, ut dum laxè in se concidit, facile ad pulmones & cor viâ resupinetur, & sanguini à cava affluenti cedat quidem, at ne rursus in cavam refluat, impediatur; ut liceat existimare in embryone sanguinem continuo debere per hoc foramen transire è vena cava in arteriam venosam, & inde in auriculam sinistram cordis; at postquam ingressus fuerit, remeare nunquam posse.

Alteræ unio venæ arteriosæ sit, postquam vena illa è dextro ventriculo egressa in duos dividitur ramos; estque velut è duobus dictis tertius truncus & quasi canalis arteriosus, ab hinc in arteriam magnam oblique ductus & perforatus: ut in dissectione Embryonum quasi duæ aortæ, vel radices arteriæ magnæ è corde exorientes duæ appareant.

Canalis hic in adultis similiter sensim attenuatur, tabescit, & penitus tandem, ut vena umbilicalis, exiccatur & aboletur.

Iste canalis arteriosus nullam membranam in se habet, sanguinis motum hinc vel illinc impediens. Sunt enim in orificio illius venæ arteriosæ (cujus iste canalis, uti dixi, propago est) valvulæ sigmoides tres, quæ intus foras spectant, & sanguini à dextro ventriculo hac viâ in magnam arteriam fluenti cedunt facile; remeare vero contra ab arteria aut pulmonibus in dextrum ventriculum volenti ad amissum clausæ omnino impedimento sunt. Ut hic etiam arbitrari consentaneum sit, in Embryone dum cor sese contrahit, continuo sanguinem è dextro ventriculo hac viâ in arteriam magnam invehi.

Quod vulgo dicitur, has duas uniones tam magnas, patentes & apertas, nutriendorum pulmonum causa factas fuisse tantum, & in adultis (cum jam pulmones propter ipsorum calorem & motum copiosius nutrimentum desiderant) aboleri & consolidari, commentum improbabile est & male cohærens. Et similiter quod dicunt, cor in embryone feriari & nihil agere, nec moveri, ideoque Naturam hos transitus facere alendorum pulmonum causa coactam fuisse, falsum est: cum in ovo cui gallina incubuit, & in Embryonibus recenter ex utero exectis autopsia pateat, æque cor moveri atque in adultis, neque naturam ulla tali necessitate urgeri. Cui motui non solum hi oculi sæpe testes, sed & Aristoteles ipse lib. de Spir. cap. 111; *Pulsus*, inquit, *per initia statim in constitutione cordis emergit, quod & in sectione vivorum, & pulli formatione ex ovo deprehenditur. Quin & observamus has vias (tam in hominum genere, quam in cæteris animalibus) non solum apertas & patentes esse usque ad tempus partus, uti annotarunt Anatomici; sed etiam permultos post menses, imo in aliquibus per aliquot annos, ne dicam toto vitæ curriculo, veluti in aures, beccagine, & avibus plurimis, & animalibus, præsertim in minoribus. Quæ res imposuit forsan Leon. Botallo se novum transitum sanguini de vena cava in sinistram ventriculum cordis invenisse glorianti: & fateor me quoque, cum in mure majori jam adulto hoc primum ipse reperi, tale quid statim existimasse.*

Ex quibus intelligitur in Embryone humano, quin & in aliis, in quibus istæ uniones non abolerentur, idem ipsum accidere, ut cor suo motu per patentissimas vias sanguinem è vena cava in arteriam magnam apertissime traducat, per utriusque ventriculi ductum. Dexter siquidem sanguinem ab auricula recipiens; inde per venam arteriosam & propaginem suam (canalem arteriosam dictam) in magnam arteriam propellit. Sinister similiter eodem tempore mediante auriculæ motu recipit sanguinem in illam sinistram auriculam diductum per foramen ovale è vena cava, & tentione sua & constrictione per radicem aortæ in magnam item arteriam simul impellit.

Ita in Embryonibus dum interea pulmones otiantur, & nullam actionem aut motum habent, quasi nulli forent, natura duobus ventriculis cordis quasi uno utitur ad sanguinem transmittendum. Et similis est conditio Embryonum pulmones habentium, dum adhuc pulmonibus non utuntur, ac est eorum animalium, quæ pulmones non habent.

Itaque tam clare in his etiam elucescit veritas, quod cor suo pulsu sanguinem è vena cava in arteriam magnam traducat & transfundat, perque tam patentem & apertas vias, ac si in homine, quod dixi, ambo ventriculi, eorum septo adempto, ad invicem pervii essent facti. Cum itaque majori ex parte animalibus, & omnibus quodam tempore patentissimæ istæ extent viæ, quæ transmissioni sanguinis per cor inserviunt, restat ut illud perquiramus, Cur in quibusdam animalibus (ut in homine) iisque calidioribus & adultis per pulmonum substantiam illud fieri non existimemus, quod in embryone natura per eas vias illo tempore quo pulmonum nullus erat usus antea effecit, quas ob defectum transitus per pulmones coacta videbatur facere: aut Cur melius sit (natura enim semper quod est melius facit) in adolescentibus naturam transitui sanguinis omnino occlusisse vias patentem illas, quibus antea in embryone & foetu usa fuerat, & in omnibus aliis animalibus utitur, nec alias ullas pro illo sanguinis transitu aperuisse, & sic omnino potius hunc impedivisse.

Ita jam eo res cessit, ut iis, qui in homine quaerunt vias, per quas sanguis è vena cava in sinistram ventriculum & arteriam venosam permeat, magis operæ pretium esset, & recte magis facere viderentur, si ex dissectione animalium veritatem investigare vellent, quo causam inquirant, cur in majoribus & perfectioribus animalibus, iisque adultis natura sanguinem transcolari per pulmonum parenchyma potius voluerit, quam, ut in cæteris omnibus, per patentissimas vias, cum nullam aliam viam & transitum excogitari posse intelligerent: si ve hoc fit quod maiora & perfectiora animalia sint calidiora, & cum sint adulta, eorum calor magis, ut ita dicam, igniatur & ad suffocationem sit proclivior; ideoque tranare & trajici per pulmones, ut inspirato aëre contemperetur, & ab ebullitione & suffocatione vindicetur: si ve quid aliud tale. Sed hæc determinare & rationem omnem reddere, nihil aliud agere est, quam propter quid pulmones facti sunt, speculari. Atque de his horumque usu & motu, & de eventatione omni, & aëris necessitate & usu, & cæteris huiusmodi; deque variis organis & differentibus huius causa in ani-

malibus factis, tametsi multa quamplurimis observationibus à me deprehensa sint; tamen, ne nimium à proposito de motu & usu cordis hoc loco aberrando aliud agere, & stationem relinquendo rem interturbare & subterfugere videar, hæc proprio tractatui convenientius exponenda relinquam. Et quæ restant, ut ad propositum scopum revertar, confirmare pergam.

Contendo autem in perfectioribus nimirum & calidioribus animalibus, iisque adultis (ut in homine) sanguinem è dextro ventriculo cordis per venam arteriosam in pulmones, & inde per arteriam venosam in sinistram auriculam, & subinde in ventriculum cordis sinistrum permeare. Et primum posse hoc fieri, deinde ita factum esse nunc probatum eo.

C A P. VII.

Sanguinem de dextro ventriculo cordis per pulmonum parenchyma permeare in arteriam venosam, & sinistram ventriculum.

Fieri autem hoc posse, & nihil esse, quo minus fiat, satis constat, cum quomodo aqua per terræ substantiam permeans rivulos & fontes procreet, consideramus; aut quomodo per cutem sudores, vel per renum parenchyma urinæ fluant; speculamur. Animadvertite in iis, qui Aquis Spadensibus vel de la Madonna (ut ajunt) in agro Patavino, vel aliis acidulis aut vitriolatis utuntur, vel qui ad congios ingurgitant potum, quemadmodum una aut altera hora post per vesicam emingant totum; cum tamen debeat ista copia aliquantulum in concoctione immorari; debeat per jecur (ut singulis diebus bis ingesti alimenti succum omnes consistuntur facere,) debeat per venas, per renum parenchyma, per ureteres in vesicam profuere.

Quos itaque audio tanquam impossibile & nullo modo credibile negantes, posse sanguinem, imo totam massam sanguineam, per pulmonum substantiam æque, ac succus alimentalis per jecur permeare? Quod genus hominum (cum Poëta loquor) ubi volunt, concedunt facile posse; ubi nolunt, nullo modo: hic ubi opus est verentur; ubi nihil opus, ibi non verentur affirmare.

Iecoris parenchyma densius multo est, & similiter renum: pulmonum, ratoris multo texturæ; & si renibus & jecori conferatur, spongiosæ.

In jecore nullum impellens, nulla vis cogens; in pulmone ex pulsu dextri ventriculi cordis impingitur sanguis, cujus impulsu distendi vasa & porositates pulmonum necesse est. Præterea pulmones in respirando elevantur & concidunt, quo motu necesse est, ut porositates & vasa aperiantur & claudantur, ut in spongiis contingit, & in omnibus particulis habentibus constitutionem spongiosam, quando constringuntur & rursus dilatantur. Contra jecur quiescit, nec ita dilatari & constringi visum est.

Denique, si nemo est, qui non asseret per jecur totum ingestorum succum in venam cavam tam in homine, quam in bove aliisque maximis animalibus pertransire posse; & hoc propterea affirmare coacti sint, quod cum nulla alia extet via, tamen pertransiisse aliqua nutrimentum & permeasse in

venas sit necesse, quandoquidem fiat nutritio: Cur non iidem argumentis de transitu sanguinis in adultis his per pulmones, fidem similem habent, & cum Columbo peritissimo doctissimoque Anatomico idem afferunt & credunt, ex amplitudine & fabrica vaforum pulmonum, & eo, quod arteria venosa & similiter ventriculus repleti sint semper sanguine, quem è venis huc venisse necesse est, cum nulla alia sit quam per pulmones semita, ut & ille & nos ex ante dictis & autoplia, aliisque argumentis palam esse existimamus.

Sed quando aliqui sunt, qui nil nisi adductis authoritatibus admittunt; iidem ex ipsius etiam Galeni verbis hanc veritatem confirmari posse sciant; scilicet non solum posse sanguinem è vena arteriosa in arteriam venosam, & inde in finitrum ventriculum cordis, & postea in arterias transmitti; sed etiam ex continuo pulsu cordis & pulmonum motu inter respirandum hoc fieri.

Sunt in orificio venæ arteriosæ, valvulæ tres sigmoides five semilunares, quæ omnino sanguinem in illam venam arteriosam immixtum non sinunt remeare in cor. Id quod norunt. Harum valvularum necessitatem & usum Galenus lib. vi de Usu part. cap. x, his verbis explicans, *In toto est, inquit, mutua anastomosis atque osculorum apertio arteriarum simul cum venis, transmutantque ex sese pariter sanguinem & spiritum per invisibiles quasdam atque angustas plane vias. Quod si os ipsum vena arteriosa itidem semper patuisset, nullamque noturam invenisset machinam, qua claudere ipsum, cum est semper spiritum, ac rursus aperire queat, fieri nunquam potuisset, ut per invisibiles atque exigua oscilla, sanguis (contracto thorace) in arterias transduceretur. Neque enim similiter omnis ex quovis attrahitur, neque emittitur. Sed quemadmodum quod leve est, facilius eo, quod gravius dilatatis instrumentis attrahitur, iidem autem contractis exprimitur: ita & per latam viam celerius aliquid, quam per angustam trahitur ac rursus emittitur. Cum autem thorax contrahitur, pulsa atque intro compressa undique fortiter qua in pulmone sunt venosæ arteriæ, exprimunt quidem quam celerrime, qui in ipsis est, spiritum, transmutant autem per subtilia illa oscilla sanguinis portionem aliquam; quod nunquam accidisset profecto, si sanguis per maximum os (cujusmodi est vena arteriosa ad cor) retro remeare potuisset. Nunc vero reditu per os magnum intercluso, dum comprimitur undique, destillat quidpiam in arterias per exigua illa orificia. Et paulo post sequente capitulo: Quanto thorax contendit vehementius sanguinem elidens, tanto membrana (videlicet valvula sigmoides) exactius os ipsum occludunt, & nihil remeare sinunt. Quod & eodem capitulo decimo paulo ante: Nisi valvula essent, triplex sequeretur incommodum; ut sanguis ipse frustra longum hoc curriculum subinde emittatur, in diastolis quidem pulmonis adfluens, & quæ in ipso sunt, venas omnes refarciens; in Systolis vero, quasi æstus quidam maritimus, instar Euripi motum identidem huc atque illuc reciprocans, qui haudquaquam sanguini conveniat: at hoc quidem videri forte posset exiguum. Quod vero interim ipsius quoque respirationis utilitatem labefaceret, id vero non amplius pro parvo est habendum, &c. Et paulo post: Atque etiam tertium secutum fuisset incommodum haudquaquam consentiendum, cum sanguis retro in expirationibus remigrasset, nisi Opifex noster membranarum epiphyisin fuisset fabricatus. Vnde concludit cap. undecimo. Communis autem ipsarum om-*

nium, videlicet valvularum est usus, ut materias retro remigrare prohibeant: utrarumque vero proprius, educationem quidem è corde materias, ne amplius ad ipsum remeant; inducentium vero, ne amplius ex ipso effluant: non enim volebat natura vano labore cor fatigari, neque in eam partem aliquando emittere, unde trahere prestiterat, neque rursus ex illa identidem ducere, ad quam misere erat necesse. Sed sunt quatuor omnino orificia, bina in utroque ventriculo, alterum quidem inducens, alterum vero educens, &c. Et paulo post: Porro, cum vias alterum, quod tunica simplici constat in cor infigitur: alterum vero quod duplice, ex ipso producat, communem utrique locum, [videlicet ventriculum dextrum: ita Galenus intelligit, & ego eadem ratione similiter finitrum ventriculum cordis] quasi cisternam quandam parari necesse fuit, ad quam perinentibus utrisque, per alterum quidem trahatur sanguis, per reliquum vero emittatur.

Quod argumentum Galenus pro transitu sanguinis per dextrum ventriculum de vena cava in pulmones adducit, eodem nobis rectius pro transitu sanguinis è venis per cor in arterias, mutatis tantum terminis uti liceat. Ex Galeni igitur, viri divini, patris Medicorum, locis & verbis clare apparet, sanguinem per pulmones è vena arteriosa in arteriæ venosæ ramulos permeare, tum propter pulsum cordis, tum propter pulmonum & thoracis motum. Quinetiam cor continue in ventriculo quasi cisternam recipere & emittere sanguinem, & hujus rei causa valvularum genera quatuor, duo inductioni, emissioni sanguinis duo inservire; ne aut sanguis Euripi in morem inconvenienter agitur, huc, illuc, aut retro remearet, unde trahere præstiterat, & ex illa refluere parte, ad quam mittere erat necesse. Et sic cor vano labore fatigaretur, & pulmonum respiratio præpeditur. Denique clare apparet assertio nostra, continue & continenter sanguinem per pulmonum porositates permeare è dextro in ventriculum finitrum, è vena cava in arteriam magnam. Nam cum continuo è dextro ventriculo immitatur sanguis in pulmones per venam arteriosam, & similiter continue è pulmonibus in finitrum attrahatur, quod ex dictis & valvularum positione patet; quin pertranseat continue fieri non potest.

Et itidem cum semper & continue ingreditur sanguis in cordis ventriculum dextrum, & egrediat continue è sinistro, quod similiter & ratione & sensu patet; quin continuo pertranseat sanguis è vena cava in Aortam impossibile est.

Illud igitur, quod in animalibus majori ex parte & plane omnibus donec adolescant, per patentissimas fieri vias ex dissectione manifestum est; illud inquam in adultis his per pulmonum cæcas porositates & vaforum eorum oscilla æque fieri tam ex Galeni verbis, quam ex ante dictis manifestum est. Vnde apparet, quod quamquam unus ventriculus cordis, videlicet sinister sufficiens esset sanguinis dispensationi per corpus & educationi è vena cava, quemadmodum etiam fit in omnibus quæ pulmonibus carent; natura tamen cum voluerit sanguinem ipsum per pulmones transcolari, dextrum ventriculum superaddere coacta fuerit, cuius pulsu per ipsos pulmones è vena cava in finitrum ventriculi locum sanguis compelleretur. Et hoc modo dextrum ventriculum pulmonum causa factum

Vide Hæmorrhoides
manu d
simi Comm
tarum
Galenus lib
de usu part
Quem lib
postquam
à me scrip
esset videt

factum esse & ob translationem sanguinis, non ob nutritionem duntaxat, dicendum est. Quandoquidem tanto proventu annonæ atque cum pulsu subministrato, & tanto puriori & spirituosiori (utpote immediate à ventriculis cordis subvecto) indigere alimento pulmones magis, quam aut cerebri purissima substantia, aut oculorum splendidissima & divina constitutio, aut ipsius cordis caro (quæ rectius per arteriam coronalem nutritur,) inconveniens omnino est existimare.

C A P. VIII.

De copia sanguinis transeuntis per cor & venis in arterias, & de circulari motu sanguinis.

HVc usque de transfusione sanguinis è venis in arterias, & de viis, per quas pertranseat, & quomodo ex pulsu cordis transmittatur ac dispensetur: de quibus forsitan sunt aliqui, qui antea aut Galeni auctoritate, aut Columbi, aliorumve rationibus adducti assentiri se dicant mihi. Nunc vero de copia & proventu istius pertranseuntis sanguinis, quæ restant (licet valde digna consideratu) cum dixerò, adeo nova videbuntur & inaudita, ut non solum ex invidia quorundam metuum malum mihi, sed verear, ne habeam inimicos omnes homines. Tantum consuetudo aut semel imbibita doctrina, altisque defixa radicibus, quasi altera natura apud omnes valet, & antiquitatis veneranda suspicio plerisque cogit nova velut nulla putare. Utcumque jam jacta est alea, spes mea in amore veritatis & doctorum animorum candore.

Sane postquam tum ex vivorum experimenti causa dissectione, & arteriarum apertione, disquisitione multimoda; tum ex ventriculorum cordis & vasorum ingredientium & egredientium symmetria & magnitudine, quam natura, nihil faciens frustra, his vasis proportionatam frustra non fecit; tum ex concinno & diligenti valvularum & fibrarum artificio, reliquaque cordis fabrica; tum ex aliis multis sæpius mecum & serio considerassem & animo diutius evolvissem, quanta scilicet esset copia transmissi sanguinis, & quam brevi tempore ea transmitteretur, nec tamen suppeditari illam ab ingesti alimenti succo posse animadverti, quin venas inanitas & omnino exhaustas, arterias vero nimia sanguinis intrusione disrumpas haberemus, nisi sanguis aliquo ex arteriis denuo in venas remearet, & ad cordis dextrum ventriculum regrederetur: Cœpi ego met mecum cogitare, an motionem quandam quasi in circulo haberet; quam postea veram esse reperi, & sanguinem è corde per arterias in habitum corporis & omnes partes protrudi & impelli à sinistri cordis ventriculi pulsu; quemadmodum in pulmones per venam arteriosam à dextri: & rursus per venas in venam cavam, & usque ad auriculam dextram remeare, quemadmodum ex pulmonibus per arteriam dictam venosam ad sinistram ventriculum, ut ante dictum est.

Quem motum, circularem eo pacto nominare liceat, quo Aristoteles aërem & pluviam circularem superiorum motum æmulari dixit. Terra enim madida à sole calefacta evaporat, vapores sursum elati condensantur, condensati in pluvias rursus descendunt & terram madefaciunt, atque hoc pa-

cto fiunt hic generationes, & similiter tempestatum ac meteororum ortus, à solis circulari motu, accessu & recessu.

Sic verisimiliter contingit in corpore, motu sanguinis partes omnes sanguine calidiori perfectio, vaporoso, spirituosio & ut ita dicam, alimentativo nutriri, foveri, vegetari: contra in partibus sanguinem refrigerari, coagulari & quasi effectum reddi, unde ad principium, videlicet Cor, tanquam ad fontem sive ad lares corporis, perfectionis recuperandæ causa revertitur; ibi calore naturali, potenti, fervido, tanquam vitæ thesauro, denuo colliquatur, spiritibus & ut ita dicam, balsamo prægnans inde rursus dispensatur, & hæc omnia à motu & pulsu cordis dependere.

Ita cor, principium vitæ & sol microcosmi, ut proportionabiliter sol, Cor mundi appellari mereatur, cujus virtute & pulsu sanguis movetur, perficitur, vegetatur, & à corruptione & grumescatione vindicatur; suumque officium nutriendo, fovendo, vegetando toti corpori præstat. Lar iste familiaris, fundamentum vitæ, author omnium; sed de his convenientius, cum de hujusmodi motus causa finali speculabimur.

Hinc cum venæ sint vitæ quædam & vasa deferentia sanguinem, duplex est genus ipsarum, Cava & Aorta, non ratione lateris (ut Aristoteles,) sed officio; & non, ut vulgo, constitutione (cum in multis animalibus, ut dixi, in tunicæ crassitie vena ab arteria non differat,) sed munere & usu distincta. Vena & arteria ambæ à veteribus venæ non immerito dictæ sunt, ut Galenus annotavit; eo quod hæc, videlicet arteria, vas est deferens sanguinem è corde in habitum corporis; illa, sanguinem ab habitu rursus in cor; hæc, via à corde; illa usque ad cor; illa, continet sanguinem crudorem, effectum & nutritioni jam redditum inidoneum; hæc, coctum, perfectum, alimentarium.

C A P. IX.

Esse sanguinis circuitum ex primo supposito confirmato.

SEd ne verba dare nos dicat quispiam, & assertiones speciosas tantum facere sine fundamento, & non iusta de causa innovare: tria confirmanda veniunt, quibus positis, necessario hanc sequi veritatem & rem palam esse arbitror.

Primum, continue & continenter sanguinem è vena cava in arterias in tanta copia transmitti, pulsu cordis, ut ab assumptis suppeditari non possit, & adeo ut tota massa brevi tempore illinc pertranseat.

Secundum, continue æqualiter & continenter sanguinem in quodcumque membrum & partem pulsu arteriarum impelli & ingredi majori copia multo, quam nutritioni sufficiens sit, vel tota massa suppeditare possit.

Tertium, ab unoquoque membro ipsas venas hunc sanguinem perpetuo retroducere ad cordis locum.

His positis, sanguinem circumire, revolvì, propelli & remeare à corde in extremitates, & inde in cor rursus, & sic quasi circularem motum peragere, manifestum puto fore.

Supponamus (vel cogitatione vel experimento) sinistram ventriculum in dilatatione, quum repletus

tus est, continere sanguinis uncias duas, tres, quatuor: ego in mortuo reperi ultra duas.

Supponamus similiter, quanto minus in ipsa contractione redditur vel quantum sese contrahit cor, tanto ejus ventriculum minorem capacitatem habere in ipsa contractione vel contractionibus, adeoque partem aliquam sanguinis in arteriam magnam protrudi: (protrudere enim aliquid semper & ante demonstratum est cap. xxi, & omnes in Sytsole fatentur, ex fabrica valvularum persua- si.) Verisimili autem conjectura ponere licet, in arteriam immitti partem vel quartam vel quintam vel sextam, & minimum octavam.

Quod si jam in homine protrudi singulis cordis pulsibus supponamus unciam semis vel drachmas tres aut unam tantum sanguinis, quæ propter impedimentum valvularum in cor remeare non possit; cor autem una semihora plusquam mille pulsus faciat, imo in aliquibus & aliquando duo, tria, vel quatuor millia, si eos multiplices per drachmas, videbis una semihora tria vel duo drachmarum millia, vel uncias quingentas, aut talem aliquam proportionatam quantitatem sanguinis per cor in arterias transfundi, majori certe semper copia quam in universo corpore contingat reperiri. Similiter in ove aut cane quod pertransit, esto ad scrupulum unum in una cordis contractione, tum una semihora mille scrupulos vel circa libras tres & semis sanguinis pertransire oportebit; cum tamen in eo corpore plerumque non contineatur plus quatuor libris sanguinis, uti in ove expertus sum.

Ita pene, supputatione facta secundum minimum quod conjectare possumus transmissi sanguinis, & enumeratis pulsationibus, videbitur totam quantitatem massæ sanguineæ pertransire è venis in arterias per cor, & similiter per pulmones.

Sed esto, quod non una semihora, sed una hora vel die uno, id fiat, nihilominus manifestum facit, plus sanguinis per cor ejus pulsû transmitti continue, quam vel ingestum alimentum possit suppeditare, vel in venis simul contineri.

Nec est dicendum, quod cor in sua contractione aliquando protrudat, aliquando non, vel quasi nihil & imaginarium quid. Hoc enim ante confirmatum est, & præterea sensus contrarium est & rationi. Si enim dilatato corde repleti necesse est ventriculos sanguine; contracto rursus necesse est protrudere semper, & quidem non parum, cum & ductus non parvi & contractio non parva sit. In quavis autem proportionem, videlicet subtripla, subseptupla vel suboctupla, similiter proportio sanguinis exclusi debet se habere ad ante contentum & in dilatatione repletem; uti se habet capacitas contracti ventriculi ad illam, quæ est dilatati. Et sicuti cum in dilatatione non contingit repleti nihilo vel imaginario: ita in contractione nunquam nihil vel imaginarium expellit, sed semper aliquid secundum proportionem contractionis. Quare concludendum, si uno pulsû in homine, vel ove, vel bove, cor emittit drachmam unam, & mille sunt pulsus in una semihora, contingit eodem tempore libras decem & uncias quinque transmissas esse: si uno pulsû drachmas duas, libras viginti & uncias decem: si semiunciam, libras quadraginta unam & uncias octo: si unciam, libras octoginta tres & uncias quatuor contingit,

inquam, in una semihora transfusas esse è venis in arterias.

Sed quantum in unoquoque protrudatur sanguinis pulsationibus, & quando plus aut quando minus, & qua de causa, accuratius post hæc ex multis observationibus à me forsan palam fiet.

Interim hoc scio, & omnes admonitos velim, quod aliquando uberiore copia pertranseat sanguis, aliquando minore; & sanguinis circuitus quandoque citius, quandoque tardius peragatur, secundum temperamentum, ætatem, causas externas & internas, res naturales & non naturales, somnum, quietem, victum, exercitia, animi pathemata, & similia.

Verumtamenvero cum per pulmones & cor vel minima copia transit sanguis, longe uberiori adhuc proventu in arterias & totum corpus diducitur, quam ab alimentorum ingestione aut omnino suppeditari possibile sit, nisi regressu per circuitum facto.

Hoc etiam palam fit sensu, vivorum dissectionem intuentibus, non solum si aperta magna arteria, sed (quod confirmat Galenus in ipso homine) quævis vel minima arteria dissecta fuerit, unius pene semihoræ spatio totam sanguinis massam è toto corpore, tam venis quam arteriis exhaustam fore.

Similiter laniones omnibus hoc satis attestari possunt, quando rescissis arteriis jugularibus in macando bove, minus unius horæ quadrante totam sanguinis massam exhauriunt, & vasa omnia inania reddunt. In membrorum excisione tumorumque ex larga sanguinis profusione idem comperimus aliquando brevi contingere.

Nec perstringit hujus argumenti vim, quod per venas effluere in jugulatione & membrorum excisione æque, si non magis, quam per arterias dicat quispiam, cum contra se res habet. Venæ enim, quia subsident, quia in ipsis nulla vis cogens foras sanguinem, & quia impedimento valvularum positio est (ut postea patebit,) parum admodum reddunt: arteriæ vero impetu impulsam sanguinem foras largius, impetuosius, tanquam cum syphone ejectum profundunt. Sed experiunda res est, omnia vena & incisa jugulari in ove vel cane; & quanto impetu, quanta protrusione, quam cito omnem sanguinem è toto corpore, tam venis, quam arteriis contingat inaniri admirabile videbitur. Arterias autem nullibi sanguinem è venis recipere, nisi transmissione facta per cor, ex ante dictis patet. Quod si ligando Aortam ad radicem cordis, & aperiendo jugularem vel aliam arteriam, solum arterias inaniri & venas repleti conspexeris, non potes amplius dubitare.

Hinc causam aperte videbis, cur in Anatome tantum sanguinis reperitur in venis, parum vero in arteriis; cur itidem multum in dextro ventriculo, parum in sinistro; quæ res antiquis dubitandi occasionem forsan præbuit, & existimandi, spiritus solos in illis cavitatibus contineri quamdiu vita superstes animali fuerit. Illius autem causa forsan est, quod è venis in arterias nullibi datur transitus, nisi per cor ipsum & per pulmones. Cum vero expiraverunt & pulmones moveri desierunt, è venarum arteriosæ ramulis in arteriam venosam, & inde in sinistrum ventriculum cordis sanguis permeare prohi-

prohibetur, uti in Embryone ante motum est prohiberi ob defectum motus pulmonum, oscilla & porositates cœcas & invisibiles eorum aperientis claudenticque. Cum vero una cum pulmonibus cor non desinat moveri, sed postea pulsare & supervivere pergat; contingit finistrum ventriculum & arterias emittere in venas ad habitum corporis sanguinem, & per pulmones non recipere, & proinde quasi inanitas inveniri.

Sed hoc etiam in rem nostram non parum facit fidei, cum hujus nulla alia causa, nisi quam nos ex nostra suppositione afferimus, adduci possit.

Præterea hinc pater, quo magis aut vehementius arteriæ pulsant, eo citius in omni sanguinis hæmorrhagia inanitum iri corpus.

Hinc etiam in omni Lipothymia, omni timore, & hujusmodi, quando cor languidius & infirmius, nullo impetu pulsât, omnem contingit hæmorrhagiam sedari & cohiberi.

Hinc etiam est, quod corpore mortuo, postquam cor cessavit pulsare, non poteris vel è jugularibus vel cruralibus venis aut arteriis apertis ullo conatu massæ sanguineæ ultra partem mediam elicere. Nec lanio, si bovi, postquam ejus caput percussit, & attonitum reddidit, jugulum prius non secuerit, quam cor pulsare desierit, totum sanguinem exhaurire ab eo poterit.

Denique hinc de Anætomosi venarum & artèriarum, ubi & quomodo sit, & qua de causa, nemò hæcenus rectè quidquam dixisse licet suspicari, ego in illa disquisitione jam sum.

C A P. X.

Primum suppositum de copia pertranscurrentis sanguinis à venis in arterias, & esse sanguinis circuitum ab objectionibus vindicatur, & experimentis ulterius confirmatur.

HÆcenus primum suppositum confirmatum est, si ve res ad calculum revocetur, si ve ad experimenta & autopsiam referatur, videlicet, quod sanguis pertransseat in arterias majori copia continue, quam ab alimento suppeditari possit, ita ut tota massa brevi spatio illac pertransseunte, necesse sit, ut circuitus fiat & sanguis regrediatur.

Verum si quis hic dicat, quod magna copia possit pertransire & non sit necesse circuitum fieri, quoniam ab assumptis refarciri queat, & exemplo esse lactis in mammis proventum: vacca enim una die lactis congios tres, vel quatuor, vel septem, vel plures reddit; mulier itidem duas vel tres heminas, infantem unum duosve lactans singulis diebus præbet, quas ab assumptis restitui manifestum est. Respondendum, quod cor tantundem vel amplius una hora vel altera, computatione facta, remittere constat.

Sin vero nondum persuasus instet, usque dicendo, quod licet dissecta arteria, quasi data & aperta via, præter naturam contingat sanguinem cum impetu effundi; non tamen propterea integro corpore & non dato exitu, & arteriis plenis vel secundum naturam constitutis, tantam copiam tam brevi spatio pertransire debere, ut regressum fieri sit necesse. Respondendum, quod ex ante dicta computatione, subducta ratione, apparet, quantum cor repletum ulterius continet in sua dilata-

tione quam in constrictione, tantundem, majori ex parte, singulis pulsationibus emitti, & proinde in tanta copia pertransire integro corpore & secundum naturam constituto.

Sed in serpentibus & piscibus quibusdam, ligando venas per aliquod spatium infra cor, videbis spatium inter ligaturam & cor valde cito inaniri, ita ut regredi sanguinem (nisi autopsiam neges) asserere necesse habeas. Posterius etiam idem clare patebit in secundi suppositi confirmatione.

Hæc omnia uno exemplo confirmantes concludamus, quo fidem oculis propriis adhibere unusquisque possit, si anguem vivum disseuerit, videbit plus quam per integram horam cor placide, distincte, pulsare & sese tanquam vermem in constrictione (cum oblongum sit) secundum longitudinem contrahere & propellere, in Systole albidiori colore esse, contra in Diastole, & reliqua pene omnia, quibus evidenter hanc veritatem confirmatum iri diximus: hic enim omnia longiora & distinctiora magis sunt. Sed hoc peculiariter & luce clarius meridiana experiri licet. Vena cava partem inferiorem cordis subingreditur, exit arteria parte superiori; jam comprehensa vena cava vel tenaculis vel digito & pollice, sanguinique cursu intercepto, per aliquod spatium infra cor, videbis exinde statim pene inaniri illam partem intra digitos & cor, sanguine exhausto à cordis pulsu, simul cor albidiori multo colore esse, etiam in dilatatione sua, & ob defectum sanguinis minus esse, & languidius tandem pulsare, sic ut emori denique videatur. Contra statim soluta vena, color & magnitudo redeunt cordi; postea si reliquas venam, & arterias similiter per aliquam distantiam à corde ligaveris vel compresseris, videbis contra illas turgere in parte comprehensa vehementer, & cor ultra modum distendi, purpureum colorem contrahere usque ad livorem, & tandem opprimi sanguine, sic ut suffocatum iri credas: soluto vero vinculo rursus ad naturalem constitutionem in colore, magnitudine & pulsu redire.

Ecce jam, duo sunt genera mortis, extinctio ob defectum, & suffocatio ob copiam. hic ad oculos utriusque exemplum habere licet, & dictam veritatem autopsia in corde confirmare.

C A P. XI.

Secundum suppositum confirmatur.

Secundum confirmandum à nobis quo clarius intuentibus appareat, annotanda sunt experimenta quædam, ex quibus pateat sanguinem in quodcumque membrum per arterias ingredi, & per venas remeare; & arterias, vasa esse deferentia sanguinem à corde; at venas, vasa & vias esse regrediendi sanguinis ad cor. Præterea in membris & extremitatibus sanguinem vel per anastomosi immediate, vel mediate per carnis porositates, vel utroque modo transire ab artèriis in venas, sicut ante in corde & thorace è venis in arterias: ut inde in circuitu moveri illum hinc illuc, huc iterum illinc, hoc est è centro in extrema & ab extremis rursus ad centrum manifestum fiat.

Quin etiam, computatione facta, similiter manifestum inde erit de copia, quæ neque ab assumptis

possit suppeditari, neque ad nutritionem necessarium requiratur.

Simul etiam de ligaturis liquebit, quare attrahant, & quod neque calore, neque dolore, neque vi vacui, neque ulla antehac cognita causa id præstent; quam insuper commoditatem & usum afferre possint in medicina; & quomodo hæmorrhagiam supprimant aut provocent; & qua de causa gangrænas & mortificationes membrorum inducant, & sic in castratione animalium quorundam, & tumorum carnosorum & verrucarum exemptione usus fiat.

Enimvero quia nemo horum omnium causas & rationes recte affectus fuit, hinc fieri solet, quod omnes fere ex antiquorum sententia in morbis curandis proponant quidem & consulant ligaturas, pauci vero recta earum administratione in curationibus suis aliquid adjuvamenti afferant.

Ligatura autem alia stricta est, alia mediocris.

Strictam ligaturam dico, cum ita arte undique constringitur membrum fascia vel laqueo, ut ultra ipsam ligaturam nullibi arteriæ pulsare percipiantur. Tali utitur in membrorum excisione, fluxui sanguinis prospicientes; & tali etiam utuntur in castratione animalium, & tumorum ablatione; qua ligatura affluxu alimenti & caloris omnino intercepto, tabescere & emori testiculos atque ingentes sarcoles, & postea decidere videmus.

Mediocre vero ligaturam voco, quæ undique membrum comprimit, sed citra dolorem & sic, ut ultra ligaturam aliquantulum arteriam pulsare sinat; qualis in attractione & sanguinis missione usus est: nam licet supra cubitum fiat ligatura, tamen arteriæ in carpo aliquantulum pulsare tactu percipies, si recte in phlebotomia fiat ligatura.

Iam experimentum fiat in brachio hominis, vel adhibita fascia, quali in sanguinis missione utuntur, vel ipsius manus fortiore comprehensione. Fiet autem illud commodius in macilento corpore & cui venæ sunt ampliores, & quando calefacto corpore calent extrema, & major quantitas sanguinis in extremitatibus erit, & pulsus vehementiores: omnia enim tunc evidentiore apparebunt.

Facta itaque stricta ligatura quam arte fieri potest, ut quis eam ferat tamen, observare licebit primum ultra ligaturam manum versus non pulsare in carpo vel uspiam arteriam.

Deinde, immediate supra ligaturam incipere arteriam altius suam Diastolem habere, & magis altiusque & vehementius pulsare, & prope ipsam ligaturam æstu quasi quodam intumescere, ac si fluxum interceptum & transitum inhibuit percurrere & referare conaretur: magisque arteriam, quam par sit, ibi repletam apparere. Denique, manum colorem suum & constitutionem retinere; solum tactu temporis refrigerari aliquantulum, sed nihil interim attrahi in eam.

Postquam per aliquod spatium permanfit ista ligatura, derepente paululum solvatur in medio, quali ut dixi in sanguinis missione utuntur, & observabis manum totam statim colorari & distendi, & ejus venas tumidas & varicolas fieri, & spatio decem vel duodecim pulsationum illius arteriæ, multo sanguine impulsio atque impactio reforescentissimam manum cernes, & ab illa ligatura mediocris multam copiam sanguinis affatim attractam

esse absque dolore, vel calore, vel fuga vacui, vel ulla alia antehac commemorata causa.

Quod si vero quis diligenter in ipso illius solutionis momento prope ligaturam digitum ad arteriam jam pulsantem applicaverit, quasi subtus præterlabentem sanguinem sentiet.

Ipsæ porro, cujus in brachio fit experimentum, à solutione ligaturæ strictæ in mediocrem, plane calorem & sanguinem pulsu ingredientem, quasi semoto obstaculo, illico sentiet, & aliquid secundum ductum arteriarum, tanquam confestim infusum & sparsim per manum transmissum percipiet, & continuo calefieri manum & distendi.

Quemadmodum autem in stricta ligatura, arteriæ supra ligaturam distenduntur & pulsant, non infra: ita hac mediocri contra, venæ infra ligaturam turgent & renitentes fiunt; supra vero nequaquam & arteriæ minores redduntur. Imo, si venas tumidas non valde fortiter compresseris, vix supra ligaturam aut sanguinem diffundi aut venas distendi conspicias.

Ita ex his cuivis diligentis observanti facile est noscere, sanguinem ingredi per arterias. Etenim in stricta earum ligatura nihil attrahitur, manus colorem servat, nihil influit, neque fit distensio: ipsis vero paululum solutis usque ad mediocrem ligaturam, vi pulsus affatim sanguinem intus trudi, manumque tumidam fieri manifestum est. Nam cum arteriæ pulsant, ut in mediocri ligatura, sanguis profuit in manum: cum vero non, ut in stricta, nequaquam, nisi supra ligaturam. Cum interim venis compressis nihil per ipsas influere possit: cujus hoc est signum, quod infra ligaturam tumidiore multo sint, quam supra, & quam dempta ligatura soleant esse, & quod compressæ nihil superioribus suggerant: ita ut, ligaturam impedire regressum sanguinis per venas ad superiora, easque infra ligaturam tumidas facere & servare, clare pateat.

Arteriæ vero iusta de causa, non obstante mediocri ligatura, vi & impulsu cordis ab internis corporis partibus foras ultra ligaturam sanguinem trudent. Atque ista est differentia strictæ ligaturæ à mediocri, quod ista non solum transitum sanguinis in venis, sed in arteriis quoque interceptat: hæc, vim pulsificam, quo minus ultra ligaturam se exporrigat & ad extimas corporis partes propellat, sanguinem non impedit.

Adeo ut sic ratiocinari liceat: cum in mediocri ligatura venas turgidas & distentas esse, & manum plurimo sanguine impleri videmus, unde fit hoc? Sane oportet aut per venas, aut per arterias, aut per cæcas porositates infra ligaturam sanguinem advenire. E venis, non potest; per cæcos ductus, minus, ergo per arterias, secundum quod dictum, necesse est. Per venas influere non posse, patet; cum non exprimi retro sanguinem contingat supra ligaturam, nisi quando ea prorsus ablata subito omnes venæ detumescere & sese in superiores partes exonerare, manus dealbari, ac sursum omnis qui collectus erat & tumor & sanguis affatim evanescere conspiciuntur.

Amplius sentiet ipse, cui ita post multum spatium ligatus carpus aut brachium & manus tumidæ pauloque frigidiore inde redditæ fuerint, sentiet, inquam, à solutione mediocris ligaturæ frigidum

dum quid sursum usque ad cubitum vel axillas obrepere, una scilicet cum revertente sanguine. Quem ego frigidi sanguinis, post missionem ejus & solutum vinculum, recursum ad cor usque, in causa fuisse lipothymiae arbitror, quam etiam robustis aliquando supervenire vidimus, maxime à solutione ligaturae; quod vulgo fieri dicunt à conversione sanguinis.

Præterea, cum statim à solutione strictæ ligaturae in mediocrem per immisionem sanguinis in arterias, continuo venas intumescere videmus infra ligaturam comprehensas, non autem arterias; signum est, sanguinem ab arteriis in venas, & non contra permeare; & vel anastomosis vasorum dari, vel porositates carnis & partium solidarum pervias sanguini esse. Item signum est, venas plurimas inter sese communicare, quod in ligatura mediocri supra cubitum facta multae attolluntur simul & turgent: ex una autem venula scalpello exitu sanguini dato, omnes statim detumescunt & in illam unam sese exonerantes subidunt simul pene omnes.

Hinc unusquisque potest causas attractionis, quæ fit per ligaturas, & forsan omnis fluxionis cognoscere. Nam quemadmodum in manu per istam, quam dico mediocrem ligaturam compressis venis sanguis exire non potest: ita cum per arterias vi cordis impingitur, non potens exire, necesse est ut inde pars repleatur & distendatur.

Alias enim qui fieri potest? Calor & dolor & vis vacui attrahunt quidem, sed ut impleatur tantum pars, non ut distendatur aut tumefiat ultra naturalem constitutionem, & ob infarctum & arcte impactum vi sanguinem tam violenter, tam subito opprimatur, ut caro continui solutionem pati & vasa dirumpi cernantur. Hoc enim aut calore, aut dolore, aut vi vacui fieri posse, nunquam credibile aut demonstrabile est.

Insuper à ligatura contingit attractionem fieri, absque omni dolore, calore aut ulla vi vacui. Quod si à dolore aliquo accideret sanguinem attrahi, quo modo ad cubitum, ligato brachio, infra ligaturam intumescunt & manus & digiti & venæ varicosæ? cum propter ligaturæ compressionem eo pervenire sanguis per venas non possit: & quare supra ligaturam in cubito neque tumoris aut repletionis signum, neque venarum turgescentiæ, neque omnino attractionis aut affluxus vestigium apparet?

Sed attractionis infra ligaturam, & tumefactionis ultra naturæ modum in manu & digitis, hæc causa manifesta; nempe, quod sanguis cum impetu & affatim ingreditur, exire vero nequeat. An illa vero omnis tumoris causa (ut est apud Avicennam) & omnis redundantiæ opprimentis in parte? Omnino; quia viæ ingressus apertæ, egressus clausæ, unde impleri & in tumorem attolli necesse est.

An hinc etiam contingit in tuberculis inflammatoriis, quod quousque tumor incrementum capessit, & non est in ultimo statu, sentiantur eo loci pulsus plenus, præsertim in calidioribus tumoribus in quibus incrementum derepente fieri solet? sed hæc posterioris disquisitionis sunt. An etiam hinc contingit, quod in me ipso casu expertus sum? Ego è curru delapsus aliquando fronte per-

cutiebar eo loci, quo arteriæ ramulus à temporibus prorepat; statim ab ipsa percussione, spatio fere viginti pulsationum tumorem ovi magnitudine, absque vel calore vel multo dolore, passus sum; sane propter arteriæ vicinitatem, in locum confusum sanguis affatim magis & velocius impingebatur.

Hinc vero apparet, qua de causa in phlebotomia, quando longius proflire & majori impetu exire sanguinem volumus, supra sectionem ligemus, non infra. Quod si per venas inde efflueret tanta copia à partibus superioribus, ligatura illa non modo non adjuvaret, sed impediret. Unde infra sectionem fieri ligaturam debere, quo sanguis inhibitus uberius exeat, verifimilis est, si ex partibus superioribus eo per venas descendens per venas emanet: sed cum aliunde per arterias impellatur in venas inferiores, in quibus regressus per ligaturam præpeditur, venæ turgent & distent ipsam majori impetu per orificium elidere & longius ejicere possunt; soluta vero ligatura, viaque regressus aperta, ecce non amplius nisi guttatim decedit, & quod omnes norunt, si vel vinculum solveris in administranda phlebotomia, vel infra ligaveris, vel stricta nimis ligatura membrum constrinxeris, tum sanguis absque impetu exit; quia scilicet via ingressus & influxus sanguinis per arterias intercepta est. Modice ergo stricta ligatura articularum, egressus liberior datur per venas, quam ligatura soluta.

C A P. X I I.

Esse sanguinis circuitum ex secundo supposito confirmato.

Hæc cum ita sint, constat confirmatum iri etiam illud, quod antea dicebam, nimirum per cor continuo sanguinem transire. Videmus enim ab arteriis sanguinem in venas dimanare, non è venis in arterias. Videmus insuper, vel pene totam massam sanguinis exhauriri posse ab ipso brachio, idque una vena cuticulari scalpello aperta, si fiat ligatura decens. Videmus præterea, ita impetuose & affatim effundi, ut non solum qui ante sectionem in brachio infra ligaturam comprehensus erat sanguis, sed & omnis ex toto brachio & toto corpore, tam arteriis quam venis, brevi & cito evacuetur.

Quare confiteri necesse est primo, vi & impetu suppeditari, & vi impingi infra ligaturam: vi enim & impulsu exit; ergo & cordis pulsus & robore: vis enim & impulsio sanguinis solum à corde est.

Deinde, à corde provenire hunc fluxum, & per cor transitu facto è venis magnis hac effluere, similiter confiteri necesse est, cum infra ligaturam per arterias ingreditur, non per venas; & arteriæ nuspam sanguinem è venis recipiant, nisi è sinistro ventriculo cordis.

Neque omnino aliter ex una vena, facta supra ligatura, tanta copia exhauriri ullo modo posset, præsertim tam impetuose & affatim, tamque facile, tam subito, nisi à corde, vi & impulsu ejus consecutio fiat hoc dicto modo.

Et si hæc ita sint, hinc præterea de copia computationem facere, & de circulari motu sanguinis argumentari apertissime possumus. Si etenim in phlebotomia quis sanguinem eo quo solet pro-

rumpere effusionis impetu, per semihoram profluere sineret, nulli dubium, quin maxima illius parte exhausta, lipothymia & syncope adventarent, & non solum arteriæ, sed & venæ magnæ pene inanitæ forent. Transire ergo rationabile est, semihoræ illo spatio tantundem è vena magna per cor in aortam.

Uterius, si quot uncia sanguinis per unum brachium perfuant, vel quot in viginti vel triginta pulsationibus infra mediocrem ligaturam truantur, supputares; daret profecto occasionem cogitandi, quantum per aliud brachium interea, quantum per utrumque crus, per collum utrinque, per alias item omnes arterias & venas corporis pertranseat; quibus omnibus interim fluxus, qui per pulmones & cordis ventriculos fit, novum continuo sanguinem suggerere debet, & id quidem è venis: necessarium ergo est, circuitum fieri; cum nec suppeditari ab assumptis possit, & longe plus sit, quam partium nutritioni congruens erat.

Amplius observandum, quod in administranda phlebotomia quandoque contingat hanc veritatem confirmari. Nam brachium quanquam recte ligaveris, & scalpello debito modo venam secueris, aptatis orificiis & omnibus rite administratis; tamen si timor, vel lipoplychia animi pathemate aut quavis alia causa adveniat, & cor languidius pulset, nullo modo sanguis exibat, nisi guttatim: præsertim si ligatura strictior paulo facta sit. Ratio est, quia compressam arteriam languidior pulsus & impellens vis infirmior recludere, & sanguinem infra ligaturam trudere non valet: imo per pulmones deducere aut è venis in arterias copiose transferre, enervatum & languidum cor non potest. Sic eodem modo & eisdem de causis contingit mulierum menstrua, & omnem hæmorrhagiam sedari. Ex contrariis etiam hoc patet; quoniam redintegrato animo, amoto metu, cum ad se redeunt, jam adaucto robore pulsificante, arterias statim vehementius pulsare etiam in parte ligata, & in carpo moveri, & sanguinem per orificium longius proflire ac continuo ductum videbis.

C A P. XIII.

Tertium suppositum confirmatur, & ex eo, esse sanguinis circuitum.

HActenus de copia pertranseuntis sanguinis per cor & pulmones in centro corporis, & similiter ab arteriis in venas in habitu ejus. Restat, ut explicemus, quomodo per venas ab extremitatibus retro ad cor sanguis remeet, & quomodo venæ sint vasa deferentia solum sanguinem ab extremitatibus ad centrum: quo facto, tria illa proposita fundamenta pro circuitu sanguinis, fore aperta, vera, stabilia & ad fidem illi faciendam sufficientia existimamus.

Hoc autem ex valvulis, quæ in ipsis venarum cavitatibus reperiuntur, earumque usu, & ocularibus experimentis, satis erit apertum.

Clarissimus Hieronymus Fabr. ab Aquapendente, peritissimus Anatomicus & venerabilis senex, vel ut voluit Doctiss. Riolanus, Jac. Sylvius primus in venis membranas valvulas delineavit figura sigmoides, vel semilunares portiunculas tunicæ interioris venarum eminentes tenuissimas. Sitæ

sunt distantibus in locis & vario modo in variis hominibus, ad venæ latera connatæ, & sursum versus venarum radices spectantes, & ambæ (ut plurimum enim duæ) sunt usque in mediam capacitatem venæ se invicem respicientes atque contingentes, sequentium cornibus præcedentibus convexæ medio alternatim semper respicientibus, in extremitatibus ita coherere ac copulari aptæ, ut si quid è radice venarum in ramos vel è majoribus in minores permeare velit, omnino impediant.




Harum valvularum verum usum Inventor non est assecutus, nec alii addiderunt. Non est enim, ne pondere deorsum sanguis in inferiora totus ruat: in jugularibus namque deorsum spectant & sanguinem sursum ferri prohibent. Quin nec ubique sursum spectant, sed semper versus radices venarum & ubique versus cordis locum. Ego, ut alii etiam, aliquando in emulgentibus reperi, & in ramis mesenterii versus venam cavam & portam spectantes. Adde insuper, quod in arteriis nullæ sunt. Notare etiam licet, quod canes & boves habent valvulas omnes in divisione cruralium venarum ad principium ossis sacri, vel in ramis illis prope coxendicem, in quibus nil tale timendum propter pronitatem corporis.

Nec, uti quidam ajunt, propter metum Apoplexiæ sunt in jugularibus valvulae; quia materia in somno potius per arterias soporales influere in caput apta est.

Nec etiam, ut sanguis in divaricationibus sistatur, atque in ramos exiles, nec totus in magis apertos & capaces irrueret: posita enim sunt ubi nullæ divaricationes, licet frequentiores conspici fateor circa divaricationes.

Nec denique, ut motus sanguinis à centro corporis retardetur solum: tarde enim satis sua sponte è majoribus in minores ramulos intrudi, è massa & fonte separari, aut è locis calidioribus in frigidiora migrare, verisimile est. Sed omnino valvulae factæ sunt, ne vel à venis magnis in minores moveretur sanguis, & sic illas dilaceraret aut varicosas efficeret; vel à centro corporis in extrema sed ut potius ab extremitatibus ad centrum progrediretur; ita enim huic motui valvulae tenues facile occluduntur, contrarium motum omnino supprimentes. Vnde & sic posita & ordinatæ sunt, ut quidquid per cornua superiorum minus transitu prohibetur, sed quasi per rimas elabatur, illud convexitas subsequens transversum posita excipiat & sistat, ne ulterius transeat.

Ego illud sapissime in dissectione venarum expertus sum, si à radice venarum initio facto versus exiles earumdem ramos specillum immitterem quanto possem artificio, ob impedimentum valvularum longius impellere non potuissem: contra vero, si è ramulis radicem versus, facillime. Pluribus enim in locis valvulae binæ ad invicem ita posita, & aptatæ sunt, ut cum elevantur, ad amissum in media venæ cavitate cohaereant & extremitatibus convexis invicem uniantur tam prope, ut neque visu cernere, neque satis explorare rimulam aut coitum liceat. Contra vero forinsecus intro immisso stylo cedunt, & (valvarum in morem, quibus fluminum cursus inhibetur,) facillime reclinantur, ut motum sanguinis à corde & vena cava profectum interceptant, & ad amissum pluribus in locis



locis elevatione clausæ inhibeat omnino & supprimant. Adeo ut neque sursum ad caput, neque deorsum ad pedes, aut latera brachii sanguinem à corde moveri sinant; ita enim sunt constitutæ, ut omni motui sanguinis, qui à majoribus venis aspicatus in minores desinere velit, adversentur & obstitant: ei vero, qui à venis exilibus incipiens in majores definit, obsecundent liberamque patientem viam expediant.

Sed quo veritas hæc apertius elucescat, ligetur homini brachium supra cubitum, tanquam ad mittendum sanguinem, AA; per intervalla apparebunt præcipue in ruiticis & varicosis, tanquam nodi quidam & tubercula B, C, D, D, E, F, non solum ubi est divaricatio E, F, sed etiam ubi nulla C, D, D: isti autem nodi à valvulis fiunt. Hoc modo apparentibus valvularum nodis in exteriori parte manus vel cubiti, si pollice vel digito venam comprimendo sanguinem, de nodo sive valvula O, submoveris; versus H [fig. 2,] videbis, inhihentibus omnino valvulis inferioribus alium subsequi non posse, & venæ portionem H, O, infra tuberculum O & digitum detractum H, obliteratam; attamen supra tuberculum vel valvulam O, satis distentam O, G. Immo si ita submoto sanguine versus H, venam inanitam pressione digiti H, retinueris, & altera manu valvulæ O, [3, fig.] partem superiorem distentam deorsum compresseris in K, nulla vi cogi aut impelli sanguinem trans valvulam O, videbis; sed quanto majori conatu hoc feceris, tanto magis ad valvulam vel tuberculum O, venam turgentem distendi videbis, & tamen inferius vacuum esse H, O.

Hoc cum pluribus in locis experiri quis possit, apparet valvularum officium in venis idem esse cum sigmoidarum illarum trium, quæ in orificio aortæ & venæ arteriosæ fabricatæ sunt, videlicet: ut ad amissum claudantur, ne retro sanguinem transeuntem remeare sinant.

Præterea ligato brachio uti prius in AA, & venis turgentibus, si infra tuberculum aliquod sive valvulam venam firmaveris per aliquod spatium in L, [4 fig.] & postea sanguinem sursum supra valvulam N, digito M, compuleris, vacuum illam partem venæ quæ est inter L, & M, permanere videbis, nec retro sanguinem per valvulam regredi posse, ut est H, O, [2 fig.] ablato vero digito H, rursus repleti ab inferioribus, & esse ut D, C, [1 fig.] Atque hinc rursus ab inferioribus ad superiora & ad cor sanguinem moveri in venis, & non contrario modo, plane constat. Et licet aliquibus in locis (ubi aut unica tantum valvula est, aut plures, si adsint, non satis exacte clauduntur) transitus sanguinis à centro ad extrema non videatur prorsus impediri, tamen ut plurimum ita, ut retuli, accidit; vel saltem quod alicubi negligentius fieri visum est, illud ex subsequenti in ordine valvularum vel frequentia vel diligentia vel alio modo compensari apparet, adeo ut venarum viæ patentibus & apertæ sint regredienti sanguini ad cor, progredienti vero à corde omnino clausæ.

Porro, liga ut prius brachium & venis turgentibus, nodisque sive valvulis apparentibus, infra aliquam valvulam in loco ubi subsequenter inveneris, pollice venam firma ita, ut nihil à manu

sursum sanguinis progrediatur, deinde digito sanguinem ab illa venæ portione sursum supra valvulam L, N, exprime eo quo ante dictum est, modo, & ablato iterum digito L, sine rursus repleti ab inferioribus D, C, & rursus appresso pollice identidem sursum exprime sanguinem L, N, & H, O, idemque milies in brevi tempore repete, ac postmodum hoc quod singulis à compressione laxationibus supra valvulam sursum ivit, quantum quantum fuerit, supputa, facta multiplicatione per numerum millenarium reperies tantum sanguinis hoc modo per unius duntaxat venæ partem in non longo tempore transmissum esse, ut de circuitu sanguinis, ab ejus celeri motu, te persuasissimum putes.

Sed ne hoc experimento naturæ vim afferri dicas, in longe distantibus valvulis idem fac & observa quam cito ablato pollice quaque celeriter sanguis sursum percurrat, & venam ab inferiori parte repleat, neque dubito, quin satis pro explorato hoc, quod dixi, sis habiturus.

C A P. XVI.

Conclusio demonstrationis de sanguinis circuitu.

Am denique nostram de circuitu sanguinis sententiam ferre, & omnibus proponere liceat.

Cum hæc confirmata sint omnia & rationibus & ocularibus experimentis; nimirum, sanguinem per pulmones & cor pulsu ventriculorum ejus pertransire, in universon corpus impelli atque immitti, ibi in venas & porositates carnis irrepere, per ipsas iterum venas undique de circumferentia ad centrum ab exiguis venis in majores remeare, illinc in venam cavam, & ad auriculam cordis tandem venire, tanta quidem copia, tanto fluxu ac refluxu hinc per arterias illuc & illinc per venas huc retro, ut ab assumptis suppeditari non possit, quia multo uberiori proventu quam requirit nutritio: cum, inquam, hæc omnia confirmata sint, necessario concludendum est, circulari quodam motu ac circuitu in animalibus sanguinem agitari, & esse in perpetuo motu; quin ad hoc esse actionem sive functionem cordis, quam pulsu peragit; denique motus & pulsus cordis causam omnino unam esse.

C A P. XV.

Sanguinis circuitus rationibus verisimilibus confirmatus.

Sed hoc etiam subjungere non abs re fuerit, secundum communes quasdam ratiocinationes ista ita se habere & conveniens esse & necessarium. Primum cum mors, secundum Aristotelem lib. de respirat. & lib. II, ac III de Part. anim. & alibi, sit corruptio propter calidi defectum, & ventia omnia calida, morientia frigida existant, oportet caloris locum aliquem & originem esse, quasi lares focumque, in quo naturæ homines & primordia ignis nativi continerentur & conserventur, à quo calor & vita in omnes partes tanquam ab origine profluant, alimentum adveniat, concoctio denique & nutritio, & omnis vegetatio dependeat.

Hunc autem locum cor esse, & hoc principium vitæ,

vita, & eo etiam quo dictum est modo, neminem velim dubitare.

Sanguini itaque motu opus est, atque tali, ut ad cor rursus revertatur: nam in externas corporis partes amandatus longe à suo fonte, immotus coagularetur, ut Aristoteles testatur lib. 11 de Part. anim. tum à frigore extremorum & ambientis, tum spiritibus, ut in mortuis, destitutus. Calorem autem & spiritus motu generari & conservari videmus, ut quiete evanescere. Quare ne istud sanguini accideret, necesse fuit, ut semper iterum à fonte & origine tam calorem quam spiritus, & omnino præfervationem suam repeteret, & reverendo redintegraret.

Videmus quemadmodum à frigore exteriori extremitates aliquando algeant, nalis & manus & genæ quasi mortuorum livida appareant, sanguis in ipsis (qualis cadaverum locis pronis solet decumbere) livore consistat, & membra adeo torpida & ægre mobilia evadant, ut vitam pene amisisse videantur. Nullo modo profecto rursus (præsertim tam cito) calorem, colorem & vitam reciperarent, nisi novo ab origine affluxu & appulsu caloris foverentur. Attrahere enim quomodo possunt, quibus calor & vita pene extincta sunt aut quibus meatus condensati & gelato sanguine repleti? quomodo adveniens admittent alimentum & sanguinem? nisi contentum dimiserint, & nisi omnino cor sit, tale principium, in quo cæteris refrigeratis remaneat vita & calor, ut Aristoteles lib. de respirat. cap. 11 ait, & unde novo per arterias transmissio sanguine calido ac spiritibus imbuto quod frige factum & effectum est refocilletur omnesque adeo particulae calorem languidum & vitalem fomitem pene extinctum reparent.

Atque hinc est, quod cæteris omnibus partibus vita restitui, & sanitas recuperari, corde illaeso, possit. Corde vero vel refrigerato, vel vitio gravi aliquo affecto, totum animal pati & corrumpi necesse sit; quia videlicet principium corrumpitur & paritur, & nihil sit, ut Aristoteles lib. 11 de Partib. animal. dicit quod aut ipsi aut cæteris, quæ ab ipso pendent, præbere auxilium possit. Et hinc obiter forsitan ratio petatur, cur à mœrore, amore, invidia, curis & huiusmodi, tabes & extenuatio contingant, aut cacoehymia & proventus cruditas, quæ & morbos plurimos inducant & homines conficiant. Omne namque animi pathema, quod cum dolore, gaudio, spe, aut anxietate humanas mentes exagitat, ad cor usque pertingens & inibi mutationem à naturali constitutione in temperie & pulsu & reliquis faciens, si in principio totum alimentum inquinat, & vires infirmet, minime mirum videri debet, quod varia genera morborum incurabili in membris & corpore subinde procreet; quandoquidem totum corpus in illo casu, vitiato alimento, inopia calidi nativi laborat.

Præter hæc, cum alimento vivant omnia animalia interius concocto, necesse est concoctionem perfectam esse & distributionem, & proinde locum & conceptaculum adeffe, ubi perficiatur alimentum & unde derivetur in singula membra. Hic autem locus, cor est; utpote quod solum ex omnibus partibus non solum in vena & arteria co-

ronali, privato usui, sed potissimum in cavitatibus suis, auriculis scilicet & ventriculis, tanquam in cisternis & promptuario, publico usui sanguinem contineat: cum interim reliquæ omnes partes sui ipsius tantum causa & privato usui & in vasis distaxat sanguinem habeant. Tum etiam quod solum cor ita situm & constitutum sit, ut pulsu suo in omnes partes secundum iustitiam & proportionem cavitatum arteriarum, unicuique particulae inservientium, æqualiter dispensare sanguinem, distribuere, & indigentibus quasi è thesauro & fonte largiri queat.

Amplius, ad hanc distributionem & motum sanguinis, impetu & violenta quadam impulsione opus est; qualem cor præstat facile; tum quia sanguis sponte sua versus illud quasi principium (inquit partis ad totum, vel guttae aquæ sparsæ super tabulam ad massam) facile concentratur & coit, vel uti celerrime alias à frigore, timore, horrore & huiusmodi causis aliis solet: tum quia è venis capillaribus in minores furculos & inde in majores ramos exprimitur motu membrorum & musculorum compressione, proclivis est magis & pronus sanguis, ut è circumferentia moveatur in centrum, quam è contrario, etiam si nullæ valvulae impedimento forent; unde ut principium relinquat, & loca stricta frigidioraque adeat, & contra spontaneum moveatur, tum violentia opus habet sanguis, tum impulsione, qualem cor solum eo, quo dictum est modo, præstare potest.

C A P. X V I.

Sanguinis circuitus ex consequentibus probatus.

Sunt insuper problemata nonnulla, quæ ex hac veritate supposita tanquam consequentia depromta, ad fidem veluti à posteriore faciendam non sunt inutilia; & quæ, cum alias multa ambiguitate & obscuritate involuta videantur, hinc & rationem & causas assignari facile patiantur.

Cur, quod in contagione videmus, in icu venenato, & serpentum aut canis rabidi morsu, in lue venerea, & huiusmodi aliis, illaesa particula contacta tamen totum habitum contingit vitari? Sic enim lues venerea, illaesis aliquando genitalibus quibus contrahitur, primo omnium vel scapularum vel capitis dolore, aliisve symptomatibus sese prodere solet: & vulnere facto à morsu canis rabidi, jam curato, febrem tamen, aut reliqua horrenda symptomata supervenisse experti sumus. An, quia in particulam impressum contagium una cum revertente sanguine ad cor fertur, & inde rediens totum corpus postea inquinat? Possè fieri paroxysmo hinc patet: In tertianæ febris morbosica causa principio cor petens, circa cor & pulmones immoratur, & anhelosos, suspiciosos, ignavos facit; nempe quia principium vitale aggravatur & sanguis in pulmones impingitur, incrassatur, nec transit (hoc ego ex sectione illorum, qui in principio accessionis mortui sunt, expertus loquor) unde semper pulsus frequentes & parvi, & quandoque inordinati sunt; adaucto vero calore, materia attenuata, viis apertis, & transitu facto incallescere incipit universum corpus, pulsus majores ac vehementiores redduntur, & fit paroxysmus febrilis: scilicet tunc, cum calor præternaturalis

accensus in corde, inde in totum corpus per arterias diffunditur, una cum materia morbifica; quæ eo modo à natura exsuperatur ac dissolvitur.

Cur etiam exterius applicata medicamenta vires intro exercent suas, ac si intro sumpta essent? Nam constat Colocynthidem & Aloë, ventrem solvere; Cantharides, urinas movere; Allium, plantis pedum alligatum sputa expectorare: & cordialia corroborare, & hujus generis infinita alia fieri. An quia venæ per officia sua ab exterius admotis absorbent aliquid & intro cum sanguine deferunt, eodem modo, quo illæ in mesenterio ex intestinis chylum exugunt & ad jecur una cum sanguine apportant. Non irrationabile forsitan est hoc dicere. In mesenterio etenim sanguis per arterias coeliacas, mesentericam superiorem & inferiorem ingressus, ad intestina progreditur; à quibus una cum chylis in venas attracto per illarum venarum frequentissimas ramificationes in portam jecoris revertitur, & per ipsum in venam cavam. Sic contingit, ut sanguis in his venis eodem sit imbutus & colore & consistentia eadem qua in reliquis, contra quam plures opinantur. Neque sic duos contrarios motus in omni capillari earum propagine, chyli nempe sursum & sanguinis deorsum inconvenienter fieri, necesse est improbabilius existimare. Sed an non summa naturæ providentia hoc fit? si enim chylus cum sanguine, crudus cum concocto, æquis portionibus confunderetur, non concoctio, transmutatio & sanguificatio inde proveniret, sed magis (cum invicem activa & passiva sint) ex alterutrorum unione mistio & medium quid, ut in perfusione vini cum aqua & oxycrato. Iam vero quando cum sanguine præterlabente multo exigua portio chyli & nulla quasi notabili proportionem miscetur, sanguis naturam suam servat, nihilo secus quam si (quod ait Aristoteles) unam guttam aquæ adjeceris vini dolio, aut è contra, totum non mistum erit, sed vel vinum vel aqua. In venis certe mesaraicis dissectis non chymus, non chylus & sanguis, aut separati, aut confusi reperiuntur, sed idem qui in reliquis venis & colore & consistentia sanguis ad sensum apparet. In quo tamen quia chyli quiddam concoctum (licet insensibiliter) inest, natura jecur appoluit, in cuius mæandris moras trahat & plenior transmutationem acquirat, ne præmature crudum ad eor perveniens vitæ principium obruat. Hinc in Embryone pene nullum usum jecoris esse probat vena umbilicalis jecur manifeste integra pertransiens & foramen vel anastomosis per quam cum vena portæ jecoris jungitur, ut sanguis regrediens ab intestinis fœtus, non per jecur, sed in dictam umbilicalem transiens una cum materno sanguine & revertente à placenta uteri cor petat. Unde etiam in prima fœtus conformatione jecur posterius fingitur. Nos in fœtu humano observimus perfecte delineata omnia membra, imò genitalia distincta, nondum tamen jecoris posita pene rudimenta. Et sane quousque membra (uti & cor ipsum in initio) omnia alba apparent, & præterquam in venis nihil aspiam ruboris continetur, nihil præter rudem & quasi extravenati sanguinis collectionem loco jecoris videbis, quam contusionem potius quamdam vel ruptam venam existimares. In ovo duo quasi vasa umbilicalia inve-

niuntur: unum, ab albumine integrum pertransiens jecur & ad cor recta tendens; alterum, à luteo in venam portæ desinens. Etenim in ovo pullus primum ex albumine tantum formatur & nutritur, à luteo vero post perfectionem & exclusionem: nam intra intestina in ventre pulli contentum post multos dies ab exclusione luteum reperitur, respondetque luteum nutrimento lactis cæterorum animalium.

Sed hæc convenientius in observationibus, ubi hujus generis problemata plurima proponi possunt de tempore conformationis & principatu membrorum: uti cur hoc prius factum aut perfectum sit, illud vero posterius: cur unum supra aliud & quod principatum gerat, & quænam particula alterius causa sit?

De Corde itidem plurima; uti cur primum (Arist. lib. 111 de part. animal.) consistat, & habere videatur in se vitam, motum & sensum, antequam quidquam reliqui corporis perfectum sit?

Et similiter de sanguine, quare antea omnia? & qualiter principium vitæ & animalis habeat, & moveri atque huc illuc impelli desideret? & an ejus causa cor factum videatur?

Eodem modo in pulsuum speculatione, cur nempe lethales aut salutare sint, quæve causas singula eorum genera habeant, quid & quare hoc illudve significant aut prælagant? In Crisibus quoque & expurgationibus naturæ, in nutritione & præsertim in distributione alimenti, uti & in omni fluxione; quin denique in omni parte medicinæ, Physiologica, Pathologica, Semeiotica, Therapeutica, cum quot problemata determinari possint ex hac data veritate & luce, quot dubia solvi, quot obscura dilucidari, animo mecum reputo, campum invenio spatiosissimum, in quo longius excurrere & adeo late expatiari queam, ut non solum in volumen excresceret præter institutum meum, hoc opus; sed mihi forsitan vita ipsa ad finem faciendum deficeret.

In præsentiarum igitur solummodo ea, quæ in administranda Anatome circa fabricam cordis & arteriarum comparent, ad suos usus & causas veras referre enitar. Nam sicuti plurima ubique, quo etiam me convertam, reperiuntur, quæ ex hac veritate lucem recipiunt, & hanc vicissim illustriorem reddunt, ita istam omnino anatomicis argumentis firmatam & exornatam præ cæteris volo.

Est unum, quod licet inter observationes nostras de lienis usu locum habere deberet, tamen hic quoque obiter annotare non erit impertinens. A Ramo splenico in pancreas deducto, parte superiore, oriuntur venæ coronalis, postica, gastrica, & gastro-epiploica; quæ omnes plurimis furculis & ramificationibus diffeminantur in ventriculum, veluti mesaraicæ in intestina: similiter à parte inferiore illius rami splenici deorsum in colon & longanoneum usque deducitur vena hæmorrhoidalis. Per has venas utriusque sanguis regrediens & succum crudiorum, hinc à ventriculo aqueum & tenuem nondum perfectam chylificationem; illinc crassum & terrestriorem, tanquam è fecibus acceptum secum reportans, in hoc ramo splenico contrariorum permixtione convenienter attemperatur, & naturæ beneficio (quæ ambos hos succos propter contrarias indispotiones diffi-

cilioris

cilioris coctionis, permiscet invicem & multa copia calidioris sanguinis à liene uberrime per multiplices arterias scaturientis perfundit præparatus magis ad jecoris portas adducitur; adeo & defectus utrorumque extremorum tali venarum fabrica abunde suppleatur & compensetur.

C A P. XVII.

Confirmatur sanguinis motus & circuitus ex apparentibus in Corde, & iis, quæ ex dissectione Anatomica patent.

COr non in omnibus animalibus invenio distinctam esse & separatam particulam. Quædam enim cor non habent, ut Zoophyta sive plant-animalia, & animalia quæ sunt frigidiora, exiguæ corpulentia, mollioris texturæ, similis cujusdam constitutionis, ut erucarum genus & lumbricorum, & quæ ex putredine oriuntur, neque servant speciem. His cor non est, quod non habeant opus impulsore, quo alimentum in extrema deferatur. Corpus enim connatum & unum absque membris indistinctum obtinent, sic ut contractione & relaxatione totius corporis intro fumant & expellant, moveant & removeant alimentum. Plant-animalia dicta, ut ostrea, mytili, spongiæ, & Zoophytorum genera omnia, cor non habent, quia pro corde toto corpore utuntur, & quasi totum cor, hujusmodi animalia sunt.

In plurimis & pene omnibus insectorum generibus, propter corpulentia exiguitatem discernere singula recte non possumus; attamen in apibus, muscis, crabronibus, & hujusmodi licet aliquando ope perspicilli, pulsans quiddam intueri; uti & in pediculis, in quibus insuper transitus alimenti per intestina (cum transluccidum sit animal) quasi maculam nigramcernere clare poteris multiplicantis illius specilli ope: sed in exanguibus & frigidioribus quibusdam, ut cochleis, conchis, squillis, crustatis, & similibus omnibus inest pulsans particula, quasi vesicula quædam vel auricula sine corde, sed quæ rarius se contrahat & pulsus suum edat, & quem non nisi æstare aut calidiori tempestate discernere liceat.

In his vero ita se habet ista particula, quia impulsu aliquo opus est ad alimenti distributionem propter partium organicarum varietatem aut densitatem substantia; sed ob frigiditatem rarius fiunt pulsationes, & quandoque non omnino, prout conveniens illis est, quæ dubiæ sunt naturæ; ita ut quandoque vivere, quandoque emori videantur, & quandoque vitam animalis agere, quandoque plantæ. Quod etiam insectis videtur contingere, cum hyeme latent & quasi mortua occultantur, vel plantæ vitam tantummodo agant. Sed an idem etiam quibusdam sanguineis animalibus accidat, ut ranis, testudinibus, serpentibus, hircinibus, non injuria dubitare licet.

In animalibus autem majoribus, calidioribus, utpote sanguineis impulsu alimenti, & cum vi forsan majori, opus est: proinde piscibus, serpentibus, lacertulis, testudinibus, ranis & hujusmodi aliis, tum auricula, tum cordis ventriculus unus datus est. Vnde & verissimum illud Aristotelis lib. xxi de Part. animal. quod nullum sanguineum animal careat corde, quo impulsore validiore &

robustiore non uti ab auricula agitur solum alimentum, sed longius & celerius insuper protrudatur.

Ideo in adhuc majoribus, calidioribus & perfectioribus animalibus, utpote plurimo ferventiori & spirituoso sanguine abundantibus, quo alimentum celerius fortiusque, & impetu majore propter corporis magnitudinem aut habitus densitatem, protrudatur magis robustum cor & carnosius desideratur.

Insuper, quia perfectioribus animalibus perfectiori opus est alimento & uberiori calore nativo, ut alimentum melius concoqueretur & plenam perfectionem nancisceretur, pulmones illa & alterum cordis ventriculum, qui per ipsos pulmones alimentum tradat, habere conveniebat.

Sic quibuscumque insunt pulmones, illis duo simul ventriculi cordis sunt, dexter & sinister: & cuicumque dexter, ei sinister quoque inest; non è contra, cui sinister, ei dexter quoque. Sinistrum vero ventriculum voco usu, non situ distinctum, videlicet eum, qui sanguinem in totum corpus diffundat, non in pulmones solum. Hinc sinister ventriculus per se cor efficere videtur, & in medio situs, scrobiculis altioribus ita insculptus & majori diligentia fabrefactus est, ut cor sinistri ventriculi gratia factum videatur, & dexter ventriculus quasi famulari sinistro, utpote qui nec ad conum ejus pertingat, & tenuiori triplo pariete sit, & quasi articulationem quandam (ut Aristoteles loquitur) supra sinistram habeat: majori interiori capacitate sit, tanquam qui non solum sinistro materiam, sed & pulmonibus alimentum præbeat.

Notandum vero, quod in Embryone aliter ista se habeant, & non tanta differentia sit ventriculorum, sed tanquam in nuce nuclei gemelli, æqualiter pene se habent, & dextri conus ad sinistri summitatem pertingit, ut cor in his tanquam duplici apice in cono sit. Atque hæc idcirco quia in his, dum sanguis non transit per pulmones, utique tamen de dextro cordis sinu in sinistram, ambo hi per foramen ovale & transitum arteriosum, ut dictum est, idem officium traducendi sanguinem è vena cava in arteriam magnam pariter præstant, & in universum corpus impellunt æqualiter: unde æqualis constitutio. Cum vero pulmones usui esse, & uniones dictas occludi tempestivum est, tum hæc differentia ventriculorum incipit in robore & reliquis exerere, & dexter duntaxat per pulmones, sinister per totum corpus impellit.

Ultra hæc etiam in corde lacertuli ut ita dicam, sive carnosæ virgulæ & fibrosi nexus plurimi (quos Aristot. lib. de respirat. & lib. xxi de part. anim. nervos vocat) reperiuntur, qui partim separatim diverso modo tenduntur, partim in parietibus & mediastino, altis factis scrobiculis, fulcatim reconditi tanquam muscoli quidam parvi contrahuntur. Sunt autem ad robustiorem & validiorem impulsu sanguinis, & constrictionem cordis quasi succenturiati, & superadditi cordi ad ulteriorem expulsionem sanguinis auxiliares, ut cordi undique se contrahenti (tanquam in navi funium diligens & artificiosus apparatus) in sanguine plenius & validius è ventriculis expellendo undique adjumento forent.

Hoc autem ex eo manifestum est, quod in quibusdam animalibus sunt, in quibusdam minime; & omnibus quibus sunt, illis plures & fortiores sunt in sinistro, quam dextro; quibusdam itidem animalibus in sinistro sunt, in dextro vero nequaquam. In hominibus autem plures in sinistro, quam dextro ventriculo; & plures in ventriculis, quam auriculis; imo aliquibus in auriculis quasi nulli reperiuntur: in Torosis quoque & musculosis agrestibus corporibus, & durioris habitus, plures; in tenellis vero & foeminis, pauciores.

In quibus animalibus ventriculi cordis intus leves, omnino absque fibris, lacertulis, neque scrobiculis fissi sunt, ut in avibus minoribus pene omnibus, serpentibus, ranis, testudinibus, & huiusmodi; perdice etiam, gallina, & piscium maxima parte: in his neque nervi five fibræ dictæ, neque valvulæ tricuspides in ventriculis reperiuntur. In quibusdam animalibus dexter ventriculus intus levis est, sinister vero fibrosos illos nexus habet, ut in anse, Cygno, & avibus gravioribus. In his eadem est ratio, quæ in omnibus. Nam cum spongiosi & rari & molles sunt pulmones, ad protrusionem sanguinis per ipsos vim tantam non desiderant, ac proinde in dextro ventriculo aut non sunt illæ fibræ, aut pauciores infirmioresque, neque ita carnosæ, aut musculosæ æmulantes. Sinistro vero sunt & robustiores, & plures, & carnosiores, & musculosi; quia sinister ventriculus majori robore & vi opus habet, quod per universum corpus longius sanguinem prolequi debuerit.

Et hinc etiam sinister ventriculus medium cordis locum occupat, & triplo crassiori pariete & robustiore est quam dexter. Hinc inter omnia animalia non tantum, sed & inter homines similiter, quanto quolibet densiori, duriori, & solidiori habitu corporis est, & quanto magis carnosæ lacertosæque habent extrema membra, & magis à corde distantia: tanto fibrosius magis & crassius, robustius, & musculosius habent cor. Idque manifestum est, & necessarium. Quanto contra rariore textura & molliori sunt habitu, & corpulentia minore; tanto flaccidius, mollius, & intus minus aut omnino non fibrosius & enervatum cor gerunt.

Valvularum similiter signiformium & tricuspideum usum considera: quarum istæ ideo factæ sunt, ne semel immixtus sanguis in cordis ventriculos regeatur. Hæ in officio arteriosæ venæ & aortæ constitutæ dum sursum elevantur & invicem conjunguntur triquetram lineam, qualis ab hirudinum morsu relinquunt, effingunt, quo arctius obferatæ, sanguinis refluxum arceant promptius.

Tricuspides in introitu à venâ cava & arteria venosa janitores sunt, ne cum maxime impellitur sanguis, retrolabatur; & ea de causa non insunt omnibus animalibus, ut dixi, neque quibus insunt, eadem naturæ solertia factæ apparent, sed in aliis exactius, in aliis remissius & negligentius, ut claudantur pro majori vel minori impulsione à ventriculorum contractione facta. Ideo in sinistro ventriculo, uti ad majorem impulsione diligenter oclusio fiat, duo tantum sunt instar mitræ, ut exactissime claudantur & longe in conum per medium pertingant: (quæ res imposuit forsitan Aristoteli, ut hunc ventriculum duplicem, sectione

ne per transversum facta, existimaret.) Similiter profecto, ne retro in arteriam venosam labatur sanguis, & exinde robur sinistri ventriculi exolvatur in propellendo eo per universum corpus; ideo valvulæ istæ mitrales mole & robore, & exacta clausura, illas in dextro positas exuperant. Hinc etiam necessario nullum cor sine ventriculo conspicitur, cum lacunar & fons & promptuarium esse sanguinis debeat. Idem vero in cerebro non semper contingit. Avium enim genera pene omnia nullum habent in cerebro ventriculum, ut patet in anse & cygno, quorum cerebrum cerebro cuniculi pene magnitudine æquatur. Cuniculi autem ventriculos licet in cerebro habeant, anser tamen non habet. Similiter ubicunque cordis ventriculus unus, ibi una auricula appendet, flaccida, cuticularis, intus cava, sanguine referta; ubi duo ventriculi, duæ similiter auriculæ. Contra vero auricula duntaxat inest aliquibus animalibus (non autem cordis ventriculus;) vel saltem vesica auriculæ analoga; vel vena ipsa, in loco dilatata, pulsum facit; ut videtur in crabronibus, & apibus, & aliis insectis, quæ non solum pulsum habere, sed & respirationem in illa parte quam caudam nominant, (unde ipsam elongare, & contrahere contingit modo frequentius, modo rarius, prout anhelosi magis videntur, & aëre magis indigere;) experimentis quibusdam me posse demonstrare arbitror. Sed de his in tractatu de respiratione.

Auriculas similiter pulsare, apertum est; quin & sese contrahere, ut ante dixi, & sanguinem in ventriculos conjicere. Unde, ubicunque est ventriculus, auricula necessaria est; non solum, quod vulgo creditur, ut sit sanguinis receptaculum & promptuarium (quid enim opus est pulsatione ad retinendum?) sed sanguinis motores primi sunt auriculæ, præsertim dextra, primum vivens, ultimum moriens, ut ante dictum est, ideoque necessaria, ut scilicet sanguinem in ventriculum suberviens infundat. Qui ventriculos continuo (se ipsum contrahendo) jam ante in motu existentem sanguinem commodius elidit, & violentius propellit, ut cum ludis pila, à reverberatione percussa fortius & longius, quam simpliciter projecta impellitur. Quin etiam, contra vulgarem opinionem, quia neque cor, neque aliud quidquam seipsum distendere sic potest, ut in se ipsum attrahere sua diastole quicquam possit, nisi ut spongia vi prius compressa, dum redit ad constitutionem suam. Sed omnem motum localem in animalibus primum fieri, & principium summissee constat à contractione alicujus particulæ: ideo à contractione auricularum conjicitur sanguis in ventriculos, ut ante patefecit, & inde à contractione ventriculorum projicitur & transfertur.

Quæ veritas de motu locali, & quod immediatum organum motivum in omni motu omnium animalium, in quo spiritus motivus (ut Arist. dicit *libro de spiritu & alibi*) primo inest, sit contractile, & à contrahendo, quemadmodum vesipor à vesipi, nuto dicatur: & quod Aristoteles musculos cognoverit, & non perperam omnem motum in animalibus retulerit ad nervos five ad contractile, & proinde illos lacertulos in corde nervos appellavit, si de motivis organis animalium, & de musculorum fabrica

fabrica ex observationibus nostris quandoque demonstrare liceret, palam arbitror foret.

Quia ut institutum prosequamur, de auricularum usu ad ventriculos implendos, ut ante demonstratum est, sanguine, notandum; quod, quo magis densum compactumque cor est & pariete crassiore, eo auriculæ nervosiores & magis musculosæ sunt ad impellendum & implendum. In quibus contrarium est, in iis tanquam vesica sanguinea, & membrana continens sanguinem, apparet; ut in piscibus. In his enim tenuissima & adeo ampla est vesica, quæ auriculæ loco est, ut super ipsam cor innatare videatur. At in quibus carnosior paulo illa vesica est, perbellè pulmones æmulari & ementiri videtur, ut cyprino, barbo, tinea, & aliis.

In aliquibus hominibus, torosis videlicet & durioris habitus dextram auriculam ita robustam, & cum lacertulis & vario fibrarum contextu interius affabre concinnatam reperi, ut aliorum ventriculis robore videretur æquipollere, & mirabar sane, quod tanta in hominibus diversis differentia esset.

Sed notandum, quod in foetu auriculæ longe majores sint, quam pro proportionem; quia insunt antequam cor fiat, aut suam functionem præstet (ut ante demonstratum est,) & cordis ibi quasi officium faciunt. Sed quæ in formatione foetus observavi & antea retuli, & Aristoteles in ovo confirmat, maximam huic rei fidem & lucem afferunt.

Interea dum foetus, quasi vermiculus mollis & ut dicitur, in lacte est, inest solum punctum sanguineum, sive vesicula pulsans, & quasi umbilicalis venæ portio, in principio vel basi dilatata: postea, cum foetus delineatus jam, corpulentiam quandam duriorē habere incipit, ista vesica carnosior & robustior facta, in auriculas (mutata constitutione) transit, super quas cordis corpus pullulare incipit, nondum ullum officium faciens publicum: formato vero foetu, cum jam distincta ossa à carnibus sunt, & perfectum est animal, & motum habere sentitur; tum cor quoque, intus pulsans habetur, & ut dixi, utroque ventriculo sanguinem à vena cava in arteriam transfundit.

Sic natura perfecta & divina, nihil faciens frustra, nec cupiam animali cor dedit, ubi non erat opus, neque prius, quam esset ejus usus, fecit; sed iidem gradibus in formatione cujuscunque animalis, transcendo per omnium animalium constitutiones ut ita dicam, ovum, vermem, foetum, perfectionem in singulis acquirit. Verum hæc alibi in foetus formatione, multis observationibus confirmanda sunt.

Denique non immerito Hippocrates in lib. de Corde, ipsum cor musculus nuncupavit; cum eadem actio, idem officium sit, videlicet seipsum contrahere, aliud movere, nempe contentum sanguinem.

Insuper ex fibrarum constitutione motivaque fabrica, ut in musculis ipsis, cordis actionem & usum licet cernere. Omnes Anatomici cum Galeno annotantur, cordis corpus vario fibrarum ductu, videlicet recto, transverso, obliquo fabricatum esse. At in corde elixo aliter se habere deprehenditur fibrarum structura. Omnes enim fibræ in parietibus & septo circulares sunt, quales

in sphinctere: illæ vero, quæ in lacertulis, secundum longitudinem oblique sunt & porrectæ. Sic fit, dum omnes fibræ simul contractæ sunt, ut contingat & conum ad basin à lacertulis adductum & parietes in orbe circumclusos, & cor undique contractum esse, & ventriculos coarctari; & proinde, cum ipsius actio sit contractio, existimandum est, functionem ejus esse, sanguinem in arterias protrudere.

Nec minus Aristoteli de principatu cordis assentiendum; an à cerebro motum & sensum accipiat; an à jecore sanguinem; an sit principium venarum, & sanguinis, & hujusmodi: cum, qui ipsum redarguere conantur, illud principale argumentum omittunt, aut non intelligunt, quod cor nempe primum subsistens sit, & habeat in se sanguinem, vitam, sensum, motum, antequam aut cerebrum aut jecur facta erant, vel plane distincta apparuerant, vel saltem ullam functionem edere potuerant. Et, suis propriis organis ad motum fabricatis, cor, tanquam animal quoddam internum, diutius vivit. Quo primum facta, ab ipso postea fieri, nutrirī, conservari, perfici totum animal, tanquam hujus opus & domicilium, natura voluit: adeo ut cor tanquam in republica princeps sit, penes quem primum & summum imperium ubique gubernandi est. A quo, tanquam ab origine in animali, & à fundamento omnis potestas derivetur & dependeat.

At amplius circa arterias plurima similiter veritatem hanc illustrant & confirmant. Cor arteria venosa non pulsar, cum numeretur inter arterias? aut cur in vena arteriosa pulsus sentitur? quia pulsus sanguinis arteriarum impulsio est.

Cur arteriæ in suæ tunicæ crassitie & robore tantum à venis differunt? quia sustinent impetum impellentis cordis, & prorumpentis sanguinis.

Hinc, cum natura perfecta nihil faciat frustra & in omnibus sufficiens sit, quanto arteriæ propinquiores cordi sunt, tanto magis à venis in constitutione differunt, & robustiores sunt, & ligamentosæ magis; in ultimis vero disseminationibus ipsarum, ut manu, pede, cerebro, mesenterio, spermaticis, ita constitutione similes sunt, ut oculari tunicarum inspectione alterum ab altero internoscere difficile sit. Hoc autem iustis de causis sic se habet. Nam quo longius arteriæ distant à corde, eo minore multo vi, ab ictu cordis per multum spacium refracto, percelluntur. Adde, quod cordis impulsus, cum in omnibus arteriarum truncis & ramulis sufficiens sanguini esse debuerit, ad divisiones singulas, quasi partitus immittitur. Adeo ut ultimæ divisiones capillares, arteriosæ videantur venæ non solum constitutione, sed & officio, cum sensibilem pulsus aut nullum, aut non semper edunt, & nisi, cum pulsar cor vehementius, aut arteriola in quavis particula dilatatur, aut aperta magis sit. Inde fit, ut in dentibus quandoque & tuberculis, quandoque in digitis sentire pulsus, quandoque non possimus. Vude pueros, quibus pulsus semper sunt celeres & frequentes, hoc uno signo febricitare certo observavi; & similiter in tenellis & delicatulis, ex compressione digitorum, quando febris in vigore esset, facile pulsus digitorum percipere potui.

Ea altera parte, quando cor languidius pulsar, non

non solum non in digitis, sed nec in carpo, aut temporibus pulsus sentiri potest; ut in lipothymia, hysteris symptomatibus, asphyxia, & debilioribus morituris.

Hic ne decipiantur, monendi Chirurgi, quod in amputatione membrorum & tumorum carnosorum excisione, & vulneribus, sanguis cum vi profluens semper exit ab arteria, non autem semper cum saltu; quia exiles arteriæ non pullant, præsertim si ligaturæ compressæ fuerint.

Præterea, cur vena arteriosa non solum arteriæ constitutionem & tunicam habeat, sed cur tam multum in crassitie tunica non differat à venis, quam aorta, ratio eadem; majorem à sinistro ventriculo impulsam sustinet aorta, quam illa à dextro: & tanto molliori tunicarum constitutione, quam aorta est, quanto dexter ventriculus cordis & pariete & carne sinistro infirmior; & quantum pulmones in textura & molitie ab habitu corporis & carnis recedunt, tantum differt venæ arteriosæ tunica ab illa quæ aortæ. Et semper hæc omnia ubique proportionem servant. Sic & in hominibus: quanto magis torosi, musculosi, & durioris sunt habitus, & cor robustum, crassum, densum, & fibrosum magis; tanto & auriculas & arterias proportionabiliter in omnibus respondentes crassitie & robore habent.

Hinc, quibus animalibus leves ventriculi cordis intus sunt, absque villis, aut valvulis, & pariete tenuiore, ut piscibus, avibus, serpentibus, & quam plurimis generibus animalium; in illis arteriæ parum aut nihil à venis differunt in tunicarum crassitie.

Amplius, cur pulmones tam ampla habent vasa, venam & arteriam, ut truncus arteriæ venosæ excedat utrosque ramos, crurales & jugulares? Et, cur adeo referti sint sanguine, ut per experientiam & autopiam scimus (monitu Aristotelis, non decepti inspectione eorum quos dissectis detra-ximus animalibus, quorum sanguis totus effluerat;) causa est, quia in pulmonibus & corde promptuarium, fons & thesaurus sanguinis, & officina perfectionis est.

Cur similiter arteriam venosam & finistrum ventriculum abundare videmus (in Anatomica dissectione) tanta copia sanguinis, & ejusdem quidem, quo dexter ventriculus & vena arteriosa replentur, similiter nigricantis & grumescantis? Quoniam illinc huc continenter peragrat pulmones sanguis.

Cur denique vena arteriosa dicta vulgo, constitutionem arteriæ; arteria venosa, venæ habet? Quia revera, & officio & constitutione & omnibus illa, arteria; hæc, vena est; contra quam vulgo creditur.

Et, cur vena arteriosa tam amplum habet orificium? Quia plus multo defert quam alendis pulmonibus sit necessarium.

Hæc omnia phænomena inter dissecandum observanda, & plurima alia, si recte perpensa fuerint, ante dictam veritatem videntur luculenter illustrare & plane confirmare, simulque vulgaribus opinionibus adversari: cum quam ob causam ita constituta sint & facta hæc omnia, difficile cuiquam admodum sit, (nisi quo nos modo) explicare.

F I N I S.



I O H A N N I S W A L Æ I

Med. Doct. & Profess. in Academ.

Batava Leydenfi,

E P I S T O L Æ D V Æ:

D E

M O T V C H Y L I,

E T

S A N G V I N I S.

A D

T H O M A M B A R T H O L I N V M,

C A S P. F I L I V M.

· Editio præcedentibus auctior.

ARISTOTELES 3 de Hist. Animal. cap. 2.

περὶ τῶν αἱμάτων καὶ τῶν φλεβῶν τὸ πρότερον εἰρηκότων τινὲς ὡς ἀληθῶς λίσσιν. αἶπον
 ὃ τὴν ἀγνοίαν, τὸ δουδιώρητον αἰών. ἐν μὲν γὰρ τοῖς πθινέωσι τὸ ζῶον, ἀθροῦς ἡ φύσις
 τῶν κυρμωιάτων φλεβῶν, διὰ τὴν συμπλήθειαν αὐτῶν ἐξιστῶνται τῶν αἱμάτων, μάλιστα πάντας.
 ὅτι τῶν γὰρ ἐκχέται ἀθροῦς, ὥστε ἐξ ἀγνοίας. καὶ αὐτὸ γὰρ ὅθεν ἐκτὶ αἷμα πλεονέχον
 ἐλίσσον ἐν τῇ καρδίᾳ. ἀλλὰ τὸ πᾶν ἐστὶ ἐν τῇ φλεβῇ. ἐν ᾗ πῶς ζῶον ἀδυστάτην εἶναι
 θεάσασθαι πᾶς ἔχουσιν. ἐν τῇ γὰρ ἡ φύσις αἰών. ὥς οἱ μὲν ἐν πθινέωσι καὶ διηρημένοις
 πῶς ζῶοις θεωροῦντες πᾶς μεγίστην ἀρχὰς ὡς ἐνθάδε. οἱ δὲ ἐν πῶς λελεπυσμένοις σφό-
 δρα ἀνθρώποις, ὅτι τὸ πᾶν ἐξίστην φαινομένων πᾶς ἀρχὰς τῶν φλεβῶν διώκον.

EPISTOLA PRIMA
DE
MOTU CHYLI
ET
SANGVINIS:
AD

THOMAM BARTHOLINVM,

GASP. FILIVM.

Parifios.



Exercuit ab omni ævo Reipublicæ & Sacrorum Antistites de primatu contentio: sed nullo sæculo Literati ambitiosius quam hodie conati sunt præ reliquis eruditi videri. Et quo id impetrent non verentur plurimi in auxilium calumnias aliasque peiores artes vocare. Nemo edere in publicum, nemo communicare amico scriptum potest, quod egregium quibuldam videbitur, qui non statim obrectatorem inveniatur, qui eum pungat, scindat, laceret crudelissime. Nihil aliud autem suis curis, suis laboribus quam invidiam & animi ægritudinem querere extrema dementia est.

Hæc, fateor, impediverunt me causæ quominus crebræ tuæ petitioni poterim satisfacere; simul & quod ea non libenter definitio quæ longa annorum experientia aut probare non potuit, aut non potuit satis limitare. Tu tamen rogare non desistis, & ego pudore suffundor semper negare. Necessitatem quasi quoque mihi imposuit vir quidam doctus, ut meam de motu sanguinis sententiam aliis debeam aperire. Theses enim quasdam de motu sanguinis me Præfide disputatas, etiam si Defendens vere in iis profiteatur suas esse, ut meas tamen aggressus est vellicare. Quamvis autem pudere illum juvenem illarum thesium non debeat: nosim tamen aliena, etiam meo præsidio defensa, pro meis æstimari. Nec ei rationes in obscuro sunt, qui meam in disputando libertatem, aut Academiæ nostræ consuetudinem noverit.

Quare nunc meam de motu sanguinis opinionem habeo.

Sanguis qui de dissectis majoribus arteriis exilit calidior, tenuior, rarior, & floridior colore est, quam is qui de dissectis fluit venis: non ideo tamen dixerim sanguinem arteriosum à venoso tota forma differre: id enim habere sanguis arteriosus præ venoso potest, quod ille recens quasi à foco caleat, majorique spirituum copia abundet; ut ebulliens lac à refrigerato eadem ratione videmus discrepare. Et certe sanguis arteriosus qualitates eas non aliunde quam à majori calore & spirituum copia habere videtur: qui enim in minoribus ar-

teriis à foco jam remotior est, animadvertitur minus à venoso differre. Et ubi è majoribus arteriis, imo è vivi animalis corde sanguinem accepimus, & ex eodem animali sumimus è venis, vivimusque refrigerari utrumque & concrefcere, nunquam potuimus in illis differentiam observare. Vt non aliud appareat quam sanguinem arteriosum, ejusdem generis cum venoso esse.

Venosum sanguinem duorum esse generum pauciores volunt, alium qui in vena cava, alium qui in vena portæ continetur. Sed nec in his, sive receptaculis suis inclusi, sive ex iis effusi sunt, ullum licet discrimen animadvertere: idem prorsus rationem dicere mox videbimus.

Præter hos alius quoque concipi sanguis potest, qui è chylo in hepate confectus, ulteriorem perfectionem in corde non accipit: qualis is naturæ sit scire non possumus; cum, ut mox audiemus, in vena cava illi sanguini sit permixtus qui ulteriorem aliquam perfectionem in corde acquisivit. Et parum nostra interest ejus naturam cognovisse, quem ad breve prorsus tempus talem tantum perdurare videbimus. Vt unius tantum sanguinis motus sit nobis inquirendus.

Moveri autem sanguis possit, vel in ea arterie venæ parte in qua continetur, vel ex ea parte in aliam.

Sanguis in una arterie venæ parte naturaliter sursum deorsum, ut ebulliens aqua, non conspicitur moveri; nec in vase receptus, nec in vivo calenteque corpore dimissus, nec in ipsa arteria si ea utrumque ligata intermedio superiori loco diffecetur. Imo discisso à nobis sæpius vivi cordis mucrone, cordeque erecto, calere sanguis deprehensus est, nunquam ebullire.

Moveri autem sanguinem ab una arterie venæ parte in aliam res oppido manifesta est. nam in extremitatibus venis sanguis continetur, qui cum ibi genitus non sit, eo debet pervenisse. Et manifesto satis in vivis ex vena cava in cor sanguis fluit, & e corde in Aortam effluit.

Quo autem totus ille sanguinis motus nobis possit innoscere, ab ipso fonte videtur arcescendus.

Solidum cibum in vivis canibus sæpissime conspeximus eum in ventriculo ordinem, quo assumptus est, observare: nisi nimio potu distentus ventriculus

Est unius generis esse.

Non moveri sursum & deorsum in vasis.

Sed moveri ab una vasis parte, in aliam.

Quis motus ita cognoscatur funditus, inquirendus est motus.

Cibus primo assuptionis primam locum in ventriculo occupat.

tricus fluctuare cibum, & eum ordinem permittat immutari.

*Forma
et
color
alimenti
in
ventriculo.*

Quem recepit cibum ventriculus, etiam si duarum tantum unciarum sit, manifesto undiquaque completur; non ab simili ratione ac plicatas crumenas globulum videmus continere. simul & coarctatur superius inferiusque orificium: quod facto in vicinia foramine, immisso minimo digito, stilo-ve, promptum est explorare. Inferius tamen orificium dum deprehenditur plane occlusum, concidisse potius quam esse contractum videtur, quod minima pressione ventriculi chylum finat transfluere. Non raro quoque debilior ventriculus, orificiaque ab illa naturali contractione deficiunt, & tum solent laxiora sentiri.

*Forma
humoris
in
ventriculo.*

Retentus in ventriculo cibis, totus à cibi, potus, salivaque liquore permadescit: nec ita multo post porosus & plane spongiosus conspicitur: quandoquidem, ut vero simile est, is liquor aliquid substantiae cibi elicit & imbibit.

*Indicia
humoris
aciditatis.*

Paulo post in minima inciditur & quasi discerpitur frustilla, & tenuis & crassior cibis, imo in canibus ipsae ovarum testae: quod sine dubio ab humore quodam acido contingit, qui vim dissolvendi habet. Ita experimur ventriculum cibi mole aut crassitie gravatum assumpto aceto, succo citri, oleo sulphuris aut vitrioli, levamen sentire. Neque id quisquam in salivam aut bilem in ventriculum regurgitantem referet, qui in calida saliva, bileve bubula, aliquot horis panem macerari viderit, & ab iis tamen non comminui: in centenis quoque & pluribus canibus, quos hanc ob causam vivos fecimus, invenimus tantum in duobus bilem in ventriculum confluisse, quorum unus in mediam passus erat per triduum, & in ejus ventriculo, mirandum visu, biliosa spuma erat ita densa, ita bullans, qualem in lixivio lavantibus lotricibus videmus in natare.

Et liene.

Acidum autem illud humorem conjectatur ex liene in ventriculum venire, quod non alia pars acida in corpore nostro sentiat, quodque deglutito cocto liene & praesertim suillo, gravitas quoque ventriculi à copia & crassitie cibi emendetur.

*Postea
comminuitur
in
cremorem.*

Ita cibis liquori per minima commixtus, tractu temporis consistentiam tenuioris cremoris hordei coctione adipiscitur: quam ubi accepit, tum deum cibum ad intestina protruditur.

*Alum citius
alium tardius.*

Verum enimvero hanc in ventriculo commutationem aequo cito omnis cibis non accipit; peragitur ea breviori mora de die, in paucis cibo, in tenui, beneve masticato; longius tempus exposcit noctu, magna copia, crassius cibis, magnis frustis deglutitus: adeo ut dentibus bene comminutus in cremorem mutari incipiat, quando is etiamnum solidus est qui frustis majoribus est devoratus.

*Et quam cito
aut tarde
comminuitur
discernitur.*

Lac jusculaque de die, horae spatio aut citius suam perfectionem accipiunt, & nisi aliud impediatur tum quoque distribuuntur; quod vel urinae emissio ab iis assumptis, sine ulla sectione, evidenter ostendit: tardius olera. Panis ratione concoctionis medium videtur substantiae modum habere, videre autem est eum prima hora cum dimidia immutari quam minimum, sequenti hora rarum & prorsus madidae spongiae similem fieri, ea elapsa in minima di-

vidi frustilla, & potui permixtum totum liquidum apparere, mox maxime concoqui, ac tandem quod è pane concoctum est, inter quartam quintamque ab assumptione horam per pylorum à ventriculo ad intestina propelli. Remanere vero aliquid à pane reliquum & illud sensum debitam perfectionem accipere, ut & si quis alius cibis cum pane forte ingestus sit, qui eo concocto sit difficilior: quos hoc animadvertimus ordine concoqui, primum legumina, inde pisces, mox carnes, & eas demum intra sextam septimamque horam perfici & excerni: Bubulam intra septimam & octavam: etiamnum tardius earum partes membranofas, & ovarum testas; ossa in tertium usque diem mansisse in ventriculo & interea facta esse cartilaginea vidimus.

*Integritas
per partem?*

Imo in horummet ciborum partibus magna saepe varietas conspicitur, ut è pane carneque etiam si integræ in ventriculo videantur, aliquid tamen licet exigua copia prima quandoque hora ad venas lacteas distribuatur. Adeo ut quidquid concoctum est, alterius concoctionem nequam expectet, nec ab incocto quoque remoretur, sed quamprimum excidat & ad intestina transferatur, imo raro, etiam si ante horas sedecim canis comedit, ventriculus cibo plane vacuus reperitur.

Hæc autem observare nobis promptum fuit in canibus, quos, vario post assumptum cibum tempore, vivos secavimus.

In intestinis chylus colore cineritius est, nec nisi raro à bilis flavedine tingitur: ab ipso autem jam duodeno incipit Asellii venas lacteas ingredi, nec is ingressus in ulis cessat intestinis, quamdiu aliquid in intestinis chyli reperitur, ut rectum ipsum intestinum venis lacteis donatum sit, quæ ab affluxu chyli non raro conspiciuntur candicare. Et ne arbitrari possemus eum lacteum succum aliunde quam ex intestinis venire, venas has lacteas, corpori intestinorum insertas ligavimus, & animadvertimus à cavitate intestinorum ad ligaturam repleri evidenter & intumescere, a ligatura vero mesenterium versus depleri & concidere.

*Concilio
tribuitur
per
intestina
per
venas
lacteas.*

*Figuram
venarum
lactearum
videtur
de pag. xlii.*

Nunquam autem chylus animadvertitur est venam ullam in ventriculi corpore, nec ullam mesaraicam intrare; ut nec sanguis ligatura venæ portæ, cujus ratio postea constabit, in venis mesaraicis immensum adauctus unquam visus est lacteas venas ingredi. Ut non aliud appareat, quam naturam venas lacteas deferendo tantum chylum, venas ventriculi & mesaraicas deferendo tantum sanguini destinavisse.

*Non per
venas
mesaraicas.*

Chylus in venis lacteis semper candidus est, etiam si ex chylo cineritio in intestinis, aut bilis tinctura flavo devenerit.

*Semper
candide.*

Per has venas lacteas chylus sursum vergit, quod id modo, res non satis expedita est. Id nobis videtur maxime verosimile, quod in magnis macilentisque canibus venaticis animadvertimus, venarum lactearum quasdam ab intestinis uno & continuato ductu in ramum mesentericum, quasdam in ipsam portæ venam, in cava hepatis quasdam, paucissimas quandoque in venam cavam prope emulgentes desinere. Ea enim animalia glandulam in Mesenterii principio unicam non habent, quam Asellii pancreas appellavit, & harum venarum ductum solet obfcurare, sed ibi minoribus, ut plu-

*Vino
et
cibi
nunc
lacteum
distribuitur.*

ut plurimum quinque, glandulis sunt donatæ, quæ manifesto intervallo à se invicem sejunctæ, per id interval lum quibusdam venis lacteis liberum transitum largiuntur. Sed cum supra has glandulas pauciores venarum lactearum rami, quarum & quædam majores, quam infra sunt, crediderim prope eas glandulas, venas lacteas in ramos dividi, & eas ut alibi in corpore vaporum divaricationi infervire.

Aliquando quoque venæ lacteæ nobis monstratæ fuere quæ lienem ingrederentur, sed cum præsentibus ipsis indicibus eas examinarem accuratius, nervos esse comperimus.

Per lacteas has venas delatus chylus permisceatur sanguini in melen terico ramo, in portæ vena, in ipsoque hepate: quocunque enim loco ligentur venæ lacteæ semper intumescunt, quia impediuntur his partibus chylum transmittere, ac soluta ligatura cum illis partibus manifesto infundunt.

Rami venæ portæ in hepate, quamvis variis in locis annectantur ramis venæ cavæ, nullibi tamen in ramum majorem venæ cavæ aperiuntur, sed minimi venæ portæ rami in minimos venæ cavæ ramos chylum hunc sanguini mistum transfundunt, ut inflato excarni hepate aquæ innatante animadvertere facillimum est. Idem reliquo chylō sanguini mixto accidere postea demum manifestum evadet.

E ramulis venæ cavæ in hepate, sanguis omnino judicio ipsi trunco venæ cavæ infunditur: & manifesto ea supra hepar in vivis ligata ab influente sanguine intumescit. Ex vena cava cordis ventriculū dextrum ingreditur, ligataque alterutra venæ cavæ parte quæ supra infravē cor sita est observavimus aliquoties, præsertim in anguilla, eam citissime versus cor inaniri. quod & observavit Harvejus libelli sui cap. 10.

E dextro cordis ventriculo, manifesto satis venam arteriosam intrat, & per eam in pulmones fertur. Aliquid quoque sanguinis è dextro cordis ventriculo, per septum intermedium in sinistram ventriculū transfusere non ausim asserere, cum alibi apertas vias, hic nullas inveniam. Refert Petrus Gassendus, vir diffusæ eruditionis & candidus, Exercitat. in Fluddan. Philosoph. part. 3, cap. 17, vidisse se Peyanum offendentem septum cordis intermedium per varios mæandros, flexuososque quasi cuniculos pervium esse: eosque posse inveniri, si stilo in foveam aliquam leviter immisso, eum sursum deorsum & ad latera patientissime contorqueas & ulteriorem aditum semper explores, usque dum ejus extremum invenias. Et revera id non raro succedere sumus experti; sed observavimus simul eas vias, eos mæandros nequaquam à natura factos esse; sed à stilo aut cuspidē cultri fieri, dum factam viam aperimus aut ulteriorem quærimus: caro enim cordis ita tenera simul & consistens est, ut minimo rei perforantis tactu ita tum diffrumpatur, & cavitatem relinquat; adeo ut & latera cordis ita potuerimus pervia invenire.

Ingressum per venam arteriosam in pulmones sanguinem per arteriam venosam ad sinistram cordis ventriculū redire hinc colligimus, quod ligato prope pericardium in pulmone vivo arteriæ venosæ majori ramo vidimus eum versus pulmonis ambitum indurari & in tumore attolli, ea par-

te inanità & concidente qua cor spectabat, solutæque ligaturæ sanguinem ad sinistram cordis ventriculū moveri: idque facillimum est in cuniculis observare. Hic autem sanguis cum aliunde venire non possit, ex vena arteriosa huc debet defluere.

Leonardus Bosallus, vir doctissimus, in fine libelli de Catharro invenisse se aliam viam arbitratur, qua è dextro in sinistram ventriculū perpetuo sanguis eat. Paulo supra Coronalem, inquit, satis conspicuum reperi ductum juxta auriculam dextram, qui statim in sinistram autem recto tramite fertur.

Hic ductus nisi progressus sit venæ cavæ ad arteriam venosam, quem foramen ovale appellamus, aut alius ductus quem aliquando in ovillo corde reperimus calami triticeæ magnitudine ex una auricula obliquo ductu ad aliam vadere, nisi inquam aliquis horum sit, difficile est quis fuerit divinare.

Iam autem id foramen ovale ubique quidem æqualiter non occluditur, & sæpe in medio accrescens membranula tenuissima & pellucida est, minimoque stili tactu facile diffrumpitur, rarissime tamen in adultis ulla ratione apertum invenitur. Et transfluens per arteriam venosam è pulmone sanguis membranam illi foramini præpositam affigit, ut etiam quando connata non est diffculter aliquid illac possit transire.

Obliquus vero ille ductus nobis in ovillo corde visus, alte sæpe auriculæ substantiam penetrat, sed rarenter prorsus ad alteram auriculam fertur. Putamusque eum auriculæ ad nutritionem datum esse, quæ ramos non solet à Coronaria accipere.

Ex iis vero quæ raro accidunt, nihil eorum concludendum est quæ perpetuo debent evenire: in Cordis quippe fabrica non raro ludit natura. Ita in bovini cordis septo intermedio superna parte, secundum cordis longitudinem aliquando sinum invenimus, ad sinistram ventriculū circa mucronem patulum, qui longitudine amplitudineque digitum indicem æquabat. Cui similem videre Aristoteles potuit, cum 3 de Part. cap. 4, asseruit majora animalia tres in corde ventriculos habere. Nam maxima animalia duos tantum ventriculos habent, ut in dissecto balenæ foetu animadvertimus.

Adeo ut videatur sanguis, non alia via ordinatim quam per pulmones ad sinistram cordis ventriculū vadere.

Ita ad sinistram cordis ventriculū delatus sanguis, inde ad arteriam aortam, mediocres, minimasque arteriolas pergit. iis enim vivis ligatis mirum in modum versus cor intumescunt, & extrema versus concidunt, ac apertā ligaturā manifesto sanguinem ad ulteriora dimittunt.

Sanguis è minoribus arteriis potest venas intrare: arteriæ enim quibusdam osculis in venas pervia sunt. Et quo esse certi possemus per ea oscula sanguinem posse transire, venam & arteriam in demortui canis pede liberavimus ab iis, quæ earum solent visum impedire, inanivimusque venam cruralem majorem & eam in illis ligavimus, ne illac aliquid sanguinis deflueret. in genu vero ligavimus venam hanc simul & vicinam arteriam. tum digitis sanguinem in arteriis iliatis ad genu usque adegimus, atque ita inanivimus cruralem arteriam, vena vero cruralis visâ est manifesto repleta. cumque in venam superne inferneque ligam-

Non per foramen ovale,

Indique in cor, arteriam aortam, reliquasque arteriolas,

Ex arteriis sanguis per communia oscula,

tam, ex ejus ramulis nisi perparum devenire posset, ea vero multum impleretur deplereturque prorsus arteria. Colligebamus eum sanguinem quo impleretur vena per oscula ex arteriis inanitis esse depulsum.

*Veneribus co-
gnita.*

Eam vero opinionem novam non esse ipse Galenus de ul. pulsus cap. 5 ostendit. Arteriarum venarumque Synastomoses sensum nostrum effugiunt: unde si ipsis seu parum constantibus merito fidem abroges, per alia certe qua veteribus sunt prodita eos esse credas, neque in postremis ex hac rei evidentia, si quis namque accepto animali quorū ex iis quibus ampla manifestaque vena & arteria sunt, veluti bove, fove, asino, equo, ovis, urso, simia, pardali, homine ipso, vel similitum aliquo, magnas multasque illi arterias vulneres, universum animalis sanguinem per eas exhauriet. Hujus rei periculum subinde fecimus, & cum semper vacuatas cum arteriis venas deprehendissemus, verum esse dogma de communibus arteriarum & venarum osculis, & communi de una in alteram transitu nobis persusimus. Imo recepta communisque opinio est, sanguinem arteriosum naturaliter minimas venulas intrare, quo partes arterioso venosque sanguine nutrantur.

*Venas ingre-
diunt.*

Et revera sanguinem ex arteriis per ea oscula naturaliter in viventibus venas ingredi, hæc indicia luculenter attestantur.

Qui in vivis dissectionibus ad eam copiam attendit quæ per arterias partibus venisque communicatur, haud facile ab animo suo impetrabit, eam omnem à partibus nutritione consumi: præsertim si attenderit sanguinem arteriosum satis crassum esse, nec quarta parte esse venoso rariorem, ut sæpius animadvertimus ubi refrigerari utrumque si-

vimus & concrefcere. Vnde merito cum Harvejo colligi potest communicatum ab arteriis, venis partibusque sanguinem magna ex parte ad majores venas remeare.

Deinde ubi venam in brachio ligato secamus, si venæ tumentis partem foramini propinquam quæ versus manum est pollice comprimamus, aut similem superiori ligaturam brachio prope vulnus versus manum injicias, nihil sanguinis videbis effluxurum; unde videtur colligendum eum à manu venire, qui per factum vulnus exilit. Et cum is sanguis venæ sectione sæpe ad libras educatur, tantumque in inferiori venarum brachii parte contineri non possit, is eo debet ex arteriis venisse, quæ ligatura supra sectam venam occlusæ non sunt, ut integer earum pulsus ostendit.

*Compressio
vena infra
ligaturam
venæ dicitur.*

Sed quo id nobis ad oculum liqueret, aliquoties in vivis canibus etiam majoribus, venam & arteriam amplam in inguine ab iis liberavimus quæ earum visum impediabant; quod facile fieri potest, nisi musculus subternatur: venam autem illam filo ligavimus, animadvertimusque eam venæ partem quæ cavam spectaret concidere & inaniri, reliquam vero pedem versus admodum intumescere, adeo ut præ plenitudine durior ipsa arteria videretur; at solutâ ligaturâ sanguinem mox sursum moveri, & venæ duritiem ac plenitudinem admodum imminui. Ligatâ vero arteriâ intumescere mirum in modum eam partem quæ Aortæ vicinior esset, concidere remotiorem: nec venam tum ligatam evidenter intumescere. Idque sæpius factum accidere semper eodem modo.

*Ligatura vena
nâ in vena.*

*Ut docet copia
emissi sangui-
nis ad partes.*




FIG. V.

FIGURÆ EXPLICATIO.

- A. Crus canis dextrum.
 B. Crus canis sinistrum.
 C, D. Ligatura subiecta arteria & vene, qua femur firmiter constringitur, expressa in dextro crure, ne literarum linearumque confusio in sinistro crure spectatorem posset turbare.
 E. Arteria cruralis.
 F. Vena cruralis.
 G. Filum quo constricta est vena & est elevata.
 H. Acus, cui filum est tractum.
 I. Vene pars superior & detumescens.
 K. Vene pars inferior à ligatura intumescens.
 L. Gutta sanguinis, quæ, è superiori parte vene vulnerata, sensim destillant.
 M. Rivulus sanguinis qui inferiori vene parte vulnerata continuo exilit.

Ne tamen ullus nobis superesse scrupulus posset & animadvertemus simul quid intus in vena ageretur, denudatam ita venam & arteriam elevavimus nonnihil, & sub iis firmiter ipsum crus ligavimus, ne per aliam quam eam quam elevavimus venam sursum aut deorsum moveri sanguis posset. Tum demum filo suspensam & simul occlusam venam, ut hac figura expressimus, supra filum & infra filum aperimus levi vulnere. Statim autem ex ea venæ parte quæ à corde remotior esset sanguis rivulose, copiose, & impetu effluxit. Illa vero pars venæ quæ à filo cor spectaret paucas tantum guttas destillantes dedit. Unde nobis videbatur evidens sanguinem non deorsum è venis majoribus, sed sursum è venis minoribus ad majores devenire. præsertim cum injecta alia ligatura eidem venæ, remotius à corde, è vulnere è quo ita impetuose exilierat nihil amplius videremus sanguinis effluere. Arbitrabamur enim eas guttas quæ è vulnere cordi viciniore laberentur, provenire posse è sanguine quem cum vulneraretur vena contineret forte, aut quem ex minori ramo venæ cruralis supra filum sito continenter acciperet; verum hæc causa mox clarius evadit.

Obvium est idem sine ulla sectione in iis experiri, qui conspicuas admodum venas brachii habent. In quibus si uno digito venam prope manum occludas, altera manu sanguinem sursum adigas, tota videbitur vena inanita: quæ mox replebitur simulac inferiori venæ partem à digito liberares, non si superiorem, ut *Harveus* quoque observavit libelli sui cap. 13. Superior enim sanguis ad majores venas vadit, & descensum remoratur valvula: quæ nihil facile delabi permittit, nisi eo usque vena dilatata sit ut inter eam valvulasque majusculum spatium relinquatur.

Cum itaque à manibus pedibusque sanguis veniat, manus autem pedesque sanguinem novum non generent, quem toti corpori debeant suppeditare, nobis non fit dubium quin ex arteriis ibi sanguis continuo & naturaliter venas ingrediatur, & ex minoribus venis ad majores eat.

Neque vereor arteriosum sanguinem, simplici venarum tunica contineri non posse, quem video in arteriis minimis, & in aëruisimato contineri, ubi arteriæ unicam tantum tunicam habent. Quod

vero propinquiore cordi arteriæ duplicem tunicam acceperint, fieri potuit ne impetu effluentis è corde sanguinis arteria laxaretur; ut eam laxari à valido palpitantis cordis motu videmus.

Sed an non quoque ut ex arteriis ita ex maximis venis sanguis ad minores venas fluit? Id videri possit venæsectio indicare quæ revulsionis gratia instituitur: secta enim vena brachii in pleuritide, is revelli sanguis videtur, qui è vena cava in azygon, ex azygo pleuram influebat. Sed nullum indicium est ita sanguinem revelli; potest enim secta brachii basilicâ, sanguis trahi ex arteriis brachii, brachii arteriæ trahunt ex axillari, axillaris ex aorta, per cujus intercostales ramulos in pleuram, non vero per azygi ramulos fluxerat, ut mox videbimus. Et certe nisi in pleuritide sanguis per arterias reveleretur, ratio nulla esset quare ad revellendum venam affecti lateris potius, quam dextram secemus: cum azygos à dextro venæ cavæ latere oriatur, & ut fiat venæsectio *καθ' ἑνὸς* eo latere secanda vena esset, secundum quod latus sanguis in affectam partem fluit.

Sed quid? an non ligatis quibusdam partibus, & sæpe brachio in iis quibus id fistula excavatur, brachium quodammodo emacrescit, quod ligatâ venâ ad inferiores brachii partes debite nequeat sanguis descendere? Non est necessarium, potest enim id fieri quod ligata sit arteria. Et revera ita fieri hoc indicio est, quod non raro arteria in eo brachio cui fontanella inest, languidius minusque quam in sano pulsare comperitur, inhibito aliquo modo per ligaturam sanguinis spirituumque influxu. Forsan tamen posset & pars aliqua emaciari, ligata tantum vena; quod natura copiose novum sanguinem per arteriam in partem infundere non possit, qui per venas libere nequit remeare. Et quamvis copiam tum sanguinis arteriæ & venæ contineant, forsân is minus aptus quo partes bene nutriantur, verum id postea constabit.

Manifestum tamen est in varicosis sanguinem è vena cava ad majores, à majoribus ad minores venas descendere. Id enim in varice femoris, pedis, & hæmorrhoidibus obvium est videre. Verum ille motus sanguinis potest præter naturam contingere, quod debilitatæ venæ sanguinem sursum non mittant, sed colligant; & quod humores sua gravitate

Non autem
sanguis è ma-
joribus venis
ad minores
venit.

Id non indicat
revulseria ve-
næ sectio.

Nec brachii à
ligatura emac-
rescit.

Nec Varices.

virate motui naturali sursum renitantur & descendunt, unde in inferioribus venis cumulat, accedente semper ex arteriis novo sanguine, earum dilatationem & varicem faciant. Ita fontes artificiales circa ea loca è quibus ascendunt, rimas potissimum agere observamus, tandem à gravitate aquæ divulsi: quæ tamen ex natura fontium sursum deberet ascendere. Et omnino vero similis est hac ratione varicem fieri; quia humores in varicosis, quando ad motum in exercitio impetum habent, majorem venæ dilatationem non faciunt, sed ubi ab exercitio quiescere; quod minori motui humores obui possint & gravitate sua descendere.

Sed & minoribus venis advenant cava,

Ex vena cava iterum in cor.

Adeo ut hæc indicia non sint, sanguinem è majoribus venis in minores, sed ea ipsa potius indicare sanguinem ex arteriis venas intrare, & è minoribus venis ad majores ipsamque venam cavam deferri.

Ex vena cava jam ante diximus sanguinem dextrum cordis ventriculum ingredi. Sed quid è iste sanguis qui jam antea è vena cava cor intraverat, & è corde in arterias erat effusus indeque redierat in venas, an is iterum cor ingreditur? an vero is solummodo qui de novo in hepate genitus venam cavam primum ingreditur, nec unquam cor transgressus est? Certe uterque.

Etiam si sanguis qui cor semel transgressus est.

Facile enim id fieri potuit, cum uterque cordi æque sit vicinus; & fieri debuit, cum qui rediit ex arteriis ad cavam, copiosior sit quam qui omnis in nutritionem venæ cavæ consumatur, & is ad minores non feratur venas. Omnino id fieri indicio est, quod ligata vena cava prope cor, non parum tantum, sed admodum inanitur, omnemque quem habet sanguinem, non aliquem tantum, cordi tribuit.

Quia alimentum non tantum sanguinis suppeditant, quantum cor transiit.

Cor quoque videtur plus sanguinis in arteriam Aortam infundere, quam ei suppeditare hepar saltem non in aliquot dierum inedia possit. In pluribus enim sumus experti cor unâ horâ plures quam ter mille pulsus edere. Cor autem quamdiu non est plane languidum, singulis pulsibus aliquid expellit: ligatâ enim prope cor arteriâ aortâ, inter cor ligaturamque superius aperuimus arteriam, vidimusque per foramen singulis pulsibus aliquid exire; nisi ubi prorsus cor languesceret, tum ternis quaternisve demum pulsibus aliquid effluere: quod tam parum è corde pelleretur quod nonnisi cumulatam sursum posset moveri & per superius arteriæ foramen exire.

Abscidimus quoque cordi mucronem, & corde erecto animadvertimus, etiam si ventriculi pleni non essent, singulis pulsibus aliquid effundi; quod & cap. 2 notat *Harvejus*. Imo & per medium discisso corde singulis pulsibus aliquid effluere prius non desuit quam vel emoreretur animal, vel superiori parte concreveret sanguis & quasi pelliculam faceret, ut non amplius illac posset effluere. Et certe aliquid semper exire pulsu è corde debuit, cum in eo semper cor fiat angustius, ut postea constabit.

Singulis scilicet pulsibus ferè semivivis.

Quantum autem id sit quod singulis pulsibus è corde exit, definire non possumus. hoc testari possumus, è corde cuniculi singulis pulsibus semidrachmam sanguinis effluxisse, è corde majori canis aquatici semivivam: putamus tamen dum vivum difsecatur animal plus quam in sano effundi.

Et si quis conjectura ex iis quæ vidimus definiri velit, quantum in homine sano putemus exire, iis non adversabimur, qui è corde singulis pulsibus in homine in aortam, semivivam effundi assentent.

Sed fingamus tantum scrupulum esse, cum cor unâ horâ pulsus & plures edat, singulis horis plus quam decem sanguinis libræ cor transibunt, quantum non comedimus, nec hepar potest cordi suppeditare.

Adeo ut omnino necesse sit, cum qui semel cor transiit sanguinem, iterum in cor fluere, & ex eo in arterias redire. Atque ita motum quandam sanguinis esse quasi in orbem, à vena cava in cor, è corde in arterias, ex arteriis in venas, à quibus iterum in cor & arterias deferatur.

Equidem ego satis mirari nequeo tot retroactis seculis, hunc sanguinis motum incognitum fuisse, cum ejus varia, nec levia indicia apud veteres inveniam.

In volumine operum Hippocraticorum Autor lib. 1 de vitæ ratione, tres calori nostro & humori circuitus tribuit, quibus introsum extrorsumque à variis partibus moventur.

Hippocrates in medio libelli de ossium natura. Venæ, sub quibus & arterias complectitur, per corpus inquit diffusa spiritum, fluxionem & motum exhibent, ab una multis propagines emittentes. Hac autem una unde exordium sumat, & ubi desinat non satis mihi compertum est. Circulo enim facto principium non invenias, quem circulum eum potissimum in distributione humorum intelligere, examinantem locum patebit.

Vt & in fine libri de Natura humana. Crassa venæ sibi mutuo alimentum subministrant, internæ externæ, vicissimque externæ internæ.

Et manifestius Autor lib. de Alimento. Omnium quæ nutriunt, unum est principium, unumque omnium finis, idemque finis & principium, quare mox hac subiungit *ἡ τροφή τοῦ σώματος ἐστὶν ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῆς ζωῆς. ἡ τροφή τοῦ σώματος ἐστὶν ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῆς ζωῆς. ἡ τροφή τοῦ σώματος ἐστὶν ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῆς ζωῆς.* Alimentum in pilos, in ungues, & in extimam superficiem ab internis partibus pervenit; ab externis partibus alimentum, ab externa superficie, ad intima pervenit: confluxio una, conspiratio una, consentientia omnia.

Ab hac quoque opinione non alienus videtur *Diogenes Apolloniata* fuisse, apud Aristotelem 3 histor. animal. cap. 2. Crassissimus sanguis à partibus carniformibus exagitur, qui vero redundat in hæc loca, venas scilicet majores, tenuis, calidus & spumosus sit.

Imo quæ à Platone de sanguine in *Timæo* traduntur, melius huic opinioni, quam communi conveniunt.

Iple *Aristoteles* non difficulter in hanc pertrahi opinionem posset. Ita enim ille lib. de Somno cap. 3. Non omnis impotentia sentiendi somnus est, sed ea solum quam divaporato committit alimenti, quod enim rarefactum est, quadatenus attolli, deinde regredi & refluxare instar Euripi necesse est: nam animantia cuiusque calidum in sublime natura fertur, at ubi eo loci subvertitur est, mox universum recipiat ac descendit.

Qui hos consecuti sunt scriptores, non satis sanguinis motum excoluisse, imo hunc obfuscasse suspicio est, quod ea quæ præcedentes suis venis; hoc est venis & arteriis adscriberent, hi venis, ut arteriis opponuntur ierint attributum. Et cum

Ades ut in ritis sanguinis sit in orbem.

Hic sanguinis motus non fuit incognitus veteribus.

Hippocrati, Edit. Foellii pag. 344.

Pag. 277.

Pag. 226.

Diogenes Apolloniata.

Platoni.

Aristoteli.

Galenus

Galenus Medicorum summus, omnibus restituentis in integrum non sufficeret. Posterioreseque Græci, ut & Arabes & Latini, nimis presse eum sequebantur aut describerent, inde suspicamur hunc sanguinis motum in hoc usque seculum delituisse:

Quo vir incomparabilis *Paulus Servatius Venetus* valvularum in venis fabricam observavit accuratius, quam magnus Anatomicus *Fabritius ab Aquapendente* postea edidit, & ex ea valvularum constitutione aliisque experimentis hunc sanguinis motum deduxit, egregioque scripto asseruit, quod etiamnum intelligo apud Venetos assevari. Ab hoc *Servatio* edoctus vir doctissimus *Guiselmus Harveus* sanguinis hunc motum accuratius indagavit, inventis auxit, probavit firmius, & suo divulgavit nomine.

Hæc inventio, hoc fatum hujus sanguinis motus fuit.

Nos vero quæramus jam porro an per omnes venas arterialesque ita sanguis fluat, an in quibusdam aliis alium insuper motum habeat? De qua re ut nobis certo constaret, ad motum sanguinis in pluribus vivorum venis arteriisque attendimus, & invenimus, præter id quod jam de arteriis & venis brachii crurumque diximus, sanguinem per arterias spermaticas ad testes, per venas à testibus ad emulgentem sinistram aut venam cavam in dextris moveri: per arterias mesentericas ad intestina; per venas ad ramum mesentericum: per arterias coeliacas ad lienem; per ramum venæ portæ splenicum continuo ad hepatis: per ramos arteriæ coeliacæ, qui sequentibus venis respondent, ad ventriculum & omentum; per venas gastricas & Epiploicas ad ramum splenicum: vala brevia arteriosa & venosa, arteriæ coeliacæ venæque splenicæ ramulos esse, qui ubi ad locum inter ventriculum lienemque medium devenere, in duos dividantur furculos, quorum unus ventriculum, alius lienem adbeat: per hunc arteriæ furculum ad lienem, per furculum ventriculi ad ventriculum vadere; per furculos vero venosos ad truncum vasis brevis à ventriculo & à liene moveri: per arterias emulgentes ad renes; per venas emulgentes ad venam cavam: per arteriam cordis coronalem in venam; ex vena cordis coronali in venam cavam: per arterias intercostales in pleuram; è pleura per venas in azygon, & inde in venam cavam. Invenimus autem id venarum arteriarumque in vivis ligatura; quæ intumescere ea parte quæ spectabat partes à quibus fluxum fieri diximus, reliqua non detumescere tantum, sed & concidere. Cavimus autem sedulo ne cum vena arteriam ligavimus, quod alias intumescens cor versus arteriam impositam sibi venam attolleret, atque ita appareret quasi vena ab utraque ligaturæ parte amplius repleteretur.

In capite autem & collo vidimus, idque in vivo anferre facillime & gallina, ligatam jugularem intumescere à capite ligaturam versus, à ligatura vero ad cavam inaniri, ut & ibi manifestum sit sanguinem à capite per venas ad cor redire. Sed quomodo ad jugulares venas veniat definire non possumus, cum ob cranii duritiem vivum accurate descindere cerebrum non licuerit, quin animal interea expiraret: credibile tamen est per arterias carotides & cervicales ad quatuor cerebri sinus fluere, eæ enim ad illos sinus usque perviæ sunt.

Retulerunt quippe mihi viri doctissimi *Fr. Sylvius*, & *Fr. van der Schagen* retracta illa fibrosa substantia, quæ non raro concreta in venis arteriisque cadaverum invenitur, eam ubi in carotide arteria retraheretur, motum aliquem usque in tertium cerebri sinum ostendisse: & certe cum è sinubus per jugulares sanguis ad cor refluat, non possunt eum aliunde sinus quam ex arteriis accipere. An autem arteriæ immediate cum in sinus infundant, an vero in ramulos quæ à sinibus oriuntur, non ita obvium est videre; quia arteriæ ab illis ramulis difficulter distingui possunt, cum in cerebro unicam tantum tunicam quoque arteriæ habeant: crediderim tamen arterias in ramulos sinuum sanguinem infundere potius quam in ipsos sinus, quod obferrem ea vala quæ sinibus inferuntur circa sinus esse maxima, ut solent rami esse in exortu.

Ita quidem in adultis; in foetu vero paulo alia videtur esse circulatio, quam ita fieri concipimus. Ex utero materno sanguis, non arterias umbilicales ingreditur, quæ ex observatione *Arantii* utero non junguntur; sed venam umbilicalem intrat, à qua in hepatis, venam cavam & dextrum cordis ventriculum; cor enim in foetu etiam imperfectum pulsatur. E dextro ventriculo, in venam arteriosam; sed cum pulmones non respirent, ideoque nec patentibus sunt, affatim nequeunt sanguinem recipere & ad arteriam venosam dimittere; quare è vena arteriosa per peculiarem ductum in aortam vadit, & quoque per peculiare venæ cavæ foramen, arteriam venosam ingressus, auriculæ cordis sinistræ, ejusque sinistro ventriculo infunditur. E sinistro cordis ventriculo, non aliter ac is è vena arteriosa, arteriam aortam ingreditur: ut in foetu natura duobus ventriculis pro uno utatur, ne in foetu qui copiosi, non intensi caloris nec sic esse debebat, his sanguis excoctus adureretur, pulmonum refrigerio & ventilatione destitutus. Ex arteria aorta sanguis ad arterias umbilicales vadit; iis enim ligatis pars quæ foetum spectat pulsatur & intumescit: reliqua versus uterum pulsus destituitur. Ex arteriis umbilicalibus ad Placentam; ubi arteriæ venis, manifestis anastomosis, junguntur, & per eas anastomoses sanguis venam ingressus, toto memorato jam ductu iterum defertur.

Hæc vala sunt per quæ sanguis & à corde & ad cor fluit. A vase autem arteriarum in venas duplici ratione venit; Primo facillime & frequentissime per Anastomoses quibus arteriæ venis junguntur, quæ Anastomoses magnæ quandoque sunt & in majoribus vasis, ut circa lienem, in vesica, in utero, in uterino hepate. Similem quoque Anastomosis accuratissimus *Beisernus*, arteriæ aortæ in venam cavam abdominis annotat, sed nec in humano, nec in Brutorum corpore unquam nobis datum est eam invenire. Quare neque omnes in extremitatibus tantum corporis sunt, sed & in locis intermediis: unde videmus amputatis membris, in mutilo tamen sanguinis illum motum ex arteriis in venas fieri. Secundo & sanguis ex arteriis per ipsam videtur posse carnem in venas redire: videmus enim sectâ venâ usque dum mutetur color, inflammationes detumescere, quod extravasatus sanguis è carne trahatur. verum hac via sanguinis transitum esse parciorem rarioremque existimaverim.

Etiam in foetu,

Per peculiarem ductum,

Transit autem ex Arteria in venas,

Per Anastomoses,

Rarius per carnes.



FIGURÆ EXPLICATIO.

- A, A, A, A. *Abdomen Canis apertum.*
 B, B. *Diaphragma.*
 C, C, C, C. *Omentum versus thoracem inversum, quo interiores partes magis visui expositæ forent.*
 D, D, D. *Lobi tres hepatis nonnihil dextrorsum moti.*
 E, E, E. *Portiuncula pancreatis discissi, quo sequentia vasa venirent in conspectum.*
 F. *Ren sinister suo involucrio reclusus.*
 G. *Pars summa Lienis superior, una cum adjacente pinguedine.*
 H. *Media lienis pars, circa quam vasa inferuntur.*
 I. *Infima lienis pars.*
 K, K, K, K. *Intestina deorsum mota, quo vasa sequentia in propatulo forent.*
 L, L, L, L. *Mesenterium.*
 M, M. *Arteria splenica.*
 N. *Pars vene splenicæ trunco vene portæ annexa, à ligatura detumescens.*
 O, O, O. *Portio vene splenicæ & ejus tres rami inde orti, qui lienis inferuntur, & à ligatura admodum intumescunt.*
 P, P. *Arteria mesenterica sinistra.*
 Q. *Portio vene mesentericæ sinistræ, trunco vene portæ proxima, à ligatura detumescens.*
 R. *Inferior pars vene mesentericæ sinistræ jam in ramos dividenda, à ligatura intumescens.*
 S, S, S. *Vena mesentericæ ideo pleniores & magis tumide, quia vena mesenterica ligata est.*
 T, T, T, T. *Reliquæ mesentericæ, quæ non ita tumide, quia earum truncus non est ligatus.*

Vt jam esse planum arbitrer quis sanguinis motus sit, & per quas vias fiat: sequitur nunc inquirendum qualis is sit & quomodo peragatur.

Sanguis illum motum à corde in arterias, ab arteriis in venas, à venis ad cor esse continuum observavimus, nec ullo momento eum definire aut interrompi. Et certe cum is fiat, ut mox videbimus, quia cor accipit & transmittit, cumque is cordis motus continuo toto vitæ cursu perduret, sanguis ille motus non potest, nisi secundum naturam, continuus esse.

Celer quoque sanguinis motus est; ligata enim & compressa arteria venæ, quamprimum admodum intumescit & in duritiem attollitur: eaque à compressione aut ligatura liberata citissime conspicitur sanguis moveri.

Quam cito autem sanguis circuitum suum à corde, iterum ad cor absolvat, præcise definire non possumus. Citius quidem animadvertitur per Anathomosin cordi vicinam quam per remotam fieri; nec admodum illi refragaremur qui maximum circuitum & per extremitates, affereret breviori tempore quam horæ quadrante peragi; celerissime enim sanguis vadit. Attramen non ita defertur celeriter, ut eum secta arteria venæ videamus exilire, quod is in tenui liberoque moveatur aëre, in corpore vero vas suum attollere, & anteriorem sanguinem propellere cogatur. quare dissectam arteriam præsertim minus remotam à cor-

de, citius inaniri videmus, quam cor novum possit sanguinem suppeditare.

Sed hoc si verum sit, quare singulis horæ quadrantibus febres non redeunt, cum futurus paroxysmus videatur, cum corrupta materia ad cor venit? nunc autem aliæ quotidie, aliæ tertio, aliæ quarto demum die redeunt. Equidem non negaverim id posse contingere, ut corrupta materia ad cor accedente paroxysmus eveniat, ut ejus exemplum habet *Harvejus* libelli sui cap. 16. Non putem tamen id necessarium esse: potest enim è foco aut decidere portiuncula aut elevari fuligo, cor petere & febrem accendere. quomodo videntur pleræque febres ab inflammatione partium oriri, quæ aperta vomica, evacuato pure desinunt. Et ut tales symptomatice febres, ita & quædam fieri intermittentes febres possunt, à materia vel in vasis vel extra vasa conclusa, quæ per putredinem vel quotidie vel tertio vel quarto die, in parula vasa regurgitans aut effumans, paroxysmum faciat.

In continuis fateor, quarum materia in vasis majoribus hæreere putatur, difficilior est causam dicere quare singulis circuitibus paroxysmus non fiat. videmur tamen eandem dare posse, quam vulgo dant causam, quare continuæ, non continenter æquales videantur; quod etiam si materia cordi satis propinqua sit, tamen citius paroxysmum non faciat, quam certum putredinis acquisiverit gra-

Nec aliud indicant paroxysmi febrium intermittentium.

Aut continuæ.

dum: & cum paroxysmum tamdiu durare, usque dum putrida ea materia sit evacuata quæ cor tangit, aut ei suos fumos mittit. Verum non arbitrer quemquam ob causam quare paroxysmi febriles certis diebus redeant, quæ prorsus & abstrusa & ignota est, motum sanguinis velle negare satis celerem esse, qui est manifestus.

*Vile motus
cuiusque est
vehement:*

Præter celeritatem, sanguis in motu & vehementiam habet, quæ ex iis apparet quæ diximus de duritie & tensione quam arteriæ & venæ ligaturæ acquirunt: nihil enim à tenui liquidaque materia in summam duritiem tendi potest, præsertim sursum, nisi vehementer in id impellatur retineaturve. sed ea motus vehementia maxima est prope cor, à quo sensim fit minor, adeo ut extremæ arteriolæ non pulsant nisi major solito sanguinis impulsus accidat, ut id in febribus fieri observamus. Quare & videntur venæ non pulsare, quod

*Non enim
venarum
est arteriarum
celeritas*

is impulsus etiam minor sit in iis, quam in minimis arteriis; & quod venæ Anastomosi arteriarum junctæ, ubi ab iis abeunt in plures fe ramulos quam arteriæ dividant; ubi enim in plura brachia, flumina ducuntur, motus ille impetus imminuitur. Quare ubi quædam venæ occluduntur brachia, vel à re comprimente, ut in quibusdam tumoribus, vel ab aliquo obturante ut in varicosis gravitate sua relabente sanguine, animadvertitur denuo impetus ille, & venæ pulsare conspiciuntur: pleraque enim palpitantes in partibus, à flatibus provenire creditas, nihil aliud quam venarum pulsationes esse, in venis transparentibus per cutim non raro nobis licuit observare.

*Existimant
tamen Celerita-
tem*

Quia autem motus vehementior in arteriis quam in venis est, videtur prima fronte in arteriis quoque celerior, quam in venis esse. non aliter ac homines, equi, aliaque animalia quæ magno se conatu movent, male sæpe videntur plus promoveri. Etenim per arterias protrusus sanguis non omnis potest Anastomoses transire, quod è lato in angustum veniat, unde accumulatur in arteriis, eæ dilatantur, in qua dilatatione aliquantulum persistunt. quare dimidio dilatationis totoque quietis tempore, perparum ille impetus ad motus celeritatem facit. qui motus interea expeditior per venas est, quod ex angusto in latum & per plures vias peragatur. Ratio autem hic dicitur in hoc sanguinis motu celeritatem utrobique æqualem esse debere, nisi quantum hepar cordi sanguinis novi è chylo suppeditat, arteriæve nutrimenti partibus largiuntur, aut alias tandem cor humore destituendum. Quod & ipsum sensus confirmat, toties enim pulsatur vena cava, toto illo tractu ab hepate in jugulum, ideoque in cor propellit, quoties animadvertitur arteria pulsare & ideo è corde admittere. sed de illo mox plura dicemus.

*Sed majoris
celeritatis pul-
sante corde.*

In ipsis tamen arteriis, sanguis celerius movetur, quando cor propellit; à qua celeritate sensim deficit, quando cor quiescere incipit & postea dilatatur. Imo & in ipsis venis motus sanguinis pulsante corde vehementior est & celerior, quod ut in vivorum sectione observavimus, ita id animadvertimus aliquoties, quando in brachio vena secaretur, in quo à ligatura non admodum distenderentur venæ. Iam dictæ quoque venarum palpitantes non videntur aliunde procedere,

quam quod à relabente sanguine, aliove modo arctatis venis, cum sanguis impetu protrusus transire non possit, is venam attollat, quæ concidat iterum quando is impetus imminuitur, aut vena transfluente sanguini liberiores largitur transitum.

Non arbitrer autem sanguinem qui per arterias v. g. crurales ad crurales venas delatus est semel, eum continuo iis viis deferri, sed eum ubi ad cor redit, ei qui ex aliis venit partibus permisceri, atque ita promiscue partibus distribui: sic enim melius nutrire partes poterunt, si semper novum sanguinem habeant, è quo elicere possint, quod illis maxime ad nutrimentum & robur facit. ita melius crescant plantæ, quæ in eodem & immoto solo semper non feruntur.

Hæc tota ratio est, qua sanguis movetur. Et quoque, cum sanguini permitti sint, qua moventur vitales spiritus.

Animalium spirituum motum sæpe conati sumus indagare, sed non potuimus cum alibi observare quam in musculis, qui videbantur ab iis in latum profundumque distendi, & disseci tremere & palpitare. Nervi enim ligati à ligatura nec tument, nec distenduntur, & disseci non alium motum exhibent, quam quod in se contrahantur. Ligare autem nervos sexti paris qui per thoracem libere vagantur res perquam facili existit.

Motus vero Chyli per venas lacteas manifestissimus est. Non est autem ut sanguinis continuus, cum non semper suppetat chylus. Quando autem ex intestinis per lacteas venas vagatur, celerius ipso sanguine incedit, & ligatæ venæ intumescunt citissime. Quam ob causam nec diu in vivis disseci apparet, nec in cadaveribus inveniuntur, nisi qualis is sit, quando aliquod obstaculum chyli motui fuit objectum. Quod vero ligatæ non intumescant in duritiem, figuræ esse videtur, non ita vehementem chyli motum ut sanguinis esse: forsitan quod cum per minus spatium moveri chylus deberet, non is in motu impetus requireretur.

Sed jam tempus est ut in horum motuum causas & primum sanguinis inquireamus.

Quidquid sit, vel insita virtute ita movebitur sanguis, vel aliquo motu qui ad vectorem, tractionem, pulsionem sit referendus. Propria virtute eo modo moveri sanguinem, nec in sanguine in pelvim recepto, nec in corpus effuso, observamus, quem esse momento corruptum durum est asserere: nec in ulla alia re inanimata talem spontaneum motum licet videre. Quod autem Harvey cap. 4 annotat, se quiescente auricula, motum in ea sanguinis deprehendisse; id & nos quoque, ut & in quiescente corde sensimus, sed simul eum motum in auricula inditum sanguini à vena cava fuisse, in corde ab auricula, ut statim videbimus.

Veli hic sanguinem à spiritibus nullo potest indicio comprobare: & ii levitate sua sursum sanguinem veherent, quem hic deorsum quoque moveri & ad latera videmus.

Quare reliquum est ut vel trahatur sanguis, vel pellatur.

Protrudi sanguinem viri quidam ingenio præclari arbitrantur, quod calore cordis immensum rarefcens, majorem locum exposcat, ideoque eum cor dilatare & attollere; cumque nec in dilatato corde contineri queat, in venam arteriosam arteriamque aortam

*Vna sanguinis
portio non ex-
citatur semper
eius visus*

*Cum sangui-
ne mos citius
arterias sper-
tat*

*Animalium
spirituum
motus per
nervos obse-
rari non po-
test.*

*Sed facile est
li motus per
venas lacteas*

*Causa autem
qua hic motus
est sanguis*

*Non est qui
quædam vi-
sit*

*Nec vehitur
sanguis à spi-
ritibus*

*Nec fundi-
tur sanguis
solum rare-
factionem*

aortam tali effundi impetu, ut omnes distendat arterias & faciat pulsare. Suae autem opinionis hoc argumentum adferunt, quod cor angustiae alteriusve animalis, ubi pulsare desinit, si à subitrato calefacti igne denuo pulsus edere conspiciatur. Sed an is pulsus fieri non possit, quod spiritus à calore vegetior factus, melius ei causae possit inservire quae in corde pulsus facit? non aliter ac calefactis in vivorum sectione intestinis musculisque, in quibus tamen nulla ebullitio est, restitui motus videtur. Omnino enim levis tantum quaedam rarefactio à tepore quodam in corde est, nulla ebullitio, aut diffusio subita. Et revera ob rarefactionem sanguinem è corde non exilire in validis saepe canibus conspeximus, quorum cor discisso mucrone, cum ob effluxum sanguinis dimidia parte non repletur, id erectum, à rarefactione repletum non fuit. Sed accedente constrictione, portio illa sanguinis quae in corde reliqua erat, ultra quatuor pedes fuit eiecta, ut in magna frequentia nos & vicini conspurcaremur. Vnde evidens est, sanguinem à parte propelli.

Propellitur autem quod ita mutatus sanguis cordi illique partibus sit molestus. Si enim cor integrum, aut ejus vivi dissectione mucro, aliave major particula, cuttello acidulave pungatur, quoties pungitur, toties se quasi naturali motu commovebit, etiam si jam aliquandiu omnem amisisse motum videatur.

Pelli autem à vena cava sanguinem in dextram cordis auriculam manifeste visis dissectionis animalibus conspeximus: in omni enim cordis motu à vena cava primum motus initium est. quod cum dubitarem an non fieret, quia cava auriculæ cordique connexa esset, cor & auriculam rescuimus prorsus in canibus visis à vena cava, & animadvertimus etiam tum venam cavam pulsare minimum, & singulis vicibus aliquod sanguinis effundere. Quare & plerumque circa cor vena cava carneas qualdam fibras accepit, quas alibi in vena cava haud invenias: eae autem admodum conspicuae in hominis, bovis, canis cava possunt videri. Motus autem ille venae cavæ prope cor evidenter est, ut plurimum tamen eum quoque in vivis canibus observavimus toto illo ductu ab hepate & à jugulo in cor usque.

Auricula dextra quem accepit sanguinem tensione quadam & constrictione in dextrum cordis ventriculum pellit: nam & in auricula motus constrictionis momento prior, quam in corde est. Et dextro cordis ventriculo ad auriculam usque discisso, manifesto apparuit singulis constrictionibus aliquid ex auricula in cor propelli, quod & notat Harvejus cap. 4.

Ita quidem pulsione praecipue sanguis ad dextrum cordis ventriculum venit. sed an non quoque & in auriculam & in dextrum ventriculum trahitur? Ita arbi amur: parte enim ejus sanguinis quem accipiunt interioris ali debent: quod autem alere debet, trahi debet, quo pars eum sanguinem accipiat qui illi est utilissimus, pulsione enim etiam inutile amandatur; ut optime Galenus, ut solet omnia, deducit libris 1, 2, 3 de nat. fac. Tractio autem hæc non tantum est vicini sanguinis, sed etiam remotioris, ut omnes partes vim eam habent, nec cito alimentum destituantur.

Sed an non quoque cor quia dilatatur trahit, metu vacui, ut solemus appellare? Non est verosimile, quia in ejus dilatatione nullus metus vacui esse potest, ut mox fiet evidenti.

Vt sanguis ad dextrum cordis ventriculum ita quoque ad sinistrum venit, nisi quod impulsione sanguinis concidente pulmone, ex arteria venosa in sinistram auriculam non tam validam quam è vena cava potuerimus observare; aliqua tamen manifestum est. Impulsio autem in utramque auriculam & in cordis utrumque ventriculum eodem momento accidit: nisi in moribundis, in quibus aliquando observavimus non eodem tempore utramque auriculam, aut utrumque ventriculum pulsare.

Vbi autem ita sanguis in ventriculos cordis pellitur, cor nullum oculis manifestum motum habet, sed imposito cordi digito aliquid intrare in cor sentimus & cor plenius fieri: quod & observavit Harvejus cap. 4. Imo septuagies, aliquando centies pulsasse auriculam observavimus, antequam cordis sequeretur motus.

Vt jam habeamus quomodo sanguis in cor moveatur. Videndum nunc quomodo moveatur in arterias. In Arteriis sanguis pulsione movetur: facto enim in arteria foramine dum cor se constringeret, exire sanguinem vidimus: ita & discissa à corde aorta aut vena arteriosa cum cor constringeretur sanguinem effundi; discisso cordis mucrone eoque erecto expelli sanguinem & è corde exilire; discisso corde medio transversim in systole sanguinem expelli, nec unquam in diastole exivisse vidimus. Quod autem quidam in visis dissectione se in dilatatione vidisse exire sanguinem asserunt, in eo fuisse illos falsos arbitror, quod dilatationem eam esse existimaverint, quæ revera est constrictione: quod insignis ille Anatomicus Columbus quoque notavit, lib. 14 de re Anatomica.

Etenim in motu cordis, oportet ejus constrictionem, quietem, & dilatationem exacte distinguere. In constrictione cordis five systole, mucro cordis accedit ad basin, ideoque nonnihil elatior fit. Et in iis animalibus quibus aorta non basi cordis, sed versus medium nonnihil inferitur, ut in cuniculis, anguillis & similibus, basis quoque cordis accedit ad mucronem. Latera autem cordis quæ costas dextras sinistrasque spectant propius ad se mutuo veniunt, adeo ut si alterutro lateri mucronem abscideris ut appendeat, in constrictione ad integrum latus, & quasi in locum suum redibit. Latus autem cordis quod sternum spectat attollitur, & quidem praecipue circa basin: atque ita totum cor undique tenditur. Eaque pars vicina basi sublata, maxime videtur pectus ferire & quem sentimus pulsus facere; quamvis & mucro possit, quod magnus ille Anatomicus Riolanus quoque observavit, lib. 6 suæ Anthropol. cap. 12.

Eum autem cordis motum quem jam descripsimus, revera constrictionem esse, quo nobis certo constaret, cordi aliquando abscidimus mucronem, aliquando transversim dissecimus per medium, & manifesto vidimus cum eum quem diximus motum ederet, ventriculorum cavitatem minorem fieri, & immisso cordi digito, ventriculos ad digitum sensimus constringi. Eum autem quem jam diximus motum cor exterius offendere dum

*Eodem causa
motus in sinis-
trum ventri-
culum est.*

*Contingitque
utrobique co-
dere mucronem.*

*Ex corde in ar-
terias sanguis
pellitur, cum
cor constrin-
gitur.*

*Ratio constric-
tionis cordis.*

constringitur, interius quoque ostendit; nisi quod in septo intermedio nullus motus videatur: forsane si septum ad sinistrum ventriculum constringendum, sinistrum cordis accessisset latus, dextram ventriculi cavitatem reliquisset maiorem.

Hæc cordis tensio constrictioque est, qua sanguis è cordis ventriculis in arteriosam venam & aortam pellitur. Ea autem ubi languida est, fit ope tantum fibrarum quibus caro cordis donatur; sed ad validiorem, majores illæ fibræ concurrunt quæ in ventriculis cordis visuntur, ut sæpe dissectis cordis ventriculis in vivis observavimus.

Fibræ autem illæ in ventriculis, & in ipsa cordis substantia manifesto constrictionem faciunt, quia in latum undique distenduntur, quare in longitudinem abbreviantur, non aliter ac musculosæ omnes nostri corporis partes ita motum absolvent. quare ubi cibum masticare volumus tumere & indurescere musculum temporalem sentimus. Hoc tumore cavitas quoque ventriculorum cordis redditur angustior. Et quidem tumor ille carnis majorumque fibrarum à basi incipit, & sensim usque ad mucronem pergit. Quem ob motum si *Maximus Medicorum* in initio lib. de corde, cor quoque musculum validum appellavit, eleganter sane, ejus motus rationem explicavit.

Vbi in arterias sanguinem sua constrictione cor expulit, cor ad naturalem statum redit. Mucro enim recedit à basi, ut quoque basis à mucrone in iis animalibus quæ egressum in arteriam aortam in basi non habent: dextrum vero sinistrumque cordis latus, versus costas se extendit, & quod sternum respicit latus concidit, ibi maxime ubi officio aortæ respondet. atque tum totum cor quiescit ac laxum & molle sentitur.

Nisi autem superius illud latus concideret prorsus, hoc ad naturalem statum reditu cor dilaretur: ut corde dissecto tangere & videre facillimum est. Verum id superius latus concidere debuit, ne præcedenti constrictione cor inanitum, vacuum pateretur. Vbi vero è vena cava, arteriaque venosa novus sanguis in cor propellitur, & qui in eo continetur sanguis à calore rarefcit, tum superius latus affurgit: & reliqua latera, ut jam diximus, manent extensa. Atque ita tum cor in sua dilatatione est; nec aliam totius cordis dilatationem præter hanc est observare.

In particulis vivi cordis dissectis è corpore exemptis, non alia quoque dilatatio est quam à constrictione remissio. Equidem in illis particulis ubi constructio desinit reliqua quandoque videtur quædam palpitatio, sed ea alterius generis motus est à spiritu in carne contento & quærente exitum; qualis & non raro in musculis integris aut dissectis mox ab obitu in dissectis animalibus potest videri.

Adeo ut dilatatio cordis & constructio eadem ratione ut reliquarum partium accadat, ventriculi, intestinorum, vesicæ, uteri, quæ ab eo quod illis immittitur extenduntur, quod ubi expulere ad naturalem statum redeunt.

Hunc autem cordis motum non melius possumus observare, quam in iis animalibus quæ unicuique tantum cordis ventriculum habent, aut si habeant geminum quando incipiunt animalia languere. alias ubi ea animalia valida sunt ob celeri-

tatem motus, eum agnoscere difficile est; simul & quod duo ventriculi illos motus geminos exhibeant; quodque conus dextri ventriculi, cum minus altus sinistron sit, ubi retrahitur ad basin obliquum motum faciat.

Sed redeamus in viam, videamusque porro quomodo sanguis ex arteriis cordi vicinis, per totius corporis arterias dispergatur? Illud manifesto fit impulsu: ligata enim quavis arteria, ad ligaturam intumescit valde & tenditur in summam duritiem.

Sanguinis tamen gravitas ejus motum deorsum promovet, unde cor propinquius capiti, quam pedibus esse situm videtur.

Trahi quoque in omnes arterias sanguinem venosum est, quo illæ illisque vicinæ partes convenienti sanguine nutrantur.

Sed dilatatione trahere arterias nulla videtur esse necessitas: solo enim impulsu sanguis propelli potest, & arteriæ possunt pulsare: disrupta quippe arteria & facta in carne aneurismate, aneurisma in carne, eadem ratione ut arteriæ, pulsare sentitur; in quo manifesto caro sanguinem dilatatione non attrahit, sed in eam sanguis pellitur. Quale miserandum exemplum nuper in Experimentissimo viro *D. Iohanne Elemanno* vidimus, cui disrupta arteria aneurisma quartam thoracis partem occupaverat. Quale & observavit *Riolanus* lib. 6. *Anthrop.* cap. 12. Et revera ab impulsu sanguinis arteriarum pulsus fieri, pulsus undosus, vermiculosus, formicans videntur ostendere, alique non pauci qui motum sanguinis in arteria evidenter imitantur.

Equidem verum est, in *Galen* libello an sanguis in arter. contineatur verbis ultimis asseri, intrusa arteriis cannula, arteriaque supra cannulam ligata, ultra ligaturam arteriam non pulsare, etiam si sanguis per cannulam pelli possit. Sed mutilum eum esse locum mihi suspicio est, quod ea ratione qua ibi describitur, succedere rarissime & difficillime operatio possit: libera enim arteria præscribitur ibi secanda, è qua dissecta nemo non novit quanta vis sanguinis exiliat, adeo ut vel moriatur animal, vel præ languore nullæ arteriæ, vel saltem non remotiores queant pulsare.

Sed locus integer sit, & ut ibi jam describitur operatio successerit, fieri potuit ut languente prorsus animali ob sanguinis effluxum, citra cannulam pulsus sentiretur, quod cannula intrusa arteriam reddens angustiorum ex parte sanguinem susteret, ut facile sanguis rephere arteriam posset & attollere. Ita non raro vidimus arterias quæ vel languidum vel nullum exhibebant pulsus, manifestum edidisse quando non ita remote à corde comprimerentur. Ultra vero cannulam à *Galen* pulsus non fuit animadversus, quod per cannulam arteriâ multo angustiorum minus sanguinis arteriæ reciperent. Et tale quid facile potuisse contingere in cuniculo animadvertisimus, cujus aortæ, ea utrimque ligata, cannulam intrusimus, sed quod soluta ligatura animal emoreretur, operæ pretium non videbatur supra cannulam arteriam ligare, visi tamen nobis fumus aliquem usque ad cannulam pulsus sentire, nullum vero potuimus supra aut ultra cannulam.

Nec præterea id experimentum nobis unquam luc-

Quæ sit ope
percorum.

A constrictione
cor ad natu-
ralem statu-
tum redit.

Atque tum
cor dilatur.

E majoribus
in minores
arterias sang-
guinem pellit.

Trahitur
meri quoque

Non necesse
est de re ipsa
dilatatione.

Nec aliud
dicit Galen
Experimentum
tum.

successit, quod haud facile sit commodam arteriam invenire. Et ea ubi oblata debiteque dissecta sit, ocyssime tamen animal aut hæmorrhagia aut, quod mirum est, convulsione moriatur.

Vt non aliud appareat quam impulsus sanguinem arterias posse permeare, & ab eo quoque arterias posse distendi. Nec aliam videri ad arteriarum pulsus causam arcescendam, cum ab his peragi pulsus possit.

Solet tamen sæpissime natura plura auxilia ad operationes suas instituendas advocare, quam nobis quidem necessaria videantur, qui non semper ejus possumus secreta rimari. Ita & hic quædam à Galeno indicia observata sunt, præter eam dilatationem quam arteriæ ab impulsu sanguinis habent, eas quoque propriam dilatationem moliri. Omnes arterias nostri corporis & in sanis & in vivis dissectis eodem momento pulsare: Nihil autem quod in distans movetur eodem momento ubique esse potest; quare nec eodem momento ubique distentionem facere. Intestina dum flatu Anatomici replent & coqui, vicina parte prius quam remota distendi conspiciuntur. Verum equidem est, arterias non inanes, ut intestina, sed ex parte sanguine plenas dilatari: cum tamen qui è corde venit sanguis propellere vicinum debeat & iterum vicinum, atque ita porro usque dum ubique repleantur arteriæ & distendantur, non videtur, etiamsi è lato in angustum fiat, hoc uno momento peragi posse. non aliter ac videmus à pueris viginti lapides ferre, majores primum collocatos, primo celeriter disiecto, reliquos omnes uno momento non cadere.

Quare suspicandum videtur, arteriarum distensionem & ab impulsu sanguinis & à propria dilatatione fieri: & utrumque ad movendum sanguinem operas conferre.

Hinc quoque apparet impulsus illum sanguinis tantum à corde fieri, nec unam arteriarum partem in aliam pellere: nam quæ pars constrictione propellit, ea eodem momento nequit dilatari, omnes autem eodem momento dilatantur.

Atque ita quidem sanguis movetur per arterias; Ex arteriis autem in venas, è venis minoribus in majores, ipsamque venam cavam, sanguis quoque impulsu movetur. Quavis enim in vivis ligata vena, versus cor concidit, repletur vero ea parte, quæ à corde remotior est.

Ea autem pulsio ad cor, à quavis videtur venæ parte contingere; ligata quippe vel compressa in brachio vivo vena, non tantum remotiori à corde parte tenditur, sed & in reliqua quæ cordi viciniore est concidit & inanitur; quam viciniorem si quoque liges, & ea ultra ligaturam distendatur & intumescet. Pulsio autem illa contingit fibris quibus venæ constituuntur.

Arbitramur tamen quoque venas trahere, ne sine delectu sanguinem accipiant, sed id allicere queant quod sibi est utilissimum, pulsione tamen magis videntur sanguinem quam tractione accipere, quod ligatæ venæ mirum in modum tendantur.

In vena cava sanguinis quoddam penarium est, in quo sanguis in futuros usus recondatur, quando copiosior est quam qui cordi omnis debeat suppeditari.

Atque hæc omnes causæ motus naturalis sangui-

nis sunt. Quibus causæ motus chyli non sunt abfimiles: etenim fibris suis se constringens ventriculus, quidquid chyli concoctum est exprimit. Et ea pressione aperire quoque simul pylorum videtur: non enim spontaneus ullus in pyloro motus, qualis in ventriculo aut intestinis, videtur.

In intestinis chylus longam moram non trahit, sed quamprimum fibrarum transversarum constrictione propellitur: dum autem multæ & quæ se mutuo consequuntur fibræ simul agunt, premitur chylus nec totus potest deorsum elabi, unde pressi chyli aliquid venas lacteas ingreditur: ne tamen chylus nimis cito ad anum defluat, inferioris transversæ fibræ constrictione sistitur, atque ita inferne superneque conclusus compressusque, per rugosam intestini tunicam ad venas lacteas quasi per colatorium premitur. Hæc autem fibrarum transversarum constrictione, in omnibus intestinis tenuibus omnibusque crassius, certa serie, per intervalla, contingit.

Per venas lacteas chylum in venas portæ, in hepate, quandoque quoque venam cavam pulsus moveri, ligatura ostendit.

Vero quoque simile est, ex intestinis lacteisque chylum attrahi, celerius enim ex iis movetur, quam intestina venæ lacteæ pellere videantur & promovere.

Chylus in ramo mesenterico, vena portæ, vena cava sanguini permixtus, ab ea movetur causa, quam diximus ibi sanguinem movere.

Per peculiare autem venas potius quam per meseraicas sanguinem continentes deferuntur chylus, quod meseraicæ sanguinem admixturæ, aperiri osculis in intestina debuissent, per quæ facile sanguis in intestina fuisset elapsus. nec ei incommodum poterat vis tractrix obviam venire, quæ multo hic obscurior, multo imbecillior expultrice est.

Vt hic chyli motus, ita quoque sanguinis quasi in orbem motus suos usus, suas commoditates habebit, quarum hæc videntur præcipuæ.


Quod continuo illo per cor transitu, continuo quoque sanguis calefiat, & dum alius paucies, alius pluries cor transivit, omnis qualitatatis sanguis in venis inveniatur: qui dum ad singulas partes deferatur, & omnem suum thesaurum natura illis exponit & offert, melius calefieri, & accipere id alimentum possint, quod maxime ad earum nutrimentum & robur facit.

Sed & is motus non minimum confert, ut sanguis in integritate sua servetur. nam

Vitium capiunt, ni moveantur aquæ.

quod & in sanguine esse verissimum, quotidie obstructis vas licet observare.

Contribuit quoque ad sanguinis perfectionem, dum continuo motu rarefcit & attenuatur. Verum præcipue ad ejus perfectionem facit, quod sanguis modo attenuatur, incalescit & rarefcit in corde, modo iterum condensatur & quasi concrefcit in corporis habitu. Nulla enim pars in corpore corde calidior, nulla minus calida corporis habitu sentitur. Vnde quædam quasi circulatio contingit, non abfimilis quæ Chymici suos spiritus tenuissimos reddunt & perfectissimos. qui enim à calore attenuatus est sanguis, ubi à frigore condensatur, in ea potest tenuitate persistere, nec ad pristinam crassitatem redit: à qua tenuitate ad ma-



FIGURÆ EXPLICATIO.

- A. Vena mesaraica vulgate, portæ rami, cum arteriis mesaraicis.
 B. Vene lacteæ discurrentes per mesenterium ad intestina.
 C. Mesenterii portionem: una etiam nervorum mesaraicorum per eam distributionem signat.
 D. Ventriculi fundus.
 E. Inferius ventriculi orificium *πύλας* vocatum.
 F. Intestinum duodenum.
 G. Jejunum intestinum.
 H. Ileum intestinum.
 I. Vena & arteria fundum ventriculi perreptans.
 K. Omenti pars.
 L. Glandula in mesenterii principio, quam *Asellius Pancreas* appellat, in qua rami venarum lactearum non tam multi sunt, ut hic designantur.
 M. Vene lacteæ in ipsis intestinis à ligatura intumescences.
 N. Vene lacteæ in mesenterio à ligatura tumide.
 O. Valvule in venis lacteis.
 P. Constrictio intestini superna.
 Q. Constrictio intestini inferna: quibus constrictioibus clystus in venas lacteas exprimitur.

jorem tractu temporis calore pervenit, in qua à frigore condensatus denuo conservatur, atque ita tandem ad generationem vitalium spirituum aptissimus evadit.

Hunc ob finem sanguis in orbem movetur; sed an non is præterea alicubi alium motum habet? E minimis Arteriis sanguis recta in carnem defertur, ut humorem innominatum, rorem, gluten, cambium constituat: nec remeat unde venit; ne transfluens per carnem sanguis, humores hos agglutinari partibus impedivisset & assimilari.

Fluit hic autem quandoque præcipue, quod ex arteriis in carnem pellatur: Et non raro quoque præcipua causa movens attractio est: Etenim non sine tractione ossa ad sui nutritionem crassiores accipere humoris partem possent, & reliquam tenuiorem humoris partem ad sui nutritionem ineptam in vas relinquare.

Sunt quoque qui arbitrantur sanguinem è corde delatum retrorsum cedere & per arterias denuo ad cor redire. Quod illis ideo videtur statuendum, ut causa dari mechanice possit, qua cordis in orificio arteriarum valvulæ, decidant & occludantur. Nos equidem præclarum semper Erasistrati institutum æstimavimus, omnia quæ in corpore nostro contingunt Mechanice explicare, sed divinam sapientiam sua metiri temerarium judicamus. Eas vero machinas esse statuendas quas evidens ratio & potissimum sensus ostendant. Hic contra sensus observant à corde non ad cor per arterias sanguinem moveri; & in raro languidoque pulsu non ultimo arteriam qua cordi nequitur, ut fieri deberet, sed primo intumescere. Valvulas quoque à remeante sanguine non occludi, hoc videtur indicium habere, quod si arteria duobus digitis à corde ligetur, & ea inter ligaturam valvulæque ita aperiat ut libere exire sanguis possit, quare nec cedere retrorsum, nec remeare; valvulæ tamen aliquoties bene constrin-

gantur, cor ordinate moveatur, & non nisi in sua constrictione sanguinem effundat. Quamobrem si ulla hic nobis eligenda esset machinatio communem admitteremus opinionem, quæ ut cordis ita & occlusionem valvularum, contractione fibrarum fieri asserit. Ea quippe fibrarum in corde contractio passim obvia in conspectum prodit.

Alia vero ratione sanguinem naturaliter recta moveri per venas à corde, per arterias cor versus, nullum equidem habemus indicium. In gaudio quidem humores extrorsum vergunt; sed id potest per arterias tantum contingere. Et in tristitia humores possunt introrsum per venas tantum moveri: & omnino debent, quod cum pulsus non cesset in hoc affectu, pulsu autem continuo aliquid per arterias extrorsum eat, difficillime posset aliquid per arterias introrsum & ad cor moveri.

Præter naturam tamen humores alium quam quem nunc descripsimus motum habent, dum humores levitate sua, vel alio impetu sursum vergunt, vel gravitate sua deorsum descendunt, ut in varicosis est manifestum. Occlusa quoque ea via qua solebant moveri, aliam quærere coguntur. Ita in Anate aliquoties in vasis pectoris variegatum sanguinem vidimus subeandem alium, alium rubentem, qui constricte arteria ad cor & à corde movebatur secundum arteriæ latus diversum: is tamen motus non diu duravit, nec eo motu unquam sanguis cor ingressus est.

Atque his, præstantissime *Bartholine*, me tibi arbitror de motu sanguinis respondisse. In quem inquisivi scrupulosius, quo melius humorum naturam & eorum defluxum cognoscerem: à quo humorum fluxu innumeri morbi oriuntur. Credidi quoque me posse exactius intelligere quomodo bonus malusve sanguis generaretur, si cognitæ milie partes essent à quibus transiens humor immutaretur. Putavi quoque me melius judicatu-

Nec in animi affectibus.

Sed præternaturali alia est.

rum, quomodo plurimi morbi curari debeant, si cognitum haberem cuius venæ incisio has illasve potius evacuet partes, & quas pertransire partes remedium debeat antequam ad affectam partem queat pervenire? Occurrebantque innumera per totam medicinam diffusa; pulsum doctrina, febrim, inflammationum, obstructionumque generatio & cura, aliaque ob quæ desideravi hunc sanguinis motum cognitum habere.

Experimenta autem quibus in hanc opinionem veni, ita evidentia sunt, ut non dubitem asserere Medicos doctos cordatosque imposterum hunc sanguinis motum esse admitturos: in causis tamen nonnullis hujus motus quibusdamque circumstantiis non cum possum consensum polliceri: quot

quot enim homines sumus, iudicii quadam disparitate facile in diversas sententias imus.

De fide autem experimentorum dubitare Bartholine non potes qui eorum non parvam partem ipse vidisti: adfuerunt autem sapissime Medicinæ Doctores doctissimi tibi non ignoti *Franciscus Sylvius, Ioannes van Horn, Abasverus Schminerus* in dissectionibus accuratissimi; & viri solidæ eruditionis *Franciscus van der Schagen, & Antonius Vockelaert*: nec adfuerunt tantum, verum ad facienda experimenta & manum & consilia contulere, quibus hoc nomine plurimum debeo. His vale, ornatissime Bartholine, & me ama. Dabam Lugduni Batavorum, x Kalendarum Octobris Anno 1610 cxi.

ALTERA EPISTOLA

D E

MOTVS SANGVINIS,

A D E V N D E M.



A Scriptorum fortuna est, ut etiam cum nolunt porro scribere cogantur: & Adversariis suis respondere, nisi aut sibi, aut causæ quam agunt, malint deesse. Mihi certe plane aliis intento *Vir quidam Doctus* hac voluit extorquere. Quas enim antea vellicaverat Theses de motu sanguinis, hisce diebus peculiari scripto conatus est refutare. In eo scripto non pauca ingeniosa sunt & docta: verum id in auctore desidero quod in Albutio Rhetore Veteres, qui de omni causa dicere cupiebat, non quidquid debebat dici, sed quidquid poterat. Eum quoque sanguinis motum qui in vivorum animalium dissectionibus evidens est, nunquam conatus est observare: prorsus quasi certius res animo concipi, quam oculis posset videri. Verum hæc aliaque Thesium auctori *Rogero Drake* curanda relinquo, nunc apud Londinenses Medicinæ Doctores acuti ingenii & solidæ eruditionis: Ego ea tantum sectaturus sum, quæ motui sanguinis in orbem obfutura videbuntur. Et primo quidnam hic nos doceat venæsectio, de qua digna consideratione *Vir Doctus* annotavit.

Venam secaturus Chirurgus vinculum brachio injicit quo vena in tumorem attollatur. In tumorem attollitur vena, non quæ citra ligaturam cordi propinqua, sed quæ ultra ligaturam à corde est remota. Ejus autem tumoris causa, non est dolor, quo vinculo contracta pars afficitur: dolor enim sæpe exiguus aut fere nullus est in parte quæ ligatur. Et vellicatione, combustioneve acriori dolore affectum brachium, minus plarumque tumentes venas, quam à simplici ligatura, habet.

Neque verosimilius est venas intumescere à ligatura, quod per venas ad ligaturam angustiores, copiosior sanguis & celerius ab hepate feratur; ut circa pontes alibive arctata flumina rapidius labuntur. Fluminis enim defluens aqua circa angu-

stum locum collecta evidenter in tumorem attollitur, à quo decidens celerius vadit. Ligato vero brachio contrarium evenit; non enim hepatis propinquiores venæ à quibus sanguis veniret, sed ab hepate remotiores magis distenduntur.

Quare reliquum est, venas ultra ligaturam tumere, quod sanguinis à minoribus venis ad cor redeuntis motus ligatura sistatur, ibique collectus venam distendat. Sed quo hac de re esse denuo certus possem, in vivis animalibus ramum jugularem cruralemque filo constrinxit archissime, ut nihil sanguinis transflueret; aperui autem eam venæ partem quæ à corde remotior esset, & sanguinem copiose, celeriter & vehementer effudit. Mox vinculum laxavi & venam dissecui per medium, parsque ejus à corde remotior fursum è corpore extracta, continuo & celeriter sanguinem dedit: interea dum venæ pars cordi propinquo; nonnihil elevata ne præ dolore se concutiens animal facile exprimeret sanguinem; primo parum, mox nihil sanguinis largiretur. Vnde mihi videbatur evidens è venis remotioribus sanguinem ad cordi propinquiores venire, nec è majoribus ad minores; nisi forte data via aliquid vicini sanguinis elaberetur. Tantundem in venæ sectione brachii unusquisque facile potest experiri: si enim sanguinem qui supra ligaturam est fursum digito adigat, ut vena inanita videatur, non minus tamen sanguinem infra ligaturam videbit effluere; qui per ramum superiorem jam inanitum non potuit venisse.

Sed si ita vena à sanguine distenditur, qui à minoribus venis ad cor movetur, Quomodo à ligatura potest arteria distendi, quam distentam non pauci præstantes Medici referunt fuisse pro vena dissectam? Sane à ligatura non intumescit arteria, nisi qua cor respicit, remotiori vero parte concidit aliquantum & imminuitur, ut in vivorum dissectionibus centies & amplius sum expertus. A ligatura autem remotiorem distendi arteriam non plane

Iterata scrip-
tura occu-
pata.

Christianum
solus.

In venæsectione
venam à
ligatura in-
mota.

non præ dolo-
re.

non à contracta
arteria vena;

Sed quod
motus
sanguinis

Nunc à lig-
atura, intum-
escit arteria.
Galenus &
Meib. cap.

plane authores voluisse arbitror, verum id tantum intendiffe, ubi vena non apparet quæ secunda est, tactu explorandum locum esse, ubi ea possit latere; & è fovea, motu tumoreque sanguinis eum invenendum: tactu autem invento apparente tumore, non statim judicandum ibi venam subesse; posse enim subesse arteriam quæ nimia ligatura pulsus amiserit, quæque ob tunicarum crassitiem non plane concidens, tumorem & quasi inflationem mentitur.

Verum insuper si à sanguine ad cor redeunte intumescit vena, cur vinculo ut supra ita quoque infra secandam venam injecto, vena tamen intumescit & dissecta sanguinem fundit? qui sanguis ex inferioribus objecto vinculo non videtur posse venire. Verum enimvero id non semper accidit, sed aliquando tantum; quando certo intervallo brachium ligatur, atque tum eum sanguinem venæ majores, loco intra duas ligaturas medio, è minoribus venis accipiunt, quæ minores venæ eum è minoribus habent arteriis, quæ Anatomici minoribus venis junguntur. Revera autem illum sanguinem qui intra duas ligaturas effluit, Anatomici ex arteriis venire, id indicio est, quod is majori impetu & calidior effluit, ac facilius citiusque ad ejus effluxum Lipothymia sequatur. Atque hac ligatura uti soleo ubi spirituosum ferventemque sanguinem esse in vitio indicia habeo, jubeoque Chirurgum illas Anatomicos ligatura quærere: supra enim Anatomicos injecta sistit sanguinis motum; infra vero non remoratur eum, sed calidior sanguis ad ægri tactum exilit.

Secunda vena sanguineque effluente quando sanguis minus copiose quam antea, aut ab initio non satis confertim fluit, ligaturam laxamus quo sanguis uberius effluit. Laxari autem non videtur ligatura quo sanguis per venas ab hepate veniat. Etiam si enim nihil aut minimum sanguinis supra ligaturam, imo fovea aliqua in vena appareat, promoveri tamen laxatione vinculi sanguinis effluxus videbitur, qui ex inani vena non potest venisse. Verum potest laxato vinculo melius sanguis per arterias descendere & ex iis venas intrare; quod arteriæ à ligatura compressæ, laxatione vinculi liberiores evadant. Arterias autem ligato brachio sæpe non satis liberas ligati testantur, qui arteriæ sæpe pulsus ad ligaturam persentiscunt, quem sensum compressa adfert arteria ubi ad carnem allidit. Et Medicus si exploret, sæpe minorem pulsus in ligato brachio quam in libero persentiet. Testarique possum, me aliquoties cum vinculum laxaretur digitum carpo applicuisse, & animadvertisse, ubi à laxatione vinculi sanguis copiosior efflueret, pulsus factum esse majorem.

At si is sanguis qui secunda vena effluit, ex arteriis in venas veniat, quomodo is potest copiosus educi? omnes enim arteriæ pulsant æqualiter, quare & videntur eadem mensura sanguinem venis largiri: si autem reliquæ arteriæ tantum suis venis, quantum arteriæ brachii tribuunt & educitur, an non cito cor omni sanguine destituetur? nullum certe periculum est. tam cito enim diximus sanguinem ad cor venire, quam ab eo pellitur.

Non arbitror tamen sanguinem æqualiter omnes venas intrare, etiam si æqualiter arteriæ pulsare videantur: in locum enim vacuum facilius fluit

celeriusque omnis liquor, in quo nihil est quod adigere debet & propellere. Et insuper hic ab evacuatis venis sanguis, magis quam à repletis trahitur.

E vena autem secunda cubiti copiosior sanguis, quam è manu fluit, quod omnis ille sanguis qui per omnes anatomicos cubiti manusque ad venas venit, per venas cubiti debeat redire; per manus autem venas parcius, & is tantum qui per Anatomicos manus venit.

E vulnerata quidem arteria, sanguis continuo effluit etiam si non ligetur. Verum id accidit quod sanguis per arterias vehementius, quam per venas feratur: qua vehementia arteriam replet, tunicam attollit & distendit, & ea si aperta sit necessario impetu elabitur.

E secunda vena ubi satis sanguinis effluxit, eum sistimus sublato vinculo, quod via pristina jam libera iterum queat sanguis deferri. Sin vero accidat ut collecto circa ligaturam sanguini nimis copioso, venæ celerem nequeant transitum largiri; aut ita vulnus amplum infictum sit, ut illac qua conclusus antea deferebatur sanguis, jam recta queat elabi, nonnunquam laxato vinculo sanguis rivulose effertur.

Quem ut sistant plane nostri Chirurghi hodie non raro, paulo infra vulnus venam comprimunt atque ita sanguinem sistunt; ne si supra vulnus comprimant, statim in vulnere retentus sanguis concresecat & venæ consolidationem remoretur. Hac autem ratione sisti posse sanguinem qui negant, nescio ubi illi debeant fidem mereri, qui in re obvia nobis audent imponere. Cum autem is sanguis inferiori parte compressa sistatur, liquet sane eum ex inferioribus venisse.

Sin vero contingat, non in venæ sectione quidem, sed alio infortunio, venam vulnerari ut sanguis sisti nequeat, vena transversim discinditur: unde, cum non amplius ut antea tendatur vena, sursum & deorsum discissæ partes in carnem trahuntur, à qua carne comprimuntur occluduntur que venæ oscula, idque tantò facilius quod per vicinas venas tensas patulasque moveri sanguis his oclusis possit. quare & eam ob causam discissa minori arteria transversim, hæmorrhagia aut inflammatione non succedit.

Quæ cum ita sint, omnibus arbitror liquere ea quæ in venæ sectione accidunt, aut comprobare circularem sanguinis motum, aut ei saltem non refragari.

Sed cum alia quoque nobis objiciantur, excutienda & ea sunt. Et quidem quod sanguinem per venas non ex arteriis, sed proxime ab hepate venire eo comprobant, quod partes quædam sanguinem accipiant, & ab affluxu sanguinis tumores patiantur quæ arterias non habent, inter quas pleuram numerant. Verum non sequitur si partes arterias non habent, earum venas sanguinem ab hepate, non vero alibi ab arteriis accepisse. ut enim diximus sanguinem ex arteriis mesentericis coeliacisque venas mesentericas splenicisque intrare per quas in hepar ferantur: ita & aliæ venæ accipere sanguinem ab arteriis possent, quem in partem ab arteriis remotiorem possent deferre. Nulla tamen corporis pars justæ molis est, in qua Anatomici conspicuas arterias non & vere agno-

Et copiosior à brachio, quam à manu?

Quare ex arteriis vulnerata non ligata effluit.

Laxata ligatura (sanguis sistitur, non nunquam fluit, & quare?)

Sistitur autem inferioris impellente, non ne digito.

Discissa enim que per arteriam tenditur, & quare?

Sanguinem partes nulla per venas accipiunt hepate exceptis.

scant. Et infinitæ adhuc illos latuere, quod minimæ arteriæ per carnes dispersæ unicam tantum tunicam ut venæ habeant. Imo in ipso hepate, tot rami arteriæ cœliacæ sunt, quot sunt rami venæ portæ, & totidem quoque sunt rami ductus cholidochi, quæ omnia hæcenus ab Anatomicis pro venis portæ habitæ sunt, quod communi tunica tria illa vasorum genera in hepate includantur. Saltem nemo pleuræ arterias denegabit qui vivi animalis thoracem unquam vidit aperiri; solet enim dum diffecatur is, è pleuræ arteriis sanguis exilire.

Ligatum brachium quare aliquando intumescit, aliquando non intumescit, aut

Fig. lxxxj.

Quomodo ligaturæ arteriæ differant

Porro probant ex arteriis sanguinem venas non intrare, quod ligato brachio ita tamen ut pulsant arteriæ, infra ligaturam brachium in immensam molem non distendatur; in eam autem molem videtur distendi debere, si ob ligaturam nihil ad majores venas possit refuere, & singulis constrictionibus aliquid in venas inferiores arteriæ propellant: quales arteriæ constrictiones plures una hora quam ter mille obeuntur. Verum enimvero fieri potest in illam molem brachium ligatum non intumescere, quod venæ prorsus non sint occlusæ, & sub ligatura per aliquos cuniculos latebrasve sanguis ad majores venas possit remeare: ut fascia repellente constrictam admodum partem ad plures menses annosve nutrirî tamen à transfluente sanguine videmus. fieri quoque potest tam parum sanguinis per arterias ligati brachii impelli, quod non nisi longiori tempore id admodum queat distendere, is enim tantum impellitur sanguis, distentis à plenitudine venis, qui in arteriis à ligatura usque ad manum est: qui enim supra ligaturam est per anastomoses liberas melius potest venas intrare. imo fieri posset cum distentæ venæ non amplius sanguinem in se pelli ab arteriis permittant, sicuti arteriarum pulsus aut sanguinem sursum regurgitare & per anastomoses supra ligaturam venas intrare: quale quid nos in Anatē didisse retulimus. Nisi aliquid horum eveniat, à ligatura intumescet prorsus brachium, & calidi innati à copia impulsus sanguinis suffocatio sequetur. Sæpe enim mihi alisque supra carpum brachium ligavi, & vidi venas semper distendi, intumescere aliquantulum carnem & rubere, Arterias sapissime, non tamen semper, sensim minorem pullum edidisse, imo & aliquando intermisisse; mox ligatæ manus rubrum colorem in lividum mutatum esse; quare ilico ligaturam dissolvi, exterritus hoc exemplo. Rustico cuidam vulnerato in brachio interno circa cubitum, cum pagi Chirurgus fissere sanguinem non posset, brachium circa vulnus archissimo vinculo constrinxit, unde secuta est ingens inflammatio inferioris brachii, & is tumor, ut pro digitorum nodis altæ foveæ conficerentur, intraque octodecim horas inferioris brachii gangræna & Sphacelus. quod Ewaldo Screvelio Maximo Medico & me præsentē, ab Expertissimo Chirurgo Christiano Regio fuit amputatum.

Obijciunt præterea, si venosus sanguis ex arteriis venit, quomodo arteriosus sanguis plurimum potest à venoso differre? Verum sciendum est cum minus à venoso discrepare quam plerique arbitrantur, qui ex impetu exilientis arteriosi sanguinis copiam in eo spirituum & summam raritatem colligunt: cum is saltus ab impetu veniat quo

cor sanguinem per arterias propellit. Ultra ligaturam quippe aperta arteria sanguis tantum guttatim emittitur. Ea autem quæ inter hos est differentia, potest & debet à majori minorive calore & spirituum copia provenire, prout magis minulve à foco & corde est remotus. multum enim differt sanguis prope cor ab eo qui in minimis arteriis invenitur, quem possis difficulter ab eo qui in minimis venis est distinguere. Et minores venæ rariorem calidioremque sanguinem quam majores habent: quod unusquisque facile in venæsectione pedis manusque potest experiri. Imo si duplici ligatura venæsectione, ut jam diximus, instituitur, calidior quam simplici exibit.

E minoribus autem venis, ad majores sanguinem non ire probare menstruis conantur, quæ illorum judicio integro mense in venis circa uterum colliguntur, & si ab utero in caput ferantur, ea venam cavam & cor putant non transire. Verum communis & vera opinio est, circa tempus consueti effluxus, menstrua demum ad uterum moveri, à quo humorum motu lumborum laterisque dolores eo tempore fere oriuntur. Et compertum habeo, si circa tempus menstrui fluxus cordis arteriarumque pulsus major fieri possit, menstrua melius promoveri, quod per arterias vehementius sanguis in uterum pellatur. Potest tamen contingere, menstrua colligi & ea obstructionem in utero facere, neque tum ad majores venas impedito eo motu sanguinem redire: verum id præter naturam est.

Vbi autem menstrua ex utero in caput feruntur, incommoda non est via, per venam cavam, cor & aortæ arteriæ ramum ascendentem. Et revera ea per cor ire, videntur palpitationes levesque lipothymia indicare, quæ suppressa solent menstrua comitari.

Sed an non videri debet periculosum futurum, si omnis qui in corpore nostro pravus humor semper cor penetrare & transire debeat. Verum sciendum est, ita corpus nostrum conditum, ut nobis sanis sit commodissimum, non ut nobis ægrotantibus. Deinde & humor qui ab obstructione putrescit & pessimus est huc non venit, quod obstructa via impediatur. Neque cor ita imbecillum est, ut ab humore pravo, qui longas ibi moras non trahit, statim corrumpatur: observarunt enim magni illi viri Galenus, Hollerius, Laurentius pus empyicorum aliosque acres & foetidos humores critiche & sine gravibus symptomatibus, per sinistram cordis ventriculum transire. Et id non raro quoque in commodum ægri accidit, quibus pravus ille humor per cor transiens, cordis vi sæpe domatur.

Cætera quæ obijciunt hujus motus causas tantum spectant, aut quasdam circumstantias, in quibus solet liberior esse diffusio. Videamus tamen & ea breviter an, aliquod pondus habeant, quo nostram sententiam queant onerare.

Sanguinem asserunt singulis constrictionibus nec semiunciis, nec drachmis, nec scrupulis ex humano corde propelli, tribus de causis. Primo quod sanguis nimis spirituosus sit. Verum jam ostendimus minus eum esse spirituosum quam vulgo solent arbitrari. Secundo quod valvulæ cordis exiles tantum rimas agant, moxque iterum occludantur.

Quod

Fig. lxxxj.

Menstrua circa uterum quomodo colliguntur

Quomodo menstrua ex utero in caput feruntur

Quomodo menstrua in corpore nostro commode sunt condita, ut nobis sanis sit commodissimum, non ut nobis ægrotantibus

6. loc. aff. cap. 7. 4. aph. co. car. lib. 6. sect. 1. lib. 3. Aph. cap. 1. 12.

Objectiones aduersus eum cunctantur

Nihil impossibile quomodo sanguis humanus spirituosus sit

Quod experientia quoque non consentit. refecta enim arteria à corde magni fatis sanguinis radii è corde emittuntur. Tercio quod arteria nimis plenae sint quam, quae sanguinis queant femiunciam, drachmam aut scrupulum admittere. Verum id nimis inconsiderate est assertum; nam confringente se corde omnes totius corporis arteriae dilatantur, idque undique, ut non raro tactu deprehendi, dum nudatam arteriam digitis continerem. Quis jam dicat omnes totius corporis arterias dilatatas, praeter cum quem habuerunt sanguinem, insuper ejus scrupulum, drachmam, imo femiunciam non admittere?

Negant quoque in foetu è vena cava per vasa cordis unita sanguinem arteriam aortam intrare, indeque ex arteriis umbilicalibus ingredi venam umbilicalem & per eam ad cor remeare: quod insigne fecurum absurdum putent, unicam venam sanguinem maternum vehere, & simul tantum sanguinis quantum duae advexerant umbilicales arteriae. Quasi vero nunquam flumina uno alveo tantum aquae transmittant, quantum plura poterunt brachia advehere. Et hic vena umbilicalis ubi unica est multo major est arteria. Saepè unica tantum est arteria, aut geminae sunt venae; ut venis arteriae quam proximae respondeant. In Bruti, inquit Fallopius insignis Anatomicus, *gemmae semper sunt vena atque gemina arteria, quae usque ad umbilicum cum uracho perveniunt, venaeque statim antequam abdomen ingrediantur in unam coeunt, quae ad portas jejuni pergit, ut in ovis, capris ac vacis omnibus quorum factus secus observavi. Sin autem de humano factu loquuntur, assero me aliquando geminas arterias umbilicales non vidisse, sed unam tantum arteriam atque unicam venam, una cum uracho ad umbilicum ascendentes: ubi iterum arteria in duas scinditur, quae postea ad ossa sacri latera permittunt. Revera autem illam vasorum cordis unionem in foetu factam esse, ut illac sanguis è vena cava in aortam transeat, videntur nobis animalia aquatica Anas, Anser, aliaque docere; quae quod saepe sub aqua respirare & dilatare pulmonem nequeant, quare nec illac sanguinem admittere, eas vasorum cordis uniones adultae quoque habent. quod & notat Harvejus cap. 6.*

Negant quoque frequentes venarum arteriarumque anastomoses, alias è fluxione congestioneque tumores non orituros. Quasi vero flumina etiam offitium habeant, si plus aquae deferant, vicinos agros nequeant inundare; nec hic sanguis extravasatus, quod concrecat, potest facile in vasa redire. Fiunt praeterea tumores quod obstructione saepe ulteriori sanguini occludatur transitus; quodque calore doloreque in carnem trahatur.

Illi autem tumores huic sanguinis motui in orbem potius favere videntur, quod à frigore, conustione, omni quae viæ constrictione accidant, quodque aqua vitae similive medicamento saepe humor in tumoribus redditus fluxilior, hoc motu sanguinis in venas rapiatur; tumorque citius quam repulsiōe, revulsiōe, concoctione, dissipatiōe plane percurretur.

De Causa motus sanguinis aliunde quoque nobis difficultates obveniunt; & cum negaverimus ita subito vehementerque ex natura instituto rarefieri in corde sanguinem, qui movere cor, totius corporis sanguinem, & ipsas arterias possit; viri

magni hujus opinionis principes, eo se id probaturos arbitrantur, quod dum frigemus, omnes venae nostri corporis contrahantur & vix appareant, cum autem postea incalcescimus adeo turgescant, ut sanguis in iis contentus decuplo plus spatii quam prius occupare videatur.

Equidem ego ita existimo atque ita animum induco meum, cum tam sedulo jam aliquoties, hanc sanguinis rarefactionem persuadere publice sint conati; & vivorum animalium corda disseverint, inspexerint, nec ausi hactenus fuerint asserere eam se rarefactionem sanguinis in corde sensisse; eos revera talem sanguinis rarefactionem in corde animadvertere non potuisse, qualem hic volunt constituere: qualem revera non esse, ei qui parum vivorum sectioni affuetus est, videre per quam promptum fuerit. Quamobrem licet probari possit eam rarefactionem sanguinis quandoque praeter naturam contingere, non tamen causa motus secundum naturam cordis, sanguinis, arteriarumque in eam ideo deberet conferri.

Sed nec satis certum videtur in eo quod proponunt exemplo ob rarefactionem sanguinem decuplo plus spatii quam antea occupare. Etenim an non facile exurgere ille exteriorum venarum tumor possit, quod cum antea praefrigore confstrictae venae angustataeque forent, non multum recipere sanguinis possent, quare nec tumere: quo frigore postea, simul & constrictione sublata; laxataeque à calore venis, multum illas admittere sanguinis possent, qui in eas à corde pellitur, atque ita tumidae apparere. Hanc non minimam tumoris venarum causam esse videntur nos febricitantes docere, qui si brachia exponant frigori, haud ita tumescentes venas habent, sin vero stragulis arceant frigus valde tumidas, qui tumor si à rarefactione esset, utrobique propemodum esse equalis deberet, cum in his rarefactio sanguinis ab interna causa proficiscatur.

Nec id quoque esse indubitatum arbitramur, ubi frigemus primo, & postea incalcescimus, ut venas exteriores ita & interiores tumere. Ingens enim suspicio est, partes interiores minus quam antea caloris sanguinisque possidere, quod à quo antea non laedebantur frigore, ubi ita incalcescimus assumpto frigido potu mirum in modum debilitentur. Sane ut interiores venae saepe sanguinis penarium sunt in quo sanguis in futuros usus recondatur, ita & id penarium esse exteriores venae possunt, atque tum turgentes apparere.

Hi ipsi cum animadverterent quoque id illorum sententiae vehementer officere, quod in constrictione manifesto effundi sanguinem asserimus; non illam esse cordis constrictionem, sed esse dilatationem asserunt: nos vero specie quadam delusos esse, quod in nostra constrictione, in basi tantum constrictione sit, at circa mucronem vera dilatatio; quod commentum cum viderent alii subsistere non posse, ne & illi causam deferere viderentur, excogitarunt in cavitate quidem integri ventriculi constrictionem esse, sed in foveis meatibusque laterum, praesertim in canibus, esse extensionem quandam & veram dilatationem.

Sed certe non conspicitur superior pars cordis dilatari quando inferior confringitur; nisi ubi moriente animali, ab impulsu sanguinis motus cordis undosus existit. Nec alia dilatatio constrictione

Sed constrictione cordis supra stragulis in arteriis palle. Pag. lxxviii.

ctiove fovearum, alia cavitatis ventriculorum potest observari. At tantum progressivus quidam motus in majori corde animadvertitur quod dilatatio constrictiove evidenter à basi incipiat & sensim ad mucronem pergat, quamvis totus momento ferme peragatur. Et quo mihi plane constaret interius quoque cor undique constringi, præcisò utriusque ventriculi mucrone, vivo canis cuniculique cordi pollicem indicemque digitum inferui; sensique manifesto cordis latera digitos ad cordis septum æque in medio, mucrone, ac basi premere: foveas autem, ad sensum in majoribus animalibus, non majores sed minores fieri. Mox autem remittente constrictione latera cordis supra infra & in medio laxari, foveasque evidenter majores perferenti. In septo autem ipso nullus motus sentitur, nisi quod à spiritibus quaerentibus exitum quadam quasi palpitatio videatur. Vbi vero motus sinistri ventriculi in moribundis definit, septum dextri ventriculi motum sequitur.

Non in dilatatione, atamque quoadque in ea sanguis exeat.

In dilatatione tamen cordis, non in constrictione naturaliter effundi sanguinem volunt, quod in vivorum vulnerato corde in dilatatione exire sanguis conspiciatur. Et hoc quandoque verum est; sed quod inde colligunt sensus ipsi attestantur verum non esse. Vel enim canis aliudve animal capite thoraceque elevato, demisso ventre, constituitur, atque ita cordi infligitur vulnus: in eo jam, cum sanguis qui per venam cavam, arteriamque venosam cor intrat, altior quovis cordis vulnere sit, is simul ac intravit, quod in dilatationis initio est, non pulsù cordis, sed solummodo sua gravitate effluit, quare nec ulla vi ut in arteriarum contingit pulsù in distans propellitur. Sin vero, ut fieri æquum est, canis supinus, capite ventreeque in eodem collocetur plano, & vulneratum cor digitis erigatur, quamdiu cordi aliquod robur adest, sanguinem quem accepit citius constrictione in distans ejicit, quam cor totum repletum sit aut dilatatum. ubi vero cordis deficit robur, & nonnisi raro aut prorsus non se constringit, quia robustiores sunt auriculæ, & eo tempore etiamnum pulfant, quo cor plane defecit. sanguis ab auriculis propulsus intrat cor, accumulatur, & quando majori copia ingressus est quam quæ corde contineri queat, exit è vulnere; non impetu quodam ut ad pulsus efficiendum foret necesse, sed leni motu & stillando. Ut sensus nullum validum motum sanguinis nisi in cordis constrictione queat animadvertere.

Per venas autem sanguinem ad cor tantum volunt redire, quod impulsus ad partes sanguis, ut aqua cornu infusa, regurgitet sursum, atque ita ad cor referatur. verum jam indicia dedi aut trahi aut à singulis venarum partibus sanguinem propelli: præter quæ & hæc habeo; quod exempto è corpore corde, motus tamen sanguinis, isque satis celer in venis videatur. Et si vena ulla, etiam lactea, duobus locis ligetur, laxata ea sola ligatura quæ cordi propinquior est, dum partes adhuc calent, semper chylus ad hepar, sanguis ad cor movebitur: qui nec à corde per arterias, nec ab intestinis per lacteas, objecto potuit obice propelli: nec fluiditate sua potius sursum quam deorsum moveretur.

Sed absolvamus reliqua quæ priores obijciunt: putant si ita rapide sanguis moveretur, venas & arterias commodè non posse nutrir. At canis sitim sedare potest è Nilo bibens & fugiens; hic autem partes ad rivum morantur: & quicquid è sanguine traxere in suam substantiam recondunt, ne à transfluxu humoris eluatur.

Sanguini quoque non putant hunc motum plane utilem esse. Eum enim, quia calore nativo abundat, respiratione transpirationeque ventilatur, satis posse conservari. Amplius tamen eum ventilari certum est si celeriter moveatur, minimæque etiam ejus particulæ eo motu agitentur. ita Lacustris aqua etiam si moveatur leniter & superna parte flabellum admittat, corrumpitur tamen; interea dum undique agitata flumina manere saluberrima deprehenduntur.

Hæc ea sunt Præstantissime Bartholine, quæ prioribus adjicienda esse videbantur, quo satisfaceret illis qui novam recipere opinionem non possunt, in qua obscuritatis aliquid aut difficultatis observant: quibus sæpe nec animus nec tempus est penitus in eam exactiusque inquirendi. Verum meo judicio neganda non sunt manifesta, etiam si solvere non possemus quæ sunt difficilia.

De verbis autem cavillise cum nemine unquam libuit altercari. Plurima egregiaque sunt quibus illud impendi tempus possit; quod & sæpe non suppetit necessarius. Quarenti quoque derisoriam scientiam ipsa sese abscondit, sed studioso veritatis obviam venit & se præbet conspiciendam. Vale Doctissime Bartholine, ex Academia Batava Leydensi. Kalend. Decembris, c1515 cxi.

F I N I S.

I N D E X

I N

O P V S C V L A

tomo primo adjecta.

A primam, B columnam secundam notat.

A.



Actio in parte præcipuum, & cur, viij. a
 Anatomico quam necessaria consideratu, xij. b
 usum antecedit, *ibid.*
 quid ea, & quotuplex, *ibid.* & viij. b
 est *νεκρωσις*, & usus partium, & membrorum & *διωσις*, quæ usu prior, quæ posterior, ejus perfectio duo in parte requirit, xxvij. b
 Adeps Mesenterii, ejus generatio, ulus communis, in pennatis, viij. a
Αιμάτωσις Mesaraicarum, viij. a
 Albot partis nihil habet ad usum peculiare, xxvij. a, in fine.
 sequitur materiæ necessitatem, *ibid.*
 Alexander, xxxij. b, in fine.
 Alexander Tadinus, xij. a
Αιμάτωσις Mesaraicarum, viij. a
 quid differat à *Διγδδωσι*, xxxij. a
 Anatome quid, xvij. b
 quot in parte quaque consideret, *ibid.*
 Anatomicum oportet credere propriis oculis, xv. a
 Andreas Trevisius, xij. b
 Aneurisma circa jugulum, & quid in eo notatum, xlv. a
 Anguillæ cor pulsat sine auriculis, xlv. b
Ανελαισις quid? xij. b
 est Galeno verissima nutritio, *ibid.*
 Appositio, & agglutinatio Galeno quid? xxij. b
 Aquapendentis novum inventum, ejus rationes pro ventriculi è chilo nutritione nullæ, malè negat nil nutrire, nisi per omnia coctionum instrumenta provedum, xxxij. a
 Aquæ potiores edaces, xxvj. a
 Archangelus malè Gal. impugnat, vi. b
 notatus, vij. b. xxij. a. xxxij. b. xxxij. b
 refutatus, xvij. b. xvj. a
 Aretæus, xxxij. b, in fine.
 Aristoteles declaratus, xij. b. xvj. b.
 xvij. b. xxij. b
 ejus error, viij. a. x. a
 quantum sensibus tribuat, xv. a
 novit alia vasa chilo deberi, alia sanguini, xv. b
 venas perquiri jubet in strangulatis, xvij. b
 Galeno *αυδωσις*, xvij. b
 quid sentiat de officio lienis, xxxij. b
 de venarum numero & origine, xxxij. a
 Aristotelicorum de officio Lienis opinio, xxxij. b
Αρτηρια Mesenterii Galeno quid? v. a
 Arteria aorta ad cor ligata & jugulari incisa, arteriæ inanuntur, venis repletis, liij. b

secta cur sanguis cum impetu exeat,

xliij. b
 venosa cur vena veteribus, li. b
 Arteriæ dilatantur corde contracto, xliij. b
 in cadaveribus cur parum, venæ multum sanguinis habeant, liij. b
 sanguinem deferunt à corde, liij. b
 Veteribus venæ vocatæ, xlv. a
 Arteriarum Mesaraicarum nomen, situs, magnitudo, numerus, origo, insertio in intestina, cur *εγέρται* Erastistrato, viij. a
 earum progressus, principium obcurius quam venarum, & cur. actio & usus, viij. b
 cur tam multe in intestinis, viij. b. x. b
 de iis Erastirati error, *ibid.*
 cur iis contigui nervi, x. b. xj. b
 an chyli aliquid in se alliciant, viij. b
 non comportant chylum ad cor & venas, x. a
 non respondent arteriis umbilicalibus, x. b
 per fibras transmittunt, xxvij. a
 Arteriarum pulsus est ab impulso sanguine, xliij. b
 Atrophia à scirrhus glandularum Mesenterii, vj. b. xxxv. a
 Auditor Isagoges, viij. b
 Finit. Medicarum, xxv. a
 Lib. de uf. respir. laudatus, xxv. a
 explicatus, vj. a
 refutatus, viij. b, in fine. xxxij. b
 Lib. de Anatome vivorum notat. viij. b
 Lib. de compag. membr. viij. b
 Avenroes, xxvij. a. xxxij. b
 refutatus, xxij. b
 Avicenna notatus, v. b. vij. b
 laudatus, xxij. b
 Auriculæ ante cor vivunt & post moriuntur, xlvj. a
 cur in fœtu majores, lxiii. a, b
 in ovo unde fiant, xlvj. a
 sunt promptuarium sanguinis. xlv. b
 Auricularum cordis varia constitutio, lxij. a
 motus qualis, xlv. a
ibid.
 cordis motum præcedit, *ibid.*
 Auriculas habent aut quid iis analogum quæcumque cor, xlvj. b
 Auriculis moveri cessantibus manet in sanguine motus & qualis, lxvj. a

B.

Babinius notatus, vij. b
 excusatus, *ibid.*
 Benedictus, xvj. a
 Bilis affluentia nihil facit ad jejuni inanitatem, xx. b
 bilis in jejunium vacuatio quomodo fiat contra Fallopium, & Archangelum, xxj. a
 Bolus, seu buccæ dulcis, xxx. b

C.

CAlor an instrumentum tractus, xxvj. a
 quomodo attrahat, lv. a
 Canum Mesenterium, v. b, in fine.
 Capivaccius notatus, xvij. b
 Caro innominata, xvij. b, in fine.
 Carolus Stephanus, xij. a, b. xvj. a
 Carpus, vij. a. xliij. a. xxv. b. xxxij. a.
 xxxij. b
 Cava ab aorta munere & usu distinguitur, li. b
 Celsus laudatus, xij. a
 ejus venæ albæ, xij. b
 Cerebrum frigidum Metropolis, plurimis venis scatet, xxvj. a
 non semper ventriculos habet, lxij. b
 Chyli motus cur inquirendus, lxvj. b
 Chylus roris tenuissimi instar rapitur in Mesaraicas, xvij. a
 quadruplici motu ab intestinis ad hepæ promovetur, xxxij. b
 an sanguine crassior? xxv. b
 ex vasis suis excidens alio quam in hepæ corrumpitur, xxvij. b
 nihil ejus à ventriculo ad hepæ concedit, xxxij. b
 Chyli motus per venas lacteas facile observatur, lxvj. b
 quomodo fiat, lxvij. b
 Cibus assumtus primum locum in ventriculo occupat, lxvj. b
 eum quomodo ventriculus concoquat, lxvij. a
 quomodo coctus distribuatur, lxvij. b
 & ad quas partes, lxvij. a
 Cicero notatus, xij. b. xj. b
 explicatus, xj. a. in fine. xv. b, in fine.
 correctus, xij. a
 laudatus, xij. b. xij. a. xvij. a. xxvij. a
 Cæci ductus in corpore nostro, x. a, in fine.
 Columbus notatus, vij. b, in fine. xliij. a, b
 ejus valvulæ in Mesaraicis, viij. a
 defensus contra Archangelum, xvij. b
 Constantius Varolius, V. Varolius.
 Contagium cur parte contacta illæsa totum habitum inficiat, lxvij. b
 Continuitas venis quid præstat, xxvij. b
 in fine.
 Costæus laudatus, xij. a. xvj. a
 improbat, xxv. b
 Cor columbæ moribundum saliba refuscitatum, xlv. b
 contrahitur undique sed magis secundum latera, xliij. b
 contractum duriusculum fit, xliij. b
 pectus ferit, *ibid.*
 sanguinem protrudit coarctatione ventriculorum, xliij. a. lxvj. b
 non vero attrahit, *ibid.*
 exsanguium lentissime pulsat, xlvj. a
 in frigidioribus, cum movetur, albidius fit, cum quiescit rubicundius, xliij. a. liij. b
 moveri & quiescere per vices unde patet,

I N D E X

pateat, xliij.b
 officina sanguinis, lx.b
 quomodo non lardatur, ex trantieu
 noxi humoris, lxxxij.b
 omnia animalia habent, xlvj.a
 quare confringatur, lxxvij.b
 sol microcosmi, ibid.b
 solum pars princeps, lxij.b
 vitæ & caloris font, lvij.b
 Cor cochlearum qui reperitur, xlvj.a
 Corde nullum animal sanguineum caret, lxj.a
 pulsare cessante totus sanguis nequit
 exhauriri, liij.a
 Cordis fibræ omnis generis sunt, lxlij.a
 variaz intertextæ, xxvij. a. in fine.
 rectæ ab Arist. nervi vocantur, xliij.b
 & cur, lxj.b
 motui non convenit exemplum Vela-
 li de vimineo circulo, xlvij.a
 motum quæ simul ordine consequan-
 tur, ibid.
 motus proprius systole, xlvj.a
 qualis ex vivorum dissectione, xlvj.b
 quomodo fiat, xliij.a
 tensio quædam est, xlvj.a
 deglutitio quædam est, lxj.a
 valvularum usus, xlvj.a
 Cor in actu ociofum est, x.b
 minime ociofum est, xlvij.b
 Crusta intestina oblines, xxx.b
 Culina corporis imus venter, xxx.a
 Cuneus non intellexit Gal, vij.b

D.

D Alebampii in Plinio error, xliij.b
 Deglutitio quomodo fiat, xlvj.a
 Diædolis Mesaraicarum, vij.b
 Distributio actio composita ex tractu, &
 pulsu, xliij.a. in fine.
 Disciplinarum inter se nexus, xxvij.a
 Dolor quomodo attrahat, lv.a
 Aoxvofiq. quidam obiter perstrictus, xlv.a
 Dulcis bolus seu dulcis buccæ, xxx.b
 Duricies fibrarum cui usui, xxvij.a

E.

E Leufinia sacra, xxxj.a
 in Embryone constitutio valorum
 cordis quæ, xlvij.b
 jecoris usus cur nullus, lx.a
 pulmones otiantur, xlix.a
 ventriculi duo quasi unus sunt, ibid.
 Epicurus, xxxj.b
 non est primus auctor vocis *επιστολή*,
 xlvj.b
 tractus causam quam statuat, xxliij.b
 Erasistrati error de arteriis Mesaraicis,
 x.b
 de alimenti digestionem, xxliij.b
 cur *εσώτρες* appellat arterias Mesarai-
 cas, viij.a
 incidit homines vivos, xj.a
 in fine vidit lacteas venas, sed non a-
 gnovit, xvj.b
 Exsanguia hieme nihil, quod pulset, ha-
 bent, xlvj.b
 Exsanguium cor lentissime pulsant, ibid.a

F.

F Ames cur statim à cibo cesset, xxliij.b
 in fine.
 an succus ejus causæ, xxxliij.b

Fallopius laudatus, vj.a. xj.a
 malè Galenum impugnat, vj.b
 refutatus, xvij. a. xxj. a. xxvij. a.
 xxx.b
 Febres intermittentes an à Lacteis affe-
 ctis, xxxv.b
 Febres quare certis temporibus redeant
 aut exacerbentur, lxxv.b
 Fernelius, xxxj.b
 reprehensus, xj.b. xxvj.b
 Fibræ in sanguine animalium, partes si-
 milares è semine, xlvij.b
 in fine quæ triplicis generis, ibid.
 rectæ trahunt, transveris pellunt,
 xxvij. a. b
 eas malè negat venis Vesalii, malè ad
 solum *diversas* datas affirmat
 Fallopius, earum beneficio om-
 nia instrumenta naturalia movent,
 xxvij.a
 carnosæ solæ cum manifesto motu tra-
 hunt & pellunt, ibid.
 Fissum jecoris, xxxij.b
 Focius laudatus, iij. b. in fine.
 Foramen ovale in vena cava ubi & quan-
 do reperitur, xlvij.a
 Frigida omnia an pauco egeant alimen-
 to, xxv. b. in fine.
 Frigidus ventriculus plurimum appetit
 cibi, xxvj.a
 Fuchsius improbat, xvij.a

G.

G Alenus notatus, v. a. vij. b. xj. a.
 xxliij. a. xxv. a. xxvj. b.
 excusatus, vij.a
 correctus, v.a
 explicatus, à contradictione vindica-
 tus, vij. a. x. a. xvij. a. xxj. b. xxliij. b.
 xxvj. b
 defensu à calumnia Vesalii, &c. vij. a
 laudatus, viij. a
 perperam citatus, vij. b
 quantum sensibus tribuat, xv.a
 indiligens fuit in perquirendis vasis
 chyli, xvij.a
 frigide disputat contra Erasistratum,
 ibid.
 venam omnem statuit dissimilem, xvij.a
 malè Mesaraicas vulgares radicibus
 comparat, & fugere dicit, vij.b
 ejus inconstancia in explicanda nutri-
 tione ventriculi, & intestinorum in-
 excusabilis, xxij. a. & seqq.
 aut peccat, aut valde populariter lo-
 quitur de speciebus tractus, xxliij. b
 in fine.
 non rectè sensit de præparatione chyli
 in Mesaraicis, xxvij. a. & seqq.
 ejus librorum de usu partium duo
 summa capita, xxvij. a. in fine.
 non sibi constat de vi venarum *αἰσθη-
 τικῶν*, xxxj. a. in fine.
 ejus sententia de lienis officio sola ve-
 ra, xxxij. a
 vix explicat cur nulla in hepate cavi-
 tas, xxxliij. b
 iij. b
 Gaza, xliij. a. b
 temerè à Plinio discedit, xliij. a. b
 Glandulæ Mesenterii duplices, utrarum-
 que usus, proportio cum vasis, vj. a
 an foveant calorem vasorum, an ab-
 sorbeant humiditatem intestinor-
 um, impediunt ne confringantur
 vasorum ductus, patiuntur scir-

rhum, vj.b
 coenosiorem chyli partem absorbeant,
 xxx.b
 Glossæ veteres, xliij. b. in fine.

H.

Hæmorrhagia, à timore cur sede-
 tur, liij.a
 Hepatis vicinia nihil facit ad jejuni ina-
 nitatem, xx.b
 Hepatis *αἰσθητῶν*, xxxliij. a
 cur in eo nulla, ut in corde cavitas,
 xxxliij. b
 Hermolaus Barbarus, xliij. a. b
 Herophilus explicatus, vij. a
 ejus laus, xvj. a
 Helychius, iij. b
 Hippocrates explicatus, v. a. vij. b. x. a.
 xxij. b. xxv. a.
 vult Mesaraicas trahere à ventriculo,
 vult fieri per eadem anadofin, &
 diadofin diversis temporibus, vij. b
 tribuit alia vasa chylo, alia sangui-
 ni, xv. b
 lienem hepati dat vicarium, xxxliij. b
 de vena portæ, xxxliij. a
 Historici in Anatome primus locus de-
 betur, xvij. b
 explicat naturam membri, ibid.
 Hominem incidere nefas, xij. a
 est veterum quidam fecere, ibid.
 Horatius, xvij. b
 explicatus, xliij. b. xxvj. a

I.

I Acobus de Partibus notatus, vij. b
 in fine. xxxj. a
 laudatus, xxliij. b. xxxliij. b
 Iecur in fetu oriatur, lx. a
 & posterus gignitur, ibid.
 Intestinum duodenum correctum, vij. a
 Intestinum jejunum cur semper inane,
 xx. b
 ejus vulnera cur lethalia, vij. b
 Intestinorum crusta, xxj. a
 eorum & lumborum sympathia, v. a
 an alantur chylo, xxj. b. & seqq.
 cur multo alimento egeant, xxvj. a
 per ea totum expurgatur, ibid.
 gracilia veteribus Lactes dicta, xliij. b
 & cur, xliij. b

Iohan. Costæus V. Costæus.
 Ioubertus notatus, xvij. a
 Iuvenalis, xxxj. a. in fine.

K.

K *καθυστάσεις* qui, xxxliij. b
 cur tam cito reddant per urinas
 quæ bibere, ibid.

L.

L Actes, seu Lactæ venæ quartum, &
 ignotum adhuc vasorum Mesarai-
 corum genus, xj. a
 an verè dentur? xliij. b
 an novum inventum? xv. a
 quando inventæ, & quomodo, xj. b.
 xli. a
 in quibus brutis clarissimæ, in quibus
 minus, xli. b
 quot de iis explicanda, xj. b
 prænoscentia, xli. a
 cur his nominibus appellatæ, xliij. b.
 xliij. b
 Lactium

I N D E X.

Lactium variae significationes apud veteres, xij. b
 apud recentiores, xiiij. a
 cur latuerint veteribus, xv. b
 cur tam cito exoleant in animalibus mortuis, xvij. a
 vivis cum secantur, *ibid.*
 an jungantur arteriis per poros, xx. a
 per anastomoses, *ibid.*
 earum etymon, xiiij. a
 substantia, xvij. a
 sunt de genere venarum, sunt partes dissimilares, *ibid.*
 temperies, xviii. a
 temperiem consequentia, albor, tenuitas, &c., *ibid.*
 conformatio in figura, levitate, asperitate, cavis, meatibus, *ibid.*
 valvulae, *ibid.*
 magnitudo, numerus, positio, xviii. b
 gyri, & plicae in Pancreate, xxi. a
 communio cum aliis partibus, quoad originem, finem, & insertionem in intestina, xx. a
 progressum ad hepar, *ibid.*
 à Pancreate an ab hepate oriatur? xx. a
 sui generis venae sunt, an portae rami? ad ventriculum non pertinent, xxiiij. a. xxi. b
 neque ad Lienem, xx. b. xxiiij. a. xxix. b
 earundem actiones, communis, quae nutritio, xxi. b. in fine. & seqq.
 non aluntur chylo, xxi. b
 propria quae est *αὐτοδύναμη*, i. distributio chyli ad hepar, xxv. b
 sentus, *ibid.*
 usus, quos praebent distribuendo chylo, singulae, earum partes, xxv. b
 fibrae, xxviij. a
 caro, *ibid.*
 membranae, *ibid.*
 temperies, *ibid.*
 temperiem consequentia tenuitas, raritas, xxvii. a
 quae accidunt: figura, levitas, & asperitas, cava & meatus, xxviiij. a. & b
 valvulae, angustia, continuas, multitudo, & parvas, situs, *ibid.* & seqq.
 insertionis modus, crassa intestina obliens quid iis praestet, item adipis in Mesenterio copia, glandulae, xxx. a. & b
 usus quos praebet earum cognitio Medicis, & Philosophis, xxx. b
 physiologici, xxxj. a. & seqq.
 pathologici, & Therapeutici, xxxiiij. b
 Lactibus nulla cum venis hepatis ceteris communio, xxxiiij. a
 desinunt in hepatis carnem, *ibid.*
 sunt verè venae portae, xxxiiij. a
 complura novorum morborum genera aperiunt, xxxv. a
 sunt in causa chylosi fluxus, item atrophiae totius, fortè etiam quarundam febrium intermitentium, & melanch. Hypochondriacae, *ibid.*
 Laurentius notatus, vij. b. viij. b. in fine. xxv. b. xxxiiij. b
 ejus rationes contra chylo proprias venas nullae, xxv. b
 Leon. Botallus chyla transitum sanguinis è cava in sinistram ventriculum quomodo falsus, xliij. b
 Levitas in parte materiae comitatur, xxviij. a

Lienis officium, xxxij. a
 Ligatura cur attrahat, liij. a
 quomodo attrahat, lv. a
 quortuplex, liij. a
 Lipothymia à sanguinis missione quam causam habeat, lv. a
 cur fluentem sanguinem sistat, lvj. a
 Lucretius, xxiij. b
 Ludovici Septalii vera laus, xij. b
 Lumborum, & intestinorum sympathia, v. a
 Lupi Lampridio, & Suetonio qui, xliij. a
 Luporum lactes, *ibid.*

M.

Macrobius notatus, iij. b
 Manus actionem suam obeunt per conformationem, xxviii. a. & seqq.
 Massae error de venis duodeni, vij. b
 de nutritione ventris & intestinorum, xxi. a
 Meatus Fallopii in glandulas, & Pancreas, xxx. b
 Medicamenta foris applicata quomodo intus vires exerant, lx. a
 Melancholia hypochondriaca an à Laetis affectis? xxxv. b
 Membri naturae cognitio in quibus posita, xvij. b
 Membranae Mesenterii cur duae, & ut duae sectione deprehendantur, v. b. & seqq.
 Menstrua circa uterum quomodo colligantur, lxxxiij. b
 quomodo ex utero in caput ferantur, *ibid.*
 Mercatus, xv. a
 ejus commentum circa venarum *αἱματικὴν*, xxxij. b
 de fibris carnis venarum, *ibid.*
Μεσεντερίου, iij. b
 Melaraicae, V. Venae Melaraicae.
 Mesenterium, ejus nomina, figura, situs, origo, iij. b. & seqq.
 connexus, magnitudo, numerus, v. a
 compositio, partes propriae, v. b. & seqq.
 non propriae, vij. b. & seqq.
 usus, v. b. & seqq.
 est Gal. triplex, v. a. b
 omento simile, *ibid.*
 item tenui cerebri menyngei, iij. b
Μεσεντερίας, v. a
 Mors quid, lvij. b
 ejus genera, extinctio & suffocatio, liij. b
 Murzarum lactes, xliij. a
 Mustum qua se vi in dolio ad vini perfectionem promoveat, xxxij. b

N.

Natura una non nisi ad unum utitur, xxxj. b
 ejusdem *σφίγμα* seu *μυχοδύναμη* administrandum, xxiij. a
 Nervi qui Hippocrati, & veteribus, v. a
 Nervorum Melaraicorum numerus, situs, magnitudo, x. b
 progressus, insertio, principium eorum, divisionis, originis, usus ratione, intestinorum: lumborum arteriis cur contigui, xj. a. & seqq.
 de eorum magnitudine error recentiorum, xv. b

Nominis notio quam necessaria, rei nominis titium parit, xij. b. & seqq.
 Nomina nova novis rebus quot modis ponantur, xxiij. a
 Nutritum verè, & non verè, xxiij. a
 Nutritio imperfecta, & secundaria Massae, & Archangeli explosa, xxiij. a
 Nutritio vera, & perfecta quid Gale- no, xxiij. b
 Nutrit nihil nisi quod provectum per omnia nutritionis instrumenta, xxiij. b

O.

ὅ ἐστι, principium scientiae, xiiij. a
 totum potestate, *ibid.*
 Objectiones contra Lactes chyli distributrices remotae, xxv. a. & seqq.
 Ovo gutta palpitans ante omnia inest, xlvj. a

P.

Pancreas insignis glandula, vj. b. xx. b
 cur Melaraicis vasibus substratum, viij. a. xxi. a
Παγκρεας & *μακρογαστρον*, xxi. a
 videri originem lacteum, xx. a
 Paræus notatus, vij. a. xj. a. xv. a
 Pars similis Galeno & Aristoteli quid? xxiij. a
 in parte quot spectanda, xvij. b
 ejus natura quibus constat, *ibid.*
 Pars dissimilis dupliciter dicitur, xvij. b
 ad partis integritatem eorum, quae accidunt necessitas, xxviij. a
 Partium organi actionem edentis quadruplex varietas, xxviij. a
 in parte ad perfectam actionem edendam quot requirantur, *ibid.*
 Perflus explicatus, xiiij. b. in fine.
 Pellentium duplex genus, xxiij. b
 Pituita qua vi in sanguinem in venis cessat, xxxij. b
 in Piscium marium ventriculis succus, Lactes veteribus, xliij. a
 Plant-animalia cor non habent & cur. lxj. a
 Plato, xliij. a
 tribuit alia vasa chylo, alia sanguini, xv. b
 lienem vicarium dat hepati, xxxij. b
 Plautus explicatus, xiiij. b. in fine.
 Plinii vulgata lectio defensa, xxiij. b
 Plicae Mesenterii cui usui, v. a
 Pollux, xvj. a
 Pomponius explicatus, xiiij. b
 Praenoscenda de lactibus, xxi. a
 Praenotio de subjecto in duobus consistit, xliij. a
 Preparare non est conferre aliquid futurae formae, xxxv. b
 Probi locus explicatus ex Hippocrate, xliij. a
Πρόβιον Aristoteli quid, xj. a
 ejus necessitas, xij. b. & seqq.
Πρόβιον quid, xj. b
 non est vox Epicuro propria, *ibid.*
 Pulli rudimentum primum quale, xlvj. b
 Pulmones plurimo sanguine in vivis circumfluunt, xviij. a
 vasa ampla cur habeant, xliij. b
 Pulsatione non opus ad retinendum, lxij. b
 Pul-

I N D E X.

Pulsus arteriarum quid, xlvij.a. xlix.a.
circa ejus naturam inquirendam cur
erretur, *ibid.*
per initia statim cordis adest, xlvij.b.
laetearum, & ejus causæ principes,
instrumentales, xxxij.b. & seq.
Puteus non intellexit Galenum, vij.b.

Q.

Q^{uestio} de officio Mesaraicarum
gravissima, xxxj.a.
ejus difficultas, b.
sententiarum in ea varietas: quæ
omnes falsæ, & absurdæ plurimæ
urguntur, *ibid.* & seq.
Q^{uestio} de lienis officio, xxxij.a.
& seq.
Q^{uestio} de venarum vi *aliquid* in
ea Galeni inconstancia, xxxij.a.
recentiorum digladiationes, vera sen-
tentia negans, b.
Q^{uestio} de *aliquid* Hepatis, de ea
quatuor sententiæ rejectæ, xxxij.a.
Quintilianus, xij.a.
Quirinus Cnoglerus, xij.b.

R.

R^{adices} non sunt principium arbo-
ris, vij.a.
Ranæ ventriculum unum in corde ha-
bent & pro auricula vesicam, xlv.b.
Renibus cur amplissimæ venæ, xxvj.a.
Rhatius rejectus, xij.b.
explicatus, xvj.a.
Riolanus notatus, vj.a. vij.b.
Ruffus Ephesius, iij.b.

S.

S^{acra} Samothracia, xxxj.a.
Salomon Albertus notatus, vij.a.
Sanguinem non moveri sursum & deor-
sum in vasis, sed à parte una in aliam,
lxvij.b.
transcolari per pulmones cur volue-
rit natura, xlix.a.
quomodo probetur, xlix.b. l.a.
transire ab arteriis in venas veteribus
notum, lxx.a.
quomodo probetur, *ibid.* b.
non venire è majoribus venis in mi-
niores, lxxj.b.
sed è minoribus in majores, lxxj.a.
pellitur ex arteriis majoribus in mi-
niores, lxxvij.b.
Sanguinis motus circularis è quibus con-
stat, l.j. l.j. l.vij.b.
qualis sit, l.j.a. lxxv.a. lxxvj.a.
quomodo in fœtu fiat, lxxij.b. lxxvj.a.
per quas vias fiat, liij.b. lvj. lxxij.a.
portio una non eadem semper via va-
dit, lxxvj.b.
responsio ad contraria argumenta,
liij.a. b. lxxij.b. lxxij. & seq.
quam causam habeat, lxxvj. b. & seq.
lxxvj.b.
quos usus & in quibus habeat, lx.b.
lxxvj.a. b.
veteribus cognitus, lxxij.b.
pulsio à corde fit, lxxvij.a.
saltus in vulnere unde, xliij.b.
transmissi in circulatione per cor
quanta copia, l.j. b. lvj.a. lxxij.a.
lxxij.b.

quantitas in ove, liij.a.
Sanguis per quas vias è dextro cordis fi-
nu in sinistram corrivetur, x.b. lxxvij.a.
Sanguis qui alat, qui non, xxij.b.
qui Aristot. ultimum alimentum, *ibid.*
Sanguis in Mesaraicis niger, & crassus,
xxxj.b.
Sanguis in jecore ubi fiat, & quomodo,
xxxij.a.
Sanguis in ventriculos auricularum pul-
su immittitur, xlv.b.
in auriculam à cava impellitur, lxxvij.a.
ab arteria non semper cum saltu, sed
cum vi exit, lxxij.a.
an sua sponte palpitet, xlvj.b.
omnis unius generis est, lxxvj.b.
quibus viis è vena cava in arterias fe-
ratur, xlvij.b. lxxvij.a. b.
quis moveatur, lxxvj.a.
& quis non in orbem, lxxvj.a.
ubi fiat, lxxvij.a.
venolus ab arterioso cur differat,
lxxvij.a.
Saturari quid Galeno, xxij.b.
Scaliger F. præter solum errat, xij.b.
Scaliger pater admirabilissimus, xij.b.
Scirbus glandularum Mesenterii, vj.b.
xxxv.a.
Senator Septalius, xij.a. b.
Sensuum veritas, & evidentia, xv.a.
spiritus palpitando exit, xlvj.a.
vitalis cum sanguine movetur, lxxvj.b.
Spiritu animalium motus per nervos
inobseruabilis, lxxvj.b.
Stoici tribuerunt alia vasa chylo, alia
sanguini, xv.b.
Suetonius explicatus, xliij.a.
Sylvius laudatus, iij.b.
notatus, xvij.a.

T.

T^{abes} quomodo ab animi affectibus
fiat, lvij.a.
Temperies quid? xxvij.b.
per eam magna ex parte quodvis or-
ganum suam operationem nanci-
scitur: est illa, qua pars quælibet
familiaria alit, retinet, coquit,
ibid.
Temperiem quæ consequantur, xxvij.b.
Tertiana cur in accessione anhelosus fa-
ciat, lvij.b.
Tertullianus, xvj.a.
Theophilus Protospatharius, iij.b. xvj.a.
Titinius explicatus, xij.b.
Tractus lactearum qualis, & ejus causæ
principes, instrumentales, xxv.a.
Tractus Galeno duplex, xxij.b.
Tractus successione ad vacuum nullus,
ibid.
Tractus instrumentum, an calor? *ibid.*
Tractum qui fit parte non mota non esse
tractum, falsum, xxvij.a.
Trabentium duplex genus, xliij.b.
Tubercula inflammatoria unde pul-
sent, lv.a.
Tumor ex contusione unde, lv.b.

V.

V^{alvæ} venarum Mesaraicarum,
xlvij.b.
Valvularum cordis quis usus,
in venis situs & usus, lvj.b.

Varolius refutatus, x.a. & seq. xxxij.b.
Vasæus, xvj.a.
Vasa alia chylo debent, alia sanguini non
ignorantur veteres, xv.b.
quæ tamen essent ignorarunt, xvj.a.
Vasa Mesenterii non sunt de ejus sub-
stantia, v.b.
sunt vulgo triplicia, vj.b.
principium eorum divisionis, vij.a.
eorum genus novum, & quartum,
xj.a. v. lactes, xliij.b.
Vena notatus, xliij.b.
Vena varia significata, xliij.b.
etymon apud Latinos, Græcos, *ibid.*
Venas veteres, quas hodie arterias, ap-
pellant, xlv.a.
Vena arteriosa cur vena dicta & facta,
lj. b. lxxij.a.
pulsat contracto dextro cordis ven-
triculo, xliij.b.
Vena magna, maxima, Gal. quæ, vij.a.
Venæ non trajicientes ad hepar Hero-
phili & Galeni, vij.a.
Venarum judicium eget sensu, non de-
monstratione, xv.a.
Venam componentes partes: membra-
næ, fibræ, xvij.b.
caro, *ibid.*
Venæ non sentiunt per se, xxvj.b.
Venæ extra jecur non sanguificant,
xxxij.a.
Venarum numerus non rectè adhuc con-
stitutus, xxxij.a.
Venæ quibus nulla cum corde societas,
ibid.
Venæ sanguinem ferunt ad cor, liij.b.
Vena secunda unde tumeat, lxxij.a.
lxxij.a.
Venarum in hepate anastomoses,
xxxij.b.
Vena portæ vulgò vix verè portæ vena,
ejus nomen non à primo Hippocrate,
xxxij.a.
Venæ hermaphroditæ, & androgynæ
Zerbi, & Carpi, xxxij.a.
Vena Lactea Arabum, xliij.b. xvj.a.
Venæ albæ, seu Lactææ, v. Lactes,
Venæ Mesaraicæ vulgatæ sive rubræ,
earum origo, cum hepate sympathia,
vij.a.
infectio in intestina, modus infectio-
nis, vij.b.
progressus, principium, vij.a.
actio vulgò triplex, sed malè, cur
Galeno radices, cur manus he-
patis, cur comparatæ bajulis, vij.a.
& seq.
non oriuntur ab intestinis, nulla ea-
rum à cava, vij.a.
non sunt radices, nullo modo surgunt
ab intestinis, vij.b.
habent suas valvulas, vij.a. & xvij.b.
nullæ perveniunt ad solum ventricu-
lum, vij.b.
non distribunt chylum ad hepar. non
sanguificant, vij.b.
vehunt solum sanguinem, xxxj.a.
& seq.
cur tam multæ ad intestina, xxv.b.
faciunt ad expurgationem totius. non
deferunt ad intestina spiritum vi-
talem, vij.b.
Venæ sectio infra ligaturam cur facien-
da, lv.b.
in Venæ sectione cur laxetur ligatura,
lxxij.a.
Vena.

I N D E X.

Ventriculo sinistro moveri cessante cessant arteriæ, xliij.b	Veteres ante Galenum Medici excusati, xvj.b. & seq.	Vfus partis propriè quid, xxvij.b
Ventriculus dexter sinistri gratia factus, lxj.b	Vinum cur tam celeriter reficiat prostratas vires, xxxij.b	Vfus, & actio partis quo differant, ibid.
Ventriculus non alitur chylo, xxxj.b	Vita à nutritione quid differat, xxxij.a	Vfus qui actione prior, qui non, ibid.
an ignobilior carne, xxxij.b	à palpitatione incipit, xlvj. a. lxij. a.	Vfus omnis partis duplex; unus quæ pars est, alter quæ cognita est: uterque quo judicetur, xxvij.a
quomodo sibi laboret, quomodo aliis partibus, xxxiiij.a	Vnio venæ cavæ cum arteria venosa, itemque aortæ & venæ arteriosæ ubi & quando fiat, xlvij.a.b	posteriorum quanta dignitas, xxvij.b
ex eo trahunt Mesaraicæ Hippocrati & Galeno, viij.b	quomodo obliteretur, ibid. a	Vulnere ex canis rabidi morsu cur su- perveniat curato febris, lviiij.b
sed malè. cum nihil ex eo chyli su- gatur, xxxiiij.b	sæpe permanet tota vita, & in qui- bus, ibid. b	Z.
Vesalius notatus, vij. a. xj. a	pulmonum gratia neutiquam facta, ibid. b	Zerbus notatus, vij. b. in fine, xxxij. a
malè negat fibras in venis, xxvij. a	Voluptari quid, ibid.	
Vesicula pulsans principium fetus, lxij. a		

F I N I S.




A D R I A N I
S P I G E L I I

B R V X E L L E N S I S

O P E R V M

Quæ extant omnium

T O M V S I I.



A M S T E R D A M I,
Apud IOHANNEM BLAEV,
C I O I O C X L V.

ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS

D E

SEMITERTIANA

Libri Quatuor.

THE END

ADRIANVS SPIGELIVS
LECTORI S. P.



RTSI mihi in Patavino Gymnasio duplex onus, Anatomem scilicet & Chirurgiam docendi impositum esse sciam; atque jam in hoc me pluribus annis ita exercuerim, ut (si standum est amicorum judicio) jam tempus esse videretur scriptis publicis aliquod signum profectus meorum studiorum Reipub. Litterariæ ostendere: tamen longe alia mihi mens fuit cum hos de Semitertiana libros exordirer, & nunc ante alios, quos de Anatomicis & Chirurgicis rebus sum exorsus pertexerem. Nam cum de his multa à Veteribus ac recentioribus exarata esse, atque adhuc indies exarari conspiciam, de ista vero febre nil aliud hæcenus sit conscriptum, quod juniorum Medicorum mentem ad ejus paulo meliorem quam tradita est, notitiam & curationem posset illustrare; operæpretium me facturum putavi, si à studiis Anatomicis & Chirurgicis diverterem, & hos quatuor de Semitertiana libros prius publicarem. Scio hoc opus esse, quod potius eos, qui in Gymnasiis jam diu Practicam vocatam Medicinæ partem profitentur, conscribere deceret. Sed quoniam omnes ubique nil aliud suis auditoribus de hac febre prælegant, atque hæcenus prælegerint, quam eam ex tertiana intermittente, & quotidiana continua, vel tertiana continua, & quotidiana intermittente conflata esse; & ideo causas, signa, curationem utriusque febris simplicis in ea misceri, non potui manum à calamo continere, quin ego quid de hujus febris natura, ac curatione sentiam, pluribus observationibus edoctus eos commonefacerem: certo sic sperans, me aliquem ex tot, tantisque viris cui publica salus, ac valetudo curæ, ac cordi est, ad hæc meas animadversiones curiose perlegendas, & opiniones diligenter examinandas, aliasque meliores edendas pro publico bono stimulatorum.

Non est vero quod quis suspicetur hanc febrem novam esse, aut usque adeo raram, ut in sexcentis febricitantibus vix conspiciatur; vel inauditam, cum fortassis nomen Semitertianæ ad aures ejus nondum venerit; aut pro levi aliquo malo habendam esse. Nam Hippocrates & Galenus in suis libris hujus mentionem fecerunt. Ejus quoque meminere P. Ægineta, Aëtius, Alexander Trallianus, Arabum princeps Avicenna, & nonnulli recentiorum, qui seculo novissimo barbari dicebantur. Agathini libri, qui de hac febre Galeno adhuc vivente extabant temporis injuria perierunt. Galenus ipse hanc Romæ frequentem fuisse commemorat, & in eo Mauritanæ tractu, qui est prope littus Mediterranei Maris. Frequens etiam nunc iisdem locis, & in Germania, Pannonia, finitimisque regionibus. Sed, bone Deus, quænam est civitas, quod oppidum, quis ager, quæ regio terræ continentis Serenissimi Senatus Venetiarum

tiarum Dominio subiectæ, quæ nunc ultra decennium quasi patriam hanc febrem non sentiat? Si isti Senatores, qui ob res domi forisque præclare gestas in hac Vrbe maxime cari fuerunt, reviviscerent, & hæc mea scripta legere possent atque intelligere, profecto magna eorum pars jurejurando affirmaret, se non alio morbo ex hac vita sublato fuisse, ut præteream Populi non minimam partem. Cum Gradisca munitissimum oppidum à Venetis obsideretur, cumque in Istriam exercitus duceretur, instar pestis hæc febris magnam hominum multitudinem oppressit, quorum eos, qui ex Patavina, Vicentina & Veronensi ditione in castra proficiscebantur, præcipue interiisse ipsi vidimus. Ante biennium, cum à Venetorum S.C.^o (quod præest sanitati publicæ) nec non à Magno Hetruriæ Duce, & Genuensi Republ. lege caveretur, ne quæ naves cum mercibus Algeria, Tunetoque Africa (in qua incredibilis mortalium multitudo peribat) in Italiam venientes in portubus suis reciperentur, contagiosa & maligna Semitertiana fuit, quæ iis veræ pestis suspensionem fecerat.

Quamobrem si nomen febris Semitertianæ ad tuas aures nondum venerit, quæso, non quia raro conspiciatur, sed quia raro de ea inter Medicinæ Professores sermo habeatur, & ideo raro ab iis cognoscatur, id evenisse putes. Nam vix audeo dicere, quam pauci ubique locorum, in quibus celebres Medici esse videbantur, deprehendantur qui hanc febrem vel nominatenus cognitam habeant. Cum ante multos annos Italiam ad stirpium & rerum naturalium perfectiorem cognitionem acquirendam peragrarem, cumque annis superioribus apud Germanos, Pannonos, Sarmatasque Medicinam facerem, & præteritis annis jussu Serenissimi Principis excellentissimi Senatus Veneti ad docendum Patavium revocarer, notavi ipse quam multos nobiles in arte medica viros hæc febris ubique deceperit, & adhuc indies decipiat, quod eam à duplici tertiana ab ipsis vocata non discernere. Probabo hoc novissimo exemplo Principis piæ recordationis Antonii Priuli. Hunc enim, cum ante biennium febre tertiana prius correptus, mox à Venæsectione in duplicem tertianam incidisse diceretur, ex signis relatis ab iis, quibus valetudo ejus curæ erat, non alia febre quam Semitertiana laborasse cognovi. Quod si tunc temporis ante venæsectionem prædicta fuisset (ut commode conjectari licebat ex prægressa tertianæ specie) ejus febris natura & motus, nunquam ab empiricis tantopere in hac splendidissima persona administrata venæsectio damnata fuisset.

Ecce benevole Lector quas habuerim causas scriptionis meæ. In qua si nova multa & à communi sensu aliena offenderis, scire te velim, nihil calumniandi animo, aut obrectandi, sed de re medica & qui cum hac febre aliquando conflictabuntur bene merendi omnia dicta scriptaque esse. Quæ ut multis commodo esse cupio, ita te valere.

INDEX CAPITVM

Quæ hisce Libris de

SEMITERTIANA

Continentur.

LIBRO I

Nomen, Definitio, Genera, Differentiæ,
& Causæ internæ continentur.

- CAP. I. Synonyma & eorum ratio, Pag. 1
 II. De veterum & juniorum definitione, ib.
 III. De generibus Semitertianæ. Quæ propria
 & improprie, 2
 IV. De differentiis propriarum, ibid.
 V. Quæ sit Semitertiana Hippocratis, 3
 VI. De quatuor propriarum semitertianarum
 differentiis; & primum de iis, quæ ab
 essentia desumuntur, 4
 VII. De differentiis, quæ à magnitudine, 5
 VIII. De differentiis ab accidentibus, ibid.
 IX. De differentiis à more, & aliis, ibid.
 X. De causa proxima Semitertianæ, ibid.
 XI. De humorum putrescentium in hac febre
 variis mixtionibus, & quam ille, 6
 XII. De numero locorum, in quo humores pu-
 trescunt; an unus sit an plures, ibid.
 XIII. De locis putredinis intra & extra vasa,
 quid sibi velint, 7
 XIV. An putredo sit in vasīs, an extravasa, &
 in quibus, 8
 XV. Intermittentium febrium putredines in
 vasīs maioribus minoribusque consti-
 tisse, exemplis declaratur, 9
 XVI. A continuis febribus sublatorum historie
 duæ memorabiles; & eorum dissectio
 quem putredinis locum monstrarint, 10
 XVII. Semitertiana propria an sit symptomati-
 ca, an primaria, & cur eam primariam
 scriptores fecerint, 12
 XVIII. Intermittentem febrem dari symptomati-
 cam, 13
 XIX. De causis antecedentibus (humoribus
 nempe) & putredinem efficientibus, 14

LIBER II

Causas externas, signa Diagnostica, &
Prognostica prosequitur.

- I. De Aere calido, humido, & inequali, 15

- II. Vitæ ratio apud Moravos Pannonique
 producens Semitertianam epidemicam.
 Qualis sit, quæ sporadicam gignat, 16
 III. De signis diagnosticis universalibus, 17
 IV. De signis veræ semitertianæ primi ordinis
 Galeni, 18
 V. De Typo semitertianæ secundæ ordinis Ga-
 leni, & magni hemitritici barbarorum,
 ibid.
 VI. De Typo semitertianæ minoris. Locus Ga-
 leni correctus, 19
 VII. De Semitertianæ exquisitæ Galeni Typo, 20
 VIII. De signis hemitritici spurii primi ordinis
 Galeni, & quibus signis duplex tertiana
 ab hemitritica spuria distinguatur, 21
 IX. De Typo compositæ semitertianæ cum ter-
 tiana, 22
 X. De prognosticis, quæ futuram semitertia-
 nam præagire possunt, ibid.
 XI. Tabidi an hac febre corripiantur. Tabidi
 vox variæ significationis, autoris sen-
 tentia, 23
 XII. Omnem semitertianam propriam periculo-
 sam esse. Locus Hippocratis illustratus, 24
 XIII. Vtrum brevis, an longa sit hæc febris, 25
 XIV. De crisi bus hujus febris, commutatione so-
 lutioneque per alios morbos, 25
 XV. De longitudinis & brevitatæ febris, com-
 mutationis in alios morbos, & speciei fu-
 turæ criseos præcognitione, 27
 XVI. De signis per quæ morituros ægros plerun-
 que prævidere licet, 28
 XVII. De semitertianæ pestilentis Cornelii Gem-
 mæ symptomatibus, & prognosticis, 29

LIBER III

Curationis maximam partem absolvit.

- I. Hactenus neglectam hujus febris exactio-
 rem curationem, eam ratione moris, &
 motus febris differre, 31
 II. De venesectione, an hæc in omni specie
 semitertianæ adhiberi debeat, ibid.
 III. De

INDEX CAPITVM.

III. De loco <i>vena</i> sectionis ,	33
IV. De quantitate sanguinis evacuandi ,	34
V. Quo tempore <i>vena</i> sit secanda ,	ibid.
VI. De Scarificationibus, cucurbitulis, frictio- nibus ,	35
VII. De Purgatione ,	36
VIII. De pulvere Comitris de Harwick, & anti- monio preparato ,	37
IX. De Vomitoriis ,	39
X. De Clysteribus ,	ibid.
XI. De Alterantibus, de obstruentibus, putre- dini & malignitati resistentibus inter- nis ,	ibid.
XII. De externis remediis ,	40
XIII. De Periaptris ,	41
XIV. De maligna semitertiana internis externis- que remediis ,	ibid.
XV. De Pestilentem semitertianam curandi me- thodo per medicamenta interna & ex- terna ,	42
XVI. In Declinatione semitertianarum, Crisi, aut commutatione quid à medico prestari debeat ,	43

LIBER IV

Victus rationem, curationem sympto-
matum huic febri magis commu-

nium, recidivarum & commutatio-
num in alios morbos complectitur.

I. Aer qualis apud ægros eligendus parandus- que & quæ victus ratio instituenda in benigna febre ,	44
II. De victus ratione pro maligna & pesti- lenti ,	46
III. De curatione symptomatum & morborum, quæ frequentius huic febri superveniunt, vel implicantur, vel post semitertianam comparent, & primum ad capitis dolo- rem ,	47
IV. Ad firim ,	ibid.
V. Ad linguam asperam ,	ibid.
VI. Pro nausea & cibi fastidio ,	48
VII. Ad lumborum dolores ,	ibid.
VIII. Ad vigilias ,	ibid.
IX. Ad Leibargum ,	ibid.
X. Ad Phrenitidem ,	49
XI. Pro Vertigine, Epilepsia, Apoplexia ,	ibid.
XII. Ad albi fluxum & Dysenteriam ,	50
XIII. De colicis doloribus ,	ibid.
XIV. De spurio dolore colico ,	56
XV. De Recidivis ,	57
Observatio Antonii Sabadini ,	59
Adriani Spigellii ad eam responsio ,	60

A D R I A N I S P I G E L I I
B R V X E L L E N S I S
D E
S E M I T E R T I A N A ,
L I B E R P R I M V S ;

Nomen, definitionem, genera, differentias, &
causas internas continens.

C A P. I.

Synonyma, & eorum ratio.



FX febris maxime nobilem nunc eligo considerandam curandamque, scilicet eam, quam Græci *ἡμικτήσιον*; Latini recentiores, Semitertianam appellant. Invenio in Plinii Valeriani libro III, cap. II, scriptum hoc: *Potio ad Hemitritum, sive ad Levifcos*. Alioquin ante hunc prisca Latinos non indidisse huic febris nomen proprie Latini, testatur Poeta medicus Quintus Serenus Sammonicus his versibus:

Mortiferum magis est, quod Græcis Hemitritum

Vulgatur verbis: hoc nostra dicere lingua

Non potere ulli, puto, nec voluere parentes.

Appellatur quoque à Galeno *ἡμικτήσιον*, id est, *febris horrida*; non quod cum horrore incipiat (nam hoc aliis multis accidit febribus quandoque intermittentibus, aliquando etiam continuis) sed quod alternis diebus magna accessionis pars horrores assumat. Dicitur autem semitertiana (si Agathino credimus, quem scribit Galenus de vocis hujus origine & causa integrum librum olim conscripisse) quod relata ad tertianam non secus atque huic per triduum Semitertianæ accessiones accedant. Nonnulli, teste eodem Galeno libro de typis, cap. xv, ajunt ita nominatam fuisse quemadmodum semicirculum & semiglobum, ipsam tertiani circuitus dimidio minorem esse asserentes. Alii vero putant, Semitertianam dici, quo pacto hemiolion, id est, sesquialterum numerum, quasi diceres sesquitertianam. Nam quemadmodum tertianæ paroxysmus per duodecim horas durat, sic semitertianam ajunt duodecim horas tertianæ in se complecti, & præter has alias quoque, quibus perdurat paroxysmus, nempe dimidium tempus tertianæ, quod est sex horarum. Ita ut tota Semitertiana se extendat ad octodecim scilicet horas. Thessalus Semitertianam dicit dictam fuisse ex eo, quod fit dimidio major, quam tertiana extensa. Galenus, quem sequor, lib. II de febris, cap. xxi, sic appellatam arbitrat, quod dimidiam partem tertianæ, & alteram dimidiam quotidianæ retineat. Sic dici semiasinum cum ad ejus compositionem pro altera parte asinus, pro altera equus conveniant: & semideum, quando dimidia parte deus

monstratur, altera vero hominis forma. Et profecto vulgus Semihominem nuncupat picturam, quæ dimidia parte & maxime superiore hominem æmulatur; altera vero, scilicet inferiore, piscem.

Quæ cum ita sint, interrogare aliquis hic me posset, cur hac febris non fuerit potius dicta *semiquotidiana*, quam *semitertiana*, præsertim cum tertiana, quæ cum quotidiana conjungitur, per triduum tantum semel conspiciatur invadere, quotidiana vero singulis diebus? Huic respondemus. Quia tertiana commixta quotidianæ longe fit non tantum Medico, sed etiam astantibus ob symptomatum vehementiam & febris ejusdem tertianæ in pluribus aliis agris frequentiam manifestior ac notior; cum quotidiana minus sit frequens in aliis ægrotantibus, & sæpe in Semitertianæ initio latere videatur, ita ut ægroti haud se febricitare putent eo die, quo videntur à tertiana liberi, sed levi quadam lassitudine pressi ad domesticas res obeundas de lecto surgant, vel ad publica officia exercenda extra domum vagentur. Quodque frequentius tertiana intermittens in hac febre prius hominem adoriatur, quam quotidiana, quæ sæpe post primum, secundum aut tertium paroxysmum tertianæ subsequi paulatim solet, rarius ilico cum ipsa tertiana eodem die invadere. Idcirco credo aliquem ex peritioribus antiquis medicis prius fuisse deceptum, qui nondum id febris genus animadvertisset, & initio hanc febrem simplicem tertianam putasse, ac mox subodorata fraude quotidianæ subsequens, semitertianam nominasse. Hæc de nominum hujus febris origine & causis dicta sint satis.

Cur nobis fuerit dicta semiquotidiana.

C A P. II.

De Veterum, & Juniorum definitione.

Admirabitur fortassis quispiam, cur tot hominum sententiæ de ratione vocis Semitertianæ fuerint. Verum is facile omnem admirationem remoturus est, si perceperit quid per Semitertianam veteres & recentiores intellexerint, non satis constare. Nam ut à Græcis incipiam, Agathinus, teste Galeno *Loco citato*, eam tertianæ speciem, quam Galenus productam & extensam nominavit (quæ ultra octodecim horas prorogatur, & aliquando viginquatuor horas, interdum triginta sex, plures perdurat) Semitertianam vocavit ipsam inter intermittentes febres collocans. Archigenes quoque eodem in genere, intermittentium scilicet, eam

Cur tot de hac febre sint sententiæ.

cet, eam posuit, & ad tertianam ac quotidianam transtulit. Thessalus febrem, quæ dimidio sit major quam tertiana extensa, in modum quotidiani circuitus, ut sit horarum vigintiquatuor. Galenus continuam febrem facit, eam nempe quæ ex duabus febribus, tertiana scilicet & quotidiana, alterutra intermittente vel continua copulatis constat. Si Latinos audiamus, Celsumque præcipue, hic videtur proximus esse sententiæ Agathini, dum sic scribit lib. xix, cap. viii: *At ubi id genus tertiane est, quod Hemitritæum Medici appellant: quibus paucis interpositis subiungit; porrigiturque febris inter horas vigintiquatuor & triginta sex.* Statuitque paulo post in ea veram remissionem. Recentiorum practici quidam, barbari dicti, febrem ex continua & intermittente compositam, Semitertianam nuncupant.

Gordonius, quia compositiones harum febrium possunt esse multæ, ait omnes reduci posse ad tres species, tanquam ad magis notas. Prima, ex quotidiana continua & tertiana intermittente: secunda, ex tertiana continua & quotidiana intermittente: tertia, ex quartana continua & tertiana intermittente constans. Ex quibus patet, quorundam Semitertianam simplicem esse febrem, nempe unam ex intermittentibus tertianis: nonnullorum vero compositam, eamque continuam.

C A P. III.

De Generibus Semitertianæ, quæ propriæ aut improprie.

Sed quoniam ad clariorem doctrinam prius determinare convenit, quid nos in hisce libris per Semitertianam intelligamus, tanquam de re magis quam de nomine solliciti, dicemus primum, Semitertianæ vocabulum duplicem significationem in se continere, laxam scilicet, & strictam. Laxa videtur posse febrium & intermittantium & continuarum species aliquas complecti: stricta vero, febrem continuam compositam ex quotidiana & tertiana. Ergo in laxa significatione sumens, Semitertianam duplicem statuo: impropriam, & propriam seu veram. Impropria, aut intermittens est, ut tertiana producta, quæ Semitertiana Agathini & Celsi appellanda est: aut continua, ut quando febris tertiana intermittens, cum quartana continua permiscetur, quæ vocatur Barbarorum major Hemitritæus, aut Semitertiana majoris famæ: aut quando tertiana intermittens vel continua cum febre symptomatice, pleuritide scilicet, peripneumonia, hepatitide, splenitide, phrenitide, aut quacunque alia; quæ ab inflammatione alterius cuiusvis visceris orta sit, componitur. Propria Semitertiana, est febris composita ex tertiana & quotidiana, de qua potissimum nunc agere institui.

Semitertiana impropria.

Propria.

C A P. IV.

De differentiis propriæ.

Iam à duplici fonte diductas plures differentias propriæ Semitertianæ proponamus: nempe ab iis tertianæ & quotidianæ speciebus, quæ huic inesse dicuntur; & ab iis, quæ eidem superveniunt. Etenim tertiana quæ cum quotidiana componitur, modo intermittens est, modo continua: &

rursus quotidiana quæ cum tertiana commiscetur, alia est continua, alia intermittens. Si tertiana intermittens cum quotidiana continua conjungatur; Galeni vera Semitertiana dicenda est, & primi ordinis. Nam libro de Febribus sic ait: *Hemitritæus dimidiam sui ipsius partem habet tertianam, alteram autem dimidiam quotidianam continuam.* Pariter si tertiana continua cum quotidiana intermittente conjungatur, Semitertiana quoque Galeni appellanda: sed secundi ordinis, ad alterius distinctionem. Nam eodem libro sic scribit: *Vna igitur sola adhuc mixtio relinquitur ex quotidiana intermittente & biliosa continua, quæ & ipsa potest continuam simul acque horridam febrem efficere.* Quod si febris occurrat tertianæ compositionis, in qua tertiana continua cum quotidiana continua permiscetur, nequaquam hæc à Galeno inter Semitertianas collocabitur, dum sic scribit *Loco citato*: *Non tamen ex duabus continuis, quarum altera biliosa, altera pituitosa sit, potest Hemitritæus consilire.* Adjungit causam: *Quoniam, inquit, hæc commixtio febrem horridam & quæ multas habet reduplicaciones non facit.* Placuit tamen nonnullis recentioribus hanc majorem Hemitritæum appellare, & spuriam Galeni Semitertianam: cum tamen Galenus Hemitritæi spuriam nomen ei, quod equidem sciam, nullibi adscribat; sed spuriam Hemitritæam appeller, in qua humor pituitosus prævalet copia bilioso; vel biliosus, pituitoso.

Vera Semitertiana primi ordinis.

Secundi ordinis.

Semitertiana spuria.

Est & quarta compositio quædam duarum harum febrium, quotidianæ scilicet & tertianæ intermittentiæ, quam etiam recentiores, Galeni spuriam Semitertianam perperam appellarunt cognomento minorem. Nam Semitertiana à Galeno hæc nunquam vocatur, propterea quod omnem Semitertianam inter febres continuas ponere voluerit, hæc vero sit intermittens. Nisi velimus dicere Galenum, quando scribit libro de typis, intermittentem Semitertianam aliquando reperiri, hanc intelligere intermittentem duarum febrium tertianæ & quotidianæ compositionem, quod tamen ejus doctrinæ secundo de febribus traditæ repugnare videtur: *Non igitur, ait, hæc febris Hemitritæus erit, siquidem ex numero continuarum Hemitritæus existat.* Quod si etiam in utroque genere (scilicet continuarum & intermittentiæ) Hemitritæus collocetur, non hæc tantum, sed multæ aliæ febres Hemitritææ vocabuntur. Ego vero ut clarior doctrina procedat, hanc appellabo parvam Hemitritæum. Nam & hæc non lecus ac vera Galeni, horrores inducere potest periodicos, eosque quotidie. Tertianæ vero compositionis febrem, magnam Hemitritæum appellabimus. Quapropter ex quatuor duarum febrium tertianæ scilicet & quotidianæ copulationibus quatuor species Semitertianæ propriæ nascuntur. Prima, vera Galeni primi ordinis. Secunda, vera ejusdem secundi ordinis. Tertia, magnus Hemitritæus Barbarorum. Quarta, parva à nobis nuncupata, quam videor posse commodè ex Galeno lib. xi de Febr. cap. viii, Archigenis Hemitritæum appellare. Invenio apud Hippocratem febrem cuiusdam factam mentionem, quam *te Slaosfulo* appellat, id est, *tertiana naturam referentem*. Galenus sic febrem continuam appellat, quæ tertio quoque die invalescit. Hippocrates quidem Ionicus, teste Erotiano in *Onomatistico* inquit, *te Slaosfulos tertianas appellari, euphonia causa*: Philonides vero Siculus febres, quæ continuæ sunt, inordinationem ostendentes:

Quatuor species Semitertianæ.

offendentes: indicare vero inordinationem in sinceritate, facta intermissione proprium est tertiana. Recte quidem indicantes inordinationem, non habentes autem sincerum medium intervallum, ita nominavit. Quandoquidem multam similitudinem habent ad tertianam. Sunt autem febres, quae appellantur *μικροί ημίεμνοι*, id est, Semitertiana parva.

C A P. V.

Quae sit Semitertiana Hippocratis.

Quæritur jam dudum à Scriptoribus, quænam sit febris illa, quam Hippocrates Hemitritæam appellavit, cujus plurimus in locis, ac præcipue in *libro Epidemiorum*, mentionem fecit. Sitne continua an intermittens, an utriusque naturæ particeps dubitatur. Sane autor libri, qui *Introduciotius* inscribitur, & Herodotus putatur, Semitertianam modo inter continuas, modo inter intermittentes posuit; secutus fortassis duo Hippocratis loca, in quorum altero pro intermittente videtur haberi, in altero vero, pro continua. Prioris hæc sunt verba *lib. 1. Epidemiorum*: *Inter febres quasdam continuæ sunt, quasdam interdiu tenent, nocte intermittunt: nonnullæ Semitertianæ sunt, tertianæ, quartanæ, quintanæ, septimanæ, nonanæ.* His verbis Semitertiana una cum intermittens numerari videtur. Ut propter hanc causam non mirum sit, Archigenem & Agathinum hanc pro febre intermittente accepisse. Rursus tamen eodem libro hæc scripta extant, quæ sunt posterioris loci verba: *Erant vero eorum plerisque passiones ejusmodi, febres horridæ, continuæ, acutæ; omnino quidem non intermittentes. Modus vero erat Hemitritæus.* Supra quem locum commentans Galenus scribit, Hippocratem appellare *Hemitritæam horridam, acque continuum, quæ sit tertiana, quotidiana continua permixta.* Idcirco *lib. de differ. febr. 11.* invehitur in Archigenem, quod naturam hujus febris non recte affectum, intermittentem esse scripserit. Et Agathinum quoque miratur, quod tertianam productam, Semitertianam appellaverit, & non extensam tertianam, ut quotidianam & quartanam febres, quas idem extensas vocabat. Ego vero, qui apud Hippocratem continuum febrem fuisse judico genus febres omnes quatuor præscriptas species continens, quid adferam pro mea opinione, & pro Galeno defendendo ad eum Hippocratis citatum locum, quo Semitertianam in catalogo intermittentium recensuit? Sane nil aliud, quam quod non expresse ibi Hippocrates febrem esse intermittentem dicat, cum ipsam ponat ante intermittentium species, quas enumerat, *tertianam videlicet, quartanam, quintanam, septimanam, & nonanam, & statim post continuas, quæ noctu intermittunt, interdiu tenent.* Quod si quis sit, qui hic aut alibi Hippocratem habere pro intermittente nihilominus asserat, id ei concedemus, modo intellexerit bifariam veteres usos fuisse continui & intermittens nomine. Nam *continuas*, inquit Galenus in commento supra hunc locum Hippocratis, *vocant febres quandoque non omnes, quæ ad integritatem non desinunt, sed solas præcipue illas, quæ omni carenti usque ad paucissimam mutatione.* Ita intermittentes interdum appellant illas solas, quæ in integritatem finiunt: interdum eas, quæ non finiunt in integritatem, sed insignes faciunt mutationes singularum accessionum, in initium, incrementum,

vigorem, & remissionem. At Medici quidam juniores quæ nullam magnam mutationem habent *αυξησις*, non continuas; ceterum continentes (*αυξησις*) nominant. Continuas autem has solas, quæ non veniunt ad integritatem, & intermittunt singulis accessionibus. Has vocant antiqui interim continuas, interim intermittentes. Nam sunt certe inter continuas & desinentes in integritatem media. Proinde recte ubi cum *συνόχῃ* conformatur, intermittentes appellantur; cum ad integritatem venientibus, continuæ. Hic loco differentiam febrium Hippocrates scribens, aliquas esse earum continuas dicit: & sunt quidem in utroque continui significato continuæ multæ. Hactenus Galenus. Iam obtrudes mihi fortassis Galeni librum de typis, in quo hæc leguntur: *Est autem non semper continua, verum & intermittens reperitur Semitertiana febris.*

Objection.
Effe etiam
Semitertia-
na inter-
mittens.

Ecce igitur quomodo hic dicit, intermittentem reperiri, cum eam ubique scribat ex mente Hippocratis esse continuum. In uno loco, quod affirmavit, id in altero negare videtur. Docti viri incidentes in hunc locum proxime citatum, negant propter contrariam hanc sententiam, hunc librum esse Galeni, qui de typis inscribitur. Sed scire hos convenit, propositionem istam, non semper continuum esse Semitertianam, Galeni doctrinæ non reclamare, quæ passim apud eum de continuitate hujus febris reperitur in variis libris, nec etiam nostræ opinioni, si diligenter perpendatur. Nam Galenus in *libro isto de typis* loquitur aut ex mente sua & aliorum simul; aut ex propria tantum. Si loquitur ex mente sua & aliorum simul, verissimum est quod dicit, continuum esse, nempe veram suam primi & secundi ordinis. Si vero ex propria hæc scribat, aliter sunt exponenda Galeni verba, quam prima facie accipiuntur. Vult enim docere Galenus, suam veram Semitertianam non semper esse continuum, totius nempe morbi temporibus omnibus. Nam in principio & declinatione potest esse intermittens; in augmento atque in statu semper continua. Exemplum producam juvenis, qui circa finem autumnii tertiana cum horrore correptus sit; secundo die ab omni febre immunis exiit; tertio rursus tertiana horrida eum prehendat; quarto lene frigus extremarum partium in fine tertianæ antecedentis, initium quotidiani cujusdam circuitus per octodecim aut viginti horas perdurantis; tum iterum redeunte tertio paroxysmo tertianæ post viginti quatuor horas, simul quoque cum ipsa quotidiana paroxysmus confundatur, & uterque simul per horas viginti duas perduret, aut tertiana paulo citius abeat quotidiana. Inde sequentibus diebus augescente utraque febre prolixior jam fiat utriusque paroxysmus, & ubi vigorem superavit breviores paulatim rursus fiant paroxysmi quotidianæ. Quis hanc non dicet Semitertianam, & quatenus quotidie in initio & fine ad infebrecitationem perveniebant febris quotidiana tertianæque, intermittentem statui oportere; quatenus vero in augmento & statu prolongatorum paroxysmorum quotidianæ unus ingrediebatur alterum, continuum recte dici. Iam & alternis diebus contingere potest, ut intermittat aliquo tempore morbi, maxime vero initio vel fine: ut si tertiana cum quotidiana vigintiquinque seu vigintifex horas perdurante simul invadat: altero vero die anticipet quotidianæ circuitus per duas, tres vel quatuor horas. Sed etiam parvus Hemitritæus, est ex duabus intermittenti-

bus febribus componatur tertiana & quotidiana, tamen ut plurimum ad continuitatem pervenire animadvertitur, aliquo totius morbi tempore per anticipationem paroxysmorum quotidianæ & tardiorum regressum tertianæ, vel hujus productionem. Hanc continuitatem si Galenus considerasset, omnino parvam Semitertianam ex Semitertianarum numero non expulisset, cum & hæc horrores inducat. Igitur ut ad institutum sermonem redeamus, recte & vere hæc scripsit in libro de typis Galenus: *ἔστι δὲ ἡ πύκνσις σωχὴς, ἀλλὰ ἡ ἀσθενεία ἐν ἐνδοκίᾳ*; quod sic sonat ad verbum, *Est autem non omni tempore continua, sed etiam (aliquo scilicet tempore) intermittens reperitur*. Quod adhuc apertius declarat in commentario in primum Epidemiorum. Cum enim prius dixisset Hippocratem ibi numerare diversas species febrium; eas scilicet, quæ ad integritatem veniunt clare, intermittentes proprie dictas, & alias quæ remittunt, continuas; subiungit: *Tertianæ & quartanæ clare ad integritatem veniunt. At ex Semitertianis quædam utraque incedunt via: quædam altera tantum, earum quæ ad integritatem non veniunt*. Patet igitur Galenum libro de typis verum dixisse, intermittentem Semitertianam aliquando fieri, esse tamen continuam.

Tex. 1.

C A P. VI.

De quatuor Propriarum Semitertianarum differentiis: & primum, de iis quæ ab essentia desumuntur.

Quatuor jam enumeratæ Semitertianæ species videntur potissimum essentia, magnitudine, accidentibus, more, causa proxima, & denique compositionis variz, duarum febrium tertianæ & quotidianæ modo differre. Nam singulæ vel sunt exquisitæ, vel non exquisitæ; vel magnæ, vel parvæ, aut inter has mediæ; vel hoc, aut illo symptomate conjunctæ; vel benignæ, vel malignæ: biliosæ, pituitosæ, exquisitæ, confusæ, complicatæ. Appello nunc exquisitas, quando singularum specierum febres, ex quibus componuntur Semitertianæ, in causis, signis, & idea exacte & perfecte naturam suam observant. Exempli gratia, Semitertiana primi ordinis Galeni, exquisita à me nominatur, quando tertiana exquisita quotidianæ continuæ exquisitæ permiscetur. Non exquisita, quando tertiana simplex intermittens vel producta quotidianæ continuæ non exquisitæ copulatur. Aut quando tertianæ spuriz productæve quotidiana continua exquisita copulatur. Sic quoque ea, quæ est secundi ordinis Galeni, erit exquisita, quando exquisita tertiana continua exquisitæ quotidianæ intermittenti immiscetur. Non exquisita, quando alterutra febrium, aut utraq; spuriz existunt.

Exquisita.

Non exquisita.

Idem de parva Hemitritæ, & magna dico. Sed Galepus & quotquot ejus doctrinam sequuntur, exquisitam Semitertianam appellant eam, quæ ex quotidiana continua & tertiana intermittente componitur, & pari copia humores putrefactos, ex quibus oritur, habet. Sic etiam Fernelius exquisitam Semitertianam vocat, in qua tertianæ continuæ quotidiana intermittens jungitur.

An conveniat
si possit febri
Semitertiana
primi ordinis
exquisita.

Movere hic aliquis dubium possit, an revera distinde dari queat febris Semitertiana primi ordinis Ga-

leni exquisita; propterea quod tertiana permixta quotidianæ continuæ, exquisitæ tertianæ naturam prorsus obscurat. Ut propter hanc causam Galenus tantum voluerit eam appellare Semitertianam exquisitam, quæ ex simplici tertiana & continua quotidiana componitur. Ad hoc dico, quod quotidianæ continuæ exquisita tertiana intermittens implicari potest. Nam apud Galenum lib. de Crisibus habemus exemplum mulieris Semitertiana correptæ, una cum alia exquisita tertiana. Forestus, lib. v Observationum medicinalium, Observ. xvii, alterius mulieris admodum biliosæ narrat similem historiam. Si itaque in Semitertiana contingere potest, ut ei jungatur tertiana exquisita; cur non etiam potest jungi tertiana exquisita quotidianæ continuæ? Nec hoc reclamant doctrinæ Galeni, quando determinat exquisitam Semitertianam ex tertiana intermittente & quotidiana continua componi: quia tertiana intermittens potest esse exquisita magis, & minus. Sed illud hic adjungendum, quod Galeni & recentiorum Semitertianæ exquisitæ accidere possit, ut tertiana intermittens sit spuria, & quotidiana sit spuria, & ex duabus febribus spuris una Semitertiana exquisita resultet. Quia in hac fit utriusque humoris, ex quibus oritur Semitertiana, æqualis copiz concursus: quod nostræ Semitertianæ primi ordinis Galeni non contingit.

Amplius adhuc dobitari potest, an detur febris continua periodica exquisita, nec ne; propterea quod ejus nulla sit facta mentio apud veteres, ut aliarum intermittentium, ob earum continuitatem. Neque enim febris continua una, altera videtur esse magis aut minus continua. Quod si ita est, Hemitritæ magna à me nominata non recte dicitur exquisita, & non exquisita. Huic objectioni occurrit, si dicamus naturas febrium continuarum periodicarum, longe esse intermittentium naturis obscuriores: & ideo nullam esse factam à veteribus mentionem febris quotidianæ vel tertianæ continuæ legitimæ & illegitimæ, vel exquisitæ & non exquisitæ. Si quis tamen velit curiosius animo concipere typos & formas febrium intermittentium, poterit etiam ex iis continuas quotidianas, & tertianas & quartanas exquisitas perscrutari. Nam quotidiana continua alia est per superingressum paroxysmorum, ut dicunt practici, alia vero simpliciter continua existit. Illa non exquisita dicitur quotidiana continua; hæc vero dicitur magis exquisita, quo lentius ad vigorem ejus exacerbatio perducitur, ut quotidiana intermittens. Sic tertiana continua non exquisita existit, quæ spuriz productæ longissimæ intermittens horas excedit, aut quæ antequam vera est quies, tertio die anticipando per tres, quatuor, pluresve horas continuatur, ob novum ingressum paroxysmi incipientis cum frigore vel horrore. Sic & quæ exquisita est continua, præterquam quod tertio quoque die exacerbetur sine rigore, horrore vel frigore, cito ad vigorem adscendit, & tarde declinat, nulla integritate post se illo tempore relicta. Hæc quam aptiori loco inter signa essent recensenda, tamen ad probandum & clarius docendum exquisitas & non exquisitas febres continuas periodicas dari, hoc loco ea proferre coactus fui.

An detur febris continua periodica exquisita.

CAP. VII.

De Differentiis, quæ à magnitudine.

Cæterum quod ad quatuor Semitertianarum magnitudines spectat, illæ hic à me confiderantur in singulis generibus ratione magnitudinis periodorum, hoc est, brevitatis & longitudinis, majoris vel minoris acuminis. Galenus libro de Typis tradens differentias, quæ à magnitudine in hac febre defumuntur, hæc ait: *Habet autem tres in magnitudine differentias: nam una, parva; altera, media; tertia, magna Semitertiana est.* Parva igitur est, quæ circa viginti quatuor horas versitur; media, quæ circa triginta sex; magna, quæ circa quadraginta octo, quæ profecto continuæ febri proxima est. Quæ si de Agathini Semitertiana, ut ex sequentibus verbis apparet, dicta sint, verissima esse comperiemus. Nam febris tertiana extensa, alia brevis est, alia media, alia longa. Brevis ad viginti quatuor horas se extendere potest; media, triginta sex: quæ vero ultra has horas prolongatur, usque ad quadraginta octo, longa dicitur. Ita ut omnes hæ differentiæ amplam quandam latitudinem singulæ adhuc in se contineant. Nam parva etiam dicitur, quæ ultra octodecim horas prorogatur, & infra viginti quatuor horas perdurat; ut quæ vigesima hora terminatur: sic & media, quæ ultra viginti quatuor horas, non tamen ultra triginta sex se extendit: longa vero, quæ omnibus horis terminatur, quæ intercidit intra horam trigessimam septimam & quadagesimam octavam. At de veris Galeni Semitertiis, quod continuæ sint, hæc vera esse nequeunt. Hæc enim scribit lib. I. *Epidemiorum*, com. III, text. v: *Aquis sane qui ajunt, si horas quatuor & viginti quibus febre facit, median cum Semitertianam habere, in numero habent talem febrem intermittentium.* Sic etiam qui medium & parvam à magna distare horarum numero ferunt, studentes utraque ad integritatem deducere, ab Hippocratis sensu discedunt, dum in febris intermittentibus ponunt Semitertianam. Nisi velimus dicere, nomen Semitertiæ loco de Typis citato à Galeno accipi abusive pro ea tertiana, quæ quotidianæ permiscetur, & Galenum metiri magnitudinem Semitertiæ à tertianæ magnitudine cum quotidiana conjunctæ. Ita eveniet ut parva, quam circa viginti quatuor horas hominem torquere statuit, duodecim horas in latitudine, quemadmodum etiam aliæ duæ, completatur. Siquidem tertianam exquisitam, quæ ad duodecim horas se extendit; & simplicem, quæ ad octodecim; & extensam parvam, quæ ad viginti quatuor horas prolongatur, comprehendere potest. Ita parva Semitertiana erit Galeno, quæ febrem habet quotidianam continuam cum exquisita, simplici, parva, extensa tertiana conjunctam: Media vero, quæ cum media extensa: Magna demum, quæ cum longa extensa copulatur. Hanc videor ex Galeno eodem libro nominare posse Semitertianam extensam, cum τὴν πενήδεκάμην ημερήσιαν τύπιν προτρεψέ Semitertianam mentionem faciat. Verum Galenus, post citata ex libro de typis (quem mendosum aut non integrum esse suspicor) verba, examians opinionem eorum, & præcipue Agathini, qui nominis Semitertiæ causam referre conati sunt facta comparatione ad tertianam, prorumpit in hoc

quæsitum: *Utrum igitur horis an intervallis Semitertiana signabitur?* Respondet: *Secundum quidem Agathini opinionem, nec horis, nec intervallis.* Hæc enim utraque adscriptam habent magnitudinem (ἀποδείκνυται τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας καὶ τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας). Riccius vertit: *utraque enim hæc huiusmodi præscriptam magnitudinem habent.* Legendum forte: aut horis, aut intervallis. Hæc enim utraque adscriptam magnitudinem habent.) Semitertiana vero indefinitam habet in latitudine horisque subsequentibus constitutionem.

CAP. VIII.

De Differentiis ab accidentibus.

Ab iis quæ superveniunt quatuor Semitertianæ speciebus, aut eas concomitantur, simplex Semitertiana, vel composita cognominatur. Nam si nullus morbus, nullumve symptoma ei adfit, quod formæ simplici prædictarum quatuor Semitertianarum non convenit; simplex est cognominanda: è contrario vero, composita; ut si Semitertianæ alia febris tertiana vel quartana implicetur. Si pestis adfuerit, pestilens Semitertiana proprie appellatur. Si strangulationes ab utero; quales Hippocrates observavit lib. VII. *Epid.* in uxore Apomoti, præter cardialgias & vomitus circa accessiones: si colici dolores aut dorsi, viscerum inflammationes, tabes, & alia ejus generis plura quæ in secundo libro recensentur, fuerint conjuncta, maligna.

CAP. IX.

De Differentiis à more & aliis.

Maligna Semitertiana non est cum pestilenti confundenda. Habet enim hæc, præter ordinariam Semitertianæ putredinem, quoddam pestis venenum, & inexplicabile ejus seminarium. Illa vero, prava & malignos quosdam mores, ortos ab excellenti quadam putredine. Rursus maligna alia contagiosa est; qualis annis superioribus magnam Italiæ partem invasit: alia vero, sine contagio. Differt etiam contagiosa à pestilenti. In hac enim, vera pestis signa cernuntur; in illa, nequaquam. Quanquam non me lateat quosdam contagiosam, epidemiam, & pestilentem confudisse. Porro biliosam & pituitosam appellant scriptores, in qua alteruter humor putrefactus exsuperat. Exquisitam etiam, quæ ex pari humorum portione conflatur, quocumque in loco consistat. Confusam & complicatam appello, ex Galeni libro II de Crisibus, cap. VII, quando causæ & formæ febrium quotidianæ & tertianæ prorsus aut confunduntur, aut complicantur. Complicationem hanc fieri ait quadrupliciter: Ex tertiana quotidianæ commixta: vel ea, quæ quotidie accessionem habet continuæ illi, quæ per tertium continua est: vel tertiana ei, quæ singulis diebus accessionem facit: vel quotidiana ei, quæ per tertium continua est.

CAP. X.

De causa proxima Semitertiæ.

duplex statuitur humor putredinem habens, causa proxima Semitertiæ propriæ: bilis nempe excrementitia & pituita. Inter Barbaros qui-

dam practici duas quasdam improprias Semitertianas, quatuor propriis enumeratis adjungentes (ut eam, quæ ex tertiana continua & quartana intermittente constat, & alteram, quæ ex quartana continua & tertiana intermittente) melancholicum humorem aut atrabilem putrefactum prædictis duobus humoribus addunt. Ita ut in universum trium humorum varia permixtio omnem Semitertianæ speciem constituat, tum propriæ, tum improprie, simplicis atque compositæ.

Simplex omnis Semitertiana duos humores ex tribus jam dictis pro causa sua proxima agnoscere dicitur: composita vero interdum duos, veluti cum febris tertianæ exquisita Semitertiana vera adjungitur: aut tres, ut quando eidem Semitertianæ quartana se adjunxit. Galenus causam docens foarum Semitertianarum, nempe primi & secundi ordinis, pituitam cum bile permixtam esse affirmat. Sic enim in *lib. de Febris* inquit: *Si pituita putrescens, ex qua febrem illam, quæ singulis diebus accessiōnem facit, accendi dicebamus, miscetur amaræ bilis humori, ex quo tertiana gignitur febris, duplex jam causa ac dispositio conjungetur. Alter siquidem humor affert quotidie accessiōnem: alter vero, tertio quoque die. Permiscetur autem hi humores variis proportionibus. Si pituita ac bilis æqualis fiat temperatura, ita ut ambæ sint æquipotentes, Semitertiana non modo exquisita Galeni, sed & aliarum specierum excitatur. Si vero flava bilis parva portione exsuperet pituitam, aut hæc bilem, simplices Semitertianæ exsurgunt, aut non exquisitæ. Si vero multum alteruter humor abundarit, spuria pituitosa vel biliosa cognominatæ proveniunt, tantoque à natura simplicis recedent, quanto humor alterutrius copia vincere videbitur. Similem quoque bilis ac melancholicæ putrescentis, commixtæque proportionem per te ipsum excogitare poteris, ad causam proximam Semitertianarum improprium cognoscendam. Verum quod ad quatuor Semitertianarum propriarum causas proximæ attinet, tantum loco differre putantur, in quo consistunt.*

C A P. X I.

De Humorū putrescentium in hac febre variis mixtionibus, & quanam illa.

Sed de hoc antequam ulterius quidquam proferam, prius curiosius indaganda humorum jam dictorum permixtio est: qualis nempe ea sit in nostro corpore. Et primum hic scire convenit, mixtionis humorum duas esse species: unam, in qua confunduntur non secus atque elementa aut vinum, dum aquæ infunditur: ita bilis & pituita in tertiana & quotidiana spuria permisceri sibi invicem putantur; alteram, in qua non confunduntur, sed tantum conjunguntur partes cum partibus, quam Galenus *lib. 11 de Crisibus*, cap. 12, complicationem videtur nominasse. Talis permixtio bilis & pituitæ solet in dysenteria notari, cum pituitæ partes in excretis apparent, quibus bilis circumfunditur. Existimo ego ex Galeni placitis recte asseri posse, in omni Semitertiana propria utrumque humorem permixtum utraque mixtione posse putrescere; siquidem Semitertiana ex spuria quotidiana continua & tertiana producta confect. Nam in quo-

Mixtionis humorum duas species.

tidiana spuria, bilis minor portio cum majori pituitæ portione suis in locis confunditur. Et in tertiana spuria pituitæ minor portio cum majori bilis quantitate. Sed antequam confundantur simul, quod fieri arbitror à nostro calore, primum per portiones implicari necesse est. Non enim uno eodemque loco uterque humor generatur: sed in diversis genitus, ex iis in unum vel plures confluere potest, atque hic utroque modo commisceri. Cæterum in impropriis Semitertianis aliter evenit. Humores enim sive sint unus, ut bilis, sive plures, ut pituita, simul aliquando implicantur; sed sæpius separati disjunctique consistunt. Is enim humor, qui peripneumoniam facit aut hepatitiam aut aliquam aliam visceris ejusmodi inflammationem, quotidie noctu magis accenditur; interdum, minus.

C A P. X I I.

De numero locorum in quibus humores putrescunt, an unus sit; an plures.

Verum de locis, in quibus putrescant humores, quot numero sint & quanam, dicendum est. Nam aut unus esse potest locus, aut plures, ut duo, vel tres. Quod unus esse possit, duo nobis persuadere queunt; natura hujus febris, & causa. Nam natura febris videtur esse simplex, quamvis singulis diebus suas habeat accessiones in modum duarum febrium. Simplex febris simplicem & unicum habet locum, qui conservat focum putredinis. Ita veteres febribus intermittentibus simplicibus unum locum adscripserunt; continuis pariter alterum his proprium. Quod autem simplex sit, probatur ex duorum mixtione, alioquin duæ jam essent febres, & non unica. Imo talis tantumque est febris utriusque, ex quibus Semitertiana sit, mixtio, ut in Semitertiana primi ordinis Galeni ea, quæ tertio quoque die tertianam intermittentem æmulatur, cum quotidiana sæpe prorsus confundatur: & rigores, horrores, aut frigus uno eodemque tempore in totum permixti compareant. Galenus *lib. 11 de differ. febrium*, cap. 11, cum dixisset, Semitertianam esse mixtam febrem ex tertiana & quotidiana; & ideo horrorem inferre rigore, qui tertianæ solet esse magis proprius, minorem; & frigore, quod quotidiana initio monstrat, majorem, hæc addit: *Non abs re hinc febris nomen Hemitritæ inditum est. Nam ex quotidiana continua & tertiana intermittente tota ejus natura confusa dimidiam partem utraque ex dictis febribus retinet. Et postea eodem libro*, cap. 11, 12, subjungit causam confusionis: *Idcirco, inquit, tertiana quidem cum quotidiana continua confusa facit Hemitritæ, cum neque utraque continua, neque utraque intermittens ejusmodi quæcunque febrem generare. Ideoque in 11 de Crisibus Hemitritæ ponit mixtam febrem ex biliosa & pituitosa, non jam invicem complicatis, sed per se totas confusis. Causa quoque febris unum esse locum arguit, nempe mixtio duorum humorum aut plurium, quæ auctoritate Galeni convincitur, & sensibus demonstratur. Etenim in lib. de differ. febrium hæc scribit: Si pituita putrescens, ex qua febrem illam quæ singulis diebus accessiōnem facit, accendi dicebamus, miscetur amaræ bilis humori, ex quo tertiana gignitur febris, duplex jam causa ac dispositio conjungetur. Alter siquidem humor*

Quod unus sit locus.

humor adfert quotidie accessionem; alter vero, tertio quoque die. Videmus præterea quotidie in patientibus hanc febrem per vomitum, per fecesum, bilem & pituitam sibi invicem confusas excerni, & sudores, quos habent præpingues ac viscidos, eorundem humorum confusioem satis declarare. Quin & in urinis sæpe talis quædam permixtio utriusque humoris animadvertitur. Nam crassæ sunt ac coloratæ, bullis & spuma coronam solam cingentibus, interdum & totam superficiem urinæ tegentibus, quæ, postquam micta est, non evanescent, nec dissiliunt, ut in urinis biliosis, quæ in tertianis mingi consueverunt, sed permanent interdum in plures dies ob pituitæ visciditatem, per serum & bilem commixtæ etiam intra venas. Ratione igitur mixtionis factæ vel confusæ, vel per minutas partes ex duobus humoribus una massa, unumve corpus constituitur, quod unum locum, non bina, putrescens habere necesse est. Quapropter his adductis rationibus unum locum putrescentis materia assignare oportebit in Semitertiana.

Rursus quod duo sint, pariter probari potest ex iisdem rationum fontibus, scilicet ex natura Semitertianæ, & causa proxima. Vtræque enim duplices censentur. Nam duæ febres implicitæ sibi invicem, ut loquuntur, & quæ in diversis horis incipiunt, diversisque desinunt (tales sunt, quæ in Semitertiana videntur) suas habent essentias singulæ, seorsimque consistunt, tametsi accessionum partes quædam eodem tempore concurrant. Fiunt hæc, inquit Fernelius lib. xv Pathol. cap. xv, ex diversis humoribus non eodem loco positis, sed quorum suæ cujusque sedes, suæ essentia. Itaque secundum doctorum opinionem bina putredinis loca in Semitertiana statuenda: unus, in quo consistit pituita putrescens; alter, in quo biliosus humor.

Potest & hæc opinio aliter defendi, negando scilicet superius allatam mixtionem humorum, aut confusioem. Nam sæpe contingunt quod & nos ipsi vidimus, bilis sinceræ vomitus in Semitertianis, & pariter dejectiones pituitæ purioris, & quæ nullam bilis permixtionem arguebant. sæpe etiam accidit fieri diversas plane excretiones, & modo quidem bilis ante pituitam per vomitus & feces biliosos; modo rursus pituitosas ante biliosas; quæ indicare manifeste poterant, ex uno loco bilem, ex altero pituitam separatim profluxisse.

Revera in hac dubia concertatione, media quædam via est procedendum, ita ut aliquando unus, aliquando plures statuatur. Si materia ex bile ac pituita confusa putrescit, potest quidem ea pluribus in sedibus consistere, sed tamen ut plurimum uno in loco consistit. Si vero complicantur humores, possunt in uno loco consistentes putrescere, si generalia loca consideremus, ut intra vel extra vasa; si vero particularia, plura quam unum habebunt loca. Extat super hac difficultate omnium ut arbitror, quæ in febris proponi possunt difficillima Galeni sententia, quæ à mea haud multum discrepare videtur. Nam libro xi de Crisibus hæc ait: Quandoque vero aliqua ex intermittentium genere, cum continua difficillimam & vix explorabilem facit mixtionem. Nam sancti febres, ita & patientia loca mixtionem recipiunt, vel quia differentia membra propria singula febrem accendunt, ut exempli gratia, lien & jecur: vel quia dispositio mixta; veluti inflammatio

cum erysipelate, aut erysipelas cum inflammatione miscetur. Verum quoniam supra diximus Semitertianæ putredinem uno in loco consistere, quod confusa sit plerumque ejus essentia & materia, adversariis quibuldam rationibus potioribus hæc respondemus. Quod si diversis temporibus singularum febrium, ut quotidianæ & tertianæ typus observetur, id dico de potentia putrescentis materiæ procedere, non semper locorum diversorum, in quibus separati humores singuli à se invicem continentur, ut postea adhuc clarius demonstrabitur. Et quamvis per vomitus & feces aliquando compareant excreti humores sinceri, & separatim singuli, non tamen inde recte inferatur, hos uno in loco consistere non posse. Quoniam prius confusi concoquantur à natura, deinde à se invicem segregantur, quemadmodum in nonnullis abscessibus contingere videmus. Etenim in initio generationis eorum apparet ex confusis in venis humoribus fieri in eos fluxionem, deinde paulatim ubi aliquo in loco & spacio cōstiterunt, à calore nativo segregari ac propriis sedibus circumscribi. Sic in tunicatis abscessibus vidi & bilem & serofos humores segregatos à pituita in candidos calculos duris ossibus similes concreta, eique circumfluxisse undique. Hi autem abscessus prius à suppuratione originem traxerant, in qua omnes prædicti humores erant confusi. Eodem igitur modo contingit confusos humores segregari à natura, ubi concoctionem aliquam putrescentes passi prius fuerint. Sed & alio adhuc modo contingere potest in initio Semitertianæ, ut singuli seorsim ex corpore expellantur: quando scilicet undique à toto corpore in unam partem confluant antequam confundantur. Ita vidimus à capite destillantem pituitam in ventriculum, pituitosum in hac febre vomitum produxisse. Et rursus à quibusdam venis ad jecur detrusa bile, in alvum aut ventriculum confluisse antequam putresceret. Quamobrem cum modo unus locus putredinis statuatur, modo plures, quinam hi sint determinandum jam est.

CAP. XIII.

De Locis putredinis intra & extra vasa, quid sibi velint.

Cum in febris putridis, quæ primario hominem affligunt, duo putredinis loca generalia à Medicis celebrentur; unus, quem vocant intra vasa; alter, quem extra vasa; prius veniunt exponendæ hæc notiones, quid sibi velint, antequam locum putredinis Semitertianæ indicemus.

Appellant igitur locum intra vasa, cavitatem nempe, quæ continetur in venis & arteriis, in quibus sanguis naturalis & vitalis spiritus alendis omnibus corporis partibus fluit & refluat.

Differunt hæc vasa magnitudine primum; deinde, loco; tertio, connexione. Magnitudo enim ipsi varia; quia vel magna sunt vasa, vel media, vel parva. Magna, ut truncus venæ cavæ, & ejus quæ circa portas est, ramus splenicus & mesentericus dictus, venæ emulgentes; item jugulares internæ; arteriæ magnæ truncus, carotides, emulgentes arteriæ, truncus arteriæ venalis, & venæ arterialis: utriusque venæ, & arteriæ rami iliaci & subclavii. Media vero sunt, in quæ rami iliaci & subclavii

Quid locus intra vasa.

Vasorum differentia secundum magnitudinem.

et duo.

humiditas
unum
aliquando

subclavii se dividunt, majores rami ad brachia & crura transeunt, vena jugularis externa; rami majores venae cavae per substantiam jecoris transeunt; item arteriae venalis & venae arterialis, qui per substantiam pulmonum disperguntur. Parva vero vasa in habitu corporis ubique consistunt, & per substantiam viscerum jecoris, lienis, intestinorum, mesenterii, pulmonum, renum, uterique, ac pudendorum, & habitus corporis exteriores partes disseminantur.

Secundum loca.

Loco variant quoque. Nam sunt quaedam cordi proxima, ut quae in thorace continentur majora vasa arteriarum & venarum; item truncus venae cavae & arteriae magnae descendunt, cum suis ramis iliatis & emulgentibus; vena circa portas, & si qui sunt alii rami ab his producti.

Connexio.

Connexio quoque eorum diversa est consideranda, quatenus ad hujus febris causas cognoscendas conducere potest. Quia vel vasa sunt cordi continua (in quo necessario accendi debet calor praeter naturam, qui in febribus à putredinis loco suscitatur) ita ut in ejus ventriculos se amplo foramine inferant; ut majores rami omnes jam nominati, qui in thorace & abdomine contenti sunt. Alii vero non sic connectuntur, ut in abdomine vena, quae circa portas jecoris sita est, omnesque ejus propagines; aspera arteria in thorace, omnesque ejus rami per pulmonum substantiam disseminati. Haec igitur sunt vasa, in quibus putredinalis materia solet contineri.

Locus putredinis, extra vasa quatuor places.

Locus vero, qui jam extra vasa dicitur, duplex est: unus, à practicis statuitur in habitu corporis; alter vero, in utroque ventre; nempe thorace, & abdomine. Qui in habitu corporis est, multiplex esse potest; caro, tendo, cutis, membranae, nervi; & si quae sint aliae partes similes, quae venae, & arteriae non sunt. Huc refer spacia intermedia musculorum & aliarum partium. In utroque ventre sunt extra vasa, parenchyma viscerum, membranae, pinguedo, praeterea cavitates naturales, ut quae in capsula cordis est, & inter pulmones & pleuram, in praecordiis, sed praecipue in ventriculo, intestinis, folliculo fellis, vesica, atque matrice in femiois: non naturales, ut vesicularum, quae in jecoris cava & gibba parte superficiali inter substantiam & membranam à fluxu humoris generari solent. His adjunge totam abdominis cavitatem, quae est inter peritonaeum & viscera. Nonnulli tractantes de febribus, per intra vasa intelligunt majora, quae inter alas & inguina excurrunt; per extra vasa, extra eadem majora: nonnulli per intra vasa, omnia intelligunt; per extra ea, quae jam commemoravi. Quid igitur sit extra vasa, & intra ea, satis explicatum est.

C A P. XIV.

An putredo sit in vasis, an extra vasa: & in quibus.

Sed an in utroque explicatorum locorum, an in alterutro Semitertiana consistat, jam declarandum est. Secundum quidem Galenum uterque locus esset huic assignandus, sed non omnibus propriae Semitertianae generibus. Nam in primi ordinis sui dicit Galenus, pituitam intra vasa, bilem vero extra ea in habitu corporis computrescere. Et in secundi ordinis, bilem intra vasa, pituitam

extra ea. In majori vero nostro Hemitritaeo, pituitam & bilem intra vasa: in minori, utrumque humorem extra vasa. Quia febrium intermittentium materiam extra vasa consistere ac ferri; continuarum intra vasa, semper docuerit. Haec autem genera Semitertianarum aut ex continua & intermittente, ut duo priora primi & secundi ordinis; aut ex duabus continuis, ut major; aut duabus intermittibus, ut minor componuntur. Similiter ex Galeni doctrina impropriae Semitertianae duplicem fomitem putredinis habebunt, unum quidem extra vasa in habitu corporis, alterum vero in aliqua parte inflammata, ut pulmonibus, pleura, jecore, splene, cerebro, aut aliquo alio viscere, quae symptomaticam antiquorum suscitare consuevit. Inter recentiores Doctissimus Fernelius, cum statuat omnium febrium intermittantium sedem & originem esse in prima corporis regione extra vasa circum praecordia, circum ventriculum, diaphragma, jecoris cava, lienem, pancreas, omentum, mesenterium; continuas vero primarias in vasis majoribus, quae inter alas & inguina excurrunt, opinatur in Hemitritaeo (per quem intelligit duo prima genera Galeni) focum putredinis esse extra vasa in prima regione: inde humoris putrefacti portionem penetrare in venas majores; majorem, quam possit dissolvere per urinas aut sudores (quemadmodum in intermittibus) sic soluta ex parte accessione manere adhuc febrilem quamdam inaequalitatem. Sed potius ex ejus jactis fundamentis esset opinandum, duo prima Semitertianae genera in vasis, & extra focum putredinis habere duplicem. In majori Semitertiana, in vasis majoribus: in minori seu quatto, eo in loco, in quo intermittens febrium originem posuit. Cornelius Gemma, eruditione & experientia nemini recentiorum Medicorum secundus, cum credidit intermittentes in venis; continuas vero primarias etiam pestilentes in arteriis collocari, symptomaticas seu secundarias in ipsis visceribus inflammatis & spaciis inanibus, ad quae jecor, venarum, arteriarumque ductus & oscula recta positione pertingunt, putredinis halitum ita continue ad cor transmittunt, concludit Hemitritaei pestilentis, quam exacte describit, praecipuam partem in arteriis, ac sinistri ventriculi cordis vicinia latuisse, etsi alium quendam seu praecedentem fomitem sui subinde, ex venis atque aliunde suscepit. Verum si ejus opinionem ad quatuor nostras Semitertianae species accommodare voluerimus, dicemus, duo prima Galeni in venis & arteriis consistere; majorem vero seu tertiam, in arteriis tantum; quartam vero seu minorem Hemitritaeam, solummodo in venis.

Ex qua sententia sequetur, omnes Semitertianas in vasis, non extra vasa putredinem suam habere, cui conclusioni & ego quoque assentior. Nam quotiescunque mecum reputo, quae in curationibus febrium putridarum, tam intermittantium, quam continuarum; quae in dissectionibus mortuorum ab iisdem febribus, praesertim à Semitertiana, observavi; toties nil aliud potui agnoscere, quam febrium intermittantium & continuarum periodicarum putredines semper in vasis consistisse, raro extra vasa; & ideo Semitertianae fomitem in vasis, sed ut plurimum minoribus me semper deprehendisse. Erant enim in dissectionibus cada-

veribus

Omnes Semitertianae vasis suam habent putredinem.

veribus inflammationes ex sanguine bilioso & pituitoso factæ circa jecoris cavam partem, in ventriculo, intestinis tam crassius quam tenuibus, mesenterio, omento, liene, & sæpius in una partium commemoratarum, aut pluribus; aliquando etiam in omnibus, quæ celeris mortis causæ erant, superveniente gangræna vel sphacelo alicui loco (etiam si quandoque exiguus esset) partium prædictarum. Iam qui à me curati fuere (si non alvi fluxus insignis præveniebat, aut locus inflammationis non esset admodum sensibilis, ut jecoris, lienis, pancreatis, mesenterii, omenti, intestinorum) dolores in ventre immanes, continui, certis plerumque horis se exacerbantes, vel intermittentes aliquamdiu eos affligebant, quod ex inflammationibus ventriculi & intestinorum ortos fuisse ex facto abscessu, sanie pureque, aut bile saniosa, & concocta per secessum vel vomitum redditis, certo sciebam.

C A P. XV.

Intermittentium febrium putredinem in vasis majoribus minoribusque consiisse, exemplis declaratur.

Exemplis (quæ inter plurima potiora elegi) illustriora nunc reddantur, quæ dixi; & primum quidem intermittentium febrium causam proximam me in vasis majoribus minoribusque deprehendisse: deinde continuas, quæ singulis diebus exacerbantur, in visceribus inflammatis sedem habuisse. Igitur à duplici tertiana juvenis quidam Germanus legum studiosus jam inde à sex mensibus oppressus, altera decem horas perdurante, altera citius fiente, nullum non, sed frustra præsidii genus expertus erat, præter venæ sectionem. Quam ob causam cum me accersiri jussisset primo ac secundo die febris natura diligenter perulustrata, utrique hypochoondri manus admovi, nec ullum tumorem notatu dignum tactu potui animadvertere. Tercio die à venæ jecorariæ dextri brachii sectione, qua septem vel octo uncias sanguinis educebantur ante paroxysmum aliquot horis, una febris tertiana, quæ nempe eodem die expectabatur, ægrum dereliquit. Quæ vero adhuc relinquebatur simplex tertiana, binis paroxysmis subsequenter æque validis ægrum molestant. Post quos cum eodem ipso die, quo expectabatur paroxysmus, horis ante ejus initium septem, venam internam sinistri brachii aperiri jussissem, & sex adhuc uncias sanguinis educere, levissimus paroxysmus supervenit, nec alius post hunc amplius comparuit. Quo igitur loco materiam duplicis hujus tertianæ fuisse existimabimus, ex quo tam prompte potuerit per sanguinis missionem evacuari, aut de suo loco commoveri? Sane non in alio, quam in vasis. Quamquam enim totum corpus sit transpirabile, id tamen tam brevi tempore efficere non potuisset, ut biliosa extra vasa collecta, per sanguinis missionem intra vasa raperentur. Neque est, quod quispiam dicat, id forte contigisse, ut utraque febris à venæ sectione evanuerit, quod in fine morbi eæ fuerint adhibitæ, & sponte, sine ullo remedio, plures morbi sic abire soleant. Neque enim mensem septimum ingressi eramus, neque adhuc bona signa concoctionis in

urinæ comparuerant, quæ concoxisse naturam humorem febrilem indicarent.

Anno millesimo sexcentesimo vigesimo famulus cujusdam nobilis Helvetii, ex gravi dysenteria per quatuordecim dies perdurante, cum febre quotidie circa vespæram exacerbante, in Semitertianam spuriam primi ordinis Galeni (quam duplicem tertianam continuam spuriam Medicorum vulgus appellat) una cum lethargo primum lapsus est: deinde cessante lethargo intermittens febris evasit, tumorque in jecore dolorosus ad tactum comparuit, nil proficientibus iis remediis, quæ interius ad obstructions hujus visceris tollendas præberi solent, & blande ventrem laxare. Quadragésimo die, etsi cum urinæ meliorem concoctionem, quam antea, monstrantibus, febris cessaret, vires nihilominus, præsertim animales collabi cœperunt. Etenim ad motum erat æger imbecillis. Tum rursus levis alteratio circa vespæram cum miti & obscura sub noctem mentis alienatione conspiciantur; nec quidquam corpus cibo reficiebatur. Sapor in ore valde dulcis, & carnis fastidium aderant. Die quadragésimo quinto duplex tertiana sincerior rediit cum vomitu bilioso, qui antea non erat visus, & nausea in fine paroxysmorum quæ matutinis horis affligebant. Quinta quagésimo rursus simplex tertiana facta est, quæ post binos paroxysmos evanuit. Sexagésimo nihilominus, ut prævideram, mortuus est. Diffecui cadaver, non tantum ut fomitem hujus febris inspicerem, quem in venis jecoris atque meseraicis consistere semper eram arbitratus; sed ut causam quoque perscrutarer, ob quam per quinque dies ante obitum ab omni febre immunis visus sit, quantum ex æquali & tardo pulsu, sanorum pulsilibus quam similimo, urinæ optimi coloris & substantiæ laudabilis, blando calore ac temperato interno externoque potui colligere. Inventa in eo est interna ventriculi tunica levi erysipelate inflammatorio affecta, jecoris ampla moles respectu maciei totius corporis sanguine sic vacua in venis majoribus, ut cum in magna frustra divideretur, vix aliqua sanguinis portio effatu digna ex ejus majoribus venæ cavæ & portæ propaginibus exiret. Ipse quoque truncus venæ cavæ, & quæ ad portas sita est, valde modicum sanguinem continebant. Sic & pulmones totumque corpus exangue videbantur. Venæ meseraicæ, & quæ ad ventriculum tendebant, atque omentum crasso nigroque sanguine refertæ erant. Omentum jam extenuatum, & præter membranas venasque nil omnino pinguedinis habebat, imo semiputrefactum erat ab inflammatione erysipelacea, seu phlogosi insigni, quæ in omnibus venæ portæ minoribus ramis sanguine contento adfuit. Pancreas obdurerat. Vesica fellea crassum humorem pituitosum cum atrabile permixtum continebat. Obstructus ejus ductus, qua vesica ad duodenum transibat. Omnes illi exigui meatus & ramuli, qui per substantiam jecoris à vesica fellea disperguntur, & per quos à jecore bilis in vesicam felleam permeat, pariter obstructi erant.

Ex hac historia constare unicuique potest, febrem hanc duplicem tertianam, & simplicem quoque in venis portæ quæ per jecoris substantiam, mesenterium, omentum, & ventriculum disper-

guntur, præcipuum suum fomitem habuisse: cum nulla alia esset pars, nullus alius locus, nulla cavitates extra venas, quæ biliosum humorem & pituitosum in se continerent: Ventriculus esset à bile vacuus, aut saltem interiore sua tunica levi erysipellate affectus. Ante obitum octo diebus, cum altera tertiana cessaret, vomitum meræ bilis passus fuit per biduum. Quod contigisse arbitror ab erysipellate ventriculi interno, fluxa in ejus internam tunicam bile à jecore per ramum venæ portæ galterepiploicam à recentioribus anatomicis appellatum, cum eam bilem natura per fellis folliculum expurgare non posset. Iecur enim copiosa bile refertum fuisse propter ramorum folliculi fellis & pori fellis obstructions arbitror, uti & alias venas majores minoresque per corporis interiora disseminatas. Sed hujus bilis colorem in vasis deprehendi non posse, quod flavus color quando cum atro vel rubro (cujus est sanguis in vasis contentus) permiscetur, comparere nequeat. Quod vero quinque diebus ante obitum sine febre fuerit, factum arbitror ob sanguinis in venis & spirituum vitalium penuriam. Nam in his calor nativus maxime viget, à quo putredinalis calor suum habet fomentum, non secus atque à solis calore is, qui in plantis est, aut etiam in nobis conservatur. Et hæc quoque est ratio, cur sæpe videamus oppressos febre pestilenti aut maligna antequam moriantur, pulsus habere ordinatiores & quasi à febre integros deprehendi, mente, qua alias erant alienati, magis constare & veluti ad se redire. Nam ob sanguinis & caloris penuriam in venis & arteriis, spiritus calore præter naturam non accenduntur.

Locus quartanae.

De quartanæ loco quid dicemus? cum sanguinis missio è salvatella sinistræ manus multos ab ea liberarit. Hujus rei testes non ignobiles esse possunt Galeatius, Valescus Tarantanus, Cardanus, & alii. Galenus lib. III de *Anatomicis administrationibus*, hujus venæ sectionem in lienis tumore commendavit (dummodo sinamus sanguinem fluere, quousque sponte sistatur) in quo quartanam consistere omnibus Galeni assensu notum est. Cæterum cum intumescit lien, non caro lienis, quæ parenchyma dicitur, in majorem molem excrevit; sed venæ & arteriæ, quarum innumerabiles per hoc viscus propagines disperguntur, adimplentur & distenduntur. Unde ejus præter rationem naturalis magnitudinis maxima in nonnullis moles cernitur. Quod & aliis quoque partibus molli substantia donatis, & venis atque arteriis quamplurimis accidere quoque videmus, ut testibus. Nam sanguine plurimo interdum adeo distenduntur vasa, ut tam parvas partes ad capitis infantis nuper nati magnitudinem excrevisse viderim.

Historia.

Elideus de Paduanis insignis præterito seculo practicus in nosocomio Bononiensi cadaver fecit mortui à diuturna quartana. In hujus corde, venis, omnibusque membris inventa sunt frusta magna, longa, alba, pituitosa.

Historia.

Lubet quoque hic commemorare, quod in uxore mercatoris Olmusensis Andræ Hieronymi ipse vidi. Multis annis hæc podagra detinebatur, quæ tandem omnes artus totius corporis invaserat, specie universalis arthritidis cum febre

continua: & jam per quinquennium continuo in lecto detinebatur. Podagra hæc à bile, pituita, seroso humore plurimo etiam cum portione melancholiæ generabatur. Horum humorum fluxio quotidie vel alternis diebus, vel quarto quoquo die aliquem articulum corporis invadebat. Hanc igitur mulierem cum ad statum talem trium mensium curatione reduxisset, ut quotidie de die surgeret, & in sedili se collocans marito (pecuniam emundis vendendisque mercibus distribuendo) opitaretur, rarisque in articulos fluxionibus tentaretur, & iis ita levibus, ut non amplius decumberet, circa finem æstatis ex meo consilio post exactam totius corporis purgationem fallæ chinæ decoctum alteratum cum cichoraceis, & nostræ antidotus podagricæ bolode glutita assumpsit, provocatis quotidie tempore convenienti sudoribus. Decimoctavo hujus curationis die, ex mulierculæ cupidam persuasione, aliquot cerasæ acida comedit, & cum alioquin circa ventriculum optime haberet, in quartanam simplicem eo die lapsa est, ob quam feliciter jam inchoatam curationem non ausa fuit absolvere. Hæc febre per aliquot septimanas perdurante, ab omni fluxione articulari libera fuit: at redeunte in pedes fluxione quartana cessavit. Sic quatuor mensium spacio, quo quartanæ tres recidivæ à me fuerunt notatæ, antequam in totum ab his liberaretur, quæ paucis, nempe tribus aut quatuor paroxysmis constabant, iis diebus, quibus à febre quartana libera videbatur, supervenerunt dolores in aliquo articulo, maxime vero in genu & pedis sinistri, hisque rursus cessantibus quartana invadebat. Qui extra vasa loco quartanæ in hac muliere statuere volunt, quæ mihi indicent causam, cur tacito à partibus externis ad internas, & ab internis ad externas transigere potuerit. Scio quidem totum corpus esse transpirabile & porulis multis transmeabile, imo spongiosum undique, ut humor qui extra vasa est, intra ea rapi queat, ac rursus ex iis foras ad quævis alia loca propelli, maxime si aliquo modo tenuis sit, qualis erat in hac quartanaria. Scio præterea, in distributione chyli materiam per exiguos meatus intestinorum in venas & arterias mefæricas deferri, ac hinc per totum corpus distribui. Sed tamen humorem, qui in articulos decubuit (partes valde frigidas) & eos præsertim, qui sunt à corde remotiores & extra vasa circa ligamenta, non censeo tam repente posse in vasa recipi, deinde ad interna viscera penetrare, ac extra vasa profundi, & iis iterum repelli in vasa & ad articulos extra vasa deponi: sed in ipsis vasis circa articulos depositum recurrere in vasa alicujus visceris aut plurium sub abdomine contentorum (quorum tamen nullus ad tactum mihi humor comparuit) & ad tempus imbi conservari, hinc rursus cum impetu naturæ ad externa loca protrudi existimo.

C A P. XVI.

A continuis febribus sublatorum historice duæ memorabiles, & eorum dissectio, quæ putredinis locum monstrant.

Cæterum neminem eorum, qui quotidiana febre intermittente obiisset, dissecui; sed plures,

plures, qui febre quotidie sese exacerbante, præcipue circa vespèram aut statim post meridiem, in modum duplicis tertianæ continuæ vel semitertianæ, perierunt. In his putredinem non in venis majoribus quæ inter alas & inguina excurrunt, sed in inflammato alicujus primæ regionis viscere vel alia aliqua recondita parte, inflammatione paulo minori, quam ut dolore ab ægro, vel tactu hypochondriorum à Medico & ægroto nosceretur.

Nobilis juvenis Belga, Dominus de Vilers Comitibus Hoochstratenfis Cubicularius, cum prius in dysenteriam & febrem continuam lapsus esset, quæ quotidie circa vespèram cum levi frigore crescebat (duplicem tertianam tum Medici appellabant, per superingressum paroxysmorum; ego vero Semitertianam spuriam primi ordinis Galeni; erat enim altero die major accessio cum horrore; altero minor cum frigore pene eadem hora) post octiduum, à febre & dysenteria liberatus est, optimis urinis colore & substantia ac hypotasi alba, levi & aequali per tres dies subsequenter. Undecima rediit febris continua, non sine suspitione alicujus malignitatis. Nam pulsus eam longe mitiorem (cum essent minus celeres, frequentes & inæquales, quam antea) ostendebant, & lingua nihilominus erat arida, sitis & delirium obscura aderant; parvæque de ventre, quando manum abdomini apprimebam vehementius, querelæ. Quarto à recidiva rursus per tres dies integer à febre fuit. Unde recidiva comparuit, qua cum neque mente constaret, neque multum febrilet, lingua nihilominus arida existente cum urina sanorum simili, tetano correptus rigidus ac gelidus, ut mortuus nulla respiratione conspicua ab astantibus accensis prius cereis, electo in mensam deferretur. Ego cubiculum ingressus cum ex valido pulsus, quem adhuc mane tetigeram, & virium paulatino lapsu, febrisque lento motu mihi persuadere non possem, ægrum mortuum, manum carpo non sine cacinno muliercularum adstantium admovi, pulsus vix perceptibilem notavi, jussique ut rursus in lectum deferretur, pannis ligneis calefactis frictiones extremis partibus adhiberentur.

Ab his post tres horas reviviscere coepit. postero die cavens sibi, ne ab intestato moreretur, tabellionem vocavit, dieque subsequenti, qui, si recte memini, vigesimus fuit, vitam cum morte commutavit. In dissecto cadavere reperta sunt intestina tenuia inflammata, ileum qua colo & cæco adhærebat, sphæcelatum. Pulmones quidem male affecti, sed citra inflammationem aut putredinem, unde horum pravam dispositionem, quæ frigida & humida videbatur (a qua temporis tractu phthisici & cachectici evadunt, corrupta substantia pulmonum) nequaquam mortis causam esse conjeci (cum simili pulmonum malo laborantes ad quatuordecim & plures annos sine febricula vitam protraxisse conspexerim, inspectis post mortem eorum cadaveribus, qui ab alia febre acuta perierant) sed solam inflammationem, quæ intestina à morbi initio occupaverat. Unde hi circuitus, hæc recidivæ. Vel quia materia inflammationis non commovebatur, nisi quando per intervalla emittebat putridos vapores per arterias ad cor: vel quia partes principes per intervalla commotæ à

materia, quam continebant, ad intestina protrudebant, & recidivas tales, quales commemoravi, procreabant.

Similis fere anno millesimo sexcentesimo vigesimo casus contigit in generoso adolescente Philippo Barone Sancti Germani Gallo ac Domini Plessæi ex filia nepote. Is enim temperamenti calidi & humidi annum suæ ætatis decimum septimum ingressus, quinto Maji, cum antea, dum integra valetudine se frui putaret, siti quadam continua premeretur, & suspiciosus esset, de febre continua levi cum capitis dolore in itinere, quo Mantua Patavium tendebat, questus est. Febris primum continens visa est. Sed quarto die periodos habere coepit, naturamque duplicis tertianæ spurie induere. Circa horam vigesimam primam, id est, tribus ante vespèram quotidie accendebatur, prægressa levi quadam partium extremarum refrigeratione, quæ alternis diebus erat major, non sine aliquo interdum horrore. Semitertianæ spurie præscriptæ in præcedenti historia modo. Statum accessionis protraxit in quartam, quintam, interdum etiam sextam noctis horam. In fine undecimæ hæc febris per quinque vel sex horas prorlus intermisit. Idem contigit decimatertia. Decima quarta in totum liber à febre usque ad decimam septimam, qua recidivam passus est, valido & longo circa vigesimam horam invadente paroxysmo cum frigore per quatuor horas perdurante, ac febrili calore validissimo tota nocte perseverante. Die vigesima facies cadaverosa, pulsus fere languidi, urinae subjugales, inconcoctæ, lingua arida, nigricans. De nullo ventris dolore conquectus est. Tamen de eo singulari studio sæpius à me fuit interrogatus. Animadvertēbam enim clysteres injectos nil facis educere, sed meram clysteris materiam sine excrementis prout injecta erat statim vel modico post injectionem tempore exire. *quod mihi signum inflammationis intestinorum in ejusmodi febribus solet esse frequentissimum.* Ab his mentis alienatio die vigesimoquarto successit. Vigesimo septimo, ingruente magno paroxysmo, expiravit. Dissectum à me cadaver fuit, ut embarratibus condiretur. In eo tenuia intestina inflammata vidimus, præsertim tunica eorum interiore. Ilei portionem magnam versus colon prorlus sphæcelatam. Interior intestinorum tenuium tunica, qua parte extremitates venarum meseraicarum terminabantur, duris quibusdam excrescentiis carneis, flavo colore ac fusco præditis, pluribus in locis per brevem intervalla dimidiæ aut paulo amplius spithamæ laboravit, majoribus excrescentiis in ileo, minoribus in jejuno. Iecoris cavæ partis portio inflammata fuit. Vesica fellis loco bilis aquam limpida, claram cum exigua portione muci & alterius materiæ, quæ luteum ovi coctum ac nonnihil cum mucoso humore dissolutum referebat, copiose continuit. Porus felleus, qui ex vesica ad intestinum duodenum perducitur, duorum digitorum transversorum longitudine, statim à vesica fellea usque adeo obstructus fuit, ut in solidum corpus conglutinatius videretur, nec apicem specilli tenuissimi admitteret. Ab hoc obstructo ductu meatus reliquos felleus apertus, satis ampla cavitate in duodenum intestinum transivit, & ab hoc recto satis tramite in cavam jecoris partem, perque ejusdem substantiam

tiam multis ramulis ac furculis cavis & obstructione omni vacuis transiit. Hinc certa conjectura mihi constitit, bilem non in vesicam felleam à jecore, sed in hofce ramulos ac furculos à natura ad intestinum duodenum detrufam fuiffe: & ob præclufum ejus ad vesicam felleam iter (in qua tanquam in penu ad tempus conservari bilis solet) factum esse, ut, cum bona valetudine frui se putaret, ea in jecore ac venis diuturniorem moram traxerit, & sic ultra modum calefactæ atræ bilis naturam induerit, aut per ramos mefentericos ad jejunum & ileum intestina diverterit, eorum internam tunicam prius leviter exulcerarit: inde ex eorum ulceribus carunculae excreverint, viscofa ob humiditatem pituitofam, quales cotyledonibus ovilli foetus adherere confueverunt, sed paulo rubundiores & ut mihi apparebant primo intuitu, non expertes cancrofa malignitatis. Patet hinc etiam causa debilitatis tenuium intestinorum, ob quam facile fluxiones fufcipere potuerint, quæ inflammationes eryfipelatofas & gangranas ac fphacellos procreant: cur quoque tempore fanitatis fere femper bibendi quidam appetitus adfuerit. Nempe ob levem phlogosim, quam in jecore ob retentum biliosum excrementum, & in tenuibus intestinis circa hafce carunculas femper adfuiffe putandum est. Pulmones quoque haud erant naturalis coloris ubique, sed in locis quibusdam inflammati, & coftis utroque in latere annexi. Cerebri ventriculi aqua limpida pleni, ut & initium spinalis medullæ; tum cerebri superficies, exteriorefque anfractus pia meninge veltiti ac fefti eandem aquam plurimis in locis continebant. Cæterum nulla neque in cerebro, neque in ejus meningibus inflammatio notata est. Vena cava & arteria magna fanguine fic erant vacuæ (quanquam ultra viginti uncias fanguinis ex variis partibus tempore curationis haud memini ductas) ut cum cadaver diffecarem, non fuerit opus filo venam cavam & portæ truncum dum exenterarentur, intercipere, quemadmodum in aliis cadaveribus fieri solet, in quibus metuimus ne fanguis ex prædictis majoribus vasis effluens reliquas abdominis partes inquinaret. Vnde fatis liquet, febris Semitertianæ vel duplicis tertianæ continuæ per fuperingreffum paroxyfinorum, ut Scholæ loquuntur, causam in utroque agrotto non fuiffe putrefactum fanguinem in vasis majoribus, aut bilem putrefactam in iisdem, cum admodum modicus & vix ad vitam necessarius in iis contineretur, sed inflammationem in iis contineretur, sed inflammationem in iis contineretur, sed inflammationem in iis contineretur, cum effet fanguis biliofus & pituitofus, fua putrefactione effecit motum, quo fingulis diebus alternilque validiori periodo accenderetur.

C A P. XVII.

Semitertiana propria an fit symptomatica, an primaria, & cur eam primariam fcriptores fecerint.

QVapropter cum eas febres, intermittentem fcilicet & continuam, ex quibus Semitertianam componi dixi, in vasis putredinem habere compertum fit, fequitur & ipsam Semitertianam in iisdem putredinem suam habere. Quispiam tamen contra hanc sententiam non leve argumen-

Objeftio.

tum objicere hoc potest. Si febres, ex quibus Semitertiana componitur, symptomaticæ sint, fequitur & ipsam esse symptomaticam non primariam, & per consequens putredinem ejus non confiftere in vasis. Quod autem tertiana & ea, quæ quotidie accenditur, symptomaticæ sint, probatur ex eo, quod ab alicujus membri inflammatione fuscitatae fuiffe videantur, ut patet ex diffecctione cadaverum propofitorum. Nam si symptomaticæ sint quæ ab inflammatione membranarum cerebri aut coftas fuccingentis, pulmonum, jecoris, lienis, aut partis alicujus externæ internæve vulneratæ, quæ à bubone & anthrace accenduntur, cur non etiam symptomaticæ dicentur quæ ab inflammatione intestinorum, mefenterii, mefocoli, omenti, ventriculo originem habent? Sed & ab ipsa Semitertiana mortui & aperti non alium fomitem febris ostenderunt, quam dictarum partium in abdomine contentarum inflammationem. Hanc autem non fuiffe simplicem aliquam phlogosim fuscitatam ab obstructionibus harum partium, sed veram inflammationem probant abfcessus, gangranæ, fphaceli in vivis & mortuis ab hac febre confpecti. Respondet, vasorum & febrium symptomaticarum nomine nos multa intelligere poffe.

Per vafa enim aliquando tantum ea capimus, quæ majora sunt & inter alas & inguina excurrunt. In qua fignificatione multi acceperunt, quando ajunt febres continuas primarias in vasis confiftere. Aliquando capimus vafa tam majora quam minora cujuscunque partis indeterminatæ, & hujus aut illius visceris. In hac fignificatione nos capimus vasorum nomen, quando dicimus Semitertianæ putredinem esse in vasis. Nam etiamfi partis alicujus inflammatione accendatur, hujus tamen partis venæ fcilicet & arteriæ humorem, ex quo Semitertianam fuscitari dicebamus, continent putrefactum; cujus etiamfi portio aliqua fit, quæ effundatur extra vafa, & quandoque fic abfcessum pariat, illa tamen portio febrem non accendit, sed quæ in extremis vasis partium cavitatem præternaturalem (quam sibi, velut in abfcessibus fieri solet, portio ista humoris putrefacti paravit) circumambientium contineri confuevit putridos vapores per arterias, quæ femper patent & venas ad cor mittunt, fi quando continuo iste humor putrefactus accendatur.

Per febrem symptomaticam aliquando intelligunt Medici febrem, quæ extra vafa in proprio aliquo & præternaturali fpatio solet contineri, ex quo accenso accenduntur venæ & arteriæ quadam continuatione, abfque eo quod putridus vapor ad cor permeet. Verbi gratia, contufio infignis in capite facta fit, ob quam fpatio non modico, præternaturali tamen, concluditur fanguis extra vafa ob earum contufionem effufus, qui prius grumefcat, mox putrefcat & ad fuppurationem tendat. Ex hujus putredine contingit continuatione quadam venarum & arteriarum, accendi febrem, quæ vere est symptomatica; quia in vasis non confiftit. Rursum aliquando accipitur febris symptomatica pro non modo hac, sed etiam ea quæ putridos vapores ad cor mittit per vafa, fuscitatos à partis cujufvis inflammatione vel putredine & corruptela fubftantiæ, vel infigni aliqua obstructione facta in vasis. Aliquando capitur febris symptomatica

Responsio.

Quid per vasa intelligatur.

Quid per fpatium intelligatur.

matica pro omni febre, quæ extra vasa majora putrefactum humorem continet. Quandoque rursus pro ea febre, quæ fieri solet ab inflammatione viscerum & partium earum, quarum curationem nobis veteres proposuere; ut est quæ comitatur phrenitidem, anginam, pleuritidem, peripneumoniam, nephritidem, hoc est jecoris, lienis, & renum notabiles & per sua declarata signa maxime conspicuas inflammationes.

In hac significatione nos capimus febrem symptomaticam, quando supra dicebamus Semitertianam improprie constare ex febre symptomatica quæ quotidie exacerbatur, & tertiana intermittente. Quapropter valet, quod putant consequens; si est febris symptomatica, ergo putredo non est in vasis, nempe si in prima significatione accipiamus febrem symptomaticam nomen. Sed in aliis significationibus falsum est.

Illud quoque hic non est omittendum, quod si diligenter consideraverimus ex quibus locis & per quas vias talis humor fluat, qui facit inflammationem membrorum ex qua Semitertianam fuscitari dicebamus, non alias inveniemus, quam vasa majora; interdum & ea, quæ per carnes corporis disperguntur, quando ab iis humores deferuntur ad vasa majora, quæ inter alas & inguina excurrunt. Contingit autem in his aliquando, priusquam depellatur ad membra inflammanda, non levem putredinem fuscitari, aliquando sine putredine in partem determinatam decumbere ac inibi putrescere. Quatenus igitur & in majoribus vasis putrescit & in minoribus, eatenus iis qui symptomaticam nominant eam febrem, quæ in minoribus vasis putredinem tantum habent partis alicujus determinatæ, acipitis erit generis Semitertiana. Sed appelletur quis Semitertianam primariam an symptomaticam parum laboro, dummodo constet ejus putredinem in vasis omenti, mesenterii, ventriculi, intestinorum, & aliarum ejus partium inflammatarum me deprehendisse. Veteres autem atque recentiores plures Medicos hanc inter puras primarias retulisse censo, quod nulla manifesta signa erysipelatis conficerent, aut inflammationis alicujus membri, ex quo symptomaticam febrem provenire putabant. Neque enim adfuit signa pleuritidis, anginæ, vel peripneumoniarum, phrenitidis, hepatidis, splenitidis, nephritidis, aut ejus febris quæ vesicæ vel uteri inflammationem concomitari consuevit. Signa vero inflammationum eorum membrorum, quæ in Semitertiana observata fuere, plerumque omni tempore obscura sunt, sed maxime morbi initio: quod contingit vel quia putridus humor prius in vasis majoribus continetur, & inde ad minora partium determinatarum fluit; vel ob parvam partis inflammationem, & spacio exiguo in parte affecta circumscriptam; Verbi gratia, cum jecoris, ventriculi, intestinorum tantum portuicula aliqua inflammatur, ob partis affectæ obcurum sensum, ut pancreatis, mesenterii, mesocoli, omenti, cavæ jecoris partis & lienis: aut propter abdita & profunda loca, in quibus partes inflammatae reconduntur, ob quæ ad tactum nullus tumor compareret: aut quia mens patientis ægrotat; unde aliqua in parte dolorem, quem alias mente constantes percipere deberent,

non sentit: aut denique quod, cum in hac febre statim periodis exacerbationes fiant, & quotidie & alternis diebus, omnes autores hæcenus existimaverint eas fuscitari non posse à partis alicujus inflammatione, maxime vero intermittentem tertianam vel quotidianam.

C A P. XVIII.

Intermittentem febrem dari symptomaticam.

Tale enim axioma nunc receptum est ab omni Medicorum schola; *Symptomatica febris omnis in continuarum est genere, neque ulla unquam visa est intermittens.* In hac sententia, si per symptomaticam febrem intelligerent tantum eam, quæ in phrenitide, angina, pleuritide, peripneumonia, magnis jecoris lienisque inflammationibus conspicitur, non invenirem quod reprehenderem, sed quoniam multi horum etiam eas intelligunt, quæ ab obstructionibus & putredinibus partium, & quavis partis alicujus inflammatione fiunt, nequeo subscribere eorum sententiam.

In Marcelli Donati historiis mirabilibus lib. v. cap. xv, legi, Iacobum Hebræum percussum vulnere transversali in musculum temporalem incidente; septima die supervenientibus rigoribus, usque ad quadragesimum quintum diem riguisse, & quotidie fere semper sudasse alternatim rigoribus succedentibus sudoribus. Fuisse hanc intermittentem febrem à vulnere factam, patet per aphorismum Hippocratis quando scribit lib. iv. aph. lxxiii. *Quibus in febribus quotidie rigores sunt, quotidie febres solvuntur.* Non ipsi observavimus intermittentem febrem in ischiade alternis diebus invadentem; & quæ ex obstructionibus viscerum oriuntur tertianæ longæ & quartanæ, tertianæque duplices, quid aliud sunt quam eorum symptomaticæ.

Desid. Iacotius in comm. ad Coscas prænotiones Hippocratis, scribit se in puellæ dissectione cadavere, quæ in levem quandam febrem incidere, tertianæ intermittenti haud dissimilem, sine dolore ventris, in ventre abscessum perruptum, à quo obituras præviderat, invenisse, magna puris quantitate circa uterum reperta, quæ ad superiores usque partes redundabat, cum intestinorum colore subnigro. Et uno anno observavit in febre tertiana, cum rigore non ita ordinato, exortam suppurationem in imo ventre, cujus nullum signum memoratu dignum præcesserat: unde subito effuso pure supra intestina, aut intestinis ipsis ad sphacelismum perductis, improvise mors secuta est, cum rigore, sudore frigido, animi deliquio, dolore ventris, & inflatione.

Ex corruptione & putredine pulmonum quotidianos circuitus notavi, non tantum continuos, sed etiam intermittentes. Hippocrates lib. v. Coscar. Prænot. Sect. ii, aph. lxxiii, hæc docet: *ei δὲ ἐμπύην πυρετὸν ἀσθενέστερον, ἐφ' ὃν ἔντας οἱ μὲν οἱ εἰσι. Ὁβ. suppurationem febres intermittentes pleraque sudorifica sunt.* Quod verissimum esse in praxi, quæ circa bubones venereos hac tempestate quotidie occurrunt, discere unusquisque potest. Etenim apparent sapissime ex his ortæ febres intermittentes quotidie cum horrore vel frigore invadentes, ac cum sudore perfecte interminantes.

C A P. XIX.

De causis antecedentibus (humoribus nempe)
& putredinem efficientibus.

INter antecedentes causas duæ præcipuæ sunt recensendæ, videlicet humores biliosi ac pituitosi, ut plurimum copia peccantes, aliquando etiam qualitate, quæ aptæ redduntur ad suscipiendas tales putredines, quæ typum Semitertianarum efficiunt; & ea, quæ putredinis est opifex primarius, quam alii obstructionem, aut constrictionem meatus cutis; alii vero viscerum interiorum obstructiones esse volunt. Humores biliosi & pituitosi in venis & arteriis omnibus per totum corpus disseminatis possunt contineri, at sæpe in aliquibus, & iis præcipue, quæ inter alas & inguina excurrunt, majoribus. Cum tanta est horum humorum copia, ut in omnibus vasis consistant, febre Semitertiana instante, maxima eorum portio ad interiores partes, ut ad ventriculum & cavitates intestinorum, aut alias his circumstantes protruditur per vasa majora, quæ inter alas & inguina posita sunt. Quod si minor sit copia, & quæ tantum in hisce jam dictis vasis consistit, in aliquam aut plures earum, quæ à propaginibus venæ portæ nutriuntur, decumbit, atqueam putrescat, aut cum jam incepit putrescere.

Vitæ meatus
guttur.

Generantur hi humores biliosi & pituitosi in vasis majoribus, ac quandoque etiam minoribus, partium determinatarum, cerebri; jecoris, lienis; ventriculi & intestinorum cavitatibus. Quando intemperie calida frigidave laborant, aut nimio ac pravo cibo aggravantur, aliæque ad hanc inducendam intemperiem causæ concurrant. Iam & obstructiones viscerum, ut jecoris, producant copiam bilis excrementitiæ, quoties non habet liberum exitum in vesiculam felleam, & inde per porum suum proprium in intestina. Quod si & is comprimatur porus à nimio cibo, aut aliis adjacentibus partibus induratis, ut colo intestino; contingit in venis plurimam bilem coaceruari, nisi per ramos venæ portæ in intestina tenuia prorumpat per biliosum alvi fluxum. Hæc ratio est, cur qui obstructionibus laborant viscerum, hinc febri sint magis obnoxii.

An bonum
corporis habi-
tum per con-
tagium inva-
dere queat ta-
lis febris.

Oportune hic aliquis querere potest, an bonum corporis habitum per contagium invadere queat talis febris. Cum enim in hoc massa sanguinea sit nulla cacochymia inquinata, videtur ab hac febre immunis esse talis habitus. Respondeo contagiosas Hemitritæas aliquando etiam invasisse optimum corporis habitum, sed tunc sanguinem putredinis contagio converti in talem cacochymiam, quæ apta est producere Semitertianas biliosas. Tempore pestis sæpe conspicitur totus sanguis optimi habitus conversus in bilem flavam, viridem, atram. Eorum qui à vipera demorsi sunt sanguis bilefcit. Argumento sunt excretiones biliosæ, quæ compa-

Nota.

rent iis, qui superstites manent per alvi fluxum, interdum etiam per sudores. Hoc tamen omnibus, ut arbitror, in confesso est, Semitertianam primo & citius invadere ac gravius qui cacochymiam in vasis foveat biliosam & pituitosam, quam qui ea carent. Novi mulierem viginti quatuor annorum, calidi ac humidi temperamenti, cum subdominio pituitæ diminutis mensibus, cancro insigni laborantem in clune dextro, progenito ex stœatomate ab imperito chirurgo male incisio, dum in domo decumberet, in qua omnes maligna Hemitritæa & plurimi ejus familiæ lethali afficiebantur, ab eadem febre immunem non fuisse, etiam si per ulcus quotidie multa sanguinis copia & sanies proflueret. Existimasset unusquisque haud fieri posse ut ob tantam humorum pravorum quotidianam evacuationem putredo in vasis aut aliquo viscere generetur, apta ad Hemitritæam producendum. Et tamen hæc misere per tres menses eandem recidivas & mutationes febrium passa est, quas aliæ ejusdem domus, quæ superstites mansere. Id tantum beneficii excretio humorum pravorum quotidiana per cancrum causavit, quod malignitatis signa obscuriora videbantur.

Causa antea
dens postur.

Sed de priori causa antecedente hæc satis, venio nunc ad posteriorem, quæ duplex est apud autores: cutis meatus nempe constriction vel obstructio, & viscerum obstructio vel eorum meatus constriction. Interdum utraque hæc concurret, interdum alterutra. Nam perspiratione corporis impedita, si id cacochymum fuerit, humores in vasis accenduntur atque putrescunt. Imo qui Galeum sequi se afferunt, omnium putridarum febrium putredinem prægredi, ac cum ipsa permanere ajunt retentionem transpirabilium & vapororum excrementorum per cutis poros, quæ sit vel quando densatur cutis ab intrinsecis & extrinsecis; vel quando obstruuntur à viscidis humoribus. Dixi ab intrinsecis densari ac contrahi, quando acris aliqua materia vel alterius qualitatis naturæ molesta stimulat ad excretionem à valida vi expultrice partium externarum & ad partes internas, & præcipue ventriculum ac intestina protruditur. Ita videmus temporibus æstivis purgantia medicamenta & fluxus alvi spontaneos, sudores inhibere, cutisque poros ac totius corporis habitum constringere. Inter viscera, quorum quoque meatus constringuntur in hac febre, solent à me præcipue numerari intestina & ventriculus in suis cavitatibus: quando pituita astringente aut frigida interna eorum tunica oblitur, vel cibis adstringentibus refrigerantur. Vasa meseraica & ea, quæ per jecur & lienem & pancreas transeunt, tum angustantur ob eandem causam, tum obstruuntur; maxime vero fellis porus ad intestinum duodenum transiens, & ejusdem meatus per jecur dispersi. Obstruuntur quoque omnes hi ductus à crassis & pituitosis humoribus.

FINIS LIBRI PRIMI.

A D R I.

SEMITERTIANA

LIBER SECVNDVS.

Causas externas, signa diagnostica & prognostica
prosequitur.

C A P. I.

De aëre calido humido, & inequali.



Vanquam omnes morbo-
rum causæ, quæ externæ
vocantur, concurrere ad
generationem hujus febris
queant, duæ tamen sunt
præcipuæ, quæ hanc pro-
creant: aer scilicet, & vi-
sius ratio. Aer, de quo prius
sermonem institui, debet
esse calidus & humidus, atque inæqualis. Galenus
Hemipteraam febrem Romæ frequentem esse scri-
bit, & in Æthiopia, totoque littore tractuque ter-
ræ, ubi calum est calidius cum adventitia humiditate.
Videtur aliquibus his verbis innere cælum debere
prius esse calidum, deinde supervenire ei oportere
humiditatem, & sic aërem calidum & humidum fa-
ctum hanc febrem progignere.

Ego per cæli caliditatem non existimo eum in-
telligere insignes calores & continuatos, quos
squalores nonnulli appellant, quia tales non sunt
semper Romæ, nec in aliis multis frigidis regionibus,
in quibus hic morbus est frequens, Austria,
Pannonia, Moravia, & hinc finitimis tractibus, in
quibus veris initio, sole nondum æstuante, talem
febrem epidemicam incepisse vidimus, & magis
vernīs temporibus, quam æstivis (quibus tamen
sol est calidior) continuasse. Et sane calores in-
signes non solent esse cum multa humiditate, qua
aer præditus esse debet, conjuncti.

Per adventitiam humiditatem meo quidem judicio
Galenus non intelligit aliam, quam quæ accersitur
à natura climatis cæli. Qualis est, quæ à ventis non
naturalibus in aliquam provinciam pellitur, vel
à vaporibus à terra elevatis suscitatur, concurren-
tibus ejus anni constellationibus ad istius humidi-
tatis proventum. Romæ, ratione climatis, debe-
ret esse temperatus aër, in Æthiopia calidus &
ficcus; & tamen cælum Romanum æstate & au-
tumno nebulosum est. Narrant nostri navigatores,
in insula Divi Thomæ, quæ sub linea æquinoctia-
li sita est, atque in Guineæ Africanæ regno, ubi
Æthiopum maxima pars habitat, multis vapo-
ribus à mari per solem attractis, quo tempore sol
meridianus verticem tangit, cælum nebulosum esse
& valde pluviosum, nec ventosum: inde febres
continuas ipsis esse familiares, quæ alternis diebus
validiores sunt, & ut plurimum per viginti dies

perdurant: advenasque nautas ejusmodi febris
(quas per signa ab aliis mercatoribus relata putò
Semitertianas esse) ut plurimum perire. In Au-
stria, Moravia, Pannonia, locisque his proximis,
mane & vespere vapores à terra elevantur, qui si
non à ventis mane abigerentur, usque ad tertiam
diei partem commorarentur, & præter naturam
aërem humectarent in perniciem incolarum maxi-
mam. Siquidem sol, validis regnantibus ventis,
aërem æstivum (qui valde calidus in iis locis non
est) contemperantibus, non potest matutinis suis
radiis derepente vapores & nebulas discutere. Ita-
que si quando contingit ventos in hisce regionibus,
aliquo anno præter morem ejus regionis sile-
re aliquandiu, tunc etiam accidit frequens & popu-
laris Semitertianarum invasio. Hinc natum est
apud eos, qui Austriam incolunt, proverbium:
Austria; ventosa; si non ventosa, venenosa.

In medio veris & in fine pluvias per quadraginta
dies & amplius perseverantes Semitertianas popu-
lares in omnibus fere regionibus, tam temperatis;
ut Italia, quam frigidioribus, ut Austria, Mora-
via, Istria, Styria, & aliis attulisse observavi statim
in principio æstatis. Anno millesimo sexcentesimo
vigesimo primo, ab æquinoctio verno usque ad
principium æstatis pluviae continuæ erant Patavii;
Vicentiæ, Veronæ, Venetiis, aliisque urbibus hinc
propinquis. In agro Patavino cum pluviae ultra
mensē perdurassent, adeo frequentes Semiter-
tiane visæ sunt, ut nullam sinceram tertianam ob-
servare mihi in centum agris licuerit. Omnes quæ
exacte Semitertianæ signa non habebant, obscu-
rioribus notis ejusdem spuria quodammodo inva-
debant. Et quo magis hæ pluviae perseverabant;
eo etiam maligniores hæ febres fiebant, & magis
contagiosæ atque lethales. Venetiis tamen eo tem-
pore, quo Patavii grassari incipiebant, non con-
spiciebantur (cum tamen hæ duæ urbes haud pro-
cul à se invicem distent) sed cum veris finis instaret.
Nam urbs Patavina non procul à montibus
sita est. Vnde non tantum pluvius continuus ejus
aër, sed etiam à nive in montibus liquefacta, intu-
mentibus extra alveum fluminibus & agros inun-
dantibus, duplicata humiditate inquinabatur;
quod Venetiis non contigit. Nam pluviae est hic
quoque frequentes essent, non tamen poterant
aërem multum humectare, quod pluviae cadentes
in civitatem in mare defluebant, & per æstus ma-
ris abluebantur ac deferebantur. Tandem cepe-
runt etiam Venetiis serius comparere, ob nebulas
à ventis

*Febres Semi-
tertianæ Aug.
no 1681, in
Italia fuisse
frequentes.*

à ventis istis à continenti propulsas. Verum pauciores, quam Patavii, Semitertianæ vigeant, & citius cessant.

Hinc patet causa, cur omnium citissime & frequentissime huic febri obnoxii sint, qui in vallibus habitant & prope magna flumina, & quæ frequentius loca plana & pascua vicina inundant, & circa magnos lacus ac piscinas aëdes suas habent: contra qui in collibus ac montibus degunt, magis ab hac febre sint tuti, aut serius minisque malignæ ac populariter ea molestantur. Hoc in Austria, Moravia, Pannonia, finitimisque regionibus verissimum esse comperi. Nam maxima harum regionum pars montosa est, aut collibus aspera; pagi & urbes pleraque in vallibus aut planitiebus inter montes sitis constructæ sunt; quo aquis, quibus indigent ad vitam commodiorem, abundant, & à ventis, qui iis validissimi sunt & asperissimi hyemalibus mensibus, tuti sint. Ideo aeris frequens adeest vere & æstate humiditas. Vere quidem, quod è pluviis & nivibus liquefactis, quæ solent esse multæ, terra supra quam calas ædificant, plurimam humiditatem absorbeat. Æstate vero, quia ab hac humiditate plurimæ vesperi ac mane excitantur nebulae; quæ propter montes, si à meridie sint, neque à sole; si vero à septentrione & ortu, neque à ventis commode possunt discuti. Autumno vero minus ab hac febre in iis locis agri molestantur, quia frigus in istis regionibus cum pruina cito oritur, quæ refrigerant & exsiccant adventitiam aeris humiditatem.

Hippocrates *libr. 1. Epidem. sect. 11.* scribit in Thaso autumno & sub hyemem Semitertianas plurimis incolis factas ex tali anni constitutione: *Ante autumnum, iniquis, tempestates non tempestive, sed derepente aquilonis & austrinis multis humida, & præcumpentes. Huiusmodi vero durabant usque ad pleiada & sub pleiade. Hyems autem aquilonia: aque multe, large, magna: nives. Plurimumque mixta aëri serenitas: & hac quidem fiebant omnia: frigora vero non admodum intempestiva. Iam vero post brumale solstitium: & quando frons spirare incipit, posterior hyems magna erat, aquilonia multa. Nives & aque assidue, multe, celum procellosum ac nubilum. Hac autem durabant, & non remittebant usque ad æquinotium. Ver autem frigidum, aquilonium, aquosum, nubilum. Aëstas non valde aestuosa fiebat. Etesia assidue spirarunt. Mox circa æstivum in aquilonis aqua valde multa.* Hæc sunt Hippocratis verba, quibus etiam docere videtur anni præscriptam constitutionem humidam quidem fuisse, sed frigidiorem, quam regioni de more solito competebat. Hoc addere adhuc libuit ut, quod supra dixi, confirmarem auctoritate Hippocratis, ad aeris constitutionem, quæ Semitertianas facit, non requiri magnum æstus, sed insignem humiditatem. Dixi etiam aerem inæqualem conferre ad huius febris procreationem, non quidem omni tempore, sed in fine veris, & æstate cum aer incaluit; si enim tunc fiant frequentes tempestates, ut modo sit calor, modo frigus; modo venti aquilonares, modo austrini; modo sudum sit celum, modo ventosum & nubilum, quemadmodum in Austria, Moravia & Pannonia cum ibi per quadriennium praxim exercerem vidi (plurimum quotidie è lecto surgens mane, dubitans, qua veste me eo die indui oporteret) aperiuntur ab æstu pori cutis, &

Qualis autem ad
procreationem
huius febris
requiritur.

rursus derepente à frigore condensantur ac obstruuntur. Autumno in calidioribus regionibus similis inæqualitas etiam hanc febrem inducit. Vidi qui in cavernas montium & cellas vinarias frigidæ ætatis tempore ingressi, atque vinum frigidum bibentes nonnullique in hoc frigido aëre moram trahentes in hanc febrem inciderunt.

C A P. II.

Victus ratio apud Moravos, & Pannones, producens Semitertianam epidemicam. Qualis sit quæ sporadicam gignat.

Quantum quoque victus ratio conferat ad hanc febrem generandam, lubet in tirorum gratiam edocere, productis in medium iis, quæ ego in praxi mea dum inter Pannonas & Moravos versarer, observavi. Non enim qui nimio potu vini aut cerevisiæ aut aquæ utebantur, huic febri erant magis obnoxii, sed qui valde frigido & glacie vel nive vel in profundis pateis plurimum refrigerato. Etenim frequens ejus usus in Pannonia apud eos, qui in humidis & uliginosis locis habitant. Cellas namque vinarias plerumque profundas non habent. Idcirco coguntur tepidum potum æstivis diebus assumere, vel glacie vel nive refrigeratum. Accidit inde caput eorum fieri destillationibus obnoxium in pectus, ventriculum, intestina, aliasque corporis partes; quod ex levi tussi, vocis rauedine, sanguinis profluvio è naribus, dolore dorsi, lumborum, scapularum, urina maxime spumosa conjicere mihi licuit. Quamobrem veracissimus redditur apud eos aphorismus *xxiv lib. v Hippocratis*, qui inquit: *Frigida, qualis nix & glacies, peccatori inimica, iustus movent, sanguinis profluvia & destillationes.* Habent quoque idem populi aquas crudas non leves nec facile penetrantes ad vesicam. Quia sunt stagnantes, palustres, puteales, ut plurimum à nivibus genitæ. Fluviales eorum aquæ & fontanæ æstivis diebus & autumno ac hyeme ibi optimæ quidem sunt; at ubi ver instat, pessimæ, ob nives liquefactas. Ex his plurimum eorum potus, qui sunt tenuiores formæ: qui vero ditiores, coquant sibi cerevisiam ex tritico magis, quam ex alio frumenti genere, dulcem & nullius vinosi saporis cum bene defæcata fuerit; ideo vix diureticam, sed crudam. Nam cerevisiarii coctores diligentem ejus cocturam negligunt, majoris quæstus gratia. Quapropter hæc bibita in præcordiis æstuat, & copiam pituitæ in iisdem partibus congregat. Unde plurimi sanitati suæ consulentes ad aquas crudas & cerevisiam digerendas, alii esu sibi prudenter mane consulunt, præcipue Pannones. At Moravi aquam vitæ modicam mane bibunt qui ditiores sunt ad præcavendas cruditates. Quas tamen ex pravo suo vitæ genere magis adaugent. Nam à potu aquæ vitæ multi cerevisia se implent in tabernis, matutinas horas in iis consulentes. Deinde post prandium vino se inebriant, quod in Moravia tractuque Pannonico ei vicino & aliis locis plerique crudum est, ventriculo & intestinis noxium. Nam hæc regiones frigidæ sunt, tardeque in iis vites florent ætate, ac citius pruina & frigora autumnii temporibus subintrant. Propterea uvæ quotannis raro ad perfectam maturitatem perveniunt. Iam & vinum quod uno anno maturuerit,

De signis diagnosticis universalibus.

ruerit, solent permiscere cum bimo, trimo, quadrimo, aut plurimo annorum, quod nisi longo tractu temporis suam austeritatem amittit. Inde contingit ipsis caput impleri, nervos, articulos & intestina lædi destilationibus, doloribus colicis, podagris, apoplexia, epilepsia, obstructionibus viscerum, & reliquis morbis qui à cruditatibus bileque originem habent, affici.

Iam vero cibos spectemus & reliquas res non naturales, quibus fruuntur. Ipsorum flumina & piscinæ, quibus abundant in vallibus, magnam piscium copiam suppeditant. Itaque piscium efus ipsis familiaris conditorum cum aromatibus. Vescuntur etiam copiose fructibus, pyris, pomis, prunis, sub finem æstatis melopepone nimis maturo, omnibus glacie ac nive refrigeratis superbibentes, hi quidem aquam, illi vero cerevisiam, ditiores vinum. Æstate media multum ipsos delectat *enunciatum in aceto maceratorum usus: quo nullum cibum vidi ad Hemitritæa generandis perfectiorem, si aquam vel cerevisiam superbuerint.* Qui crapulæ indulgent & copioso cibo utuntur, variis eduliis ventrem replent, permiscentes (ut cum Horatio loquar) conchyliis turdis.

Somno maxima pars hominum longiori utitur & plurimo, ac præter ambulationes exercitia pauca habent cuiuscumque sexus & ætatis homines. Minus præterea mingunt, quam ratio copiosi potus eorum requirit. Nec tamen alvum propterea lubricam habent. His igitur de causis in prædictis regionibus Semitertianæ non epidemiæ tantum frequenter visuntur, sed & prorsus endemiæ existunt. At in aliis regionibus ubi hæc febres sporadicæ sunt, nascuntur ob pravam & inconsoletam victus rationem, ob quam pituitæ & bilis copia in corporibus accumulatur. Animadverti itaque iis, qui ex servitute in libertatem redacti sunt, aut ex paupertate ad divitias pervenerunt, derepente harum febrium periculum impendere. Veluti sunt qui ex monachis fiunt abbates, aut clerici qui episcopatum accipiunt; mercatores ex longinquis regionibus divites facti ac domum reversi & otiosam vitam degentes; qui veneri plurimum indulgentes bene comedunt aut bibunt vel statim à venere, vel ante venerem, ut noviter nupti, sponsi & sponsæ, & pauperes, qui ducunt uxorem divitem, aut pauperes mulieres, quæ cum divitibus maritantur. Nam ex venere intempestiva & nimia ante vel post cibum varium & copiosum multa pituita ex chylo nimis crudo, & bilis ex supercalefactis vasibus in corpore generantur.

Animus quoque eorum à curis liberior longiori fomno & frequentiori indulget. Eo tamen nec cibibus nec potus propter varietatem digeruntur, sed congeritur quotidie aliquid ad cumulum crudiorum & excrementorum in vasibus consistentium. Notavi biliosos natura & ad febrem tertianam proclives, debilibus visceribus præditos, & qui facile incurrunt in horum obstructiones, si mutaverint vitam in otium & crapulam, eduliis frigidis & humidis crassique succi, ut laganis, utrius, & ex pasta factis eduliis, placentis ex lacte, caseo, betis & aromatibus utantur, in Semitertianam facile incurrere.

Signa communia pathognomonica nulla in Semitertianæ, quæ propria & impropria competunt, insunt. Omnia enim quæ simpliciter Semitertianæ adscribuntur à Scriptoribus, propriæ conveniunt. In hac enim videre licet alternis diebus febrem magis urgere. Hinc Hippocrates lib. 1. Epidem. loquens de febribus in Thalo regnantibus prima tempestate; *Modus, inquit, erat Semitertianus; uno die leviores, altero gravius iterum invadentes.*

Sed cum multæ sint febres compositæ, quæ alternis diebus sunt majores, nempe tertiana continua, duplex tertiana, tum intermittens, tum continua, & Semitertiana; quærendum modo est, quibusnam notis hanc ultimam à cæteris distinguamus. Sane à continua tertiana per rigorem, aut frigus, aut horrorem distinguitur, quæ in continua abiunt. A duplici tertiana longitudine paroxysmorum & typo quotidianæ permixtæ. A continua conclusa duplici, frigore, horrore, & rigore: continua vero per superingressum paroxysmorum, invasionis modo, quo duplex hæc continua tertiana breve habet initium & augmentum, statum & declinationem longam. At in Hemitritæa longa productio augmenti & status, ac declinatio brevior.

Hoc per exempla declaro. Anno millesimo sexcentesimo primo circa initium mensis Augusti, & in fine mensis præcedentis, cum frequentes tempestates oborirentur, & venti frigidi matutinis præsertim temporibus spirarent, Patavium & circumvicinas civitates, pagos, oppidaque invasit epidemica febris, quæ duplex tertiana continua per superingressum paroxysmorum, spuria à Medicis vocabatur. Febris prægresso ut plurimum catharro incipiebat, eratque biliosa cum sub dominio pituitæ. Cum insigni horrore ac frigore uno die invadebat; perseverabatque ad octo vel novem horas, antequam ad statum veniret: post quem quibusdam sudores oboriebantur crassi & pingues primo, deinde tenuiores. Vomitus in augmento pituitosi, deinde biliosi conspiciebantur. Post sudores febris non intermittebat, quamquam esset longe remissior cum pulsu molli & debili, atque ita perseverabat parumper ad integritatem proximè accedens, donec alius horror, aliudque frigus partium extremarum superveniret altero die minoris afflictionis, quem minor calor febrilis exceperit plurimis horis paulatim incrementum accipiens sine vomitibus. Quis dicet hanc febrem revera duplicem tertianam esse; & non potius spuriam Semitertianam, præsertim cum nulla essent accidentia alterius tertianæ eo die, quo minor febris comparabat; nullus vomitus; sed tantum dolor quidam ac morsus circa ventriculum? Sed præter hoc unum signum, quod ex inæqualitate magnitudinis paroxysmorum sumitur ex Hippocrate, aliud signum universale non habemus. Nam quod ad continuitatem hujus febris attinet, quam ipsi adscripsit Galenus ex sententia Hippocratis, de ea in præcedenti libro fuit secundum meam opinionem determinatum.

Semitertiana quomodo à tertiana continua & duplici tertiana distinguenda.

Elisiorum.

C A P. IV.

De Signis verae Semitertianae primi ordinis Galeni.

Quapropter ad signa specierum propriae Semitertianae, & impropriae nunc excurramus.

Vera Semitertiana primi ordinis Galeni signa habet tertianae simplicis cum quotidianae continuae signis permixta. Ut propterea in libro de typis dicat Galenus: Quaecunque autem omnia tertianum (typum) insequantur, eadem Semitertiano contingunt. Nam eisdem generis ambo sunt participes: quippe qui accessio- num & remissionum repetitiones per triduum faciant.

Proprium tamen hoc signum addere oportet, quo à simplicis tertianae accessione distinguere possumus Semitertianae accessione: nempe accessio- num productionem, & quae ut plurimum in hac fit per reduplicationem, quam Graeci *ἐπανάστασιν* vocant. Nam antequam una febris ad vigorem veniat (sive ea prius fuerit tertiana, quae invalerit, sive quotidiana) altera febris novo paroxysmo affigere incipit alternis diebus. Non tamen semper, etiam si accessio sit producta, teste Galeno, fit haec paroxysmorum reduplicatio. Nam fieri potest, ut tertiana paroxysmus cum quotidiana paroxysmo ita inter se confundantur, ut alternis diebus invadant una eademque hora. Accessionem tamen produci tunc etiam oportet, etsi tertiana simplex commixta esset, quod quotidianae accessio longa esse consuevit.

II. Aliud quoque signum est: nempe perfrigeratio, cum qua solent saepissime (ut loquar & hic secundum Galenum) venire accessiones.

III. Antiquissimi quidam codices addunt tertium signum, pulsus nempe maxime debiles.

At hoc abesse potest ab hac febre in principio morbi, vel cum nullam habet prorsus malignitatem: adest tamen persaepe, ne dicam semper, in augmento & statu.

IV. Quantum signum ibidem Galenus huic febrī assignat, nempe horrorem in accessionibus diutissime agros assigentem, ut propterea febres horridae appellentur. Nam per totam accessionem producitur symptoma horrores; vel propter inaequalem ascensum, vel ob reduplicationem. Nam si brevibus intervallis horrores diu repetant, tunc producuntur propter inaequalem ascensum febrilis caloris. Si vero per longa intervalla horae nempe unus vel alterius, sit per reduplicationem, quas ternas plerumque, aut quaternas in Semitertianis febribus adesse scribit Galenus, quod & nos ipsi vidimus. Libro autem de Crisibus xi, accessionem horridam Semitertianae exquisita propriam attribuit singulis diebus, sed uno majorem, altero sequenti minorem. Et lib. de morb. Tempor. horridum insultum, omnes principii peculiare notas habentem, praeter rigorem, ei adscribit, declarans se hisce verbis: Etenim vehemens horror, vel initium aliquod rigoris, vel parvus rigor esse videri potest. At ex acuto rigorem, qualis in tertianis quartanisque est, huiusmodi febris non accipit. Iam ponamus pro tironibus exemplum in juvene vigintiquinque annorum bilioso, qui autumni initio ex melonum & aliorum fructuum esu immoderato, glacie vel nive refrigeratum superbibendo vinum, tempore aesti-

tis, quo tempestates frequentes erant & venti modo australes, modo boreales, in febrem lapsus est, invadentem primo die cum horrore hora prima post ortum solis, cum pulsu & calore valde inaequalibus, qui calor ubi ad statum venit hora nona, jam per corpus expansus iterum ad interiora contrahatur, & pulsus fiant tardiores, rariores, minores, & partes extremae nonnihil refrigerentur: aestuante vero thorace ac ventre, denuo alius horror repetat, quem sequatur post horam unam, vel alteram anxietas, nausea, bilis & pituita vomitus, deinde tota nocte male se habeat. Circa vero primam sequentis diei, vix oborto madore, cum partium extremarum refrigeratione & pulsus contractione, atque sic tertio die duplicis febris fiat accessio horrida, unus quidem mane, alterius vero circa vesperam. Et sic quarto die subsequente mane una tantum accessio repetat: talesque alternatim frequentibus diebus paroxysmi compareant, nonne hic febris Hemitritae exquisita Galeni typus monstrabitur? Nam alternis diebus cum horrore invadit tertiana simplex, singulis vero cum frigore aut levissimo horrore quotidiana. Decipiat tamen hic nos non oportet, quod aliquando contingat tertianae & quotidianae horrores inter se confundi cum uno eodemque tempore invadant. Tunc per brevia intervalla horror repetit & diutius tenet uno die, quam altero: utroque tamen eadem hora invadit, nisi singulis diebus anticipet, vel postponat. Siquidem tunc altero die apparebunt horrores per longiora intervalla, & paulatim tertianam, quae commiscetur quotidianae, vel tardare sua accessione, vel citius quotidiana eadem die invadere. Apparebit in tertianae accessione, praeter rigorem & horrorem nausea cum cordis morfu primis accessionibus, si per plures circuitus repetent, si per pauciores duos vel tres uno eodemque die, loco nausea vomitus biliosus atque pituitosus, & alia, quae tertianis circuitibus propria. His distingues haec Semitertianam à duplici tertiana, in qua etiam altero die solent manifestari eadem signa, quamquam remissiora, rarissimeque eadem hora in principio paroxysmorum.

Ceterum interrogare hic aliquis posset, quomodo quotidianae continuae paroxysmus in Semitertiana exquisita cum horrore invadat, cum continua quotidiana sine extremarum partium frigore invadere soleat, intermittens cum frigiditate? Ad hoc respondeo, quotidianam continuam non esse illam quam nonnulli recentiorum conclusam vocant, sed productam intermittentem. Supervenire autem alteram quotidianam fini alterius, antequam in integritatem definat, & propter confusionem bilis pituitaeque fieri horrorem.

C A P. V.

De Typo Semitertianae secundae ordinis Galeni, & magni Hemitritae Barbarorum.

Quae secundae ordinis Semitertiana dicitur Galeni, singulis diebus paribus cum frigiditate accessiones habet, vel cum horrore; quae modo accidunt eodem tempore semper, modo tardius singulis diebus, modo citius, quas appellant praetici anticipantes, ut illas postponentes accessiones,

Quomodo
à duplici
tertiana
distinguitur.

Quomodo
à duplici
tertiana
distinguitur.

Quomodo
à duplici
tertiana
distinguitur.

fiones, sequuntur has calor mitis paulatim increfcens, remittens quidem, nunquam tamen intermittens, cum fiti fere nulla, pulſu parvo molli non valde celeri in ſtatu acceſſionum. Tertio vero quoque die exacerbatur vehementer ſine horrore novo aut repetito, aut tam diu, quam in primi ordinis Semitertiana perdurante, ſed breviori & mitiori: cum quibuſdam tamen ſignis tertianam ſimplicem concomitantibus; ut inſigni calore & acri, ſiti intenſa, vigilis, inquietudine, urina rubra; quibus adſunt mentis alienatio, aut furor: ita ut acutiſſime diebus imparibus aeger ægrotare videatur. Evadit hæc, tempore præſertim peſtilentiæ, Magnus Hemitritæus, quoties horrores ac frigora partium extremarum acceſſiones relinquunt. Sed ſine his febris utraque, tum quotidiana, tum tertiana exacerbentur atque remittant quotidie; alternis vero diebus acutiſſima fiat acceſſio.

Notandum autem hic pro tironibus, in Semitertiana ſecundi ordinis Galeni quotidianam cum tertiana continua implicitam primis diebus cum frigore invadere, deinceps auſcendente febre ſupervenire horrores. Et ruruſ vice verſa aliquando primis diebus horrere, poſtea frigere ægros: quod humorum mutationis penes naturam, multitudinem & locum adſcribere poſſumus.

Alterum quoque animadvertendum, quod maxime juniores Medicos decipit, & etiam quandoque ætate provectos, in Semitertianis duobus Galeni prius oriri febrem quotidianam, deinde poſt tres, quatuor plureſve dies tertianam ſupervenire. Ruruſ aliquando prius tertianam invadere, deinde ſecundo aut tertio paroxyſmo paulatim per obſcuros paroxyſmos ſe inſinuare quotidianam: atque inde poſtmodum naſci, ut commemorata hæc ſigna non uno eodemque tempore compareant. aliquando duas hæc febres uno eodemque tempore diſtincte, vel conuſe. Hinc patet ratio, cur hodierni Medici in prognofi frequentiffime decipiantur, & ægri interdum ſe vel non febricitare putent morbi initio, vel levem febrem ſentiant. Quod etiam Galenus ſua tempeſtate notavit, inquiens: *Sane alias à primo die conſtituitur, alias à ſecundo & tertio incipit. Unde maxima deceptionis cauſa Medicis oritur, ob ejuſmodi invaſionem.*

Nam quibus hodie quotidiana febris ante tertianam per tres quatuorve aut plures febres præceſſit: hi levem quandam laſitudinem ac ſitum ſentientes, & capitis dolorem, naufeam aut cibi faſtidium, febricitare ſe non putant, cum neque rigor, neque horror, neque inſignis aliqua refrigeratio extremarum partium quotidie ægros moleſtet. Vbi vero ſupervenit febris tertiana cum horrore, jam tum ſe febricitare putantes, Medicorum auxilia quaerunt: qui ægri ſi iter confeſerint cum quotidiana prægreſſa, aut aliquo viſcere antea fuerint invalidi, maxime pulmonis, ita ut ad tabem inclinarint, ut plurimum facta tranſmutatione in febrem malignam moriuntur. Similiter ſi febris tertiana prius hominem prehendam uno vel altero paroxyſmo; intermitat autem perfecte, omni periculo ſe vacuum aeger arbitrabitur: deinde quarto die leviter ſitiat, pulſus ſit paulo frequentior & inæqualior, quam erat tempore integritatis, caput non omnino liberum à dolore aut gravitate, non tamen ipſum ſurgere prohibeat, quod febris

& hæc & alia accidentia in principio ſint obſcura; tractu vero temporis repetentibus paroxyſmis validioribus, jam Semitertiana ſe prodiit interdum, præter mentem nec ſine admiratione celeberrimum Medicorum. Ita ut nonnulli Hippocratem mendacii coarguerint, exiſtitantem febrem tertianam periculo vacare. Itaque qui hujus febris naturam & typum probe noſcere cupit, eum oportet in minoris Semitertianæ ſignis dignoſcendis plurimum operæ ſtudioque ponere.

C A P. VI.

De Typo Semitertianæ minoris. Locus Galeni correctus.

Hujus ut plurimum talis typus eſſe ſolet. Primo die febris corripit cum horrore, naufæa vel anxietate circa ventriculum, ſed ſine vomitu. Vbi hæc febris per ſeptem vel plures horas perduravit, ſudor ſequitur; poſt quem videtur quaſi integer à febre laborans, cum nulla videatur notata digna inæqualitas in pulſu, aut calor præter naturam. Tertio die ruruſ invadit tertiana cum horrore, & majori naufæa anxietateque, vel dolore circa ventriculum, diutius perſeverat anticipando acceſſionem; deinde, prolongato paroxyſmo, ſudore finitur; ſic ut reliquo tempore, qui diem quartum continet & integer eſſe deberet, pulſum paulo frequentiore conſervet (oportet autem hic jam eſſe in pulſu ægroti exercitatum tironem, ut ſciat qualis ei eſſe deberet, tum qualis etiam fuerit, dum eſſet ſanus. Mulieribus enim plerumque, & qui in hypochondriis antiquatas obſtructiones habent, pulſus ſunt viris & integrum ventrem habentibus frequentiores & minus æquales; deſt tamen ipſis ſemper calor præter naturam) & nonnihil inæqualem, ſi quis bene perpendat circa præcordia leviſſimum calorem præter naturam, qui leviſſime videtur ſequenti die poſt meridiem exacerbari. Atque hoc tempore aeger neque appetit potum, neque cum reſpuit. Quinto die, qui tertius eſt paroxyſmus tertianæ, omnia vehementiora comparent, anticipant horrores, longior inæqualitas, caloris cum vomitu pituitæ & bilis, & tunc adhuc magis producta fit febris, quam ſecundo paroxyſmo; ita ut quæ febris primo paroxyſmo, intra ſpaciū duodecim horarum, videbatur terminare ſuum paroxyſmum cum ſudore, nunc ulterius vagata paulatim ſexdecim, viginti aut triginta horas perduret & amplius, præſertim cum jam confundatur cum tertiana. Manet enim febricula poſt ſudorem, quæ deinde ſexto die manifeſtioribus notis ſe indicat. Nam circa vespæram leve frigus extremas partes occupat, & interdum etiam levis horror, poſt quem ſenſim in multam noctem calor ſentitur cum levi ſomno aliquantulum perturbato, & levi ſitu. Et ſic paulatim utraq; febres invaleſcunt, donec tertiana deſinat, & per aliquot dies quotidiana reſtet.

Sed cum ſupra mentio facta ſit productionis acceſſionum in Semitertiano circuitu, notandus eſt locus apud Galenum libro de Typis, cap. 111; ubi dicit, *quotidianum typum longam acceſſionem habere, atque extenſam Semitertianam.* Quaſi vellet dicere, Semitertianam quandam eſſe extenſam, aliam vero non extenſam, & hanc non habere acceſſio-

num productiones, quales alibi Semitertianae simpliciter adscripsit. Existimo tamen ego, codicem eo in loco esse mendosum, ubi sic scribit de Typis: *Secundi vero, qui longam accessionem habent, & parvam remissionem, qualis est quotidianus & extensus Semitertianus.* Vel expungenda mihi videtur vocula, *extensus*; vel tertianus pro Semitertianus, in Graeco codice legendum. Subjungit causam suae propositionis. *Hic enim solus (nempe typus extensus tertianus aut Semitertianus) ἐξ ἀρχῆς ὅλης, id est, immutatus ab antiquis nominatus est.*

C A P. I I.

De Semitertianae exquisitae Galeni typo.

Quaquam omnes propriae Semitertianae species, exquisitae & non exquisitae dici queant, & ideo omnium signa nobis essent proponenda ad exactiorem doctrinam, tamen ne confusionem mentis ac memoriam tironi parerent, volui tantum in primi ordinis Galeni exquisita & spuria tironem exercere. Inde enim caetera aliarum specierum signa facile innotescunt.

Typus exquisitae Semitertianae primi ordinis Galeni optime apud hunc autorem declaratur lib. 1. de Febris cap. vi. r., in adolescente, his verbis: *Atane quidem, inquit, in prima hora rigorem pati capis exquisitae tertianae familiarum, adstantque alia omnia ejusdem febris indicia usque ad horam sextam, & repentinus vomitus biliosus & multus, & pauci sudores, inter quos statim homo contraxit se atque horruit, & subinde incipiente annotatione pulsus erat parvus, inaequalis; deinde usque ad horam undecimam, cum paulatim adhuc succederetur, plura quidem signa habebat annotationis propria, paucis tamen intermixtis augmenti indicibus. Hinc vero usque ad quartam noctis horam febris certissime intendebatur: deinde quantum sensu percipi poterat, usque ad sextam noctis horam in eadem magnitudine persistebat: mox jam manifeste declinabat usque ad diei sequentis horam quartam: in hac enim jam & contrahabatur, & annotationis signa ostendebantur frigidosioribus factis extremis ejus partibus, parvoque existente pulsu & jam ad vespertas usque intendebatur paulatim, neque horrorem, neque inaequalitatem aliquam praeseferens: deinde rursus in summo consistebat circa quintam noctis horam: sexta vero manifestissime caput remitti.*

Quod igitur tertio die hora secunda quotidianam annunciationem expectare oportebat, in ambiguo non erat. Non tamen, utrum tertiana eandem horam esset servatura, an non, satis constabat. Hora igitur secunda accessio supervenit horrida, quae celerius ea quae in primo & secundo die quotidianae continue facta erat, invalescens usque ad horam quintam, aliud rursus post quintam horam fecit initium, in quo aderant omnia similia ista, quae in secunda hora contigerant, accidentia. Hinc vero rursus promptus invalescens usque ad horam octavam, denno in eadem horruit: ac paulo post rursus accrescens accessio expedite accendebatur, adeo ut hora noctis quarta jam ad summum pervenerit. Et quid aliud hoc erat, subdit Galenus, quam accessio exquisita Hemitritaei duabus eadem hora invadentibus febris? Quoniam quotidiana duabus horis celerius, tertiana autem totidem tardius accendebat.

Adeo ut quicunque facultatem haberet februm figuras agnoscendi, tertiana ac quotidiana continue accidentia in

unum confusa, manifeste deprehenderet. Nam cum tertiane insulsum rigor comitaretur, quotidiana autem sine rigore invaderet, mixta ex utraque febris horrorem continuus afferebat, rem quidem rigore minorem, majorem autem refrigeratione, tantoque hac ipsa majorem, quantum à rigore magnitudine superatur: adeo ut cum ab utroque extremo aqua distet proportionem, horror medius inter ambo, rigorem scilicet & refrigerationem collocetur: quod quidem maxime fieri consuevit cum extremitates confunduntur. Haec Galenus, qui interpositis nonnullis de etymo Hemitritaei, pergit narrare reliquum historiae commemorari adolescentis, Hemitritaeo laborantis. In adolescente igitur, inquit, quem nostra narratio supposuit, cum tertiae die ejusmodi accessio facta esset, quia in unum tempus conveniebant ambarum febrim invasiones, quoniam quotidiana quidem duabus horis semper praeveniebat, tertiana autem diserebat, die quarta accessio sole oriente invasit, formam exquisitam pituitosa febris praeseferens. Erat autem secundum proportionis similitudinem quinta ab ipsa accessio circa decimam noctis horam principium factura, quoniam duabus super horis celerius invasit: biliosa autem febris accessio tertia ab initio, die quinto, hora quarta erat invasura: adeo ut inter duarum februm initia, sex horarum spacium intercederet: quod & factum est. Nam circa quartam noctis horam decimam invadente accessione, quae febris pituitosa servabat imaginem, atque hoc modo usque ad quartam quintae diei horam progrediente, ubi febris biliosa mediocrem rigorem secum adferens eidem conjuncta fuit, mislam subinde formam gerens accessio, biliosa scilicet febris & pituitosa, sequenti nocte circa horam octavam pituitosa febris incipiens exquisita, ac sola totam diem subsequente ordine sextam occupavit: deinde cum media nocte declinasset, aliud subinde eodem modo fecit initium: deinde cum reliquam dimidiam noctis partem usque ad meridiem diei septimae obtinisset, postmodum jam veluti declinabat. At eandem excepit tertiana, quae cum rigore invasit, quemadmodum exquisita tertiana invadere consuevit; atque cum alia omnia secum eodem modo certissima adferret indicia, vomitus bilis invexit, atque alvi excrementa biliosa, & urinae optimas, ac cum jam advesperasset, breves quosdam veluti sudores: adeo ut quicunque febrim species didicisset, ei aperte indicaretur eam remitti ac declinare, neque ultra unam aliam periodum, aut ad summum duas debere protrahi: nam & in ea declinatione erat quies admirabilis, qualis ante visa non fuerat, donec ad quartam noctis horam perventum esset. In illa etenim febris pituitosa, quae quotidie quidem accessionem, sed duabus anticipabat horis, invasit: cumque totam noctem occupasset, ac totum deinceps diem, rursus in secunda hora noctis octavae aliud fecit initium: cumque eandem pariter noctem totam occupasset, sequenti die quae nona erat, declinavit. Eodem vero die circa horam octavam, quoniam duabus horis tardius invaderebat, futura erat tertiana febris accessio: sed tunc hora nona supervenit, hoc ipso etiam se declinare significans. Sole autem occidente ei se associavit febris pituitosa, more suo anticipando. Et cum noctem illam obtinisset, diemque sequentem, hora decima diei decimae iterum invasit, deinde die undecima rursus hora octavae exquisita permanens pituitosa: deinde prima noctis hora tertiana febris, quae quatuor tardaverat horis, horrida accessio facta est. Deinde sexta noctis hora albus biliosa excrevit: ac quidem per universum corpus veluti sudores exhalarent, per quos tota declinatio fere ad infirmitatem pervenit: neque jam in ambiguo erat, quin tota febris tertiana omnino desisset:

Historia.

desisset: pituitosa autem sola remanserat, quæ & ipsa jam remitti incipiebat. Hac igitur ratione die duodecima non amplius anticipavit accessio duabus, ut antea consueverat, horis, sed hora septima invasit: neque die decima tertio sexta supervenit hora. Sed illa etiam septima hora invasit, quietem effatu dignam ac declinationem ostendens. Quartadecima vero die eadem declinatio melior admodum successit, ac hora nona accessio facta est: in urinis autem erant insignia conciliationis indicia, solutionem agitudinis in die decretorio succedente futuram præmonstrantia. Hac est tota adolescentis Hemitritæ exquisito laborantis historia:

C A P. VIII.

De Signis Hemitritæi Spiritus primi ordinis Galeni.
Quibus signis duplex tertiana ab Hemitritæa
spuria distinguatur.

IAm signa Semitertianæ spiritus primi ordinis pendantur, & an ea febris, quæ vulgo hic in Italia dicitur tertiana duplex continua per superingressum paroxysmorum, non sit ad notas & illegitimas Semitertianæ referenda. Non exquiritur habet signa tertianæ exquisita, cum quotidiana spuria, vel quotidianæ exquisita typum cum tertiana producta; vel quotidianæ spuria & tertianæ spuria, quæ spuria recte vocatur. Galenus & posteriores ejus affectus hosce typos nobis expresse non declararunt, præsupponentes eos aut ex typo Semitertianæ exquisitæ jam proposito facile perdisci (facta inter cum & alios spuriarum comparatione) vel per signa, quæ redundantiam pituitæ vel bilis indicant latis spuriarum Semitertianarum signa declarari. Ajunt enim, quando pituita cum bile non habet æquabilem mixturem, tunc appellari spuriam Semitertianam; si bile magis abundet, si pituita superet bilem. Quod idem esse videtur, ac si dicerent, modo tertianam vel quotidianam magis esse legitimam, modo minus: & utramque aliquando spuriam. Nam existente bile minus mero, tertianam productam generari asserunt: quotidianam vero spuriam, quoties multa bilis pituitæ permiscetur, locis tamen putredinis discrepare, ut alia in venis sit, alia extra venas, quæ putrescit. Ex quo conficitur eas febres, quas nunc duplices tertianas appellant per superingressum paroxysmorum, esse magna ex parte Hemitritæas spurias; item & alias, quæ sunt conclusæ, & uno die sunt leviores, altero vero graviore. Igitur videndum est, quibus signis nos distinguere debeamus duplicem tertianam, tum eam, quæ continua est per superingressum paroxysmorum ab Hemitritæa spuria Galeni primi ordinis.

Profecto quotidianam à duplici tertiana distinguere solemus typis quibus discrepant, manifeste in principio morbi, manifestissime vero in fine, quando solvuntur. Nam primo quotidiana una febre eademque hora quotidie invadit, si non anticipet aut postponat, cum accidentibus quotidianæ plurimis & magis propriis, & quotidie fit major invadente febre; ubi vero ad statum pervenit, ipsa quoque constitit quotidie, nec uno die major quam altero invadit; in declinatione vero quotidie fit minor & paroxysmos habet breviores, levioribus accidentibus concomitantibus, donec solvatur. At tertiana duplex quotidie neque una

hora invadit, neque æqualiter in augmento paroxysmi utriusque augetur, sed una magis & citius altera ad statum morbi properat cum accidentibus tertianæ magis propriis; & quæ mitior fuit aut prior, prius solvitur ac declinat, altera graviore ac difficiliore adhuc perdurante tanquam simplici tertiana.

Ponamus pro exemplo presbyterum, quem invivissimum anno superiori in fine ætatis prope æquinoctium. Hunc febris primo die, qui erat lunæ, invasit hora una post meridiem (quæ in Italia est decimanona) cum calore, deinde circa vespeream hora vigesima quarta, horror cumprehendit per mediam horam durans, postea vomuit invadente paroxysmo bilem & pituitam; hora octava noctis (seu quatuor horis ante exortum solis subsequenter diei (qui fuit Martis) febris fuit in statu, deinde circa vespeream subsequenter in summa declinatione, ita ut pulsus fuerit æqualis secundum longitudinem, & ordinatus, paulo tamen celerior quam esse debebat, si prorsus ad naturalem statum reductus fuisset: die igitur Martis ejusque nocte sequente ad naturalem statum rediit. Circa meridiem tertiæ diei, qui Mercurii fuit, calor anticipavit per duas horas, & horror quoque citius invasit, nempe hora decima septima: quarta vero hora noctis subsequenter, remissa febre, iterum rigor invasit, deinde subsecuti vomitus alique febris tertianæ signa, quæ tota nocte illa cruciarunt ægrum usque in diem Iovis quo plurimum remisit in quarti diei initium excurrere antequam desinerebat. Rursus in fine quarti anticipando per tres horas invasit horror hora duodecima mane diei Veneris invadente paroxysmo. Quis hanc febrem pro duplici jam tertiana non habebit? Vocet alius duas tertianas, unam productam, alteram simplicem, non laboro, dummodo febris progressum & finem animadverterit. Igitur anticipans hic paroxysmus est minori cum horrore invaderet, calor tamen erat major, febrisque accidentia graviora solito præterquam capitis dolor, perdurabat per totam diem, & antequam desineret ad integritatem, hora sexta noctis rigor iterum comparuit major, cum vomitu levi, majori calore ac in diem sabbathi sequentem, (nempe quintæ diei, quæ ab initio morbi computatur,) excurrente antequam intermitteret. Die solis hora una ante auroram rediit febris sine horrore, sed cum insigni fervore. Deinde hora circiter nona noctis, iterum riguit æger, validiore subsequente paroxysmo, quam prægressa nocte. Perduravit hic per totum diem sequentem lunæ, in qua circa vespeream octavam diem à morbi initio eramus ingressi. Die Martis mane leviter incaluit, perduravitque calor usque ad vespeream, qua nonum diem ingressi eramus. Noctu subsequente hujus diei, nullum initium alterius paroxysmi visum est. Sed mane die Mercurii circa exortum solis parum riguit, plurimo calore subsequente in multam noctem. Die Iovis mane, quo adhuc eramus in decima aut (si quorundam calculationes sequi voluerimus, qui viginti tres horas tantum pro die medicinali numerare volunt) initio undecimæ morbi totius, calor novus invasit, sed levior quam qui matutinis horis diei Martis: is circa vespeream prorsus cessavit, ut æger à febre integer videretur. Die Veneris horis duabus post

bus post exortum solis (fuit hæc hora decima quarta) incallescere coepit lente; & post meridiem febris fuit validissima, quæ ad noctem mediam ægrum cruciavit. In summa declinatione horum paroxysmorum nulli unquam sudores comparuerunt, sed levis quidam mador circa collum & caput. Die sabbathi cum ibi jam effemus mane exitus calor febrilis paucis horis animadversus. Die solis hora decima quinta, calor insignis incepit sine rigore, perduravitque usque ad noctem mediam, qua intermisit. In fine diei decimæ sextæ (qui erat lunæ) mane sine febre. Die Martis antequam ingrederemur decimam quartam, hora decimæ septimæ febrilis calor minor, quam die solis apparuit, ac se in mediam usque noctem protraxit. Die Mercurii caruit omni febrili calore. Die Iovis calor rursus invasit circa decimam & nonam horam, sed minor quam die Martis. Hæc febris deinceps alternis diebus invadens usque ad vigesimum quartum morbi diem permansit (singulis paroxysmis notabiliter declinans,) quo tandem disparuit. Die vigesima septima à morbi initio, rediit febris cum horrore, circa vigesimam primam horam. Die sequenti iterum invasit hora vigesimæ tertiæ, cum partium extremarum levi frigore & minori ac breviori calore subsequente, perque novem horas perduravit. Tertia die à recidiva (quæ fuit trigesima ab initio morbi) horror invasit cum febre per undecim horas perdurante. Die huic proxime sequenti, rursus febricitavit eo modo & eadem hora, quo secunda à recidiva die. Atque sic alternis diebus quondie febrem patiens unam, quæ vere erat intermittens, modo major modo minor paroxysmus comparebat. Qui in statu recidivæ erant longiores, in declinatione breviores. Evanuerunt tandem oborto alvi profluvio post quadagesimum diem à recidiva, à morbi vero initio post sexagesimum septimum diem.

C A P. I X.

De Typo Compositæ Semitertianæ cum tertiana.

Semitertianæ exquisitæ cum alia tertiana compositæ typus nobis declaratur à Galeno lib. 11 de Crisibus; cap. xx, per historiam mulierculæ, his verbis. Nuper igitur (inquit) quædam muliercula in paribus diebus horridam accessionem habebat, Semitertianæ exquisitæ propriam: in imparibus vero, mane alteram quandam ea, quæ præcesserat, longe minorem: ut altero die Semitertianæ febris accessio super accessionem advenire videretur; quod in tali febre fieri consuevit. Circa octavam vero horam diei altera invadebat accessio cum rigore vehementi, omnia exquisitæ tertianæ febris indicia adferens. Iam vero hæc confracta sudoribus & bilibus vomitibus hora tertiæ noctis, mox extendebatur ad diei paris horam secundam. Et cum jam infebrecitationi appropinquaret, rursus horrida atque inæqualis illa accessio succedebat, quam in paribus diebus fieri diximus: Deinde per totam diem maligne compressa, ac deinceps ad aucta, vix occidente sole ad statum perveniebat, ac declinare incipiebat hora quarta noctis. Deinde mane rursus super abundantes reliquias additum augmentum non valde inæquale, usque ad octavam horam intendebatur. Et cum jam manifeste statum febris obtinere videretur, jam febrem hanc febris exquisitæ tertianæ accessio altera susceperat. Hanc nos febrem statim die secunda ex com-

Et ista hora.

plicatione Semitertianæ febris atque tertianæ factam nominamus: longe vero certior tertius dies præbuit cognitionem. Atque in speciem venimus, alterum circuitum qui erat tertianæ febris, cito finem habiturum: alterum in longius tempus debere protendi, quod etiam contigit. Et tunc aperte visum est, in reliquis parte agnitudo solam superesse Semitertianam: quæ principium quidem totius circuitus in pari die faciebat; in die vero impari superacendebatur. Tales quidem missiones (nempe febrium) non est uniuscujusque discernere.

C A P. X.

De Prognosticis, quæ futuram Semitertianam prælagire possunt.

Quæ Semitertianam minantur signa, desumuntur præcipue ex quinque fontibus; nempe anni constitutionibus, regionibus, ætate, sexu, dispositione corporis, aut morbo præsentem. Nam anni tempora inæqualia hanc maxime producent: Ver, æstas, autumnus, pluviosa & austrina, intervenientibus frigidis ventis, aut post tempestates frequentes vel grandines plurimum refrigerato aëre. Anni quoque constitutio pestilens, vel acrimiasmatibus pestilentibus inquinatus, frequentiam hujus febris prælagire solet. Nam quo tempore pestis regnat, hæc febris in omni terrarum regione, in qua pestis est, frequentissima esse certitur.

A paucis tamen Medicis solet animadverti ob duas causas: prima est, quod antequam per tres aut quatuor paroxysmos innotescat in ipso augmento, in principio morbi ægri sæpe moriantur. Secunda est, quod magis in peste urgeat necessitas pellendi malignitatem pestilentem, seu ipsam pestem, & sic omni fere tempore nutriendi, quam considerandi, qua hora plurimum remittat febris, ut ea protinus cibis porrigatur.

Regio quoque, in qua hæc febris endemia est aut frequenter versatur, animadvertenda, ut Roma, Africa totus tractus, quem mare mediterraneum & Oceanus alluunt: Pannonia, Austria, Moravia, Croatia, Styria, Illirium, Istria. Germani Rhæni accolæ, & Belgæ minus hoc malum sentiunt: nisi quo anno dysentericæ contagiosæ grassantur, quæ plerumque ante finem æstatis & in principio autumnus conspiciuntur. Nam apud hos, præcipue Belgas, magnæ temporum mutationes non sunt. Lana & pelibus se vestiunt usque ad initium æstatis, quibus contra vernam aëris inæqualitatem sese satis tumentur. Cibis, quibus hyeme quotidie vescuntur, ex rapis, napis, pastinaca, carotis seu duaco tum nigro, tum flavo Theophrasti, se magnopere per urinas purgant. Anno millesimo sexcentesimo septimo, quo Patavii medicinam exercebam, ex vere continuis pluvii tentato, & prima æstatis parte reliqua, & autumnus subsequens plus quam media parte calidis & siccis, Hemitritæas prædiximus & vidimus. Easdem ob tales aëris & temporum constitutiones, annus millesimus sexcentissimus decimus quintus apportavit & prædixit multis Germaniæ regionibus non modo vere & æstare, sed etiam autumnus initio, quod esset solito calidius & humidius. In Moravia tunc temporis eramus, & tam frequentes in ea vidimus, ut adultorum, qui in vallibus & circa aquas habitabant, tam

Fontes ex quibus
hæc febris
animadversatur.

Cur hæc febris à paucis Medicis animadvertatur.

Qui populi
hanc febrem
magis minus
que obnoxiunt.

Et quo tempore.

tam virorum quam mulierum mediam partem invaderent, mense septembri & initio octobris. Eodem anno verno tempore veræ hemitritæ, majores & malignæ cum rubris maculis culicum moribus similibus, sed latioribus dense per totum corpus dispersis antea advenerant, integros pagos & oppida invadentes, ac nemini fere adultorum parentes, ex quibus omnes pene post decimum quartum diem superstitēs mansere. Quapropter ad rectam prognosin hujus febris constituendam, oportet diligenter regionum climata considerare, ac conferre cum iis anni constitutionibus, quæ ipsi convenire solent. Repetantur ex Hippocrate ac memoriæ mandentur constitutiones anni, quæ in Thaso observatæ sunt, in prima & secunda sectione epidemiorum, harum febrium fœces.

Actus quoque, & ætus in hac prognosi considerandi. Nam pueri rarius his premuntur, viri & juvenes frequentius, quam mulieres. Maxime etiam prædicimus hæc futuræ ex dispositione corporum, & morbis prægressis desinentibus die pari & non critico, ac sine signis coctionis, vel præsentibus, ut febribus tertianis productis simplicibus, & compositis ex duplici tertiana producta. Quemadmodum etiam ex spuris quotidianis: nonnunquam ex specie quadam tertianæ, quam octo vel pauciores horas ante rigorem præcedit quidam calor febrilis secundo vel tertio paroxysmo, qui paulatim exacerbatur augeturque subsequenter paroxysmis tertianæ.

C A P. XL

Tabidi an hac febre corripiantur. Tabidi vox variæ significationis: auctoris sententia.

Memini Hippocratem nos docuisse lib. I. Epidem. Tabidos, & quicumque ex aliis longis morbis agrotant, ex hac maxime agrotare. Id confirmat ex eodem sect. I. ejusd. lib. ubi anno maxime austro in Thaso contigisse hæc narrat: *Solus enim, inquit, & maximus ex his, qui tum vigeant (morbis) tabidos morbus multos occidit. Erant autem plurimis ipsorum affectiones ejusmodi: febres horride, continue, acutæ, in totum non intermittentes: modus autem erat Semitertianus.* Ego, qui annos jam viginti quinque & amplius medicinam variis in locis feci, haud memini me unquam vidisse tabidos, qui ea Semitertiana laborarint, quam nobis descripsit Galenus. Nec puto eam unquam à Galeno visam tabidis supervenire. Quapropter anceps hic in suo commentario I. I. ad lib. I. Epid. Galenus timide ac dissidenter hæc ait: *At nullam in iis, quæ ad integritatem evadunt Semitertianam vocare Hippocratem offensum.* An vero eam unam, quam proprie ego vocare consuevi horrificas repetitiones facientem, an etiam eam, quæ absque his sit, dignum est attentione. Si enim tabidis & aliter diu agrotantibus solet accidere hæc febris, forsatis etiam si horrore careat vocabimus eam Semitertianam, si die secundo iterum invadat. Sed quod dixi, quando de vocabulo questio est, nil interfit, si cui potissimum tribuit febrim nomen Semitertianæ Hippocrates, non plane teneamus. Ego profecto semper fere animadverti tabidos febribus corripui, & perire tandem eisdem, quæ singulis diebus invadunt in modum quotidianæ continuæ; cui si superveniret ter-

tiana, esset jam Semitertiana quodammodo Galeni dicenda ratione modi invadendi, nequaquam tamen causarum ratione, & maximæ puræ loci. Nam quotidiana tabidorum, symptomata Galeni sequacium, me iudice erit febris non primaria. Quamobrem aliter, quam Galenus locum Hippocratis citatum interpretari mihi certum est. Imprimis ad illustrandam Hippocratis veritatem stabiliendamque scire interest in quam significatione nomen *φθινιδες*, quod tabidos vertimus, accipiat. Deinde quoniam sint illi longi morbi, quibus Semitertiana supervenire est solita. Sane *φθινιδες*, teste Galeno, dicebantur veteribus Medicis, qui morbo tabifico, quem etiam *φθίσις* vocant, sunt oportuni: quales sunt, quibus caput facile repletur & ob id destillationibus in thoracem valde sunt obnoxii; item qui angusto sunt thorace atque restricto, ut à tergo in modum alarum scapulae prominent. Hos Græci *πλευρῶδες* vocant, id est, *alatos*. Contingit autem aliquando utramque dispositionem tabificam reperiri in Semitertianam habentibus (& tunc facillime contabescunt) interdum alterutram tantum. Nam fluxiones, quas caput ad pulmones mittit, temporis tractu ita labefactant pulmones, ut in iis vas quam facillime rumpatur, tum ob pulmonum substantiam labefactatam, tum ob tussis frequentem motum, qua conatur natura quod in pulmones lapsum est expellere; in his vero qui alati sunt restrictoque thorace præditi, nequeunt quod influxum est in thoracem pulmonefve expellere, aut valde difficulter. Sed & alio modo fit tabes quam per destillationem: quando scilicet pulmones vitium contraxerunt ex vase rupto, aut quando eorum substantia corrumpitur à fluxione alicujus humoris ab aliquo viscere in pulmones, ut jecore, liene, aliisve, quæ difficillime cognoscitur. Ideo hujus notitiam signaque Medici præterisse videntur aut saltem non observasse, quos ego per sexdecim & viginti annos vixisse aliquando notavi sine tussi molestia, facie florida & præpingui, aut certe quadrato corpore, nec nisi dissecto cadavere substantiam pulmonum corruptam cognovi.

Cæterum hic prætereundum non est, quod Galenus lib. I. Epid. Com. II, tradit, Hippocratem folere etiam tabidos nominare, quorum quocunque modo extenuantur & tabescunt corpora, nedum eos, quibus ob pulmonum exulcerationem totum liquefcit corpus.

Cum igitur tot significationibus accipiat tabidi vox, videndum est an de omnibus, qui multipliciter dicuntur tabidi, hæc propositio Hippocratis vera sit. Deinde si de omnibus, cur id contingat.

Certe quæ ego in hac febre animadverti, Hippocraticæ veritati sunt consentanea. Etenim eos rarissime Semitertiana laborare conspexi qui firmis sunt visceribus: sed eos, qui destillationibus laborant, jecur habent obstructum aut lienem aut mesenterium, pulmones male affectos, per longa intervalla colicis doloribus infestantur, frequentius cæteris ab hoc malo prehendi. Nullius eorum, qui à Semitertiana perierant, cadaver memini me inspicisse, in quo pulmones & jecur non male habebant, vel una cum his caput, lien, renes, mesenterium, intestina magna ex parte inflammata, & in aliqua parte

parte gangrenata erant, præsertim quo loco ileon colo conjungitur. Observavi præterea eos, qui validis erant visceribus & corpore eufarco, ab hac febre incidisse in maciem corporis, obstructions ingules viscerum, à quibus non poterant peritiorum Medicorum diligentia, nisi tractu temporis liberari. Itaque ex hac febre macilentii evadabant, aut maligne decumbebant. Quocirca non est à veritate alienum quod Hippocrates adjunxit, eos scilicet qui aliis morbis longis detinentur, hac (quanquam *ἡ τέταρτος* alio sensu accipi queat, ut infra dicam) præcipue ægrotare, verbi gratia, lentis febribus ab obstructione viscerum pronatis & mensium suppressione in foeminis. Tales igitur ægrotantes ac tabidi facile in hanc febrem incurunt; quod viscera in his labefactata, præcipue naturalia, cibum nec bene concoquant, nec in probum sanguinem convertant, nec horum copiosa excrementa commode segregent. Ita copia pituitosi & biliosi humoris redundantibus venis contingit horum humorum putrefactio, qualis ad hanc febrem requiritur.

C A P. XII.

Omni Semitertianam propriam periculosam esse. Locus Hippocratis illustratus.

Cunctas Semitertianas proprias, quæ continuæ sunt, periculosas esse satis constare unicuique arbitror. De intermittentibus autem dubitari potest, an vacent periculo, nec ne. Nam videtur omne vitæ discrimen nobis abstulisse Hippocrates, tum in libro aphorismorum quarto, tum in *Coacis prænotionibus*, ubi asserit, febres continuas, quæ tertio die accrescunt, periculosas esse, intermittentes vero periculo carere. Ego tamen & ipsas intermittentes periculosas esse semper adstantibus ægrisque confidenter prædixi, propter earum tum transmutationem in continuas, malignas, recidivas, & alias periculosas; tum diuturna, acuta, & prava accidentia, quæ, ut in Semitertianis continuis omni tempore morbi, sic hisce in augmento, statu, ac aliquando etiam declinatione existimata supervenire consueverunt. Nam, teste Galeno lib. de typis, non os ventriculi solummodo ac nervosæ partes, & summam mediæ attingit (Semitertianæ), sed & veterinos cataphoras, vigiliæque cum delirio, & synopolas diaphoreses insert. Linguam præterea valide exsiccatur, & animi defectionem efficit vehementer, quæ in profundo sunt commovens. Observavit etiam Hippocrates, libro 1. Epid. sect. 111, accidere Semitertianæ morbos acutos, & longos; ex illis periculosissimam fieri, ex his maxime molestant, nec sine periculo, quando sic scribit. *Εν δὲ τῷ ἡμέτερον καλεσμένῳ ἐνυπνίῳ μὲν καὶ ὄρεα νοσήματι γινώσκω, καὶ ἐν τῷ λοιπῷ ἐν τῷ συνάλωσθαι. ὁ δὲ ἀνὰ καὶ φθινύσκει καὶ οὐκ ἀλὰ μακροτέρῃ νοσήματι νοσήσκει, ὅτι τέταρτος μάλιστα νοσήσκει.* Quæ sic interpretor: In febre, quæ Semitertiana appellatur, accidit quidem acutos morbos fieri, & talis est omnium maxime lethalis. Sed & tabidi & qui aliis longioribus morbis laborant ex hac (vel post hanc, in utraque enim significatione *ἡ τέταρτος* à Græcis scriptoribus capi video, & debent hæc duæ voculæ sine distinctione conjungi cum νοσήσκει ὅτι τέταρτος, postea distinguimus maxime ægrotant. Quasi vellet dicere, non carent periculo qui in

longos morbos & tabem incidunt ex hac febre, sive jam intermiserit, sive soluta sit per transmutationem in tales morbos longos.

Sed quod spectat nunc ad sententiam Hippocratis libro 14, Aph. 11111, quæ contradicere non solum opinioni videtur, ea sic habet: *Quæcumque febres non intermittentes tertio die validiores redduntur, periculosa existunt*: (quidam scribunt codices *μάλιστα ὁπικινδυνεύει*, id est, magis periculosa) *quomodo cumque autem intermiserint, periculum abesse significat.* Ista sententia valde est ambigua: quia in varios sensus torqueri potest, & diversis distinctionibus scripta, alios sensus profert. Nam modo quo citavimus scripta, potest intelligi de omni febre continua primaria, quæ tertio die crescit, & ut continentes quoque includat: vel de periodicis tantum continuis duabus, vel de aliqua harum tantummodo. Nam synochus putrida & non putrida epacmaistica tertio etiam die increscunt, & quarto plerumque magis, quam tertio, & nonnunquam quinto plus, quam quarto, si septimo fieri homotonos incoeperit. Periodicæ continuæ, quæ tertio die increscunt, duæ sunt; *τετρασφονής* ab Hippocrate appellata, quæ secundum Galenum proprie dicitur febris tertiana continua; & Semitertiana: cui, si quis velit, poterit quoque eam adungere, quæ ex duplici tertiana admodum producta componitur. Ita ut anticipando suis paroxyfmis etiam hæc febris continua fiat. Omnes hæc periculosas statuunt auctores. Sed & alteram invenio in Hippocratis codicibus hujus aphorismi distinctionem, præter jam communem propositam, quæ maxime consideranda est in vulgari textu, ubi invenio commate distinctum: sic enim scriptum est; *οἱ πυρεθοὶ, ὅσους καὶ ἀσθενέστερος ἀσθενέστερος, ἰσχυρότεροι γίνονται, ὁπικινδυνεύει*, id est, *Quæ febres non intermittentes tertio die, validiores sunt periculosa.* Libro 111, aphor. 1111, hoc modo legitur: *οἱ πυρεθοὶ, οἱ καὶ ἀσθενέστερος, καὶ ἰσχυρότεροι ἀσθενέστερος γίνονται ὁπικινδυνεύει.* id est: *febres non intermittentes si validiores sunt tertio die periculosa.* Hanc scripturam nos sequentes putamus, Hippocratem per febres intermittentes non intelligere febres omnes continuas; nam hæc periculosas esse non per se docere videtur: sed, ut dicit 1. Epidem. quia sunt acutissimi & maximi ac gravissimi morbi, & maxime lethales in continua febre. Ineptus igitur apparet hic aphorismus si ita intelligeretur, ut febres continuæ sint periculosa, quæ tertio die sunt fortiores: quasi vero quæ secundo aut quarto sunt fortiores, periculosa non sint. Aut si Galeni scripturam eligamus, illæ his magis sint periculosa, quod falsum est. Nam quæ secundo die aut quarto fortiores sunt, paribus diebus judicantur æque vel ad salutem vel ad mortem: quæ vero tertio, imparibus. Iam Semitertianam febrem non omnem fieri fortioiem diebus imparibus, & tertio die præsertim, patet ex ea specie, quæ prius à quotidiana incoepit primo die, secundo vero tertianam sibi habet comitem. Itaque statuo Hippocratem per febres non intermittentes intelligere febres, quæ per duos vel plures dies perdurant, ut sunt diariæ plurium dierum, & synochæ, quæ tertio die declinare jam incipiunt aut factæ sunt homotonæ; illæ non sunt periculosa si tertio die intermittant, hoc est, vel in

totum ad infabricationem deveniat, vel remittant, vel permanent in eodem statu eadem febres non intermittentes: his enim modis si remiserint, periculo vacant. De perfectis enim & proprie dictis intermittentibus nequit hic aphorismus esse verus, etiam ex doctrina Galeni. Nam producta tertiana simplex & duplex, intermittentes sunt, nihilominus periculosa; & febris quotidiana non vacat periculo. Quartanas in nonnullis regionibus periculosas esse vidi, ut in Moravia sæpissime in hydropem transmutatas: quod æris, aquarum & victus rationis vitio dandum arbitror. Tertianas à superveniente syncope mortem nonnullis intulisse (raro tamen) observavimus. Porro propter clariorem citati aphorismi expositionem, addendum per fortiores febres significari eas, quarum calor sit validior aut paroxysmus vehementior, quam prior: etiam si alii morbi acuti non supervenerint. Per tertium diem intelligit non omnes illos dies impares totius temporis morbi, sed tantum primum impari ab initio morbi. Quamobrem statuit Hippocrates, non omnes febres continuas periculosas esse: sed eas, quæ invalescunt tertio die. Remittentes vero tertio die ut plurimum, aut proflus intermittentes, sine periculo esse.

CAP. XIII.

Verum brevis, an longa sit hec febris.

Galenus libro de Typis Semitertianam non modo inter acutos, sed etiam inter longos morbos esse connumerandam ex libris *Epidemiorum* Hippocratis statuit: quando Hippocrates docet, præ cæteris maxime lethalem esse, cum in hac morbi eveniunt acuti, tabidos & longis aliis morbis dentos hac præcipue ægrotare. Avicenna auctor est, aliquando hanc febrem extendi usque ad septem menses. Quod tanti viri testimonium sæpe consideravi, quomodo verum esse possit. Nam videtur quoquo pacto humanam intelligentiam superare, Semitertianam febrem, quæ continua est, omnibus suis typis & circuitibus usque in septimum mensem extendi posse, cum vires hominum non videantur esse ferendo tam longum & gravem morbum. Etenim quamvis tertiana, quæ in Semitertiana concurrit, cum quotidiana aliquando in multis mensibus perseveravit, quotidiana tamen continua per tantum temporis spatium nunquam perseverat, uti nec tertiana continua, nec quotidiana intermittens, nisi aliqua duplex tertiana valde spuria adfuerit, & à plurima pituita pronata, aut eadem infarsa in aliqua parte, in qua concoctio materiæ febrilis difficulter procedit: qualis ea esse solet, quam nonnulli symptomatam ex obstructionibus viscerum appellant. Itaque censendum quoque est, Semitertianæ huic longæ, si fuerit primi vel secundi ordinis Galeni, non fuisse adjunctos morbos acutos, qui admodum vires prostrernere potuerint; aut sane intermittentem ex continua factam fuisse: quæ, quo tempore æger vacabat à febre, quotidie præbere potuerit tempus restaurandi vires ægri.

Sic illa matrona (quam narrat in *Epistolis Medicinalibus* Balduinus Ronsæus, sexagenariam tertiana febre annis triginta detentam fuisse) tam mihi

tertiana laboravit, ut tempore paroxysmi singula munia obire & exequi potuerit, de tertio in tertium certa hora horrere leviter inciperet, cum quadam pandiculatione, quam post tres horas levius excipiebat fudor, cum non admodum acri calore. Sed & ad septem menses Semitertiana fe extendere potest, & ulterius computatis una recidivis vel commutationibus in alias febres, quæ utraque in hac frequentissima esse solent: quemadmodum quartanæ in unum vel alterum annum sic porriguntur, ut non semper quartanæ maneat; sed modo hæc intermittit integre per plures dies, quandoque septimanas; modo ubi per hæc tempora in alias febres sese transformavit, repetitiones facit pluribus, propriisque circuitibus reliquo tempore, donec proflus desinat.

CAP. XIV.

De crisi bus hujus febris, commutatione, solutione, quæ per alios morbos.

Raro ejusmodi febris crisi perfecta solvitur intra quatuordecim aut viginti dies, nisi si primi vel secundi ordinis Galeni fuerit, & ea valde exquisita, quæ raro conspicitur: spuria vero quasi semper. Hæc ratio est longitudinis, imperfectæ criseos, commutationis in alios morbos, & recidivarum. Crassa enim materia & frigida longiori indiget mora, ut concoquatur in venis. Observavi plerumque ab initio febris, computatis recidivis, & febrium commutationibus esse primum terminum solutionis diem quadragesimum raro, deinde hoc frequentius sexagesimum, frequentissime octuagesimum, raro centesimum, & centesimum vigesimum, ac ultra.

Modi, quibus perfecte solent judicari Semitertianæ, sunt fluxus alvi, enormes dysenteriae, interdum & colici dolores morbum abbreviant, si sint cum signis concoctionis & facili tolerantia: si abfuerint, in vitæ discrimine versari ægrum dicendum est. Modos autem, quibus imperfecte judicantur, & veluti per recidivas & alios morbos solvuntur longo temporis tractu, & quales illi sint, jam per historias ostendamus.

Primum animadverti Semitertianam in simplicibus, ex quibus composita est, febres continuas vel intermittentes transmutari plerumque intra viginti circiter dies: deinde paucorum dierum intervallo eam febrem, quæ desierat, sive quotidiana fuerit sive tertiana, intermittens aut continua, rediisse per aliquot dies: iterumque ægrum deseruisse per justum statutumque intervallum; factis sic tribus aut quatuor recidivarum circuitibus, nec desinente alterutra febre.

Cum anno millesimo sexcentesimo decimo-octavo Semitertiana minori ipse correptus essem mense septembri, post quartum paroxysmum tertiana liberatus fui: decimo quarto die etiam ab altera, quæ quotidiana videbatur spuria, proflus immunis: vigesimo iterum correptus sum febre, quæ singulis diebus invadebat, cum horrore per tres dies continuos circa vespem, ut illa quæ primo die accessit, levissimos horrores haberet, post extremarum quartæ verum frigus per aliquot horas perseverans: quæ vero sequebatur postero die manifestos horrores monstraret Semitertianæ magis proprios:

D

Modi judicantur.

Historia.

prios: quæ tertio die invadebat iisdem horis vesperitinis, iterum typum primi diei observabat. Tum post hos tres paroxysmos, per tres dies omnino à febre immunis videbar: inde eadem febrium repetitiones animadvertentur, quæ toties suos circuitus fecere, ut jam ad sexagesimum diem ab initio morbi me perduxerint prorsusquam prorsus sanus essem. Et nisi medicamentis blande purgantibus atque obstructions tollentibus, alvum laxam quotidie tenendo valetudini consuluissem, proculdubio ad octuagesimum se extendissent, vel usque ad centesimum vigesimum, ut aliis temporibus.

Figura.

Sic anno millesimo sexcentesimo decimoquinto, mense Augusti, in Moravia uno eodemque die minori Semitertiana corripiebantur plurimi incolæ, quorum omnium fere tertiana, cum ad quatuordecim pervenisset paroxysmos, desuit: quotidiana continua quodam catarrho concomitata supersit cum satis laudabili enazoremate, subsequente alvi fluxu modico. Hæc quoque paulo post in tantum remittebat, ut periti Medici judicassent jam à febre liberatos ægros: quin Medicis valedicentes, ut sani degebant. Post dies circiter quatuordecim duplex tertiana intermittens eos invadebat, tenebatque per quadraginta dies, quibus tandem una tertiana post alteram, consueto suo more, paulatim evanescebat. Totum autem morbi tempus fuit octuaginta dierum.

Aliis à simili Semitertiana febres lentæ quotidie invalescentes circa vesperam statutis horis cum frigore partium extremarum supervenerunt, cum magnis obstructionibus viscerum, jecoris præsertim, lienis, mesenterii, pancreatis ob abundantem pituitam à capite ad hæc partes (ut signa quædam ostendebant) dilabentem. Neque tamen hæc febres lentæ quotidianæ erant simplices, sed spuria causis & typo. Nam portio bilis pituitæ putrescente erat permixta, & una febris diebus paribus tardius (hora scilicet quarta) invadebat; altera diebus imparibus hora tertia, quarum status in singulis paroxysmis matutinis temporibus prius non elucescebat, ut propterea tertianæ duplicis productæ naturam haud sapere mihi videretur. Quippe quæ longam habet declinationem, & breviora tempora principii, augmenti & status. Igitur ex jam dictis spuriis quotidianis, nonnullis quartanæ contigerunt, iis scilicet qui sese non bene in victus ratione gesserant: sed statim redeunte appetitu, plurimo cibo famem, quæ erat plerisque falsa, pellere conabantur. Cæterum pauci ex hac Semitertiana è vita discesserant: ii tamen qui infirmis, antequam ea corripiebantur, visceribus erant, & fenes & capite imbecillo præditi moriebantur, succedentibus apoplexia vel lethargo. Nonnulli quoque circa quadagesimum diem fiebant ex levissima apoplexia, & quæ per quadrantem horæ aut mediam perseverabat (plane quomodo ii, qui animo linquunt & ad se redeunt) cum stertore tamen paralytici, quibus motus artuum, præcipue brachiorum & crurum difficilis reddebatur, superstite sensu. Hæc paralytis à paucis Medicis cognoscebatur. Omnes autem existimabant, hanc ambulandi, corpus erigendi & apprehendendi, crurum & manuum impotentiam (erat enim ut plurimum universalis) à virium imbecillitate produ-

ctam, & propterea ægris copioso alimento, contra meam sententiam subveniendum esse.

Albertus tunc temporis Baro à Wallestein ex Semitertiana die vigesimo in quotidianam spuriam, quæ duplex tertiana ab aliis vocabatur, incidit. Ex hac die vigesimoquarto levis apoplexia, quæ per medium quadrantem horæ cum vix perdurasset (à Medicis adstantibus prorsus syncope, vel animi grave deliquium putabatur: aderat enim stertor) paralytis facta est; quam primo die tantum debilitas ambulandi subsecuta est. Inde cum propter famem supervenientem post apoplexiam, & consilium Medicorum, qui cum à ciborum & virium vitium inopia debilitatum tantum credebant, plus comederet & biberet quam valetudini acquirenda conveniebat, concoctioni scilicet crudorum humorum à febre relictorum, paucis diebus omni ambulandi potentia ablata, brachiorum erigendi & manus ori admovendi, dorsum flectendi & erigendi sese, ac erecte sedendi, caput & cervicem attollendi, in lecto decumbere coactus fuit.

Omnes enim nervi qui à spinali medulla originem habent, ab humore seroso à capite dilabente per magnum foramen offis occipitis, circa quam partem dolebat, erant valde relaxati. Post quatuor dies, nisi mea opera usus fuisset fortioris apoplexiæ recidivam proculdubio incurrisset, à qua mortem effugere non potuisset. Verum cum ex meo consilio mutasset victus rationem (permanente adhuc prius lenta quadam febricula, circa vesperam cum frigore partium fe exacerbatante ex viscerum obstructionibus dependente, & capitis destillationibus in varias subiectas partes, per paroxysmos veluti quasdam recidivas redeunte,) intra dies septendecim, octuagesimo nempe curatus fuit superveniente colico dolore eoque critico, quem ex consuetudine talis crisis illius regionis & anni multo antea prædixeram.

Sed & in aliis regionibus ut Belgio & Italia, quando Epidemicæ grassantur Semitertianæ (ut contigit anno millesimo sexcentesimo decimo-septimo, & vigesimo ac vigesimo primo) colici dolores post longam quotidianam spuriam aut duplicem tertianam spuriam vulgo vocatam, relictam ex Semitertiana, cum eos multo tempore antea prædixissem non sine plurium admiratione, solverunt morbum. Vsu enim longo edoctus sum dolores hosce colicos post duplicem tertianam vel quotidianam spuriam relictas sequi, quod febres præcedentes hos aut concomitantes oriuntur ab abscessu plerumque consistente in pancreate, mesenterio vel cava jecoris, atque inde jam aliquo modo concocta materia ad tenuia vel crassa intestina depellerentur. Contingere hæc vidimus aliquando quadagesimo die, nonnullis sexagesimo, plurimis octuagesimo. Interdum colicorum dolorum loco, perpurcato diligenter corpore & præcedentibus signis concoctionis in urinis cum laudabili hypostasi, diarrhææ accidunt per intervalla repetentes & per paucos dies continuantes, nec ægros delassantes, subsequenter aut præcedentibus sudoribus copiosis, urinis copiosissimis, tenuibus, albis, aquosis. Si dolores colici multo tempore ante criseos tempus comparebant, abscessum in colo aut circa ipsum denuntiabant. His per alvum pus aut sanies cum diarrhæa tempore criseos

Figura.

criseos exercebatur. Nonnullis purulenta materia per urinas excreta in hoc morbo pro pituita & crudo humore habebatur; non sine falla prognosi, qua afferebant morbi jam per longum tempus perdurantis longius tempus, cum finis ejus instaret. Sed hos antea graves lumborum dolores ac colici spurii, quos appello cum Femelio, diu vexaverant. Quibus siue dolore colico febris Semitertiana aut quotidiana ex hac relicta paulatim sine aliqua manifesta excretionem discutebatur sponte post diem quadragesimum, sexagesimum, vel octuagesimum aut ulterius, & plurimo cibo utebantur propter restitutam appetentiam, hos vidi semper plurimum a cibo & potu letos, ac febribus frequentibus ob obstructiones relictas in prima corporis regione obnoxios fuisse, hypochondriacos & melancholicos evasisse, si non in periti alicujus Medici manus incidissent. Itaque sæpe meis auditoribus inculcare soleo, me nullam noscere febrem plurim recidivarum, plurim ac magis variorum morborum feracem, quam Semitertianam.

Illud quoque observandum in hac febre, quod Hippocrates scriptum reliquit lib. I. *Epidem.* omni morbo ac febre evenire: quod nempe quibusdam ægris incipiens floret & viget maxime, infestatque gravius: circa judicium vero, & in judicio imminuitur. Nonnullis moliter incipit & submisce, sed crescit indes, & exacerbatur: sub judicio vero & in judicio abunde elucet. Quibusdam etiam leviter incipiens augetur & exacerbatur, & simul atque aliquandiu viguerit ad judicium, & sub judicio rursus se remittit.

C A P. XV.

De Longitudinis & brevitate febris, commutationis in alios morbos, & speciei futurae criseos præcognitione.

Medicum imprimis prævidere ac prædicere oportet, an longa an brevis futura sit hæc febris, & quæ in ea commutationes ac crises expectandæ sint. Ea quæ præcesserunt, quæ consequuntur, quæque adsunt nobis ista significabunt. Invasiois modus, regio, anni tempus, cæli & aeris constitutio perpendenda sunt. Nam si lente febris hæc procedat ad statum; nec tertianæ & quotidianæ uno eodemque tempore simul invadant, tussis aliquandiu molestaverit modice irritans & sitim extinguens, sine sputo persistat; urinæ sint disperso enazemate vel nubecula, quæ initio morbi magis videbantur compactæ, aut modo laudabilem habeant hypostasim, modo rursus enazemata tantum vel compactum vel dispersum, aut aliter tarde fiat laudabilis, longa febris futura est.

Si febris sine signis concoctionis ægrum reliquerit & valida aliqua evacuatione per abscessum vel sudores & urinas copiosissimas, aut norabile sanguinis profluvium, pro cruda recidiva est expectanda, aut commutatio in alium morbum. Et si mors non præveniat, quadragesimo, sexagesimo, ut plurimum octuagesimo, raro centesimo vigesimo, vel ultra finem suum habent recidivæ, aut morbi commutatio, etiam si ægri foras progrediantur, & ut sani vivere videantur. Nam & ipsæ commutationes plerumque suas recidivas etiam faciunt, ut quotidiana vel duplex tertiana, colicos

dolores, abscessus circa articulos, ut parotides, & qui circa viscera fieri consueverunt.

In Æthiopia & Africa alitque calidioribus regionibus judicantur Semitertianæ septimo vel undecimo, vel commutantur in alios morbos, quemadmodum etiam anni temporibus pestilentibus, & vere ac æstatis initio in adolescente, juvenili, ac viridi ætate. In frigidioribus regionibus paulo tardius, præsertim si anni tempora valde inæqualia fuerint. Et pluviosa, frigida, tempestatibus frequentibus lacescita, autumnus instet, & senilis ætas.

Conducet hic etiam considerare species Semitertianæ. Nam Hemitritæa major brevis est: cæteræ ut plurimum si ad mortem, breves; si ad salutem tendant, longissimæ, si recidivas & commutationes earum temporibus includere voluerimus: alias intra viginti dies veluti aliæ acutæ simplicifque febres ut plurimum terminantur.

Conjectari etiam oportet earum commutationes futuras & species criseos. Vernis temporibus plerumque in quotidianam aut duplicem tertianam spuriam transire, si fluxus alvi insignis, aut copiosissimi sudores critici aut scabies non prævenierint, & si nulla malignitas & pestilens aeris qualitas regnet. Si vero hæc adsint, maculae, petechiæ dictæ, exanthemata, parotides expectandæ. Æstate dysentericæ veniunt, & quartanæ, si autumnus instet, duplex tertiana vel quotidiana frequenter recidivans, quæ tandem sæpe in dolores colicos abit circa autumnum & hyemem, eoque magis quo annus qui præcessit austrinus frigidus ac humidus fuerit, in temperatis regionibus, ut in Lombardia. Si vina quæ eo anno maturaverunt, omnibus in locis, tam planis quam montosis, consuetam maturitatem adeptæ non fuerunt, inde plurimos ægros conjecturandum est austera vina bibisse, & intestina ac ventriculum præter morem refrigerasse. In Moravia corporibus diu vexatis post Semitertianam à duplici tertiana & quotidiana spuris, nægri licetibus & obstructionibus jecoris aut mesenterii ac pancreatis, frequentissime superveniunt critici dolores colici. Quæ cuncta sunt ob inæqualitatem materiæ putrescentis ac putrefactæ, transcurrentis de una parte ad alteram per venas & arterias à valida vi expultrice naturæ & partium recipientium imbecillitate. Hæc profecto Moravorum intestinis inest maxima ob aquas crudas, vina cruda, & vitum nimis intestina refrigerantem. Colicos dolores futuros sæpe prædixi ex medicamentis calidioribus purgantibus assumptis, ut pilulis cochiis & quæ aloen aut colocynthidem recipiunt, nil purgantibus aut minus, quam virtus medicamenti requirebat; qui tamen antea dum sani essent optime purgabantur ex lenioribus quibusdam purgantibus medicamentis & refrigerantibus melius hos ægros, quam fortiter purgantibus. Ex alvo admodum pigra, nausea, inappetentia, ciborum vomitu, aut gravitate à cibo ac molestia quadam (quam percipiunt maxime inter respirandum) metiente cingulum, quo ægri sibi præcordia & ventriculum per transversum constringi sentiunt; ab ardore quem inter mingendum sentiunt; vel urina rubra, crocea, biliosa, oris amarore, siti, inappetentia, vigiliis, artierum pulsu, febre continua quotidie se exacerbante, veluti quotidiana spuria. Hæc enim

Prædictio ex regionibus, ætate, & anni temporibus.

Ex speciebus Semitertianæ.

enim mala præcedunt, & invalescunt cum instant dolores colici, & permanent una cum aliis sæpissime per aliquot dies, si autumnus jam adsit, ut in curatione explicabimus.

Duplicem tertianam vel quotidianam continuam seu intermittentem, quæ ex Semitertiana relicta est, terminaturam per diarrhoeas, & copiosas urinas, cognoscitur ex præsentibus signis concoctionis in urinis, hypochondriorum murmure, & lumborum dolore superveniente juxta Aphorismum lxxxi, lib. iv Hippocratis: *Quibus hypochondria suspensa murmurant, lumborum dolore superveniente, in alvi humectantur, si non statim erumpant aut (legendum forte, &c) urina copia prodeat: hæc autem in febribus.*

C A P. XVI.

De Signis, per quæ plerumque morituros agros prævidere licet.

ATque hæc de commutatione in alios morbos & crisi in Semitertiana, ex qua plerumque supervites evadunt homines, dicta sufficiunt: modo sequitur, ut de iis agamus, per quæ præscire consuevimus magna ex parte agros morituros. Hippocrates lib. i Epidem. Semitertianam præ cæteris lethalem esse dicit, in qua morbi eveniunt acuti, & recte. Nam cum ipsa febris sola per se apta sit magno opere vires dejicere, tum multo magis prosteruntur, cum morbi superveniunt acuti, quorum magna pars per se periculosa est, quidam etiam maxime lethales: quales sunt apoplexia, paroxysmus epilepticus, catechos forte Aetii, & alius quidam morbus in Germania & Pannonia frequens, quem Austriaci, Moravi, ac Styri *timorem* appellant, inter apoplexiam & epilepsiam quodammodo ambigens. Cadunt enim velut apoplectici sine sensu, non tamen motu privantur, neque tamen convelluntur ut epileptici: aliquando stertunt, nec tamen discusso morbo paralyticum alicujus partis incurrunt. Porro præter hos morbos acutos, superveniunt lethargus, convulsio universalis totius corporis, sed maxime tetanus, & motus quidam convulsivi, in brachiis conspicui, quando carpo admotis digitis explorant pulsus; præterea marasmus, strangulationes ab utero, angina, in qua difficillime deglutunt acri ob calidissimos vapores à præcordiis ascendentes, ad caput asperæ arteriæ & oesophagi principium ac faucium. Nonnunquam & propter inflammationem, quæ in arteria magna est & vena cava, accenditur oesophagus, & interior ejus tunica ita obdurescit, ut acri strangulentur, aut cum cibum deglutire nequeant, sola media è vita discedant, quæ metuenda est, ubi lingua perquam arida evasit & aspera, veluti in ardente febre. Diurni sunt quoque morbi, qui si Semitertianæ superveniant aut illis hæc incidat, funesti sunt, ut hydrops, cachexia, aut tabes. Quibus pulmonum substantia labefactata est, & obstructions insignes in mesenterio, jecore, liene, pancreate, & colo; raro ab hac febre liberantur, præsertim si Semitertiana fecundi ordinis Galeni fuerit: quod si transmutationem fecerit in alias febres longas, ut quotidianas, tertianas duplices, abscessus circa ventrem, colicos dolores, hydroperem, dysenteriam, cachexiam, plerumque per-

eunt. Dysenteria cum hac febre incipiens periculosa quidem est; sed tamen non valde lethalis. Nam per hanc plurima febrilis materiæ copia, etiam si cruda sit, expurgari consuevit, quæ initio morbi allevat ægrum, etiam si concoctionis notæ nullæ fuerint prægressæ. Quod si vires ilico prosterantur, funesti valde, præsertim si una peticulæ initio morbi aut exanthemata comparuerint. Nam si sistere voluerimus dysenteriam, augemus febrem: si finiamus eam fluere, ab inanitione vires nimium prosterantur. Dysenteria quæ critice supervenit, etiam si imperfecta sit crisis, laudabilis. Idem dico de diarrhoea, in qua corrupti & fetidi humores excernuntur: & de colicis doloribus, si statim cum febre, si paulo post eam supervenerint. Maxime si tres affectus in eo qui insignes viscerum obstructions habet, & cui superveniunt vomitus, convulsio, singultus, mortem præfagiant. Si initio variolarum superveniat Semitertiana, aut ex hac invadant, spes in angusto est.

Juvenem quandam strenuissimum Danum, ex Ranzoviorum familia curavi, qui cum una cum hac febre in variolas incidisset, in tribus recidivis hujus febris tres variolarum recidivas passus est ante parotidas. Cæteris, cum post variolarum expulsiorem & febrem fynocham comparuisset, lethalis Semitertiana fuit, quod totalis variolarum expulsio prohiberetur ad partes externas ab internis.

A lumborum dolore initio huic febre conjuncto una cum febre sese exacerbante, pestilens febris aut maligna plerumque expectatur; præsertim si talis sit anni constitutio, in qua pestis aut febres malignæ populariter grassantur. Horum multi anno millefimo sexcentesimo primo, verno tempore in petechias inciderunt septimo vel undecimo, quandoque etiam decimo quarto, & mortui sunt undecimo, decimoquarto, decimosextimo, & vigesimo cum delirio & aliis morbis acutis. In horum cadaveribus apertis inflammationes, gangrænae, corruptiones in intestinis, ventriculo, reliquisque visceribus omnibus, aut harum aliquibus, ut mesenterio, omento, jecore, liene, visæ sunt. Quin & pulmonum una, vel altera fibra, etiam si sine tussi decubissent. Proveniunt hi dolores lumborum à putredine insigni, inflammatione, & cacochymia biliosorum humorum in vena cava & arteria magna, quæ per dorsum & lumbos perreptant, consistentium.

Decipi autem hic nos non oportet, si dolor lumborum ab aliqua causa evidenti nascatur. Ut à menstruorum profluvio vel instante vel jam fluente, gonorrhoea magna, calculo, aliave renum dispositione: vel si quis in lumbos ceciderit, vel ictus acceperit. Nam tunc hi dolores non à febre oriuntur, sed à propria causa. Hocque illud est, quod nos docere voluit Hippocrates lib. Coacar. prænot. quando sic scribit: *Lumborum dolor sine causa manifesta sæpe impetens, maligni morbi signum est.* Nuper nupti, aut alias plurimum Veneri incumbentes, & qui multum celeriterque equitarunt sicque magnum iter brevi confecerunt, si in Semitertianam incidant & una statim in dolores lumborum, temporibus quibus febres malignæ grassantur, in eas plerumque & ipsi incurrunt.

Cæteris

Lumborum dolores in febribus variolis

Cæteris vero temporibus, in quibus febres malignæ vel pestilentes non comparent, prædicere oportet hos præ aliis pejus se habituos ac periculosius ægotaturos. Horum nonnullos observavi, etsi viginti jam dies superassent, aut primum impetum morbi, quo malignitatis & petechiarum signa elucescere confuissent, in recidivis ægre salvatos, quosdam in longos morbos incidisse, ac longas & difficiles crises habuisse. Nonnullos etiam in prima recidiva, aut secunda, aut tertia, aut quarta, aut ea, quæ post sexagesimum diem comparebat, derepente mortuos. Itaque quod ab Hippocrate scriptum legi in Coac. prænot. ex dorsi dolore agitudinis principia difficilia sunt, in hac febre frequentissime verum esse deprehendi.

CAP. XVII.

De Semitertiana Pestilentis Cornelii Gemma Symptomatibus, & prognosticis.

ANno millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, tertio, & quarto Epidemica febris pestilens Belgium invasit, quam, quod ad Galeni Hemitritæam proxime accederet, pestilentem cognominavit Cornelius Gemma; ego vero malignam. Nam vix unum vel alterum se vidisse scribit tunc temporis, qui omnibus signis absolutam Galeni Hemitritæam patiebantur. Hujus igitur accidentia, quæ omni fere morbi tempore contigerunt in plurimis ægris, & prognostica, non inutile fore judicavi, hic ex eodem autore adungere. Sic enim scribit: Incipiebant febres cum gravissimo dolore capitis, & somnolentia propter effervescentem spiritum, vaporis, exhalationisque crassissimæ ex subiecta materie, quæ assidue à corde per arterias sursum ad cerebrum exundabat. Aderant & communia cætera, ingens præcordiorum dolor, sitis, inflatio spiritus frequens, suffiria luctuosa, jactatio corporis, extrema lassitudo, frequentes vomitus circa initia, sæpe & ventris per inferna excretio turbulenta, in omnibus & bilis exuperantis summæ malignitatis, & pituitæ lentior apparuit. Multis à primo assultu desillationes gravissimæ in nares, in stomachum, in metapneumum, crura aut brachia perfluabant, cum dolore spina intolerabili. Plerisque statim sudores rari, subfrigidi, sine dicrum lege, aut ordine promanantes, qui in perfrigerationem exitiosam cum stertore, ut plurimum desinebant. Sæpe cum illis pustula varia, & exanthemata in variis partibus occurrerant, nunc cum tumoribus, nunc cum vesicis atque ampullis, nunc denique cum exoriatione totius, pro acrimonia vehementia, & putredinis modo. Multis insomnia fere continua post nonnum, undecimum, decimumquartum diem, in somnum dicrum plurimum terminabantur, quibus & curationis spes multo major affluerat: præsertim ubi sudor universalis accesserat: contra, quam aliis, quorum vigilie transibant in coma lethargicum, aut cataphoram, aut catalepsi. Multis parva quedam initia, & valde tranquilla, exiguum latentis veneni suspensionem de se dabant. Verum illicet à quarto, aut septimo die in phlogism maximam evadebant, cum delirio, alias continuo, alias interrupto. Quibus à principio vehementia major, his fere minus periculi fuit. Qui vehementius purgabantur, mortui sunt plurimi ante crism. Quibus aures obsidebant, etiam in melius progrediebantur: foras enim vertebatur morbus, ac vel sudoribus copiosis, vel superveniente lotio crassiore sunt restitui. Quos sudor non judicabat, longa

illis impressio febris, quid heciticum olens cum cachexia vestigio, permanebat. Qui magis debus imparibus agitabantur, iis & magna ex parte funesta catastrophæ fuit. Moriebantur, quibus & sanguinis boni profusio ante septimum diem. Nam symptomatica erat excretio, non naturæ providentia, aut gubernaculū fulta. Peribant & illi, quibus quartum inter & nonum diem sudores subfrigidi, aut pustule parvæ, & nigra nunc foras erumpentes subito, nunc ab oculis oblitescerent. Sequebantur hæc ex vestigio magna deliria, tremores manuum, pedum, pulsus convulsorii cum jactatione corporis, & summa inquietudine, lingua tremula, urinae & alvi incontinentia, tandem ex sudore continuo perfrigerati, ac rigidi spiritum exhalabant. Urina ut plurimum inter initia tenues, minimum tinctæ, sed sensim ex pallido in rufum, inde in sanguineum, passim, aut atrum penitus mutabantur: neque ullum curatum memini, nisi prius in illis cum plurimis bilis & pituitæ portionibus crassissimum venerit sedimentum, instar puris aut facis: etsi plerique anticipans ventris profusum hanc urinae speciem intercepti. Mortui sunt septuaginta cum atro admodum circulo, contenta urina consimilia, atque ex eisdem spirans teterrimus factor. Multa erant in hoc morbi genere propemodum prodigia: quæque divinum illud Hippocratis in una mixtura totius forma inclusum, & abditum tenebant. Quam ultimam propositionem, paucis interpositis, probat his verbis: Primum est, quod etiam nono die præterito, ac decimoquarto morbi vehementia perduraret sæpe usque in vigesimum, vel vigesimuseptimum diem. Cum enim raro conveniant simul & graviter affligere, & diu persistere, idcirco compositam fuisse materiem, & modo mirabilis fermentatam, facile colligebam: videlicet igneas quasdam putredinis partes in profundo positas, quæ sensim urentes sub multo tamen glutinoso, & aquæo delitescerent. Erat aliud ejusdem propemodum argumenti, illa nimirum frequens somni, insomni, avocis, delirii alterata vicissitudo, confusa interdum, qualis in sopore vigili à Galeno est exarata. His adde, quod plurimis vigore præterito, tamen & morbi sit aucta malitia, ut, quasi devorato bove, tamen in cauda deficerent. Hac autem simul constare posse Galenus ostendit libro de morbi temporibus, restincto quidem incendio secundum extensionem, sed intus grassante putredinis virulentia cum obstructionis materie, tum summa jactura virium: ut quam excoquere plene non potuit, propter malitiam facultas imbecillior non absolbat, imo vel aggredi in posterum vacetur: & quos totius mali ferocia minime sustulit, diuturnitas paroxysmi, & repetitio crebra confecerint.

Sed quid ex eo repetam singulares historias, quibus incredibilia ægris supervenisse narrat, propter peculiare cujusque subiecti temperamentum? In lingua multorum tantam animadverit asperitatem, ut in fissuris aridis vasta profunditate dehisceret, & cum sanie hæc etiam sanguinem stillarent. In aliis inflammata rursus ac valde tumens, in nonnullis hiuleam, squameam, instar nigricantis corticis, item prassinam quandoque ob bilis pressinæ & ifatoidis copiam incredibilem. Vidit quoque linguarum tunicas abscedere, ut absque tergendis sordibus & pelliculis, spacio horarum viginti-quatuor, vix cochlearia septem vel octo sufficerent. Quæ quantitas nequaquam diminuebatur tractu temporis, sed detractis aliis indies aliæ subnascebantur cum suffocationis periculo. Et hæc illis scribit potissimum contigisse, qui à vino abstinabant. Mulierem quoque idem Gemma invisit, cui in pelli-

culas crassas & glutinosas non solum lingua, sed & oesophagus universus cum ventriculo, tandem & intestinorum tunica computruerunt. *Hæc, inquit, inter initia sciens maximopere vinum auferum & rubrum hauserat in uno die prope ad quantitatem librarum sex, unde sic illi gustur incanduit, ut nec liquidiore cibos transmittere nedum medicamenta potuerit. Obiit illa miserrimo fato damnans humana presidia multumque impatiens, quod ne potius quidem accipiendo in acerbissima siti vitam aut instrumentum commodum reperirent. Prima huic alba semper inter calores maximos totius corporis, in qua tamen odor grævis & pisculentus indes augebatur, unaque fluebant primo fursures quadam, inde pellicula, & postremo pus manifestum, villis, festucis & tunicis variis intertextum. Aderant singultus, ructus assidui, cum tanta doloris acrimonia circa præcordia, ut tanquam parturiens miserrime clamaret. Sed post deliria parva ventris torso supervenit, ac primum scitida, virulenta per sedem copia incredibili profluxerunt, inde & sanguis per os, & per posticam cum dolore punctili vehementi, à qua ita per acerbissimos cruciatus extincta est paulo post viginti simum diem.*

In Urinis etiam quorundam hæc scribit se observasse post septimam diem, primo ramenta quædam crassiora tum carnea, tum membranosa successive, postea fursurea, demum veluti in atomos comminuta quædam corpuscula, prout putridus calor accensus in carneas aut solidas partes se insinuaverat.

Vidit etiam in quatuor aut quinque, quibus post diuturna deliria velut pus exactum in urinis magna copia subsideret. (Quod & ego sæpe, ne dicam semel, me observasse memini) principio rufum, deinde carminatum, & sanguinolentum; postea album, leve & æquale. Ita, ut variis humoris rudimenta, in locum suum tendentia, pro alimentis specie reciderent. Erat autem plerisque subærum in fundo, scorsim livescens, atque ita sensim candidius atque tenuius. Sedimenti crassioris medio coronam æmulante, in cuius medio vacuum cum esset, transparebat uri-

na, sine sedimento purulento. Cum talibus urinis scribit ægros plene judicatos. Memini me quoque invisisse generosum Baronem Hauvitiu quendam Moravum Semitertiana correptum, jacentem sine pulsu perceptibili per quatuor dies per similes urinas judicatum fuisse. Anno millesimo sexcentesimo primo mulier paupercula quadraginta circiter annorum per maculas nigras, satis magnas in universo corpore dispersas, judicata fuit, cum jam domo egressa sua munia exerceret, perque plateas obambulans sine noxa huc & illuc Patavii cursitaret. Mercatori autem Cornelii Gemmæ pustulæ nigrae per totum corpus ante septimum oriebantur; iis delitescentibus delirium accidit, superveniente circa undecimam ventris profluvio, qui deinde sanguinis atrii purulenti foetidi magna copia per os reddita expiravit. Judicatos etiam quosdam vidi per sudores copiosissimos & per multos dies perdurantes, & scabiem erumpentem per totam cutim, quorum qui unguentis scabiem pelle- re conabantur, recidivam passi sunt vel Semitertianæ, vel quotidianæ spuria.

Adjungendum hic quoque ex eodem Gemma, ^{Historia} quod de matrona sibi narratum scribit, tantam scilicet putredinem circa cerebrum & ejus meninges in dissecta hujus calvaria post diuturnos & vehementissimos capitis dolores notatam fuisse, ut vermiculorum & cemicum copia incredibilis conspicienda sit. Hæc pro pleniori hujus febris cognitione ex Cornelio Gemma, doctissimo suæ tempestatis Medico, recensere tironi volui, ut sciret plerisque signis, quæ ad ejus cognitionem & prognosim superius enarravi, apparentibus, etiam si varii ac diversi affectus pro corporis cujusque idiosyncratia, diverso ac vario cæli & anni temporum & regionis statu compareant, & alios morbos mentiri videantur, plurimum tum ad febris naturam judicandam, & ejus futurum exitum prædicandum, confidendum esse.

FINIS LIBRI SECVNDI.



SEMITERTIANA

LIBER TERTIVS.

Curationis maximam partem absolvit.

C A P. I.

Hactenus neglectam hujus febris exactiorem curationem; quam ratione moris & motus febris differre scribit.



Vm igitur hæc febris olim usque adeo frequens fuerit, & hodie quoque talis sit (siquidem quibusdam regionibus endemia & fuit & est, nonnullis epidemia ob anni temporumque mutationes assignatas, sparsim vero per totum mundum

nullis non anni temporibus, sed maxime æstate, autumno ac vere ob immoderatam victus rationem conspicitur) cum deinde tam periculosa sit, funesta aliquando, sæpe contagiosa, ut non secus ac ipsa pestis multa hominum millia invadat prosterneatque; cumque etiam Medicorum prognostica tam frequenter illuferit hæcenus, & ipsam plane non cognoscentibus etiam nunc illudat, mirum est, neque Galenum in *libris Methodi*, & de arte curandis ad *Glaucum*, neque quenquam ex aliis veteribus qui extant, multo minus ex recentioribus ullam ejus curationem tradidisse. Et credo equidem hanc fuisse causam, quod à plerisque neglecta, à paucis visa & cognita fuerit. Sed non satis est, cum compositam hanc dicat esse Galenus, & ideo mixti in ea sint humores, bilis nempe & pituita, compositas ac mixtas ponere indicationes curativas, quales nempe utrique humori conveniunt in tertiana & quotidiana. Verum mehercule opus est diligentius remedia pendere (per quæ contrariis propositis indicationibus satisfacere debemus) qualia illa sint : quæque longo usu & experientia probata sunt peculiariter huic febri profuisse, tum qua quantitate, mixtura, quoque tempore adhiberi debeant. Et quanquam tria remedium (communia etiam aliis morbis) genera in hac febre sint præscribenda, chirurgica, pharmaceutica ac diætetica: tamen sine distinctione moris & motus hujus febris recte ea adhiberi non possunt. Convenit enim prius Medico considerare an Semitertiana, quæ curanda proponitur, benigna sit, vel maligna & pestilens.

C A P. II.

De Venæsectione, an hæc in omni specie Semitertiana adhiberi debeat.

Equidem venæsectionem in omni tertiana commendavit Celsus. Per venæsectionem more veterum intelligit eam, in qua ad minus libra una sanguinis extrahebatur. Sed primo an in omni benigna, maligna & pestilenti adhibenda sit; deinde, qua quantitate; tertio, quo tempore sanguis in utraque extrahi debeat, diligenti indiget perscrutatione.

Quod in nulla harum recte adhibeatur, commodissime sic probari potest. In quibus morbis adeo copia pituitosa materia vel in vasis, vel extra vasa, non convenit venæ sectio. Nam si ad libram & amplius sanguis evacuetur è vena cubiti, refrigeratur corpus, calor nativus & vires labefactantur, quæ sunt summopere conservandæ: in benigna, quia plerumque est morbus qui vel ex acuto degenerat in chronicos morbos, vel acutis morbis accidentibus valde prosteruntur ægri: in maligna & pestilenti, quia ilico in hac vires deficere consueverunt. Quod autem in Semitertiana benigna, quam maligna & pestilenti secundum Galenum sit copia pituitosorum humorum, non opus est aliis demonstrationibus, quam eorum locorum quos in præcedentibus duobus libris citavi.

Rursus contra, quod in omni Semitertiana adhiberi debeat, his rationibus concluditur. In omni morbo (ajunt peritiores Medici) vena secanda, qui magnus est. At hæc febris siue sit benigna siue maligna & pestilens, talis est. Magnus enim est morbus benigna, ratione sui generis, causæ & symptomatum. Nam aut prima regio, ventriculus, intestina, jecur, partesque circumvicinæ, aut majora vasa gravem humorum biliosorum & pituitosorum putredinem in se continent, ut Galenus tradit, vel, ut ego observavi, aliquando unum vel plura commemoratorum viscerum, & una cum his pulmones quoque, interdum & cerebrum inflammationem patiuntur: quibus omnibus supervenire plerumque consuevit aliquis acutus morbus, aut aliud grave symptoma ut sitis, vigiliæ, inappetentia, dolores, quibus vires magnopere convelluntur. Sed & maligna, præter hæc omnia pravam in se continet humorum venenatamque qualitatem, ob quam solam magnus morbus Semitertiana dici meretur. Quapropter perpenis diligenter omnibus hisce rationibus, Celsi consilium in omnibus quatuor generibus Semitertianæ optimum esse reor:

Quod in nulla benigna maligna febre vena sit secanda.

Quod in omni Semitertiana sit secanda.

In quibus
speciebus
hujus
febris non
conveniat
venae
sectio.

reor: at in eorum speciebus omnibus istud non fe-
quor. Nam in ea quæ est primi & secundi ordinis
Galenī, præterea in majori Hemitritæo & Aga-
thini, quando sunt spuria pituitosa, venæ sectio
non convenit. Etenim secta in cubito vena, eva-
cuatur sanguis tenuior & a putredine liberior, cras-
sior, crudiore ac putrido permanente in ventri-
bus & præcordiis, seu vasis majoribus. Et quan-
quam ratione caloris febrilis aliquid refrigerium
expectare queamus ab hac sanguinis evacuatione,
tamen in ejusmodi febre non tam urget calor fe-
brilis, quam crudi humoris concoctio. Morbi præ-
terea valde acuti & symptomata his spuriis & pi-
tuitosis febribus non valde accidunt, quæ venæ
sectionem postulant. Imbecillitas præterea ven-
triculi, difficilis ciborum concoctio, animi ob utra-
que deliquia venæ sectionem prohibent.

In quibus
conveniat.

Quamobrem in Semitertianarum quatuor ge-
neribus exquisitis, & spuriis biliosis constantibus
viribus & abundante sanguine simplici vel bilioso
laudanda venæ sectio, ut in iis, quorum facies est
rubicunda, non pallida, venæ amplæ, urina rubra.
Nam hæc vel abundantiam sanguinis declarant,
vel summum ejus fervorem. Quibus præterea ve-
næ sunt amplæ, in his spes est per venam sectam
nos posse evacuare etiam aliquid humoris putridi,
qui in vasis majoribus continetur. Sed & ratione
morborum acutorum, & symptomatum, ut do-
loris capitis, & lumborum, apoplexiæ, epilepsiæ,
convulsionis à plenitudine, lethargi, anginæ, pe-
ripneumonix, volvuli, & aliorum id generis hoc
præfidium convenit, quod plerumque vel à summo
fervore, vel ab inflammatione partium originem
habeant.

Fortassis quispiam putaverit venæ sectionem
etiam vitandam esse in ea, quæ est secundi ordi-
nis Galenī, & in quarta specie, quæ est Agathi-
ni, seu minor Semitertiana. Propterea quod hæc
pituitam (loquor nunc secundum Galenum) cum
habeant in ventriculo & primis venis melaericis,
periculum sit, ne crudi & putridi humores à vena
secta in majora vasa rapiantur, & sic fiat major He-
mitritæus omnium maxime periculosus, vel au-
geantur obstructions in visceribus. Testatur enim
Galenus lib. v. de Sanis. tuenda, evacuationis venis à mis-
so sanguine facile esse ut attrahatur cruda illa pi-
tuita, quæ per alias venas distributa in visceribus,
& in universo corporis habitu plures validiores
que excitet obstructions. Ideo videmus quoque
Libro de Arte curandi ad Glauconem, nec alibi, fa-
ctam mentionem venæ sectionis in curatione quo-
tidiana.

Responsio.

Sed ad hanc objectionem respondemus, distin-
guendum esse tempus sanitatis, in quo aliquis præ-
servari cupit à morbis impendentibus ab eo, in
quo jam facti morbi, & præcipue febris habentis
putredinem in vasis, & plerumque cum visce-
rum inflammatione. In illo enim (prima regione
crudo & pituitoso humore repleta) metuendum
est, ne sanguine misso ex cubito rapiatur humor
crudus in venas majores & viscera, atque sic ob-
structions vel augeat vel pariat nondum factas.
Nam tunc carnes totius corporis sanæ, robore at-
tractricis facultatis pollent (qua plurimum sangui-
nis contenti in vasis consumitur) unde evacuato
sanguine & attrahentibus carnibus duplex fit in

vasis evacuatio, naturalis videlicet & artificialis,
ob quas crudi humores à ventriculo ac prima re-
gione facile possunt ratione vacui in vasis & attra-
ctricis in carnibus robore rapi in viscera & vasa
majora. At in hoc tempore, quo febre præsup-
posita premitur homo, id non est metuendum:
quia carnes parum attrahunt, interdum etiam nil,
si multa & magna putredo consistat in vasis majo-
ribus vel prima regione corporis. Nam robore
attractricis facultatis languent propter febrilem
intemperiem, aut prorsus privantur, ut in iis, qui
lethali vel pestilenti Semitertiana laborant, pro-
pter insignem copiam putridorum humorum bi-
lioforum & pituitosorum, aut eorum putredinem,
quam continent in vasis, vel ut nonnullis placeat
extra vasa. Quod enim pro alimento iis non con-
venit, quomodo id attrahent ut cedat in alimen-
tum? Quapropter quotiescunque quis venæ sec-
tionem instituit præservationis gratia, recte à pe-
rito cavetur ne ea fiat antequam ventriculus &
prima regio cibum concoxerint, aut maximam pi-
tuitæ partem digesserint. Sed quod si aliquando
contingeret quempiam in signi plethora abundare,
& crudis etiam in ventriculo humoribus, huic pro-
fecto non differrem minime febricitanti etiam san-
guinem ex brachio demere: diminuta enim ex
parte plethora calor nativus partium antea op-
pressus melius concoquet, nec rapietur crudus hu-
mor ad vasa majora à primis venis. Quia in ple-
thorico corpore carnes plurimo alimento sunt sa-
tiatæ. Itaque vel non attrahunt, vel debilitat.
Adde quod plurimum sanguinis in venis continetur,
unde petere alimentum queant, vasa & præ-
cipue venæ nimia copia sanguinis liberatæ me-
lius retinent, & sanguinem contentum constrin-
gunt.

In maligna & pestilenti Semitertiana video do-
ctis quibusdam viris suspectam venæ sectionem.
Cornelius Gemma scribit in pestilenti sua Hemi-
tritæa observatum fuisse mortuos plures, quibus
venæ sectio achibita fuit, quam quibus omissa. Et
Galenus libro de boni & mali succi cibis scribit; nun-
quam vel raro aulos fuisse Medicos sanguinem de-
trahere in peste, quæ Romam suo tempore inva-
serat, etiam si initio morbi essent vocati. Sic etiam
nostris temporibus plurimis in locis timent sangui-
nis missionem in illa contagiosa Semitertiana, in
qua peticulæ expectantur aut metuuntur, aut jam
comparent: ut anno millesimo sexcentesimo vi-
gesimo primo & secundo Patavii ac Venetiis vidi-
mus. Ratio, cur hoc auxilium fugiant, hæc est.
Quod in ejusmodi febre vires statim concidunt;
quarum conservatio omnibus modis est in hac cu-
ratione procuranda. Sed & illud in his maxime
dignum notatu animadverti, corpora ægrotantium
Semitertiana maligna, multo antea tempore dis-
poni ad altam quandam putredinem, quæ jam in-
vasit viscera clandestino gradu, antequam signis
sue febris se in conspectum proderet. Quod si
jam prodierit febris, etiam si vires consentent & nulla
adsint præsentis malignitatis signa, qualia sunt à
vulgatis præcticis commemorata, pulsus parvus,
debilis, inæqualis, maxime urinæ confusæ ac tur-
bidæ, peticulæ maculæ incipientes, tamen vix
venæ sectioni ullus amplius est locus, ut ea putre-
dini resistatur eventualiter scilicet vel evacuando
aliquam

An in Semi-
tertiana se-
cundi ordinis
Galenī venæ
sectio sit vi-
tanda.

An in mali-
gna & pesti-
lenti Semiter-
tiana venæ
sectio.

aliquam portionem materiae putridae una cum bono sanguine. Nam tota, quae postmodum latius ferpit, evacuari per venam sectam nequit. Quare ut venae sectionem, ad praevendam Semitertianam malignam, optimam in pluribus judico, quo tempore periculum est ne in aliqua domo vel familia in plures contagione sua serpar; sic in jam facta (nisi plethora quoque opprimantur vires) tutius omittitur, praesertim si initio febris malignitatis ea signa jam se monstraverint, quae ego tanquam verae malignitatis prodroma recensui. Quod si valde obscura sint, tunc eam non soleo adhibere, nisi praehabito prognostico futurae malignitatis. Sic tam magnum remedium, quod in tam multis febribus indicies experiri esse salutiferum, profanari non fuit.

Memorabilis exempli, cujus in fine primi libri à me facta fuit mentio, recordatio hoc in loco non est praeterenda, mulieris nempe pauperulae viginti quatuor annorum, temperamenti calidi & humidum, cancerum habentis circa posteriorem femoris partem qua clunes desinunt. Cum enim hac incidisset in talem affectum ex male inciso & aperto steatomate, ut aliis videbatur, aut atheromate, ut mihi persuasi, ad eum abscondendum radicitus cum suo peciolo medicocriter crasso (cum neque musculus, neque nervus affixus esset) eam sum cohortatus, opportuno tempore veris, post universalem corporis purgationem. Vlcus erat tam latum ac profundum & crassum, excrecentia carneâ cancrofa, admodum dolorosa, ex fundo suppullulante, & indices quando ejus portio abscondebatur renascente compositum, ut pileum meum neque ingredi posset; nec eo integrum cum suo lato pediculo capi. Pruinae seu recoctae similis materia magna ejus frusta quotidie ex ulcere premedo eximebantur una cum sanguine, cujus quotidie plures unciae, saepe ad mediam libram per idem ulcus effluebat. Et quamvis hoc sanguinis profusum per plures menses ita continuasset, nihilo tamen secius à Semitertiana primi ordinis Galeni servari non potuit, cum in eadem domo omnes eadem antea inficerentur. Hoc tantum vidi, ipsam per sanguinis & humorum evacuationem, quae fiebat per cancerum, consecutam fuisse, quod Semitertiana in hac maligna & funesta, ut in aliis ejusdem familiae non fuerit. Diuturna tamen & hac fuit, & plane cum iisdem recidivis (cum quibus alii, qui malignam erant passi) per tres menses vivebat. Hanc historiam pluribus hic repetendam duxi, ut ex spontanea sanguinis evacuatione, quantum venae sectioni in curanda praeservanda quae Semitertiana sit tribuendum pateret. Quod si in bello vel ob annonae caritatem & pravam victus rationem, atque aërem admodum pravam multos milites contingat à tali febri invadi, nulli horum venae sectio instituenda est. Idem etiam in pestilenti Semitertiana faciendum moneo; & magis in hac ab ea abstinendum propter acumen morbi & subitanam, quae instat, virium prostrationem, quam in maligna. Patet igitur, neque in omni Semitertiana venae sectionem adhibendam esse, neque in omni omittendam; deinde in quibus conveniat, vel non.

Sed quoniam ab initio argumenta eorum attulerimus, qui in omni Semitertiana venae sectionem vel necessariam vel noxiam sunt arbitrati;

nos autem quasdam posuerimus in quibus eam laudavimus, quasdam in quibus eam vituperavimus, tempus est respondere eorum argumentis, qui eam negant in iis, in quibus venae sectionem laudavimus, ut in Semitertiana primi ordinis Galeni.

Dicent enim in hac febre virtutem quoque profecti. Oportere, & pituitae in vasculis putrefactae maturationem concoctionemque prorogari vel impediri; quod sanguis, in quo calor natus conficit, evacuetur, aëque extraneus frigidior intret in venas per vasorum, quae sit in venae sectione, aperitionem.

Verum ad propositum argumentum respondeo, putrefactam pituitam in vasculis accendi, quod vias ubique vel magna ex parte interclusas habeat; eam deinde dum putrefit permisceri cum sanguine in vasculis: quatenus igitur materia quae putrefit, ventilatur per venae sectionem, & copia ejus cum sanguinis copia demitur, quae poterat quoquo modo suffocare calorem, concoctionis opificem, eatenus in omni Semitertiana primi ordinis Galeni benigna convenit venae sectio, aliter non.

Rursus ad aliud argumentum, quo probatur in omni Semitertiana sanguinis mixturem convenire, quia scilicet magnus sit morbus, dico; falsam esse hanc propositionem in pluribus morbis magnis, qui frigidi sunt, & cum virium jactura, venenosa qualitate, inopia sanguinis & alimenti. Sed iterum instabit aliquis, Celsum in omni Semitertiana proposuisse venae sectionem, si vires ferant, nulla habita mentione plethorae, ergo etiam in aliis Semitertianae speciebus licebit venam secare, praeterquam in jam commemoratis. Dico, Celsum per Semitertianam omnes eas species intellexisse, quas recensui venae sectionem admittere; pituitosas Semitertianas excluisse, quia in his vires non ferant.

Interrogabit me nunc aliquis tiro; unde ego cognoscam, num vires ferant, nec ne?

Respondeo, non semper ex pulsus resistenti & forti, ut vulgus medentium de fortitudine virium judicat, sed etiam ex tempore, quo conjicimus naturam indigere ad totum morbi cursum totamque historiam, usque ad materiae debitam concoctionem absolvendam. Hoc igitur tempus quoniam in Semitertianis pituitosis longissimum esse consueverit, & vires quae paulatim debilitatae sunt à morbi longitudine, paulatim non modo restaurari debeant, sed etiam difficulter restaurari queant, quod à quotidiani cibi debili ac difficili concoctione sanguinis novus difficulter regeneretur in venis, sufficienter tibi indicabit una cum pulsus virium tolerantiam.

C A P. III.

De loco venae sectionis.

Quamquam in principio hujus libri differentes de venae sectione communem loquendi morem ac veterum servantes, eam intelligamus, quae in brachii adhibetur venae jecoraria seu communi; tamen scire etiam & hoc convenit, nos aliquando feliciter aliis in partibus in hac febre, in qua venae sectio convenit, administrasse. Nam in magna plethora, dolore insigni lumborum & capitis,

E

& mentis

Objecta.

Responsa.

Unde constati, num vires ferant venae sectionem.

me in am-
Semitertiana
venam esse
malignam, ne-
in omni
venam.

& mentis alienatione, venam pedis saphenam aperimus, libra una sanguinis exempta prius, priusquam brachii venam aperiremus. Eligatur plerumque dextrum latus tum in brachio tum crure, nisi aliquis alius morbus sit, qui sinistrum evacuari possit. *Vasa enim dextro lateri majora sunt & major copia sanguinis, quam sinistro.* In pestilenti Semitertiana si bubones in inguine apparuerint, vena pedis saphena pertundatur: si sub alis, jecoraria aut media, vel manus salvatella.

C A P. I V.

De quantitate sanguinis evacuandi.

Veteres quoties proponunt sanguinis missionem ut dixi, toties intelligunt ad libram usque & amplius, non ea minus sanguinem evacuandum esse; quod existimarent sanguinis minorem quantitatem plethoram tollere non posse, nec ullam revulsionem vel derivationem in magnis vasis prope ex minori quantitate sanguinis dempta sequi. Sed nostris temporibus unciatim demitur sanguis, præcipue in hac febre. Nam Curtius & Rondeletius quantitatem tantum trium unciarum præscribunt, quæ profecto nimis parva est & nulla ratione proficua. Nam si magno morbo magnitudine æquale remedium convenit, certe magnum remedium non est venæ sectio, in qua tam paucus sanguis demitur. Deinde neque quantum requiritur de morbi materia, tantum tollitur, ut æger aliquantulum levetur. Idcirco nonnulli hodie docti viri veterum vestigia secuti, recte sanciverunt evacuandi quantitatem *ex morbi magnitudine & virium robore metiendam esse.* Satiùs igitur erit venæ sectionem omittere, quam tam paucum sanguinem profundere. Fortassis quispiam pauci sanguinis evacuationem utilem esse inveniet in viribus languidioribus, ratione ventilationis quæ fit per venam sectam. Existimare enim aliquis posset, cum in visceribus & magnis vasis plerumque nascantur putredines, quia corpus non bene perspirat nec ventiletur, per venæ sectionem in parva quantitate ventilari, ac tanquam aperto aliquo spiraculo putredinis causæ opitulari, occluso intus aëre & spiritu putrido nonnihil ex foramine venæ expirante, & simul per id vulnus refrigeratio aut mutatio ab aëre externo. Verum si standum est quotidianæ experientiæ, quæ in abundantia sanguinis ejusmodi auxilio nil aperte profecit, ex istimo nimis exiguum hanc esse ventilationem, ut aliquod evidens auxilium inde sperari possit: nisi repetitis vicibus quotidie aut alternis diebus aperta rursus vena finantur duæ vel tres unciae sanguinis effluere, ut in Hispania fieri consuevit, & sic mediocris aliqua quantitas repetitis vicibus eximatur, quæ ad libram vel ultra accedat, pro magnitudine plethoræ corporis & venarum. Qui quidem modus detractionis sanguinis convenit in iis, qui facile exolvuntur, raræ texturæ sunt, ore ventriculi superiore biliosi, & frequenter animo delinquentes ex levioribus causis. Hi enim repentinas evacuationes gravius aliis ferre consueverunt.

Verum ulterius queritur, an in evacuatione sanguinis ad libram ex utroque brachio libræ pars dimidia aut paulo plus effundatur fructuosius, quam si ex dextro, quem plerumque eligimus, partitis

vicibus, vel unica vice libra demeretur. Respondet, quod non, nisi aliquod symptoma in sinistro latere premat, ut hemiplegia. si enim non notabilis aliqua quantitas sanguinis ex uno loco effundatur, vasa majora, quæ inter alas & inguina excurrunt, neque evacuari aliquantisper, neque refrigerari ventilarique sufficienter possunt. Nam dum sanguis evacuatur ad quatuor, quinque vel sex uncias ex brachii venis commemoratis, in locum sanguinis qui effluit, succedit alius ex vicinis venæ sectæ venis minoribus & majoribus per musculos & habitum corporis dispersis, ita ut non recto tramite vena sola, quæ truncus est vicinior evacuetur. Evidens ejus rei argumentum est, quod externarum partium inflammationes & præcavimus, ut frequenter in vulneribus contingit, & curamus, ut in anthrace, per venæ sectionem. Itaque indiget majori copia ut sanguis evacuetur, quam ea, quæ solet in toto illo spacio contineri, quod est inter venam aliquam brachii & truncum venæ cavæ.

C A P. V.

Quo tempore vena sit secanda.

Tempus accommodatum venæ sectioni nobis Celsus proposuit, dum inquit, in omni Semitertiana venam esse *initio* secandam. Per initium hic non intelligimus primum tempus, quo aliquis incipit febricitantem invisere, neque principium paroxysmi febrilis, sed quod primum est tempus totius morbi, præcedens augmentum, aut hoc ipsum initium & augmentum simul, de quo intellexit Hippocrates lib. 11, aphor. 221, quando inquit: *In principio si quid videatur movendum, move; cum vero consistunt ac vigent, melius est quietem adhibere.* Hic enim Hippocrates morborum tempora, quæ sex alias Galenus recensuit *libro proprio*, tria tantum videtur complexus, principium, statum seu vigorem, & declinationem quam adjuugo ex prædictorum temporum relatione. De hoc ultimo non facit mentionem Hippocrates, quia in eo non adhibebantur remedia.

Cæterum hic notandum, *tempus sectionis vena illud esse melius, quod vicinior est proprie dicto principio febris*, quam augmento: neque modo in venæ sectione brachii, sed & aliarum evacuationum, & præcipue purgationis eligendum: quia tunc hinc remediis putredini incipienti felicius resistatur, viresque ad validas evacuationes sufficiant. Raro tamen vocantur in principio hujus febris Medici: quia id occultatur, præsertim cum quotidianæ prius quam tertiana hominem adoriatur: vel quia ægri plerumque initio Medicorum auxilia recusant, maxime quando levi quadam lassitudine se oppressos sentiant, aut aliqua levi febricula sine ullis gravibus accidentibus laborare, sperantes sic omne malum sponte sine ope Medicorum abiturum. Vnde postmodum alius non levis error committi in prognostico solet, nempe quod nos lateant veri dies decretorii & judicatorii, & intercedentes aliquoties pro criticis & judicatoriis habeantur, atque sic ea signa, quæ in hisce contingunt, bona pro malis, & mala pro bonis censentur. Ut plurimum tamen in omni Semitertiana primi & secundi ordinis Galeni, & minori Agathini soleo initium statuere & primum morbi diem, non quo

Vnde quanta-
ritas sanguinis
evacuanda
metienda.

Legitur.

quo æger decumbere inceperit, sed quo rigore aut horrore vel frigore cœpit manifeste molestari: in magna Hemitritæa statim quum decumbere inceperit. Nam in hac vires ilico præsertim animales prosteruntur, ita ut æger recta incedere vix queat. Quapropter primo die venæ sectio instituenda est, aut saltem iis diebus, qui huic sunt propiores: ea hora, qua vel plurimum remissa est febris vel intermisit, sitque ad minus quinque aut sex paroxysmis ante novum paroxysmi insultum, quo die quotidiana sola affigit atque remittit. In Semitertiana benigna sexto die, quo fumus in augmento secare venam in brachio possumus; in maligna ultra quartum secare vix audeo; in pestilenti tertium transire non sūo. Nam in peste, qui post primum diem fecant venam, si non aliquod grave symptoma vel morbus, ut carbunculus appareat, vel bubo bub axillis vel inguine, vel parotis; raro secatur vena feliciter in brachio seu pede.

C A P. VI.

De Scarificationibus, Cucurbitulis, Frictionibus.

Scarificationes in cruribus & dorso factæ locum obtinent venæ sectionis in adultis, in iis nempe, in quibus hanc adhibere non possumus, propter ætatem, ut est puerilis, senilis; sexum, ut muliebris; tempus morbi, ut quando vocati sumus in augmento & non procul à vigore; morem & naturam febris, ut quando maligna est aut pestilens; vires denique debiles. Quibus jam initio secta vena fuit & circa augmenti finem vel medium, & spes est materiam ad cutim corporis tractam iri, Scarificationes erunt fructuosæ, eductis quatuor, quinque vel sex uncis sanguinis per adhibitas post scarificationes cucurbitulas. In pueris, omiſsa venæ sectione, in principio morbi hoc remedium convenit. Si Scarificationes paulo profundiores fiat, quam nunc est communis usus in Germania, tum singulare hoc esse remedium expertus sum. Quippe cum per id maiora vasa, vena scilicet cava & arteria magna evacuentur per vasa, quæ ab hisce oriuntur, intercostalia dicta, quorum rami recta ad spinæ dorsii latera tranſeunt sub cute dorsii disperguntur. Galenus libro de Cucurbitulis & Scarificatione, dum pestilentia vehementem Asiæ invaſisset, multosque perdidisset, meque, ait, etiam morbus attigisset, secunda morbi die remissione febris facta crus scarificavi, duasque fere sanguinis libras detraxi, hacque de causa periculum evitavi. Itaque hunc & ego secutus iisdem Scarificationibus cruribus adhibitis felicissime uti incipio, in maligna Semitertiana; neque modo in adultis, sed etiam in pueris, nec in viris tantum, sed & in mulieribus, præsertim quibus per ætatem & morbos menses non fluunt amplius, aut non in ea copia, qua convenit. Laudoque hoc præsidii genus, venæ sectioni præponens, quod capitis morbis valde acutis, Semitertiana maligna laborantes, moleſtentur; & dolor dorsii plurimum ab eo remittatur; sensibiliter ea, quæ in magna vena & arteria continentur evacuant (sine manifesta & effatu digna aliqua spirituum vitalium effusione, etiam in maiori quantitate, quam si ex vena aliqua brachii

vel cruris esset extrahenda, evacuetur) & à corde ad remotiores partes, nempe crura detrahens. Quapropter cum in pestilenti & maligna febre per hoc remedium non sit metuenda ulla vitalium & naturalium facultatum labefactatio, multis modis præfero id venæ sectioni. Sed in benigna Semitertiana venæ sectionem præfero scarificationibus crurum in adultis, in quibus adest indicatio sanguinem evacuandi, quia in hac etiam si spiritus vitalis effluat, non tantus est metus, ne vires debilitentur, cum tales initio morbi à benigniori febre refarciri non prohibeatur. In pueris Arabes & Ægyptii Medici acuto morbo oppressis crura scarificant pro venæ sectione, vel sanguinis evacuatione per cucurbitulas cum scarificatione dorſo adhibitas. Facienda autem est scarificatio non καὶ ἀνὰ τὸν ὄνυχον, ut vulgus Chirurgorum hoc tempore affuevit, id est, percutiendo aut pertundendo, sed ut vult Apollonius καὶ ἀπὸ τοῦ ὀπίσθου, id est, trahendo, ut minus sic, vel nil fere doleat. Quod fieri consuevit scalpello pectorali, vel cultro utrinque aciem habente, vel novacula qua utuntur tonsores ad radendos capillos.

Locus autem scarificationum cruris duplex est, furæ scilicet & malleoli. Galenus per crurum scarificationem eam, quæ est malleolorum, videtur accipere, vel saltem alteri prætulisse. Hunc locum etiam Ægyptii eligunt, ut est apud Prosperum Alpinum libro de Medicina Ægyptiorum.

Tempus autem huius remedii, etiam si quod principio morbi est, vicinius sit eligendum (ut in venæ sectione) tamen & in augmento, cum capitis morbi acuti superveniunt, dolores, vigilie, phrenitides, surditates, aurium dolores, vel etiam peticulæ jam apparent, tutius adhibentur, viribus mediocribus, quam venæ sectio. Scarificationes tres vel quatuor æquidistantes sunt faciendæ & profundæ, ut cutim penetrent, secundum longitudinem. Aquæ deinde calidæ imponendum est crus scarificatum, ut optime & sine dolore sanguis evacuetur sine cucurbitulis.

Cucurbitulæ quoque sine scarificatione & cum eadem, utiliter adhibentur revulsivis & derivationis gratia, cruribus circa malleolos & furas, femori & scapulis & brachiis, & ventri, pro diversitate symptomatum & specie Semitertianæ. Conferunt enim magis in febre maligna, in qua dolores dorsii comparent insignes aut peticulæ, in dorſo & cruribus adhibita; & quibus adest cataphora, vel lethargus, vel apoplexia, phrenitis, dolorque capitis ingens, quam brachiis.

Sanguifugas in pueris nonnulli solent adhibere venis cubitorum pro venæ sectione, & venis sedalibus in adultis post universalem evacuationem totius corporis per sanguinis missionem & purgationem, quas & ego in iis, qui hæmorrhoidales habent aut venas hæmorrhoidales admodum láticas, approbo: in aliis omnibus non probo; quia etiam si post casum jam sanguine repletarum sanguifugarum, cucurbitulis sanguinem evacuare queamus, aut vapore aquæ calidæ ad notabilem quantitatem educere, ea non evacuet venas majores, sed minores tantum.

Locus Scarificationis crurum duplex.

Tempus.

Sanguifuga.

C A P. VII.

De Purgatione.

Purgationes initio hujus febris quæ bilem & pituitam purgent necessarias esse, nemo amplius in dubium revocare debet, etiam si tunc temporis cruda sint omnia, & scripserit Hippocrates lib. xi, aphor. xxxi, *concocta esse medicanda, non cruda*. Refert enim plurimum scire quales tempore Hippocratis sint institutæ purgationes, & quales hoc tempore instituantur, tum qualibus in hac febre utendum esse ducam. Veteres enim, præsertim tempore Hippocratis, validissimis utebantur, ut; *helleboro, colocynthide, grano gnidio, scammonio, elaterio*, quod Cnidia scholæ sectatores usurpabant. Galenus enim in exegeſi vocum Hippocraticarum, elaterium exponit medicamentum non solum ex agresti cucumere factum, sed etiam omne quod deorsum per ventrem purgat. His igitur & similibus valide purgantibus, sed peculiari & obsoleto quodam modo permixtis & exhibitis utebantur, quæ etiam si parva quantitate dabantur, corpus nihilominus commovebant, & à concoctione naturam avocabant, quod ex crudioribus urinis, quæ postero die tingebantur, ex alvi excrementis durioribus subsequenter facile animadvertabant.

Quare recte scripsit Hippocrates lib. i, Aphor. xxiv: *In acutis affectibus raro etiam in principis medicamentis purgantibus uti oportere, atque hoc agere diligentius prius facta præmeditatione*. Si enim materiam febrilem turgere observabant, hoc est, petulanti quodam veluti motu huc vel illuc concitari, timentes ne ad aliquam partem principem rueret, eam ilico purgabant sine mora, si talis erat morbus, qui septimo die suam historiam efflet absoluturus. Vnde libro quarto apud Hippocratem extat aphorismus decimus talis: *Pharmacum purgans præbere oportet in valde acutis eadem ipsa die, si surget. Tardare enim in talibus malum*. At in iis morbis, qui simpliciter acuti sunt, ante quartum diem, quando decimo quarto aut undecimo crisis est expectanda, dandum purgans, si vigesimo aut decimo septimo, etiam post quartum, nempe quinto vel sexto. Igitur cum Semitertiana peracuta futura sit; quæ raro observatur alio quam pestis tempore aut cum eam morbus aliquis peracutus ab initio concomitetur, non dandum erit medicamentum purgans secundum doctrinam Hippocratis, nisi eodem ipso aut saltem ad summum secundo die, cum vero acuta & decimo quarto sit terminatura, nunquam præterito quarto dabitur, nec post sextum vel septimum si vigesimo.

Sed & illud quoque adjungendum, veteres istos nunquam venæ sectionem instituisse, aut perquam raro in talibus morbis (quod tam magis evacuationibus vires agrorum raro pares invenirent) solo clystere contenti. Sed nostro seculo multum ab eorum curandi modo jure optimo discessimus. Nam postquam blandiora pharmaca à posterioribus Græcis & Arabum schola in medicinam inventa sunt, ut *castia, mel rosarum solutivum, sirupus ex infusione stirum violarum & rosarum, manna, folia sene, rhubarbarum, agaricum* in parva quantitate, & adhuc ex Indiis nova quotidie exportantur, quæ sine ex-

agitazione corporis humores peccantes ex primis viis expurgant, non multum commoventes sanguinem & humores in venis aut habitu corporis consistentes, non ad amissum observatis Hippocratis regulis secamus venam in hoc morbo, ut in aliis febribus, & præbemus purgans medicamentum (quod qui volunt servare doctrinam veterum rectius leniens appellant,) in peracutis & acutis morbis etiam in augmento, hoc est, etiam post quartam vel septimam tutissime. Et ego testari possum me animadvertisse in remediis hujus purgantibus, multis symptomata & morbos acutos me præcavisse, nec ullo modo interturbatam crism, etiam si die decretorio porrigerentur & repetitis vicibus ante vigorem morbi, imo etiam in vigore vice clysteris in modica quantitate functa fuisse. Longeque tutius arbitror nos iis uti in omni Semitertiana, quam aliquo veterum valido medicamento omiſſa venæ sectione, aut hac præmissa, & omiſſo pharmaco, quod illi tenuius agros nutriebant, & ideo vires à validis his ambobus evacuantibus citius languescerent hoc sustentare non poterant, nos vero paulo plenius. Quidquid enim à cibis ingestis excrementi in tenuibus intestinis quotidie colligitur, aut à majoribus vasis ad primam regionem depellitur & inde ad intestina, in futuram obstructionem, id evacuumus tutissime per ea, quæ jam recensuimus, sive illa sit concocta (nam etiam in morbi principio aliquid de putrefacta jam materia concoquitur, quod ad has partes solet plerumque deponi, etiam si plus putrefcat quam concoquatur) sive cruda materia & in parvis viscerum vasis & vel extra vasa majora minoraque consistat. Fit hæc tum multa pituita à capite destillans per œsophagum, internam intestinorum tunicam obstruat, & sic obstructions viscerum doloresque colicos & alios morbos parit. Et cum multa quoque bilis à victu parco pravogue ab omni corporis parte ad jecur, lienem & mesenterium, inde si viæ sint parulæ ad ventriculum, intestina tum tenuia tum colon deferretur. Vfus quotidianus me docuit *rhubarbarum, senam, agaricum* atque *aloëscoscorinam* initio omnis hujus febris datam plurimum profuisse, castigata refrigerantibus & viscera deobstruentibus commissa, ut *cichorio, gramine, soncho, borragine, hueracio, chondrilla, endriva, sero caprino, hordei decoctio*, additis *capillo veneris, enſcuta, agrimonia, betonica* in pituitosa magis Semitertiana. Sed & *scordium* in ea, quæ malignitatis & pestis aliquod prælium præmonstrabant, addebam, & *carduum benedictum* & *ebur*: quanquam & hæc ipsa medicamenta purgantia per se putredini magno opere resistant & pestilenti quoque lui.

Rusticos, qui altos Moraviæ montes incolunt, vidi in hac febre & in quotidiana tertianaque duplici non alio sibi remedio mederi quam *agarico*, quod inter venenorum antidota ponit Dioscorides & apud eos copiose provenit in trunco laricis arboris altissimæ, & optimæ notæ. Nam Moravia Sarmatiæ vicina est, in cujus regione quæ Agaria dicitur & quasi sub eodem climate (si fides veteribus Geographis habenda est) quo Moravia sita est, optimum nasci scribit Dioscorides. Mandunt autem hoc cibi rustici, atque inde per se unius aut alterius drachmæ pondere devorant. Hæc volui hic recens-

Quando purgans exacerbat.

Vbi optimum nascitur agaricus.

hic recensere, ne mihi contradicant aut irascantur amplius illi, qui agarico in substantia dato timorem Medicis & maxime tironibus incutere solent, docentes agaricum in substantia venenum esse. Nam per alvum non subducunt tremorem & resolutionem induxissē, aliis vero suffocationem perhibent. Agaricum sane Aëtius posuit inter ea, quæ hominib. commoditatem in usum veniunt, aliquando vero pericula inducunt. Sed de agarico malo hæc intelligenda sunt, nequaquam de agarico bono, quod tantum abest ut inducat paralysem vel tremorem, ut potius ea mala hoc ipso in substantia dato sub forma pilularum (correcto tamen, ne ventriculum subverteret) felicissime in iis locis curaverim. Sed nunquam utor solo agarico & in substantia in Semitertiana, verum permixto cum aliquo prædictorum, maxime vero cum *foliis sene*, & fere semper in diluto. In ea, quæ primi ordinis est atque secundi Galeni tali forma præscribo.

℞ *foliorum cichorei, sonchii, borraginis, capillis veneris, agrimonie singulorum pugillum semis: radicum graminis drachmam unam: pruna damascena duo: uvarum passulorum drachmas duas. Bulliant in aquæ sufficienti quantitate ad uncias quatuor: colature infunde per noctem foliorum sene drachmas quatuor, agarici trochiscati drachmam unam, vel scrupulum quatuor, florum cordialium pugillum unum: expressioni adde manne electæ unciam unam, vel syrupi aut mellis rosati solutivi uncias duas vel unam, pro pituitæ bilisve abundantia. Datur hæc potio (quæ non excedere debet uncias tres aut ad summum quatuor) in die minoris afflictionis summo mane vel quatuor horis ante prandium in declinatione febris quotidianæ. Additur huic manna, vel *syrupus rosatus solutivus*, ut non diu (quemadmodum alias solet) medicamentum in ventre commoretur. Hoc post venæ sectionem porrigo semel, & repeto paucis interpositis diebus in benigna Semitertiana, antequam ad vigorem perveniat febris vel ad summum augmentum. In maligna semel tantum porrigo, additis iis quæ superius commemoravimus. In pestilenti, si non primo statim die aut secundo pro symptomatum vehementia permixta portione antidoti nostri, vel *theriacæ*, vel *mithridaticæ* confectiois, vel *diascordio* *Eracastorei*, ab eo abstineo usque dum evicta fuerit magna ex parte pestilens lues in minori quantitate, & pro virium robore. Quod si bolum petat loco potionis. ℞ *pulpæ prunorum damascenorum unciam semis, pulveris foliorum sene drachmam unam, agarici trochiscati drachmam semis, croci grana duo, spica indica grana tria, manna electæ drachmas duas: (agaricus trochiscatus præparari debet cum aqua vitæ, ut postea docebimus) adde scrupulum unum theriacæ vel mithridaticæ, vel alterius antidoti tempore pestis: aut loco hujus, diascordionem unciam præscribatur, cui adde nostræ antidotus, aut speciem de hyacintho portionem, nempe drachmam dimidiam aut duos scrupulos. Quod si spuria Semitertianæ fuerint, quæ ad prædicta genera reducuntur, in pituitosiore dare soleo *floris castæ unciam unam, cum drachma una specierum hieræ simplicis in bolo aut hieræ simplicis drachmam unam & medium cum syrupo rosato vel melle rosato solutivo factis bolis, super quos æger bibat cyathum aquæ frigidæ, vel seri caprini libram unam* post horam ab assumpto bolo. Pilulæ nobiles, quarum**

apud me maximus est usus in hac Semitertianæ specie pro iis, qui pilulas maluit & caput aggravatum lentius ac tussunt. ℞ *rhabarbari electi, foliorum sene Alexandrinæ viridum, aloes Socotorinæ, agarici trochiscati cum aqua vitæ ana scrupulum unum & medium, spica indica, schœnanthiana grana sex, cum aqua vitæ secundo destillatæ, fiat massa duriuscula, ita ut ægre in pilulas formari queat: quæ deinde ex massa formate, oleoque communi leviter in superficie oblita, ut folia auri adherere possint, deaurantur & in vitro bene obturato servantur ad usum; dosis est drachma una, ex qua quinque tantum pilulas conficere soleo. Vbi jam purgare cœperint, vel transactis tribus horis post earum assumptionem jusculum cichorei, endivie, Soncho alteratum do superbibendum, ut in spectus earum calor refrenetur, meliusque procedat operatio. In biliosiori Semitertiana sola infusione foliorum sene utor in sero caprino alterato cum cichorea: vel *syrupo rosato solutivo & mellis rosati solutivi ana uncias duas; manne electæ uncia una, cum decocto florum & fructuum, vel samarinderum in sero caprino. Vel conficio bolum ex castia adjecto pulvere foliorum sene, & florum violarum cum granis quatuor spica indicæ. In omni autem Semitertiana pestilenti primo die aut secundo purgandum cum antidotis, prout sunt acute. Quod si vero acutissima fuerit, omisso purgante & quasi neglecta Semitertiana, statim pestilens qualitas cum fudoriferis antidotis expugnanda: deinde purgandum.**

C A P. VIII.

De pulvere Comitris de Harwick; & Antimonio præparato.

Invexit nuperrime in medicinam chymicorum schola pulveres duos purgantes, quorum alterum appellant pulverem Comitris de Harwick, alterum vero antimonium præparatum.

Comitris prædicti pulvis componitur ex optimi scammonii crustacei tritæ, & super chartam bibulam tenuiter & æqualiter expansi & liquati per summum factum cum sulfure ignitis carbonibus injecto, cavendo ne comburatur, drachmis novem & antimonii duabus, nitri ad albedinem calcinati drachmis sex, cremoris tartari, quem crystallinum appellant, drachmis tribus. Variatur ab hisce Medicis chymicis horum ingredientium medicamentorum proportio, pro humorum & temperamentorum varietate. Quibus enim plus bilis inest in corpore, plus induit scammonii, quibus vero plus melancholiæ & pituitæ, plus antimonii & cremoris tartari.

Adultis dantur ab octo vel decem granis scammonii usque ad octodecim & viginti grana, pro virium robore; antimonii præparati modo prædicto, à granis sex usque ad quatuordecim vel sexdecim, cremoris tartari à granis duobus usque ad sex & ultra. Datur hic pulvis initio paroxysmorum semel, bis, ter & sæpius, donec febris desinat, in omni ætate, anni tempore, sexu, gravidis, molestatis vomitu, & alvi fluxu crudaque materia existente, prægressa vel penitus omiſſa venæ sectione. Facile assumitur & sine nausea, & citam tantæ curationem peragere historis eorum, qui quotidiana, tertiana & vera & notha, nec non & febribus continuis laborarunt, ab internis inflammationibus, pluribus docuerunt. Hoc remedium

E 3 & ego

Pulvis Comitris de Harwick.

Ejus dosis.

& ego quoque his de causis in Semitertiana expertus sum, quantum valeat, nam præterquam quod sine molestia fumitur, scammoniumque probasi habeat, medicamentum etfi calefaciens & propterea inflammans ac mordicans, incidens tamen, detergens, aperiens, discutiens, bilemque & pituitam expurgans.

Scammonium.

Idcirco ingreditur pleraque purgantia, quibus Alexander Trallianus familiariter usus est ad febres intermittentes variis rebus permixtum, ut in rhodomelte purgante, quo utitur cum *agarico* in tertianis & quartanis spuris, & sine *agarico* in legitimis iisdem febribus; præterea in *halatio medicamentum*, quo utitur in quotidianis. Præparat quoque medicamentum ex *malis cydonæis assatis fermentoque oblatis cum scammonio* pro febribus quartanis, quæ à bile excitantur, etiam in iis qui generosam purgationem ferre nequeunt, ut pueris & mulieribus.

Nitri.

Nitrum præterea cum *antimonio calcinato* permixtum est, propter summam attenuandi, discutienti, detergendi ac resistendi putredini humorum in primis vis facultatem, & quia non mediocriter etiam obstructionibus succurrit, & calorem scammonii plurimum obtundit. Vt propter hanc causam multis chymicorum visum fuerit, nitrum refrigerandi vi pollere, cum interius etiam per os detur febre ardente correptis, præterea applicetur externis inflammationibus, quas aliquando nitri decocto cum quibusdam aliis, maximas vigintiquatuor horarum spacio sublatas me vidisse memin.

Antimonii calcinati.

Antimonium autem calcinatum non propter combustionem, veneficam vim ciendi vomitum solum perdidit, sed etiam ob scammonium & cremorem tartari. Nam memini me ante annos octodecim, cum arcanis perscrutandis desiderio flagrare, assumplisse, facta prius exploratione à granis paucis & ascendendo ad plura, antimonii crudi grana vigintiocto cum drachmis duabus manna electæ, duodecim sedes vehementes habuisse biliosas & atrabiles non mediocriter ventriculo labefacta, absque eo quod ullam nauseam vel proclivitatem ad vomitum perceperim. Hoc itaque medicamentum datur initio febrium & in augmento, atque in statu in periodicis paulo ante paroxysmum. In Semitertianis id ita sum expertus duobus uno eodemque tempore simul ea oppressis, quo anno epidemica florebat. Dedi alteri quidem medicamentum Comitæ, alteri vero aliud ex blande purgantibus supra descriptis: atque animadverti Semitertianas nihilominus recidivantes & ejusdem criseos utramque octuagesimo die fuisse, nempe facta concoctione, alteri quidem, cui datum erat medicamentum Comitæ, supervenisse fluxum alvi blandum post sudores & urinas copiosas antea excretas; alteri vero, factis eodem quo alteri tempore paroxysmis, dolore colico, quem eodem pulvere quam brevissimo tempore sustulimus. Ex quo deinceps, ut in aliis quoque febribus didici tutius esse methodo à me præscripta curationem peragere expectata crisi & concoctione materiae morbificæ, quam validioribus medicamentis corpus commovere, quod etfi in intermittentibus febribus bonum sit remedium, & in aliis quibusdam

morbis à me valde probatum, in febre tamen continua si indicia spectemus facilius tolerantia, suspensum esse debeat, quod concoctionem materiae perturbet potius, quam juvet.

Quod si initio febris turgeant humores, hoc est, huc & illuc ferantur, furiose minantes aliquid grave malum, ut epilepsiam, apoplexiam, dolores colicos, phrenitidem, dolores de uno loco ferantur ad alterum veluti ad os ventriculi & intestina aut articulos, laudo hunc pulverem præ cæteris medicamentis, ut statim detur sine ulla humorum præparatione, vel expectatis signis concoctionis. Et quanquam in exhibitione hujus medicamenti observetur tempus paroxysmi initio proximum, sive sit die majoris afflictionis five minoris, hoc tamen nos ab ejus usu pertertere non debet. Multa enim docet ratio, quæ experientia clarorum virorum coarguit, ejus indicium cum valde sit difficile propter morborum varia tempora quæ sunt artis & naturæ beneficio, multa opus est diligentia, ne nos in experimentis ista fallant. Notavi & hoc, multa remedia quorum vires hæcenus fuerunt reconditæ, pervertere regulas medicinae veterum; quæ tamen firmæ sunt atque solidæ in iis, quæ à veteribus usurpabantur. Porrexi hunc pulverem febri maligna affectis, quæ primis diebus spuria Semitertiana videbatur, & animadverti malignitatem me neque cum Comitæ pulvere superare potuisse, etiam initio morbi dederam, nullis neque in pulsu neque in urinis malignitatis signis apparentibus, præterquam dorfi dolore.

Tirones igitur practicos monitos volo, ut veterum prius medendi normam sequantur, deinde ubi in hac sese aliquandiu exercuerint, etiam nova remedia & quadam meliora cum fiducia usurpent. Sufficit prius purgans aliquid lene medicamentum & venæ sectionem adhibere, deinde victu conveniente uti. Hac methodo experti evadent in eventis morborum: & historiam cujusque affectus optime sic perdiscerent, præcognoscentesque cujusque novi remedii veram experientiam melius acquirant, & occasionem nanciscuntur bene de quaque febre prædicendi: quod ab iis qui sunt empirici uti prorsus negligitur, sic prorsus nescitur, & calumnias ac ignominia vulgi se magis obnoxios reddunt.

Qui ad Afros novissimis temporibus navigarunt, narrant in Guinæ regno empiricorum chirurgorum experimentis, qui ex Belgio una cum mercatorum navibus istuc appulerunt, certis anni temporibus febres quasdam grassari tertianæ modo invadentes horridas, peracutas plurimos incolas ex iis mori quarto, septimo, nono, undecimo, decimoquarto, solo usu vitri antimonii à morte vindicatos fuisse, si illico quam horrore corripiebantur, antimonium sic præparatum portigeretur. Sed nec hoc remedium consulo ut omnibus sic indiscretim adhibeatur. Etenim quemadmodum in febribus acutis paulo pleniori victu minus peccatur, sic etiam in hisce febribus paulo leviori medicamento securior medela est, quam in paulo validiori. Ex decem enim sufficit novem curasse cum ejusmodi medicamentis, & unum præcipitasse ad perpetuam Medici & Artis ignominiam.

Pulvis Comitæ de Harzsch quando maxime sit usurpandus.

Admonitio.

C A P. IX.

De Vomitoriis.

DE ea purgatione quæ fit per vomitum, in hac febre ita cenfeo. In benigna aliquando utiliter instituitur; in maligna, raro; in pestilenti, nunquam. Nam in peste ventriculus plerumque debilis & spontaneis vomitionibus obnoxius magis ab iis debilitatur, ut syncope & animi defectiones à vomitu non cessent: sed ab eo totius corporis vires posternantur, etiam si copiam multorum corruptorum humorum educant. Quia ab eo humores indies magis magisque putrescunt, pestifero veneno intus nihilominus permanente. Quapropter in his Semitertianis prudentes Medici est ventriculum jam nauseantem corroborare, ne quod dandum est ad expellendam vim pestiferam, vomitu statim quam est assumptum rejiciatur. Cæterum in benignis vomitoria variare debent pro specie Semitertiana. Nam in primi ordinis Galeni & Agathini seu minori Semitertiana aqua tepida vel jus earum non salitum cum oxymelite potest propinari.

Dedi aliquando decocti raphani uncias quatuor cum oxymelitis uncta una, olei amygdalarum dulcium uncias duabus. Interdum in iis qui facile vomunt, sola aqua tepida copiose hausta sufficit: vel frigida, si valde siticulosus sitiger & linguam aridam habeat, ut in ea quæ est tertii ordinis. In ea vero, quæ est secundi ordinis Semitertiana flores vel semina genisse in pulverem redacta cum jure vel melicario tepido præbere oportet, adultis à drachma una & media ad drachmas duas & mediam. Vel accipere drachmam feminis genisse, quæ quadrato stipite affurgit, & ei addere sex vel octo grana radicem hellebori albi. Datur cum jure saccharo albo dulcorato. Cavere tamen oportet ab omni vomitorio in iis, qui nauseant & ad vomitum inclinant, propter dolores colicos. Magis enim ab hoc offenduntur quam juvantur, etiam si bilem & pituitam vomant: quod inflammatione intestinorum aliquando & ventriculum in consensum trahat, fiatque sic à vomitu, rapta ad aliam quoque partem biliosam materia erysipelas in interiori ventriculi tunica, quæ ægrum plerumque occidit. Ego autem rarissime vomitoris usus sum, etiam si ægri precibus aliquando à me ea extorquere viderentur. Quod humores qui in prima regione oberrant, fore semper per purgantia propolita & clysteres convenientes sine ulla corporis commotione ex suis locis extraxerim.

A cibo autem dandum erit vomitorium, quod præberi debet modicum, die majoris affectionis, nempe quo tertiana intermittens invadit, & statim initio ejus paroxysmi. Melius enim tunc, quam aliis temporibus, commoveantur humores biliosi & pituitosi, & minus etiam molesta tunc fit vomitio.

C A P. X.

De Clysteribus.

Cæterum clysteribus in hoc morbo plurimum fidendum. Colum enim intestinum multa pituitæ copia adimpletur, & interiori tunica obcrustatur, ob quam non modo graves fiunt obstu-

ctiones, sed & majores putredines, & difficiliores concoctiones tum ciborum (ventriculo, cui colon annectitur per omenti portionem, & subiacet, plurimum refrigerato) tum etiam materię febrilis in vasis putrefactæ. Incumbit enim ventriculus venæ cavæ; ramusque ab arteria magna suscipit, ut & colon intestinum. Propter quam causam in omni febre, in qua putredo est in vasis majoribus, non refrigerare tantum hæc vasa per clysteres, sed etiam putredini eorum resistere, & materiam expurgare poterimus.

Sint autem clysteres initio purgantes leniter, & detergentes iis diebus, quibus non datur per os medicamentum purgans. Deinde paulatim aucto morbo & ad vigorem accedente, minus purgantes, magis vero emollientes & detergentes. In minori vel Agathini Semitertiana & duabus prioribus primi & secundi ordinis Galeni minus acutis, talis clyster præscribitur: *℞ foliorum malva, mercurialis, parietarie, lactuce, chrysolachani* (vulgo spinachiam vocant, & atriplicem hortensium herbarii, nobile remedium ad lumborum dolores) *florum chamemeli, meliloti ana Manipulum semis. Radicum albeæ unciam mediam: seminis cymini, feniculi (si tormentia adfuerint ventris) singulorum drachmam unam: centaurii minoris pagillum unum, scaram passulorum unciam unam; Bulliant in aqua communi ad libram unam. Colaturæ adde mellis dispensati uncias tres, electuarii lenitivorum unciam unam. Misce pro clystere tepide injiciendo.*

Circa vigorem morbi electuarium lenitivum dematur, & addatur major quantitas mellis dispensati, vel ejus loco sacchari rubei uncia tres. In peracuta Semitertiana & admodum biliosa: *℞ surfurum triici manipulum unum & medium, foliorum lactuce, cicorei, malva, mercurialis ana Manipulum unum. Bulliant ad libram unam. Colaturæ adde mellis rosati solutivi uncias quinque, olei violacei uncias tres, salis niri drachmam semis. Atise pro clystere tepide injiciendo.* Circa statum solo hydropemelte venter est eluendus cum oleo & sale, ut veteres in omni febre continua acuta solebant; vel decocto surfurum, aut juris carnis, vel hordei, cui immiscerentur olei communis & sacchari rubei singulorum uncie tres, salis communis vel niri drachma media.

Suppositoriis communibus ex melle cocto & sale torrefactis hic parum præstatum. Hic in supervenientibus lethargicis vel epilepticis affectionibus usus sum in iis, qui clysteres nullo modo admittere voluerunt, suppositoio sequentis descriptionis. *℞ Hiera simplicis drachmam unam, salis gemme scrupulum unum, mellis quantum satis est, fiant suppositoria duo filo appenso.*

C A P. XI.

De Alterantibus, Deobstruentibus, Putredini & malignitati resistentibus internis.

INterea dum vacamus ab evacuantibus, & maxime à purgationibus, concoctio materię febrilis est expectanda in benignis febribus: quæ procuranda adjuvandaque est peculiaribus remediis internis & externis, quæ alterant & obstruções tollunt, putredinique resistunt, quanto prece fieri potest.

Et quamquam in omni febre refrigerandum humectandumque esse doceamur, in hac tamen febre non nisi diligenter examinata ejus specie hoc præstatum.

Quales clysteres injiciendi.

Enema.

Aliud ad febrem peracutam & biliosam.

Suppositoria.

Quomodo est in quibus febribus refrigerantia & humectantia sunt injicienda.

praestandum. Vbi enim pituitosa fuerit, moderate refrigerantibus & incidentibus ac detergentibus est utendum. Veteres utebantur oxymelite diluto, quo & ego aliquando utor, alterato tamen cichorio, betonica, radice petroselinii. Vel dari potest jusculum alteratum isdem herbis addito soncho, data prius ante potionem uncia una syrapi acetosi simplicis, vel oxymelitis simplicis, cui interdum aliquot guttulas optimi aceti addo. Si non satis acetosum appareat oxymel, ut solet apud nonnullos pharmacopolas, qui carent bono aceto ex optimo vino facto.

Potos.

Potionum do-
sti.Asteriscus
Castrensis
austri.

Vel \mathfrak{v} aqua cardui benedicti, & cichorei, betonica singularum unciam unam & mediam; syrapi de duobus radicibus unciam unam; olei vitrioli guttas duas, vel quantum sufficit ad acorem. Misce. Potiones haec non debent excedere uncias quatuor. Sed si juscula alterata vel decoctiones herbarum loco aquarum stillatiarum porrigantur, debent esse herbis potentia. Nam à nimio potu humectatur praeter modum ventriculus, impletur caput, & soporosi affectus, si adfuerint, graves evadunt, ægrius à viscerum calore distribuitur in venas, ac opus suum in pituitosam materiam exercet. In horum medicamentorum penuria milites in Pannonia antidotum circumferre jubebam, cujus drachmam unam dissolutam cum modico aceto & cum decoctis cichorei uncias tribus vel quatuor porrigebam.

Antidoti castrensis à me vocati hæc est descriptio: \mathfrak{v} cardui benedicti, verbenæ, cichorei, pulegii, betonica, chamædrys, melisse, absinthii, centaurei minoris singularum manipulum medium. Seminis acetose, portulacæ, violæ purpureæ, ana drachmas duas. Seminis cumini, feniculi, carvi, ana drachmam unam. Salis natri preparati scrupulos quatuor. Corticum mali citri exteriorum flavorum exsiccatum drachmam mediam. Fiat omnium pulvis, & cum melle despumato in forma opiata fiat electuarium.

Serum caprinum vel alterius animalis depuratum, vel destillatum per balneum animadverti hic plurimum obesse, praesertim cum sponserat affectiones adsunt vel expectantur.

Inlepis.

In biliosa praescribere soleo sequens julapium: \mathfrak{v} syrapi acetosi simplicis, acetositate citri ana unciam mediam, aqua cichorei, endivia, cardui benedicti ana uncias duas. Vel hujus loco detur jusculum pulli non salitum alteratum cum cichoreo, soncho, endivia, carduo benedicto, addita drachma una cremoris tartari. Si æger valde sitiatur, dabitur commode serum caprinum deparatum cum oxymelite vel acido citri ad libras duas vel tres. aut aqua hordei recenter facta cum guttulis aliquot spiritus vitrioli ad convenientem aciditatem, quousque bilis fervor retusus sit, & calor aliquantulum quieverit. Quod si non admodum magna sitis adsit, fiet julapium ex aquarum stillatiarum endivia, cichorei, sonchi, cardui benedicti ana uncias quatuor, cum drachma una specierum aromatici rosati, & oxyfachi uncias duabus, colatis omnibus per manicam Hippocratis simul ut sit potus instar clareti; de quo septem vel octo unciae praberi possunt in vigore paroxysmi tertianæ & quotidianæ. In pauperioribus veterum utor remediis jucundissimis oxymelite magis & minus diluto, prout adest copia pituitæ vel bilis, dando libram mediam in vigore febris & principio declinationis. His obstructions viscereum quando adsunt, & pororum cutis aperiuntur: ut jusculis alteratis & julapiis praescriptis non indi-

Claretum.

geamus. Aliquando solo jusculo, cui drachma una florum chamomeli pulverati inpersa fuit, usus sum fructuose. Nam teste Galeno flores chamomeli omnem febrem tollunt praeterquam eam, quæ ab inflammatione oritur, cui tamen non parum prodesse scimus.

Florum chamomeli pulverati inpersa fuit, usus sum fructuose.

Mitiores Semitertianæ & quæ diuturnæ videbantur, decocto salsa parilla & radici chine, immixto paulatim paroxysmo in nobilioribus personis post purgationes convenientes sustulimus. \mathfrak{v} radicem chinæ unciam mediam, salsa parilla unciam unam, aqua libras quatuor; bulliant in vase duplici per quatuor horas lento igne addendo in fine radicem dentis leonis unciam mediam, aliquando modicum carnis addebam, & alternis diebus novum parabat; bibebat de eo omni tempore. Dabam hoc decoctum hora una ante paroxysmum ad sudores sine violentia provocandos, stragulis cooperto ægro.

Decoctum chinæ & salsa parilla.

Potio à Hemitritaeum Plinii Valeriani recipit Croci denarios duos, nardi duos, absinthii pontici duos, enule tres. Quæ omnia cribabis: & cum opus fuerit, dabis cochlear dimidium cum aqua calida. In talibus igitur persistendum, quousque totius morbi tempus apparuerit, quod vigorem appellamus, adjunctis etiam externis remediis ejusdem scopi.

Potio Plinii Valeriani. Libras, c. m.

C A P. XII.

De Externis remediis.

I Ecori fomenta atque unctiones & cataplasmata decernantur. In pituitosiori Semitertianæ; \mathfrak{v} succi cichorei libram unam & mediam, absinthii libram mediam, aceti rosati uncias duas. Misce pro fomento spongiis adhibendo.

Fomentum hepatis.

Vnguentum sit tale: \mathfrak{v} specierum aromatici rosati drachmam unam; olei rosati completi novies loti in aqua absinthii cum modico aceto uncias tres, cere albæ parum. Misce pro linimento.

Vnguentum.

Cataplasma, recipit aqua cichorei partem unam, vini rubri austeri partem semis. Misce ad ignem, & adde pulveris florum chamomeli, absinthii ana unciam semis, olei rosati uncias tres, aceti rosati unciam unam & mediam. Misce pro cataplasmate.

Cataplasma.

In biliosa, fomento, quod constat ex aqua vel succo endivia vel cichorei permixto cum modico aceto, & succo absinthii, unguento sanitino vel rosato Mesues correcto cum drachma una olei de absinthio, praetero cataplasmata. Quia nec cito exsiccantur & humectant, concoquant, digerunt, refrigerantque plurimum, ita ut nunquam meminerim me ejusmodi remedium jecori in hac febre, ut in alia quacunque biliosa applicuisse, cui non statim postero aut tertio ad summum die evidens auxilium attulerit, siti immixta, & urinis redditis jam flavioribus. Vt loco balnearum, quorum jam in febribus usus obsolevit, hæc cataplasinata à me felicissime substituantur.

Horum unum, quod familiarius est, Recipit farina hordei libram unam, sursum medianorum tritici uncias tres, aqua endivia & cichorei stillati ana quantum sufficit: ad ignem misce, & adde pulveris rosarum rubearum unciam unam & mediam, absinthii unciam mediam, natri pulverati drachmam mediam: olei rosati completi uncias tres. Misce f. s. a. Cataplasma.

Cataplasma ad febrem biliosam.

Obstructions meatuum cutis, frequentissimi putredinum fomites, quæ semper adesse consueverunt ob crassum lentumque humorem & ambients

bientis refrigerationem, aperiendae sunt, fordes cutis summæ detergentibus, attrahentibus ex alto, & attenuantibus eluendae; ut his libera fiat totius corporis transpiratio, cessetque putredo vel paulatim deficiat. Igitur madefiat cutis totius corporis panno lineo madefacto cum sequenti aqua.

℞ tartari vini albi pulverati & exsiccati libram mediam, nitri pulverati & ad ignem exsiccati uncias tres. M. & ponantur in olla munda ad ignem, & cum charta accensa inflammetur, ut totum comburatur in nigros carbonis, superfundende aquae fontanae vel fluvialis vel pluviae libras duas, coletur per manicam Hippocratiæ vel filtratam. Postea abluantur fordes cum panno lineo madefacto in aqua tepida, & fiat talis unctio. ℞ trochiscorum florum chamemeli, vel florum chamemeli pulveratorum quantum sufficit, dissolve cum oleo chamemelino communi, vel parato eo modo, quo subjungam, ut fiat linimentum, quo totum corpus erit inungendum.

Trochisci chamemelini parantur in hunc modum. Flores chamemeli soli sine foliis aut stipite cum oleo chamemelino facto cum olei amygdalini dulcis modico in mortario tam diu contunduntur, donec passillis formari queant bene subacti, qui ad usum in vitro vase sunt servandi. Olei chamemelini hæc est descriptio.

℞ florum chamemeli libram mediam, olei chamemelini officinarum communis libram unam, aquae supra prescriptae ex nitro & tartaro combusto uncias duas, coquantur in diplomate ad consumptionem aquae: deinde oleum cum torculari fortiter expressum servatur ad usum. Eligendi sunt flores chamemeli, qui passim in Belgio crescunt, nam qui in Italia nascuntur, minoribus polent viribus. Post unctionem totius corporis modice cooperiendus est ager, ut sudores moveantur; quod si hi non moveantur, nil refert. Exhalat nihilominus per meatus cutis aura putrida: quod si sudor moveatur, procurandum ut quam plurimum fudet, auctis etiam cooperimentis aut stragulis, cavendo ne suffocetur.

Plinius Valerianus, libro tertio Hemitritæa depellendo hæc scribit. *Ranulas parvas virides capies, & aperto ventre circum harundine intestina auferes ac propicies: illas vero mites in stagnatum novum & friges. Quibus sublatis mites in oleum & ceram, & facies eeratum molle: Et ab auribus usque ad pedis ungues triduo perunges, & non lavet, sanus erit. Quia vulnera ex-eunt per corpus, à quibus cito liberabitur.* Hæc oleum expertus sum in Hemitritæis benignis recidivantibus nil opis attulisse. Fortassis malignis & pestilentibus conveniet, in quibus est intentio humores ex alto ad corporis superficiem evocandi, ut cum jam peticulæ vel maculae aliae comparere incipiunt. Nam cutim rubicundam & dolentem facit hæc unctio, ut erysipelate affecta esse videatur primo statim die: quod si quis in hac unctione per triduum perseveret, inducuntur pustulae & ulcuscula majora minora prout oleum ranarum viribus potentius est redditum, & prout pluribus aut paucioribus ranis oleum frixum est. Sed existimo hoc oleum, si quid tam miraculose in hac febre operetur, id facere potius beneficio facultatis diu-reticæ, quam rana viridis parva habet, quam calamitam appellaverunt veteres, quam virtute, qua ex alto humores evocat.

Qua etiam ratione videmus vesicantia ex can-tharidibus, aut alio domestico conso nonnullis plurimum profuisse, urinis copiosioribus productis.

Nam quod attrahendo humores ex alto id præstent in tanta humorum copia & putredine; verisimile non est, cum parva portio horum humorum educi per vesicantia queat, nec nisi iis, qui in ex-lrioribus venis cuti & carni proximis vagantur.

Q. Serenus Sammonicus de Hemitritæi remediis ita inter alia cecinit:

Nonnulli memorant adipem prodesse leonis;

Adipem Leonis.

Existimo peruncto eo corpore toto, cum digerendi & emolliendi cutem, attenuandique humores virtute polleat, & scirrhusis tumoribus fit aptissimus. Profecto Plinius leonis adipem cum rosaceo quotidianis febribus mederi scribit. Ejus loco oleum vulpinum, vel adeps vulpinus substitui potest, vel canis rubri.

C A P. XIII.

De Periaptis.

INvenio & à veteribus in curatione hujus febris non fuisse omissa periapta. Plessus in eo libro quem de Lapidum viribus inscripsit, tradit adamantem suspensum Semitertianæ febres extinguere. Memini cum essem in Austria, incidisse me in maxime illustrem virum Gondacherum à Liechtenstein, qui mihi narravit se, cum esset natura & temperamento prorsus melancholicus & capite admodum calido, ac ad maniam propenso, non potuisse longo tempore somnum capere sine insomniis turbulentis perpetuis, solo adamante auro incluso sinistroque brachio supra cubitum, quo loco fonticuli huius temporibus inuruntur, alligato in forma armillæ, ita ut adamas tangeret semper nudam carnem ab huius molestiis plurimum liberatum. Erat adamas planus & latus duorum vix granorum pondere.

Idem ad febres arcendas, quibus alias erat valde obnoxius, præcipue tertianæ collo quoque suspensum gerebat lapidem lazuli: nec interea dum hoc portaret, se à febre affectum asserere. Smaragdus teste Alberto Magno collo suspensus sanat Hemitritæum. Q. Serenus tale habet:

Coralium atque crocum corio connectito felis,
Nec dubites illis virides misere Smaragdos,
Talia languentis conducent vincula collo,
Lethalesque abigent, miranda potentia, morbos.

Smaragdi.

Qua autem ratione contingat, ut periapta vires suas in nobis exercent contra captum vulgi in Epistolis Anatomicis clavis & amplis rationibus docui. Et in commentariis in Plessi libellum de viribus lapidum lingua Italica conscriptis.

Sed an ea omnia, quæ à scriptoribus periaptis attribuuntur vera sint, accuratissima in singulis indigeret observatio. Nos ea tantum, quæ scimus, sic docuimus, quomodo contingant, ut sapientis animus facile possit acquiescere.

C A P. XIV.

De Maligna Semitertiana internis externisque remediis.

Hæc quæ jam recensuimus, benignæ Semitertianæ conveniunt. Quod si maligna sit aut expectetur, eadem conveniunt, & quæ altiori putredini & contagiosæ resistunt. Ideo iulapiis & iusculis alteratis uncia una aquæ cordialis miscenda erit.

Adamantis ob-
res contra in-
ferniata tra-
bulenta.

Idem lazuli
contra huius
febres.

da erit. Peculiariter *scordii* modicum aceto incoquantur, vel aqua cum qua oxymel, vel aqua mulsa paranda est. Dentur aquae cordiales ante cibum hora una, aut pulvis de *hyacintho*, vel si initio lumbrici adhiat & alvus fluida. *cornu cervi* ussi preparati cum aqua scorzonerae, terre sigillatae ana scrupulos duos, margaritarum preparatarum drachmam mediam, specierum de gemmis frigidis scrupulum unum. M. cum syrupo de coriis citri, si pituitosa fuerit, sin biliosa cum syrupo ex acido citri, & fiant boli numero quatuor. Capiat duos singulis vicibus, hora una ante cibum.

Boli.

Pulvis par-

Si alvus adstricta est, *cornu cervinum* ussum, corallinam, rhabarbarum paribus portionibus, praebendum ad drachmam unam cum aqua graininis. Etiam paulo ante paroxysmum in omni febre malignitatis futurae notas praeseferente consuevi dare.

Pulvis.

terra sigillata Toccantensis, vel sigillata orientalis, vel Silesiaca, *cornu cervi* ussi tenuissime triti ana drachmam unam, salis absinthii scrupulos duos, pulveris trochiscorum capbura drachmam mediam, Misce pro tribus dosibus, dentur singulae cum aquae cardui benedicti uncis tribus vel quatuor. Datur a me pauperibus in pituitosiori Semitertiana pulvis baccarum hederæ ad drachmam unam, cum niri granis sex, trochiscorum capbura granis tribus, ex uncis tribus aquae cardui benedicti, vel calendulae, vel endrivia.

Alus pro pauperibus.

Fomentum cordiale.

Cordialibus exterius praemuniendum cor fomento, quod habet aquae rosarum stillatitiae, borraginis, melissae ana uncias tres, specierum cordialium temperatarum drachmam unam, croci grana quinque, aceti vel vini albi optimi unciam unam, Misce & cum panno coccineo foveatur tepide.

C A P. XV.

De Pestilentem Semitertianam curandi methodo per medicamenta interna, & externa.

Tempore pestis febre ingruente cum horrore, ilico Hemitritaeam suspicaberis, non expectato tertio die statim antidotis est expugnanda lues pestilens, postea tractanda ut benigna.

Omissa igitur venæ sectione, si corpus non fuerit valde plethoricum, & magna pravorum humorum saburra lateat in primis regionibus, castia vel electuarii lenitiori, aut alterius purgantis supra nominati uncia una cum antidoti nostri vel alterius drachma media porrigatur. Sin indigere venæ sectione videbitur propter corporis plethoram, nullo apparente pestis characterismo, eodem ipso die cum vires consentent sanguis detrahatur ex brachio, si characterissimus pestis adfuerit, ut carbo, vel tumor sub alis, & circa pectus, collum, caputve, ex eodem etiam: si vero in inguinibus, saphena incidenda ejusdem lateris, & si maculae vel exanthemata per cutim corporis effluerint in principio, quod rarius contingit, ab ea desistendum.

Caterum si non appareant necessitatis purgandi aut venam secandi signa, ilico antidota sunt praebenda, & in iis perseverandum, quousque pestem huic febre adjunctam evicerimus. Neque hic per varia antidota vagandum: sed quæ jam experientia confirmata sunt huic febre plurimum profuisse, ut theriacam, mithridatium, diafascordium Fracastorii magno opere laudo, variis modis castigata pro intensiori & remissiori calore.

Diafascordium Fracastorii.

Diafascordium Fracastorii recipit cinnamomi, castia

lineae, ana unciam mediam: scordii unciam unam, distamni Cretice, tormentilla, bistortae, galbani, gummi arabici ana unciam mediam; opii drachmam unam & mediam; styracis drachmas quatuor & mediam, acetose (malim semen quam herbam) drachmam unam & mediam; gentiane unciam unam & mediam: boli armeniae, terre sigillatae singulorum tantundem: piperis longi, zingiberis ana drachmas duas: mellis albi despumati libras duas & mediam, vini aromatici libram mediam, sacchari rosati libram unam. Misce.

Cornelius Gemma in Hemitritaeo pestilenti, quam scribit praecessisse veram pestilentiam, satis frequenter se usum scribit diafascordio, cujus compositio instar theriacae ex variis & contrariis invicem fermentatis constat. Habet, inquit, pro base scordium (omissis simplicium ponderibus, quæ quilibet peritus artifex pro suo ingenio adicere poterit ex ejus verbis sequentibus) inde distamnum Cretensem, absinthium ponticum, epithymum, cum resis Alexandrinis: habet & femina plantaginis, nucleos pini, melonem, lactuca, papaveris albi, erratici, cucumeris, cucurbitae, ac paulatim in minori proportione, radicem gentiane, angelicæ, zedoariae, pseudo-distamni, nucis myrsicæ, macis, croci, piperis albi, myrrhae, cinnamomi, corallinae, rhabarbari, xyloales, gummi belzoini, masticis, boli armeniae, camfore prope partes aquales: cum aliis odoratis & inodoris, ut musco, osse de corde cervi, & similibus paucis, quæ mira proprietate vitalem spiritum atque animale m recreant, omnibus exceptis saccharo & vino adeoque digestis in formam opiatum. Mirum in modum ea confectio venenis, vermium corruptela, & morbis pestilentibus relucatur: sudores atque urinas extemplo provocat, vires contractas citius expectatione redintegrat.

Opiatum Cornelii Gemma.

Frequenter usu venit, ut ægri purgationes & antidota statim quam assumpta sunt vel paulo post revomant. In hoc casu prædicta cum succo limonium aut granati acidi, aut aceto rursus porrigenda repetendaque, donec retineant; si non retinuerint, exigua spes salutis superest.

Nunquam me fessellit antidotus mea, cujus drachmam dedi cum aceti uncia media dissolutam additis uncis tribus aquæ endiviae vel cardui benedicti: tantumque eo profeci, ut non modo semper prima vice retinuerint ægri, sed etiam nauseantem ventriculum eo corroborarint, & inappetentiam ciborum abegerint, sudoribus venenum ad cutim propulsarint.

Compositio ejus est talis. *scordii* drachmas duas, polii montani, pulegii, distamni Cretici, verbenae, prassii albi, origani, calamenthae, hyperici, centaurei minoris, stachados, chamedryos, cardui benedicti, chamepityos, spice nardi ana drachmam unam: Seminis anisi, cymini, carvi, petroselinii, feniculi, cardui benedicti, citri, dauci, sileris montani, oxalidis, rutæ, ocimi, bormini, thlaspi, baccarum lauri, hederæ, juniperi, seminis pœoniae maris ana scrupulos duos: radicem aristolochia rotunde, imperatoria, gentiane, distamni albae, asari, valeriane ana drachmam mediam; radicem angelicæ, petasitidis ana drachmam unam: forum calendulae, verbasci unguiculis, caryophylli altilis, betonicae ana drachmam mediam: Zingiberis, nucis muscatæ, caryophyllorum, piperis, croci ana scrupulos duos: lachryma cervi (si haberi potest) drachmam mediam. Cinnamomi electi, myrrhæ, castorei, styracis, calamitæ ana drachmam unam & mediam: mellis boni quantum satis est, ut fiat Opiatum.

Aqua

Qua pro pe-
ste & hemi-
tritæa pesti-
lenti.

"Aqua pro peste & Hemitritæa pestilenti valde experta in nosocomio Viennensi extra portas, quod Lazaretum vocant, anno millesimo sexcentesimo decimo tertio, & hoc prioribus cum essem Viennæ. de baccarum juniperi viridis, foliorum rutæ ana manipulos duos: theriacæ Venetæ, angelicæ ana drachmas decem: radicum pimpinellæ drachmas quindecim: boli armenia, radicum levisstici, valerianæ, aristolochia rotunda ana drachmas quinque: Myrrhæ, castorei, galangæ, camphoræ, nucis vomicæ ana drachmas duas & mediam: Croci drachmam unam. Quæ contundenda sunt, contundantur & incendantur, & in optimi acetii vini albi libra una, aquæ vitæ libra mediâ infundantur omnia, permixta in phiala vitreâ bene obturata ejus orificio. Et in aqua fervida per quatuor horas pone, ne multum bulliat, mox in alio vitro transfusa servantur ad usum.

decoctum
decoctum
decoctum

Magnum auxilium falsæ decoctio deprehendi propria experientia, optimis rationibus ad eam allectus, priusquam in locum Cornelii Gemmæ incidissem, in quo magnis laudibus hoc remedium esset isdem prope rationibus, quibus & ego permotus. Testimonium ejus notatum dignum hic adscribam. Dicit (inquit) non potest, quam multos curaverim, uno decocto carseparilla, si quando in diploide vel vase duplici pararetur: sic enim spirituosus illius substantia non exhalat, sed per reflexus continuos, cum potius totius corpore denuo permiscetur: atque tum contra pestiferos morbos sive venena validius profliganda, tum pro principibus nostrorum corporum reformendis mirabilem concepit analogiam. Nam quidquid alii statuunt de caliditate nimia clamantes, equidem vel in ardentissimis febribus, naturis oppido biliosis, ventre purgato paululum, ac statim à crisico primo rudimento, plus centies usus fui: ac rationalem viam successus ubique felicitas consecuta est. Nec aliud habui rationis fundamentum quam Galeni methodum in exploranda simplicium facultate, quæ ita sæpe composita à natura dicit, ut nomen simplicium præ nostris compositis ac polycrestis omnibus aperuerit. Videbam in illa radice saporem primo subdulcem, atque decoctum etiam pingue quiddam recrementitium, & calori humido consentaneum: sequitur hunc amaritudinem leviuscula sensim sese aperiens tum abstergendis vasibus atque visceribus oportiana. Postremo tentandi diutius etiam alte demersa tenuitas explicatur, calor non urens, neque salsus & mordax, sed subtilis volucer, ut in recessus abditißimos partium solidarum posset vel momento temporis pervagari. Quamobrem quia morbus compositæ rationis, hac paulatim concoqui, roborari, illa velis scereri, abstergi, displicere, discuti, aperiri, usque ad minutissimas corporum partes: quia rursus conservanda virtutis prima ubique est indicatio, quod hæc per se Medicus curationem quasi ex accidente perficiat: idcirco me aberrare non posse fidebam, si hoc insigni divorum munere tanquam totis ipsius manibus hydræ immensißimam oppugnarem. Quod certo sciam in hoc uno medicamento & nutriendi quandam vim inesse mirabilem, & facultatis deleteriæ vindicem, obstructioni ac putredinis curatricem. Imo, ut verbo dicam, insunt ad vitæ custodiam principii utriusque semina non obfcura: alterum, quod in solidis partibus substantiam humidi primogenii possit reficere: alterum quod cum spiritu calorem ætherem restituat, quoniam dubio procul non omnibus æque conveniat in eadem specie morbi, quin quantitas, ordinis, aliarumque rerum ratio sit una in calculum adhibenda. In multis etenim adjunctis majorem partem radicis plantaginis, eringii, asparagi, caryophyllatæ; in aliis ligum aloes, cinnamomum aut aliud quidquam, imo sub-

inde decoctis cæteris parum duntaxat ipsius carse, quo velut additis aliis, quod reliquum foret, celerius multo vel in corporis penetrare vel in externam circumferentiam permearet. Sed ego falsæ, ut dixi, decoctum cum cichoraceis alteratum do in simplici Hemitritæa cum china, sed ante potum ejus præmitto antidota, reliquamque curationem evicta malignitate cum hoc decocto absolvo. Pauperibus in falsæ decoctum radicum graminis porrigi potest.

Externis quoque remediis pugnandum est adversus pestem, ut oleo scorpionum Matthioli, ungendo pulsantes arterias circa tempora, collum, carpos manuum, circa umbilicum & mucronatam cartilaginem, & circa cor eadem inunctio facienda, applicandusque pannus coccineus madefactus vino non valde potenti, vel aceto aqua rosarum camforata destillato. Quod si ad manus ea non fit, tum olei scorpionum communis unctio cum drachmis duabus mithridatis vel theriacæ Andromachi erit permiscenda.

Oleum Scipionis

C A P. XVII

In Declinatione Semitertianarum, crisi, commutatione quid à Medico præstari debeat.

Sed ad benignam Semitertianam revertantur, quæ debet esse tanquam norina & regula aliarum, ubi ea in vigore constiterit videndum est, an crismum morbus sit habiturus & qualem; deinde quam commutationem sit factura cum eo natura in alium morbum, an recidivam facturus sit, nec ne, an sponte solvetur. Hæc omnia commode ut prævideri queant, à me in præcedenti libro sunt quam plenissime explicata.

In crisi perfecta quæ rarissima est, nil tentandum, in imperfecta adjuvandus naturæ conatus, atque per quas vias natura ducit humorem morbosum cum aliquo levamine aut facili tolerantia per eas etiam ducere oportet & promovere. Per urinas, diureticis; per alvum, blandis dejectoriis; per sudores, sudoriferis; per abicessum, maturantibus. Atque hoc tempore maxima & præcipua indicatio est concoctionem naturæ una adjuvandi: quoniam cum paulatim & veluti per partes concoquat, id quod concoxit, etiam separat & excernit. Quod vero adhuc crudum est, retinet.

Sed quærat hic aliquis, an quod excernit natura ante perfectam crismum & absolutam, non possit concoctioni relicta adhuc materiæ obesse? Dicebat Hippocrates lib. vi Epidem. sect. xi: Quæ concoqui oportet, conclusa esse oportere. Itaque requiri hic videtur indicatio potius laxas partes, per quas natura excernit humores concoctos, adstringendi, ut melius concoquat. Quare non videbitur opus in crisi imperfecta dejectoriis, sudorificis, diureticis, sed concoctioni toti incumbendum.

Quæstio.

Respondeo, hic signa concoctionis esse inspicienda in urinis, & alvi excrementis; quæ si fuerint laudabilia, atque superare signa cruditatis longæ, adjuvandus erit naturæ excreticis conatus. Si vero tantum leve appareat signum concoctionis ac veluti ejus initium, concoctioni erit incumbendum. Morborum, in quos ex hac febre est transitus, natura debet esse Medico quam diligentissime perspecta; eorum, qui communiore sunt curationem in sequenti libri fine trademus.

Responsio.

ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS
DE
SEMITERTIANA
LIBER QVARTVS.

Victus rationem, curationem Symptomatum huic febri
communium magis, Recidivarum, & Commu-
tationum in alios morbos complectitur.

CAP. I.

*Aër qualis apud agros eligendus parandusque, &
que victus ratio instituenda in
benigna febre.*



On parvam & infrequentem hæc febris præbet occasionem ægris errandi in victu. Nam circa statum quando natura aggredditur concoctionem materiæ febrilis, sæpe mitescit vel intermittit, & sic ægrum jam debilitatum à prægressis paroxysmis fames denuo adoritur. Itaque victus ratio diligentissime instituenda est. Vñs enim quotidianus docuit eos, qui in victu deliquissent, aut extinctos cum hac febre, aut in lethales morbos lapsos fuisse: aut longiores quam oportebat tempore, aut frequentius & gravius passos recidivas, interturbata scilicet natura in concoctione materiæ morbificæ, & avocata ad concoctionem ciborum, aut denique valetudinarios permansisse, & ad integram sanitatem nullo vitæ tempore ob insuperabiles visceris alicujus obstructions potuisse perducere.

*Qualis aër
eligendus.*

Aër igitur eligatur sicus, in calore temperatus. Qui enim frigidus est, qualis indicatur ratione caloris febrilis, catarrhum bilioforum & pituitosorum humorum movet, partes extremas refrigerat, calorem & humores ad interiora viscera pellit, cutis obstructions adaugens. Hæc ratio est, cur Semitertianæ æstivæ brevioris sint solutionis, quam vernæ vel autumnales & hyemales. Si vero deliria incesserint aut magnæ vigiliæ, & summa linguæ ariditas, aërem alterare oportet *viridibus foliis vitæ, salicis, & myrthæ*; frequenti suffumigio factum cum aqua rosacea, aut guttatim instillata prope lectum ægroti super palam ferream igitam, aut tegulam candefactam. Si vero soporofus aliquis affectus ægrum affligerit, acetum *coryphyllum* & *rutæ* folia parvæ ollæ mundæ indere oportet, & eam modicis carbonibus aut calidis cineribus prope lectum ponere, ut ferveat & sic exhalet paulatim.

Potus ordinandus.

Pro potu in Semitertiana, quæ æquales fere portiones bilis & pituitæ habeat five intra, five extra vasa, & *uvorum passularum uncias duas: hordei pugillum unum, feminis anisi drachmam unam, aquæ fluvialis*

aut fontana libras sex, in phiala vitrea latiori orificio bulliant lento igne, quousque percoctum sit hordecum, & crepuerit: ablato ab igne, ubi refrigerari inceperit, adde cinnamomi crassiuscule concisi drachmam unam & semis: stent infusa quousque refrigerato decocto accesserit color aliquantulum rubicundus. Qui fieri solet quoties cinnamomi vis & odor ab aqua jam sit attractus. Servetur frigido loco sine colatura pro potu ordinario: & æternis diebus nova fiat decoctio, præsertim æstivo tempore, quo facile acefcit, vel corrumpitur.

In ventriculo relaxato & fluxu alvi dabitur loco præscripti, talis potus. *Medullæ panis domestici (crusta enim solet empyrena redolere) uncias duas, rasura eboris, rasura cornu cervi crudi ana drachmam unam. Bulliant in aqua sufficienti quantitate ad horam, coletur per manicam Hippocratis, & aromatizetur cum drachma una specierum diarhodonis abbatis, vel aromasici rosmi (prout videbitur major vel minor copia pituitæ) ut fiat veluti claretum, quod vinum rubellum appellamus.*

Conveniunt etiam in benigna, pro varia humorum abundantia, *hydroscacharum aqua multa cum modico cinnamomo aromatizatum; syrupus acetosus, oxymel, diluta omnia cum aqua fontana vel fluviali, adjecto acetis momento ad gratiorem saporem, vel spiritus vitrioli quantum ad acidum saporem satis est. Aliquando & furfurum decocto ista diluo, & addo drachmam unam salis prunellæ chymicorum ad tres potus libras.*

Destillatum longum hic Patavii appellatum, quod fit ex jure carnis per balneum destillato, non convenit hic pro potu ordinario. Nam quamvis eo non tantum ventriculus offendatur, quantum ab aqua cocta, quæ hic vitanda est, aut aqua hordei simplici, non juvatur tamen, quia non incidat crassos in ventriculo & intestinis humores, nisi parum feminis anisi in ipso maceretur.

Melius est dare quod pauperioribus præscribo, jus carnis longum appellatum, hoc est, cum multa aqua præparatum & alteratum cum incidentibus & refrigerantibus. *Jus carnis pulli vel gallinæ vel vituli libram unam, aquæ communis libras decem, bulliant lento igne ad consumptionem medietatis, addendo in fine radicem graminis, densis levis, petroselinæ ana unciam mediam, ablata diligenter pinguedine, ubi refrigeratum fuerit, præbetur pro potu. Convenit & serum lactis cum multa acetosa coctum.*

Vinum in totum interdicatur, quod caput repleat & viscera inflamet. Pituitosis tamen & debilibus valde id concedo austerum & linguam mordicans,

Destillatum longum carnis hic non conveniat.

Jus carnis longum.

Vinum cum quibusdam modis conveniat.

inordicans, cujus vivacitas multam communis aquæ dilutionem tolerat, quale est quod ex vis parum maturis in fine ætatis Patavii confici solet. Concedatur in fine prandii & cenæ cum aqua communi: vel *endivia dilutam vel borraginis, per balneum desillata; dulcoretur cum modico saccharo offam panis in hoc tinctam ægro præbendo.*

Cerevisiam, quæ pro ordinario potu in septentrionalibus regionibus usurpatur, iis, qui eam bibere consueverunt, defæcatam tenuemque concedo, & quæ tractu temporis vinosum saporem acquisiverit, si modice bibatur. Nam cum omnibus huic potui affuerit id fere sit moris, ut ad satisfactionem bibant, si sitim extinguere velint, tum in hac febre id vitandum est. Etenim in ventriculo fluctuat, & non facile ad renes transit.

Crasa autem cerevisia, quod caput non secus de vinum repleat, & ventriculo gravis sit difficilisque distribuatur, vitanda est. Defæcatam & cum multa aqua dilutam præferrem tamen paulo salubriori potui ac minus grato & consueto, juxta sententiam Hippocratis aphor. xxxix, lib. ii: Paulo deterior cibus & potus, suavior tamen, minus suavior est præferendus.

Cibus quoque sit refrigerans, humectans, detergens, attenuans, incidens, facilis nutritionis ac boni succi, pro acumine febris ac tempore; modo tenuior, modo paulo plenior, hoc est, plus, aut minus nutiens. Nam si acuta Semitertiana sit futura, tenuis porrigendus est. Si vero longa, plenior. Tenuis erit, exempli gratia, cremor hordei simplex in aqua cocti, forbitionem veteres appellant; cremor triticeus, avenaceus, vel factus ex farre, panis in aqua coctus cum modico butyro vel oleo ut forberi possit, addita emulsione seminum melonum. Hæc in temperatis & calidis regionibus conveniunt; in frigidioribus, panis in tenui cerevisia coquitur cum modico butyro, & forbitur. Quod si minus tenuis esse debeat, prædicta omnia sunt juri, loco aquæ, incoquenda. Præstat autem cremorem hordei, tritici, vel faris cocti in aqua cum modico saccharo dulcorare, & ei aspergere pauculum cinnamomi pulverizati. Vbi vero in jure carnis coquitur cremor, abstinendum à saccharo; quod etiam si magis detergere videatur, minus tamen concoquitur, diutiusque inoram in ventriculo trahens bilefcit, & multis propter ingratitudinem movet etiam nauseam. Iam & paulo plenior erit cibus, si cremor aut panis coctus crassiori pultis forma coquatur. Tempus etiam febris qualitatem cibi indicabit. Nam quo magis vergit febris ad vigorem, eo magis de cibo detrahendum est, juxta doctrinam Hippocratis aphor. viii, lib. i: Quando morbus in suo vigore consistit, tunc victu tenuissimo utendum est. Vtinam hæc sententia aureis literis majusculis fronti cujusque hæc febre ægrotantis inscripta esset, ut à quovis nostræ tempestatis Medico primo intuitu, quando ad ægrum introducit, posset perlegi & in mentem revocari. Non enim non possum in omnes propemodum, qui hodie medicinam exercent stomachari, tantum à veteri arte eos discessisse, ut tenuiorem in principio febris, in statu vero pleniorrem porrigant, carnes vitulinas, consummata caponum, contusa pullorum, panatellas in optimo jure & cum ovis forbilibus permixtas, ut adhuc ma-

gis nutrant, quo auram vulgi sequantur & muliercularum preces putantium eo magis esse nutriendum, quo magis ægri se lassitudine oppressos sentiant. Ego autem tales five altantes fuerint, seu ipsimet ægri, condocere soleo cibum pleniorrem tunc esse morbo gravem, hunc augere ac prolongare, viresque diminui potius quam augeri; contra à tenuiori sustentari eas commodius, morbo levem esse, & eum abbreviare. Nam non solum avocatur natura per cibum pleniorrem à concoctione materiæ morbificæ, ut dicebat Galenus, verum etiam à valde nutrientibus & durioribus cibis commemoratis in languidissimo ventriculo sit eorum difficillima concoctio, imo potius sequitur eorum corruptio. Languet enim ventriculus à putridis vaporibus, qui in venis & arteriis, atque etiam intestinis præcipue colo, quando pituita & bile putrescentibus refertum est; fuscitantur; & ab intemperie, præcipue calida, partium ventriculo circumstantium jecoris, lienis & intestini colli depravatur ejus chylicatio. Et quia carnes concoctum & chylicatum cibum non facile attrahunt per venas mefæraicas in habitum corporis (attrahit enim earum facultas, ut & alia: naturales, vitantur & languent propter febrilem calorem & putredinem) ideo diutius si commorantur cibi in ventriculo aut intestinis corrumpuntur; si citius quam naturaliter consueverunt, rapiantur à carnibus, cruditates omni in parte augentur. His igitur de causis quo magis morbus accedit ad vigorem; eo minus nutiens & facilius concoctionis cibis est porrigendus. Celsus quoque magnopere necessarium esse scribit, non dare cibum, nisi in ea remissione, quæ vera est, & ubi ea venit protinus dare, subjungens, plurimos sub alterutro curantis errore subito mori.

Quæ quanquam de tertiana producta, quam cum Semitertianam appellasse diximus, intelligenda sint, hic tamen locum dant querendi, an cum hæc febris, quam nos Semitertianam appellamus, uno die gravius affligat, altero levius, quotidie cibibus porrigi debeat; an vero tantum, quo levius ægrum affligit & horis quo vel intermisit, vel remittit. Dico ego, quotidie cibum porrigendum esse, sed quo die quotidiana sola, bis, quo vero tertiana, semel tantum porrigendum esse in remissione, quæ sex horis ante principium accessionis quotidianæ alterius levioris diei expectatur, præsertim si pituitosa Semitertiana fuerit. Quandoquidem crudi & pituitosi humores, si in ventriculo & intestinis consistant, si in venis aut quacunque alia parte, si nondum putrescant, concoquantur à natura, & in alimentum quoquo pacto cedant. Sed si assuetus sit æger sæpius in die cibum capere cum sanitate frueretur, Semitertiana biliosa detineatur, regio frigida sit, sitiat admodum in fine vigoris paroxysmi, si utriusque febris nempe tertianæ & quotidianæ paroxysmorum initia duabus tribusve horis à se invicem distent, & ideo vigor quoque utriusque fere in eadem horas incidant, bis dare licebit, observatione adhibita, ut tenuior cibus porrigatur die graviori; leviori vero paulo plenior.

Sed quot vicibus ægri in die sint cibandi, indicabunt non modo febris species & consuetudo verum etiam ætas, natura ægrorum, anni tempus

Quando Sc.
mitertiana
laborantes
sint cibandi.

Quot vicibus
ægri in die sint
cibandi.

& regio, & ipse cibus, quo delectatur aeger. Nam si hic parum nutriat, sapius offeratur, quam si multum: tenuior enim citius plenior concoquitur. Hæc igitur quoque in definienda cibi quantitate sunt consideranda. Nam pueris & adolescentibus, quorum corpora crescunt, plus dare oportet, & etiam bis in graviore die: senibus semel sufficit, & minus quam proportio magnitudinis corporis postulat. Qui famem facilius tolerant, semel in die graviori cibentur. Qui statura longiori sunt & graciles, crura habeant longa, bis cibentur, sed pauciore cibo pro singula vice; breviori statura præditis & quadrato corpore, semel & copiosius, quod in illis celerius cibus & excrementa ad alvum transeant, & minor sit ventriculus, in his contra. Hyeme & vere atque etiam autumnii parte, quæ hyemem attingit, plus & sæpius porrigatur omni morbi tempore, quam æstate. Si regio sit, quæ multum digerat, ut septentrionalis aliqua, maxime Belgii & Germaniæ tractus prope Oceanum, & Scythia, quæ est maxime vorax, plus quam in aliis regionibus cibi porrigatur, & bis in die graviori. Esse quoque Africæ coelum Celsus commemorat, sub quo nullo die aeger abstinere recte videtur. Contra in Ægypto & Asiæ multis partibus famem homines facilius tolerant; sic ut in ea regione quadriduam illam famem, quam olim febriçantibus initio Medici præscribebant, facile tolerare potuerint. Asperorum & altorum montium incolæ magis voraces sunt iis qui in planitie habitant. Ergo & illis bis cibus die graviori offerendus & copiosior, his semel tantum & copia minori.

Sit igitur pro exemplo Semitertiana acuta laborans, vigintiocto annorum, temperamenti parum per calidi & humidi, Patavii in patria civitate decumbens, famem facile tolerans. Huic in die graviori semel porrigam cremorem hordei unciarum octo vel decem pondere, aut alium ex cibis commemoratis. Quod si non facile possit famem tolerare, bisque propterea fuisset cibandus, singula quaque vice uncias sex præberem cremoris hordei, aut liquidioris panatellæ, deinde interpositis horis quinque eandem dosim liquidioris die graviori, crassioris die leviori.

Horæ autem, quibus quotidie sunt ægri cibandi, eligendæ sunt, quibus videbitur universum corpus aequaliter esse dispositum, ut nullius (ut Galeni verbis lib. de Præfatione, cap. vi) aut frigoris, aut caloris rationem inter se corporis partes dissentiant; id est, quando jam declinare febris incipit. Contingit aliquando in hac febre, ut pedes magis caleant toto reliquo corpore, idque in declinatione, quando natura pellit calidiores fulgines ad partes externas. Igitur etiam si tunc corpus inæqualem calorem conceperit, à cibo non est abstinendum, dum animadverterimus talem ejus febris esse peculiarem declinationem.

In somno notandum, ut in principio paroxysmi ægrotus ab eo abstineat, procurandumque ut is in declinatione febris obrepit, quæ in hac febre post mediam noctem plerumque contingit. Quod si nullo tempore somnum capere possit, præterquam initio paroxysmorum, & eum facile toleret, finendus est aeger ut tunc dormiat.

Nunquam in hac febre ad soporifera, quæ opium conti-

nent, veniendum est, ubi spacio vigintiquatuor horarum una vel altera hora dormire animadveritur. Morbo enim ad judicationem tendente expectandus est longissimus somnus. Quo tempore quidquid somni naturæ antea detractum est, hoc ita refarcit ut præ nimio somno lethargici evasisse videantur.

C A P. II.

De Viçtus ratione pro maligna & pestilenti.

Alis igitur viçtus ratio, qualem recensui, in benigna Semitertiana instituenda est. Quod si pestilens fuerit, multum mutanda; si vero maligna, media via erit procedendum. Igitur aer cubiculi, priusquam aeger in eum deferatur, exsiccandus est, igne in medio cubiculi accenso, & constructo ex lignis odoriferis cypressi, juniperi, lauri, qui non tumum, ut plerique faciunt, sed copiosam flammam edat. Deinde olla aceto plena eodem loco carbonibus ignitis superponenda, cui folia pulegii, rorismarini, ruta, origani, radices angelicæ, & petasitidis indita sint. Acetum, in quo pulegium & radix angelicæ macerata sint per noctem sæpius naribus, spongia eo imbuta vel linteo trito, admoveere oportet. Vngere mentum & narium foramina antidoto nostro vel alio, cui modicum acetum permixtum sit. Sed & barbam si vir sit, eodem inungere optimum erit, quo expiret aliquid in circumstantem aërem, qui postmodum ab ægroto per os attrahitur. Aut vino malvatico aqua rosarum sertia pars addatur, & stillatum cadat super lapidem molarem ignitum aut silicem.

Pastilli seu trochisci pro suffumigio paucis carbonibus ignitis injiciendi, ut paulatim consumantur, nec valde comburantur. *Radani purissimi drachmam unam, styracis calamitæ, benzoin ana drachmas duas; myrrhæ electæ, ligni aloes ana drachmam unam & mediam, pulveris corticum mali citrii, caryophyllorum, cinnamomi electi ana drachmam mediam; gummi Arabici dissoluti cum aqua rosarum modico quantum est satis, fiant trochisci parvi, adde ambrai & moschi dissoluti in eadem aqua granum unum.* Pauperiores utantur bacis juniperi in ignem projectis.

Potus sit syrupus acetosus simplex, aut hydrosaccharum aromatizatum speciebus cordialibus temperatis, vel de gemmis frigidis, vel de hyacintho, & aquarum endiviæ, scorzonere, cardui benedicti ana libram mediam: aqua sturvalis, in qua drachma una cornu cervini & eboris macerata sint, libra quatuor, julepi rosati uncias quatuor, succi limonum uncias duas vel tres pro gustu. Misce. Si pituitæ aliqua pars prævaleat, syrupus de corticibus citri uncia una vel altera addatur, aut syrupus de mentha. Si deest succus limonum, substituitur pauperibus septentrionalibus succus berberis, vinum cerasorum acidorum, succus acetosi depuratus. Si phrenitides aut insignes aliquorum viscerum inflammationes non adsint, dandum est vinum aqua endiviæ, vel cardui benedicti, citrii, fragariæ, echii, scorzonere dilutum, addito modico succo limonum, aut mali citrii aut arancii. Nam ab his officium ventriculi roboratur, & vapores, ne ad caput ascendant, à partibus infernis prohibentur. Si potens valde fuerit vinum & subdulce, quod ægris nauseam movet & subvertit ventriculum, succi acidi præscriptorum aliquid addatur. Si vero austerum ac debile, ab hoc abstineatur.

Quibus horis
sunt cibandi.

De somno.

Operari in hac
febre esse vi-
tiosa.

De aëre.

Suffumigium.

Trochisci pro
suffumigio.

Pauci.

abstineatur. Cerevisia tenuis etiam pauperioribus concedi potest, calefacta tamen, & in qua baccae juniperi aut aliquot semina cymina leviter ebullierint. Dabitur calida vel refrigerata cum modico succo limonum. Cavere tamen oportet ab omni potu glacie aut nive refrigerato vel perquam gelido, quod partes spiritales eo non parum offendantur. Procurandumque etiam ne sitim ægri valde tolerant: quia vires ejus tolerantia labefactantur. Sic & modus habendus est, ne etiam nimium bibatur, quod posset cruditates augere, nec à valore confici.

Cibus quoque hic debet esse plenior, quam in benigna Semitertiana: & pestilens adhuc paulo plenior, quam maligna postulat: Quapropter summo opere cavendum Medicis, ne in pestilenti Semitertiana victus rationem instituant, prout in aphorismis præcepit Hippocrates. Bis & ter quaterve in die dandus est cibus, minorique singulis vicibus quantitate, sic ut non oneret naturam & vires conserventur, quæ in hoc morbo derepente concidere consueverunt. Atque non solum in declinatione paroxysmorum, sed etiam in principio paroxysmi si syncope vel animi defectio ægrum affligat aut lipothymia, porrigantur forbitiones ex jure pulli cum acetosæ succo; vel pulvere feminis ejusdem, aut cremor ptisanæ cum manus christi perlato dulcoratum, aut ovum sorbile cum panis frustulo præbendum in vino aqua acetosæ diluto intincto: aut lactuca & acetosa coctis in jure carnis cum modico omphacio & petroselino. Præstat tamen semper in initio paroxysmi tenuiori uti victu, ut forbitionibus jam dictis; in declinationibus, paulo pleniori, ut solidiori cibo, contusus caponium cum omphacio aut succo mali aranci. Carnes quoque concedendæ sunt caponium, perdicum, vituli, pipionum, turdorum cocta cum capparibus aceto conditis dictis Genuensibus, vel floribus mali citri & aranci, vel fructibus eorum omnibus in aceto prius maceratis. Dari etiam possunt carnes assæ, si æger mandere poterit, vituli, caponium, perdicum, turdorum, & aliarum avicularum montanarum. In statu capiat juris glaciati tria vel quatuor cochlearia facti ex pedibus vituli in aqua coctis, vel carne vitulina & capone cum vini albi modico, cum corticibus & palpa mali citri aut eorum floribus aceto maceratis, coctis omnibus usque quo tabescant, addito sub finem aceti momento, & saccharo perlato, ac cornu cervino uslo. Consummata etiam laudamus caponium & carnis vitulinæ. Ins expressum ex carne castrati semiasata, ut in Galliis fieri consuevit cum succo mali granati acidi vel aranci.

C A P. III.

De Curatione symptomatum & morborum, quæ frequentius huic febri superveniunt, vel implicantur, vel post Semitertianam comparent.

Symptomata varia morbosque acutos aditurnos huic febri supervenire aut subsequi, aut cum ea nasci plurima in secundo libro recensimus, quorum quædam rarius comparent, quod sæpius ne dicam frequentissime conspiciuntur, ut capitis dolor, fitis, lingua arida, nausea cibi, fastidium, lumborum dolor, phrenitides, vigiliæ, lethargi,

vertigo, epilepsiæ quædam species, timor Germanis dicta, alvi fluxus, dysenterię, colici dolores, recidivæ, & mutationes in febrem duplicem, tertianam, quotidianam, quartanam, abscessus. Horum pene omnium quanquam exacta satis curatio videatur à recentioribus tradita, tamen peculiaria remedia, quibus ad ea tanquam arcanis hæcenus felicissime usus sum, operæ pretium duxi in gratiam tyronis hic adjungere.

Primum ad capitis dolorem, præter cucurbitulas cruribus aut scapulis cum scarificationibus adhibitas, confert etiam balneum vesperi pedibus administratum, in quo sequentia incoquenda sunt. *℞ foliorum ruta, verbenæ, salvie, florum (si desint) saliorum sambuci ana manipulum unum; florum chamæmeli, meliloti ana Manipulum medium; salis unciæ duas, fursurum tritici manipulos duos. Misce.* Fronti cum stuppa cannabina diligenter baculo contusa, ut fiat mollior, adhibendum oxyrrhodinum. *℞ olei violacei unciam unam, aquæ rosarum unciam unam & mediam, aceti rosati vel sambucini unciam unam, albumen ovi unum, pulveris caryophyllorum, majoranæ ana drachmam mediam, verbenæ scrupulos duos. Misce.* adhibeatur tepidum hyeme, æstate frigidum toti fronti, sic ut & tempora late obideat. Adde interdum soleo nucleos persicorum tres vel quatuor, vel malorum armeniacorum diligenter contusorum cum suo rubro exteriori cortice ad majorem discussionem. Pauperibus folia mali persicæ fronti fructuose applicui contusa.

C A P. IV.

Ad sitim.

Pro siti extinguenda os aqua non valde frigida sæpe collatur. Plurimum ad hanc facit cataplasma ex farina hordei, succo cicoreæ, oleo rosato, quod supra descripsimus; utroque hypochondrio late adhibendum. Ossa prunorum damascenorum coctorum in ore detenta, & ipsa pruna comesta: pulpa citri aut aranci acidi pulvere sacchari cantu asperso, macerata in aqua rosarum vel endivie.

Hemitritæo depellendo trochiscus apud Plinium Valerianum libro tertio; Et ad febricitates ut non sentiant ardorem stomachi & febres, & ad solis ardorem nimium: Recipe succi glycyrrizæ (quo recentior, eo melior) drachmas sex; seminis cucumeris hortenensis quatuor; svagacanthi duas, quæ teres singillatim, & permiscebis cum albo ovorum, & facies catapotia. Hæc deglutita quoque ad sitim maxime faciunt, etsi tantum in ore detineantur.

C A P. V.

Ad linguam asperam.

Linguam asperam, etiam si fauces & guttur ali quo modo inflammata sint, ita curabis. *℞ macilaginis seminum psyllii & cydoneorum extracta cum aqua violarum in qua glycyrrizæ portio per horam macerata sit unciæ duas, eo tingatur pannus lineus, & superponatur lingue, postquam ablata est cum aqua hordei, in cujus singulis libris salis nitri drachma una ebullierit, prius addita una vel altera gutta olei tartari.* Dedi aliquando propinandum drachmam unam seminis psyllii orientalis ex aqua communis vel portulacæ unciis tribus; maximeque profuit, quando suspicio erat

De Dolore capitis.

Lesio pedum.

Oxyrrhodinum fronti applicandum.

Cataplasma.

Cap. 1.
Trochisci Pl.
Valeriani.

erat oesophagi interiorē tunicā eodem vitio quo lingua laborare, ex quo anginae lethales oriuntur tractis in consensum propter asperitatem & insignem siccitatem oesophagi, musculus laryngis, nec ullo apparente in faucibus tumore.

Huic etiam succurrere soleo aqua hordei & ghyrrizae adjecto diamorem pro gargarismo. Aliud, quod fissuras linguae & ulcuscula etiam sanat si saepe in die repetatur. Asclacos fluoriatiles, quos gambaros vulgus appellat, urcioi duodecim contere in sufficienti aqua endivia, cui tertia pars aqua papaveris erratici permixta sit in mortario marmoreo, & cum expresso succo ager se gargarizet, & non modicum ejus deglutiat, tum butyro recenti novies loti in aqua communi linguam ungat, quae priusquam gargarizet, à pituita & immunditie abluta sit, & purgata cum peniculo facto ex panno laneo molli peruncto melle rosato colato aut aqua rosarum, in qua sacchari cantii uncia media, & drachma una aluminis dissoluta sint. Aliud. Spongiā mollem novam & lapillis diligenter purgatam, decocto radicū albae in aqua portulacae madefacere oportet, addita quinta parte olei de feminibus cucurbitae, vel communis, vel amygdalarum dulcium recentis novies loti in aqua communi, & eam spongiā ori aegrotantis indere, jubereque ut per os respiret quantum fieri potest. Nam per foramina spongiae, & à lateribus aeris nonnihil ingreditur, quod ad interiora penetrat, humectans & refrigerans. Aliquando mucilaginis seminum cydoniorum & psyllii madefacta usus sum.

C A P. VI.

Pro nausea, & cibi fastidio.

Ad insignem nauseam & cibi fastidium, quo aegri quemvis cibum aspernantur, raro fallit antidotus nostra drachmae media vel unius ponderis cum aceti optimi drachmis duabus & uncis duabus aquae cardui benedicti. Pauperioribus etiam succurrit jusculum carnis cum mentha vel pulegio alteratum addito succo berberis, vel granati acidi, aut mali citrii. Nimiis etiam vomitus si affligat, si ve bilis sit, si ve pituitae aut cibi, ut quidquid in ventriculum illapsum sit, statim vel paulo postquam assumptum est, revomatur, conveniunt praeter jam dicta, fomenta & cataplasmata ventriculo adhibita, ut est emplastrum decoctum panis in officinis nobile.

Fomentum.

℞ corticum granatorum, mali citrii vel arancii ana unciam semis, florum rosarum rubearum, foliorum absinthii, menthae, pulegii, florum chamamelis ana manipulum unum. Bulliant in vini rubri austeri libris sex ad consumptionem medietatis, colatura servetur pro fomento spongiis calide adhibendo prope mucronatam cartilagineam, & infra.

C A P. VII.

Ad Lumborum dolores.

Lumborum dolori succurrit lac muliebri vel alterius animalis recens multum & lumbis inspersum vel inunctum, vel in ejus defectu oleum commune, vel amygdalarum dulcium, vel butyrum recens novies lotum in aqua communi.

Linimentum egregium.

Linimentum egregium: ℞ mucilaginis feminis psyllii & cydoniorum extractae cum aqua rosarum ana unciam unam: olei violacei novies loti in aqua nymphaeae unciam

unam & mediam, butyri recentis novies loti in aqua communi uncias duas, cera alba parum. Misce pro linimento.

Plurimum etiam confert oleum recens expressum de feminibus cucurbitae. Linimenta & inunctiones adhibenda sunt initio febris, aut cum maculae petechiales nondum comparent; aliter clysteribus refrigerantibus, detergentibus, blandis, duriore existente alvo, succurrendum.

℞ florum chamamelis, meliloti ana manipulum unum; foliorum parietariae, endiviae, violariae ana manipulum semis; foliorum papaveris rhaadis pugillum medium; hordei pugillum unum. Bulliat primum hordeum ad crepaturam, deinde herbae & flores adjiciantur, in fine colatura adde mellis rosati solutivi uncias quinque. Misce pro clystere tepide injiciendo. Supra vero dorsum pellem agniam vel caninam novissime detractam, vel alterius quadrupedis domestici, qua parte carni adhæsit lumbis & dorso superligare oportet per unum vel alterum diem, donec fetere incipiat, & eandem si dolor non cessarit renovare. Siquidem hoc remedium insignem habet digerendi facultatem & per poros portionem malignae materiae evocandi. Facit etiam ad idem oleum amygdalarum dulcium cum chamomelino permixtum, gutta una adjecta olei tartari, & modico sale niri.

Enema.

C A P. VIII.

Ad vigilias.

Vigiliae quoque saepe molesta sunt biliosis Semitertianis, quibus succurrit cucurbitulae extremis partibus, ut furis & femoribus adhibita: item balnea & lavacra pro iisdem partibus.

℞ florum chamamelis, rosarum rubearum, nymphaeae singulorum manipulum unum & medium; foliorum lactuca, violariae, malvae ana manipulum unum. Capita papaveris albi duo. Misce incisus incidendis & bulliant in sufficienti quantitate aquae, quae ad media crura balneum perveniat, quod tepidum fit. Addere ei interdum licet lixivii medicis famentorum visum partem octavam.

Latio pedum.

Vaguentium temporibus & fronti adhibendum cum stuppa cannabina. ℞ unguenti populei unciam unam, olei violacei unciam mediam. Misce. Oleum etiam amygdalarum dulcium novies lotum in aqua florum violarum locis supradictis illitum plurimum probat: & emulsionem hora una vel altera post cenam, quae ℞ amygdalarum dulcium excoctatarum uncias duas, quatuor seminum frigidorum majorum ana drachmas duas, feminis lactuca, papaveris albi ana drachmas duas. Misce, & in mortario consusa cum aqua hordei vel lactuce uncias sex, fiat emulsio, quae saccharo perlato vel canis violato dulcoretur ad libitum aegrotantis: feminis acetose drachmam unam & mediam adjungo, si malignitatis sit suspicio, cum aqua cardui benedicti & scorzonerae facta emulsione.

Vnguentum.

Emulsio.

C A P. IX.

Ad Letbargum.

Letbargicis injiciatur clyster acrior, & qui pituitam ex crassis intestinis educat, qualis erit qui ex hydromelite conficitur, cum drachma una specierum hiera & salis niri altera drachma. Vel suppositorium ex melle, sale & speciebus hiera. Oxyrrhodium confert, quod capitis dolori supra proposui, vel

Enema.

Suppositorium.

Oxyrrhodium.

vel. \mathfrak{R} olei rosati unciam, aceti unciam unam & mediam, pulveris foliorum ruta drachmam mediam, pulveris iros, majorana, cornu cervini usli ana scrupulum unum, cum mucilagine radicum albæ, Misce. Adhibeatur naribus ruta cum aceto contusa, & enforbii medicum, capillis humani, aut cornu hircini rasura comburatur, & naribus adhibeatur.

Plantis pedum talis sinapissimus alligetur. \mathfrak{R} radicum raphani rusticani, si haberi potes (marinum herbarii quidam cognominant) vel ejus loco raphani alterius fortis diligenter in mortario lapideo tusi vel derafi uncias duas, fermenti fecalini, quod melius est triticeo, uncias quatuor; seminis sinapiis unciam unam & mediam, pulveris foliorum ruta drachmas duas, Misce. f. Cataplasma.

Vesicatoria cruribus tantum, vel una etiam brachiis adhibita, plurimum commendo. Fiant ea ex aliis contusis in forma cataplasmati, & superimpositis: quod securius est eo, quod ex cantharidibus conficitur. Nam in hac febre, rendente ad exitum morbo, sæpe urina supprimitur, maxime quando præcesserunt insignes lumborum dolores vel hypogastrii, quod \mathfrak{H} ippocrates appellavit. Itaque tunc usus cantharidum mihi solet esse suspectus. Optimum quoque vesicatorium est & blandum, ceratum factum ex succo & pulvere flammule bovis, quod in molli cute præditis solet sufficere. In durioribus octava pars pulveris cantharidum additur.

C A P. X.

Ad Phrenitidem.

Convenit phrenitidi lac muliebri cum oleo rosato permixtum, initio morbi duplici petacio adhibendum fronti, & sæpe renovandum derafis capillis usque ad finciput. Hydroleo lana succida vel sponsia imbuta applicanda: vel cataplasma ex pane, oleo rosato & aqua: conferuntque ea omnia, quæ ad vigilas præscribi consueverunt. At in augmento statuque phrenitidis derafis capillis toti capiti utiliter adhibui cataplasma, quod apparentibus jam petculis ad sanam mentem ipsos vigintiquatuor horarum spacio reduxit. valet quoque ad lethargum, in quem sæpe phrenitis permutari consuevit. Et è contra ex lethargo phrenitis aliquando expectatur. Quapropter non mirum esse debet, si à veteribus nonnulla remedia probentur in lethargo, quæ phrenitidis conferre etiam peculiariter scripserunt.

Cataplasmatidis descriptio. \mathfrak{R} farine hordei libram mediam; farine fabarum uncias tres; furfurum tritici tenuium unciam unam & mediam; pulveris florum chamemeli unciam mediam, pulveris florum stachados, foliorum salvia, ruta, majorana, ana drachmas duas; seminis cymini pulverati drachmam unam; olei rosati uncias duas, succi lactuæ uncias tres, oxymellis simplicis quantum sufficit. Misce pro cataplasmate. Impo-natur tepidum ac spacio viginti quatuor horarum non renovetur, ut sic acrius evadat medicamentum & ex alto humores evocet ac digerat. Atque ne refrigeretur cataplasma, & ne à phrenitidis avellatur à capite, fasciis, quas cancores veteres appellant, cum octo capitibus scissis, prohibendum est, & superponenda super cataplasma stuppa canabina calida, ne refrigeretur; si hyems fuerit, superliganda in duplici lineo & æquali crassitie ac mole.

Iuvat etiam plurimum in hoc casu pellis de recenter maciata quadrupede detracta: vena frontis recta incisa, vel sanguifugæ naribus indita.

Vesicatoria quæ hæcenus Medicis familiaria sunt, hic non laudo, quia nimios dolores excitandi vigilas conservant, quæ quantopore fieri potest, sunt evitandæ & profligandæ. Animadverti etiam humores iis magis accendi, quam à capite revelli.

Sed & illud neminem latere velim, plerumque lethargum & phrenitidem ab inflammatione viscerum non modo foveri, sed etiam dependere: & cum biliosa diarrhæa in hac febre phrenitidem per triginta quinque dies continuos durasse. Itaque dum hæc externa adhibentur, juvabit plurimum cataplasma adhibuisse toti ventri phrenitici, quale pro jecoris refrigeratione præscripsimus; & si alvus nil reddat, eam eluere cum decocto hordei & furfurum in jure carnis, additis mellis violacei solutivi uncias quinque, olei violacei uncias duabus aut tribus, salisque momento.

Sed si lethargicus fuerit, apponatur ventri pellis novissime detracta de maciatis animali; vel cataplasma quod sequitur. \mathfrak{R} medulla panis macerata in aqua communi libram unam, pulveris absinthii, majorana, salvia, mentha, ana unciam semis; olei rosati uncias duas & mediam; seminis carvi pulverati drachmam unam; vini rubri austri quantum sufficit, ut fiat cataplasma.

C A P. XI.

Pro Vertigine, Epilepsia, Apoplexia.

Vertiginem maxime illi patiuntur, quibus plurimi putrefacti humores pituitosique in intestinorum cavitate, ventriculo vasisque continentur. Patiuntur eam dum caput erigere volunt, & toti furgere aut deambulare. His nil est conducibilis, quam clysteribus frequentibus, & blandis tutisque purgationibus, quales antea præscripsimus per epicrasin humores expurgare, aliquando per vomitum, sæpius per secesum: ita paulatim hæc affectio abire consuevit, quod & ægris & astantibus prædicendum est, ne ubi illico cessare vertiginem non conspexerint, præcipitare Medicum cogant in majora & minus tuta remedia, maxime ea quæ ad vertiginem à quibusdam antiquis scriptoribus commendantur, & quam maxime mutare ea, quæ ad febrem hanc præscripsimus.

Epilepsia aut apoplexia si supervenerint, earum recidivæ sunt præcavendæ. Peculiariter confert repetita purgatio ex infusis foliorum sene drachmis duabus, agarici drachma una; spice, schenanthi ana granis quatuor, in aque cerasorum nigrorum dulcium per balneum destillate uncias quatuor, addendo expressioni uncias duas manna electæ.

Tempore paroxyfmi applicari possunt multa, quæ ad hoc facere dicuntur. Cornu cervini usli tenuissime in mortario triti drachme due cum aqua peonia vel cerasorum nigrorum præbeantur, vel pulvis sanguinis canis aut hepatis lupi, aut splenis pulli equini pari mensura cum isdem aquis.

Appellant autem hic Patavii equorum pastores spieuzam, hoc est, splenem pulli equorum noviter nati mucum, quem in ore pullus continet, dum egreditur ex utero matris. Hunc, nisi illico ori-

G

inferant

Contra vertiginem.

Contra Epilepsiam & Apoplexiam.

Mucus in ore pulli equini jam nato natus contentus.

inferant manum vel digitos & extrahant, statim deglorit pullos. Quare summa diligentia & cura est opus, ut habeatur: siccatur in umbra & in pulverem teritur. Sunt qui ei alia medicamenta & aromata admiscunt, qualia ad morbum caducum valere ajunt scriptores practici. Hujus loco lichen equorum in pulverem redacti substituantur.

Scio vertiginem, epilepsiam, apoplexiam à variis causis oboriri posse, & harum magnam partem una cum febris Semitertianæ causis implicari, ad quæ præscripta remedia non semper conferunt. Quoniam tamen plerumque ab iis causis oriuntur, quibus hæc remedia plurimum succurrunt, idcirco ea præscribere hoc in loco non sum gravatus, ut unicuique magis tanquam experta in promptu essent, donec accidentium causæ melius sint Medico diligenti perspectæ. tunc si alia sit causa per se subsistens, ea talibus remediis est proliganda, qualia à doctis practicis proponuntur.

C A P. XII.

Ad alvi fluxum & Dysenteriam.

Alvi fluxus & dysenteria blande & cum summa prudentia sunt tractandæ. Prohibendæ enim ne aut nimium fluant, & sic vires debilitentur, aut brevi adtingantur. Periculosum namque. Quibus natura ad tabem vergit, ut angusto thorace præditi, & graciliores, & prædurus est lien vel jecur, citius susti debent. Et his majore cum diligentia initio procurare, ne cum impetu quodam validiore fluxu oborto vires ilico dejiciantur. Dentur igitur serum destillatum ad libram unam cum uncis duabus aque fragariae, vel uncis tribus emulsionis seminum melonum facta cum aqua bordei: julsula alterata cum plantagine, cichorco, soncho, pilosella, quatuor seminibus frigidis, aque beata virginis thermalis librae due cum succi ciclores uncis duabus in primo cyatho, & alia ejus generis. Multi tanquam ab orco resuscitantur decocto salsa parille alterato cum quinquefolio aut fragaria: datum pro ordinario potu quantum aeger velit. Multis quoque profuit jus carnis alteratum cum radice alceæ, vel floribus conyzæ minoris. Considerandum præterea, an pestilens seu malignus & contagiosus sit fluxus aut dysenteria, nec ne. Nam talis in hac febre tempore autumnii integros magnosque exercitus militum depopulare nonnunquam consuevit ob fructus, quos comedunt plurimos, & carnes recen-
ter mactatas. Iis magnum adjutorium est recentis theriacæ drachma una cum cerevisia calida propinata, aut jure alterato cum cichorco, plantagine, carduo benedicto: vel bolus, qui terra sigillata, cornu cervini usque singulorum drachmam unam: seminis plantaginis scrupulos duos, specierum de hyacintho drachmam mediam, vel lapidis bezoar grana decem, cum succo ciclores aut conserva rosarum, sunt boli pro quatuor vicibus sumendi mane & vespere media hora vel paulo plus ante jus alteratum.

Boli.

Perquirendus est etiam aeger, an ei os amarescat, nec ne. Nam quibus in ore amaritudo est, iis purgatio blanda instituenda. Ut sero caprino depurato cum syrupi rosarum solutivi uncis duabus in primo cyatho, vel aque beata virginis libris duabus, in quibus pulpa amarindorum uncia media dissoluta sit.

Si adstantium aut amicorum precibus aut aliis necessitatibus, quæ protinus ventrem sistendum esse persuadent, ad miraculum usque tibi satisfaciet placenta quæ fit ex pulveris florum conyzæ drachma una cum ovo integro hoc est, albo & luteo ejus diligenter confusus & in sartagine frixis cum butyro vel oleo olivarum. Datur hæc ad comedendum tribus diebus continuis mane jejuno ventriculo horis quatuor ante prandium.

Venter (ut externa remedia quoque attingam) ungendus oleo rosato omphacino completo, vel oleo cydoncorum & mastichino. Placenta ex ovis ventri applicetur. & ova integra, id est, cum albumine & luteo diligenter confusa numero sex; pulveris conyzæ media vel minoris (flores eligo magis, quam folia) drachmas duas. Misce & cum oleo olivarum vel mastichino in sartagine igni admodum fiat placenta, quæ linteo raro ac tenui involuta late per totum abdomen & calide applicetur, fascia prohibendo ne decidat. Vel omentum calstrati superponatur in oleo rosato & mastichino tepidis, in quo prius flores conyzæ ebullierint, blande ne comburatur calefactum.

Et quoniam dysenterias teneasmus præcedere vel concomitari solet omnibus modis, ut is mitigetur & sedetur, erit studendum. Lacte igitur recen-
ter multo cum modico saccharo postquam bis terve alvus est abluta, suffumigium ano extrinsecus adhibendum, quale est quod sequitur. & pulveris menthe drachmam semis; rosarum rubearum, florum verbasci, mastichis, olibani ana scrupulum unum; macis vel nucis muschatae scrupulum medium cum resina thebentina, sunt trochisci pro suffumigiis. Pauperibus quoque ex sola resina pini, vel thebentina, rasura cyperi vel loricis, vel nucis pineæ cortice fiat suffumigium.

Suffumigium contra teneasmus.

Fomentum quoque cum spongiis madefactis in decocto calido frequenti adhibendum supra os sacrum exterius, ita ut ad anum perveniant spongiæ madefactæ & ipsam cooperiant. & foliorum burse pastoris, foliorum & florum thapsi barbati singulorum manipulos duos, florum rosarum rubearum manipulum semis, corticum nucis pineæ unciam mediam. Vini rubri medicis & austri libras sex, bulliant ad horam lenta igne, & colentur pro fomento.

Fomentum.

C A P. XIII.

De Colicis doloribus.

In prioribus libris dictum est colicos dolores præ cæteris morbis hanc febrem maxime concomitari, vel subsequi: imo quoties aliqua crisis expectanda est, holce præ cæteris criseos modos esse magis expectandos.

Per colicos dolores intelligo eos, qui non tantum tenuia (quos post Hippocratem ceperunt proprie ileum & dolores iliacos appellare) sed & crassa intestina (quos colicos proprie nominant) obfidere consueverunt, & quos utrosque Hippocrates semper uno nomine proprio, scilicet ilei nobilitavit in suis aphorismis. Neque tamen omnes intestinorum dolores tam tenuium quam crassiorum, sed eos præcipue quos Dioscorides magis proprio nomine dignatus est appellare colicos paroxysmos, id est, dolores intestinorum periodicos. Nam ab aliis doloribus intestinorum hi differre videntur, quod illi magis continui sint, quousque vel à natura sapereantur, vel naturam

Quod per dolores colicos hic intelligendum.

naturam superent: hi vero redeant per paroxysmos magis, ut aliquando animadvertemus aegrotos, qui in imperitis Medicos inciderant, vel malam victus & medicamentorum rationem erant secuti, per biennium ab hac febre soluta colicis paroxysmis molestantur fuisse, quorum plurimi circa vesperam exacerbantur quotidie, veluti quotidianarii cum febre continua quotidie se exacerbante vel invadente post intermissionem febris, tanquam novo paroxysmo. Sic & quidam alternis diebus exacerbantur aut invadebant tanquam tertiani, alii plurium dierum intervallo. Et rursus vidimus eos, qui per plurium dierum intervallo repetentes, multos dies continuos aegros misere affligebant, circa vesperam nonnihil acris molestantes, mane vero nonnihil remittentes, deinde per octo, decem aut plures dies prorsus intermittentes.

Oriuntur hi à composita plerunque phlogosi vel inflammatione intestinorum. Hanc nobis apertissime demonstrantur cadaverum dissectiones. In omnibus enim quotquot unquam aperire potui, veram inflammationem conspeximus, quæ modo ileon vel jejuni intestini partem aliquam, modo vero colon tantum, sæpius cum incipit eam quæ intestinum colon cum ileo necit partem obfedit. Vidi etiam quibus omnia & ventriculus erant inflammata una cum omento & mesenterio. Vidi aliquando & mesenterium tantum inflammatum cum levi tenuium intestinorum inflammatione. Multos qui moriebantur ab his doloribus, gangrena harum partium aut sphacelo mortuos: quæ modo exiguum intestini jejuni vel ilei colive partem, modo magnam tenebant. Et plerunque quoties una cum doloribus colicis (qui Medicos plurimos & nobiles in arte in principio latent propterea, quia sub specie alterius morbi plerunque habebantur, aut clandestino quasi ac blando introitu eos decipiunt) Semitertiana invadit cum dolore lumborum, animadvertemus hanc magis præ cæteris malignam & lethalem fuisse, periissequæ ex ea homines propter gangrenam intestinorum, & aliquando etiam ventriculi maculis quibusdam lividis in eo deprehensis, ac si ab hausto veneno facti fuissent, comparentibus etiam peticulis vel ante vel post mortem, vel insignibus maculis aut vibicibus lividis in dorso, quales & pestis tempore observantur, maxime quando anthracis internum aliquod viscus, sed intestina præcipue obfesserant. Dixi causam horum dolorum esse inflammationem compositam, non simplicem, tum ratione essentia, tum ratione causæ. Est enim inflammatio erysipelacea, vel erysipelas inflammatorium, quod à bile prædominante sanguinem crassum & pituitosum originem habet. Non nego tamen, quod ab erysipelate simplici aliquando oriri possint. Nam in dissecis cadaveribus aliquando intestinorum & ventriculi interiorem tunicam, quæ villos continet, florido quodam plus quam decet rubore coloratam vidimus, nequaquam aliis intestinorum tunicis eo colore infectis, sed naturale colorem reservantibus, & meram bilem viridem flavamque per vomitum & fecesum excretam fuisse ante mortem. Erysipelas autem ut in externis partibus summam cutim obfideret, sic in internis viscerum superficiem internam

vel externam. Deponit autem natura ad intestina ejusmodi humores propter validam vim expultricem, stimulatam à copia biliosorum & pituitosorum humorum aliquando coctorum (ut quando dolores colici sunt critici, quales inclinant febre Semitertiana aut ex hac nata quartana, duplici tertiana, aut quotidiana solent comparere quo tempore sunt abitura) vel adhuc crudorum, quales in initio vel augmento Semitertianæ oboriuntur.

Propellit autem expultrix facultas ad intestina magis, quam ad alias corporis partes convenientes, propter tres causas. Prima, quia ægre per habitum corporis & cutis poros tales humores depellere potest, quia etiam bilioli in venis sunt, & plurimi quoque pituitosi humores; tamen pituitosi iis permixti suo lentore & visciditate cutis poros obstruunt, adde, quod æstas etiam ab aëre externo plurimum ac repente refrigerato tales pororum cutis obstructions multum augeantur. Indicium hujus rei non minimum est, quod balnea quæ meatus cutis referando destinata sunt, non mediocriter tales colicos juvare soleant. Quod temporibus frigidis, ut hyeme & autumno maxime ingruant, aut aegros crudelius affligant. Quod denique adhibitis externis medicamentis refrigerantibus, adstringentibus & repellentibus dolores articularum inflammatorii & podagrici præcipue oboriuntur.

Secunda causa est propellens ad intestina naturæ, quod per urinas peccantem materiam expellere nequeat. Renes enim tantam humorum copiam feceræ ac suscipere non possunt. Nam sæpe intemperie calida laborant renes ob consensum inflammationis, quem habent maxime si color fuerit inflammatus. Sed & pori ureteres aliquando inflammantur & accenduntur propter intestina tenuia, quæ ipsis incumbunt, inflammata. Substantia deinde renum cum pituitoso biliofoque sanguine nutriatur, papillares carunculas, per quas transit urina, infarcit. His igitur de causis, cum renum facultates naturales langueant, non mirum est, si aliquando contingat ab hisce doloribus urinae suppressiones excitari, per quas nil à renibus in vesicam colat, quod cathetere immisso in vesicam, & nil urinae per eam exeunte certo scivimus.

Tertia causa est, quod intestina sint veluti naturalis cloaca; per quam pituita & bilem naturæ commodissime solet detrudere. Iam hæc facilius humores in colico laborantibus suscipiunt, quod calore naturali plurimum sint labefacta, qui hosce humores copiosos nequit digerere, neque concoquere, ut antea solebat, multo minus per fluxum vel diarrhæam expellere, humorque calidus defluens non statim apertam inveniat viam, ut in cavitatem intestinorum depellatur. Vbi enim ad interiores tunicas pervenit, eas magis contractas & obstructas deprehendit, & sic biliosus humor cum pituita permixtus in substantia intestinorum manet conclusus; unde putrefit una cum portione sanguinis & inflammatur.

Argumentum hujus rei certissimum est dysenteria vel alvi fluxus; qui si superveniat dolori colico, eum solvit. Si vero dysenteria aut alvi fluxus in Semitertiana aliquando intempestive curati fuerint, in hunc dolorem colicum transmutetur.

*Cum facilis
expultrix ad
intestina ma-
gis quam alie
tales humores
propellit.*

II.

III.

*Vnde confirmatur inestimationum inter-
vires tunicæ
&c.*

Porro confringuntur intestinorum interiores tunicæ, & obturantur oscula venarum meseraicarum, ac labefactatur eorum calor natus, partim à causis internis, partim à causis externis. A causis internis, ut à copia pituitosorum & biliosorum humorum, à pontica horum qualitate, crassitie, & lentore, quæ plerunque sunt ejus pituitæ, quæ interiorem intestinorum cavitatem implet, & interiori eorum tunica superficie oblinuit valideque adhæret. A causis externis, ut cibus & potu stiptico & pontico, vino austero vel acido ut pergolano Patavinorum, vel alio crudo & ex uvis immaturis facto, fructibusque acerbis. His igitur si quispiam diu & continuo utatur, solet in hunc affectum facile incidere. Idcirco apud Pictones Gallorum & plerosque Germanos apud quos vina non plane maturefcent, hic morbus est frequentior quam apud alios calidiorum regionum. Biliosa materia in ventis generatur ut & pituitosa, quanquam maxima hujus pars à capite destillet in intestina, ea scilicet quæ internam intestinorum superficiem obstruat. Quamobrem illi, qui destillationibus & obstructionibus mesenterii laborant ac folliculi fellis, magis quam alii colicis doloribus infestantur. Incidi in non paucos, eosque in hac arte peritissimos viros, qui exiguum hujus morbi cognitionem, ne dicam nullam ab initio cum ingruerant mihi habuisse videbantur. Horum enim maxima pars in muliebri sexu pro uterinis affectibus habuerunt: in virili vero pro dolore ventriculi (quia multis nausea & vomitus supervenerant) aut dolore nephritico, quoniam in lumborum alterutro & maxime dextro dolore insignem ægri percipiebant. Hos ad ejus cognitionem nunc signis paucis ut ducam, tempus est, desumptis potissimum à loco & excrementis.

Horum dolorum signa.

Nam modo infra umbilicum, modo supra vel circum ipsum, vel à lateribus tantum versus ilia & lumbos tantum dolor percipitur, modo vero per totum ventrem: ut plurimum autem dolent lumbi utrinque, aut eorum alteruter, sed frequentius dexter, qui dolor se postmodum extendit ad anteriorem regionem ventris supra umbilicum ut plurimum, & circa ventriculi regionem per transversum veluti cingulum cingens & coarctans partem ventris, quæ utroque hypochondrio subest. Quia colon, quod hoc loco est positum per transversum sub ventriculo, fere semper afficiatur, ut ideo colicus potius quam iliacus aut chordapilus dici mereatur. Præter hæc advertendum, quod excrementa per alvum aut non reddantur, aut ægre admodum. Siquidem à primo clystere (si à natura prius non sint sponte fæces ex alvo ante eum exclusæ) prompte fæces exeunt. At si secunda vice post aliquot horarum intervallum, alius communis injiciatur, nil redditur præterquam clyster cum pauca pituita, quam à tunica interiore coli intestini abrafit vel deterfit. Si vero clyster purgantia, quæ conveniunt, receperit, evacuat quidem bilem & pituitam, & dolores vel cessabunt vel evadent mitiores, plerunque tamen aut redibunt aut exacerbantur.

Recidivæ signum satis certum capere soleo ex molestia quadam seu pondere, quod tamen sine dolore percipiunt ægri, & circa lumbos & per transversam ventris supra umbilicum regionem in-

fra mucronatam cartilagineam. Et major sit hæc gravitas ab assumpto cibo: quia tunc ventriculus distentus à cibo & potu colon intestinum magis premat. His accedit (si æger debitam potus quantitatem observavit) urina rubra, acris à bilis portione per renes una cum urina pertranseunte: quæ interdum tantum ardorem inter mingendum excitat, ut ægri videantur calculo renum magis, quam colico dolore laborare, correspondente huic opinioni dolore alterutrius lumborum, vomituque biliosorum & pituitosorum humorum. Præter hæc sentitur ab ægris oris amaror, sitis, inappetentia, vigiliæ, articularum pulsus, interdum & præcordiorum calor cum febre continua plerunque quotidiana spuria & aliquando duplicis tertianæ nothæ typum observante, quæ nisi præcaveantur, ad tabem ægros & mortem aliquando deducunt, nisi per maturum abscessum materia ad alvum deturbetur. Nonnullis epilepsiæ, catoches, apoplexiæ, motus convulsivæ falsæ paralyse præcedere, sæpissime subsequi consueverunt, eæ nempe in quibus motus aufertur illæso sensu manuum, pedum, brachiorum crurumque, & aliquando alterutrius totiusque lateris. Vidi qui præter oculos & labia oris nil aliud movere potuerunt. In Moravia, Austria, Styria, Carinthia, Pannonia aliisque Germaniæ frigidioribus locis id mali genus post colicos dolores expectatur. Similiter & apud Pictones Gallorum, sed in calidioribus regionibus raro admodum, etiam si Romæ tempore Pauli Æginetæ populatim grassaretur pestilenti modo.

Aliquod tamen obscurum paralyseos prædictæ vestigium in me ipso & aliis ante quinque annos à colicis doloribus Patavii sum expertus, quando epidemii hic erant & vicinis urbibus. Neque enim ambulandi potentia nobis erat prorsus sublata, sed summa quedam difficultas, quæ ægri cruribus insisteret & ea transferre tanquam majori pondere prædicta percipiebatur. Hanc multi tunc temporis in cognitione hujus morbi hallucinantes cibo & potu copiosiore frustra tollere conabantur.

Oritur hæc paralyseos (omitto quidquid alii hæc de re opinati sint) ex bile ex intestinis per arterias ad nervos repente translata, sed quomodo hoc contingat, & per quas arterias, in *epistolis Anatomicis* ex professo docebo.

Nunc ad curationem me confero, quæ debet esse & prudens & diligens. Nam hæc modo longa, modo brevis futura est pro humorum varietate, virium caloris nativi intestinorumque robore & modo curandi. Sed & periculosus est morbus quocumque tempore superveniat, & graves ac periculosas ac diuturnas post se aliquando relinquit repetitiones, nisi radicitus extirpetur. Vidi qui multis remediis frustra tentatis per triennium in lecto continuo decubuerunt, multos per medium annum, quosdam etiam per viginquatuor annos & amplius, cum pro alio morbo curarentur, toto vitæ tempore ex Semitertiana in colicum dolorem transmutata, vel una cum hac incipiente etiam si à febre curati essent, singulis fere mensibus vel annis colicis doloribus miserrime molestatos, quando vina austera & pontica bibissent. Et quanquam aliquibus octuagesimo die à Semitertianæ initio, cum qua dolor colicus invalerat, abscessus in colo

*Causa paralyseos
si hinc dolor
tribus super-
veniat.*

Horum dolorum prognostica.

colo intestino vel mesenterio oborti fuissent, per quos hic morbus perfecte solutus credebatur; tamen colicas repetitiones per mensem intervalla & annorum plerumque supervenisse animadvertimus.

In curatione talibus indicationibus imprimis est satisfaciendum. Si magni sunt dolores, prius mitigandi peculiaribus remediis, materia inflammationis est evacuanda, repellentibus, digerentibus, purgantibus per alvum, acris & pontica obtundenda, crassa attenuanda, viscida ac lenta incidenda ac detergenda, prohibendaque, ne amplius talis generetur, & quæcunque in corporis venis existit similiter educenda est, derivantibus per urinas, revellentibus per cutis totius corporis meatus, ne amplius ad centrum corporis confluant. Sic enim fit, ut hic dolor non facile redeat, aut si redierit, minor quotidie evadat. Si in abscessum inflammatio terminatur fit (ut plerumque in admodum extenuatis ab hoc malo aut diu vexatis) expectari debet quadragesimo die ab initio ejus curatio, quam jam præscribam, raro octuagesimo, vel si una cum Veris duorum priorum ordinum Galeni Semitertianis oborta sit die octuagesimo.

Quoties igitur mitigandus est dolor, toties videndum an una cum Semitertiana inceperit, & jam sit in principio accessit, vel multo post id, tendente ad judicationem vel transmutationem febre. Nam si vires constant & corpus aliquo modo sanguine abundet, initio sanguis ex brachio detrahendus, cucurbitulæ scarificatæ & non scarificatæ artubus adhibendæ, ne major fiat ad intestina humorum fluxus, deinde cucurbita magna super umbilicum affigenda est. Quod si vero tendente ad judicationem tertiana supervenerit, dolor mitigandus omnia venæ sectione, solis cucurbitulis extremis partibus, & una supra umbilicum adhibitis contenti esse debemus, reliquæ adjuvantia interna & externa administranda, quæ ex pharmacia desumuntur.

Plurimos juvit omni tempore potus, qui & olei amygdalarum dulcium uncias tres; melle calabrino uncias duas, vel syrupi rosarum solutivi uncias tres, juris pulsi, in quo flores chamamelis ebullierint unciam unam, vel quantum sufficit ad mannam dissolvendam. Nobilis etiam medicina est, oleum olivarum, quod per multos dies & menses supra infusionem rosarum solutivarum stetit, cum jure vel decocto mercurialis & radicum althææ. Alvum enim per plures dies lubricat & lenit dolores. Sed quia multis aegris solet adesse vomitus vel nausea, ob quam præscripta remedia in ventriculo continere non facile possunt, ideo aliud præscribere consuevi, quod habet decocti stirum chamamelis cum jure carnis vel tenni cerevisia uncias quatuor, specierum dactylini drachmam unam & mediam, butyri recentis uncias duas. Misce & bibat calide & repetat horis febris convenientibus, quousque plurimum sit mitigatus. Cornu cervi usum in tenuissimum pulverem tere, nec aqua rosarum; ut fieri solet, abluatur, dentur hujus drachmæ duæ cum decocto sanigraci, aut aqua cardus benedicti. & pulveris stercoris lupini albi in vesperibus repeti (eligendum præ cæteris, in quo ossa animalis devorata ab hac integra continentur) unciam mediam, mellis quantum sufficit, sicut pilule scrupulis unius pondere. capiat duas vel tres singulis vicibus longe à pastu, mane & vespere. Canis

quoque albi (ossa tantummodo comedentis) stercus eodem modo sumptum optimum est adjuvatorium.

Et intestinum colon lapsi mirabilem edit operationem, si una cum suo stercore exciscentur, in camino suspendatur ut fumo paulatim indurescat; deinde ablato stercore intestina in pulverem redacta drachmæ unius pondere propinentur è jure carnis.

Pulvis ad colicam noxter. & seminis cymini, carvi, salis nitri ana partes æquales, Misce. datur drachma è jure carnis.

Opiata colica nostra, & baccarum juniperi seminiacum, baccarum hedera drachmas tres; seminum anemones, carvi, cymini ana drachmas duas; seminis cymini drachmam unam & mediam; myrrhe drachmam unam; castorei semi-drachmam, vel hujus loco testiculorum equinorum excicatorum drachmam unam; salis nitri, cornu cervi usque tenuissime triti ana drachmam unam & mediam: cineris martiorum erinaceorum usulorum drachmas duas, opii drachmam semis, cum melle despumato fiat opiata. Dosis drachmæ duæ, vel una cum dimidia. Et quamquam pleraque horum calidiora sint, quam ut febricitanti, aut internis inflammationibus tentato convenire videantur, tamen sciendum est, non hisce nos uti oportere, nisi cum admodum urgent dolores, ut iis magis mitigandis sit incumbendum quam febrì propellendæ, quæ plerumque solet ab intestinorum inflammatione non mediocriter fore. Eligenda ex his magis temperata, si Semitertiana biliosa fuerit, sin vero pituitosa, calidiora præferuntur.

Aliquis fortassis posset existimare, his remediis augeri inflammationem, qui eorum caliditatem tantum intuentur. Sed hic scire debent, quadam dirigendo & discutendo plurimum inflammationibus opitulari, & calidos humores ad articulos vel ambitum corporis propellere, quadam per urinas eos derivare; quod cum hactenus Medicorum plerisque latuerit, in causa fuit ut existimarent mirabilem jam quorundam commemoratorum vim experti ad profligandos vel mitigandos colicos hosce dolores, occulta & impercrutabili proprietate id peragere.

Cæterum si dolores sint tolerabiles, qui Semitertianam comitem habent, aut jam mitigati sint, solis clysteribus & externis medicamentis ventri adhibitis curationem absolvo.

Clyster ad colicam mihi familiaris in Semitertiana pituitosa. & hordei pugillum unum, & variorum pasulorum unciam mediam; caricæ pingues duas, pruna quatuor, seminis lini & sanigraci ana unciam mediam: seminis carthami contusi ana drachmas sex; cymini drachmam unam: stirum chamamelis, meliloti ana manipulum unum. Bulliant in aqua sufficienti quantitate ad libram unam, pro unica tantum ebullitione, in fine adde agarici drachmam unam, foliorum senæ unciam mediam, colaturæ adde mellis rosati solutivi uncias quinque, salis nitri scrupulum unum. Misce pro clystere tepide injiciendo, ut diu detineat.

Clyster alius in Semitertiana biliosa. & radicum althææ unciam mediam, foliorum malvæ, parietariæ, mercurialis, violariæ, stirum chamamelis ana manipulum unum; seminis lini & sanigraci ana drachmas duas, bulliant ad libram unam in sero lactis; colaturæ dissolve dactylon unciam mediam, mellis rosati solutivi uncias quatuor; olei violacei uncias tres, stercoris canis albi ossa comedentis

comedentis subtilissime pulverari drachmas duas. Misce pro clystere. Interdum injeci in magnis inflammationibus clysterem ex uncis octo vel decem olei rosati completi & decocti sanuigraci libram mediam cum salis nitri drachma una. Sine ullis purgantibus ac detergentibus; interdum ex puro oleo, aut qui ex lacte & saccharo rubeo paratur cum butyro recenti & albo graco. Et hi clysteres quo diutius in ventre continentur, eo cum majori sanore reddunt excrementa.

Externa.
Cataplasma.

Exterius applicandum toti ventri calidum cataplasma ex panis macerato in lacte recenti multo, cum oleo rosato, atque in suo calore per horas viginti-quatuor est conservandum: vel fiat cataplasma ex farina seminis lini in decocto radicum althæe cum butyro recenti, addito pulvere cymini & oleo rosato. Quæ præsentente biliola febre sunt adhibenda. Saepè vidi ab his applicatis alvum lubricam redditam fuisse humoreque concoctos à natura excludos. In simplici Semitertiana & pituitosiore fomentum præstantissimum, quod & lumbis dolentibus adhibetur. *℞* florum chamamelis, meliloti, foliorum trifolii aut huius loco florum feni ana manipulum unum, furfurum tritici manipulos tres; seminis lini & sanuigraci ana unciam unam; seminis carvi, cymini, ana unciam mediam. Misce. ponantur in sacculis ex tenui linteo factis filo interfundis & ea magnitudine, qua ventrem & lumbos tegere queant, hi in cerevisia calefacta vel decocto radicum, althæe, foliorum malvæ & florum chamamelis calido exprimendi, & ut singulis horæ quadrantibus quando refrigerati sunt, mutari queant quatuor habeantur aut ad minus duo, si venter tantum solus sine lumbis venit fovendus. Quibusdam nimis graves hi sacculi videntur, ideo loco horum spongiis fovendus est locus in decocto calido herbarum omnium, quæ sacculos ingrediebantur, expressis aut madefactis.

Fomentum.

Ol. Cyclaminis
magis preparatum.

Potest etiam fieri fomentum cum Lana succida oleo rosato & vino simul calefactis & mixtis. Vngatur deinde venter oleo cyclaminis, quod hunc in modum parare solco, valet etiam plurimum ad sedandos dolores pleuriticorum. *℞* florum cyclaminis recentium libras quatuor; olei communis libras duas: bulliant per horas tres in olla munda, donec comburantur florum duæ libræ, sic oleum nigrum apparebit inde forti facta expressione, alia florum libra in eodem oleo per tres horas coquantur, & postea facta forti expressione, oleo residuo iterum tertio una libra florum sic incoquantur, expressum tandem servetur ad usum. Tota regio umbilicalis hoc oleo perungatur supposita charta cærulea bibula. Valet & oleum carvi arte chymica destillatum, ita ut leviter umbilicus & partes ei vicinæ inungantur.

Intestinum lupi instar cinguli circumligatum ventri, nobile est remedium. Atque hæc omnia præsentente Semitertiana possunt adhiberi ad dolores mitigandos.

Quod si post Semitertianam relicti fuerint colici paroxysmi, qui agrum multo tempore torserunt aut torquent, ii quidem qui adhuc recentes sunt, plerumque citius solvuntur: qui vero jam aliquamdiu hominem per intervalla affligerunt, & ad maciem ac tabem deduxerunt, debilitatis jam viribus & paralyti præsentente, tardius & magno labore tolluntur: interdum vero lethales sunt & neutiquam curandi. Nam bilis jam crassifaccta ægre medicamentis & præparatur & expurgatur.

Et vires difficulter convenienti cibo recreantur: quia calor natus viscerum interventium nutritioni languet, & qui concoctus est propter menterii obstructions, quæ tabidis jam ad marasmodum ductis adesse consueverunt, propter abscissus induratos circa venas & arterias mesenterias hæret. Verum comperi in hujus colici curatione majorem difficultatem curandi, quam quo tempore Semitertiana esset conjunctus. Nam tunc ratione febris optima instituitur victus ratio, etiam ad hunc pellendum, refrigerans scilicet & humectans, attenuans, incidens atque detergens. Sed in hoc ejusmodi victus solet agris & multis astantibus, imo plerisque etiam Medicis esse suspectus, credentibus dolores esse ventriculi imbecillis à prægresso tenuiori cibo, & refrigerati ab aquæ copia hausta in Semitertiana. Quare persuadent Medicis ut vinum concedant & cibos calidos aromaticis conditos, & quia debiliores sunt, pleniorrem longe quam antea victum, five quotidiana jam facta sit, aut alia quævis febris lenta quotidie se circa vespem exacerbans, qualis hunc dolorem colicum solet sæpe concomitari; five duplex tertiana facta sit, seu quartana, quam post annum & amplius critice plerumque solvi per colicos dolores sæpissime vidimus, (cum tamen aliæ quartanæ, quæ per se oriuntur aut ex duplici quartana per alios modos plerumque solvantur) unde postmodum contingit hos agros non sanari, sed diu marcore paulatim consumptos à vita discedere. Purgantia medicamenta disuasi, & quod si forte præbeantur quæ sunt optima, quia tamen interdum possibile est colici doloris recidivas prohibere, & quia ignorant motus esse colicos, ut & tertio quoque die & quarto, & singulis diebus sole occidente gravius affligant, putant statim astantes Medico curativas indicationes mutandas esse. His molestiis & veræ curationis impeditis obviam ivi solis prædictionibus. Nam & colicos futuros multo antea tempore cum prædixissemus, & jam præsententes quem typum servarent, etiam si optima quæque ex arte & usu essent à me præscripta ad morbum expellendum, me cum typum non possem vincere, effecturum tamen, ut quotidie evadant minores paroxysmi, aut si tertio quoque die exacerbarentur, facturum me ut mitiores quam antea alternis diebus fiant, aut cum recidivæ plurium dierum erant expectandæ mitiores fore recidivas, non modo mihi magnam fidem apud agros pepere, sed in neminem incidi qui meis remediis ac methodo curandi apud maxime barbaras nationes non diligenter servarent, & tandem spacio quadraginta dierum ab omni recidiva liberaretur, quem curaturum me speraveram.

Præscribebam prius victum talem, aquam hordei ^{Potus ordinarius.} ^{Cibus.} magistrali pro potu. In prandio paucam jure carnis madefactum cum modica carne vitulina elixa, vel caponis, gallinæ, pipionis. Cum hac lactucam coquebam, interdum pruna damascena. Vespere cremoris hordei libram mediam cum modico saccharo & pulvisillo cinnamomi, addebam aliquando duas uncias emulsionis seminum melonum facta cum aqua hordei magistrali, & hunc declinante febre noctu porrigebam. Quod si esset brevis ejus paroxysmus addebam ovum forbile. Si parva febris & symptomata à colica indispotione, coquebam ovum forbile in aqua

aqua & cum panis modico comedendum dabam. Interdum duo ova sorbilia in aqua fervida rupta coquebantur quousque albumen esset coctum molli permanente vitello, hæc cum pane modico & eodem jure, in quo ova erant cocta addito butyro recenti agro porrigebam. Si quando colici paroxyfui iniegebant, eos mitigabam externis & internis præfidiis jam supra enumeratis, ubi mitiores videbantur purgabam corpus per epicrasim alternis diebus aut quarto quoque die dieprunon solutivum, electuario è succo rosarum, diacatholon, si in bolo medicamentum volebant. Si vero potum expetebant uno ex iis medicamentis, quæ *agaricum & sennam* recipiunt, quæ libro superiori ad purgandos Semiteretianos scripsi.

Vt autem una à doloribus colicis quantopere fieri poterat, præfervarentur, aut quando hi vitari non poterant, mitiores brevioresque redderentur, & sine tabe ac paralyfi abirent præ cæteris hunc potum commendabam. *Pruna damascena duo, urinarum passularum drachmas tres, radicem polypodii unciam semis, herbarum agrimonie, capilli veneris, fumarie, cichorei, sonchi, dentis leonis, buglosse singulorum pugillum medium, feminis carthami consuli unciam unam, bulliant ad uncias quatuor, colature infunde per noctem solutorum sennæ drachmas tres, agarici trochiscati in petia ligati drachmam unam vel scrupulos quatuor, storum cordialium pugillum unum, solutorum malvæ (ad tormina mitiganda, quæ folia sennæ excitant) pugillum unum, croci (ingreditur & hoc ipsum omne medicamentum, quod sedat dolorem) grana duo, fiat expressio, eique adde mellis rosati solutivi uncias duas, mannæ unciam unam, ut citius descendat. Dabam aliquando & hunc potum sine manna vel syrupo rosato mane; sed vespere horis duabus ante cenam injici curabam clysterem ex herbis emollientibus & anodynis, in quarum decocto sub finem, quod reliquum erat ex apozemate laxativo præscripto, injicere jubebam & fieri unicam levem ebullitionem, ut quidquid esset residui purgantis in *agarico & senna* clysteri communicaretur, & sic crassos humores ad colon lapsos, si forte & ob vim debilem assumpti mane purgantis apozematis de suo loco non moverentur & per alvum excluderentur, commode educeret. Quod si aderat metus futuræ alicujus paralyseos, pulveris *castorei drachmam unam* addebam. Diebus autem intermediis, quibus non sumebat hoc aut ei simile aliquod purgans medicamentum, dabam duas uncias *syrupi diascereos* ex descriptione Andernaci, aut jusculum pulli non salitum alteratum cum omnibus herbis apozema purgantibus, ac laxantibus & eorum correctivis. Mirabiliter multos juvit *pulveris elefcos* drachma una & media, vel duæ cum jure alterato propinando summo mane. Dedi etiam cum maxime fructu *pulverem Comitæ de Harwich*, cujus dimidia drachma adultis semel tantum porrecta sex horis ante prandium vel ante cenam horis quatuor aliquando repetita cum jure prunorum vel carnis simplicis recidivas in totum profigavit, plerunque sic mitigavit ut minores & rariores postmodum reverterentur, levique negotio eodem vel alio pulvere in totum tollerentur.*

Ab *hieræ simplicis* vel *diacolocynthidos* abstinendum semper, quod animadverti ab aloe humores accendi & dolores exacerbari: Maxime quando in colo in-

testino præcipuus est dolor. Venas enim ejus intestini dilatando novum humorum affluxum procreat.

Cætera quoque multa purgantia medicamenta valida, quæ colocynthidem (nisi magna pituita copia intestinorum internam cavitatem aut vasa melaica obsederit) vel *helleborum* vel *scammonium* non castigatum ut in pulvere elefcos, vel Comitæ de Harwich, hic valde suspecta esse debent, quod ad locum affectum à toto corpore trahant humores, & sic magis intestina inflamment, ideoque longe molestius purgent, & ægrius quam blande purgantia attractos humores educant. Multos novi in Germania & Pannonia, qui ex præscripto familiarium Medicorum assumebant valde purgantia medicamenta, & ut medicamenta probe suo officio fungerentur, in duplici ut appellant, imo quandoque triplici dosi; hos tandem ego accersitus non sine omnium qui tunc aderant admiratione simplici commemorato apozemate vel diaprurnum solutivum cum manna copiosissime purgabam. Atque ex hoc cognoscebam, imo non falso prædicebam multos dolores colicos instantes nisi præcaveantur, vel eos antea fuisse. Quod si aliquando contingat propter penuriam lenientium & blandorum purgantium ad fortiora nos cogi, præmunenda sunt prius die antecedenti exterius fomentis, cataplasmatis commemoratis refrigerantibus, humectantibus & anodynis ac concoquentibus intestina, & ordinaria dosi, hoc est, simplici medicamenta præscribenda sunt. Sic enim & hæc fortia longe melius & tutius opus suum abfolvent. Aut balneis prius corpus præparetur ex aqua fluminis calefacta & alterata radice *albiæ*, foliis *malvæ*, *parietariæ*, *violariæ*, floribus *chememelii* & *meliloti*, lotis præterea *sylvestris*, *medicæ*, *trifolii pratensis*, floribus *sani qui in stabulis equorum solent reperiri*, aut in alveo in quo ponitur fœnum quod equi comedunt aut boves.

Hæc eadem balnea quotiescunque sæviunt dolores colici, magno sunt auxilio, uti & illud quod ex mero oleo paratur, & aliud quod ex aqua fluminis fit calefacta candefactis igne filicibus, quæ omnia ad dolores præcavendos iis diebus, quibus sumit juscula alterata vel vacat à purgationibus solent adhiberi, intermittente vel inclinante febris si adsit (dummodo vacet à Semiteretiana) paroxyfmo horis duabus ante cibum. In Labro vel Semiscupio debet per horam desidere, quod in se tantum aquæ vel etiam olei contineat, quantum ad mammas usque sedenti potest pervenire. Perpurgato corpore sic ut maxima pravorum humorum copia educta esse videatur, etiam dolorum ac recidivarum metus quasi in totum sublati sint, intestina ne facile iterum ejusmodi fluxiones fulciant, corroborari debent. Conferet in hunc finem potus aquæ Tetutianæ in agro Pistoriensis aut aliæ aquæ thermæ sulphurææ & nitrosæ, quæ per alvum magna ex parte ducuntur; in Germania præstantissimæ sunt acidulæ, maxime quæ prope Francofurtum ad Mœnum scaturiunt, & illas in Gallia, quæ sunt prope Aquas mortis præstantissimas deprehendi. Apud Bigerones ut audio, & Nivernenses, Pugnenses, Causeses & in Perinæis montibus tales extant.

Rupispozæi fontes maxime pro hoc malo commendantur;

Car & cætera
valida pur-
gantia.

Balnea.

Aqua ther-
malis.

Macro-
syrubacem-
se, & alia.

mendantur. Singularum aquarum modum peculiarem per os assumendi petere oportet à Medicis, qui prope ea loca habitant, & hisce aquis frequenter utuntur.

Ufus aquæ Tetutianæ.

Ego in Italia aquam Tetutianam hoc ordine propinare consuevi ad hunc affectum. Primo die duas hujus aquæ libras porrigo parum calefactæ, secundo duas libras cum dimidia, tertio tres, quarto mediam adhuc libram addo, quinto aliam dimidiam. Sic quando ad quatuor aut ad summum quinque libras pervenerim (nonquam enim hanc dosim transcendi) paulatim iterum diminuo quotidie dosim, quousque ad duas libras perveni, tum ab ejus usu desisto, qui ad decem vel duodecim ad summum dies perdurare consuevit.

Quod si ad tres septimanas aut sexdecim dies continuare potum hujus aquæ expedierit, tunc quando ad summam dosim perventum, in ea persistendum per quatuor vel quinque dies, & sic rursus paulatim declinata quotidie dosi finem facere.

Primo die præbeo simplicem: quod si non moveat alvum, postero die vel tertio, & sic alternis diebus continuando in primo cyatho dissolvo *unciam unam mannae vel mellis rosati solutivi uncias duas*: ut enim fiat dejectoria, magis laudo quam ut per urinas transeat, venas enim ac jecur accendere consuevit. Tota aquæ quantitas quotidie summo mane ebibenda est quinque horis ante prandium & una hora inter bibendum absumenda. Itaque ubi ager surrexit ac lavit sese, obambulabit parum, mox sumet primum cyathum, qui mediam plus minus libram capiat, & ubi hæc descenderit rursus paulatim obambulando, ut ventriculum pertranseat, alium cyathum haurire debet, & sic horam, nec plus nec minus in præscripta aquæ quantitate ut dixi consumere.

Moderatius utendum aquâ acidulâ in Germania.

Aquas acidulas in Germania alio modo præbent Medici. Nam ab uno tantum cyatho incipiunt, & paulatim quotidie uno cyatho augentes aquæ ebibendæ quantitatem ad quindecim & viginti cyathos ascendunt, inde rursus descendunt, quotidie unum cyathum diminuunt donec ad unum pervenerint, tum desistunt, atque sic dies triginta & quadraginta infumunt in potu acidularum. Quod si forte in primis diebus observant, quando ad aliquam dosim aquæ ebibendæ notabilem pervenerint, neque per alvum neque per urinas aquam transire, paulatim diminuunt dosim uno cyatho desistunt, nullo medicamento neque dejectorio neque diuretico adjuvantes aquæ transitum vel per alvum vel per urinas. Esset tamen longe conducibilis, ut statim à notabili aliqua quantitate inciperent, scilicet una libra vel altera, & sic citius curationem absolvent, efficientes aquam modo dejectoriam cum *manna una vel altera uncia*, vel duabus *syrupi rosati solutivi*, vel media *urcia electuarii lenitivi* factò bolo & deglutito sine nebulis media hora antequam primum aquæ thermalis cyathum hauriat, modo diureticam immiscendo primo cyatho uncias duas *emulsionis seminum melonum factæ cum aqua fragariæ*. Aquæ enim hæc et si per venas transeunt, eas tamen non calefaciunt, sed potius refrigerant præcalesfactas ac roborant.

Post potum aquarum thermalium balneis esse utendum.

Ab aquarum thermalium potu utendum est balneis aquarum thermalium ut in Patavino agro

D. Petri & Aponensium, vel Lutis thermalibus ventri admotis per horam quotidie semel aut bis in die horis tribus ante prandium & cenam.

Commendo hic Luta D. Petri in agro Patavino, vel Montis Ortoni, vel Borbonensium in Gallia, D. Sebastiani in Paannonia. Debent hæc Luta esse modice calefacta vel à sole vel ab igne, vel proprio calore sulphureo loci unde extrahuntur. Abstergo ventre cum aqua thermali à luto detracto unctio fieri debet oleo vulpino toti ventri superligata stuppa cannabina. Eodem etiam oleo membræ paralytica innungantur.

C A P. XIV.

De spurio dolore Colico.

Dolor colicus spurius interdum ex Semitertia tendente ad judicationem nonnunquam provenit. Diciturque spurius, quoniam neque in ventris *mefericis intestinorum*, neque in substantia, multo minus in cavitate, sed in partibus intestinis vicinis, aut circumstante cavitate doloris causam habeat; fallatque Medicos, quod eo fere modo ac ordine agrum cruciet ac eo loco, quo dolores colici veri circa ventrem.

Sed tamen differre nonnihil mihi loco inter se verus & spurius dolor colicus videntur. Nam spurius infra umbilicum inferiorem abdominis partem vel imum ventrem occupat; verus autem eam, quæ supra & circa umbilicum est, aut totum ventrem. Continuus hic spurius mihi semper comparuit, sed circa vesperam crudelius agrum affligens, & quandoque alternis diebus, uno levius altero gravius. Quartanas non secus ac quotidianas & tertianas diuturnas ex Semitertia productas hoc malo finisse certis circuitibus, parique accessum ordine.

Materia biliosa acris fervida non expers (ut opinor) alicujus pontici, & ut plurimum purulenta est caula proxima hujus affectus. Hæc quo loco consistat, scire perquam difficile est. Quod enim neque in intestinorum cavitate, neque in earum venis mefericis consistat aut substantia, indicat curatio, quia neque per clysteres, neque per medicamenta purgantia vel alterius generis per os assumpta mitigari unquam possunt. Iam diu opinatus fui intra peritonæum & musculos abdominis, vel intra tendines obliquorum descendentium & quatuor corporis integumenta his substrata consistere, sed quoniam neque fomentis, neque emplastris, aut inunctionibus ad colicos dolores & alios mitigandos accommodatis leniri animadvertēbam, & circa locum vesicæ dolores (qui neque ad tactum exacerbantur, neque tumorem supra suum locum monstrabant) plerumque consistere, eam interdum sic affligere ut difficulter reddatur urina, stranguriam aliquando obortam, purulentæque materiæ per urinas excretionem per multos dies perseverantem, postquam dolor terminabatur, non potui alium materiæ locum invenire quam cavitatis abdominis illam partem, quæ est prope vesicam, hoc est, inter peritonæum & vesicam atque intestina vesicæ adjacentia.

Confirmavit hanc meam opinionem nuperime casus cujusdam juvenis civis Patavini vulnerati sclopeto circa spinam mediæ lumborum vertebræ, & exeunte globo post transversos processus vertebrae

Vnde dicitur spurius.

Quomodo a vero differat.

Materia biliosa.

História.

vertebrae ruptos trium digitorum spacio à latere umbilici per ventrem : quo loco cum consisteret sub communibus quatuor integumentis , à me excisus fuit. Transactis viginti diebus cum per venteris foramen posterius magna puris copia exiret quotidie , per anteriorem vero nil prorsus ex abdomine exiret , collecta materiae purulentae portio circum omentum ad vesicam descendit & dolores colicos spurios excitavit , qui reddito plurimo pure per vesicam una cum urina modo cessabant , modo mitiores evadabant , & interdum urinarum meatum dolore inter mingendum insigni affligebant. Quapropter exilitandum etiam est in febre Semitertiana vel aliis ab hac ortis , & quae ejusmodi dolores colicos (spurios faciunt , abscessus aliquos in abditis locis latentes ut in omento vel mesenterio tandem perruptos deponere materiam purulentam in abdominis cavitatem , & sic eam paulatim subsidere versus ossa pubis immumque ventrem.

Et quoniam quaerit exitum per partes sensiles , quales sunt vesica , & intestina , idcirco illorum locorum continui solutionem solvi , transmeareque per poros substantia vesicae in ejus cavitatem potius , quam per ramos iliacos , propterea quod hi undique pinguedine & membranis sunt plurimum tectae.

Curatio hujus doloris est colici veri curatione difficilior & plerumque longior. Nam omnia fere externa internaque remedia , quae ad colicos praescripsimus , spernit ; & quadragesimo die plerumque sponte solutam vidi per purulentas mictiones , non admodum congrua observata victus ratione , praeterquam abstinentia vini. Comedebant enim pisces loco carnis , quam ob febris Semitertianae & aliarum diuturnitatem abhorrebant. Erant tamen pisces facili digestibiles , ut Lucius , Cyprianus , & Mulus. Prodest hic venae sectio in talo , aut scarificatione , cucurbitulae utrique cruri adhibita sine etiam scarificatione. Nam quamvis haec remedia chirurgica materiam non evacuent , quae inter peritonaeum & intestina vesicamque continetur , tamen urinae difficultatibus & phlogosi vesicae ac partium circumstantium , ob quam dolores graviores fiunt , plurimum opitulantur. Quidam ex consilio barbitonensis in Germania balneo aquae fluvialis , in qua florum chamemeli & cretioneis (nasturtium aquaticum vocant) aliquot manipuli antea incocti erant hunc affectum sustulit. Omnia quae per os assumuntur diuretica , non purgantia esse debent (nisi forte propter insignem corporis adhuc relictam cacochymiam , pulvere Comitidis de Harwich , vel speciebus electis uti luberet) quod materiam per intestina aegre , per vesicam facilius detrudat natura , quae in hoc opere est adjuvanda. Quapropter laudo juscula alterata cum vincaperunica , perichymeno , fragaria , agrimonia , pimpinella , equisetio , nasturtio aquatico. Praebeat in jure pulli galinacei feminis erysimi pulverati drachma , aut cum syrupo de duabus radicibus , & malva vel e capillo veneris fiat electuarium. Inungatur imus venter oleo vulpino , cui olei cymini per cymium desillati aliquot guttae sint admixtae , vel tertia pars olei de scorpiombus. Prodest & oleum de scorpiombus per se , & quod ex cyclaminis fit floribus. Sacculus praeterea ventri adhibitus ex sale , surfuribus , milio , lini semine cum semine

carvi calefactis , & cataplasma ex parietaria & nasturtii foliis cum capsa cocta , addito modico oleo chamemelino vel de scorpiombus.

C A P. X V.

De Recidivis.

Quantopere recidivae sint in Semitertiana metuendae , si non fiat in aliam febrem vel morbum transmutatio , secundo libro diximus , in hujus sine subnectemus modum , quo sunt à Medico tractandae , si prius de causis nonnulla fuero praefatus. Omnes enim fere in ea versantur opinione , recidivas fieri à generatione novae materiae morbificae , quod falsum est. Nam illi qui non praebuerunt occasionem per externas & internas causas generandi materiam novam , ut per errores in victu , nihilominus in recidivas incidunt , quamvis haec sint minores quam illae , quae post errores in victu vel alias causas externas succedunt.

Quapropter censendum est has provenire à relictis cruda vel non integre concocta , sed ex parte tantum causa morbifica : verissimumque esse aphorismum Hippocratis , in quo inquit , quae relinquuntur in morbis nempe cruda recidivas facere. Sed quomodo haec generentur per proprietatem materiae morbificae non concoctae , quae singulis annis pro caeli constitutione & varietate temporum anni variare sic solent , ut modo ter invadant , modo bis , modo quater & saepius , modo per paucos paroxysmos , modo per longos , aliquando per quotidianas , saepe per duplices tertianas , id apto exemplo declarabo per bubones venereos , tanquam affectus externos , quos saepe hoc tempore hic videmus ortos ex sanguine , bile & pituita. In his enim difficilis est suppuratio. Itaque primis sex aut septem diebus febrem accersunt cum horrore vel frigore. Deinde haec indies invalescit una cum inflammatione concomitantibus signis & accidentibus , postmodum his decrecentibus diminuitur & intermitit integre ac perfecte. Inde rursus febris invalescit cum signis suppurationis jam secunda vice à natura tentata , tum iterum secundo & febris & inflammationis accidentia abeunt ; manent tamen durities & tumor in inguine tanquam materia morbifica relictas. Itaque & tertio & quarto quasi quasdam paroxysmos natura aggreditur inceptam suppurationem , quam tandem si vincat ad suppurationem perducit ; si vero succumbat , transmutatur materia abscessus qui expectabatur in aliam materiam & alium tumorem , vel evanescit atque discutitur. Eodem plane modo contingit etiam in Semitertiana , ut materia febris certis periodis in vasis vel visceribus contenta nullos de se producat vapores putridos , qui cor molestant & accendant , rursus alio tempore eos producat , deinde delitescat , donec iterum novus calor ex putredine suscitetur , qui irritet naturam ad expulsionem vel concoctionem per affluxum sanguinis & bilis. Ideo concocta jam materia in Semitertiana nullae recidivae sunt expectandae ; veluti pure facto nulla febris recidiva est metuenda in abscessibus inguinum difficulter ad suppurationem venientibus , sive si pus expulsum , sive adhuc in proprio spacio conclusum.

Quamobrem ut ad recidivarum curationem

H

veniam,

Vnde fiant
recidivae.Quomodo
causa illa
relinquatur in
morbis.

Curatio.

Curatio.

Curatio.

Potion.

veniam, diebus quibus æger vacat à febre, victus ratio convenit sanorum similis, ita tamen ut à vino abstineat, & ejus loco aqua hordei magistrali fruatur: aut in fine cibi ossiam è vino maturo sumat, modicum vini superbibendo.

Cibus.

Cibus sit facilis digestionis & boni nutrimenti, attenuans, detergens, & qui quam minimum calefaciat.

Solent ægri statim à febre cum liberati esse videntur insigni fame premi. Itaque curandum est ne nimio potu aut cibo se impleant, à quo postmodum & inappetentia procedat & virium prostratio, quæ propter futuras recidivas hic confervandæ, imò augendæ sunt.

Alvus alternis diebus clystere eluatur purgante, & ex iis composito quæ ad dolores colicos propositimus, ut sic iis prospiciamus in tempore, & insignes viscerum obstructions atque apostemata interna quantum fieri potest præcaveamus. Vbi

jam febris rediit, rursus ad præscripta huic febri remedia erit redeundum, ita tamen ut diligenter advertatur, an nonnihil à pristina natura Semitertiana decesserit, nec ne: Nam prout magis vel minus recessit, pro eo & victus ratio & alia præsidia pharmaceutica erunt mutanda.

Si mitis facta est, & sit Semitertiana quarti generis intermittens, vel duplex tertiana spuria, non admodum acutis morbis vel symptomatibus concomitata, nil æque prodesse animadverti, quam decoctum salsa & china cum cichorio alteratum, & datum quotidie ante accessiones. Stragulis prius ægro superpositis, ut si fieri potest sine ulla violentia sudor promoveatur: qui si non primis diebus, saltem sequentibus paulatim prodire consuevit, alternis diebus injecto clystere. Sic sensim digeritur febris Semitertianæ aut quartanæ, tertianæque duplicis vel simplicis diuturnæ, quotidianæ ex hac genitæ diuturnæ & molestissima recidiva.

FINIS LIBRI QVARTI.



Ad Perillustrem & Excellentissimum

D. ADRIANVM SPIGELIVM,

in Patavino gymnasio Professore Anatomicum
Chirurgumque primarium,

ANTONII SABADINI

Observatio Medica.



Reverendissimus Pater D. Flavius à Padua Abbas meritisimus S. Mariae Pratalee, temperamenti calidi & humidis, corporis quadrati, pulchroque colore dotatus, magna suae vitae parie delicata victus ratione usus, vniuersisque vinofloribus ac meracioribus summo opere dectus, nunc suae aetatis quinquagesimum sextum agens annum, die septima Octobris extra monasterium animi oblectandi gratia cum sese contulisset, hora diei vigesima prima quadam membrorum frigoris sensatione correptus de febre dubitans sine cena decubuit: quatuor post horas calor febrilis irruit, qui ad sextam horam noctis usque manifeste perduravit: noctis reliquo satis commodè quieuit. Surgente sole curru Pratalem venit, tota die liber à febre: in prandio usus est panatella & ovo forbiti, & vini oligophori modico. Simili cibo cenam gessit. Tertia die hora decima quinta, iterum frigore, sed potius ut dicebat, tremore hypochondriorum correptus, bilem citrinam tenuem evomuit, pulsus concentratus cum anxietate lumborum, ac crurum dolore acerrimo, symptomata usu epicerausticorum, & accedente paroxysmi statu remiserunt hora vigesima prima, qua hora ius alteratum cichorei, borraginis, endiviae, acetosae, seminum citri bibit, accedente declinatione hora noctis secunda cenavit panatellam cum emulsione seminum melonum & ptisanam hordeaceam, & parum juris alterati destillati: nocte quieuit. Quarta die accepit medicamentum ex syrupo rosati solutivi uncis tribus, mellis rosati solutivi, mannae electae ana uncia una, decoctionis cichorei, endiviae, acetosae, seminum citri quantum sufficit. Multas sedes habuit biliosas, flavas, spumosas, graveolentes. Sine febre tota quarta fuit isdem alimentis nutritus: noctem inquietam transiit: ante diem accepit ius alteratum cum ovi vitello. Morbi quinta die hora decima quinta irruit iterum febris isdem ac intensioribus symptomatis, qua minime topicis cedentia ad vigesima primam perdurarunt: ius solutum accepit, & tertia noctis hora cenavit. Nox quieta fuit. Sexta morbi die curru accessit monasterium S. Iustinae de Padua: & cum aliquantulum in cubili requievisset, sine ulla lectionis sensu ex itinere, Perillustri & Excellentissimo D. D. Eques Antonius Niger accessit, qui pulsum tangens intermittemem esse febrem affirmavit.

Quotidie ab epoto leniente habuit sedes biliosas: eadem die hora decima sexta salvatella dextra manus scilla fuit: sanguinisque uncias quatuor circiter extraximus: ad vesperam usque bene habuit, qua hora Excellentissimi D. D. Niger, Sylvaticus, Sala, pulsum aequaliter celerrimè invenerunt. Noctem quietam habuit. Septima die hora

decima sexta accessio irruit isdem symptomatis, gravioribusque: maxime vero lumborum dolor urgebat, & anxietas. Excellentissimi praesentes vomitoria propinarunt ex oleo amygdalarum dulcium, aqua cordiali, & syrupo acetoso simplici: non evomuit: in accessione surrexit ad alvum exonerandam, correptus est symptomate convulsivo oculorum ac manuum: vi deperitatus in lectum mortuus est: urina semper tenues cum suspensis dirulsis fuerunt. Secto cadavere, quod multa pinguedine repletum erat, ventriculus & orificium inferius inflammatione atrii coloris in tunica interiori laborabat: cordis ventriculus dexter multo sanguine melancholico repletus (mortis immediata meo iudicio causa) lienis tota substantia (mirabile ac novum visum) fusa liquataque in sua tunica tanquam in vesica continebatur, vena arteriaque omnino deperdita: ramus vero splenicus multo limoso ac retro sanguine plenus: reliquae vero partes, quas quidem vidi, omnino suam naturam servabant: jecur incolome cum colore, tum substantia: cystis fellis parum mutata in magnitudine: sed parvi id momenti.

Hac sunt, quae mihi dicenda erant, ut voluntati tuae satisfacerem. Quae si non eo ordine ac methodo declarata fuere, ut res postulat, indulge tantillum juvenili meae aetatis ac ingenii tenuitati. Quod si autem ejusmodi historiam unquam alias tibi videre aut diligentius considerare contigeris, roga te atque obsecro, ut infra scripta dubia mihi enodes, cum summo opere mentem meam agitent.

Primum. Quare intermittens tertiana febris quarta accessione hominem jugulet, cum Hippocrates lib. iv, Aphor. xliii contrarium doceat.

Secundum. Quomodo possit dari febris tertiana sine jecoris affectione, quod aperte repugnat doctrinae Galeni lib. i ad Glanconem.

Tertium. Cur potius in tanta affectione lienis non sit orta quartana, quam tertiana, cum Galenus eodem libro hoc idem asserat.

Quartum. Unde lien receperit illam colliquationem. Circa quod mea opinio est, quia jecur optimo temperamento erat constitutum: & sortem expultricem habebat: cujus indicium erant multae urinae, albae, tenues, quae erant partes tenues vini: pars autem crassa ab ipso jecore transmittetur ad lienem, qua ibi immorante sua viscositate, ac calore fusionem hanc humorum & totius substantiae produxit. Mihi summo opere gratum erit ex te scire horum dubiorum explanationem. Et si aliquid aliud à me quod possim, cupis, impera & inserviam tui commodis libenter. Vale & me tui amantissimum ac observantissimum discipulum semper habe.

Die decima octava Mensis Octobris, anno millesimo sexcentesimo vigesimo primo. Pratalla.

H a

A N T O -

ANTONIO SABADINO

fuo, medico Excellenti

ADRIANVS SPIGELIVS

S. P. D.



Aximas tibi gratias ago, mi Sabadine, quod nulla interposita mora historiam Reverendissimi Abbatis Prataleæ Flavii Patavini ad me miseris. Metuendum enim erat, ne si in aliud tempus prorogasses, scribere ea quæ tibi mihiq; maxime notatu digna videbantur propter occupationes varias è mente exciderent. In fine historię quatuor quasita mihi proposuisti. Singulis eo ordine, quo proponis, respondebo tibi, si prius de morbi natura, quo hic Reverendissimus Pater extinctus est, quid ipse sentiam aperuerim.

Nam tertianam dicis esse simplicem; ego vero unam ex compositis Galeni, quam ipse quidem Hemitritæam vocat, ego vero in libro de Semitertiana Hemitritæam primi ordinis Galeni, ad differentiam alterius apud eundem Galenum, quæ est secundæ ordinis. Barbari Hemitritæam minoris famæ hanc vocant, constantem nempe ex continua quotidiana & tertiana intermittente. Hanc spuriam, nempe biliosam fuisse arbitror, atque malignam seu pestilentem. Quod enim non fuerit tertiana simplex, patet ex typo ejus, quem hæc febris habuit. Neque enim invasit cum rigore, neque integre paroxysmus terminatus fuit cum sudore, neque diebus paribus omnino à febre liber fuit, ut quarta & sexta: at secunda tantum liberum à febre ponis. Quod vero fuerit Semitertiana primi ordinis Galeni, significare tibi possunt notæ tertianæ intermittētis, quæ solent ei adesse, quæ cum quotidiana vel continua, vel intermittente implicari consuevit: imprimis horror, quem ego intelligo per hæc tua verba, quæ scribis, primo die paroxysmi hora vigesima prima quadam membrorum frigoris sensatione correptus de febre dubitans, sine causa decubuit: quatuor post horas calor febrilis invasit. Sane in secundo paroxysmo hunc horrorem statuis & majorem. Tertia die, inquis, hora decimaquinta iterum frigore, sed potius ut dicebat tremore hypochondriorum correptus bilem citrinam tenuem evomuit. Et rursus quinta die narras eandem febrem invasisse tertio majoribus symptomatibus præscriptis, & aliis: & septima die eadem hora quartum paroxysmum supervenisse longe adhuc sævioribus accidentibus. Frigoris enim nomine hic abusus es pro horrore, ut & nos aliquando solemus vulgi sermonem sequentes. Sed cum frigore quotidiana invadit, non tertiana. Iam vero cum nullius quoque sudoris in fine paroxysmi seu declinatione mentionem facias, quid aliud videris confirmare, quam hanc tertianam esse ex earum genere, quæ aut præfagire solent Hemitritæam, aut esse præsentem. Et enim duo hic abs te notari velim. Primum est, quod in hac febre Hemitritæa modo habetur tertiana, quæ cum sudoribus declinat; sed tamen ad

integritatem non transit, si continua ipsi adfuerit, & id primis tantum paroxysmis; modo vero ne vestigium ullum sudoris monstrat ullo tempore declinationis, nisi forte ultimis paroxysmis aliquando, cum est abitura, quod raro contingit & nisi iis annis, in quibus anni tempora servant naturalem suam constitutionem; quia ut plurimum recidivas faciunt aut imperfectas crises, mutationem in alios morbos graves aut febres. Sudores enim critici, qui in simplicis tertianæ singulis paroxysmis comparent, in Hemitritæa neque tam copiosi sunt, neque adeo tenues, ut in simplici tertiana, sed viscidiores, crassiores, interdum & graveolentes, præcipue in primis paroxysmis comparent: sunt deinde & in minori copia, quam in simplici tertiana, tardiusque prodeunt, nec semper per totum corpus. Pectus enim & caput tantum sudore madefacta non semel vidimus; interdum & ventrem; artus vero nequaquam. Aliquando tantum caput, quod longum morbum & periculosum (etsi nulla symptomata prava adfuerint initio Hemitritæi) propter varias recidivas & morbi huius in alios graves & periculosos transmutationem denunciat. Porro sudoris in hac febre, aut nullius, aut tardi, aut viscidi, & per totum corpus, vel non diffusi causa est quotidianæ instantis præsentive putredo, cujus calor præter naturam omnem conatum naturæ aut prorsus impedit, aut debiliorem reddit.

Alterum deinde nota, nempe ad constituendam Hemitritæam non semper tertianam & quotidianam uno eodemque die ac hora invadere. Sed aliquando tertianam prius invadere non modo horis, sed etiam diebus, quæ maxima est deceptionis Medicorum causa. Et rursus vice versa quotidianam aliquando nonnullis horis, quandoque etiam aliquot diebus tertianam præcedere. Illud tibi notum arbitror cum in plurimis tibi hoc anno observare licuerit, uti & in præsentis casu: hoc vero si nunquam adhuc occurrerit, sæpe observabis, cum ubi nunc es, diutius eris permanurus, aut in populosa aliqua civitate praxim exercitaturus. In hac enim nobiles statim ab initis morborum Medicos accersunt, in quo hæc ad unguem observantur: pauperes vero non nisi ab augmento aut in statu morbi, quo sit ut in nosocomio Patavino S. Francisci in quo diligentissimi adstantis agrotorum officio aliquandiu cum honore functus es, etiam si pauperes plurimos inviseres, id tibi non comparuerit.

Caterum ne ab instituto latius recedamus, jam tempus est ut & quotidianam huius tertianæ fuisse adjunctam tibi ostendam. Pares dies inquietiores eam arguunt, quarta nempe & sexta circa vespere: ais enim quarta die noctem turbulentam transiegit, & sexta pulsum inæqualiter celerem inventum circa vespere, nempe quo tempore erat in medio augmento aut ad statum vergebat, occulto antea principio

principio quotidianæ existente. Quippe quod tardi motus est, & multis admodum in febribus curandis exercitatis integritatem mentitur; quam per hæc verba etiam intelligere mihi videris sine febre tota quarta fuit. Et morbi quinta die post febris tertianæ paroxysmum, tertia, inquis, noctis hora cecidit: non quæta fuit. Sexta morbi die curru accessit monasterium S. Insula de Padua, & cum aliquantulum in cubili quietis accepisset sine ulla læsionis sensu ex itinere Perillusius & Excellentissimus Eques D. D. Antonius Niger accessit, qui pulsam tangens intermittentem esse febrem affirmavit. Similiter cum in sexta ponis pulsam celerem circa vesperam, nullamque inæqualitatis aut ordinis pulsus facis mentionem, opinor quod non adesset omnino vel non adeo manifeste perciperentur veluti solent in pulsu tertianæ. Nam & illud quoque te scire velim, lentarum febrium & occultarum pulsus nos sæpe decipere, maxime vero quotidianæ in Hemitritææ principiis & remissionibus; interdum quoque in intermissionibus futuræ recidivæ, cum vel maligna fuit, vel expectatur, vel jam facta est. Recorderis tunc Celsi dictum: Pulsus venarum credimus fallacissimos. Plurimi sunt hoc tempore nobiles doctrina viri, qui in febre pulsus inæqualitatem semper quaerunt, quæ ex putredine scilicet ortum habet: ubi vero pulsus celerem, & frequentem deprehenderunt tantum, ibi febrem adesse negant. Ego vero adversus eos in omni tempore paroxysmi febris periodicæ pulsus inæqualitatem non puto requiri. Aliquando enim in declinatione & principii prima parte febris quotidianæ celerem tantum pulsus & frequentem deprehendi ob lentum febris motum.

Non omnes
febrem esse
cum pulsu
sæguis.

Hæc mea sententia cum à communi tot ac tantorum Medicorum doctrina abhorreat, maximæ quidem sed tamen utilissimæ controversiæ inter me & alios Medicos coram agris occasionem dedit, negantibus illis febrem in iis, in quibus ego eam adesse affirmare. Nec potui doctos holce viros aliis rationibus in meam sententiam trahere, quam signis, quæ à siti, linguæ ariditate, urinis rubicundis, calore præcordiorum & pectoris desu mebantur; quorum modo omnia, modo quædam comparebant. Cunctis tamen aderat calor præter naturam, qui adnota manu pectori & abdomini, atque arteriæ circa carpum percipiebatur. Nam in omni febre necessariè requiritur calor is, qui præter naturam dicitur. Itaque ex his concludimus aliam febrem periodicam diebus paribus clanculum irrepisse: & quod hæc fuerit quotidiana inde probatur, quia sane alia tertiana intermittens vel continua non fuerit. Typus enim utriusque huic febri defuit. Nam debebat veluti alia cum rigore invadere, vel horrore & nausea, vel bilis vomitu, aut quoque monstrare in principio aliquod insigne acumen, celerem motum, linguæ ariditatem, qualem in febre tertiana intermittente habere soleamus, aut manifestam continuitatem & exacerbationem sine rigore, cum siti, urinis rubicundis, pulsibus frequentibus, celeribus, inæqualibus manifestissime, & difficili tolerantia ægri, si tertiana continua fuisset. Restat igitur, ut quotidianam continuam fuisset dicamus, eamque per superingressum paroxysmorum: cujus quidem principium in die pari per pulsus contractionem & partium

externarum levissimum frigus curiosus quispiam, qui de ea prius dubitasset, observare potuisset, at die impari in hoc agro nequaquam, quod typus quotidianus & tertianus simul quodammodo confusi eodem fere tempore concurrerent. Et quam nocte subsequente tertianæ paroxysmum quietius debebat, quam noctibus parium dierum, non tamen ideo dicendum est, eum à febre quotidiana liberum fuisse, quia hæc non molestat ægrum gravibus accidentibus omni tempore, sed aliquando certis diebus, cum quid bonum aut malum præfigere solet, ut hic quarta & sexta.

Porro superius statui Hemitritæam nostram fuisse spuriam Galeni ordinis primi, hoc est, biliosam. Quia non possum ponere hanc fuisse exquisitam, quod in hac diebus paribus horrores manifesti non comparuerint, neque imparibus horrores majores & reduplicantes, quam paribus, qui Hemitritææ exquisitæ semper adsunt. Quia in nostra Hemitritæa horrida tantum fuit die impari. Sed & illa ex pari utriusque humoris bilis nempe & pituitæ putrescentis permixtione genita esse dicitur à Galeno: hæc vero maiorem partem bilis continebat, quod ex iis, quæ per vomitum & alvum excreta fuere, manifestari potest. Animadverti Hemitritæam primi ordinis Galeni exquisitam in spuriam transmutatam fuisse biliosam vel pituitosam: & ea, quæ erat spuria, in exquisitam; sæpe in duplices tertianas, aliquando in quotidianam, tum hanc rursum, ubi tertiana intermittens quieverat, in duplicem tertianam. Cujus mutationis causas, si ex Galeni placitis elicere voluerimus, non sunt rejiciendæ in alias, quam in humores, qui modo copia, modo qualitate variant. Nam sæpe contingit, ut prius à biliosis humoribus sese natura exoneret. Est enim hic humor & ratione tenuis substantiæ, qua solet esse præditus magis fluxilis, quam pituita; & ratione fervoris atque acrimoniæ magis naturam ad expellendum provocat. Unde cum pituita crassior remaneat, fit Hemitritæa magis pituitosa, quæ vel in quotidianam spuriam vel in tertianam spuriam degenerat. Quod si vero plurima pituita prius evacuetur, quam bilis portio putrescens requirit, transmutatio fieri solet ex Hemitritæa exquisita in biliosam vel duplicem tertianam. Hæc dico, ne statim sic arguas. Hæc Hemitritæa, quam vocas, aliquando in quibusdam habuit signa duplicis tertianæ intermittens post aliquos dies, vel Hemitritæa exquisita: Ergo & nunc talis est dicenda. Nam hæc propositio non est vera ob dictas causas, quia ego non nego, quod si Reverendissimus Abbas superstes mansisset, hanc febrem non transmutari potuisse in duplicem tertianam vel Hemitritæam exquisitam, vel quotidianam. Sed dico nunc non aliam esse, quam quæ jam à me descripta est.

Addidi huic Hemitritææ malignitatem, dum ipsam malignam quoque dixerim. Fuit enim signum à te animadversum, dolor nempe lumborum & dorsi insignis in primo tertianæ paroxysmo, in secundo insignior; in tertio & quarto usque adeo sævus, ut nullis remediis quibus mitigari prius videbatur, cedere postmodum voluerit. Hoc in hac febre & in duplici tertiana continua, & in spuria quotidiana longa experientia edoctus, tum plerumque in initio harum febrium malignitatem præ-

Hanc febrem
fuisse mali-
gram.

facire soleo vel jam adesse dicere. Fallere tamen te non oportet is, cui dolores lumborum familiares sunt, ob destillationem arthriticalem, lapidem in renibus, colicum dolorem, hæmorrhoides & mensles instantes si femina laboret. Appello autem hic ego febrem malignam non eam modo, quæ cum urina turbida, crassa, alba, pulsu celeri, frequenti, inordinato & debilissimo nobis plerumque se prodit, sed & quæ talis futura est, & alia quæ jam sine hisce signis ex improviso hominem jugulat, non secus ac si aliquis venenum hauisset, quod vim habet mortem subitanam inferendi, veluti in febre pestilenti. Et profecto hujus febris malignæ signa in disseccto cadavere habuisti, dum in interiori tunica ventriculi insignem inflammationem, & cum aliqua gangræna te vidisti scribas per hæc verba: *Secito cadavere quod multa pinguedine refertum erat, ventriculus & orificium inferius inflammatione atri coloris in tunica interiori laborabat.* Sed quoniam multi, qui de venenis scripserunt, inter signa universalia, quæ sublatum veneno ægrum demonstrant, ponunt viscerum disseccti cadaveris erosiones & insignes putredines, pessimorumque succorum collectiones, quæ in hujus ægri disseccto cadavere visa sunt, ut ventriculi inflammatio cum gangræna, & tanta lienis putredo, ut totam ejus substantiam liquarit, commovere aliquem posset ad credendum veneficio sublatum potius ægrum, quam febrem, atque id datum, dum febre corripere- retur sive illa Semitertiana dicatur, sive tertiana simplex. Verum hic omnem veneficii suspicionem facile submovebit, quando reputare secum diligenti- us voluerit Reverendissimum Abbatem ante- quam ægrotaret, bono quidem habitu prima specie præditum fuisse, (scribis enim, eum tempe- ramentum calidum & humidum habuisse, corpus quadratum & pulchri coloris) sed non sanorum more educatum, verum vixisse cum magna sue vi- te parte delitiosa vitæ ratione, viniisque vinosioribus & meracioribus summo opere deditum, per quæ humores ac succi sic putrefcere in corporibus admodum plethoricis consueverunt, ut veneni naturam induant. Iam vero toto morbi tempore nulla conspecta sunt symptomata, quæ indicare consueve- runt speciem alicujus veneni erodentis & putrefa- cientis, ut arsenici citrini, realgaris, sublimati & præcipitati mercurii, thoræ, napelli & aliorum ejus generis, quando ea quantitate præbentur, ut spacio trium vel quatuor dierum hominem jugu- lent, neque enim actuatio fortis cum magna siti, neque tussis sicca vel humida, neque inflammatio- nes linguæ & labiorum, nec dolor fortis ac ulcera oris, palati, œsophagi, ventriculi, intestinorum comparuerunt, & insignis cum ardore abdominis cruciatis. Neque post mortem corpus nigricans varium ac diffusum, aut tumidum, aut putredinem molestantem olens deprehensum fuit. Ita ut omnia symptomata, quæ comparuerunt in hac febre cum signis Hemitritææ malignæ, qualis eo tempore toto fere anno maxime vero vere & autumno per totam fere Italiam est grassata populatio, com- modissime congruant. Quamobrem cum statuerim febrem ex qua Reverendissimus Abbas obiit, non fuisse Tertianam simplicem, sed Hemitritæam primi ordinis Galeni spuriam malignam, patet ad primum quaesitum quod falsa nititur hypothesi

non esse respondendum, nisi fortassis ex jam à me præmonstratis mutare velis quæ situm tuum, & tale statuere videlicet, cur hæc febris Hemitritæa septima die hominem jugularit, sine prægressis pravis signis in die quarto, qui est index septimi. Respondeo, quod si id verum esset, neutiquam esset mirum in pestilenti malignæ febre. Nam sæpe & quarta tempore pestis exstinguit multos, nullis apparentibus signis momentaneis alicujus malæ criseos futuræ in diebus præteritis, cum tamen tunc temporis malignissimæ febres deberent sæ- vissimis accidentibus ratione sui acuminis id præ- monstrare. Neque tamen ideo Hippocrates, quan- do scribit in Prognosticis; *Malignissimas febres, & quæ signis horrendissimis sunt quarto die aut prius occi- dere, mitissimas vero & signis securissimis firmatas qua- rto die aut prius desinere*, nostræ observationi contra- riatur. Non enim negat fieri posse, ut aliquis qua- rto die à febre moriatur sine signis horrendissimis, imo neque in seipso. Raro tamen id contingit, & quando contingit, malignissimi moris indicium est. Sed in Reverendissimi Abbatis febre pericu- losa, qualis est Hemitritæa (est enim hæc conti- nua, & tertio quoque die invasit validior) præ- cesserunt signa malignitatis in die impari & majoi- ris afflictionis, anxietas, lumborum dolor & cru- rum acerrimus, quæ alternis diebus una cum ter- tiana crudeliter invadebant, favioraque compa- rebant, quo magis ad statum & judicationem fe- bris properabat. Nonne hæc signa sufficiebant ad magnum & repentinum quod imminebat, pericu- lum prævidendum? Vide, quid scribat Hippocrates in Coac. Prænot. *Ex dorsi dolore egritudinis principia difficilia sunt.* Et rursus: *Quibus lumborum dolor adest, hi male habent.* Et tertio: *Lumborum dolor sine causa manifesta sæpe impetens maligni morbi signum est.* Lege librum Rhafis Arabis inscriptum de constitutione pes- tilenti, qui ex Arabica in Græcam Linguam trans- latus est, in eo hæc scripta habentur cap. iv: *τὰ δὲ σημεῖα τῆς λοιμικῆς ἢ τῆς πυλῶδους (lego πυλῶδους, ut interpretes) τὰς ἀκαργῶς ἐμφανίζοντα τὸ παροξυσμὸν, εἰς ταῦτα. Προσηγῆται τῶν δύο εἰδῶν τέτανος ὁ νῆσος, πυε- χῆς πυρετός, οἰσμήν νύκτι. Κηρὶς νῆσις, πύλας ἐν τῷ ὕπνῳ. πύλας τὰ ἴδια σημεῖα τέτανος, ἢ μάλλον, ἢ τὰ νύκτι οἰσμήν μὲν τὸ πυρετός, id est. Signa morbi pestilentis & incendii, quæ evidenter monstrant paroxysmum, sunt hæc. Præ- cedunt duas species hujus morbi febris continua, dolor dorsi, pruritius narium, sputa in somno. Hæc propria sunt harum signa, magisque dorsi dolor cum febre. Hic per pes- tilentem morbum Autoretiam malignas intellexit febres, & pestilentes; per dorsi dolorem, & dorsi proprie dicti & lumborum. Fiunt autem utpluri- mum in febribus ejusmodi dolores ab insigni in- cendio & putredine consistente in vasis majoribus quæ inter alas & inguina excurrunt; aliquando etiam à ventriculo, liene renibusque inflammatis. Nam hæc partes supra lumbos posita sunt. Ob- servavi plurimis convulsiones post eos ortas, aut una cum iis. Lumborum dolor in ventriculo os dolente cum excretionem violenta habet quid convulsorium, in- quit Hippocrates in Coacis Prænotionibus. At con- vulsio in febre Hemitritæa periculosissima, ut in hoc casu monstravit eventus. In hac enim secun- dum Hippocratem lib. i. Epidem. contingit & acutos morbos fieri, & est hæc præ cæteris (nempe febribus) maxime lethalis, cum ei superveniunt.*

Signa mali- gnitatis.

Sed

Sed & illud inter prava signa reputare oportebat, quartæ diei noctem inquietam. Cœpit enim die decretorio fieri febris continua, quæ antea videbatur intermittens. Neque enim ea nox gravis fuit, ut solet aliquando, quia febris tertianæ paroxysmum præcessit: sed quia continua evasit, aliquam omnibus aliis noctibus, quæ præcesserunt febrem, inquietudines comparuissent. Earum tamen neque secundæ diei nocti, neque sextæ ulla à te fuit facta mentio. Die sexta, inquis, noctem quietam habuit. Fuit igitur hæc febris periculosa, tum ratione suæ naturæ, tum ratione symptomatum acutorum lethalis, quæ celeriores in hoc subiecto mortem induxit, quam in aliis. Scis enim Athleticorum, hoc est, plethoricorum habitus periculosos esse, & pingues citius mori, quam graciles ex Hippocratis sententiis, qui non de naturali morte tantum, sed etiam, imo magis de ea, quæ à morbis contingit (rara namque altera conspiciatur) proculdubio intelligendus est. Die autem impari obiit: quia is erat dies gravior, quo Semitertiana invadebat, & omnia symptomata erant sæviora; morbi acuti tunc maxime premebant. Die vero septimo obiit; quia criticus est & ratione febris continuæ & ratione tertianæ. Quartus enim tunc hujus paroxysmus invasit.

Secundum vero quæsitum videtur commodius cadere posse in casum propositum. Hemitritæ enim febris tertianam intermittentem habuit. Itaque quæritur jure merito, cur Hemitritæ febris detur sine jecoris affectione. Ad hoc dico, me in libris de Semitertiana satis diffuse ostendisse, intermittentium febrium putredinis modo in vasis, modo extra vasa consistere, inque aliis partibus & trunco venæ cavæ magnæque arteriæ; neque locos periculosos facere intermittentes, aut continuos rationibus ab experientia remedium & dissectione cadaverum ductis pluribus probavi. Iis hæc etiam addo: bilem non semper in jecore, sed venis quoque generari, nec aliter in jecore, quam quod venas contineat. In iis enim sanguinis officinam multis rationibus alias posuimus. Iam & in ventriculo bilem generari porraceam, & eam, quæ glasti colorem refert, hoc est, extra jecur & vasa, notius est quam ut multa probatione indigeat. Ego in longa & simplici tertiana (quæ rarior est) & in duplici (quæ est frequentior) intermittentibus lienes magnos animadverti istarum febrium fomitem suscepisse: cum prius materia fuisset vel in jecore, vel in vena cava & arteria magna, ut propterea tibi jam cesset ista admiratio, quam super jecore pulchro & nullatenus affecto in tertiana suscepisti, vel Hemitritæ, qua obiit Reverendissimus pater. Si quidem in hoc & in vasis majoribus, vena nempe cava & arteria magna, liene & ventriculo putrescentem bilem constituisse arbitror. Sed evenire quoque potest, ut jecur copiosam bilem flavam in suis venis & arteriis contineret in hoc subiecto. Verum quia rubedo sanguinis & jecoris occultat flavedinem copiosæ bilis, ejus copiam non potuisti oculis in jecore magno & pulchro animadverti.

Quæres nunc fortassis ex me, quam periodorum causam statuas? Ad materię proprietatem reduco, à qua neque Aristoteles, neque post eum viri politiciis litteraturæ distrahi potuerunt, quotidianis multarum rerum exemplis cominoti. Nam

quod spacio vigintiquatuor horarum muscæ ex vinnaceis nascantur, non pituitosæ aut biliosæ materię adscribendum, sed proprietati feminis in vinaceis existentis, cui hoc peculiare est, ut singulis diebus ad ea animalia producenda moveatur. Quod ex semine humano nono mense ut plurimum ex utero homo proveniat, non quarto vel quinto, proprium est ejus materię. Sic cur hic fructus mense Septembri singulis annis maturecat, ille vero mense Augusti, alius mense Junii, per subtiles quasdam rationes inquirere ridiculum est: cum id arcanum naturæ sit, & omni humana intellectione non capiatur. Nam motus materię & humorum quemadmodum in animalium generatione, quæ per sexum generantur, aut ex putredine nascuntur, aut ex vermibus fiunt, imperscrutabilem habent causam proximam & veram, ita & humorum, qui in febribus periodos faciunt, & dierum decretoriorum. Similis enim est motus materię febrilis & materię generationis animalium. Quod considerans Aristot. lib. v. Hist. de animal. tractans de generatione eorum, sic inquit: αἱ δὲ μεταβολαὶ γινώσκουσι τοὺς παλαιούς καὶ τελευτῶν ἢ περὶ μέρων, ὥστε καὶ αἱ τῶν νόσων συμβαδύνουσι χρόνους. id est, mutationes fiunt plurimum tertio, aut quarto die, quemadmodum in morbis quoque crises contingunt. Porro notandum hic tibi, materiam quæ per circuitus sua putredine movet febres, sive bilis, sive pituita, seu melancholia sit nominanda, aut apta sit generare circuitus quotidianos, tertianos, quartanos, singulis annis non semper una eademque putredine putrescere (cujus naturam secundum motum noscimus) sed penes anni tempora & tempestates & cæli præteritas ac præsentis constitutiones plurimum variare. Nam si ver, hyems, æstas, autumnus naturalem suum cursum in quaque regione observarint, proculdubio (nisi ægri aliquo modo propter victus rationem eam mutarint) unaquæque febris simplex suam circuitus naturam observabit. Quod si vero nonnihil anni tempora mutata sint pro analogia magnæ vel parvæ mutationis putredines singulorum humorum quotannis variabunt; sic ut tertianas quotidianasque producant non exactas, & omnibus notis suo naturali ac proprio typo correspondentes. Sic uno anno vidi tertianas omnes anticipantes suis paroxysmis indicia dedisse abituræ febris; quæ postponebant, difficiliorem habuisse crisin, cum tamen ut plurimum contra videamus contingere. Rursus annos observavi, in quibus tertianarum erat circuitus sine horrore vel rigore vel frigore. Anno millesimo sexcentesimo quinto omnes tertianæ productæ videbantur. Anno millesimo sexcentesimo vigesimo circa finem Julii omnes tertianæ & duplices productæ fuere. Harum una citius altera abibat. Iam & exanthemata in tertianis annis quibusdam à me visa, & syncope & cardialgiæ frequentes, quæ aliis annis plerumque absunt. Anno millesimo sexcentesimo vigesimo secundo omnes quartanæ, quas vidi ex Hemitritæ ortas, quadruplicem quartanam monstrarunt loco simplicis vel duplicis ut aliis annis.

Imo tantum in nobis faciunt anni constitutiones, ut quædamque novæ febres comparere videantur. Quapropter si medendi artem in posterum cum laude proficere & exercere cupis, singulis annis hortor ut cæli constitutionem & mutationes temporum diligenter

Causa motus
materię fe-
brilis.

responsio ad
questionem
de Hemitritæ
febre
causa
motus
materię
febrilis.

ubi
ge-
neratur.

causa
motus
materię
febrilis.

Via constitutio
temporis anni.

ter observes non ex astrologorum ephemeridibus vel ex eorum in Calendariis prædictionibus, sed autopsia; deinde in ægris febricitantibus notes, ex quibus in quæ fiant mutationes: ita revera discēs & prævidebis, quod ex sexcentis Medicis nullus ingenio industria & arte potuit, & apud ipsos & ægros plurimum autoritatis tibi indies comparabis, probeque discēs in una bile pro varietate annorum aliam atque aliam putredinem ex circuituum commutationibus & accidentibus consistere.

*Responsio ad
quæsitum ter-
tium.*

Sed ut ad institutum redeam, & tertio tuo quæsito satisfaciam, scire nostra interest in liene quod ejusmodi bilem constituisse, depositam prius à vasis majoribus (nempe trunco venæ cavæ & arteriæ magnæ) nec non à jecore hic factam æruginosam, præstinam ex parte, & sua acrimonia lienis vasa excedisse: copia vero disrupisse, ac sibi proprium spacium fecisse, sicque extra venas & arterias prolapsam sanguinem putrefactum fuisse, inde tertianam potius, quam quartanam ortam. Quamobrem non eam inficias, quartanam aliquando à bile progenitam exemplo criseos quartanæ, in qua meri humores biliosi per alvum reddebantur. Hanc autem bilem non potuisse sensibus animadverti, nisi quis forte eam gustare voluisset. Nigredo enim sanguinis omnem alium humoris colorem obliterat & occultat, præsertim bilis flavæ & æruginosæ.

*Quartanam
nempe
quam ferri ex
bile.*

Vt propter hanc causam in arteria magna & vena cava existimem multos humores contineri, qui tamen conspici propter sanguinis ruborem nequeant. Quoniam autem ramuli, qui ad nutriendum ventriculum à splene originem habent, vel à splenico ramo ad ventriculum commodissime bilem, quam lien continebat, deponere potuerit: ideo contigit, ut ventriculus atrii coloris inflammationem in interiori tunica conceperit maximam & convulsionis & mortis causam.

Ex his præmissis facile erit ultimo quæsito respondere; videlicet, quod Lien colliquationem acceperit ab insigni putredine, quo sanguis extra vasa existens statim capiti laborare, qui non potuit esse in majori copia, ut solet in aliis, in quibus præter modum lienes distenduntur sine disrptione vasorum: quia in iis non est tanta acrimonia, quanta in hoc humore bilioso fuit; & majus spacium in aliis, quam in hoc. Obæsis enim viscera, quæ in abdomine continentur, præcipue lien parvo temporis spacio in insignem molem augeri nequeunt. Est enim laxa ejus substantia, mollis & plena venis arteriisque, ob quas facile patiuntur à compressione vicinarum aliarum partium. Hæc mihi succurrebant, mihi Sabbadine, quæ tuis quæsitis in tanta temporis angustia respondere mihi visa sunt. Vale. Patavii.

*Unde Lien
colliquatio-
nem acceperit.*

F I N I S.



ADRIANI SPIGELII

BRVXELLENSIS

DE

ARTHRITIDE,

LIBER SINGVLARIS.

ARTHRITIDE,

LIBER SINGULARIS



DE Articulorum dolore acturi, principio monendum per articulum intelligi debere Articulationem sive Conjunctionem duorum ossium per *σύνδεσμον* vel *συνάρθρωσιν*. Per *σύνδεσμον* facta articulatio, motum edit manifestum; ut in humero, coxendice, cubito, genu, aliisque. Per *συνάρθρωσιν* quæ fit articulatio, motum habet obscurum; ut in carpi & metacarpi ossibus. Circa has articulationes dolor factus, *ἀρθρίτις* Græcis appellatur; Latinis, morbus seu dolor articularis; Barbaris, arthetica passio, & gutta, quod guttatim destillatio seu fluxus in hoc malo fiat. Alioquin articulus, quem Græci *ἄρθρον* vocant, omnem significare speciem articulationis constat apud Galenum libro de Ossibus; ubi omnia articulationum genera recenset. Non ideo tamen si quis circa futuram capitis aliquando doleat, vel circa dentes, ea parte, qua maxillis junguntur, dolor articularis dicendus est. Dicitur etiam morbus hic juncturarum, stricte sumpto morbi nomine pro dolore. Nam luxatio alioqui morbus etiam est articulorum vel juncturarum, sed in situ.

Est autem *ἀρθρίτις* vera, dolor partium articulorum, ex intervallis per defluxionem humoris accedens. Per articulorum autem partes, non tantum intelligo extremitates utriusque ossis, quæ mutuo conjunguntur; aut ligamentum, quod conjungit interius, & in articulo tum coxendicis tum humeri rotundum est & sensus expers: sed omnes eas partes, quæ exterius has ossium extremitates amplectuntur, ut sibi invicem conjungantur melius; nempe ligamenta externa, periostium, membranas, tendines musculorum, mûculos ambientes nervos, ipsasque musculorum extremitates. Hæ enim cunctæ in dolore articulari maxime patiuntur. Dixi in definitione, ex intervallis per defluxionem humoris dolorem arthritidis accedere, excludens una cum Galeno eum dolorem articulare, qui fit à siccitate, cujus fecit mentionem Hipp. lib. III, Aphor. XVI. Hic enim improprie arthritidis appellatur. Dixi, defluxionem fieri per intervalla; quod in omni arthritide est necessarium, quæ jam confirmata est. Quod si vero quispiam podagra corripiatur, & intervallo nullo redeat dolor, tamen dicenda est arthritidis, nisi ex intervallo provideatur.

Differentiæ doloris articularis statuuntur variae. A materia dolore causante, dicitur arthritidis biliosa, pituitosa, sanguinea, melancholica, mixta. A qualitate venenata huic materiei implexa, dicitur arthritidis Gallica. Sed communis differentia

fumitur ex articulis variis, quos hic morbus solet affligere: sic quæ pedes exercet, podagra dicitur; quæ manus, chiragra; quæ articulum coxendicis, ilchias; quæ genu, gonagra; cæteros articulos si quando dolor infestat, nomine caret, & communi arthritidis appellatione gaudet. Cæterum sub quo affectu præter naturam arthritidis teneri possit, non est multis verbis investigandum curiosius, cum dolorem esse dicamus, qui est de genere symptomatum: at si respiciamus affectum dolorem facientem, hoc est tumorem ex distensione partium articulorum per humorum defluxum factum, morbum esse dicemus, nempe tumorem cedematofum, vel ut plurimum, inflammationem improprie dictam.

Causa conjuncta ab Auctoribus recensetur varia: quidam aut nudam intemperiem, aut etiam ventositatem statuunt, ut Guainerius & Gradius: Græci, Latini & Arabes, humores. Atque ex his iterum Recentiores quidam unicum statuunt; ut Fernelius, frigidum & pituitosum, vel solum ac tenuem, qualis tempore frigido è cerebro per nares solet effluere. Cæteri una cum Græcis plures humores accusant; & vel quatuor simplices, bilem, pituitam, melancholiam, & sanguinem, quibus etiam possit addi serosus humor; vel mixtos ex his. Siccitatem aliquando generare ischiadem, testis est Hippocrates. Cur igitur non potest eadem generare alias arthritidis species? Partes enim similes similibus morbis sunt obnoxie. Verum Alexander Trallianus cum ait, non solum ob materiei influxum in articulos fluxiones fieri, sed etiam propter nudam qualitatem calidam vel frigidam, & ad hæc siccitatem vel humiditatem subinde fluxiones concitare, videtur existimare, articulorum seu partis affectu intemperiem non esse causam proximam doloris arthritidis vel solutionis continui, sed tantum concausam, quæ faciat debiles articulos. In omni enim fluxione necesse est partis imbecillitatem adesse, & humoris abundantiam. Sed & partium imbecillitas non à sola dependere intemperie mihi videtur, sed ex amplitudine vasorum, venarum scilicet & arteriarum, & laxitate partium circa articulos. Quæ vitia vel ab ortu genita sunt in nobis, & tum fit arthritidis hæreditaria, accedente humorum copia; vel postea fiunt, à causis evidentibus laxantibus & emollientibus vincula & articulorum membranas, ut sunt contusiones, balnea, Venus, & vinum immoderatum, illudque in balneo vel statim post potum, quemadmodum in Germania fieri solet. Porro humor hic, qui est causa continens, non consistit in eo spatio seu ea cavitate, quam constituunt ossium duo extrema quando sibi invicem conjunguntur,

Sub quo afficitur præter naturam.

Causa conjuncta.

Intemperies an causa proxima arthritidis.

Imbecillitas articulorum.

Hæreditaria arthritidis.

*Sedes humoris
in arthritide.*

*A capite ut
fuit fluxio in
articulis.*

*A iecore ut
fuit fluxio.*

*Ex suppreſſio-
ne humoris
et acceſſione
erit podagra.*

guntur, quemadmodum multi hæcenus ſomnia-
runt; ſed ſere ſemper in membranis, tendinibus
ac vinculis externis, à perioſtio originem ſuam ha-
bentibus, offium extrema ac muſculorum tendi-
nes neceſſantibus. Idque cognoscitur manifeſte ſic
ſe habere ex nodola podagra & chiragra, in qua
tophus ſeu humor jam in calculum concretus
aperta ruptave cute, plerumque eruitur è digito-
rum articulis, externo vinculo, ut ſcribit Fernelius,
integrò atque illaſo. Præterea, ſi materia in
cavitatem internam articuli flueret, nullus vel ad-
modum obtuſus excitaretur dolor, quod hoc
vinculum neceſſans interius offium duo extrema
ex offe oriatur, nullumque ſenſum habeat; & ideo,
quia cum offis cartilagine connaſcitur, *χονδρῶν
δυσία* nomen apud Græcos accepit. Sed unde &
per quas vias humor hic dilabatur in has articulo-
rum partes, ex veterum & recentiorum ſcriptis
cognoscere perquam eſt difficile. Nonnulli enim
à capite fluxionem fieri putant; alii, ab hepate; nos
vero, ab utroque. Eorum qui à capite fluxionem
fieri aſſerunt, unus ab internis capitis partibus,
ipſoque cerebro per ſpinalem medullam, vel in-
fundibulum, vel offa vertebrarum, vel per me-
diam ſpinalis medullæ ſubſtantiam & ſic per ner-
vos in articulos derivari cenſet; alter vero, à ca-
pitis externis partibus & extra calvariam poſitis,
atque per ſumma corporis ſub cute deorſum de-
currere in articulos; & hæc poſtrema opinio fuit
Fernelii, non infirmis ſulta rationibus, ſumptis ab
iis ſignis, quæ ſolent arthritidem præcedere. Præ-
cedunt enim capitis gravitas, ſomnolentia, dolor
externus, & qui contactu, præſertim in verſis ca-
pillis exacuitur; tumor in capite œdematoſus, in-
terdum ut cera mollis, cuti præſertim ad occipiti-
um ſubjectus, cutis denſa nec calvæ propius ad-
hærens: atque idcirco idem Fernelius, ejuſmodi
ſuum humorem pituitolum, tenuem & ſeroſum
ſub cute capitis denſa cumulari ac repere per ve-
nas jugulares externas à partibus infernis. Qui ve-
ro ab hepate fluere materiam dicunt per venas in
articulos, hiſ rationibus nituntur. Quod criſes
ſiant in febribus continuis per articuloſum dolo-
res; quod in arthritide frequenter conſpiciantur
inflammationes circa articulos, quod fieri non poſ-
ſet, ſi à capite juxta Fernelium flueret humor in-
tra pericranium & cutem. Non enim poteſt ſem-
el extra venas conſiſtens, venas ruſus intrare.
Hiſ addo alias, quod videmus per hæmorrhoidum
ac menſium purgationes reſtriſtas, podagras &
articulares morbos tum viris tum mulieribus eve-
nire. Dicebat enim Hippocrates lib. vi, Aphor.
xxix, Mulier podagra non laborat, niſi eam men-
ſtrua deſecerint: Videmus ortas nonnullas poda-
gras à ſanguine & bile, ceſſare vel præſervari ve-
naſectione. Sed mea opinio eſt, tum à capite tum
à jecore fieri poſſe fluxionem. Et à capite qui-
dem, per venas & arterias, raro per locum ſub cu-
te, ut putat Fernelius; nunquam vero per foramen
vel medullæ, quo ſpiritus continetur (paralyſis
namque fieret in deſluxione) vel nuchæ, ſupra
membranam extimam ſpinalis medullæ in nervos
tranſudare, & per eos in tendines muſculorum de-
fluere. Nam humor intra calvam & ſupra menin-
gen non fluctuat, expurgarique iſi adeſſet, poſſet
per nares, ut omnis humor qui in cerebro conti-

netur, per nares & palatum pellitur à natura com-
modius. Fernelius cum docet ſub cute capitis con-
geſtum humorem tanquam deorſum ad articulos
currere per ſumma cutis, nullo argumento id mihi
videtur probaſſe, niſi fortaiſſe per laxitatem noſtræ
cutis, & dolorem quem ægri percipiunt ætate
proveci in frigidis regionibus & jam antea arthri-
tidem perpeſſi (craſſiore reddita materia ac tar-
diore ad motum) è cervice vel per humeros in cu-
bitos & manus, vel per dorſum in coxendices, ge-
nuæ pedefque ſenſim devolvi, ſenſu interdum tri-
goris oborto, quo corpus omne perhorreſcit. Sed
quia in multis arthriticis hic dolor non ſemper
obſervatur, etiamſi diu eo cum morbo conſiſtari
fuerint, & materia dilabens craſſior facta ſit, cre-
dendum eſt materiam non in omni arthritide, ſi
quando ea à capite deſluit per humeros vel dor-
ſum in ſubjectos articulos, repere per ſumma cuti
ſubjecta vel ſumma cutis ipſius, ſed per venas &
arterias jugulares non ſolum externas, ſed etiam
internas (per quas ab infernis partibus, jecore præ-
fertim, ferebatur humor in capitis externas in-
ternaſque partes, nempe cerebrum) remeare in
venam cavam & arteriam magnam, vel ejus ma-
gnos ramos ſub jugulo conſtitutos, atque ſic in
articulos devolvi: quod nullus ſanæ mentis nega-
bit, qui modo intellexerit per ampla hæc vaſa in
vivo corpore repentium ac facilem fieri fluxum
ac refluxum humoris; quique obſervavit, ante
univerſalem totius corporis vacationem, ab ex-
ternis remediis manu vel pedi applicatis mate-
riam refluxiſſe ad partes nobiles & febres conti-
nuas excitariſſe, multoſque celebres inſuper in arte
medica viros, qui podagram ſecundum commu-
nem medicorum opinionem periculo vacare te-
mere pronunciarant, eventu mendaces ceſſiſſe.
Neque etiam eſt credendum, humorem hunc te-
nuem & frigidum Fernelii, initio levioris arthri-
tidis mole tam exigua in manus pedefve aut eo-
rum unum digitum tantum illabentem, vel uſque
adeo eſſe frigidum, ut digerì à Natura non poſſit
citius, quam in pedes à capite per tam longum
ſpatium deſcendat; vel eam eſſe per ſumma cor-
poris cutis laxitatem, quæ tam celeri motui &
concoctioni vel digeſtioni materiæ per poros re-
pugnanti conveniat. Qui enim hunc ſimplicem
ac frigidum ſemper eſſe contendunt ex ſenſu cum
deſcendit à capite frigoris oborto, quo totum
corpus perhorreſcit, non videntur obſervaviſſe, ma-
teriam calidam ſæpe ſenſum frigoris inducere,
cum ſenſiles partes tangit. Si eryſipelas inſtet in
pede vel alia parte, antequam per febrem calida
& biliola materia expellatur ad partes, corpus
perhorreſcit, vel frigore aut rigore premitur; fe-
bresque tertianæ, quæ à bile ſtimulante partes ſen-
ſiles, originem habent, initio ſuæ acceſſionis cum
horrore, rigore, ac frigore invadunt. Porro ne-
gandum non eſt, non per venas modo materiam
ad caput repere in arthriticis; ſed etiam ab aliis in-
fernis partibus in ventre contentis, ventriculo
nempe inteſtiniſque, vaporibus ſuſcitatis caput
repleri, pituitosamque materiam per palatum à ca-
pite dilabi in ventriculum, mox in venas meſeraſi-
cas rapi, ac in jecur & venam cavam protrudi una
cum aliis humoribus, ac ſic quoque per aliam
viam, quam per arterias & venas labi à capite in
articulos.

Contra Fernelium.

Podagra periculo non vacat.

Frigor ex calida materia quomodo oritur.

articulos. Sed hæc via non est usque adeo conveniens tam celeri motui, qualis interdum in humore arthriticorum turgente solet animadverti. Cæterum eæ rationes, quibus Fernelius probat caput esse arthritidis semper originem, probant hoc tantum, quod in arthritide caput quoque offendatur, quod & in febribus lædi sæpe cernimus, ex capitis gravitate, somnolentia, dolore; non tamen propterea dicimus febrem à capite oriri: sed illud vel per consensum affectarum aliarum partium infernarum lædi; vel propter plethoram & pravorum humorum copiam. Hæc enim oppressa natura tentat omnem viam, per quam exonerare se potest, eos per venas ad caput, renes, alvum, cutis spiracula pellendo. Quare concludimus raro aliam, quam quæ fit per venas & arterias à capite vel jecore fieri fluxionem in articulos, quod etiam sensu commode demonstratur. Videmus enim, antequam fit dolor in articulis, venas in membris, ad quæ futura est fluxio, nempe in manu vel pede, distendi ampliorem reddi; quo signo semper podagrici cognoscere solent inflare dolores: ita ut Fernelius non recte senserit, à dolore quem jam in articulo excitavit humor qui influxit, trahi materiam inflammationis postea vel alterius tumoris, qui fere semper comparat, causam. Nam si hoc ita est, cur venæ ante dolorem tument ac turgent, si expectandus est dolor à materia extra venas existente? Nunc autem quaerat quispiam, quid fit cur, si humor per venas fluat in articulos à capite & jecore, non statim in omnibus arthriticis in extremis articulis ruat, vel in eo spatio consistat ac hæreat, quod est inter articulum & articulum. Nam dum fluat, verbi gratia, in brachium, prius in humeri articulo consistit per aliquot dies, vel in cubiti articulo, non in spatio quod est inter unum & alterum articulum. Atque ubi per aliquot dies ibi hæserit, si non sponte vel à medicamentis digeratur, tum demum ad inferiores partes transit. Res hæc à nemine, quod equidem sciam, satis considerata, majori indiget inquisitione. Fernelius, in articulorum naturam, causam retulit. Ait enim, decursum fluxionis fieri in folis articulis, ibique materiam subsistere & hære propterea quod illi compacti sint densique: non item in mediis regionibus, quod amplæ sint & laxæ; intelligens amplitudinem & laxitatem meatuum cutis, quæ circa articulos minor est, quam in intervallo medio inter duos articulos. Ego vero existimo, quod cum per magnas vias fluat materia hinc & inde in minores ramos, tamquam per fluvios in rivus à natura pellatur, quorum extremitates in articulis terminantur: in his, cum propter arctos meatus & frigidam partis naturam nequeat domari atque evinci vel dissipatione per halitus & poros, vel alia coctione, in angustioribus quam per quos transit, cancellis coercita dolores in partibus sensu exquisito præditis pariens, quaeret refluxum per eosdem ramos, per quos in articulos intravit, in majores venas, per quas deinceps ulterius in inferiores articulos per ramos minores nutritioni inferiorum articulorum inservientes protruditur.

Causæ antecedentes sunt duæ præcipuæ, copia humorum commemoratorum in venis tam capitibus, quam aliarum partium existentium, & artuum

imbecillitas; quibus addit Rhafes tertiam, robur scilicet partis expellentis excrementa, nempe jecoris atque capitis. Alterutra enim, vel ut plurimum ambæ hæ partes principes in omni arthritide præbent humores, tamquam fontes totius mali, quibus aliquando associata cernitur ventriculi imbecillitas, orta ex humidissima, aliquando etiam frigida intemperie. Caput humidissimum copiosa gignit excrementa, & si una frigidum sit, pituitosa, dulcia, aquosa: si calidum, pituitosa, salsa, acra, præsertim si jecoris caliditas cooperetur. Iecur præterea plerumque impense calidum est, quod non modo copiosos vapores ex ventriculi concoctione in cibis cerebro suppeditat; sed & ipsum vel sanguinem copiosum, vel atrabiles ac falsos humores generat, ac in venas deferit. Externæ autem causæ sunt omnes eæ, quæ plethoram & cacochymiam venis inferunt, partiumque principum intemperiem fovent, quæque imbecillitatem articulorum generant, ut sunt vita ociosa vel cum paucis laboribus & exercitiis; nimia ciborum nec cuique temperamento convenientium repletio; potus vinorum generosorum multus, præsertim in junio; Venus, balnea: his addentur concitiores motus, ambulationes, equitationes, præsertim statim à cibo, insueta frigida portio, animi affectus omnes, prolapsus, contusio, luxatio, & si quæ sunt aliæ, quæ partem debilitant. Retenta excrementa, quæ vel per menses, ut mulieribus, vel per hæmorrhoidas, vel sanguinis profluvium è naribus expurgari consueverunt, nonnulli inter internas causas connumerant. Sed ex causis externis, vinum & Venus principem locum obtinent. Atque ideo Poëtæ Græci podagram Bacchi & Veneris filiam esse finxerunt. Hippocrates libro vi, Aph. xxviii & xxx ait, Eunuchos podagra non laborare, neque pueros ante usum Veneris. Nam Venere non modo corpus laxum redditur, & artus debiliores, sed omnia vasa sunt ampliora. Et licet eunuchi podagra laborasse dicantur, id contingit ex intemperantia vitæ aliisque causis externis. Sic Seneca in epistolis invehitur in mulieres, quod propter luxum, Hippocratem mendacem fecerint. Sed omnibus illis, quas cognovi, mulieribus podagra laborantibus, etsi menses fluxerint, diminute tamen fluebant. Extat apud me quaestio non inlegans, cur podagrici generent podagricos. Communis medicorum schola respondet cum Hipp. & Gal. quod patrum semen fit vitiatum in partium imbecillitatem generando. Excernitur namque auctore Hipp. semen genitale ab omnibus corporis partibus, à sanis sanum, à morbis morbosum. Horum tamen ratione, quamvis antiqua, non plane mens mea quiescit. Probatio enim, qua demonstratur semen esse prorsus vitiatum, neganda. Non enim semen defluit ab omnibus corporis partibus, à sanis sanum, à morbidis morbosum. Nam à testiculis, in quibus elaboratur, dimandatur in parastatas, & coitus tempore excernitur; à testiculis vero attrahitur materia feminis & spiritus à vasis magnis, arteria scilicet magna & vena cava, per quas sanguis & spiritus vitalis funduntur in omnes corporis partes; non vero mittitur à partibus & tantum ab istis vasis recipitur & asservatur donec per coitum excernatur. Quocirca quod podagrici

Caput & jecur fontes arthritidis.

Causa externa.

Podagra Bacchi & Veneris filia.

Cuius podagrici generent podagricos.

Quomodo semen generetur.

memoriae accipere.

inter Fernelium.

Causæ antecedentes.

generent podagricos sit, quod materia sanguinis in podagricis sit podagrica; quemadmodum & spiritus, qui in arteriis continetur, scilicet vitiatum à pravitate humorum in massa sanguinea existentium, ex qua spiritus vitalis elaboratur, & corporis omnes partes alimentum capiunt.

Signa diagnostica.

Signa vero diagnostica satis patent ex definitione. Nam adest dolor circa articulos, modo acris, modo mitior cum pondere & gravitate membri, modo pungens, modo magis obtusus, modo profundus, modo in superficie, aliquando absque tumore, sæpius cum tumore simplici vel mixto, prout est natura humoris, qui ad articulum confluit, vel simplex vel mixta. Hinc apparent tumores inflammatorii, oedematosi, erysipelatodes, duriores, molliores, flatulenti, & ex his compositi atque permixti. Qualis vero sit causa conjuncta, an humor, an simplex intemperies, manifestabunt quoque sua signa. Nam humorem esse indicabunt tumores in articulis, tum colores tumorum, atque dolorum species; juvenia item & lædencia. At qualisnam sit, simplexne an commixtus humor, qui in articulum influxit, non modo ex his, sed etiam ex causis internis, eorumque signis fiet manifestum, ad quas cognoscendas inspicere oportet causas externas, & inter hæc in primis victus rationem quæ præcessit, anni tempus, aeris constitutionem, ætatem, habitum corporis, intemperiem partium principum.

Signa arthritidis sanguineæ.

Si igitur sanguis arthritidem causet ob copiam, pars affecta tumorem habet ingentem circa cutem, & venæ tument, calor in parte tumida est moderatus, cum insigni robore, pulsus percipitur profundus, dolor extensus, veluti in aliis inflammationibus parique pondere pars gravatur. Ea quæ forissecus applicantur, sive valde calida sint seu frigida, lædunt (quamquam sint aliqui, qui à refrigerantibus juvari scribant) ægrique assiduo exacerbationem sentiunt; & quidam per circuitus irritatione vexantur. Urinæ eorum fulvæ sunt, substantia mediocres, cum hypostasi vel nubecula vel contento albo, ætas temperamentumque corporis & partium principum, vernum tempus, regio temperata apta generationi copiosi sanguinis, præcessit victus ratio, quæ boni fuit succi, maxime alentis & sanguinis copiam generantis. His nonnulli addunt alia signa, sudores nempe modicos in facie, in fronte vel capite; gravitatem, somnolentiam, quandam perturbationem in sensibus, intellectu & cogitatione, corporis lassitudinem sine labore præcedente, & si quæ sunt alia, quæ indicant plethoram sanguineam.

Signa biliosa arthritidis.

Quod si à bile fiat, nullus secundum Trallianum tumor in parte affecta est conspicuus, cutis color subruber spectatur, qualis in erysipellate, calor ac dolor acris, sine pondere vel gravitate membri: articulus dolens læditur à calidis, juvatur à frigidis applicatis, sive fiat actu talia, sive in potentia, exacerbationes animadvertuntur de tertio die in tertium; febris in ipsa acceptione succedit valida, cum siti & insigni rigore; urinæ conspiciuntur flavæ & subfulvæ, splendentes, substantiæ tenuioris, acrimoniæ participes. Victus ratio præcessit, quæ bilem generare abundanter potuit, ex acribus & attenuantibus cibis salisque, animi affectiones, iræ, vigiliæ, moerores, curæ, fatigationes, ætas juve-

nilis adest cum temperamento corporis calido & sicco; æstivum tempus, & calida regio.

Quod si à pituita oriatur, tumor apparebit circa articulum oedematofus, hoc est, colore subalbido aquæ inter cutem similis conspicietur, & cavus ad digitorum compressionem, ac laxus; dolor aliquando fortis, aliquando mitior, quotidiana exacerbatio notatur, quæ omnia paulatim irruunt & augentur, & per plures horas durant, brevemque intercapedinem habent, immo nec unquam integre remittunt, tardiorque fit fluxio, unde tumor paulatim augetur: calidis ægri juvantur, læduntur à frigidis: adest senilis ætas, temperamentum frigidum & humidum, & talis aer, tempus hyemale, percipitur aliquando frigoris sensus. Victus ratio præcessit refrigerans & humectans, balnea à cibo, vita ociosa ac deses, urinæ crassissimæ, aliquando perturbata in iis reperiuntur.

Quod si vero ab atra bile contingat arthritis, tumores conspiciuntur duriores & nigro colore præditi, frigoris sensum quandoque habentes, & afficiuntur in profundo corpora, veluti atterantur & scalpantur; redit circuitus exacerbationum de quarto in quartum, mediocres magnitudine & impetu: adest ætas constitit ætatis & inclinantis ad senectutem, temperies corporis calida & sicca, aeris constitutio, regio, tempus autumnale; edulia quæ copiam bilis atræ generare potuerunt, vel ipsam melancholiam; lassitudines immodicæ; urinæ tenues initio & aquosæ, postea vero atiores quam naturales requirunt, modice crassæ, cum contentis ad fuscum colorem vergentibus, aliquando vero mixtum, subcruentum & fuscum, ut Paulus & Aetius ajunt.

Sed raro à simplici humore fit arthritis, plerumque à mixto oritur, & præcipue à bile & pituita, & tunc nonnullis ea vocatur pituita salia, cujus indicia sunt mixta, scilicet tumor oedematofus cum calore & robore, acrimonia in cutis superficie, urinæ variæ, modo aquosæ & tenues, modo crassæ & turbidæ. Similiter si causa arthritidis sit commixtio aliorum humorum, tunc quoque mixta apparent signa. Verum diligenter animadvertendum est, quod quandoque hæc signa nos possint decipere, quod etiam ab aliis notatum video. Nam in permixtis humoribus color membri, & caliditas nos decipiunt. Si enim bilis cum pituita permisceatur in articulo, tunc ad circumferentiam facile bilis fertur, & idcirco in cute rubedo cum flavedine & calore cernitur. Ex quibus non est existimandum, dolorem articulorum cum hisce signis erysipelatis vel inflammationis, fieri tantum à bile. Sic etiam contra contingit, ut si bilis interiorius dolorem efficiat, & pars affecta exterius cernatur vel aeris vel medicamenti exterius frigidi applicati vi, alba vel livida, non propterea mera pituita erit arthritidis causa: uti, si cum sola pituita dolorem efficit, articulus vero à medicamento calido applicato, vel aeris caliditate, vel alia extrinseca causa rubet, atque calet exterius, non recte dicetur pituitam esse bile permixtam. Humor præterea, inquit Guainerius, existens in profundo membri, membri superficiem plerumque non mutat: & sic membri color tunc nullum tibi indicium daret. Contingit, inquit idem, ut humor frigidus ad juncturas defluat dolorem intensum faciens, cujus

Signa pituita, seu arthritidis.

Arthritis ab atra bile orta signa.

Arthritis raro à simplici humore oritur.

Signa bile & pituita mixta.

Decipio in signis.

cujus causa febris fiat, causabitur infomneitas, pulsus velox erit, & urina tincta, dolori succurrere intendens, sanguinem, & spiritum in multa qualitate ad locum illum mandabit, quæ ex causa locus iste rubet tunc atque calet: quæ omnia calidæ materiæ sunt signa, et si frigida sit in causa. De colore igitur membri, caliditate seu frigiditate, nisi perseveret, confidendum non erit. Occurrunt enim sæpe plurima, quæ tam caloris seu frigiditatis, quam caliditatis membri causæ esse possunt, contra tamen materiæ peccantis naturam. Cum igitur signa talia fallacia sæpe sint, ad alia dicta recurrendum erit. Alius autem in applicandis localibus error sæpe contingit. Nam hora paroxysmi interdum applicari frigida consueverunt, quæ aliquantulum stupefaciendo dolorem remittunt, materia tamen frigida existente, quam hujus de causa pro tunc forsitan calidam judicamus. Contingit interdum, quod materia calida existat & pauca, & ex applicatione calidorum materia ista pauca resolvatur, & sedetur dolor, ex quo ad pauca respicientes, materiam istam fuisse frigidam facile judicemus: hinc ergo patet, quod in casu nostro ex juvantibus & lædentibus esset per se judicium fallax. Ne igitur hos in errores tam hora paroxysmi quam quietis incidat, particularia quæ supra te docui, diligenter perscrutare, & super quem humorem plura concurrunt, eum in causa fore judica. Hæc ille.

Arthritis
gallica signa.

Arthritis vero gallica fit, cum partium excrementa sensim colliguntur, sine defluxione admodum manifesta; & cognoscitur, quod fiat sine tumore, sed cum dolore totius periosii: dolet caput, vel sternon, vel omoplate, et si nullum adit ulcus manifestum vel intra vel extra cutem, quod nonnullos decepsisse scribunt auctores. Patiuntur hanc pituitosi, statim post bubones venereos non suppuratos, sed repercussos vel propter intemperie adhibita remedia, vel usum vini statim à sudoribus: multumque exsiccantibus juvantur. De nocte & temporum mutationibus exacerbatur vel excitatur, maxime flante austro, & modico lecti calore. Signa vero arthritidis ex simplici intemperie ortæ, vel ex flatibus, sunt apud Guainerium & Valescum de Taranta.

Arthritis à
ficcitate.

Ita etiam Petrus Salius Diverfus lib. de Affect. part. cap. xvix, cum per nomen arthritidis intelligat omnem articulum impeditum motum & dolorem, arthritidem à ficcitate (quam nos pseudarthritidem nominabimus) oriri putavit auctore Hipp. lib. de internis affect. qui, ubi coxendicum dolorem à bile generari affirmavit, pariter eundem dolorem à ficcitate articuli generari testatur est: per ficcitatem non intelligens intemperiem siccam partium solidarum articulum ipsum constituentium, videlicet ossium, ligamentorum & tendinum, sed consumptionem ejus glutinosæ humiditatis, qua naturaliter nutritur, & ad faciliorem motum subungitur articulus ipse. Talem humorem continere natura articuli subministrat, ne exsiccati ad motum inepti reddantur. Cum autem (inquit Salius) contigerit humiditatem hanc aliqua ex causa, quæcumque ea exiterit, exsiccare, tunc articuli motus impeditur, difficultasque in motu ac dolor una succedit. Hujusmodi affectum, si in coxæ articulo fiat, vocat libro citato Hippo-

crates ischiadem coxendicumve dolorem, perinde ac vocet eos, qui à fluente generantur materia. Quem eundem affectum ego non in solo coxæ, sed in quocunque alio articulo gigni posse animadverti, hincque fieri alteram arthritidis differentiam notavi, si per arthritidem omnem articulum dolorem & impeditum motum intellexerimus. Consumpta enim ea humiditate, quæ ex naturæ præscripto articulos subungit & humectat, coguntur ac in unum compinguntur articuli: unde ad motum inepti ac impotentes redditi, dolore ex quocunque levissimo motu cruciantur. Tales articulum dolores in constitutionibus siccioribus Hippocrates lib. iiii, Aph. xvi, fieri monebat. Quoniam ut docebat Galenus, in ejusdem aphorismi commentatione, immodicæ aëris siccitatis articulum humiditatem consumentes, eos ad motum difficiles ac impotentes reddunt, doloremque hinc nonnunquam invehant. An autem tales affectus vere sub nomine arthritidis comprehendantur, visus est negasse ibidem Galenus; cum tamen rem indeterminatam reliquerit: qui cum de nominibus parum sollicitus fuerit, ideo hanc partem, quæ circa nomen arthritidis, & non circa ejus essentiam versatur, neglexit. Si autem nos per arthritidem morbum in articulis à materia fluente factum intellexerimus, tales dolores ac articulum impedita sub nomine arthritidis non erunt recensendi. Si vero omnem articulum impeditum motum ac dolorem pro arthritide accipiamus, hi proculdubio arthritidis nomine vocandi erunt. Quam sententiam Hippocrates lib. cit. de affect. internis clare admisit, pariter coxendicum dolorem hunc ac eum, qui à materia articulos occupante causatur, appellans. Qui dolor à sola humiditatis naturalis articulum consumptione, non à sicca partium solidarum, ut jam dictum est, ipsum articulum constituentium intemperie dependet: quoniam quandocunque illa naturalis humiditas abundaverit præsensque sit, non adeo insigniter exsiccare poterunt partes articuli solidiores, ut hinc impeditus motus aut dolor succedere queat: deficiente tamen hac humiditate ac supra modum exsiccata, nonnunquam etiam communicatur hæc exsiccatio partibus ipsis solidis: & hoc potissimum, cum à causa externa & valida ortum ea habuerit: hincque admodum exsiccati supra articulum tendonibus & partibus nervosis, in hac affectione consueverunt aliquando, ut notavit Hippocrates, succedere convulsiones, quas quandoque sequuntur & febres, quæ ratione doloris & cruciatus accenduntur. Hæc de nomine & essentia hujus affectus habet Salius: nunc causas recensens, inquit: Quæcumque humiditatem articulum naturalem resiccare & consumere apta sunt, ea omnia talem coxendicum dolorem, talemve arthritidem causare poterunt. Vnde & diurnum ac vehemens exercitium sub sole factum, ut habet Hippocrates lib. de affect. intern. & ficcitates aëris immodicæ, ut habet libro iiii, Aphor. xvi, possunt esse eorundem causæ: pariter & visus exsicicans hoc idem causare poterit; quoniam hinc consumptis humiditatibus internis, etiam illæ, quæ ad articulos naturaliter defluere solent, multoties consumuntur: cujus ratione, ut recitat Hippocrates vi Epid. sect. iv, qui

qui in Aëno leguminibus (quoniam talis victus est exsiccatans) vescebantur, infirma habebant crura: & quætales (quoniam hi leguminibus ficiore sunt) condebant, genuum dolores patiebantur. Quod idem & longæ & diuturnæ agnitudines, quæ corpus exsiccare aptæ sunt, agere poterunt; unde videmus aliquando convalescentes, qui ex huiusmodi morbis liberati fuere, male incedere, ad omnemque motum ineptos esse: qui si etiam coguntur deambulare, non levem articulorum præsentunt dolorem, qui deficiente ipsorum articulorum naturali humore succedere consuevit.

Natum omnium causarum signa ex se patent. Nam omnes hæc causæ sunt præcedentes, quæ vel ex agrotantis relatione, vel ex sola Medici inspectione nullo negotio comprehendendi possunt. An autem sicuti ab externis ita ab internis causis possit talis affectio procreari, si quis quæreret, dixerim hoc pro possibili admittendum esse, cum huius humiditatis pariter ac cuiuscunque alterius partis nil sit, quod exsiccationem impossibilem reddat: hoc tamen non ita experimento comprobatum est. Quare pro huius affectionis cognitione sufficiant ea, quæ de exterioribus causis exposuimus. De quibus hoc advertatur, quod ex omnibus molestior ea est affectio, quæ à vehementi & diuturna exercitatione sub sole facta occasionem habuit. In hac enim dolores sunt multo quam in cæteris faciores, ac æstus una cum caloris sensu existunt, faciliusque his superveniunt febres, aliquando & convulsiones. Quare quod ad prognosticum, hæc erit cæteris difficilior & periculior: reliquæ autem non ita sævæ sunt, & minori cum discrimine affligunt agrotantes, ac minori cum labore ab his iudicantur. Quæ omnes affectiones quomodo præsententur cognoscendæ sint, superfluum esset enarrare, cum ex sola articulorum resiccatione & compactione, omni tumore absente, ac ex sola inspectione prudenti medico patere possint.

Signa prognostica arthritidis veræ sunt alia, quæ morbum præfagiunt, alia quæ curabilem vel incurabilem indicant. Præfagiunt artuum debilitas ex parentum semine contracta, si intemperantia vitæ adjuncta sit, & alia causæ internæ atque externæ. Mulieres podagra non laborant, nisi cum menstrua defecerunt, vel sint admodum diminuta, & ipsæ in victu intemperantes. Sic puer non laborat podagra, nisi ante usum Veneris: & eunuchus podagra non laborat, teste Hippocrate Aph. xxviii, xix, xxx, sect. vi, quod ita tamen intelligendum est, si factus sit eunuchus, cum adhuc puer esset. Nam si cuipiam secentur testes, qui podagricus est, & intemperanter vivit, eum non credo posse à podagra liberari. Rustici in Italia raro hunc morbum sentiunt, neque servij in Germania aliquando. Quibus podagrici dolores instant, iis vere & autumnio magna ex parte moventur: quoniam eo tempore redundantium humorum major copia & commotio. Sed nonnullis tanta est intemperantia vitæ, vel motionis humorum celeritas, & partium summa debilitas, ut non tantum semel aut bis in anno, sed ter quaterve aut pluries iis molestantur. Imo observati sunt aliqui mensuris fluxionibus toto vitæ tempore cruciari. Quibus vero jam instat podagra, iis ut plurimum hoc peculiariter præcedit, quod non sudent vel mingant, ut solebant. Dixit

Hippocrates Aph. xix, sect. vi: Quibuscunque morbi podagrici sunt, nis sedata in quadraginta diebus inflammatione finiunt, modo (addit Gal. in Commento) medicus in curatione nil deliquit, & ægri sint obedientes. Sed sciendum est podagras pro natura humorum eas facientium citius vel tardius finiri. Nam ex bile vel sanguine ortæ citius, quam quæ ex pituita sunt, terminantur. Imo ex bile si oriantur intra septem vel quatuordecim dies, si modicæ sint, solvuntur; ut idcirco Hippoc. aphorismus mihi videatur esse intelligendus de ultimo termino. Eum videlicet esse quadagesimum diem, nec ulterius protendi, ex quacunque etiam materia podagra oriatur: ita tamen ut non neget intra hos dies multos à podagra liberari. Ego tamen usu medendi cognovi, eos, quos podagra insignis semel aut bis in anno invadebat, ex pituita & bile orta, non facile ante quadagesimum diem fluxionibus liberari, etsi purgantia & venæ sectio ad inhibendam fluxionem essent adhibita. Vel enim de lecto (ubi dolor videbatur plurimum mitigatus) surgentes & obambulantes, ærique exponentes se, iterum in eadem parte affecta radicabantur, vel aliis novis fluxionibus & doloribus capiebantur. Quare nonnullis podagricis consulo, ne citius aëri se exponant, vel ad solitum cibum redeant, etiam si omnis dolor evanuerit, antequam attingerint quadagesimum diem, vel nullus frequentior pulsus amplius animadvertatur: aut febricula levissima, ex qua sunt solitus fluxiones prædicere, præsertim si una cum urinæ spumæ corona supernatare videatur. Imo moneo ut omnes podagrici in principio per quadraginta dies, etiam si levis podagra sit, curationem instituant, ne radix mali in corpore relinquantur. Ajunt nonnulli præctici, in biliosa arthritide si multum se repleat, interficit, habetque suas periodos, & non inducit spasnum. Urina crassa alba copiosa eam quandoque judicat: febribus superveniens cum crisi, vel hæmorrhoidum fluxus, vel varices. Interdum febres continuæ in arthritidem terminantur. Vnde Avicennas: senes huic malo apti, & longas agnitudines habentes, & convalescentes maleque se gubernantes. Chiragram citius reliquis desinere, non semper verum est. An podagra curari possit certatur sententia vulgi contra medicos. Sed dico quod quibus intemperantia sanatur, iis quoque podagram facile sanari, modo ex qua materia seu causa oriatur, probe cognitum sit ab eo, qui tales curat ægros. Et ideo inquit Trallianus contra eos, qui hunc morbum statuant incurabilem: Vbi differentia recte cognoscuntur, faciles sunt curatu omnes istæ affectiones. Notæ sunt plurium historia, qui vel temerario vel fortuito ac levi medicamento liberati esse dicuntur. Narrant auctores, coelo duntaxat mutato in quibusdam desisse podagram, Marcus Agrippa pedum gravi morbo conflictatus (loquor cum Plinio) cum dolorem eum perpeti nequirit, dummodo illo dolore careret, volebat potius usu pedum sensuque omni carere. Democritus itaque in acetum calidum cruribus, ab eo morbo evasit. Quidam neglecto vino, annuo aquæ potu usi, eo cruciati toto vitæ spatio liberati sunt. Tutam enim valetudinem permittit saluberrimus aquæ haustus. Vini potus largior in Creta, annorum intervallo (nam vina gypso & calce concinant)

Qui morbi in arthritidem terminantur.

An podagra sanari possit.

Podagrici multis sanati.

Podagra non laborat nisi ante usum Veneris.

Podagra non laborat nisi ante usum Veneris.

Podagra non laborat nisi ante usum Veneris.

Podagra non laborat nisi ante usum Veneris.

Podagra non laborat nisi ante usum Veneris.

nant) etiam validissimos homines advenas articu-
lari morbo corripuit: qui exinde manibus pedi-
busque distortis nodosisque, neque calces inducere,
neque manibus quid tenere potuerunt. Sed aliud
exemplum subtexemus, ne podagrici desperatio-
ne valetudinis remedia negligant. Sextus Pompe-
jus Prætorii viri pater, Hispaniæ citerioris Prin-
ceps, cum hordeis suis ventilandis præfideret, cor-
reptus dolore podagræ, merfit in triticum sese su-
per genua; levatusque siccatis pedibus mirabilem
in modum, hoc postea remedio usus est. Vis tan-
ta est, ut cados plenos siccet. Hæc Plinius lib. xx,
cap. xxv. Cæterum eæ podagræ, quæ jam inci-
piunt omnes facile curantur, si modo purgentur
diligenter per quadraginta dies cum debita victus
ratione, ut omni cacochymia corpus liberetur.
Alioqui relictis in levi podagra cacochymia reli-
quiis, ubi ægri se sentiunt paululum à doloribus li-
beros, denuo ad intemperatam vitam redeunt, at-
que ideo nunquam liberantur: quia quo magis ac-
cumulantur humores pravi, eo sapius eos natura
cogitur expellere ad articulos; quo fit, ut primum
quidem singulis duobus aut tribus annis, deinde
annuatim, mox bis in anno, tandemque sæpius ar-
ticularibus morbis crucientur. Eæ vero arthritis,
quæ multos annos invasit ægros, difficulter cura-
tur; multoque magis, si ex mixtis humoribus fiat.
Imo in senibus mitior quidem reddi potest; curari
vero nunquam, si per multos annos antea oppres-
serit. Ovidius illo versu,

Solvere nodosam nescit medicina podagram,

Tum sibi tum aliis etiam hodie persuadet curabi-
lem non esse arthritidem, quæ nodis circa arti-
culos facta insignis est. Quod tamen falsum est:
Vidi enim nodosam podagram in ætate juvenili, &
consistente curatam. Trallianus notat electua-
rium, quo podagricorum nodi intra annum sunt
soluti. In senibus verum tamen est ob plures ra-
tiones nodosa in podagram non admittere perfe-
ctam curationem. Concludam igitur cum Hippo-
crati in secundo Proorrhæti. hæc ait: Qui aut senes
sunt, aut (legerem, &) circa articulos callos ha-
bent, aut ærumnose vivunt alvo adstricta, hi om-
nes sanari non possunt humana arte, quantum ego
novi. Sanant quidem hos optime dysenteria, si
successerint; sed & aliæ eliquationes valde pro-
sunt, quæ ad internos locos repunt. Qui vero ju-
venis est, necdum super articulos ex callo tubercu-
la habet, & accurate vivit, & laboris amans est,
& alvum bonam habet, ad obediendum medica-
mentis, hic sane medicum prudentem nactus, sa-
nus fieri poterit.

Duplex in arthritide proponitur curatio, una
præservativa, altera curativa sic dicta. In illa scopi
sunt cacochymiam & plethoram auferre, &
prohibere ne amplius hæc generentur, partium
principum intemperiem corrigendo: præterea
articulos laxos ac debiles corroborare, & partes
per quas fluit humor, angustas reddere & astrin-
gere: in hac vero, præter dictos scopos, fluentes
etiam humores revellere, derivare, interciperi
oportet, jamque fluxus in articulos evacuari; do-
loresque item, si admodum urgeant, mitigare. In
summa, eadem sunt in arthritidis curatione inten-
tiones, quæ in quatuor tumoribus præter naturam.
Inter præsidia, quæ sunt chirurgica, venæ sectio

principem obtinet locum, non solum ratione ple-
thoræ, quæ semper non adest, sed ratione doloris.
Neque est quod Paulum sequamur, qui ait, jam
sæpius ejusmodi arthriticis fluxionibus conficta-
tos, plus noxæ quam auxilii ex sanguinis detrac-
tione sensisse, præsertim si sint corpore frigido
& debiles. Nam omni arthritidi in primis accef-
sionibus semper venæ sectio confert: in aliis vero
pituitosis, præsertim jam aliquoties fluxione ten-
tatis, non item. Verum locus, in quo administra-
ri debet, variat prout varia est species arthritidis,
vel locus affectus diversus. Si enim universalis est
per omnes corporis articulos, brachii vena media
secanda: si vero pedes laborant, similiter in brachio
mittere sanguinem convenit ejus lateris, cui-
us pes afficitur. Hoc enim melius est, quam venam
poplitis oppositi lateris, secundum aliquos
Galenī auctoritate ductos, aperire. Illa namque
humores fluentes intercipiuntur & revellantur;
hac tantum derivantur, quemadmodum alibi ple-
nius demonstrabimus contra vulgarium medico-
rum receptam opinionem. Non enim habent ean-
dem vasorum rectitudinem, ut putant illi, cum lo-
co affecto pes sinister atque dexter. Frictiones
quoque hic conveniunt in parte ejusdem lateris,
opposita nempe superiori, ut avertant & à pedibus
revellant fluxionem; sintque lenes, si quando par-
vis evacuationibus opus habeamus. Quin & cu-
cubitulæ hic erunt admodum necessariae, si ca-
put huic malo consentiat. Eæ scapulis affigantur
cum scarificatione, si corpus sanguine abundet;
vel parti oppositæ, si revellenda sit fluxio. Si vero
in coxendice dolor est, vena ejusdem pedis saphæ-
na aperienda: si in humero, ejusdem brachii ma-
nus vena, vel cubiti. Si dextra manus laborat, ex
sinistra vena trahatur. Si in genu sit morbus, pe-
dis ejusdem vena aperiiri potest, postquam in cu-
bito secta sit vena ejusdem lateris, & omnis ple-
thoræ suspicio abfuerit. Nam in ischiade dextri
lateris, vena poplitis secanda est secundum Gale-
num, cur non potest in gonagra pedis vena ape-
riri, fluxa jam materia? at si fluere incipiat, prius
in cubito expedit venam tundere, deinde vero
in pede, ut revellamus & intercipiamus priori ve-
næ sectione, derivemus & evacuemus per poste-
riorem.

Cauteria seu fonticuli à multis in hoc affectu
commendantur: & si caput una labore, brachio
sinistro infigantur; cruris vero internæ parti, vel
supra genu vel infra, si jecoris adsit caliditas. In
utroque loco commodè ponitur, si à pituita & bile
oriatur, ut plerumque solet, & jam sæpius homi-
nem invaserit: In dolore coxendicis, vel ischiade,
cruris ejusdem lateris externæ parti infra genu
inuritur. Multi supra articulum fonticulo facto,
ac aliquandiu detento aperto, sanitatem pristinam
sunt adepti. Admoto etiam iis caustico parti in-
ternæ poplitis, qui gonagra molestantur, ab acri
fluxione liberati sunt, evacuata per ulcus ea mate-
ria. Quo fit, ut non incommode veficatoria his
partibus adhibeantur. Trallianus ad podagram
idem commendat: ubi initio, inquit, videris pedes
inflammari, allium levigatum quotidie ipsis indu-
cito, non solvens donec fuerint exulcerati: deinde
urinae pueri impubis, quam calculis marinis
candentibus accenderis, omnia injicito, & utitor;
postea

Podagra re-
centi facile cu-
ratur.

Oculi sen-
tentia de in-
teracta po-
dagra.

Frictiones.

Cucubitulæ.

Cauteria.

Indicationes
curativæ, &
præservativæ.

Vesicatoria.

Venæ sectio.

postea si abinthio pedes obducas, adeo efficax est, ut non amplius podagra infestet.

Lancetia.

Purgationes erunt instituendæ pro peccantis humoris varietate. Si enim arthritis biliosa sit, bilem purgantia erunt danda, prægressio leniente vel ex flore cassiæ aut pulpæ tamarindorum; vel ex syrupo rosarum laxativo cum foliis senæ, vel solutivo cum rosis pallidis infusus, permixta manna. In purgatione humorum biliosorum advertunt practici, permiscenda esse medicamentis bilem purgantibus ea, quæ & pituitam educunt. Quod tamen non video esse necessarium, cum omnia fere, quæ purgant bilem, debiliter quoque purgent pituitam. Ita præparatis prius humoribus per tres dies hoc julepo; Rec. syr. de violis unc. j. aquæ cichorei, endiviæ, fonchi, vel lactuæ ana unc. iij.

Preparatio.

Misce pro tribus dosibus. Potest cum prædictarum herbarum decocto etiam præberi decoctum tamarindorum & sebesten. Vel detur per tres dies, singulo mane jusculum alteratum cichorio, endivia, lactuca, folatro, portulaca, soncho, dente leonis, cucurbita, prunorum, sebesten. Paschasius notat, in dolore magno absque syrups & coctione evacuandam esse bilem, quamvis non sit turgida proprie. Nam quemadmodum, inquit, in vehementissimo dolore narcotica sunt necessaria, quæ dolorem curant causam non auferendo: ita coactæ vacuandus est humor dolorem pariens vehementem sine concoctione, quia est majus auxilium nocumento. Alioquin Aërio visum est, non esse prius evacuandum, quam acrimonia humoris humectata sit & temperata. Purgentur deinde electuario è succo rosarum cum lenitivo vel diacatholico; vel si potio esse debet; Rec. Rhabarb. electi drachm. ij, spicæ scrup. v, fiat infusio in aquæ cichorei vel endiviæ unc. iij, colat. adde syr. ros. fol. unc. ij, elect. diacathol. succo ros. ana drachm. jfs. M. F. potio. Vel fiant pilulæ ex elect. è succo ros. drachm. ij, rhabarb. electi drachm. jfs. cum syr. ros. fol. sol. q. s. Sed hic oritur quæstio, an in solidiori forma convenient medicamenta in arthritide biliosa? item, an arthritis requirat medicamenta purgantia è longinquis partibus? Quod pilulæ in purganda arthritide magis convenient, videntur probare illi, qui existimant in arthritide omni, quando damus medicamenta purgantia, ea præscribenda esse, quæ ex longinquis partibus trahunt, cujusmodi sunt, scammonium, turpethum, hermodactylus. Nam quæ in solidiori forma dantur medicamenta, ex longinquis partibus generosius trahunt, quam quæ liquida sunt. Hinc præscribunt pilulas aureas, quæ multum scammonii recipiunt, vel pil. ex hermodactyl. minor. drach. j, vel scrup. iij; vel elect. è succo rosarum, ut nos fecimus. Contra vero formam pilularum hic minus convenire ajunt respectu materiæ peccantis, nempe bilis, quæ liquidis tutius purgatur quam solidis; deducta enim aliqua bilis sincerioris quantitate ad ventrem magis torquet ægros sua acrimonia & siccitate, unde requirit purgantia, quæ etiam humida sint & actu & potestate, quantum fieri potest. Huic difficultati respondeo, quod oportet distinguere arthritidem, si conjunctum habeat symptoma doloris acerbissimi; tunc oportet post leniens & leviter purgans primas regiones, dare aliud medicamentum, quod

Purgatio.

In forma solidæ an conveniant biliosa arthritide.

ex articulis vel longinquis partibus educat. Vbi vero non est magnus dolor, qui etiam externis leniter placandus est, prius validioribus erit opus, sive in potione, sive in pilulis. Sed si in forma solida capiendi sint medicamenta, post unam vel alteram horam aliquid juris alterati cichoreo, endivia, lactuca, cucurbita superbibere potest. Extat in biliosa arthritide magnis doloribus nobile purgans, quod dicitur Hermodactylata, cujus variae sunt descriptiones, sed hæc egregia, qua Fallopius testatur dolores gallicos optime leniri. Datur à nonnullis in omni genere arthritidis, statim initio ad sistendam fluxionem à drachm. j, ad drachm. jfs. summo mane è jure carnis pingui; & hæc est ejus descriptio: Rec. Hermodactyl. turpethi ana drachm. iij, dactyldii drachm. jfs. zingiberis drachm. j, mastichis drachm. fs. sacchari drachm. vj, M. fiat pulvis. Ejusdem farinæ est caryocostinum Bayri, sic dictum, quod caryophyllos & costum recipiat: Rec. Hermodactylorum alborum, à corticibus diligenter purgatorum, dactyldii ana drach. ij, costi, cumini, zingiberis, caryophyllorum, ana drach. j, contusa cribrentur, & cum syrupo facta ex melle & vino simul coctis, fiat Opata. Datur à drach. ij, ad unc. fs. aut drachm. vj, cum nebulis, aut vino albo non potenti & austero, summo mane. Admiserunt auctores hermodactylis cuminum, mastichem, zingiber, aliaque similia, quoniam teste Tralliano lib. xi, § de Antid. quæ somno dolorem levant, efficiunt, ne ii, qui hermodactylis utuntur, crebrius fluxione, ut aliqui contingit, irriterentur. Alii etiam euphorbium admiscuerunt, arbitrati hermodactylos refrigerantium quippiam habere & narcoticum; alii id negant ob insignem eorum virtutem purgandi: sed falsum esse arbitratur Trallianus. Omnibus enim, inquit, qui biberunt eventit, ut eo die stomachus cibis qui offeruntur, non oblectetur. Idonea igitur sunt, quæ cumino, zingibere & pipere participant, & malitiæ ipsius, qua stomachum offendit, resistunt; sed nullum adeo, ut aloë ipsi adjectæ opitulari potest. Observandum est præterea quod ego facio semper, ut cum præservari debent ab arthritide ægroti, in purgationibus non utamur iis, in quibus ingreditur hermodactylus. Non enim opus est educere humores ex iis partibus, in quas adhuc nil deciderit (nisi antiqua & nodosa sit arthritis, quæ per frequentes accessiones suos habet dolorum recursum) & ideo sumus contenti iis, quæ venas & caput, si consentit, purgant post leves primarum viarum purgationes. Aliqui hic tempore accessions abstinere volunt à præscriptis validioribus medicamentis, & non nisi levioribus esse faciendam purgationem, vel validioribus in minori quantitate, & recte. Nam fortes purgationes humorum copiam insignem à partibus ignobilioribus & externis trahunt ad partes nobiliores & internas. Vnde contingit aliquando nonnullos ab insigni purgante in febrem ardentem malignam incidisse atque funestam, mirantibus amicis in morbo periculum, in quo nullum alias solet esse. Idcirco in arthritide biliosa caute est purgandum, & (ut nonnulli recte monent) tempore accessions instantis oportet necessario lenissimo medicamento ad constringendum dato, ut triphera perfica, quæ lenissime evacuat citra agitationem humorum, uti, ne magis irriteretur

Hermodactylata descriptio.

Caryocostini descriptio.

Purgatio in accessione periculosa.

irritetur defluxio. Atque eo etiam assevero me plurimos blandis medicamentis sæpe repetitis & temperatis, vel non multum calefactis curasse feliciter, quos jam defluxio in pedes & alias partes detinuerat, ut cum proba victus ratione uterentur, non amplius malum redierit. Nec mirum: non enim cum humorem, qui jam in articulos defluerat, per purgantia tollere curavi. Etenim natura sua sponte, levioribus medicamentis paulatim ab onere & multitudine pravorum humorum, qui sunt in venis & prima corporis regione allevata, infurgit ad expulsiorem reliquorum sua vi expultrice, quam paulatim per omnem corporis viam extrudere molitur; per sudores scilicet & halitus factos per cutis poros, per quos etiam discutitur materia in articulos fluxa; per urinas, unde videmus eos, qui à suo paroxysmo incipiunt convalescere, copiosius mingere quam consueverant, ubi vero morbus incipit, minus quam potius requirit; per intestina in qua maxima humorum pars per venas iterum depellitur, quæ si multa sit & confertim fluat, alvi sequitur fluxus: si vero modice confluit, non sequitur, sed à medicamento facile depellitur; & ideo non sunt semper vel singulis diebus præbendæ purgationes, etiam si sit corpus cacochymum, ut in omni arthritide fere esse solet; sed singulis fere quatuor diebus vel pluribus, ut denuo biliosa ac etiam pituitosa materia, ex aliis corporis partibus ad ventrem confluens per venas, prius iterum colligatur in prima regione corporis. Quod autem natura vim quandam singularem semper habeat expellendi pituitam & biliosa excrementa per alvum ex omnibus corporis partibus, probatur exemplo infantium recens natorum, qui cum nondum quidquam comederint, copiosissima excrementa pituitosa, biliosa atque adusta, in ventre dum adhuc essent in utero matris collecta, ab omnibus corporis partibus per duos vel plures dies expellunt. Quod si autem arthritidis fuerit sanguinea, eadem illi purgatio decernenda, quæ biliosa. Sanguis enim inflammatur & in bilem vertitur, ferumque redditur acrius, si in corpore præter naturam copiosius contineatur. Itaque bilem & ferum purgantia erunt danda. Pro pituitosa vero arthritidis purgatione, vomitus, si ægri constitutio ad eum apta sit, in primis decernendus est, per longa intervalla, modo à cibo, modo à stomacho vacuo; sunt autem vomitoria blanda & tutiora, ut oxymel, prius sine, deinde cum raphano, post cenam alium sumptum, & parvo intervallo aquam calidam post sumptam vomitum facere, auctor est Octavius Horatianus. Nam in ventriculū à valido medicamento pituitosus humor attractus, periculum inducere potest. Si valentius queramus proderit oxymel cum jure carnis pinguis vituli vel pulli non saliti, addito oleo amygdalarum dulcium vel decocto hordei cum butyro recenti. Forestus laudat magis vomitum in ischiatica, quam in chiragra, propter diversitatem magis convenientem. Aëtius etiam in biliosa arthritide vomitum præscripsit, ex aqua tepida cum aceti exiguo, vel syr. acetoso permixto. Dabuntur pilulæ ex hiera cum agarico, vel aloephagine, & de aganico, vel assajeret, cum infusione agarici in oxymelite, aut melle rosaceo solutivo & decocto betonice & polypodii. Nam agari-

cum, teste Plinio, facit ad articulorum dolores, si cum aceto mulso pari pondere sumatur. Alibi namque etiam scribit, oxymel sumptum simpliciter credi articulorum morbo conflictatis prodesse. Extenuentur & detergantur per quatuor vel quinque dies humores melle rosaceo colato, vel oxymelite, syrupo è betonica, è stæchade (ante perfectam purgationem à diureticis semper abstinentes, quod notent quidam, calculo renum & vesicæ affectos ex usu longo diureticorum ex arthriticis ægros evadere) cum decocto betonice, florum rorimarini, salviae, ivæ; stæchados, ligni guajaci & aliis eorundem, aromatizatis cum pulveris diarrhodon abbatis drachm. ss. pro singula dosi. Postea eadem purgantia repetantur, vel capiat pil. imperialium scrup. iij. vel elect. diacnicu drach. iij. vel pilularum foetidarum & arthriticarum vel sine quibus drach. j. Si fuerit melancholica arthritidis, confert pro leniente dare elect. lenitivum & diacathol. cum trochisc. de violis siue scammonio. Si atra bilis fuerit, decocto epithymi, fol. fenæ, polypod. florum cordialium, fumarie, lupulorum, cum syrupo rosaceo solutivo. Preparatio fiat cum syr. è fumarie, scolopendria, è succo buglossæ, vel violarum cum decocto fumarie, loriginis, ceterach, lupulorum, polypodii, melissæ. Purgatio fiat cum elect. diacatholon, & confectioe Hamech, vel diaphanicon. Vel fiat potius, quæ Rec. Herb. fumarie ceterach, capilli veneris, melissæ, florum cordialium ana manip. ss. glycyrrhizæ, polypodii, uvarum passul. ana unc. v. coquantur in aquæ suff. quant. ad unc. v. addendo in fine epithymi unc. ss. vel drach. iij. decocto per cribrum colato addantur cassiæ fistulæ, vel mannae calabrinæ unc. v. confect. Hamech, diaphanicon ana drach. iij. syrupo violacei fol. unc. j. M. pro potu, capiat in aurora. Deinde alternis diebus, quia hic humor est rebellis, detur decoctum epithymi ad drach. ij. in fero caprino cum drach. ij. cort. myrobalanorum indorum infusorum in fero caprino per duodecim horas. Vel singulis diebus, per septem dies, capiat decoctum hellebori nigri preparati ad drach. j. in feri caprini cum floribus violarum & buglossæ alterati, libra una. Ultimo dentur pilulæ Indæ, & arthriticæ, ana scrup. ij. Sed raro contingit ab atra bile arthritidis, plerumque ex mixtis humoribus originem trahit, & propterea mixtæ debent esse in purgantibus prescribendis intentiones, hoc est, danda erunt medicamenta purgantia, quæ & bilem flavam, & atram, & pituitam purgent simul.

Purgato corpore, partium principum intertempores corrigatur ea ratione, qua in eorum morbis à practicis est traditum. Nonnulli statim veniunt ad ea, quæ nervos & articulos roborant, internis remediis; externis vero pugnant cum parte affecta, ejus dolorem mitigando, & debilitatem corroborando: sic statim, facta purgatione, accedunt ad usum resinæ therebinthinæ, quæ nervos munit, alvum solvit, jecur, lienem, renes, pulmones, & intestina abstergit: dant mane singulis septimanis facta concoctione drachm. ss. cum aqua ivæ lotam, hybernis temporibus præcipue. Fernelius, si humorum, inquit, reliquæ fumendis digerendæ, dissipandæque videbuntur, in id apta erunt simplicia, quæ ad cerebri affectus supra attulimus;

Lenientia in
melancholica
arthritide.

Preparatio.

Purgatio.

Purgatio in
sanguinea.

Vomitoria in
pituitosa.

Corroboran-
tia.

quandoquidem nervorum eadem atque cerebri est ratio. Proprie vero, & particulariter ad artuum dolores hæc commendantur; helenii radix, & iris, chamæpytis, verbascula duo, calamenthæ, acori radix, centaurium minus, hermodactylus in apozemata aliæve compositiones aptandus. Herba chamædrys, inquit Innominatus, in pulverem tenuissimum redacta cum aqua calida paregoricum est. Dosis sit drach. ss. vel j. Dioscorides chamædryos decoctum, betonicam herbam in vino amomi aut androfoces, aut mel decoctum cum aqua, succum è centauro minore, arthriticis assumpta subvenire dicit. Iuvare item & esum viperæ, de quo & infra dicemus. Extant apud Alexandrum Trallianum, & Plinium Valerianum antidota, quibus in totum quempiam liberari promittunt: ea mane quinque vel sex horis ante cibum debent assumi per annum, cum optimo vitæ regimine. Sed in causa calida nil magis puto convenire, experientia edoctus, quam pulverem foliorum cichorii sylvestris, mense Majo collectarum & in umbra exsiccatarum: ejus datur drach. j, vel scrup. ij, cum jure carnis pulli non saliti, mane quatuor horis ante prandium, & vespere cum vadit dormitum, vel absque cœna, vel cum cœna parca: hoc vidi in biliola podagra incipientes jam fluxiones ita cessasse, ut mitior paroxysmus redierit, & breviori tempore durarit, duobus vel tribus diebus continuis assumpto. Verum in causa frigida, vel mixta ex frigidis & calidis humoribus, conducent summopere antidota prædictorum auctorum, diacoralium Tralliani, Theriaca Andromachi, & Mitridatium, tum etiam antidotus alexipharmaca contra luem gallicam Fernelii; de quibus drach. j, per autumnum & hyemem fumere satis est, superbibendo mane unc. iij, vel v, aquæ communis tepidæ. Antidotus podagrica nostra, Rec. Trochisc. de vipera, fol. centaurii minoris, chamæpytis, betonicæ in umbra cum charta ficatarum, ana unc. j, chamædryos unc. ij, rad. gentianæ, aristolochiæ rotundæ, pæoniæ, bardanæ, ana unc. j, baccarum lauri, myrrhæ, rhabbari electi, spicæ nardi, ana unc. ss. caryophyllorum drach. ij. In pulverem cuncta redacta serventur in vitreo bene clauso, vel cum melle despumato fiat electuarium ad formam opiata: dosis in pulvere scrup. j, opiatae drachma una, superbibendo aquam tepidam. Hastulæ regię radicem drach. j, pondere potam dolores podagræ sanare Plinius auctor est. Quidam ossium humanorum cinerem, vel alterius animalis quadrupedis à drach. j, ad drachm. ij, dant secundum Rhafem ex aqua communi. Guainerius insuper jubet chiragricum fumere ossa manus, podagricum, pedum, ex syrupo convenienti. Valet & pulvis stomachi vulturis, vel pulmonis vulpis, sæpe bibitus ex syrupo de iva, vel cichorea. Verum mihi inprimis placet statim à purgatione non tantum pro curatione paroxysmorum, sed etiam pro præservatione impostherum decoctum falsæ, chinæ, atque ligni guajaci, alteratum cum iis, quæ & roborant partes internas, & humorum peccantium reliquias (quæ recidivas facere consueverunt) tollant digerendo per sudores, ac per vicium exsiccando intemperiem quoque partium corrigant. Idcirco si bilis abundans arthritidis causa est, decoctum chinæ opitulabi-

tur, alteratum cum cichorea, endivia, plantagine, soncho, quibus nil eorum indendum est, quod vel nervos vel articulos roborare dicatur: quod ea suo calore impediunt jecoris refrigerationem, quæ in hoc casu procuranda est, ad prohibendum materiæ biliosæ regenerationem. Imo multi curati sunt solo cichorio vel dente leonis, vel soncho; datis eorum per quadraginta dies succis ex jure pulli non salito, vel concisis herbis, & ad spissitudinem pulvis coctis, ac comestis pro jentaculo summo mane: quibus mire jecur ab obstructionibus & intemperie liberatum vidimus. Externis prædictis dum sumitur simile aliquod decoctum in præservationis cura, erunt articuli iis corroborandi, quæ mox recensentur. Capere decoctum poterit per triginta dies cum victu neque admodum exsiccante, neque multum humectante, neque valde tenui. Comedat carnes vitulinas, vel gallinarum & caponum assas, panem bene coctum.

Quod si autem doloris necessitas, vel initio paroxysmi dum purgatur corpus, vel post purgationem dum capitur decoctum chinæ sudorificum, topicis eum mitigari postulet, fomentum cum panis lineis sæpe sæpius renovatis imbutisque ac madidis lacte vaccino recens multo maxime proderit. Fuerunt etiam podagrici, qui capram in cubiculum adductam supra dolentem partem emulgeri jusserunt cum magno levamine. Possunt & alia lacti permisceri in eundem usum; ut farina hordei, panis medulla, oleum violaceum, rosaceum, lumbricorum, unguentum populeum, ut fiat cataplasma: quod fiet validius, si lactucæ, sempervivi, portulacæ, cichorii, solatri folia, vel sola coquantur, vel lacti permisceantur, una cum mucilaginis sem. psyllii, althææ, cydoneorum, extrachis cum aqua rosarum, vel solatri, vel plantaginis: quæ mucilagines quoque per se solæ conveniunt illitæ. Sed cum admodum refrigerantibus caute progrediendum; itidemque notandum, ut quando lac cataplasmatibus inditur ad sedandum dolorem, parum vel nihil (si fieri potest) coquatur, ne pars serosa, quæ vim habere dicitur anodynæ, evanescat, vel lac fiat coctione acrius, & caseosa atque emplastica, quæ relinquitur, sua adstrictione magis noceat. Foretiss, solo lactis cremore oblinendo partes affectas, dolore intensissimum mirum in modum sedavit. Idemque refert Simonem quendam Leidanum, lentunculam palustrem & flores chamomeli decoxisse in lacte, addendo parum farinæ hordei in fine in modum cataplasmatiss, & apposuisse ad sedandum dolorem cum maximo miraculo, in progressu vero plus farinæ hordei addidisse. Vtor quoque interdum Fernelii fomento ad podagræ chiragræque dolores, præscripto ex aquis stillatitiis rosarum, plantaginis, solatri cum aceti quadrante, quod reprimat fluxiones, & collectam materiam quodammodo discutit. Plinius, radicem cucumeris podagricis decoquit in aceto pro præsentaneo remedio: item ramenta corticis cucurbitæ recentis ad podagram refrigerandam. Opitulatur etiam frequenti experimento ovi luteum cum oleo violacæ subactum, vel aquis stillatitiis prædictarum herbarum, aut earundem succis: præterea pulpa cassiæ fistulæ cum succo solatri vel aqua, juxta

Villmaria.

Topia.

Cichorii folia
sive folia.Anidolus
podagrica
etere.China deco-
ctum.

Avicen-

Vinaris aqua
stillatitia.

Narcotica.

Avicennam, æstate frigide cum pannis lineis, hyeme tepide applicetur. Dicitur & aqua ranarum stillatitia, & oleum mirabiliter hic prodesse, tum experientia quorundam, tum Plinii auctoritate; qui lib. xxxi scribit oleum articularibus morbis utilissimum esse, in quo decocta est rana & ipsius intestina. Plinius Valerianus muscum, qui in aqua nascitur, tritum & impositum commendat, & limum aquaticum cum oleo subactum. Apud Moravos Olmutienses nobile nuper hoc experimentum didici pro sedandis illico doloribus podagricorum. Rec. herbam barbicapram, quæ alias dicitur ulnaria apud vulgum & Brunsfelsio Primon; ea cum suis radicibus floribusque destilletur, & in aqua hac panni linei madefacti imponatur podagricis, vel cum penna illinatur articulo dolenti, juvabit plurimum, nec citra rationem. Cum enim adstringere dicatur & refrigerare; articulo calidis fluxionibus reprimendis & sistendis plurimum conducere potest. Sutor quidam Viennæ natura biliosus, podagra circa magnum pedis pollicem atrociter corripitur, multis remediis frustra tentatis, tandem omni dolore liberatur cataplasmate sæpius de die renovato ex stercore vacino recenti in sartagine cum butyro fixo, quo postea & alios ab immanibus doloribus sanavit. Dioscorides in Euporist. five parabilibus, stercus bubulum calens imponit podagræ; & stercus caprinum tritum cum axungia & veteri caprillo adipe. Expertus fuisse piscis cyprini inunctum profuisse podagricis. Sed communiter in omni fere arthritide à quacunque causa oriatur, soleo feliciter uti (si quando potest applicari) cataplasmate ex vino & panis medulla facto. Si sit causa calida vinum rubrum capio, cui addo oleum rosaceum: si frigida vel mixta, vinum album cum pulvere florum chamæmeli, fursibus bene tritis & oleo rosaceo. Hoc autem cataplasma ex pane & vino non modo omnem fluxionem repellit, sed & influxum humorem non modicioriter digerit: imo instante paroxysmo, si manibus vel pedibus applicetur, prohibet chiragicam vel podagricam fluxionem, quamdiu adhibetur parti debilitatæ, ut in multis experti sumus, tum præcipue in Principe de Liechtenstain anno 1613. Barbari quidam, emplastrum ex scordio in aceto cocto, vel mixto cum aqua, omnibus podagricis conferre scribunt. Notandum omnia ea, quæ podagricis in causa calida applicantur, ad tollendos vel mitigandos dolores, æstate frigida, hyeme tepida esse adhibenda.

Dolores autem intolerabiles, nec prædictis remediis mitigati, narcotica requirunt, cum ea tamen cautela, ut simultaque sint mitiores redditi statim à narcoticis abstineatur, quæ etiam in exigua dosi erunt præscribenda. Longior enim eorum usus & in majori quam consuevit copia constringendo humorem influxum, ac in topus vertens, motus articulo rum perdifficiles parit & tardos longo tempore, & sensum obtusum; unde ablato calore, calefacientibus erunt partes fovendæ, roborandæ ac succandæ. Igitur narcotica in tali cataplasmate poterunt adhiberi: Rec. far. hordei unc. iij, medullæ panis tritici unc. ij, lactis q. s. ad ignem parvum misce, donec coctat ad consistentiam mellis, cui adde olei rosacei unc. j, vitellos

ovorum ij, opii scrup. j, cui & drachma seminis hyoscyami addi potest, & scrup. ss. castorei, ad corrigendum opium, præsertim si aliquis humor pituitosus permixtus esse videatur. Rondeletius crocum imponderet: quia ubi opium vel hyoscyamus vel mandragora ingreditur medicamenta, croco corrigit. Palschafius hoc cataplasma laudat in doloribus intolerabilibus à causa calida: Rec. far. hordei sine fursure, medullæ panis ana p. j, fol. hyoscyami, malvæ, violarum, ana M. j, florum chamæmeli, corticis papaveris albi, ana p. j, ex his decoctis fiat cataplasma, addendo oleorum lumbricorum, & papaveris, ana unc. j, opii & croci, ana drach. ss. quod cataplasma super folia lactuæ, supposito panno lineo distendatur, & forinfecus imponantur super cataplasma folia betæ. Post usum horum narcoticorum vel anodynorum refrigerantium calidis fomentis, ut decocto pulegii, salviæ, origani, calamint hæ, centaurei minoris & similibus in aqua vel vino, loci dolentes irrigentur ac corroborentur, ne frigiditas nimia adhibitorum quidquam noceat. Porro arthritidis, quæ est à sanguine iisdem anodynis tractatur quibus ea, quæ à bile fit, nisi quod in hac, quæ à sanguine fit, refrigerare conveniat cum minus humectantibus & relaxantibus. Vnde eligenda sunt, quæ exterius applicantur, refrigerantia, cum iis quæ nonnihil exsiccent & adstringant, & modice quoque discutiant. Parietaria in aqua vel posca cocta foveantur pedes. Nam hujus herbe decoctum teste Appulejo mire sanat podagram, si pedes eo foveantur. Conducet etiam cataplasma ex lacte, pane & oleo rosaceo omphacino cum succo sempervivi. Vel Rec. far. hordei, fabarum, ana unc. ij, coquantur in vino & aqua ad consistentiam cataplasmatibus lævigati, addendo in fine olei rosacei unc. ij, pulv. foliorum parietariæ drach. ij, Misce. Coquitur & aliud cataplasma ex medulla panis in posca cum oleo rosaceo & pulv. florum chamæmeli. Omnis etiam generis inflammationi conducit medulla panis aquæ frigidæ immerfa, & cum oleo communi subacta in formam cataplasmatibus. Emplastrum expertum apud Plinium Valerianum extat, quod semper nobiscum ferre possimus; Rec. cerussæ & spumæ argenti ana unc. iij, ceræ puniceæ unc. sex, axungie porcine veteris colatæ lib. i, cerussam vero & spumam in thebaico mortario tamdiu teras donec in pulverem redigas, ceram autem & axungiam solves, & pulverem totum paulatim admiscebis, & levato cacabo immittes manum, & agitabis tepidum donec omnia solvantur, & sic in patellam fundes, ut congelet, ferventurque munde, & cum opus fuerit maxillatum cum oleo rosaceo imponatur.

Neque interea dum fluit materia, supra partem dolentem applicanda sunt repercutientia & valde constringentia, præsertim in augmento doloris & inflammationis. Etenim augentur his dolores, tum quia prohibent aliquam materiæ per poros cutis expirationem, tum quia coarctant & constringunt articulo rum partes sensitivas & vasa. Convenient hæc constringentia (quæ repercutiva barbaris dicuntur) initio inflammationis paulo supra articulum posita, ut si in pedes fluxio fiat, supra articulum pedis in media tibia; si genu articulus

Palschafius
cataplasma.Anodyna in
sanguine ar-
thritide.Plinii Vale-
rianus: empla-
strum.

Repercutientia.

dolere incipiat, in femore. His enim locis trium vel quatuor digitorum transverso latitudine pannus lineus unguento constrictivo, vel cataplasmate, vel linimento imbutus circumcirca imponitur. Pulvis constrictivus albumine ovi & aceto exceptus circumducitur. Vel cataplasma ex fructibus loti arboris (guajacum Patavinum dictæ apud Herbarios) nondum maturis, pyris sylvestribus, malis cotoneis, forbis, cornis aut eorundem succis, exceptis pulvere myrtillorum, balaustiorum, fumach, radicis bistortæ, additis bolo armenia vel sanguine draconis, farina fabarum & lentium, acacia, hypocisthide, portione aceti & olei rosacei omphacini, myrtillorum, cotoneorum, nenium & statim arescat cataplasma. Item Rec. boli armenia orientalis unc. j, fs. lithargyri argentei unc. fs. succi mali granati acidi vel cydoneorum, aceti, olei rosacei omphacini, ana q. s. M. fiat linimentum forma nutriti. Ceterum ubi materia non amplius influit, sed quæ influxit crassior facta fuerit, concoquens ac digerens cataplasma imponendum est, cum refrigerantibus castigatum. Tale est, quod Rec. rad. althææ & malvæ ana unc. ij, parietariæ, violariæ, malvæ, florum violarum, meliloti, ana m. j, coctis in aqua & confusis adde farinæ hordei unc. iij, farinæ sem. lini & foenigraci ana unc. j, fs. vitellos ovorum ij, olei rosacei & chamæmelini ana unc. j, fs. M. fiat cataplasma. Post cuius usum apponi potest diachylum simplex, vel diaplasma emplastrum cum oleo amygdalarum dulcium vel liliorum alborum mollificatum. Alexander Trallianus articulis statim, inflammatione tentari incipientibus, cataplasma inducit, quod ex cortice mali punici & rhœ obsoniorum diligenter in vino coctis, addita polenta & sempervivo parat. Ad ejus imitationem ex Galeno Bayerus mirabile esse dicit hoc cataplasma, quod Rec. corticem mali granati M. ij, coquantur in vino ad mollitudinem; postea Rec. fol. sempervivi, cymarum rubi ana M. j, confusa cribrentur & adde far. hordei non maturi M. j, cum sufficienti quantitate vini prædictæ decoctionis fiat cataplasma coctis omnibus parum: imponatur articulis æstate, frigide; hyeme, tepide. Aucta inflammatione fovet Trallianus cerembrocho dicto fomento, quod constat ex sapæ partibus duabus, rosacei una, & ceræ medico, ut fomentum crassius efficiatur, quod exceptum lanis fuscis imponitur hyeme, tepide; æstate, frigide. At si in profundo fuerit inflammatio nitri paululum & olei dulcis, loco rosacei, sapæ admiscet. Quod si dolor adhuc remanserit cataplasma imponit factum ex foliis brassicæ coctis lævigatisque diligenter, quibus faex aceti, ovorum lutea duo, & rosacei paululum adjicitur.

Tralliani cataplasma.

Bayeri cataplasma.

Tralliani externa medicamenta.

Pituitosa arthritide remedia externa & interna.

Decoctum salisæ & guajaci.

In pituitosa arthritide post universalia convenit decoctum falsæ & ligni Guajacini, prout vel magis vel minus est calefaciendum, & arthritidis est sincerior. Nec est inconveniens decoctum radicis bardanæ, cum incidat, discutiat, sudoriferum sit; & urinas moveat. Applicatam enim foris radicem tritam podagricis succurrere, dolores sedando, testis est Dioscoridæ. Refert Forestus, Vastellum Pensionarium Mechliniensem cum in lecto decumberet ex doloribus articularum, ut nulla membra movere posset, bibisse cerevisiam, in qua radix

lappæ incocta erat; qua epota, cum nullis remediis à medicis curari posset, plurimum minxit lotium album instar lactis, & à doloribus liberatus fuit. Rondeletius dicit se multos vindicasse ab hoc morbo, vel portione aquæ, quibus per defluxionem fiebat, & frequenti vomitu, vel purgatione per alvum. Puto aquæ potum in causa pituitosa sinceriore nullo pacto convenire, quod concoctioni ejus resistat, quæ in hoc malo est perquam necessaria: nisi calor nativus satis vigeat, qui eam concoquat ac per se digerat, interea dum corpus ab excrementis vacuum tenetur, quod fortassis fecit Rondeletius frequenti facto vomitu cum aqua tepida. Idem autor ad corpus humidum exciccandum dat drachm. j hujus pulveris sequentis, hora matutina: Rec. cineris priapi tauri & cranii hominis, ana drach. iij, galangæ drach. j, facchari canti drach. iij, M. deinde revertitur ad pilulas purgantes ex agarici trochiscati & rhabarbari ana drach. ij, rad. aristolochiæ & quinquesfolii, ana scrup. j, galangæ, caryophyllorum, spicæ nardi, ana scrup. fs. malaxentur cum succo brassicæ vel rosarum, & fiant pilulæ; de quibus capiat semel in hebdomada drachmam semis, vel singulis diebus pilulas duas. At instante paroxysmo abstinendum a medicamentis purgantibus, sobria victus ratione præscripta & quiete. Imo antequam infuset paroxysmus per aliquot dies, nempe octo vel decem, non esset à ratione alienum tenuem victus rationem instituire, & postea sic purgare. Quod vero spectat ad externa præidia, si materia jam fluere ad aliquam partem incipiat, defendere eam oportet defensivo supra articulum, in quem fluxura est, apposito, & cataplasma statim inducendum est pedibus vel manibus confectum ex pane vinoque & lixivii modico cum portiuncula salis, ut si quæ materia levis irreplevit, exciccetur, discutiat, prohibeaturque ne alia infuset. Quod si vero jam fluxerit in partem, multis anodynis veluti in causa calida non censeo esse opus, quod podagra à causa frigida non usque adeo doleat. Sæpe arthriticis à pituita contingit, ut cedemata post dolores sedatos remaneant, quæ optime discutiantur fomento ex sale torrefacto sæpe renovato, quod non finit in tophum materiam concrecere, uti Trallianus observavit: vel potest fieri sacculus ex sale torrefacto, milio & fursuribus, quo calido locus affectus sæpe foveatur. At si ex bile & pituita permixta sit arthritidis, anodyna sint ex calidis & frigidis temperata. In podagricis doloribus, cum calore aut frigore præter naturam, Fallopius utitur hoc emplastro, quo valde dolorem sedari scribit: Rec. olei rosacei, chamæmelini, anethini, & lumbricorum, ana unc. ij, fursurum, pulv. florum chamæmeli, farinæ hordei, ana M. ij, cefypi unc. j, fs. aceti unc. j, sapæ unc. x, M. & coque in fartagine ad formam emplastri, quo calido locus fovetur, postea illinitur flore cassiæ. Valent etiam quorundam testimoniiis hermodactyli pulverati & cum farina hordei & vitellis ovorum in massam redacti, quæ massa extensa super lineum pannum loco patienti calida applicetur, per modum emplastri. Ægineta & Trallianus thymum, origanum, saturajam, & calamintham in aceto acerrimo decoquant probe, quo aceto adhuc calido affectas partes non modo semel aut iterum,

Rondeletius pulvis.

Emplastrum Fallopii.

iterum, sed sæpius & frequenter super infundunt & foveant, fatenturque permultos sanatos perfectos fuisse, quibus non modo à pituita, sed etiam à bile erat podagra infesta. At Elidæus de Padoanis, ut ex ms. didici, in causa frigida vel mixtis humoribus biliosis & pituitosis laudat oleum myrrhæ. Ad podagram & omnem tumorem nervorum, herbæ plantaginis folia trita & cum salis modico imposita, optime facere certum est quorundam experimentis. Ad omnem speciem podagræ aut guttæ, suffumigium cum foliis urticæ vivæ ab aliquibus celebratur. Herbam betonicam decoctam ad tertias, & aquam potui datam, ac peræque illam tritam & impositam, mirifice dolores tollere notatum invenio inter experimentatores. Quantum valeant caules rubei, foliis suis ad ignem calefactis & impositis apud Forestum legitur, qui recitat nonnullos his sæpe renovatis, dolores non modo tolli vel leniri, sed & eisdem humores resolvi. Oblinunt nonnulli folia prius butyro recenti & ita applicant, alii simpliciter sine ullis unguentis. Idem Forestus hoc unguento plurimos ab arthriticis doloribus liberatos recenset. Rec. stipites duos sambuci decem vel duodecim digitorum, à quibus extrahatur pulpa interior seu medulla intus latens, demum impleantur rursus crasso sale, & luto utrinque foramina sigillentur, ne sal excidat, postea in tegula ignita sæpius circumvolvendo comburatur, & fiat pulvis, cui addatur olei lavendulæ & rosacei tantum, quod sufficiat & coëat in unguentum, quo loca affecta perungantur. Emplastrum præterea laudat Lucæ medicus Delphenensis in arthritide ab omni causa, quantum in frigida magis convenire videatur. Hoc Rec. ficuum seu caricarum pinguium quantum volueris, contendantur & cum semine sinapios confuso, pane albissimo trito & cocto, atque radice lepidii Germanice *pfesser Kraut*, & axungia porcina, concinnetur emplastrum. Trallianus scribit se quendam novisse, solo sinapi in frigidorum humorum defluxionibus, dum maxime urgerent, accessiones feliciter dolore liberasse. Admiscebat ei frequenter caricas, & cum aceto in emplastrum formabat. Sed in usu (ad quem aliquando pervenire nos cogit pertinacia dolorum, qui interdum immutari nequeunt, nisi aliquod acrius ipsis admoveas) ejusmodi acrium ut sunt sinapi, euphorbium, cantharides, allium, & alia quibus ad phanigmos utimur, observandum, ut cum mollioribus permisceantur, ne tenui humore attracto quod crassius est in articulis relinquatur & impingatur, nimiumque accesserint humores à potenti siccandi & calefaciendi virtute. Dioscorides in Parabilibus, ad podagram commendat sambuci folia cum caulibus trita, additis marrubio & adipe. Experimentum regii cuiusdam chirurgi, inquit Mizaldus, adversus chyras & podagras: Habe manipulum arthemisiæ, deservefacito in oleo dulci olivarum, donec decreseat ad tertias, & eo dolentem locum inunge, senties brevi tempore dolorem fedari. Qui plura cupit, ea apud insignes practicos reperiet fere innumera: apud Dioscoridem & Herbarios non parca. Sedatis jam doloribus reliquæ humorum sunt resolvendæ, ne in totum paulatim, præsertim ex iteratis fluxionibus, concrecant. Inter ea remedia, quæ supra podagræ &

arthritidi convenire inter anodyna recensuimus, non pauca leviter discutunt mixtasque habent vires, tum humorum reliquias dissipandi & exciscandi, tum dolores mitigandi, ut alio non sit opus. At ex iis anodynis, quibus partes affectæ refrigerantur, ad arcendas inflammationes & ardorem humorum compescendum; vel quæ leniunt, temperant atque foveant calorem, sine humorum aliqua insigni discussione pro humorum reliquiis absumendis, inter leviora conveniunt olea liliorum alborum, chamæmelinum, vulpinum, cui addi potest, ut fiat validius, modicum aquæ vitæ: vel oleum irinum, rutaceum, lumbricorum, cum guttis aliquot spiritus terebinthinæ refinæ in causa frigidiori. Valebit etiam unguentum anseris à Guainerio descriptum, adeps viperinus, oleum viperinum, quod fit ex libra una olei antiquissimi, cui incoquitur vipera una cum rutæ manip. 1, hoc pars affecta inlinatur. Sanat integre & est remedium Aboaly. Ex cinere cyclaminis cum aceto & melle factum emplastrum, dicitur esse mirabile: item ammoniacum cum facce vini vel cinere caulium. Stercus caprarum cum hordei farina & oxymelite in forma cataplasmati impositum, discutit egregie, & dissolvit etiam incipientes nodos. Cinis sarmentitius aut ex brassica cum axungia & oleo convenienter illinitur. Nam oedemata discutit, & articulorum nodis, contusionibus ac doloribus mire prodest. Experimentum Plateri & aliorum: Rec. limacias ex cochleis demptas xxv, granorum ebuli recentium, vel loco eorum miaræ & salis ana q.s. in vase mundo vel vitro subtus perusto primum ponantur limaces, tum grana ebuli cum sale, & repetatur, donec totum fuerit impositum; hoc in loco obscuro vel cella vinaria suspendens vas suppones, quod excipiat liquorem, qui supra pannos lineos distentus podagræ apponitur in declinatione, tophum non finit succrescere, & extrahit brevi ex alto humorem multum. Laudatur etiam oleum guajaci, præsertim in lue gallica, arthritidem pariente. Ceratum quod semper ad usus fervetur; Rec. ammoniaci in aceto dissoluti unc. ss. cineris caulium rubeorum, stipitum sambuci, ana drach. j, sulfuris drach. ss. salis scrup. j, olei chamæmelini, liliorum alborum, ana unc. j, ceræ flavæ unc. j ss. M. f. ceratum. Quod si quid remanserit, inquit Mercatus in articulis impactum, antequam ad incurabilem duritiem perveniat, utendum diachalcitide à principio, cum modico sævo caprillo, vel oleo cucurbita, vel postea solo, quo magis resolvat.

Ad corroborandos articulos confert imprimis usus vinaceorum, tempore vindemiarum per dies trigiuta: item balneum in musto, dum adhuc fervet. Arnoldus de Villa nova & Leonellus Faventinus commendant epithema ex filato cannabino seu stappa in lixivio decocta. Plinius radicem cannabis in aqua coctam, podagras & articulos contractos mollire scribit. Balneum nostrum, quo reliquæ humorum ex articulis auferuntur, luxatque ex fluxionibus & ligamentorum relaxatione restituuntur, Rec. lixivii medicis sarmentorum vitium vel ossium humanorum vel aliorum animalium quadrupedum in cinerem combustorum, vini rubei chalybeati, herbarum ivæ, chamedryos, absinthii, salviæ, centaurii minoris, florum rorimarini,

Discussoria
mitiora.

Oleum
persimum.

Oleum
Guajaci.

Articulos
corroborant.

Balneum
Ani-

marini, rosarum rubrarum, chamæmeli ana M. ss. furfurum tritici M. j, bulliant cuncta in vino parum, deinde cum lixivio permisceantur, pro balneo pedum & manuum: genu vero & humerus spongiis in calido balneo madefactis foveri poterunt, vel filtra (ubi minor est quantitas decocti pro balneo) in prædicto decocto sint expressa articulis alligari etiam post balneum, vel sine balneo. Hoc pacto etiam administratam veterem urinam humanam nramiliter profuisse vidimus absque balneo, solo fomento, etiam adhuc persistentibus insignibus doloribus, fortassis ex consilio quorundam barbarorum, qui scribunt: In urina hominis patientis, vel alterius hominis valde senis calefacta intingatur pannus albus non coloratus, & loco dolenti calidus applicetur. Posiunt in calida podagra in lixivio coqui plantaginis & rubi folia, cortices granati, balauftium, abinthium, sal & nitrum, folia myrti cum vino rubro, & salicis cortices. Post hoc ungi locus poterit oleo lentisci & myrtino, rosaceo, omphacino in calidioribus, vel vulpino & mastichino cum salis modica quantitate, vel si causa sit frigida, Rec. olei è lateribus, vulpini ana unc. ij, olei mastichini unc. ss. M. pro linimento. Nonnulli decocto simili, quod pro balneo descripsimus, supra lapidem molarem vel pyritem, vel ferri scoriâ candentem insperso vaporem excitant, & partibus affectis suffumigium parant; quod pannis circumquaque obvolutis ne quid expirat, tandiu applicant, donec parti affectæ sudorem moveant. Atque ego in capitaneo Ieremia, postquam sudasset per viginti dies, cum decocto ligni guajaci & fassæ, plurimum profuisse vidi. Nam cum in fine curationis à balneo, quod pedibus nimis calido adhibuerat, iterum nova fluxio in pollicem majorem sinistri pedis influxisset circa vespem, articulum ubi rubebat, igne ussi, apposto statim emplastro diapalma appellato; & cum crederem crustam decessuram & per ulcus materiam paulatim exituram, nullum factum, nec ultra crusta ab ustione decessit, sed tertio die tumor pollicis evanuit & crusta, quæ exusta erat, sicca permansit, ut statim quo vellet potuerit incedere; quod proculdubio contigit ab istis sudoribus, quos excitaveramus vaporibus decocti roris-marii, salviæ, betonice, abinthii, centaury minoris, & florum chamæmeli cum vino & lixivio facti. Dederam autem hora una mane, antequam assumeret decoctum sudoriferum, per multos dies meam antidotum, qua destillationes etiam sistentur. Sed & simplex partium lotio, cum sale & vino plurimam fert opem. Item luta naturalia ex balneis, qualia sunt apud Patavinos D. Petri & D. Bartholomæi post ædes, & D. Helenæ. Posiunt etiam balnea parari ex thermis, quales in Italia & aliis plurimis regionibus scaturiunt, ut thermæ S. Philippi, quæ dicuntur esse aluminosæ: in villa Corosona prope Lucam, quæ sulfureæ, aluminosæ & nitrosæ esse perhibentur: prope Pisas circa montem S. Iuliani, quæ aluminosæ & sulfureæ: & aliæ in Germania & Pannonia, de quibus consule auctores, qui de hisce naturalibus balneis scripserunt. Posiunt etiam ad horum naturæ imitationem fieri artificialia ex sale nitro, alumine, sulfure, vel bitumine. Verum in horum balnearum usu hodie maximus error, & præsertim in Germa-

nia committitur. Etenim jam mos invaluit, quia nonnulli regri viderunt quosdam à fluxionibus capitis & catarrhis liberatos, articulos ex parte corroboratos, corpus à serosis & biliosis humoribus exoneratum, quod cognoscunt ex cutis rubore, qui solet per aliquot dies in usu balnei comparere cum pruritu saepe molesto, ut quisvis fere podagricus & arthriticus statim nulla facta corporis præparatione vel levi purgatione adhibita, balnea naturalia & artificialia ingrediatur. Quæ sane pessima est consuetudo. Nam et si corpus ab aliqua humorum serosorum quantitate liberatum esse videatur, & partes corroboratæ; tamen cum partium principum intemperies non auferatur, ab horum balnearum tali usu obstructions viscerum, & præcipue mesenterii & pancreatis non referentur, articularum venæ laxiores reddantur à tepido balnearum calore, hinc contingit ut paulo post usum balnearum brevi intervallo arthritici frequentius & ad plures partes fluxionibus tententur, favioraque symptomata redeant, regeneratis denuo aliis humoribus sese commiscitibus cum iis, qui adhuc à balneo in venis erant relicti. Quocirca in arthritide universalis, quæ paulatim ex longo tempore repetentibus sæpius & invalescentibus fluxionibus originem habuit, à prædictis balneis abstinendum suadeo, quod partium principum languor vix unquam hinc restitui queat, nec etiam aliis internis auxiliis: neque etiam in arthritide biliosa tentandum puto ejusmodi præsidium, quod corpus, sanguinem, articulos & jecur maxime accendat: neque post purgationem solam & simplicem, quod reliquæ pravorum humorum non semper balneis evacuetur totæ; sed in arthritide, quæ unam vel alteram tantum partem invasit, ut pedes vel manus vel extremos artus, vel fere universalis est sed non antiqua, constata ex mixtis humoribus, prædominante pituita cum multo sero, facta diligenti totius corporis purgatione, evacuatis per sudorificæ & diuretica vi antidotorum maxima humorum saburra, ne quispiam ad articulos adhuc facile confluat, corroboratisque visceribus & obstructione liberatis, balneis præscriptis commode utendum esse moneo. His conditionibus Aëtius & alii, quando arthriticis balnea commendarunt, præscribi voluerunt. Ludovicus Mercatus solvi quovis balneo humores, & esse minari articulos laxioresque reddi putat, quantumvis resolutoria aut adstringente vi polleant. Quippe plus prævalere dicit aquæ humiditatem & teporem aut calorem, ad humorum fusionem & articularum laxitatem, quam possit aquæ aut mineralis, aut cufusvis alterius medicamenti vis ad resolvendum. Quod sane falsum est, monstratque Mercatum balneis naturalibus raro usum; forte quod in Hispania raræ sint thermæ. Exiunt enim nonnulla naturalia, quæ constant ex commemoratis mineris, quæ potenter efficcant & resolvunt, præsertim si sulfureos habeant vapores permixtos, vel naphtham, vel bitumen & nitrum. Nam & hydropicis hisce à ventris & corporis mole liberatos frequenter vidimus spatio quadraginta dierum, cum probò victu præscripto. Hoc anno c. 130 xiv, Illustris Dominus Philippus Comes ad Rhenum arthriticus & multis capitis fluxionibus obnoxius, & Iohannes de Molart Consili

Error Germanorum in usu balneis.

Contra Alerium.

Historia.

Interdum in balneo.

Balneis arthriticis.

Consilii militaris apud Cæsarem Præses podagricus, cum balneis cuiusdam chymici artificialibus ex sale, alumine, spiritu sulfuris & nitro uti velent, spatio triginta dierum bis terve usu balnei in alvi profluvium prolapsi sunt, quo multa biliosa & pituitosa reddebant. Nam et si his venæ à tepore & humiditate balnei ampliores & patentiores redderentur, vis tamen aluminis constringendo cutem & articulos & habitum corporis carnosum, ita fluentes humores compescebat in venis, ut ab habitu corporis ad ventrem eos, si qui à calore balnei in venis funderentur, coegerit & diarrhæam excitarit, cum tamen corpus antea satis congruenter à me esset purgatum. Sic & alius quidam cum à balneis & luti ita corroboraretur penes articulos, antequam partium principum imbecillitati esset prospectum, post aliquot septimanas accumulata nova materia, incidit in lethalem febrem. Nam cum non amplius illa materia ad corroboratos nimium articulos æque ac ad imbecilles antea fluere posset, pedes puta & manus, ad interiora regressa partes nobiles invasit, febrisque continuæ atque lethalis causam præbuit. Possunt igitur optime exterius balneis medicatis adstringi & corroborari artus, & in iisdem superflui humores exsiccati ac difcuti. Ad arthritidem calidam balneum aquæ dulcis laudant Trallianus, & alii docti viri post universalia. Illo tamen articuli non videntur corroborari, cum potius laxentur, sed tantum intemperies jecoris corrigi, & sanguis in venis refrigerari. Idcirco Galenus lib. 11 Meth. med. cap. 22, balneum ejusmodi arthriticis maxime adversum infert. Nam cum prius dixisset in febribus, imbecilla existente parte principe, balneum aquæ dulcis esse majoris detrimenti & periculi, subdit: Quod si, præterquam quod nulla pars princeps imbecilla sit, etiam inferioris notæ partium aliqua sit invalida, veluti podagrici pedes, & iis qui articulari vitio laborant, universi corporis articuli, maxima salutis pars ægro comparabitur ex balneo ipsi infirmis partibus, quæ supervacua sunt excipientibus. Affolent enim nonnunquam & citra balneum supervacanea in partes infirmas confluere, à balneo vero magis, ut pote succis ipsis per id liquatis, tum viis per quas meent patefactis. Ambo enim hæc ex moderato calore proveniant necesse est. Hæc Galenus. Ego tamen existimo ex parte articulos balneo aquæ dulcis corroborari posse, quandoquidem ex calidis fluxionibus frequentibus contrahunt in se artus intemperiem calidam, ob quam fiunt imbecilles, & facile non modo recipiunt, sed etiam attrahunt humores in corpore mobiles. Hæc intemperies corrigi aquæ dulcis balneo potest; præterea venarum laxitas eadem constringi, si eo modo administretur, quo nos in podagricis docuit Trallianus his verbis: Balnea dulcis aquæ his conducunt, atque ea quæ vesperi adhibentur magis quam matutina. Nam post cibum maximam vim ad calidorum intemperiem corrigendam obtinent, præsertim in gracilibus, siccioribus & acrioribus corporibus. Nam in ejusmodi si quotidie balnea adhibeas non eis nocebis, sed plurimum etiam adjuvabis. At priusquam æger in calidum balnei ætrem ingressurus sit, confort ei pedes aqua frigida prius irrigare. Vbi vero medium domum balnei ingressus fuerit,

deinde modice sudaverit, sit hæc tepida ei superfundentur, atque ita totum corpus hydrelæo perungi oportet. Porro balnei ætrem temperatum esse convenit, similiter & lavacri solum. Post unctionem, ex transitu statim in calidæ solum æger ingredietur. Quod si etiam frigidam aquam influere contingat, pedes scaturigini submittat, priusquam in ipsum descendat. Egressurus rursus è thermis descendere omnino in frigidæ solum debet: & si æstas fuerit & oblectetur, in ea natet; vestimentis autem indutus pedibus iterum aqua frigida injiciatur. Reversus à balneo in domum æger non statim bibat vinum, præsertim merum; sed pitianæ cremorem aut tepidam aquam prius assumat. In medio autem prandii si æstas fuerit, aquam frigidam; si aut hyems, temperatam bibat. At si hoc balneo non satis corroborati esse videantur articuli, validiora poterunt adstringentia & refrigerantia adhiberi, emplastrum diacalcitheos cum aceto rosaceo, succus acaciæ cum posca, lycium cum croco.

Quod si nodos & tophos materia podagræ fecerit, ut solet contingere (si quando diu & frequenter fluxione tentati sint artus) vel per se sponte à victu nimio, crassos & crudos humores generante; vel à mala curatione, nempe adhibitis magis quam decet refrigerantibus & narcoticis, aut validis discutientibus tenui humore exhalante, crasso & terrestri relicto in articulis atque impactato; aut præfatis humoribus à validis exsiccantibus & acris, sine admittance eorum quæ emolliunt, his quoque tam internis quam externis remediis erit succurrendum. Ad rectam autem horum curationem, plurimum scire interest à quam materia oriatur. Nam si pituitosa sit, ut plerunque est, erit excalefaciendum & attenuandum. Pro internis horum remediis proponunt à Tralliano antidota, inter quæ duo hæc mihi maxime arrident, quod consistit ex iis medicamentis, quæ haberi possunt: primi descriptio talis est: Rec. centaurei unc. v, chamædryos, hyperici, ana unc. 1x, aristolochiæ rotundæ, gentianæ, petroselinæ, agarici, phy dulcis, mei ana unc. iij, spicæ nardi unc. j, excipito melle, datoque ex aqua tepida. Alterius antidoti descriptio, quod datur ad annum similiter, præterquam quod callos in articulis concretos summe discutit, medetur etiam articulorum, capitis, stomachi, oculorum, jecoris & renum dolori, urinæque difficultati, eodem Tralliano teste, qui ipsum dat mense Ianuario diebus quinque alternatim, Februario, Martio, Aprili diebus quinque alternatim, Iulio uno die, Augusto uno die, Septembri uno die, Octobri duobus diebus alternis, Novembri duobus diebus alternis, Decembri quatuor diebus alternis. Abstinentum est mero, carne suilla, bubula, leporina; Item brassica & sinapi & crudis omnigenis oleis, hydrogaro. Et bene concoquat æger, qui medicamentum assomet, pedes aqua calida lavet & oleo inungat, lactis potione abstineat. Rec. rhapontici, agarici, ana unc. ij, phy unc. iij, petroselinæ macedonici, & mei ana unc. iij, gentianæ, hyperici ana unc. vj, aristolochiæ unc. vij, centaurei unc. viij, chamædryos unc. ix, dantur viris scrupuli duo; mulieribus, unus. Novit quendam Trallianus cum tophos habere incepisset;

L

decocto

Tophi unde, & quomodo tollendi.

Tralliani antidota.

Modos exhibendi Tralliani antidota.

Alii profluvium ex balneo.

Balneum aquæ dulcis pro calida arthritide.

Modos administrandi balneum Tralliani.

decocto chamæpyteos & origani assumpto prohibuisse, ne alii nascerentur. Huc refer ea etiam antidota podagrica quæ superius recensuimus. Porro externa remedia sunt, si nondum nodi articularum plane gypseam aut lapideam materiam contineant, ammoniacum cum modico aceti dissolutum, vel hoc emplastrum, Rec. olei olivarum veteris unc. ij, lythargyri aurci præparati in tenuissimum pollinem (vel lapidis pyritis præparati secundum Dioscoridem) gagatis (cui inest vis emolliendi & discutiendi, unde & podagricis medicaminibus & acopis additur, teste Dioscoride) & adipis decoctionis pernæ vetustæ, ana unc. j, additur unc. ss. aceti, ubi fluxiones calidæ nodos molestare solent, coquitur in emplastrum: proderit & oleum viperinum, & lacertæ viridis, & adipis earundem præsertim vetustiores, vel, Rec. diachyli simplicis unc. j, ammoniaci, galbani, bdellii, sagapeni, ana drach. j, olei irini, liliorum alborum, ana unc. ss. pulv. ireos unc. j, M. cogatur denuo in ceratum. Validius, quod emollit & discutit cataplasma pro duris tophis. Rec. rad. bryoniæ, cucumeris agrestis, iridis, sigilli Mariæ crudæ, ana unc. ij, rad. althææ, & liliorum alborum sub calidis cineribus coctarum, ana num. iij, sem. urticæ, sinapios, nasturtii, ana unc. j, trita cum adipe anserino, & oleo amygdalarum dulcium q. s. fiat cataplasma, imponatur, factò prius fomento cum decocto althææ, malvæ, florum chamæmeli & meliloti. Ceratum excellentissimum tophos articularum dissolvens adeo, ut neque an oborti fuerint adhuc appareat. Rec. aphronitri unc. viij, therebinthinæ unc. xij, ceræ unc. xv, olei veteris unc. xxj, lixivii, quo pilarii utuntur pro lanis succidis abluendis, quod etiam nonnulli Græci protofackon vocant, unc. vj. Hoc jubet uti Trallianus ut præstantissimo. At celeberrimum est, & à multis hodie probatum quod ex caseo veteri à Galeno conficitur. Rec. casei veteris & acris unc. iij, vel quantum libet; intingatur in juris carnis suillæ salisæ sufficienti quantitate; mox in mortariis subactum pistillo, tophis imponitur. Nam cute sponte disrupta absque sectione articulos citra noxam quotidie lapidibus liberans reficit. Alii postea ad Galeni imitationem pedes suum salitos in aqua decoquunt in mucilaginem, cui postea admiscet casei antiqui partes duas, nasturtii pulverati partem unam, & sic emplastrum conficiunt, quo innumeros à se curatos esse testantur. Podagricorum tophis ac nervorum seu tendinum distortionibus hæc facile parabilia præscripsit Dioscorides: ammoniacum cum arida pice impositum, bdellium jejuni saliva emollitum, cannabis sylvestris imposita, styrax saliva emollitus, sesamum in forma cataplasmati adhibitum. Æque efficax est hoc ceratum, quod ex tabaco conficitur, & citrinum appellatur: Rec. succi tabaci, seu herbæ reginæ unc. iij, ceræ citrinæ novissimæ unc. ij, resinæ pini unc. ss. resinæ terebinthinæ unc. j, olei myrtini q. s. M. fiat ceratum molle. Huic addantur lutea emollientia & resolventia quorundam balnearum naturalium ut D. Petri & D. Bartholomæi in agro Patavino; quibus mane atque vespri singulis vicibus per horam vel amplius calide foveantur articuli, mox aqua thermalis abluuntur & imponuntur cerata & emplastra præ-

scripta, magis & minus resolventia & emollientia, uti requirit indicatio. Nonnulli hic validius statuunt suffumigium ex lapide molari, quod scirrhis nodis commode adhibetur. Prius pars nodosa fricatur donec sudor appareat, deinde inungitur hoc unguento; Rec. olei amygdalarum dulcium unc. ij, adipis gallinæ, anatis, olei chamæmelini, ana unc. j, medullæ cruris bovis, resinæ pini, ana unc. ss. ceræ flavæ drach. v, dissoluta ad ignem fiat unguentum. Bis hæc unctio quotidie repetatur (uno intermedio ad unguentum & fricandum destinato) donec durities adfuerit. In hoc casu reperio etiam pretiosum hoc cataplasma, quod præter nodos podagricorum etiam luis venereæ duras & scirrhas collectiones discutit. Rec. stercoreis caprini pulverati, farinæ hordei, singulorum partes æquales, aceti acerrimi & aquæ ana q. s. ut possit fluere; deinde supra pannum lineum distendatur, & alligetur parti nodosæ tam calidæ quam potest sufferri uno die, altero vero quiescat ab ejus impositione; unguentum tantum aliquo emolliente, & nonnihil resolvente, ut adipe anserino, vel præscripto unguento: nec debet hoc cataplasma renovari quo die imponitur, nisi nimium siccescat. Quod si vero gypsea materia, aut instar lapidis dura, vel terræ cimoliz similis (qualem in nosocomio Delphensi notavit Forestus, & ego Olmuti ex articulis digitorum manus cujusdam pauperis effluxisse, qua pingebat & inscribebat parietibus) ex nodis podagricorum exeat & ulcerati evaserint; imponatur donec sponte claudatur ulcus nec amplius talis materia emânet, diachylum simplex prius cum adipe anserino emollitum, deinde sine adipe; triapharmacum, vel citrinum ex tabaco. At si nodi & tophi à nimia exustione humoris melancholici vel biliosi nati sint, vel vi acrium medicamentorum plusquam decebat calefacientium & siccantium: à cibo siccante & calefaciente, præscriptis antidotis, aliisque omnibus, quæ corpus & humores siccant abstinendum est: medicriter calefacientibus & humectantibus lapidescens materia dissolvenda dissolvendaque. Igitur foveatur locus decocto malvæ, althææ, florum chamæmeli & meliloti, capitis castrati; postea lana succida imponatur. Emollit plurimum & calefacit admodum convenienter quod in ventriculo castrati jamjam mactati reperitur, & præsertim nutriti herbis appropriatis, si eo adhuc calente per aliquot dies partes foveantur. Viçus ratio non modo ratione materiæ, sed etiam temporis remissionis dolorum pro præservatione, & tempore paroxysmi variat. Nam podagræ à causa calida fitis & fames non admodum laudantur, dum urgent dolores; quod hisce & partes & sanguis inflammatur, evadatque acrior & biliosior, biliofi- que famem non valde tolerant, ut in arthriticis à pituita, vel mixtis humoribus biliosis cum multa pituita. Tempore igitur dolorum à bilioso humore natorum detur pilana hordeacea, vel farina aut panis coctus in aqua cum modico butyri recentis vel juris carnis non valde nutritis, vel cum femine melonum, vel lacte amygdalarum dulcium; quali modo & oryza coqui potest in aqua pluvia ut in pultem proflus abeat, & sic condiri cum aliquo ex præscriptis, vel cum sacchari modico. Carnes in prandio assumat, vel earum contusum &

imo

Cataplasma
pro duris to-
phis.

Ceræ Casei
Galeni.

Ceræ citrinæ
descriptio.

Villus vici.

imo sepe abstinere à carnibus multum conducit arthriticis, præsertim sanguineis. Frequens enim comestio carniū generat podagram dixit Rhases. duodecimo Continentis: ratio est quod plus alimenti accumuletur in corpore nostro quam partes nutriendæ requirunt, & præcipue articuli, qui in provectioni ætate, ut & juventute, non attrahunt tantum alimenti, quantum in adolescentia & pueritia: in quibus ætatibus articuli non solum nutriebantur, sed & augebantur ac firmiores solidioresque evadebant: quod cum non amplius contingat in juvenibus ac viris & ætate provectionibus, inde fit ut alimentum superabundet ex nimis nutrientibus cibis, & inde in excrementa pravosque humores vel crudos commutetur. Nonnulli tempore paroxysmi concesserunt ciceres à cortice liberatos & lentes. Dantur commodè carnes cum boragine, buglossa, beta, lactuca, vel potius endivia, soncho, cichorea coctæ & omphacio: etiam spinachia, malva, portulaca cum modicis uvis passis, & butyro recenter facto: hoc enim minus calefacit. Potus sit aqua pluvia vel fluminis in qua panis calidus lotus est vel maceratus, vel pars cruris bovis sine carne & medulla cocta, vel hordei decoctum cum uvis passis & cinnamomo, vel aqua saccharata: sitim enim sedat, & per urinas in multis facile transit. Vnde præscribitur & aqua coriandri. Hoc claretum etiam commendat: Rec. hordei mundi M. j. prunorum damascenorum num. xx, granorum berberis, si subacidum potum velit, unc. iij, aquæ pluvie vel fluminis lib. x. bul. ad consumptionem tertiæ partis; amotis ab igne & adhuc calentibus adde cinnamomi crassiuscule incisum unc. ss. sacchari albi lib. ss. cola per manicam Hippocratis. Atque hæc omnia in declinatione nonnihil immutanda, ut paulo plenior sit victus: sed vino omnino interdicatur. Averroes dimitendum esse vinum monet quousque integre sanetur: quam sententiam nonnulli putant intelligendam esse quo tempore urget dolor: alii vero non tantum quousque, sed quo debet præservari. Sane Aegineta scribit plurimos sanitatem consecutos, qui profus à vino abstinabant: horum alios per morbi initia liberatos; alios in posterum rarius, & minori cum dolore accessiones percepisse. Quod si autem paroxysmus abierit, victus ratio nihilominus proba est instituenda, quæ generationi materiæ calidæ, & partium principum imbecillitati opponitur, qualis est refrigerans atque humectans jam præscripta, sed paulo plenior, præsertim si æger non cogatur decumbere, sed propter vitæ institutum mediocriter se exercere queat vel debeat. Igitur in prandio ex carnibus comedat castrati, vituli aut capræ lactantis, bovis, & maxime ejus ventrem. Novi quosdam, inquit Trallianus, qui cum fluxione copiosissima & valde acri laboraret, tunc maxime carnibus bubulis adjutos fuisse. Dicebant enim non amplius se continue aut vehementer pedibus dolere, quemadmodum cum victu tenui uterentur: esse autem pedes bubulos aut ventres magis quam decoctum. Porro erat hic ætate florida, & calidior temperamento. Alii tamen Hippocrates jecur bubula carne calefcere scripsit. Avicenna laudantur phasiani, attragene, perdicæ, gallinæ cohortales non pingues admodum, mē-

læ, turdi: pisces saxatiles carnis albæ atque friabilis in aqua cocti, cum paucō oleo, & paucis acribus seminibus: item testudinis, ranæ aut viperæ caro, qua comesta novi quendam dolore coxendicis liberatum, qui extractum ejus per circulationem destillatum assumpserat. Nam per cutim materiam ex alto pellit & discutit cum sudoribus. Porro coquitur cum oleo, vino, salis exiguo & anetho; sicque præparatam puto in omni arthritide convenire. Cochleæ latæ potæ tollere dicuntur articulorum dolores, ut Plinius autor est. Ostrocoderma, ut pectines, chammæ, dactyli, ungues, ostrea concedi interdum poterunt: myaces articuli utilissimi sunt, ut refert Plinius. Carnes testudinum coquantur, eodem autore, in aquæ congio sale modice addito, ita decoctarum ad tertias partes succus articularios morbos sentientibus bibitur: ejusdem decollatæ sanguine pedes fricantur. Hordei farina in aqua cocta, vel tritici, vel psisana, vel puls avenacea cum modico butyro recenti, vel jure carnis bubulæ; & ova tremula commoda sunt. Inter legumina concessit Trallianus fabas virides & siccas leviter fervefactas: item fiseolum Alexandrinum, quod puto nunc esse hareomam Caramaniorum & dora dictum, peregrinum apud nos, feritur aliquando in Italia. Hoc enim inter omnia legumina quæ novi, minus inflat, & est melioris nutrimenti; à cæteris abstinendum: fructum pomaceum bene maturum admodum dulcem, inquit Trallianus, offerre consulo circa horam secundam vel tertiam; præsertim persica aut rhodacina, aut uvam duram, & non adstringentem, damascena, mala dulcia, citria purgata & excorticata probe; quibus addo mala vinosi saporis sub cineribus cocta, & cytonæa. Pyrum vero, malum punicum aliaque omnia raro aut nequaquam offerre jubet. Arthriticis noxia, nuces juglandes, aut pineæ, aut amygdalæ, aut placentæ. Ex bellariis castaneas potissimum assumere voluit Trallianus. Acetum quoque in omni cibo pro condimento nocet, quod nervis, tendinibus, & stomachi tunica: sit maxime inimicum, uno aut altero cibo in prandio & cœna æger sit contentus. Varietas enim eduliorum repletionis omnisque fere fluxionis mater est. Brassicam edentes, teste Plinio, liberati à podagra inveniuntur. Si æger præscriptis pro potu uti noluerit, nec vino abstinere, bibat loram, aut vinum tenue oligophorum, facile per urinas transiens, quale in planis locis natum in Italia, & arenosis colligitur mense Julii & Augusti ex uvis æstivis bene maturis; in frigidiori regione ex uvis maturis montanis exprimitur mustum, cui tertia pars aquæ fluminis, à nonnullis chalybeata permiscetur, imponitur in cadis donec bullierit per mensem, deinde obturatur orificium, ne quid exspiret, & sic servatur ad annum. Alii vinum graminis extollunt: potest graminis radicis debita quantitas aquæ incoqui, quæ cum vino solet ante ebullitionem permisceri. Cur Trallianus abstinthes vinum his præscripserit equidem non assequor, cum calfaciat magis, & caput gravet, & inducere somnum videatur, si cum cibo sumatur. Fortassis eo fluxiones sisti autumat, quod biliosa detrahat, quæ stomacho & alvo inhæserunt, urinam cieat, crapulam in potu præsumptum acceat, ut de abstinthio scripsit Dioscorides. Porro nil

Fructus arthriticis concedendi.

Quæ arthriticis sunt noxia.

Victus ratio in arthritide qualis.

pejus in hoc morbo quam bibere inter prandium, & coenam jejuno stomacho, & præcipue si vinum sit, quod æger bibit. Hoc enim vehementer movet fluxiones & irritat nervos jecurque & sanguinem calefacit. Sic & statim bibere in prandio vel coena non confert valetudini, sed octo vel decem bolos præsumpsisse de cibo melius est. Post coenam etiam bibere vetitum volo, ac multum quoque bibere. Arthritici à sanguine hac eadem victus ratione sunt tractandi, sed paulo tenuiori & minus nutriente; dandaque omnia quæ minus sanguinis generant. At si pituita arthritidem causet, confert hic victus adhuc tenuior, & cibi ac potus interdum abstinencia. Corporibus enim carnes humidas habentibus famem adhibere convenit: famem enim, inquit Hippocrates, corpora ficiat. Quamobrem ubi doloribus vel fluxionibus torquentur, semel in die comedant, parum bibentes in prandio, vel si tantum abstinere à cibo nequeant, incidentia, attenuantia, calefacientia & ficiantia offerantur, & quæ non multum alunt. Eadem etiam intermediis temporibus quando à doloribus vacat æger pro præsertione porrigenda paulo pleniori victu; quæ multum nutriunt bis in die offerantur neque multa. Convenit his imprimis oryzae succus in aqua coctæ cum saccharo & cinnamomo asperso; vel ex jure carnis porrigatur cum petroselinio alterato. Carnes commemoratæ sint potius assæ quam elixæ, pisces saxatiles similiter; sed elixari quandoque poterunt cum petroselinio, anetho, fœniculo, hyssopo, satoreja, majorana, serpillio, pulegio. Vvæ passæ & cappares in aceto mulso conceduntur. A pomis, pyris, prunis, persicis, cæterisque ejusmodi fructus abstineat. Aëcius etiam juglandes & pistachia concessit. Vinum aliquando bibat tenue, fulvum, maturum atque vetus, sed parce attingat. De cætero potus sit aqua cocta cum aniso, fœniculo, urvis passis, radice acori, cinnamomo; vel cerevisia tenuis, in qua baccae lauri vel juniperi, vel radix lappæ vel uvæ passæ, dum adhuc recens esset, una bullierint. Extollitur hic multum aqua mulsa. Nam Mesues affectus frigidos cerebri, nervorum & articulorum juvare ait, loco vini potum tussim humidam, puris & pituitæ crassæ expectorationem promovere, lavare, tergere, purgare viscera, atque intestina & meatus urinarios, colicis prodesse, ac calculum in vis urinæ prohibere ne hereat aut generetur. Quamobrem & Plinius, mulsam dari solere veteribus articulari morbo laborantibus, memoria prodidit. Venere in omni arthritide abstinendum est, at in calida quam maxime & statim à cibo; hanc ante cibum moderata corporis exercitatio juvat, fatigatio summopere lædit, quod à lassitudinibus corpus & articuli imprimis incallescant. Vehementiora exercitia & corporis motus cum levi lassitudine iis, qui frigidis fluxionibus tentantur, jure concedantur. Caveat sibi etiam æger à forti frictione, caligis & calceis angustis, ligaturis fortibus, æquitatione forti & vigiliis fu-

perfluis, somno denique post prandium. Roborant articulos, præsertim pedum, caligæ integræ strictæ ex panno infecto cocco baphica seu Kermes, cum quo etiam dormiat si velit.

Pro pseudoarthritidis curatione duabus satisfaciendum est indicationibus, nempe humectandi artus exsiccatos, & regenerandi naturalem eorum humiditatem. Pro his consequendis conducet (omissis in totum purgationibus, & præsertim acribus & vehementibus, ob nimiam eorum exsiccandi vim, quæ articulis nocere possunt) interius victum medicamentosum, exterius balnea, fomenta, emplastra, unguenta adhibere. Victus præscribatur, qualem biliosæ arthritidi præscripsimus; plenior tamen & minus refrigerantem siccantemque. Sint omnia, quæ mensis apponuntur boni succi, facili concoctionis, nec multas superfluitates in corpore giggentia, qualia sunt, carnes hœdi, vituli lactentes, cappones & pulli gallinæ pinquifculi, eorumque pedes; carnes suillæ recentes stomachis robustis, elixæ potius omnes quam assæ; ova recentia forbilis tremula, ptisana ex hordeo, spelta seu zea, avena, farre, oryza cum jure carni prædictarum; caseus recens, lac recentior multum & potum. Potus sit vinum tenue, maturum, subdulce, & oligophorum. Balneum aquæ dulcis alteratum radicibus althææ, & malvæ, capite castrati, pedibusque ejus & vituli: ingrediat æger quotidie ad minus semel. Exeuntem, & si sit ambulandi impotens, ducere tamen oportet, ut exerceantur leniter articuli, & sic ad ipsos humiditas attrahatur; cavere tunc oportet, ne aër vel calidior sit, in quo æger versatur, vel frigidior, sed tepidus. Calor enim eisdem ex poros laxando, ipsumque illum qui affluit humorem attenuando discutit & absument. Frigus vero articulos confringendo in ipsos humorem, quem postulamur, illabi non finit, & tendines musculorum rigidos facit, qui ad articulos conflunt: unde ad motum sit æger ineptior. Hæc etiam ut præcaveantur consulimus, ut æger à balneo oleis actu calidis circa articulos inungatur, quale est amygdalarum dulcium, chamæmelinum, mastichinum, narcissinum, olivarum dulce, & lumbricorum: à cæteris resolventibus abstineatur. Adhiberi etiam articulis poterit emplastrum ex eisdem oleis confectum cum medulla cervina, vitulina, exungia suilla recenti & butyro quam recentissimo, additis mucilaginis lini, althææ & fœnigræci & cera flava novissima: præsertim si convelli patientes se circa laborantes articulos perceperint. Tunc mulsam præbere satis est, & vino interdicare. Vbi cumque à balneo abstinuerint (inquit Petrus Salus) fomenta ex eisdem rebus, nempe ex quibus sit balneum, parata in usum habeant: in quorum administratione hoc animadvertant adstantes, ut antequam caro detumescat, vel hominem à balneo educant, vel fomenta removeant; alias in his administrandis, succedente humoris attracti resolutione, restitutio, deperditæ humiditatis non esset speranda.

Pseudoarthritidis curatio.

Victus ratio in pseudoarthritide.

ADRIANI SPIGELII

BRUXELLENSIS

DE

LVMBRICO LATO,

LIBER.

INDEX CAPITVM DE LUMBRICO LATO.

CAP. I.	Quid Vermis,	87
II.	Quid Lumbricus, ἑλμινς, ἡελμιν.	87
III.	Quid Lumbricus rotundus, latus seu planus, εὐγυρόδον, πλατὸν,	88
IV.	Propria Lati Lumbrici nomina,	88
V.	Figura & Descriptio Lumbrici Lati,	89
VI.	Quid Vermis Cucurbitinus Arabum, Tenia degener Auctoris,	92
VII.	An Lumbricus Latus sit Animal,	93
VIII.	De ejus generatione & materia,	94
IX.	Pituita quomodo transeat in lumbricum latum, & quamnam hujus prima forma,	95
X.	Plures uno non nasci: nec bis in homine nasci notatum,	97
XI.	Locus generationis, utrum crassum sit, an tenue intestinum,	97
XII.	Qua aetate generetur in humano ventre,	98
XIII.	An pariat,	99
XIV.	Quamdiu vivat,	99
XV.	Signa ejus Diagnostica,	100
XVI.	Prognostica ejus signa,	103
XVII.	Quenam sit ejus curandi ratio,	104

ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS

DE

LUMBRICO LATO,

LIBER.

CAP. I.

Quid Vermis.



Qvoniam ad hujus animalis plenior, quam hactenus à Medicis, atque Philosophis tradita est, notitiam & varia ejus synonyma intelligenda plurimum proderit, prius cognoscere, quid Vermis, Lumbricus, ἔλμυξ, ὄρελον, antiquis significet, statim hujus libri initio, loco proemii, harum vocum significationes diversas tradendo, latius quam Medico fortassis convenire multis videbitur, exspatiari. Parvorum igitur animalium sanguine carentium, quæ ἔνυμα Græcis, Latinis *insecta* dicuntur, genera plures continent species quam enumerari possint propriis nominibus. Ideoque obscuro aut nullo nomine designantur aliqua, quæ à Grammaticis non sine ratione σκώληκες, & σκωλήκια, id est, Vermes, & Vermiculi vocantur. Etiam omnem vermem insectum esse, atque omne fere insectum vermem, patet ex eo, quod vix ullum insectum est, quod non vermis aut sit, aut certe fuerit. Nam appello proprie vermem insectum oblongum, & pedibus carens, quod aut species est perfecti animalis ac destinati ut ex eo nil aliud generetur, ut lumbricus, hirudo; aut principium est insecti pedati, sive sponte more plantarum provenientis, ut culicis; seu per sexum generati, ut apīs; sive utroque modo, ut muscæ. Aristoteles Hist. de animalib. lib. v. cap. xix, omnia insecta, aut ex animalibus, aut sponte provenire scribit. Quæ ex animalibus procreantur, omnia à verme oriri manifestum est. Nam omnia insecta, ait Philosophus, quæ parvum à coitu, vermem faciunt, excepto quodam genere papilionum, quod parit quiddam semini cruci simile, intus humorem continens. Sed etiam ex hoc semine nasci videtur eruca, quæ nil aliud est, quam vermis, eodem teste. Qui bombycum erucas, filum sericum nentes aluerunt, experti sunt, ex semine, quod papilionem pepererunt, eas quoque prodire, deinde in chrysalida mutari, atque ex hac fieri papilionem. Iam & eorum, quæ sponte proveniunt, ortus primordia, modo sint sensibus nostris manifesta (nam in minutissimis animalibus propter corporis exiguitatem interdum latent) si diligenter examinaverimus, rarissime sane, quæ ex verme producta non fuerint, reperiemus. Recte igitur Veteres Græci obscura insectorum nomina, quibus proprias quiddam species significabant, vermem dixerunt, & exposuerunt, nomine scilicet omnia insecta complectente.

CAP. II.

Quid Lumbricus, ἔλμυξ, ὄρελον.

Sequitur Lumbricus, cujus appellatio latius apud Latinos, quam apud Græcos patere videtur. Illi enim per lumbricos intelligunt non tantum vermes, qui in animalium ventre generantur, sed etiam qui ex terra ipsa oriuntur: nam terrenos vermes, quos Græci ἔσχαζα τῆς γῆς, id est, *intestina terre*, lumbricos terrestres sive terrenos nominant: Hi vero per ἔλμυξ (quod Latini veteres, proprio magis nomine carentes, passim lumbricum, paulo latius quam deberent, interpretantur) vermes tantum in animalium intestinis, seu ventre nascentes designarunt. Sic Aristoteles lib. v Hist. tria genera ἔλμυθων enumerans, loquitur de lumbricis in excrementis animalium, adhuc intra eorum corpus contentis, enatis. Et lib. vii Hist. quando inquit, ἔλμυξ sub cane ballo, atque stilloni innasci; locutus est de ventris lumbrico. Et lib. ix Hist. Canes, ait, tritici herbam comedere, ὅταν ἔλμυθῶσι, id est, cum lumbricis intestinorum laborant. Sed & ante Aristotelem Hippocrates nunquam per ἔλμυξ aliud intellexit. Recte igitur utrosque secutus Galenus, lib. i de Locis male affecti, ubi recenset nonnullos morbos, ex quorum cognitione devenimus ad certam notitiam loci affecti, scripsit ἔλμυξ in folis intestinis nasci. Ergo eorum, qui vim Græci hujus vocabuli non satis sunt affecti, vana mihi videtur disceptatio, qua contra hunc Galeni locum probare conantur, lumbricos in aliis corporis partibus, præterquam in intestinis nasci. Porro cum tria recenscantur lumbricorum, seu ἔλμυθων genera, teres nempe, latum, & quod ascaris appellatur; notandum est strictim apud Latinos Lumbricum, & ἔλμυξ simpliciter apud Græcos, capi quoque pro uno ex prædictis generibus, scil. pro tereti, seu rotundo, quod huic, ut cæteris generibus, nullum nomen proprium donatum fuerit, frequentiusque cæteris in animalium, hominis præcipue, ventre conspiciatur. Nam latum lumbricus habet sua nomina, quæ paulo infra recensentur; & tertium genus dicitur ascaris. Ita Hippocrates lib. i Epidem. non aliam lumbrici in ventre geniti speciem intellexit, quam teretem, sive rotundum, dum inquit, *cuidam δὲ τοῦ κοιλιῆς ἐρεθισμῷ ὑγρὰ πλεονάζοντα μὲν ἔλμυγγων*, id est, *irritata aëre, liquida, turbida cum lumbricis exivisse*; sic & alibi: sed in libro de Crisibus recensens bonæ Criseos signa ait, *commo- dum esse ἔλμυξ seu lumbricos exire, morbo ad judicationem tendente*. Quod & lib. ii Prognost. & in Coacis prænotionibus de lumbricis rotundis scribit. Et clarus agricola Constantinus Cæsar, agens de nascituri

Lumbrici terrestres.

Explicatum Galenus.


Tria lumbricorum genera: teres, nempe, latum, & quod ascaris appellatur.

Lumbrici vocantur pro tereti accipiuntur.

Hippocratis auctoritas.

Terminatio Constantini Cæsaris de nascituri.

*Figura hæc ponatur inter
pag. 88 et 89.*



Græci, & Latini *tæniam* appellare voluerunt. Nam Plato in Symposio ait: *πάντες τὴν ὕψασμα ἢ ἐξέλιξις τῆς τανίας λέγουσι*, id est, *omnem autem angustam telam textilem ex lino vel lana, fasciam dicunt, seu tæniam*. Invenio in Onomastico Erotiani in Hippocrate, *lumbricos latos præcipue nominari κηρίας*, dum inquit; *κηρίας πυκνὰς λέγουσι αὐτὰς παλαιῶν ἑλμυντες*, id est, *Cariae proprie dicuntur lati lumbrici*. Anutius Fœsius valde arbitrarium putat, an apud Hippocratem Erotianus legerit *κηρία* pro *κηρία*. Apud Suidam, & Helychium leguntur *κηρία* & *κηρία* (quæ vox usitatissima est in Novo Testamento) & *κηρία*, à *κέρω*, quod significat tundo, pro fasciis, loris, ac tæniis. Suidas *κηρία*, *ἐὶς τὸ ζώνης ἐξ ὀρενίων παρκοῖς ἡμῶν, ἢ δεσποῖσι τοῖς κλύμας*, id est, *speciem cinguli ex junctis facti, similem lora, quo lecti vinciebantur*, exponit. * Qui medicorum Arabum scripta in Latinam linguam transtulerunt; pro latis vermibus cucurbitonibus posuerunt, sicque vocarunt eos, quod dicantur ægri iis laborantes, veluti cucurbitæ femina per inferiorem ventrem una cum excrementis reddere: vel quod tæniam constare existimantur ex multis vermibus semen cucurbitæ referentibus. Germanis dicitur proprie *Wasser-Kalb* / id est, *vitalis aquaticus* (solet enim in multa humiditate degere) cum lumbricum rotundum proprio nomine vocent *Spiegelwurm*.

* In Glossario veteri lumbricos exponitur *κίρκος*, forte *κηρία*, quod Grammatici est, *ἰσῆς ποικίλος*, id est, lorum varium.

C A P. V.

Figura & Descriptio Lumbrici Lati.

Sed figura hujus animalis nobis satis perspicue indicantur veteres ipso solo nomine tæniæ, quod ei commodissime imposuerunt. Siquidem albas lineas fascias, quibus infantes communiter involvuntur in Italia, & aliis plerique Europæ regionibus, plurimis lineis per transversum æquali intervallo insignitis, ex filo gossypii vel lini crassioris intexto constantibus ob molliem & firmiorem diligationem, tam exacte refert, ut existimem veteres nomen magis proprium huic imponere non potuisse. Hippocrates, ut in hujus vermis descriptione pergamus, *lib. iv de Morbis*, eum esse ait, veluti *ὁστὴς ἐν σπύρμα λευκόν*, id est, *album ramentum intestinorum*, nempe alba ab intestino abrafa tunica; quibus verbis formam & colorem satis aperte designavit. Non enim per intestini ramentum intellexit eam mucosam substantiam, quæ aliquoties in diarrhæa biliosa ab intestinis, propter acrimoniam humorum præterfluentium, abraditur; t aut quam coqui, qui farcimina parant, in ablundis intestinis solent diligenter detergere; neque etiam alteram, quæ in sæva dysenteria ab interna propria intestinorum membrana vi humoris, aut acrioris medicamenti avelli, & per alvum excerni consuevit. Hæc enim ex multis parvis ramentis est conflata, & ut clare loquar, ramenta sunt, non ramentum; sed voluit significare unicum intestini ramentum interioris tunicae intestini, idque tenue, non valde latum, nedum longum ad

cubitos, ut sunt intestina, & secundum eorum longitudinem cum suis transversis plicis detractum. Etenim ex veteribus Hippocrates, seu auctor *lib. xv de morbis*, admirabilem longitudinem huic animali adscripsit, dum ait, *partem ab hoc verme abrumpi, aliquando duorum, trium, aut plarium cubitorum, quæ per alvum redditur*. Galenus, seu autor ejus libri, qui inter Galeni libros hodie circumfertur, & Introductio seu Medicus inscribitur; (aliis Herodoti esse existimatur) nonnullos horum vermium tam longos esse dicit, ut in totum exporrigantur intestinum. Idem Alexander Trallianus confirmavit in Epistola de lumbricis. Scribit enim ad tantam magnitudinem eos pervenire, ut universo intestino coextendantur: quin etiam constare, quandoque excretos fuisse, qui sexdecim pedum longitudinem prope aquarent. Idem autor referens historiam mulieris, quæ ab assumpto purgativo ex Hiera facto lumbricum ejecit, qui putabatur duodecim cubitos & plures in longitudine habere, latum vermem procubito intellexit. Plinius ait, tæniam in homine nasci triginta pedes longam, & amplius. Ex recentioribus Rondeletius, eum tantum duorum cubitorum, quem uxor militis cujusdam in caltris Perpinianis excreverat, animadvertisse se testatur. Nemo, quantum equidem ex scriptis clarorum virorum & multorum fide dignorum relatione potui meminisse, hoc brevioris unquam notavit, qui ex hominis ventre prodisset. Nam qui ulnam tantum longum se vidisse scribunt, latitudine paulo majori quam semiunguis, integrum non viderunt, sed tantum ejus fructum. Quanquam verisimile est, in admodum tenello, nec diu nato, breviori eum corpore præditum esse; aut ubi in animalibus homine minoribus, ut canibus, oritur: quemadmodum longiorem, ubi in equis, bobus, & aliis id generis majoribus quadrupedibus, quæ hac eadem molestia sæpe tentantur. Amatus Lusitanus integrum vidit quatuor cubitorum longitudine. Fœlix Platærus, quadraginta pedum. Thaddæus Dnus in cujusdam uxore juvene, quæ in agro Tigrino habitabat, unam partem ejectam quinque ulnarum, & alteram, quæ viginti superabat, in neutra caput & caudam adfuisse: quod adhuc magno est argumento relictam hujus vermis portionem alicujus notabilis longitudinis, quæ tandem in dysenteriam & hydropem conjecit mulierem, & paulatim ad interitum deduxit. Porro ratione tantæ longitudinis exigua latitudinis portio ab auctoribus traditur more fasciarum. Semiunguem exiguum latus erat, quem supra diximus Amatam Lusitanum vidisse quatuor ulnarum longitudine; minimi vero digiti, quem Thaddæum. Hæc latitudinis proportio diligenter à Medicis notanda est, ut, cum ægri frustulatum excernere plerumque soleant hoc animal, conjicere possint, quam longum adhuc in corpore sit relictum, & quam valido ad expellendum opus sit medicamento. Petrus Paulus Pereda in scholiis ad Methodum Michaëlis Paschafii refert, se adeo magnam fasciam vidisse, ut fere ulnæ longitudinem attingeret; adeo cavam, ut totam manum includeret. Vbi quid per cavum intelligat, non assequor. Nam si latam esse velit usque adeo, ut, lateribus utrisque nonnihil incurvatis in circulum, tantam cavitatem fecerit, quæ totam

Lib. Introductio
Hic Gale-
m.

Alia anima-
lia, quæ præ-
ter homines
vermes habent.

Ex latitudine
longitudinis pro-
portionem
Medico mda-
ganda.

Cavum Pa-
schafii non in-
tellectum.

* De qua constat Hippocratem mentionem fecisse *lib. vii, aph. 1212*, veluti *ἐν σπύρμα* ta vocat: quando dicit. Et quibus dejectionibus si stare permiseris, & non moveris, veluti *ἐν σπύρμα* (stigmata virtutis) subsistunt, & si paucia sint, paucis est morbus, &c.

totam manum complecti poterit; profecto incredibilis fuerit hoc animal longitudinis, utpote quod ratione tantæ latitudinis, quæ palmam ad minus æquavit, plusquam ad trecentos pedes se extendit, cum hoc animal nequitum monstrum sit, (etfi rarius cæteris lumbicis in nobis generetur) sed suis omnibus membris, & debita proportionē, tam longitudinis, quam latitudinis absolutum, & numero articularum, qui sunt incisuræ. Sed quomodo tam longum latumque animal in intestinis spaciū habere possit, non potest hunc in intellectu capi. Vt propterea apud Plinium, ubi feribit, intra hominem tænas tricenū pedum aliquid, & pluriū longitudine nasci, proculdubio recentiores multi mendose legerint trecentum, hoc est, tricenū pro tricenū, id est, triginta. Cæterum quale sit huic vermi caput, non extat apud antiquorum aliquem, juniores diversa profertur. Nam Amatus Lusitanus verrucosum vidit, ex quo corpus latum procebat. Rondeletius oblongum, parvum, oculis destitutum. Gabulius videtur id rostrum acutum à figura nominasse, quam rostru aucto piscis comparavit. Forestus lib. xxvi, cap. xxxvi, in quodam adolescente vidit in mucronē, tanquam subulam desinisse. A multis vulgo creditur, caput esse exiguum, cum paucis quibuldam pedibus, more araneorum. Ego autem, quandam nunquam caput videre potuerim, non levi ratione conficio, huic esse parvum in acutum desinens, & rostratum, ut aliis est lumbicis; quod modo exerere solent, modo contrahere ad libitum atque recondere, veluti limacæ cornua, & alia multa animalia linguam, mûscæ epibolidem. Etenim eodem cibo alitur augefcitque, quo cæteri lumbici. Nam omnes præparatum quoddam alimentum liquidum, veluti chylum confectum, (nam aliquid aliud, quod egeat vel oris, vel linguæ, vel dentium præparatione, aut ventriculi concoctione) sugendo hac parte capiunt, quod proprio verbo Græci vocant *ἐσθλόν* *λίαν*. Hanc partem (quam vel linguam, vel principium, vel caput appellare libet, parum refert) nonnulla infecta, quæ pedibus carent, aculeatam habent, ut hirudo; aut admodum mucronatam, ut solida corpora queant perforare, veluti lumbici terreni, & iis similes in ventre nati, qui teretes dicuntur, quos aliquid intestina perforasse legimus, & per umbilicum prodisse; per angustia venarum melaicarum orificia perussisse in ramos venæ portæ mentericos, inde in venam portæ transisse, ibique constitisse, & transitum alimenti impeditivè, ipsi vidimus. * At ne latius digrediantur, nostrum lumbicū latum molliorem hanc partem anteriorem obtinere ex eo con-jicere possumus, quod molestissimas punctiones, quales ægri à lumbicis rotundis aliquid in ventre patiuntur, non percipere se dicant ii, qui lato laborant. Igitur ab ejusmodi capite puto statim corpus plani vermīs prodire, prius quidem latius

& crassius, atque si ad aliquam insignem longitudinem accreverit, a lateribus crispum, mox angustius, tenuius, paucioribus, & minoribus laterum crispitudinibus, donec paulatim in caudam definat angustam, & tenuem nullis amplius lateribus crispata. Quandoquidem duas partes longas ab hoc verme abruptas videre nobis contigit, quas præter alias breviores Maria ux. Casparis Helveti (qui cum ipse Germanus esset inclytum Germanicam nationem mercede Patavii hospitio excipiebat) duabus vicibus, nec eodem tempore excraverat. Harum una, quæ prius ex ano pendens ab ejus forore (quæ putabat primo esse lumbricum teretem) extrahebatur manibus, mox insignis longitudinis pertasâ unguibus dilacerabatur, quinque cubitorum longitudinem superabat, finem vermîs fere caudæ partem continens, cui extrema caudæ particula unum, vel alterum adhuc pedem longa deerat, fortassis antea ab ægra inficia fronte abrupta. Hoc integrum frustum, qua parte a verme recenter abruptum, digitum minimum latum erat, ad caudam paulatim vergens angustius evadebat. Erat ejus substantia per totum mollis, densa, exanguis, alba, membrana tefteftinorum similis. Qui colore am flavo, & ad fubcineritium tendente depingunt, iis conspecta est nondum à foribus & excrementis bluta, vel jam in corpore mortua aliquandiu detenta. Casparus Wolfius albam quidem & ipsam commemoravit, sed nigris maculis distinctam. At nostram vidimus purpuræ candidam, lineis, fve incisuris, more infectorum, quibusdam (quas spiras dixerunt nonnulli, quod harum beneficio multis voluominibus sese hic vermîs, quasi in circulos contrahat) æqualiter & fve invidem ditantibus, per transversum præditam, in quarum spatio intermedio habebat quædam, veluti internodia, lenticulæ figura, quæ à nonnullis vermes cucurbitini, quod cucurbitæ semina referre ipsa vîs sunt, quando abruptuntur singula, sunt nuncupati. Thædæus Dunus squamas, & adhuc rectius genicula, à nodorum in herbarum caula similitudine, appellavit. Hæc, ubi alimento sunt repleta, colorem fulcûm, & nigras veluti maculas, aliquando præbent: sed omni humore vacua, proflus alba sunt, & ipsa parum elevata, & veluti ex duabus membranis conflata, inter quas alimentum pro nutrienda tota ejus vermîs parte, quæ incisuris interjacet, continetur. Nec ipsam substantiam vermîs crassiam, quam in hisce nodis, & tamen vix superant crassiam cerebri membranam, quam duram matrem vocant anatomici; aut communis animalis, ut porci aut ovîs veficam, fve crassitie: hi paulatim versus caudam progressi quanto erant caudæ extremo viciniore, tanto minores evadebant; ut tandem in caudæ extremitatibus oblirescerentur, unde intervalla quoque incisurarum semper minora & obscuriora cernebantur. Latera ubique in hac parte erant æqualia, & plana. At in altero frusto, quod post annum eadem mulier ejecit, octo pedes longo, crassum digitum lato, nodi majores, crassiores, rariores inciluræ, latera notabiliter crassia erant. Rondeletius scribit fuisse, quem vidit, fuisse à lateribus serratum. Carolus Cullenius, in scholiis suis ad Monardum, lib. 111 de simpl. ex novo orbe delatis de verbera, refert Lucam

Fernis lacus
non est mon-
strum.

Articles ver
més.

Plinius expli
c 147.

Caput Ver-
mæ.

Rescriptum ac-
tum.

Integrā lum-
brus iam effu-
git cum a-
curatissimis
eius decriptis
ne primus na-
per nobis ex-
hibuis Vire
vere Magni
et nobis in
causis D
Nicolaus Tu-
pae An-
p. An-
Resp. Ex-Sc-
bimus & S-
2. 17. Me-
cus & An-
tomicus nu-
ferendus, in
2. 17. Me-
2. 17. Me-
lib. 11, cap-
2. 17. Me-
2. 17. Me-

Lumbrici
terres perfor-
ant intestina
C. umbra-
tum.

Corpus luteum
Lumbri quatuor
ec.

Corporis sub-
stantia.

Color.

Spiræa laevis
L.

Genicula.

Latera ferra
ta, scilicet

* Nam anno millefimo sexcentimo primo, cum Petavii per publicam amentiam jecur, quod excarare vocant, praeperam ejusdem mulieris confilientis atatis, quae in noxiomem prope aedis Divi Francisci jamvis mortua, ad tantam naftem erat redacta, ut prater cutem, & ossa, vires quippiam competeret carnis, quod ossa contingeret, quatuor mulieribus teretes spithame anni longitudine in info truceo vena porae je infimale, ac toti corpori alimenti aditum, & viam obstruxisse, Virosque quatuordecim, quosdamque fabrico Aqpendentes, praecceptorum huiusmodi monstravimus, qui eos postea in publico Theatro anatomico cum nobis medicina doctoribus, & studio pro miraculo aspicendis proposuit.

OBSERVATIO RARA.

Farellum crispum quoque produxisse. Et profecto hic vermis eget crispis lateribus, maxime parte sui corporis latissima, nec procul ab ore, quod in flexuosis aliquando voluminibus degenti tam longo & plano animali, flexuosos ac veluti in orbem aut semicirculos, factos motus in omne latum natura debuerit accommodare, qui in tam plano corpore ad primum & supinum facile, ad latera vero plana absque eorum extremitatibus corporis, & frequentibus nodis, seu dearticulationibus, peragi nequibant. Igitur si quando in hac corporis parte, qua crispata habet latera, unum latum in spiras se convolvit ac torquet, oppositum beneficio crispæ suæ substantia cedit, æqualisque redditur suis extremis in distentione. Atque hinc patet causa tam admirabilem flexum, ut in glomi, ex filo convoluti speciem se quandoque formet, ubi medicamentorum vi ex ventre hominis totus propellitur. Cæterum incifuras in aliis vermibus rubro colore aliquando notatas fuisse accepimus. Pronum quid sit, atque supinum, non facile est in eo animadvertere, cum utrinque, dum aquæ innatat expansus, aut in saxum planum, afferremve projicitur, sibi similis sit: at si baculo ex aqua expansus in sublime attollatur, videntur tantum latera ab una parte finibus suis contrahi, ac veluti in se mutuo coire, apparetque tunc teres. In hac figura compositus esse videtur, quem Weckerus, in muliere quadam triginta quinque annorum in valle Gregoriana observavit, quam ait lumbricum octodecim pedes longum, una cum foedissimis excrementis ejecisse per alvum, tunc, non valde inanem, non admodum teretem, crassitudinis lumbrici terrestris. Sed hæc figura, ut aliquoties expertus sum, perit, si in aquam lumbricus demittatur, & planam tunc ad modum fasciæ recipit. Fortassis in hoc verme describendo, videbor fuisse paulo prolixior & curiosior, quam res postulat, sed non sine fructu. Accurate enim per lumbricum latum Hippocratem, & alios veteres, nil aliud intellexisse, quam vermem in intestinis genitum, planum, angustum, plurium cubitorum, figura fasciæ, substantiæ intestinorum similis, commostrarum sum conatus. Scholiastes Hollerii scribit, puellam quandam Parisiis, quæ in taberna ad portas Divi Iacobi decumbebat, album vermem latum, palmo majorem, fatis crassum, rejecisse per nares, nulla tussi, nullo vomitu præcedente. Per quem vermem non intellexit nostram tæniam, de qua sermonem habemus, sed alterius generis, ad teretes potius lumbricos reducendum, perquam rarum, quod natura solet in corpore, ex materia idonea, pro materiæ, & agentis causæ varietate, producere. Sic neque Forestus lib. xxxi observ. xxxv, ubi infantem duorum fere annorum commemorat, plusquam centum vermes per alvum deiecit, non longiores medio digito, & latiores depressioresque rotundis, alios (ut quidem ex eorum brevitate licet conjicere) intellexit. Neque is lumbricus, latus dicendus est, quem scribit Wierus ex rustico expulsum, sibi visum octo pedes longum & digitum unum, recto oris & capite anatis. Figura enim plana fasciæ non adscripta, & propterea in monstrorum catalogo reponendus.

Monstrum fuisse, uti Auctor assererat, non latum lumbricum vermem illum quem excretum à rustico Wierus se vidisse refert lib. xv de Prestig. Damon. cap. xvi, ne cui dubium sit, operæpretium factum me existimo, si adjiciam raram historiam de istis similibus vermibus, una cum iconibus eorundem ad vivum delineatis, quos videre contigit Patri meo p. m. D. Antonio Antonide Vander Linden, Enchusano primum, deinde Amstelredamensi Medico experientissimo. Eam sic refert.

Anno CIO DCCXI, Enchuse puerulus quatuor annorum cum per duos integros annos admodum languidus fuisset, & toto eo tempore de ventris (qui & tumidus semper diutiusque erat) doloribus punctationibusque nunc acerbioribus, nunc remissioribus conqueffus esset, ac sepe tenuem atque avram materiam magni cum torminibus copiose admodum per sedem evacuasset, tandem XVIIII lunn cum similis coloris & consistentiæ excrementis tres insigniter monstrosos vermes (quorum ad vivum formam delineatam adjuncta tabula, & coloribus insuper expressam a J. J. G. exhibet) magno cum screatu, præsentem matre in matulam, cui infidebat, deposuit. Unde mox ventris dolores evanuerunt, ejusdemque tumor admodum imminutus est. Mater filium ab olla sublevans, inque fecibus hæc monstra videns, quia horret ollam attingere, pannum cannabinum, quali tergendis & mandandis pavimentis nostrates ancilla utuntur, non procul inde ex clavo pendentem dum adferre properat & olla superinjicere, interea horum vermium unus ex olla ora propendens in terram delabitur, & per cloacæ foramen celeriter proserpens evasit, diligenterque mox extra domum questus inventus non fuit. Ego ob rei novitatem advocatus, postquam horam adveniens, atque rem totam ex pueruli matre intelligens, injectum olla pannum tollo, bacilloque feces atque & terrarum fetorem spirantes moveo, ac conspecta monstra inde aufero, non sine admiratione dicens adstantibus non monstra, multo minus vermes esse, sed juniorum anatum rostra cum annexis asperis arteriis, eaque haud dubie à quopiam in ollam antea injecta. Sed aliter ferem habere mox sum probabilibus rationibus mater, tum motus ipse certo docuit, quo se adhuc, horrendi isti vermes præsentibus variis spectabilibus moverunt, nunc se contrahentes, nunc iterum extendentes.

Porro prima figura utriusque vermis dorsum seu partem superiorem ostendit. In hoc autem verme desiderabatur oblonga ac tenuis cauda; quod forte ea in validiore & molestiore excretionē lacerata & abrupta in fecibus immersa manserit.

Altera figura utriusque vermis non tantum ventrem seu inferiorem partem; sed & præter integram caudam inter duos ab utroque latere appendentes longiusculos & anatinis non admodum ab similes pedes, foramen insuper oblongum & hians, inque circumferentia hirsutum oris instar, oculis exponit.


CAP. VI.

Quid Vermis Cucurbitinus Arabum, Tænia degener Auctoris.

Sed haud monstrosa atque insolens videtur ea vermium series, quam Cornelius Gemma Frius, olim Medicus Lovaniensis, Vir solide doctus, duodecim aut tredecim pedes longam, catenatim sibi adherentium, ac seminum cucurbitæ, seu cucumeris speciem præbentium eo in libro nobis

M. 2 depinxit;

Cornelii Gemmae Vermium Longa series



depinxit, qui de occultis naturæ characteribus inscribitur. Etenim similem Antonius Benivenius in suis medicinalibus observationibus videtur annotasse, ubi ait, se vidisse aliquando seriem vermium quatuor cubitorum longitudinem excedentem, quæ unicum corpus, & unum vermem referebat, ex multis sibi invicem mordicus inhaerentibus connexum. Et, quia equi fere omnes morbos pati dicuntur, quos homo, prætereundum hic non est, quod Musa Brasavolus in pullis equinis Herculis Ducis Ferrariæ mortuis ob ingentem vermium copiam, quæ in singulorum ventriculis continebatur, observavit; nempe hos vermes fuisse colore, partim rubicundos, partim subnigros, figura feminis cucurbitæ. Ego quoque pictorem Germanum ante aliquot annos Patavii conveni, ut hoc frustum veræ fasciæ, quod hic depingi curavi, delinearet, is mihi retulit sororem suam Augustæ Vindelicorum similes figura, quales Gemma depinxit, excrevisse, quorum iconem, quam mihi erat pollicitus, derepente Patavio avocatus ad Magnum Hetruriam Ducem, relinquere non potuit. Picturam igitur Gemmæ nostræ iconi adiunximus, propterea quod multis visa sit fasciæ, seu tania veterum; quamvis ex multis vermibus, femini cucurbitæ similibus constare nonnulli sint arbitrati, quidam etiam partus ejus esse. Si quidem Arnoldus Villanovanus cucurbitinos hoscæ vermes appellans, opinari aliquos refert, in ventre taniæ, quam cingulum vocant, generari. Quin proba & fide digna Matrona, inquit Monades, nuper in magno quopiam verme, quem ejus avia ægrota dejecerat, se vidisse multos vermiculos cucurbitæ seminibus similes asseveravit. Verum mea fert opinio, tam longam seriem vermium in ventre. Taniæ consistere non posse, uti mox probabo à forma corporis: neque ex multis vermibus, ut somniant auctores, sibi invicem adhærentibus catenatim, constam; sed ex multis nodis, veluti articulis, semen cucumeris referentibus, unum vermem esse compositum, qui, quod non habeat fasciæ aliquam similitudinem, non debet pro veterum lato lumbrico sumi, etsi longitudine par ei aliquando esse videatur, sed pro suæ speciei lumbrico, quem Arabes fortassis cucurbitinum vermem, à figura ejus articulorum, appellare voluerunt: quamvis Franciscus Pedemontanus latos & cucurbitinos, ex Rabbi Moyse, & aliis Arabum interpretibus, pro ejusdem generis lumbricis nominat. Ego nihilominus fasciam potius, seu taniam degenerem nominabo. De hac apud antiquos Græcos fateor ingenue me nullam reperisse factam mentionem; ut propterea aliquando fuerim in ea opinione, fasciam nostram quandoque in ventre se volvere posse in speciem talis vermis, qualem ex Cornelio Gemma hic secundo loco depingi curavi.

C A P. VII.

An Lumbricus Latus sit Animal.

Sed quia perobscura atque cognita perquam difficilis est tam longi corporis generatio & vita, nonnulli dubitare ceperunt, an id esset animalum, quod veteres latum lumbricum nominant. Non desierunt in arte medica nobiles Viri, qui id

animal esse negarunt; atque tantum substantiam esse rudem, & membranofam, quæ quandam vermium delineationem, & quasi inchoatam, non absolutam speciem præ se ferre videatur, esse voluerunt. Idque etiam veterum testimonio putant se probare, quos ajunt dixisse, substantiam quandam esse adnatam ipsis intestinis, quæ animalis formam repræsentat quodammodo. Ego nil quidquam tale ex veterum scriptis unquam elicere potui; ut propterea admirer, tam sapientes viros de iis dubitasse, de quibus neququam erat ambigendum, ac veterum fere omnium testimonio, alicujus forte obscurum locum anteposuisse. Peræque idem iis contigit, quod olim Sorano, qui dracunculi genus, quod lumbricis simile animalculum in regionibus Indiæ supra Ægyptum in muscolosis hominum partibus, brachiis scilicet & femoribus tibiisque, in pueris etiam in lateribus sub cute consistit, manifesteque movetur, negavit animal esse; verum tantum nervi alicujus concretionem, qui opinionem solum ducat, quod moveatur. Nam quemadmodum hic Soranus nunquam mihi visus est vidisse dracunculum, quod in Græcia malum hoc fit insolens; aut si forte Indi hoc affecti in Græciam transirent, non curiose inspexisse, ut nos nuper in carduele avicula; aut fide dignis reatoribus non credidisse, propter summam rei novitatem; eodem plane modo existimandum est, ejus novæ opinionis inventores de lato lumbrico, aut nunquam, aut sane negligenter lumbrici lati corpus, & figuram intuitos; nec antiquorum testimonio ullam fidem habuisse. Etenim si lumbricus latus non est animal, cur Hippocrates, Aristoteles, Galenus, & alii posteriores, lumbricum nominarunt? Respondebimus fortassis, quod striis & sectionibus hæc membrana prædita sit inflat vermium, non quod animalis vitam habeat? At per vetustus Auctor lib. iv de Morbis Hippocri vocat, dum dicit *ὅς ἐστι τὸν τὸ ἵπποκρί*, id est, ut communis interpretes vertit, qui habet hoc animalculum. Aristoteles etiam pro animali agnovit, dum eum in lib. v Hist. de Animal. cap. xix, inter insecta recensuit, quæ sponte oriuntur & pariunt. Plinius, de insectis loquens, quæ nascuntur in homine, taniarum mentionem facit, quos alii posteriores Græci & Latini scriptores secuti sunt. Hippocrates, seu libri quarti de morbis autor, sensum & motum ipsi peculiarem assignavit; dum ait, totum animal in pilæ modum se componere à præassumptis medicamentis bene præparato homine. Et paulo ante, quibusdam, inquit, iter facientibus, aut laborantibus, & ventriculo calefcente, deorsum descendis, ipsique prominet ex podice inflatus, hocque facit, & de podice recedat, aut retrocedit. Profecto non retrocederet, si sensu motuque careret. Certe primam partem hujus vermis à me depictam, soror ægræ (ut multorum omittam nomina, qui ipsum vivum excrementum fuisse viderunt) cum ex ano extraheret, adhuc lumbrico adhærentem digitis avulsit à reliquo corpore, & in aquam projecit, moventemque se in gyrum ad modum coronæ aut cinguli se vidisse mihi narravit, brevique temporis spacio exanimatum, reliquam partem, quæ adhuc ex ano propebat, denuo in ventre regressam. Atque ego asseverare possum, me apud ægram hanc aliquoties auribus percepisse, instar pilcis in aqua se volutantis,

Non esse ex antiquis probatur. Mercurialis notatur.

Dracunculus animal.

Candilli Dracunculi laborant.

Est animal ab auctoritate probatur.

Lumbr. Latus sponte nascitur.

A sensu & motu.

*A. Spigelius
quodammodo*

tantis, strepitum facientem in abdomine: quin etiam manu abdomini imposita sensisse motum, tanquam foetus in utero conclusi. Et cum videam, formam corporis, partium, articularumque seu sectionum esse motui aptissimam, ut paulo superius monstravi: nec tam longi corporis, ac destinata figura præditi, fieri posse generationem atque conservationem per annos in ventre humano, absque vitali calore & spiritu; nil aliud concludendum censeo, quam lumbricum latum, animal esse, & ex eorum genere, quod sponte generatur more quarundam plantarum; quia nullo sexu distinguatur, & in ventre animalium, in quem nunquam antea aliunde erat ingressus, sponte proveniat.

*Generatio
ex aqua
sa.*

C A P. VIII.

*De ejus generatione, & primo de materia,
ex qua nascitur.*

Nunc, quomodo hæc spontanea fiat generatio, investigandum est. Ad hanc materiam, loci, atque causæ formalis indicatio est necessaria. Materiam duplicem apud Scriptores invenio: nempe propriam ex Aëtio atque Ægineta, & communem. Appellatur enim communis, ex qua & alii vermes in intestinis producuntur. Hæc autem alimentum esse dicitur, aut excrementum. Etenim Polybus & Galenus alimentum statuunt: ille quidem lac, & sanguinem; dum foetus adhuc in utero existenti innascitur; hic vero, egresso ex utero, cibum. Aristoteles autem in excrementis adhuc intra animantem contentis tam latum lumbricum, quam aliorum lumbricorum species nasci docuit. Cæteri vero docti Medici ex pituitosa materia, viscida, & cruda, chylove, quod eo nutriatur, vivatque in iis partibus, per quas chylus labitur, aut ex utraque quadam materia conflata. Solus Aëtius, si quorundam, haud infamæ famæ virorum sequi volumus opinionem, lumbrici lati propriam materiam dicere videtur intestinorum interiorem tunicam propriam, ubi sic inquit: *Est autem latus lumbricus si ita dicere libeat, permutatio pellicule intrinsecus tenuia intestina ambientis in corpus quoddam vivum, quod continuos stomachi morfus inserit.* Quibus verbis non videtur velle Aëtius interiorem intestinorum tenuium tunicam in animal vivum mutari: sed definire lumbricum latum, aut describere per formam & substantiam sui corporis, docens nempe tam esse similem intestinorum tenuium tunicæ internæ primo aspectu, ut quis eam conversam in animal esse diceret, si liceret per rationem. Quis enim sibi somniabit internam intestinorum tunicam in animal posse converti, cum sit pars nostri corporis spermatica? quis deinde hominem absque ea vivere? quomodo abscedere ab intestinis tam longæ fasciæ, quæ interdum omnium intestinorum longitudinem vincere sunt observatæ, absque intolerabili & lethali dolore, sibi quis persuadebit? cum videamus in torminibus intestinorum, abraso tantummodo mucos ab intestinis vimordacis materiam, acerbissimos cruciatus excitari. Quare explodentes tam indignam omni hominum fide opinionem, revertamur ad eos, qui materiam cum cæteris ventris lumbricis communem statuunt, ut tandem ex ea aliqua propria invasti-

*Materia duplex
Communis.*

*Alimentum
qui statuunt.*

*Excrementum
qui.*

*Cruda &
pituitosa
materia
qui.*

*Tunica interior
intestinorum,
conposita
in animal
vivum.*

getur. Imprimis autem videndum est, quid Polybus seu autor lib. x v de Morbis per sanguinem & lac in pus conversum intelligere voluerit; quidque Aristoteles per excrementa intra animantem contenta. Etenim Polybus docens, quomodo foetus adhuc in utero matris existenti, lumbricus latus innascatur, ita ait: *ἐπὶ τῷ ἥμῃ πῶς καὶ οὐδὲς δὲ τὸ γάλακτι & τὸ αἷμα & οὐ σπογγώδης, ἀπὸ γλυκὺ & ἐν τῷ ζῶν ἀποψύσσεται αὐτὸν δὲ γίνονται ὅς ἐστι σπυγγώδης ἑλμύντες αὐτὸν πρὸ τοῦ τῷ αὐτῷ.* quæ sic vulgaris interpres: ubi ex lacte & sanguine computrescente, ac redundante, utpote quod dulce est, pus factum fuerit fervidum, animal istuc generatur. Nascuntur autem & rotundi lumbrici istuc eodem modo. Sed cum lumbrici in intestinis generentur, quomodo sanguis & lac eò devenit, si ore foetus non trahat sanguinem, neque lac, dum in utero matris concluditur? Duplex responsio. Vel enim dicendum est, ejus libri autorem credidisse unâ cum veterioribus philosophis & medicis, foetum in utero matris fugere, & ore alimentum capere, cum viderent excrementum, quod statim aut paucas post horas à partu ejicit infans, atrum quidem primo, mox piceum & sanguineum (ut scribit Aristoteles) deinde lacteum; vel quod magis crediderim, existimasse in trimestribus & quadrimestribus gravidis, & iis quæ ultra hoc tempus uterum gerunt, cum sanguinem, qui solet ad mammam fluere ac in lac quodammodo converti, iterum à mammis, tanquam quid dulcius, regredi ad uterum pro alimento foetus magis conveniente, ab utero deinde trahi per venas umbilici in jecur. Idem enim autor libro de natura pueri, qui falso Hippocrati adscribitur, facto factu auctiore, sic scribit: *ἐλκετὶ δὲ τὸν αἷμα & ἐν αὐτῷ τὸ γλυκὺ καὶ τὸν αἷμα, ἀπὸ τῶν γάλακτι & ἐπὶ αὐτῷ κατὰ τὸν ὅλον, id est, Trahit enim quod dulcissimum est à sanguine ad se, simulque etiam lacte modice fruitur.* Sic igitur ubi sanguis ad jecur pervenit cum imperfecto lacte, ex mente Polybi, in stomachum, & intestina per venæ portæ ramos fluit, ibique in pus aut faniem convertitur. Etenim in foetu, tam hominis, quam alterius animalis quadrupedis, apparent intestina referta materia alba, glutinosa, puri simili, non quidem ei, quod ex ulcere aut vulnere manans, omnibus conditionibus laudabile existit, sed cui flava materia, & ichorosa modico sanguini interterum permixta est. Verum quod hæc sit excrementum ex pituitoso humore & bilioso à capite & jecore, aliique corporis partibus detrusum in suam sentinam, quæ venter est inferior, in libro de formato foetu pluribus demonstrabimus. Hoc igitur erit illud pus, quod una cum stercore videtur Aristoteles appellasse excrementum intra animal contentum, ex quo fieri lumbricos volebat.

*Sanguis &
lac quod &
sibi.*

*Problema
evolutur.*

*Forum lac
fugere.*

*Autor lib. de
nat. pueri non
tacet.*

*Aristoteles
explicat.*

*Excrementum duplex
Arist.
Vnde.*

& sterco

& stercus dicitur, atque interdum absolute excrementum à Medicis, ut videntur docti Viri intellexisse, & imprimis Hieronymus Mercurialis; sed excrementi nomine id solum omne complexum fuisse, quod *ἐν κοιλίᾳ τῆς κοίτης*, in ventre inferiore, hoc est, in intestinis tam tenuibus quam crassius reservatur à natura ad excernendum; sive à cibis ingestis ibi relictum sit, tanquam inutile pro alimento; seu à corporis præcipuis partibus, capite scilicet, & jecore eò delapsum. Quamobrem etiam si alimentum excrementum sit contrarium, non tamen Polybo (qui librum de morbis dicitur scripsisse) Aristoteles contradixit, quod ille ex sanguine & lacte generari lumbricum diceret, hic ex excrementis in animali adhuc contentis. Neque etiam Galenus Aristoteli, quod ex cibis lumbricos nasci diceret; nec alii, qui ex chylosa materia statuerunt. Omnia enim hæc, ut fiant lumbrici, in excrementa mutentur necesse est. Verum quemadmodum ea, quæ sponte generantur, materiam aliquam determinatam & propriam habent, veluti testacea, quæ *ὀστρακοειδῶς* Græcis dicuntur, in limo sponte fiunt, sed tamen pro limi differentia, specie diversa (nam in cœnofo, dicebat Philosophus, ostrea; in arenoso conchæ, chamæ, solenes, peccines proveniunt) sic etiam cum ex intestinorum excrementis nascantur lumbrici, pro excrementorum differentia, variare lumbricorum species oportet, ita ut aliud sit excrementum quod latum, aliud quod rotundum, & ascarida progeniat. Id jam ratione investigandum est in excrementorum generibus, quod aut simplex est, aut compositum. Simplex, ut pituita, mucus, seu crudus humor, bilis, melancholia, aqua, stercus, & quicquid in alimentum verti nequit. Compositum, quod ex hisce, vel omnibus simplicibus, vel quibusdam, est permixtum. Oribasius inter veteres scriptor egregius lib. 111, aph. xxx, latos, ex pituitoso; ascaridas, ex nigra bile & melancholico humore; teretes, ex bilioso fieri scribit. Montanus inter recentiores, ex omnibus humoribus omnes nasci lumbricos putavit, quod variis coloribus, modo flavo, modo nigro, modo albo, & rubro colore insignitos conspexisset. At Galenus ex cruda, & Paulus Ægineta ejus interpretes, ex pituitosa, crassa, crudaque materia, omnibus lumbricis originem esse, expresse tradit, non ex calida, acri aut atrabiliari. Hæc enim, inquit, cum etiam nutrimenti naturam transgressæ sint, ad lumbricorum generationem ineptæ existunt, imo vice versa etiam corrumpendi ipsos vim habeat biliosæ maxime superfluitates. Si quando una cum lumbricis excreta fuerit flava bilis deorsum, aut per vomitus, illos quidem in intestinis esse scito, biliosum autem humorem, aut circa os ventris, aut alia quadam parte constituisse. Hujus sententiam reliqui omnes posteriores Græci & antiquiores Latini secuti sunt. Nam Alexander Trallianus in epistola de Lumbricis, Celsus, Plinius, Columella in libris de rustica, ex pituitosa vel cruda materia nasci omnes lumbricos commemorarunt. Quid igitur pro Oribasii defendenda sententia adferemus, utpote qui hunc Pauli Æginetæ locum optime animadvertit, cum fuerit eo posterior? Certe nil aliud, quam quod Oribasius per bilem flavam & atram, non intellexerit sinceris eos hu-

mores excrementitios, sed permixtos cum aliis, nempe crudo & pituitoso, quem quia biliosi humores superabant, potius biliosos, quam pituitosos voluit appellare. Etenim nullus Medicorum dubitabit, ex viscida, & glutinosa materia corporari vermem, quacunque in corporis parte nascatur. Hanc, si quis adhuc in intestinis existentem, crudum humorem, aut pituitosum voluerit appellare, parum interest, dummodo intelligat, pro ratione mixtionis, diversorum humorum, loci proprii, ac caloris, species lumbricorum diversas generari: ut si pituita cum multa materia terrestri & stercorea in intestino recto sit, accedente calore idoneo, ascaridas produci: sicut plurima bile in intestinis tenuibus cum pituita, lumbricos teretes. Nam in eorum corporum diffinitione, qui febre maligna obierant, plurima bile referta intestina una cum multis lumbricis teretibus notavimus, qui bile repleti, tanquam eo nutrimento, vivebant. Lumbricum latum cuncti autores ex pituita lenta & viscida formari testantur, sed aliis humoribus impermixta.

C A P. I X.

Pituita quomodo transeat in lumbricum latum, & quanam hujus prima forma?

Am quomodo tam longum animal formetur ex hujusmodi materia, dicendum est. Id sit opera caloris insiti, qui suscitatur de potentia materiæ, quam in actum deducit, ubi propriam & peculiarem quandam putredinem in ventre acquisivit ex obstructionibus, ob quas non potest à natura nostra hæc materia evinci, ut mutetur, vel in alimentum corporibus nostris idoneum, vel in tale excrementum, quod ilico cum aliis alvi superfluitatibus excerni possit breviori tempore, quam in animal transformari queat. Etenim formatur prius ab innato calore & spiritu, quam vitam animalis adipiscatur: quod uti teretibus & ascaridibus brevi temporis spatio, nempe viginti quatuor horarum, aut paulo plurium (veluti ex ægrorum historiis alias didici) fieri solet: ita in lumbrico lato longius tempus desiderari, ex tarditate motus, quo præditus est, corporisque longitudine, conjicio. Sed qualem figuram, aut corporis delineationem hic calor materiæ imprimat, aut qua forma sit vermis, antequam animetur, investigare perquam difficile est. Lumbricos rotundos percipimus aliquando in vitulis nasci, facta prius delineatione pituitæ longa, & tenui, instar fidium crassiorum testudinis, quæ postea, ubi vitam acceperit, surgens alimentum, crassior evadit & amplior. Actuarius de lumbricis teretibus scribens, *priusquam, inquit, in animal probe formati fuerint, atque à se invicem sejuncti, non secus quam tenuium funiculorum quidam globi excernuntur*. Ex cujus verbis unusquisque potest animo concipere, ex pituitosa materia quando lumbricus teres generatur, nescio quid conglobatum, veluti ex tenui filo, prius formari, quam animal sit. Sed figuratio materiæ, seu prima ejus delineatio, ad tam longi animalis generationem, à nullis, quod equidem sciam, scriptoribus vel oculis conspecta, vel diligenti ratione investigata. Vt gratia longitudinis lumbrici, de longitudine ejus corporis, communis sit facta Medicorum senten-

Lumbricorum teretum & ascaridum citra generatio.

Lumbricii vitæ sutorum.

sententia, eam fieri vel per materiam appositionem, vel propter materiam copiam. Nam Franciscus Valeriolus lib. 1. *Obfero*. ix, ingeniosissime hæc scribit: *Quomodo autem ad tantam longitudinem protensa fuerit & ut genita, haud difficile fuerit perquirere, si quis vermium generationem reliquorumve insectorum, aus etiam fetus in utero sibi proponat contemplandam. Nam quemadmodum ex calida genitura in loco calido constituta, ipsa quidem inflatur, atque inflata pelliculam sibi induit: (circumenditur enim, quod forissecus circum ipsam est, continuumque evadit, ut pote viscosum existens) & quemadmodum in pane, dum torretur, tenue quiddam pellicula specie in superficie abscedit ac extat: (calescens enim panis & inflatus attollitur: qua parte vero inflatur, illic pellicula species excutitur, & consistit) ad hunc sane modum existimandum est, pituitam in intestinis copiosam quidem existentem, & calorem & ipsam quoque concepisse, tum merito loci, tum etiam à calore putredinali excalescentem: (erat enim in homine (Petro Rationo Vinitore, in quo se latum vermem, quem solummodo membranam appellat, observasse scribit) calor febrilis multus ex humorum intus, putredine enatus, unde febris continens gignebatur) calefactus vero is humor, & sequax existens, à calore agente, & partes continuante, in membrana formam abiit: & qua parte humor is magis incaluit, ea parte pelliculam induxit, ut in pane, quæ crusta nominatur: ac proinde effectum est, ut à calore humidum evaporante atque exsiccante, superinducta quedam pellicula tenuis huic humoris fuerit, quæ speciem membranae longè instar coriacei praeberit. Quod vero striis & laciniis membrana ea ficta foret, id inaequalitatis subiecta materia, & loci est merito adscribendum; quod non ex aquo complanatus esset humor, ex quo membrana à calore efformante effingebatur, inde striata ille (ut arbitrandum quidem est) oriebantur: vel etiam, quod cum materiam hanc vermium propriam esse dixerimus, delineationem quandam, & rudem vermium quasi inchoatam, non absolutam speciem referre ea membrana videbatur, striatam gerens formam: striati namque vermes revera sunt. Hæc illæ. Quibus verbis etiam malo eorum, qui ejus membranam vermiformem nequaquam animal esse putant, fundamento innixus est, videtur tamen tam ingeniose & recte generationem ejus membranæ proposuisse, ut multi, qui eandem membranam animal, & lumbricum latum veterum esse arbitrantur, eodem plane modo lumbricum latum generari, possent credere, nempe primo mutata copiosa pituita in membranam vermiformem magnitudinis & formæ talis, qualis ipse vermis jam perfectus cernitur, deinde animata. Verum equidem opinor longe aliter hanc rem sese habere. Etenim quemadmodum arbores magnæ ex parvo semine initium habent: ita quoque magna animalia, ex parva mole ortus sui primordium sumere, demonstratur ex singulis, quæ per sexum generant. Et in iis, qui sponte nascuntur, idem est observandum: nempe ex perquam exiguo corpore formari animal, quod cum de foris alimentum capere incipit, prægrande evadit. Non aliter videtur natura posse hunc latum lumbricum producere. Etenim ad tam longi corporis conformationem, antequam vivat, non modo requiritur copia tenacis pituitæ, quæ aliquando in intestinis cumulari solet, sed etiam locus opportunus, in quo secundum longitudinem diffluenta paulatim, quo pacto docet Va-*

leriola, tunica obducetur. At talem in intestinis nullum invenio. Nam excrementa acria, vel duriora, quæ præterlabuntur, partem jam compositæ ad animalis formationem materiam (cum adhuc tenui pellicula induta sit) abrumperent, cum idem faciant in animali jam perfecto. Siquidem lumbrico lato per longitudinem intestinorum extenso, sæpe videntur particulae ejus à corpore avelli, atque abscedere, interdum unius spithamæ, vel pedis, interdum plurium cubitorum longitudine. Est præterea lumbrici longitudo interdum multo major ipsius intestinis. Et hæc sola ratio sufficiat ad probandum, vanum esse arbitrari, pituitam per longitudinem intestinorum duci ratione tenacitatis & lentoris; & propter inaequalitatem, tum loci, tum materiam, multis incisuris articulari; & magnitudinem, qua ipsum animal perfectum cernitur, antequam animetur, jam habere. Hinc etiam potest intelligi, minus esse probabile Medicorum opinione, qui hæcenus materiam pituitosæ copiam requiri ad generationem vermis scripserunt; cum à parvo verme jam perfecto, capiente de foris alimentum, proferatur corpus in tantam longitudinem supra ei assignatam. Atque hunc vermiculum per longitudinem intestinorum productum figurari, priusquam vitam nanciscatur, olim non credebam, sed in spiras veluti compositum, ac conglobatum, & quemadmodum in ovo factum, levi membranula obducta à calore innato. Ea enim mihi tutius videbatur generatio, quod minori spatio corpus contineretur, imbecille adhuc & externis injuriis præterlabentium excrementorum minus obnoxium. Ad hoc persuadebar exemplo animalium longorum & pedibus carentium; quorum foetus in ovo, priusquam nascatur, circulatim & arcuatim jacet, ut serpentum, & erucarum. Dracunculus obscuri motus vermis, quem in carduelis aviculæ coxa, sub cute natum semel conspexi ante paucos annos, pedalis longitudinis, mediocri chordæ testudinis crassitie, forma profus nervuli, hac fere figura positus erat. Itaque quemadmodum hic non ante cutem perrumpit, & foras prodit, quam veram perfectionem, quæ in tardo motu existit, acquiverit: si etiam latum lumbricum involutum, in spirasve contractum, in membrana prius nasci, mox vitalem factum, vinculis natalibus solvere, membranam perrumpere, tum intestino secundum longitudinem se annexere, atque sic adhærere, ad tutius capiendum alimentum, illudque esse, quod scribit Arist. lib. v. Hist. de Animal. cap. xix, ἡ δὲ ἀνάλειψις πρὸς τὸν σπινθὴν πρὸς τὸν σπινθὴν, id est, *latum autem soli adheret intestino*, hoc est, internæ intestinorum superficiei, vel tunicæ soli; ac si diceret, reliquas duas lumbricorum species, nempe teretem & ascarida, non adhærere intestino, sed vagari in intestinorum cavitate, ac permisceri cum excrementis & cibo. Sic igitur quondam sentiebam. Verum cum considerassẽ accuratius planam corporis figuram, etiam longam, non requirere tantam circumvolutionem, aut compositionem in spiras, ut quæ teres est, atque longa, quod illa distenta per longitudinem intestinorum valde exiguum spacium occupet: imo in muco, quo interna intestinorum superficies in crustatur, tutissime sic sita vitæ primordia capere posset, coepi dubitare

de hac

Panis confectio.

Alia opinio rejicitur.

Prior Auctoris sententia tutior.

Alia Auctoris sententia.

Observatio
animum.

de hac mea sententia. Tandem Lanios Germanos adii, quibus aliquando in intestinis boum solet lumbricus latus occurrere. Hi retulerunt, se circa initia ætatis, vel medio veris tempore, quo generationis primordia ducere ajunt, exiguum aliquando per longitudinem intestinorum distentum, & firmiter iis annexum conspexisse. Patet igitur apud Aristotelem illud verbum *περὶ τῆς φύσεως* significantius accipi posse pro eo, quod dicimus, *adnatum esse*.

C A P. X.

Plures uno non nasci: nec bis in homine nasci notatum.

Duplex Pro-
blema.

ITaque cum à parvo principio, & parva corporis mole hunc lumbricum originem capere asseruerimus, oritur duplex problema; primum non inelegans, nempe; cur non gignantur plures uno, cum lumbrici teretes & ascarides plurimi generentur in ventre animantium; & id docere etiam videtur Actuarius lib. 1. Meth. med. cap. xxxi, qui Julio Alexandrino interprete, inquit, *Porro tanta una lata in intestino gignitur*. Alterum deinde problema est, cur semel expulsi vix alius renascatur? neque enim ullus unquam visus est latus lumbricum excrevisse integrum, & post hunc rursus alios in ventre ejus natos: alii vero lumbrici breviterum numero, nempe ad summam trium vel quatuor denuo nasci in multis ægris videantur. Respondeo ad primum: naturam ea animalia, quæ grandia procreavit, pauca numero producere voluisse; quæ vero parva, plura. Quadrupedum enim maxima singulos pariunt foetus, ut bos, elephas, asinus, equus: parva multos pariunt, ut sunt canis, felis, mus. Inter aquatilia cete uniparum est. Arborea, quæ magnos, respectu suæ magnitudinis, faciunt fructus, paucos producunt, quod fit propter alimentum, quod multis magnis fructibus suppediari commode non potest. Hac eadem ratione natura videtur tantum unicum vermem latus generasse in ventre. Neque enim ex parvo principio propter alimenti inopiam, loci angustias, & corporis humani imbecillitatem, ad tantam magnitudinem vermibus, tanquam ad suam perfectionem ultimam, & veram unquam pervenire potuisset, si eodem tempore plures numero procreasset. Apud Forestum tamen, inquit, in medicis observationibus legi, quendam adolescentem, ultra duodecim vermes latus, admodum longos, rejecisse, qui non alios intelligit, quam eos, de quibus jam agis, cum eorum signa in excrementis comparuerint certissima. Sed ego, ut tibi respondeam, cenfeo, omnes, quotquot sunt, qui scripserunt se latus vermes plures, quam unum, ab ægro expulsi conspexisse cum veris signis lumbrici lati antiquorum, partes tantum unius lumbrici, pedem circiter longas, aut unum vel alterum cubitum, aut plures ab integro vermibus corpore abruptas vidisse, nequaquam tot integros lumbricos. Quod si, per communem aliorum observationem, quispiam revera plures integros in nostro corpore genitos animadvertit, necesse est, eos de communi longitudine plurimum degenerasse, & propter alimenti indigentiam expulsi fuisse, antequam perfectam magnitudinem

acquisivissent. Sic arborea quædam magnorum fructuum feraces, si plures quam ex consuetudine naturæ ferant fructus, minores proferunt. Ad secundum problema dico, uno semel expulso, alios non renasci, quia cum rarius sit hujus vermibus generatio, adhuc multo erit rarius, rursus post hujus speciei vermem semel expulsum alium posse oriri. Non tamen nego, quod similis aliqua putredo in corpore generari denuo posset, & eandem vermibus speciem secundo producere.

C A P. XI.

Locus generationis utrum crassum sit, an tenue intestinum.

Quoniam igitur à parva mole initium generationis habet in intestinis, atque intestinorum duo sint genera, crassum & tenue, quæret quispiam ulterius, in utro horum generetur? Galenus nullibi (quantum equidem memoria teneo) certum aliquem generationis locum in intestinis, vel crassis, vel tenuibus ausus est assignare, cum tamen aliis lumbricis proprium indicarit. Nam in comment. aphor. xxvi, lib. xxi, in parte inferiori crassi intestini, maxime ascarides provenire scribit, in superioribus intestinis, teretes. De lato autem subdit tantum eum esse *omnium longissimum, & sæpe per omnia extendi intestina*: quasi vero dicat, se nescire, utrum in aliquo proprio intestino, ut cæteri, generentur; an vero omnia intestina, tam crassa, quam tenuia simul, sint proprius generationis lati lumbrici locus, cum sæpe per omnia intestina extendi videatur. Alexander Trallianus in epistola de lumbricis hæc eadem videtur opinatus, cum eadem, quæ Galenus, repetat. At Aëtius audacter in tenuibus præsertim ortus sui initia trahere docuit lib. ix, cap. xl. Reliqui omnes posteriores docti medici, quos nominatim recensere superfluum cenfeo, unanimiter in crassis, præcipue vero in colo. Atque ita mihi sentire videntur, qui colon intestinum multis valvulis seu cellulis, copiosa pituita refertis, præditum sit; quodque locus sit longe capaciore intestinis tenuibus, tam magno animali generando. Sed quoniam jam satis videor probasse, non requiri magnam illam pituitæ copiam ad hujus animalis generationem, quam hætenus omnes putarunt; neque locum amplum, quod à parva corporis mole primordia ducat; etiam colon intestinum esse locum incommo- dum, tum quod humore aqueo & copioso careat (semper enim repletur excrementis ficioribus) tam quod procul absit à chylo, quo simul ac natus est nutritur, & in tam vastam longitudinem brevi tempore se extendit, cogor sequi opinionem perdocti Aëtii. Hippocrates, foetui adhuc in utero matris esistenti latus lumbricum innascenti, scripsit. At cum crassa foetus intestina crassis & duris excrementis distendantur; tenuia vero liquidissimis abundant; non video ullum commodiorem, quam in tenuibus generandi locum. Accidit autem tum temporis, ut tenui pituita à capite distillante in ventriculum, & ad chyli quandam formam à ventriculi concoctrice facultate redactam, nutriatur tandiu, donec ex utero egressus foetus lac sugere incipiat; tunc enim lacte gaudet, si non una cum excrementis intestinorum, & cor-

Aëtii opinio
de loco proprio
generationis
lumbrici lati.

Approbat Aëtii
sententiam.

poris totius purgatione , quæ fit blande laxantibus
medicamentis , atque colostri * lactatione primis
quatuor diebus , cum in lucem editus est , è ventre
infantis expellatur.

Paspalum
lum.

Colostyrium.

Infantes co-
llycati

Lac bonum.

[illegible]

C A P. XII.

Qua etate generetur in humano Ventre.

An hermine
confusante
Lumière
latine.

Hippocrates mentio me nunc trahit ad diligens inquirendum, qua ætate potissimum generetur. In libro enim quarto de morbis manifeste docere videtur, primum in adultis non nasci hunc lumbricum, sed semper in foetu adhuc in utero existente, & sic una cum homine oriri; iterum, etiam, nisi expellatur tempeste, cum eodem mori. Verba ejus hæc sunt: Νῦν γ' ἐρέω αὖτις ἐμάνθαν τὰν παλαιάν. γίνεται γὰρ Φύμη ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇσι μήτραισι ἐνόν. ἡ γὰρ ἐστὶν ἰσὺν ἀπὸ τῆς τῶν μητρείων ἐξέλιξις χροῖος, τῇ κοίτησιν ἐν τῇ κοιλίᾳ σπῆται, αὐτὴ σπένδεται ἐν χειροπόδεσσι, χρόνῳ παλαιῶν ἐν αὐτῇ, ὡς πικρὴν μὲν ἐστὶν γίνεται. ἀποσπείρεται δὲ ἀπὸ τῆς ἑλκῶν κόπτης ἀπὸ πύσος γήμερας, καὶ μέλινᾳ ὑδατίνῳ ὁ ἀσθρῶπιος. γίνεται δ' ἐν τοῖσις ζῶνι, ἐν δ' ἐν τοῖσις γήμειραι, καὶ ἀποσπείρεται ὁ αἰσθρῶπιος. πολλὰ γὰρ γίνεται ἐν τῇ μήτραισι ἐνὶ τῇ παιδίᾳ. Quæ sic verba interpretor: Nunc autem de lumbrici latit dicam. Postquam enim ipso in puero dum adhuc in utero est, nasci. Postquam enim semel ex utero egresus est, non tanto tempore steruus in alvo manet, ut ejus diuturnitas & putrefactio, tanta magnitudinis animal generari possit. Externi enim semper externum steruus per omnes dies, si sanus homo esse debet. Tota vero animal nasci non potest, etsi multis diebus homo steruus non egeret. Multa enim nascitur, dum puer in utero est. Petrus Salus Diverfus, vir doctissimus, in commento hujus libri putat autorem voluisse his verbis probare, latum lumbricum foetui adhuc in utero matris existenti nasci, non tamen etiam negare in adultis generari posse, cum subjungat etiam innasci in ventribus jam ex utero egres-

rum. Ἐπὶ τὰ πλείστα γέννηται ψυμωμένη αὐτὴ ἀνὴρ
 κερπὶς τὴν αὐτὰ Φαέρμακα, ἀπὸ καὶ κοπέτῃ ἐξ ἑλθὼν ἐκ τῆς
 ἑρπύλλης, καὶ μὴ ζωοποιεῖται, ὥστε τὴν ἑρπύλλη ἐκ τῆς ψυ-
 μωμένης, πολλὰ δὲ τὰν πλείστα, καὶ στρογγύλη καὶ σκατεῖται
 ἑμὲν ὡς ἀποπύοντα κματὶ τὴν κερπὶς τὴν πλείστη, ὅτι μὴ
 δύναται ποιεῖν, γίνονται καὶ σὺ τὴν ὑπόστασιν αὐτὴν μὲν στρογγύ-
 λην πλείστην, καὶ αὐτὴν σκατεῖται ἕκ ἑκατὶ, καὶ ποιεῖται
 αὐτοῖς. id est, Postquam in lucem editi sunt pueri, mulieres
 ipsae in cibo offerunt medicamenta, quo pueros ex in-
 testino exco, et non comburatur, et simul in testum
 dilatatur, cum cibum obtulerint. Multi sane pueri, et ro-
 tundos, et latos lumbos una cum primo stercore excre-
 unt. Si vero non excreverint, fiunt citius, infloresce-
 nescunt in ventrum. Et rotundi quidem parvius, lati
 vero non amplius, etiamsi quidam ipsi parere dicant.
 At ego tum ex vi argumentorum, tum ex ordine
 dignitatis, cumque ob hoc loco, si diligenter

Elicitus sensus Hippocraticus.

give X quid.

Locus obscu-
rus Hippocra-
tis.

priusquam perfectam aliquam magnitudinem acquirat. Ad octo cubitorum longitudinem Hercules Saxonia, in puero fe notasse scribit. Porro quod Auctori libri quarti de morbis, seu Hippocrates narret recenter natos pueros aliquando excrevisse rotundos lumbricos & latos, volui sedulo apud obstetres inquirere, an illud unquam tum in Germania, tum in Italia ab ipsis fuerit observatum; quæ id prorsus negarunt. Laniones & maccellarii (quos hac de causa aliquando allocutus sum) in vitulis nunquam latum lumbricum confecerunt, sed in adultis jam & grandibus bobus.

C A P. XIII.

An Pariat?

DE partu etiam non conveniunt inter se scriptores. Nam Aristoteles lib. v Hitt. de animalib. cap. xix, parere scribit cucumeris semini quid simile; *δοκίμια δὲ οὗτοι οὐκ ὀλίγη*, inquit. Miror tam diligentem Philosophum, qui omnes libros autorum, qui ante ipsum extiterunt, diligenter perlustravit, non incidisse in eum auctoris libri quarti de morbis locum, ubi ex professo negat latum lumbricum parere; tum etiam alios magis admiror, qui cum lumbricum cucurbitinum quem ex Cornelio Gemma depingi curavimus, partum similiter lumbrici lati censuerunt. Verba auctoris libri quarti de morbis hic placet adicere ex communi versione. *Et rotundi quidem pariunt, lati vero non amplius, etiam si quidam ipsos parere dicant: neque enim ab uno animalis tot puli generari possunt; neque ea est loci in intestino capacitas, ut partus educare queant. Augescente autem puero, augetur etiam lumbricus in intestino ab his, quæ in ventriculum ingesta sunt, & æqualis fit intestino, quibusdam in pubertate, quibusdam posterius, quibusdam paulo prius. Et postquam intestino adequatus est, similiter augetur, & quanto major factus fuerit, una cum stercore excernitur de intestino recto, & excidit veluti cucumeris semen, sæpe vero etiam major. Et paucis interpolitis subiungit iterum: Signa vero quod non pariat, sed ita habeat, veluti ego dico, hæc sunt. Si quis curet hominem, latum lumbricum habentem, & medicamentum dederit, aut potionem, siquidem fuerit homo bene preparatus, totus rotundus factus ad pile figuram exit, & homo sanus evadit. Si vero ad medicinam hereat, recta pars de lumbrico abrumptur, longitudine duorum aut trium cubitorum, aut etiam longe amplior: & ubi abruptus fuerit, per multum tempus signa cum stercore non prodeunt: postea vero augetur. Atque hæc argumenta sunt, quod lumbricus latus non pariat, sed abrumptur. Hæcille. Cujus sententiam, quæ partum negat, non modo approbo, sed adhuc aliis argumentis, ab eo non tactis, stabiliro. Etenim quæ infecta pariunt, aut sui simile animal pariunt, ut aranea, vel cicada, vel araneam, vel cicadam: aut genus diversum, ut musca vermiculos. Sed neutrum horum parere lumbricum latum, ex eo manifestum est, quod unicum tantum in singulis animalibus natura procreari voluerit. Flores si ex illo prodissent, incremento suo, quod cito perficitur, restitissent. Deest quoniam etiam locus in hoc ipso verme, qui in cæteris uteris est, quo suos foetus inclusos habent usque ad partum. Idcirco sexu haudquaquam distinguitur, tum quia ex putri provenit, ex quo dicebat Aristoteles nullum*

animal natum generat sibi simile, tum quia unicum semper generatur. Quod videtur etiam Actuarii lib. i Meth. med. cap. xxxi, animadvertisse, iniquiens, interprete Alexandrino: Porro *tinca una lata in intestinis gignitur, cum lentus & leviter calidus humor, internæ intestinorum superfices illinitur*. Sed nec aliud generat à se diversum, veluti musca vermiculum, sic hoc quippiam cucumeris semen referens, propter eandem causam.

C A P. XIV.

Quamdiu Vivat.

Quispiam fortassis existimaverit hunc vermem esse brevis ævi. Nam in leuciscis, circa æstatis principia generari incipit, veluti nobis aliquoties ipsi piscatores retulerunt, autumno ad justam magnitudinem pervenit, hyeme rursus consumitur. Indicium hujus rei esse ajunt, quod nec veris initio, nec hyeme, venter eorum tumeat; sed æstate prius attolli incipiat; autumno vero in tantam molem excrecat, ut ab emptoribus, quibus ob hunc tumorem vermem latum in ventre latere notum est, omnino rejiciatur. Deinde cum par ortus atque exitus sit ratio (quod enim cito fit, cito quoque perit) utique necesse videtur esse (cum hic vermis brevi tempore & generetur, & in magnam molem excrecat) etiam cito putrescere & interire. Præterea cum lumbricus latus infectum sit, & infecta omnia brevem vitam habeant, quod, teste Aristotele, exanguia sint, & ideo humida, aquosa, frigidaque, necessarium est arbitrari, brevi quoque lumbricum latum interire. Nam, teste Philosopho lib. de long. & brev. vitæ cap. xv, humidum aquosum facile corrumpitur, frigidum, facile congelatur. Immo trium, aut quatuor annorum ætatem non excedere posse, ex eo potest argui, quod vermes brevioris sint vitæ inter infecta, quia imperfectiora sunt. Aristoteles loc. cit. & ex eo Plinius lib. x, cap. xx, vitam apum (quæ vermicibus sunt perfectiores) longissimam esse dixit, non modo respectu aliorum insectorum, sed etiam cæterorum exanguium: & tamen Aristoteles lib. v Hitt. de Animal. cap. xxxi, sex vel septem annorum curriculo eam confici docuit. Verum donemus etiam Cardano, qui in libris de varietate rerum se observasse scribit, robustiores apes ad duodecimum annum pervenire posse; tamen ipsi vidimus (quod neutiquam ex rerum naturæ summis miraculis expungendum est) lumbricum latum apum hanc ætatem superare in uxore Helvetii, quæ etiam nunc quotannis fere ab esu acetarii, quod mixtas herbas plures recipit, veris initio frustum unius vel alterius ulnæ longitudine, excernit. Et profecto auctor libri quarti de morbis videtur nos docuisse, vitam hujus lumbrici ad hominis ætatem pervenire, cum ait: *si non sponte exeat, vel expellatur medicamentis, unâ cum homine confescesce*. Nam quemadmodum, hunc adhuc in utero matris initium sui ortus capere, hic sibi auctor persuaserat, ita etiam tractu temporis, facto homine grandiore, per ætates aggrandescere, ac sic una cum homine accedere usque ad ultimam senectutem, videtur inferre per illud verbum *συγκαταγένηται*, quo utitur. Sed Petrus Salius, cum hoc doctissimo huic viro, & ejus libri com-

Observatis
piscatorum.

Lumbricus
latus ægrotat
30.

Apes brevis
vita.

Confescesce
homini.

Parvuli pueri
lumbricum
latum non
habent.

Experientia
obstetricum:

Et Lanio-
nium.

Hippocr. &
Aristot. con-
traria opinio.

Non parit au-
toritate Hipp.

Item alii au-
torum argu-
mentum.

Lumbricus
latus sexum
non habet.

Sensitus naturalis.

Longitudo ejus.

Cur in homine dissimilis vivat.

Ratio secunda.

Ratio tertia.

Ratio quarta.

mentatori absurdum videretur, existimavit hanc esse ejus auctoris mentem, nempe lumbricum latum consensescere cum ægro, qui per varios morbos ei supervenientes, debilitatis jam antea viribus, solet cito conficere senium. Quasi vero senectus sit illud vitæ extremum, quod vi morbi maturius, quam lege naturæ infertur. Idcirco ego per illud *ἐκ τῆς ἀσθενείας*, puto intelligi conficere senium lumbrici proprium, certis annis, temporibusque à natura ei circumscriptum, quod in hominis ventre paulatim contrahit. Habet enim & suas ætates hoc animal, quibus oritur, augetur, viget atque declinat. Vltimum ejus tempus est senectus. Variat autem longitudo vitæ penes animalia, in quorum ventribus generatur. Nam quæ breviorē hominē vitam obtinent, in iis minus diu quoque vivere certum est. Ita sit, ut paucis annis canes ab hoc verme molestantur: Leucisci vero, & alii pisces pauci paucioribus mensibus; quam quibus annus completur. Sed cum in homine diutius, quam ullo aliorum insectorum, aut animalium exanguium genere, animadversus sit vivere, posset aliquis sapientiæ studiosus, hujus rei admirandæ causæ à me jure merito perquirere. Eas ego quatuor statuo. Prima, quia videtur hoc animal inter omnia exanguia maxime dearticulatum. Etenim constat ex innumeris articulis: quia singula internodia, sectionesque singulæ correspondent articulis aliorum animalium. Aristoteles scet. x. probl. xlviii, inquirens causam, cur illi, qui casuram (quam lineam vitæ Chiromantæ appellant) per totam obtinent manum, longioris vitæ sint. An quoniam, inquit, brevioris vitæ sunt, quæ inarticulata sunt, ut aquatilia? Quod si quæ inarticulata sunt, brevioris vitæ sint, manifestum est contra se habere, quæ articulata sunt. Secunda ratio potest etiam duci ex eodem Aristotele. Nam in libro de longitudine & brevitate vitæ, cap. v, ait; *ex æque animal, quia humidum est & aquosum, brevioris esse vitæ, quam sanguineum, nisi magnitudine sui corporis resistat*. Id in hoc verme facile observatur. Cum enim longissimus sit, tueretur se ab externis injuriis, ne facile vel corrumpatur, vel congeletur. Nam ubi quid noxæ in intestinis percipit, statim se in glomum componit, caput & partem principem, à qua vita ejus præcipue dependet, in medio corporis ponens, quod est veluti longissima cauda corporis reliquum, ei circumglomerat, ut sic nil damni capiti, aut partibus principibus inferri queat. Inde accidit, ut sæpe videamus partes exteriores injurias corruptionis & congelationis suscipere, & sic per vices abrumpi, eas vero, quæ capiti sunt viciniores, ipsum denique caput ultimo emori atque consumi. Ad hoc igitur conducunt tot articulationes & incisuræ: quia etiam si particulatim abrumptur, non tamen illico patitur pars præcipua, in qua vita maxime sustentatur. Tertia ratio est, quod dulci & pingui humore, quo nostra corpora maxime præ cæteris animalibus nutriuntur, abunde alatur. His adijunge quartam, quod hoc animal, etiam si frigidum sit, non facile congelari queat, cum a viscerum nostrorum calore interno quotidie fovetur.

Q Vapropter quod simile femini cucumeris expellitur, id nequaquam partus est; sed particula, quæ à verme abrumptur: cujus pars, quæ ad latera est tenuior, moram aliquam trahens in corpore, & jam emortua, vel femimortua, tanquam facilior ad suscipiendam corruptionem putrescit: quæ vero in medio est, veluti nodus, atque spira, membranaceis lateribus jam ablatis à putredine, figura feminis cucumeris, crassior & vivacior existit, & postquam abrumptur à verme, diutius conservatur, remanente adhuc integra sua forma, postquam ex ventre expulsum est. Et hoc est proprium signum, quo hunc vermem in ventre nostro latere deprehendimus. Cætera vero fere communia sunt cum iis, quæ teretes lumbricos manifestant, quanquam inter hæc differentia quædam posset constitui. Ægro namque lato lumbrico laboranti non valde accidit epilepsia, apoplexia, deliria, vigilie, febres insignes & acutæ; ut ei, qui terete molestat, nisi alia mala accesserint: aut æger præter latum, teretem quoque in ventre habeat, quod rarissime puto contingere posse, cum hujus generatio pellat aliquo modo rotundos. Alioquin febris, vel nulla, vel sane per exigua, lato lumbrico laborantem infestat. At si quæ signa sunt cum teretum signis communia, ea tamen distinctione aliqua carere non videntur. Nam si forte epilepsia in lato lumbrico laborantibus occurrat, vel animi defectio, aut syncope, id contingere potest, vel à validis medicamentis, quæ illico ægrotanti non præparato dantur ad occidendum & expellendum vermem. Is enim variis flexionibus ac motibus, in intestinis modo se extendens, modo se contorquens, tueretur sese contra sibi lethalia venena, intestina divellit, & colicos dolores excitando facit syncopas, epilepsias, & alia perquam gravia mala, quod fit, ut ante hæc, motus instar fluctuantis in aqua piscis, in ventre ab ægris percipiatur. Teretes lumbrici dolorem ventris pungitivum excitant, latus magis divellit, & lacerat intestina: idque contingit propter motum diversum, quia teretes robustiores, ac breviores, duriores flectendo, vel anteriorem, vel posteriorem partem semicirculariter, pungunt; præsertim si quid sit, quod ipsos molestat: Latus vero debilius & tardior motu, propter corporis longitudinem particulam distendit; nec ita repente, ut teretes, sed paulatim vires acquirens, piscis in aqua fluctuantis instar mormurat, siquidem sæpe nimio humore aquoso solet circumfluere, qui, facto verme debiliore, solet interdum cum portiuncula vermis per ventris fluxum prodire. In febribus acutis sæpe observantur teretes, & lati perquam raro; sed febris, ut plurimum lenta, hoc ægrotantes affligit cum pulsu parvo, sæpe valde inæquali, præsertim si corpus vehementer moveatur. Paulus Ægineta, si Latino ejus interpreti fidimus, *pulsus inæqualitatem cum inæqualitate inter lati lumbrici signa numerat*. Sed Græcis *ἀδυναμία μετ' ἀνωμαλίαν*, est impotentia cum inæqualitate: quod non est de pulsu intelligendum; sed potius de imbecillitate corporis inæquali (ut opinor) in qua semper quidem

Proprium signum.

Communium signa.

Teretes lumbrici pungunt intestina; lati divellunt.

Lati lumbrici tardior motus.

Adynamia μετ' ἀνωμαλίαν, est impotentia cum inæqualitate: quod non est de pulsu intelligendum; sed potius de imbecillitate corporis inæquali (ut opinor) in qua semper quidem

Historia dua.
Prima maci-
me notabilis.

quidem corpus debile est, sed modo plus, modo minus. Qui Aëtii librum novum Græcum habent, legunt in ipso ἀδυναμία τῆς βροχῆς, id est, imbecillitatem corporis cum segnitie, & revera ita est. Nam imbecilles, & ad motum pigriores evadunt: quia corpus aigre nutritur, & prout vel magis vel minus nutritur, pro eo vel magis vel minus robusti sunt, & ambulare possunt. Et quanquam teretes gracile corpus reddere queant; tamen etiam in obesif, & bene aliquin constitutis corporibus sine febre conspiciuntur. At latus semper gracile corpus reddit, nec illico, sed paulatim grandefcente verme, post duos aut tres menses. Neque est, quod quilibet reclamet libro autoris quarto de morbis, ubi ait: ὅς ἐστι τὸ τοιοῦτον ἐν μὲν τοῖς ὑπομαρῶν χροῶν δυνάμει καὶ ἐν αὐτῷ, id est, qui hanc bestiolam habent, in toto quidem tempore eū nil admodum grave contingit. Cum enim præsupponeret fallum, jam ab ortus nostri primordiis, usquequo adoleverit homo, paulatim secundum corporis incrementum augeri; & hac hypothesi observaret, adultos hoc verme laborantes non valde in tenera ætate de hoc conquestos, similique aliquo symptomate, quale pati solent natu grandes, concludebat hunc vermem multo tempore posse latere in nostro ventre, absque eo, quod tales molestias adferret, quales sub signis jam dictis & dicendis comprehendendo. Certe verum hoc est, ea signa non sese manifestare statim ac vermif est genitus, vel quando adhuc parvus existit. Imo tunc fieri non potest, ut notis ulla medicoriter probabilibus se prodant, nisi aut mutarit locum versus stomachum, propter aliquam insolitam inediam, datumve medicamentum, vel cibum; aut alia de causa vel tormina exciter, vel per intestinum rectum pars prodeat, vel in valde pueris, in quibus propter loci angustiam nequit diu latere, ob augmenti celeritatem. Concludendum igitur, parvum lumbricum latum non valde magnam molestiam aëris exhibere, si naturalem locum, qui est intestinum tenue, & præcipue ileum, non mutarit. Magnum vero omnes eas molestias inducere manifestissime, quas hoc loco commemoro; etiam si sic obscuriora sint signa in iis, qui inter parvum & magnum habent mediocrem. Bartholomæus Carrichteris tradit, lato lumbrico obnoxios, subinde lactis & papaveris esu affici, alias minus quietos futuros. Verum inter alia signa non infimum locum obtinet fames canina sæpe, interdum etiam dejecta appetentia. Et quanquam utrumque possit etiam in teretibus lumbricis, quando abundant, notari; tamen in his ut plurimum, inappetentia adest, raro insignis aliqua fames. At in lumbrico lato sæpius fames ægrum fatigat, quam prostratus appetitus. Quamobrem Aëtius famem affiduam refert ad signa lumbrici lati, & morsum stomachi. Quod enim vivificatum est, inquit, in intestinis, ubi recens exhibitum cibum consumpsit, post etiam solida corpora arrodit. Et auctor libri quarti de morbis hæc dicit: ὅτι jejuniū est homo, ἀσθενεὶς ἀδυνατεῖ, ἡπαρ ἀσθενεῖ, καὶ πόσις ἐνδύει, & quandoque spūa ori influunt, ubi ad hepatis afficit, quandoque non. Quibusdam etiam vocem intercipit, si fortiter ad hepatis irrumpit, & valde multa spūa ex ore fluunt; paulo autem post sedantur, & tormen multum in ventriculo aliis atque aliis eboritur. Sed hæc ab au-

tore relata signa apparent tantum quibusdam temporibus, & verne plurimum aucto: quibus subnectam duas historias memorabiles. Mulier illa Germana, quæ Patavii anno millesimo sexcentesimo septimo, mense Decembri, puerum optime sanum edidit, erat parvus satis difficilis, non tam quod primipara esset, quam quod foetum contineret habitiorem. Quo tempore uterum gerebat, bene se habuit, cuncta edulia libenter assumebat, sine nausæa, sine ullo ciborum fastidio, somno erat naturali, alacri motu domestica negotia obibat: at postquam peperit, coepit vinum fastidire, aquæ potui plurimum indulgere, noctu esse sine naturali quiete, pigrescere ad omnem motum, aliquando febrili calore corripit, noctu capite dolere cum gravitate ac pondere; torsiones in ventre sentire, interdum per totum abdomen, sæpe circa umbilicum, aliquando in dextro, nonnunquam in sinistro latere. Inde transacta quinque mensibus macilentia evasit, oculis lucentibus, & facie, corporeque floridum adhuc colorem observante; mox frequentior, quam antea febris, singulis diebus interdum invasit, aliquando tertio, quarto, quinto, raro pluribus, qua de causa decumbere in lecto sæpe cogebatur; ac tum præter obscurum motum in ventre, & tumorem, & levissima tormina per totum abdomen, nil aliud mali sentiebat; imo se gravidam esse quatuor mensibus putabat. Denique sequentis anni mense Augusto, qui erat octavus à partu, hora dimidia post coenam, in qua lactucam cum oleo & aceto assumpserat, rigore insigni, subsequente febre, corripitur, cum maximis ventris doloribus. Pro iis mitigandis, cum sibi distrumpi ac lacerari ventrem metueret, manibus utrumque latus abdominis comprimerebat, ortosque dolores putabat propter menses, qui instabant, & soliti erant à partu statutis temporibus larga satis copia fluere ob sanguinis abundantiam, quanquam semper puerum lactaret. Sed alvi profluvio oborto, quo plurima aquosa biliosaque rejiciebat, ex ano propulsum est lati vermif frustum. Soror aëgræ, quæ jam animo deficere incipiebat, ignara quid esset rei, quod propenderet, manu frustum apprehendit, & extrahit ipsum quinque cubitorum longitudine, metuentique ne intestini partem, cujus substantiam referebat extraheret, unguibus divellit vermem, cujus pars, quæ adhuc extra propendebat, in ventrem irrepsit, avulsam vero alteram partem in saxum projecit, in spiras multas se contorquentem; postea adhuc vivam baculo elevans, in aquam protrudit, in qua in coronam se componens statim moritur. Maritus rei novitate ductus, illico me accersiri jubet. Ut ad agram veni, percunctatus sum, quidnam antea esset perpessa. Illa præter jam commemorata, narrat se ante tres annos, adhuc virginem Augustæ Vindelicorum pessime valuisse, vermes rotundos sæpiissime per inferiora reddidisse, ventris doloribus aliquando molestatum, rigore & febre subsequente; potu aquæ frigidæ, vel oxagalæ, vel alterius lactis acidi, ipsique acidis rebus magnopere delectatam: raro carnes, aut vinum appetivisse; assuetam se à teneris carnes, & obsonia comedere absque pane: forem suam majorem natu, dum esset adhuc virgo septendecim annorum, graviter ex eodem hoc lumbrico lato laborasse

Alia lætio
quæ dicitur.

Quando lum-
brici lati se
prodant.

Fames canina
in hoc afficitur.

raffe per biennium; tandem emaciata, & veluti hydrope afeite laborantem, frustatim cum fœvis ventris cruciatibus, lumbricum latum excrevisse: viro tandem nuptam integra valetudine fuisse, sed sterilem permanisse. Id quoque subjunxit peculiare, se jam noctu magis aggravari; minus ventre dolere, dum prona decumbit, quam dum jacet supina. In latus alterutrum si declinaverit, medio-criter affligi; sed pejus si in dextrum, quam si in finistrum latus se vertat, non sine gravi pondere: quo cum gravida etiam premeretur, id à foetu modo huc, modo illuc se devolveat in decubitus mutatione evenire sibi persuadebat. His re-latis, quæ deinceps passura foret, curiosius animad-vertere statui. Igitur fluentibus postero die men-sibus satis copiose, febricula alternis diebus, maxi-me circa noctem, per paucos dies eam corripuit: frequentes dolores divellentes, raro pungentes, in sinistra abdominis parte magis præsentiebant, qui ad dorsum pertingebant, & omnem sedendi po-terant: tollebant: quotidie, vel alternis diebus vel pluribus intercedentibus, aquosa multa per al-ventum reddebantur; quæ ani pruritus & ardorem faciebant. Atque hæc alvi perturbatio magna ex-pectabatur, ubi rigor, horror, vel levis aliqua fe-bricula præcesserat, cum insignibus ventris tor-sionibus, ac motibus, sonitum caudæ quatientis aquam piscis, ac natantis, edentibus, vel vesicæ aqua & vento repleta, ac fortiter commota. Erat-que hic sonus ulque adeo manifestus, ut ex lon-ginquo facillime perciperetur. A quocunque ci-bo ac potu circa ventrem doloribus plerumque cruciatur; seu aquam seu vinum biberet; seu carnes, ova, fructusque, quibus impense delectaba-tur, comederet; sed præcipue ab eo cucumerum genere, quod Melopepones vocamus, abstinen-dum sibi esse usus docuerat, propter maximos cruciatus, quos excitabant. Ventris tumor ali-quando hydropicam dicebat; verum inconstans, modo major, modo minor, quandoque nullus. Ca-ligines etiam aliquando circa oculos, & capitis vertigines, frequentissimum aurium tinnitus; lassitu-do corporis continua laboranti, aut stanti; in le-cto vero jacenti vix ulla percipiebatur; sitis nun-quam intermittebat, quæ aquam potius, quam vi-num expetebat; & horum plurima noctu magis quam interdiu eveniebant. Lac, quoque in tan-tum defecit, ut puerum coacta fuisset ab lactare, nisi convenientibus remediis, quæ vermibus & ferociam frangebant, paucis diebus à me fuisset revocatum. His quoque factum est, ut debilior vermibus redderetur, tumore ventris sublato, vali-dior ægra viribus, post biennium iterum concipe-ret. Quo tempore ipsam invisi, nunquam obser-vavi, quod in excrementis semen cucurbitæ re-ferret exquisitè, sed semper frustum vermibus, quod ad me in pelvi aqua repleta per ancillam deferri aliquando curabam, ut studiosis Medicinæ com-monstrarem. Quocirca cum autor libri quarti de morbis, et atque alii scriptores antiqui scribant, ægros tania laborantes, excernere una cum alvi excrementis alias atque alias, veluti cucumeris semen, non intelligunt, quod quid separatim exeat, quod unicum tantum semen ex cucumeris fructu exem-ptum recte referat; seu quod frustulum vermibus ab-ruptum aliquando una cum excrementis prodeat;

in cujus medio sunt quidam veluti articuli lata membrana inclusi, qui singuli unico semini cucu-meris, aut plures pluribus ejus feminibus per lon-gum aut transversum incisus satis apte possunt comparari. Similis enim eorum forma est, & or-dinis dispositio. Quoniam autem superius dixi-mus, hanc feminam sibi persuasisse, se esse gravi-dam, non est prætereundum, quod in simili mor-bo accidit cuidam virgini Austriacæ, ex illustri fa-milia ortæ. Hæc enim cum per multos menses ventre tumeret, mensisque ipsi non amplius flue-rent, aliquos cibos fastidiret, nonnullos appetere cum fame quadam insolita, gravida putaba-tur. Amici atque parentes ægræ suspecta pudici-tia percussi (nam à Medicis, quos in consilium coegerant, & obstericibus multis rationibus gra-vida ducebatur) ejus curationem neglexerunt, quo accidit, ut tandem emaciata moreretur. Post obitum inspecto cadavere, plurima aqua in inte-stinis, una cum tania reperta est, quæ mortis cau-sæ extiterant. Inquirendum nunc est, cur ab hoc verme corpus omnibus emaciatur, quamplurimis ingens fames, atque sitis superveniant, & quibus-dam mulieribus lac in uberibus possit deficere. Vi-dentur omnes docti viri veterum autoritate, & probabilibus satis rationibus asserere, hæc evenire propter vermibus edacitatem. Cum enim tam longus sit, multum quoque eum comedere necesse vide-tur. Apparet etiam idem iis quoque accidere, qui-bus copia lumbricorum teretum in ventre est, qua-si à multitudine corporis & ciborum, alimentum absumeretur. Veruntamen longe aliter sentio. Quandoquidem Aristoteles lib. xv de Partibus animalium cap. v, esse omnia insecta *ἀναγόμενα*, id est, paucò alimento nutriti scribit; non tantum quod parva sint, quantum quod frigida. Nam quod calidum est, inquit, eget alimento, quod & cito conco-quit: quod vero frigidum est, sine cibo vivere potest. Sic puto *ἀναγομεν* esse interpretandum: aut sane tam paucò cibo indigere, ut nullo egere videatur. Nec est hic, quod quis magnitudinem corporis opponat. Nam longissimum esse hunc vermem fatemur, sed tamen exiguum propter corporis planitiem, nec tantæ molis, ut possit alimenti (quod interdum plus assumitur, quam corporis ægri magnitudo requirit) absumere maximam partem. Quamobrem ad alias horum symptomata-tum indagandas causas impulsus, tres potissimas deprehendi: Una est cibi assumpti corruptio quæ-dam, ob quam non attrahitur à natura, quantum requiritur; Altera, cibi jam ex parte concocti diffi-cilis distributio; Tertia motus animalis in intestinis. Corruptio autem pars cibi, antequam in chy-lum à ventriculo convertatur; pars jam in chylum conversa non promptè à jecore attrahitur. Qua jam in intestinis diutius hærens quam deberet, pu-trescit propter obstructions, quos parit animal in intestinis oberrans. Nam orificia venarum me-saraicarum obstruat; deinde in globum se torquens, in parte ilei intestini, quæ proxima est intestino colo, impedit transitum excrementi, relictæ in chy-lo, quod jam è tenuibus intestinis exitum ad erasa quarit. Auget quoque ciborum ingestorum cor-ruptionem substantia ipsius vermibus, qua salum excitat appetitum multarum rerum, & facile cor-ruptibilium, ut fructuum, potulque aquar. Hinc fit, ut cum

Historia sa-cunda.

Nota gravida falsa signa.

Mucies unde lato lumbrico laboranti co-acta sympto-mata.

Alimentum cau-sa.

Insecta pauco alimento in-digere.

ἀναγομεν quid est? inchoat.

Vera causa alvi excre-mentis.

Secunda.

Tertia.

Explicatur excrementum Hippocrati-cum.

Cucumeris se-meni similitudo qua in lum-brico latet.

ut cum aqua, humidusque cibus non habeant exitum per urinas, in intestinis obstructa oberrent, excipientque hydropicorum ventres; qui postea, cum vermibus ad inferna descendit, maxima sui parte per intestina expansa, aliisque profluvio oborto, concidant. Quapropter perdoctus Aëtius, reliquis lumbrici lati commemoratis signis, addit peculiariter, cibos assumptos celeriter in excrementa mutari. Motus quoque animalis emaciat corpus. Actiones enim naturales intestinorum interturbantur, deinde totum corpus, ut auxiliatur parti laboranti; & ut, quod præter naturam est, expellat à circumferentia ad centrum, humores ac sanguinem movet, ut inde corpus vix possit nutrir. Ergo siquis ad Galeni (qui libro de Theriaca ad Pilonem scribit, *latum vermem extenuare corpus, quod omne nutrimentum ipse devoret*) & aliorum doctorum, tum antiquorum, tum recentiorum tuendam opinionem dicat, hunc vermem alimentum devorare & consumere, non quod ipse comedat, vel intra corpus assumat, sed corruptum, per me quidem licet, dummodo ipsam rem intelligat.

C A P. XVI.

Prognostica ejus signa.

Præiusquam ad curationem descendam, jure merito quæri potest, an curatio sit perquam necessaria? Videtur enim Autor libri quarti de morbis eam tanquam non magnopere necessariam ponere, quo loco scribit; *habenti lumbricum latum toto tempore nil admodum grave contingere, & si non curetur, sua sponte non exire, mortem tamen non inferre, sed consensescere*. Verum cum his pugnant curationes variae, quæ ab antiquis & recentioribus magna sollicitudine, magnoque studio sunt nobis traditæ: quoniam, morbis incurabilibus temporis tractu vitam ægri abbreviare, gravissimaque symptomata supervenire, usu didicissent. Nam ut ea præterea, quæ supra commemoravi, nonne cuiusdam uxor apud Thaddæum Dunum, multis ad lumbricum pellendum remediis frustra curata, dysenteria primum correpta, mox hydropica facta interiit? Annon illa nobilis virgo Austriaca, cujus paulo ante à me facta fuit mentio, ex eodem hoc morbo, nempe hydropie, è vita migrasse visa est? Propterea Avicenna de latis lumbricis prædixit, si non expellantur, sed in ventre remaneant, majoresque fiant, cæteris omnibus lumbricis esse deteriores. Cornelius Celsus quoque latos teretibus pejores esse ait: contra quam multi ex recentioribus sunt opinati. Itaque ut huic dissensionem meam interponam sententiam, puto, & auctorem libri quarti de morbis vera dixisse: nempe eum, qui habet lumbricum latum, toto corpore quo habet, non valde graviter premi, nec ejus neglectam curationem mortem inducere, si simpliciter dicta accipiantur. Ægrotis enim contingere potest, ut commemorata gravia mala nulla accidant, si modo illis tollatur occasio lumbricum natura satis mitem, & motus tardioris, ac moris placidi, depravandi pravis moribus, atque malignis motibus, & majore forte putredine, ob quæ tormina, dysenteria, dolores colici, syncopæ, epilepsiæ, & longæ his pejora mala possunt

excitari. Occasio autem talis nascitur à causis externis præcipue; interdum etiam ab internis. Nam si æger multum delinquat; aut in nimia quiete, aut motu, & exercitiis vehementibus; victu pravo, aut copioso, aut ipsi lumbrico valde contrario; medicamentis, aut longa curatione, viribus ægri debilitatis frustra ad lumbricum pellendum tentata: aut si in ventre nostro, atque venis humor aliquis generetur, vitæ vermis insidians, tunc aut nimium supercalefactus, aut plus quam decet refrigeratus, multa mala eaque funesta inducere potest: at per se tamen non inducit, quamvis ratione sui ortus ex putredine venenosus esse videatur, & ratione suæ magnitudinis consideratæ ad capacitatem, & longitudinem intestinorum, sit dicendus *Hyæov*, hoc est, fera parva. Veruntamen quamvis per se ægrotum non occidat, ratione tamen eorum, quæ ei superveniunt, præsertim diu laboranti, factoque verme grandiore, pernecessaria est ejus curatio. Quinetiam morbi, qui sua natura satis mites sunt, atque securi, ut febres intermittentes, tertianæ, quartanæ, si incendant, periculosi evadunt; quod æger, qui modo sanus & robustus erat ante febres, vires magnopere fractas, in eis, vel post eas facile cibo, potuque resarcire queat, & sic ad integram sanitatem redire. At qui lato lumbrico laborat; neque quo die febris, neque quo tempore prorsus abiit, vires facile resumere potest, quales ante febrem fuerant, etsi imbecilles: quippe cum magna pars cibi potiusque in ventre ægri corrumpatur potius, quam ut concoquatur, aut in sanguinem, viribus corporis conservandis, restaurandisque idoneum, converti queat. His de causis recte scripsit autor libri quarti de morbis, laborantem lato lumbrico, *ubi debilis factus fueris, vix revalescere*. Siquidem contingat aliquando, ut convalescat, si à perito Medico iusto modo curetur, tamen maxime difficilis est ejus curatio. Nam si difficilis est in ægro, ab aliis morbis virtutes corporis infirmantibus adhuc immuni, longe erit difficillima, viribus ab aliis multis jam fractis, ac curationi, quæ longa esse tunc consuevit, vix paribus. Sed quam arduum sit latum lumbricum curare, nobis eleganter insinuare videtur fabula Hippys Rhegini scriptoris apud Ælianum de muliere hoc verme laborante. De ejus curatione, inquit, cum Medici etiam peritissimi desperassent, Epidaurum delata diis ab hoc malo, ut liberaretur, supplicabat. Absente Æsculapio, ministris eam eo in loco, ubi Deus mederi supplicibus solebat, quiescere parum jussit, deinde capite ejus resecto, unus eorum manus immisit in ventrem, lumbricum feram sane ingentem exemit. Caput vero in suum locum, & pristinam harmoniam conantur restituere, idque præstare non possunt. Interim Deus revertitur, illisque increpat, quod rem supra artem & vim humanam aggressi fuissent, ipse divino & ineffabili modo, & caput suo corpori, & mulierem restituit. Itaque ex hac eadem fabula patet, longe difficiliorem esse curationem lati lumbrici, quam teretis; nec à veritate abhorre, quod scripsit Celsus, latos esse teretibus pejores. Nam quanquam & hi malignissimi sunt, ut intestina, vesicam, stomachum perforant, & sic mortem inducant; rari tamen sunt, & monstrosi quid habent. Cæteros, qui communiore sunt, ut plurimum longe facilius expelli posse, imo sapissime & vivos, & mortuos,

Lumbricus
latus quomodo
alimenti
devoret.

Verum si
curatio
latis
lumbricis
lati.

Pericula ex
lumbrico lati
curatione
negligia.

Auctoris
consilium.

Difficilis
curatione.

Latis lumbricis
cuius difficultas
quomodo teretis
curatio.

homo sanus evadit. Adduntur etiam rationes. Lumbrici enim vivi nequeunt expelli commode ex intestinis, quod iis obhareant: imo et si medicamenti impetu deorsum ferantur in alvum, redeant tamen in loca superiora, unde erant detrufi. Ipse quoque testari possum visam à me partem lumbrici lati dimidii cubiti longitudine extra anum proponentem, cum nondum esset à verime separata, iterum in ventrem irrepisse. At vero qui præparandum simul & expellendum esse ducunt, contra affirmant, multorum usu comprobatum, majorem noxam agris, tum pueris, tum adultis inferri, cum lumbrici prius occiduntur: deinde eam curandi rationem breviorē esse, quæ utrique scopo uno tempore satisfaciunt; secutos eam veteres & juniores. Siquidem apud hos extant plurima medicamenta composita ad lumbricum latum, in quorum descriptionibus tum ea, quæ ipsum occidunt, ut falsa, acria, amara: tum quæ expurgant, ut scammonium, colocynthis, aloë, helleborus, reperiantur. Verum enimvero, ut meam interponam in hac diffensione opinionem; scire posterioris sententiæ sectatores debent, in lumbricis teretibus & latis curandis, experientiam demonstrasse, quo tempore eorum cædes, inedia præcipue, præparabatur ante expulsionem, sæva tormenta, gravissimos, ac maxime malignos morbos, aliquando eos per se excitasse; inprimis vero teretes monstruosos, aculeatique capitis intestina perforasse, & per cutem egressos fuisse. Trallianus auctor est: at medicamentis, peculiariter ad eos interficiendos destinatis, tutissime præparari, antequam expurgentur. Sed & illud latere neminem debet, teretes simul necari, & expelli brevissimo tempore posse; latos vero non ita. Longiori enim mora ad eos enecandos opus est; nisi quos velit minus tutam eorum aggredi curationem validissimis remediis. Etenim teretes facilius occiduntur & educuntur levioribus remediis, quam lati. Nam illi parvi sunt, & sub rotundo corpore, minisque dearticulato, non ita adherent valide intestinis, sicque præterlabentium medicamentorum injuriis in intestinis facile obnoxii sunt, imbecillioresque redditus non difficulter devolvuntur in alvum; at lati, quia longissimi sunt, & plano corpore, plurimisque incisuris præditi, internæ intestinorum tunicæ validissime adherent, & sub mucosa eorum interna superficie sese occultantes, levioris medicamenti transiens vim facile perferunt. Ita fit, ut difficilior interficiantur. Sed & validioribus ob jam allatas causas interfici debent; quæ si cum iis, quæ expurgant, medicamenti permisceantur, imbecilliora solent evadere; quod vis purgatrix unius medicamenti, alterius facultatem occidendi lumbricum adepti, non finat diu in ventre permanere. Sed dicit aliquis; nonne in medicorum historiis relatum est, sine ulla lumbrici lati præparatione pilulis diatribicis cum rhabarbato appellatis, & aggregatis, item ex hiera Rufi, foliis senæ in aceto maceratis, nonnullos ab hoc verme liberatos fuisse? Nonne Heurnius narrat, potionem ex graciola, quæ purgat, latum lumbricum se expulisse una cum aquis? Nonne Manardes lib. 111 de Simpl. ex novo orbe delat. cap. de Verberna scribit, ex consilio nobilis cuiusdam matronæ, ex Peru redeuntis, cuidam singulis diebus

mane verbenæ, ignobilis adhuc herbæ ad occidendos lumbricos, succum saccharo permixtum præbuisse, ac præter multos vermes teretes, unum longissimum instar cinguli rejecisse? Respondeo: aliquando contingere, ut vel à victus ratione, vel alia causa interna nobis abdita elanguescat lumbricus latus, ac sic præparetur, ut levioribus medicamenti possit & occidi simul, & expelli: nihilominus manet, præparationem præcedere oportere, antequam excludatur. Quod spectat ad Verbenæ succum, cum ego nobilissimum esse duco ad occidendos vermes, tum teretes, tum latos, & si veteres hanc ei vim nullam adscripserint, propterea quod amarus sit, eumque malignitati humorum, & putredini, moribulque venenatorum serpentum resistere, sciamus. Quapropter quod Galenus de omni curatione dixit, in hujus vermis curatione à me concluditur; præstare nempe, ut *serius & tutius curetur, quam ut spe citioris curationis ager manifesto periculo exponatur.* Sed cum præparatio duplex sit, una perfecta, altera imperfecta (perfectam nomen, in qua vermis totus sponte sine magnis torminibus, aut cum levi medicamento purgante excernitur: imperfectam vero, in qua frustatim excluditur, & per longa intervalla) eo semper medicus collimare debet, ut perfectam præparationem instituat. Sic enim quam citissime sanus evadit, qui eo malo detinetur. Ex imperfecta præparatione, longa, & fastidiosa metucenda est curatio. Contingit hæc imperfecta præparatio, cum non plane enecatus est medicamentis, sed imbecillis redditus quiescit in ventre, nullis motibus, aut aliis molestiis vexans amplius egros, à propinato tamen medicamento purgante non exit totus, sed tantum pars, à reliquo corpore unius aut alterius, aut plurium cubitorum divulsa.

* Et quanquam, ut in universum dixerim, omnem lumbricum occidant acria, amara, acida, quorum magnus est numerus; tamen nonnulla peculiariter comperta sunt, ad latum lumbricum occidendum, longe cæteris magis pollere. Ea nunc enumerabo, & ab iis, quæ omni ætati, sexuique, sive febrem habeat, seu ea careat, tuto adhiberi possunt primum exorsus, ad ea veniam, tum simplicia, tum composita, quæ non febricitantibus magis sunt idonea. In priori autem classe principem locum mihi filix obtinere videtur, tum mas, tum femina, quæ *ἡδύμελες* dicitur Dioscoridi, & Theophrasto; Tralliano vero *ἡδυμέλες*. Hujus radicis adhuc recentis aqua per balneum distillata, & saccharo dulcorata dari potest pueris; aut pulveris ejus drachma dimidia semel, aut bis in die, cum lacte nutricis ipsis adhuc lactantibus: quibus tamen innasci lumbricum latum, non memini à quoquam observatum, præterquam ab Autore libri quarti de morbis. Sed natu grandioribus drachma una, vel paulo plus cum syrupo de floribus persicorum, aut rosato solutivo, si alvum valde altricem habeant: aut, si lubrica sit, cum aqua polygoni, graminis, aut plantaginis sufficit. Illud perpetuo observandum, ut alvo existente lubrica, videntur laxantia; ne nimium cito exeat medicamentum.

O mentum.

* De hac imperfecta præparatione mentionem facit autor libri quarti de morbis, ita scribens: Si vero (Lumbricus latus) ad medicum heret (Græcus codex habet, *ἂν ὅτι τοῦ φαρμάκου ἔσται*, id est, uti opinor, si ingrediatur medicamentum purgans (utpote non mortuus, aut totus coagulatus) recta pars de lumbrico alvum potius, longitudine duorum, aut trium cubitorum, aut etiam longe amplius.

Verberna.

Ad sui observationem respondit.

Succus Verbernae.

Lento procedendum.

Præparatio duplex.

Perfecta.

Imperfecta.

Lumbricos quæ occidant.

Filix.

Diversitas medicamentorum secundum ætatem.

In alvo lubrica laxantia videntur.

mentum, quod vermem occidit; sed adstringentia ei potius permisceantur. Adultis jam tres quatuorve drachmæ ex aqua galegæ, quæ ruta capraria dicitur, propinabuntur; vel ex hydromelite, aut melicrato, more veterum. Scio multis usum radicis utriusque filicis esse suspectum in muliebri sexu; propterea quod scribat Theophrastus, filicem foeminam gravidæ mulieri datam facere abortum, non gravidam in totum sterilem reddere; idemque confirmatum à Dioscoride. Plinius quoque ait lib. xxviii, cap. v, neutram (hoc est, neque marem, neque foeminam) dandam mulieribus: quoniam gravidis abortum, cæteris sterilitatem faciat. Sane Galenus, partum vivum enecare, & mortuum ejicere, credidit, quod amara sit radix, paululum habens altrictonis. * Ego in gravidis ejus vim nunquam sum expertus. At hoc testari possum, uxorem Helvetii, cum utramque radicem singulis diebus in pulvere, per plures dies, horis matutinis sumpsisset, nihilo tamen secius tres liberos adhuc postea peperisse. Quod si aut spem conceptus utraque radix adimeret, aut abortire cogeret gravidas, male ageretur cum illis populis, qui panem ex ea conficiunt, ut, teste Dalechampio, Nortmanniæ Abricates. Nullus igitur sexus à tam salutaris radicis usu prohibeatur, cui vis quædam est indita cito, si velis, ac etiam paulatim lumbricum occidendi, etiam in febricitantibus, & uterum gerentibus, sine ulla torminibus aut novis accidentibus illico ferociam vermis compescendi. Imo si quæ jam laborantem symptomata molestant, ea, vel abigere, vel plurimum lenire potest. Ita uxor illa Helvetii, cum multis cruciatibus per intervalla afficeretur circa abdomen, febribusque intermittentibus, ordinatis, & inordinatis, modo alvum haberet altrictram, modo ultra modum fluidam, ab unius drachmæ farinæ filicis exhibitione, neglecta omni conveniente victus ratione, doloribus, & febribus liberari cœpit, ventremque naturaliter deponere. Lac quoque ei, quod per octiduum mamillis erat subtrahctum (nutriebat enim infantem masculum) ita rediit ad ubera, ut per aliquot menses commode rursus lactare potuerit. Ad hanc quoque classem reducere possumus corticem radicis arboris Mori, quæ leni sua amaritudine latum lumbricum interficit, purgatoria vero facultate, qua pollet, ipsum ejicit. Decoquitur in aqua, ut Dioscorides auctor est, & hoc ejus decoctum propinatur. Mali punici decoctum quoque idem præstat. Plinius radicem decoctam succum emittere, ait, qui tanies necati videtur pondere, & malum ipsum contusum ex tribus heminis vini decoctum ad heminam. Celsus radicula- rum hujus arboris manipulum in aquæ tribus sextariis decoquit, donec tertia pars supersit: adjicit ei nitri paululum, & jejuno propinat. Itaque hoc genus remedii is commode dabitur, quibus alvus lubrica est; ex Mori vero cortice, quibus valde altricta. In altero Dioscoridis libro de facile parabilibus, inter latos lumbricos pellentia, cornu cervinum cum melle delinctum proponitur, quod omnes lumbricos occidere (etiam amarum non fit) ex aliorum scriptis didici. Plinius; *Tinearum genera pellit ex melle cornu cervini, potus*. Detur igitur duarum

vel trium drachmarum pondere, infantibus vero unius drachmæ. Cum enim ad lumbricum latum occidendum requiratur fortiora remedia, augendum est mitiorum pondus. Aëtius: *Terræ intestina pota numero quinque, aut septem cum passo urinam cient, & omne genus lumbricorum ejiciunt*. Eodem modo pota, aut quocunque velis, latum lumbricum expellent, aut cum oxymelite. Accidit aliquando, ut enumeratorum addit inopia: in quo casu non abhorreo ab argento vivo, cum pane calido à plumbagine loto. Id enim scrupuli unius, aut drachmæ dimidiæ pondere vermibus affectis pueris felicissime præbuimus ex jure carnis simplicis, vel alio conveniente liquore; & pilulis ex aloë lota in succo rosarum aliquando sex grana permiscui. Tutius tamen integrum datur per os, quam permixtum electuariis, & pulveribus, quia citius per ventrem transit, quod in hoc remedii genere procurandum est. Sunt qui terram Melitensem ad occidendum latum lumbricum celebrent, & terram Cimoliam. Iis autem, qui sine febre sunt, costus ex aqua calida detur drachmarum duarum pondere; item cedria, cardamomum, nasturcium, scordium ex aceto, vel oxymelite, chameleonis albi radix ex vino austero, acetabuli mensura. Trallianus iis, qui lato lumbrico laborant, proponit herbam quandam, quam ipse *ελμινθόκατον* vocat, ob frequentem ejus in occidendis lumbricis virtutem: interpretes lumbricariam vertunt; forte tinearia Marcelli, & Scribonii Largi. * Juniores eam corallinam esse autumant, musci marini speciem frequentem in maris Ligustici littoribus, sic dictam, quod coralli radicibus adnascatur. Et revera etiam nunc in Græcia magni usus est, ad omnis generis lumbricos occidendos. Nam per plateas, & vicus hanc herbam, in pulverem redactam venditant, *ελμινθόκατον* appellant, corrupta voce, quasi *ελμινθόκατον* vellent dicere. Vnde à circulatoribus, & circumforaneis tanquam magnum secretum transferunt per totam Europam. Hujus pulveris adultis drachma una in jure sufficit, aut in vino hausta ad teretes necandos: Latos vero duplicatum pondus occidet: quin & ejus decoctum potest præberi, atque in hujus penuria absinthium marinum latifolium & seriphium. Sed & magni quoque usus esse hic notavi aquas salvas, nitrolas, sulfureas; & quæ chalcanti mineram habent, ut acidulas purgantes. His solis per multos dies haustis mane ad aliquot libras, prægressa totius corporis purgatione, latum lumbricum sublatum novimus. Talis aqua est Teutiana, quæ in agro est Pistoriensi, & prope castellum novum, Graffignana dicta: in Germania Eggerana, Sualbacensis: in Bohemia Carolina: in quarum penuria aqua salsa facta, vel marina potest præberi, etiam ventriculo nonnihil molesta esse consueverit. Hæc enim blande purgat, & pituitam, cui maxime adhæret hic vermis, ab intestinorum interna superficie absterget, falsedine vero ipsum interficit. Lixivium cum oleo ad eundem finem forbeat hujus mensura, & ut minus

* Nisi quis tineariam eorum putet herbam, quam storchadem citrinam vulgus barbarum vocat. Eam enim citra solutivum adsumam, & præcipue in festo die S. Iohannis à vetula thioronia summo studio in Hetruria colligi vidi ad occidendos lumbricos puerorum magno successu. Propterea puto, ibidem communi sermone tignamicam dici quasi tineariam. Andreas tamen Cæsalpinus tignamicam derivat à thymima, ob odoris suavitatem.

Filix fœstilla
regemina.
Auctoritas
Theophrasti.

Dioscoride,
Plinius, Gale-
nus.

Auctoritas ex
porcencia.

Pancus filiginea.

Morus.

Mali puni-
ci.

Cornu cervi-
norum.

Mercurius.

Terræ Meli-
tensis & Ci-
molianæ.

Lumbricaria
Corallina.

Aqua thori
males.

Aqua salva.

Storchas citri-
na.

* Theophrastus tamen filicis radicem succo *γλυκύποτον* dicit, hoc est, dulcem cum altricione.

nus nauseam moveat, succum mali arantii, aut citri infillare convenit. Galenus theriacam mirabiliter extollit, quæ drachmæ pondere mane per plures dies datur cum aceto: & melius erit in adultis scyllium ei permiscere. Antidotus Lumbricaria: Recipe foliorum Corallinæ, verbenæ, scordei, pulegii, origani ana Manipulum sem. radicem dictamni albi, filicis, angelicæ, gentianæ, singulorum drachmas duas; corticum radicem arboris mori drachmam unam & semis; feminis finapiis, cardamomi, nasturtii, singulorum drachmam unam; piperis drachmam semis, croci scrupulum dimidium: fiat omnium pulvis, & cum melle despumato commisceantur cuncta in formam opiata; cui pores, si velis, addere olei vitrioli scrupulum medium. Datur mane per plures dies jejunio stomacho, adultis drachmæ unius & dimidiæ pondere. Clysteres quamvis ad occidendos lumbricos proponantur ab exercitatissimis Medicis ex decocto centaurei minoris, absinthii, scordei, abrotoni, tenacetii, fantonici, colocynthidis, radicem dictamni albi, bistortæ, tormentillæ, addito oleo, & melle rosato solutivo: tamen ego hosce non possum non summopere dammare in lumbrico lato: Quia ab hoc clysteris genere, ubi noxam lumbricus percipere, statim ad superiora vergit versus stomachum, & dolores, ac tormina per frequentiora intervalla ægro parat. Præstat igitur loco horum uti iis clysteribus, qui potius à superioribus partibus, & tenuibus intestinis ad cœcum lumbricum aliiunt, quo fit exitui vicinior. Parentur igitur ex lacte cum saccharo, aut melle, vel hydromelite, ex jure carnis non salito cum butyro, cavendo ab oleo & sale, quæ omni insecto sunt inimica. Pueris conducet anodere glandem lacte & melle imbuto gossypio factam, & isdem podicem intro forisque illinere. Quin & infantibus fieri ex diapenidio glans potest, atque supponi. Externa quoque auxilia ad occidendum hanc feram non sunt omittenda, ut unctiones, & emplastra, cerota, quæ umbilici regioni imponuntur, quæ Græci *ἐμφυλάδια* nominant. In tenera ætate fiat unctio, si febris urget, ex cornu cervino pulverisato, atque cum oleo rosato permixto, vel oleo amygdalarum amararum. Si vero desit febris, cataplasma imponatur ex foliis mali perficæ, absinthii, farina lupinorum, & pulvere corallinæ, exceptis decocto calaminthe, vel pulegii, addito pulvere cornu cervini, & oleo amygdalarum amararum, vel de nucleis persicorum: vel laneus pannus madescat aceto rosato, cui pulvis infpergatur, qui accipit aloes drachmam unam, myrrhæ, croci, garyophyllorum, radicem dictamni albi, corallinæ, singulorum scrupulos duos, misce. Idem quoque præstabit oleum scorpionum descriptionis Mathioli, quo umbilici regio, & stomachi, tempora, jugulum, & pulsus inungantur. Cataplasma pro adultis validum. Recipe farinæ lupinorum uncias tres, succi foliorum perficæ mali quantum satis est: misce ad ignem ut redigatur ad mellis consistentiam; deinde insperge pulveris costi, radicem dictamni albi, corallinæ, foliorum fabinæ, singulorum drachmas duas; feminis melanthii drachmam unam, & mediam; fellis taurini drachmas duas; olei ex nucleis mali Armenii expressi, & aceti fortissimi, utrius-

que quantum sufficit pro conficiendo cataplasma. Nicolaus Myreplus unguentis ad lumbricos occidendos aliquando argenti vivi portunculam immiscuit, quod mihi non improbat, si quando validissimis externis remediis indigemus, etsi id sit inusitatum nostris temporibus. Oleum potens egregium, quo umbilici partes circumstantes, & ventriculi orificium perunguntur. Recipe olei ex nucleis persicorum malorum expressi, vel ex amaris amygdalis uncias sex; radicem dictamni albi, corallinæ, costi, foliorum fabinæ crasso modo pulverisatorum, singulorum drachmam unam & mediam; lumbricorum terrestrium numero octo; olei de feminibus colocynthidis unciam mediam; stent permixta diebus canicularibus in sole, ut maceantur; deinde fiat fortis expressio: cui, quo fiat potentius, addere soleo olei petrolei drachmas duas, vel tres. Nam bitumen, cujus species est petroleum, brevissimo tempore lumbricos interficit. Ad hunc eundem scopum occidendi lumbricum victus ratio plurimum conducit. Hæc variare penes medicamenta, quibus occidendus est, apud scriptores videtur. Nam qui filicis radice id præstare cupiunt, iis præcipitur ab antiquis carnis abstinentia, & plurimus allii usus per triduum. Scribonius Largus adjungit huic veteratum caseum mollem: licet tamen, eodem autore, & sine alio pridie incanato dare filicem. * Sunt qui ab inedia metunt convulsiones, torminaque, nec non cruciatus colicos. Itaque ut hæc caveant in utroque lumbrico, tereti nempe, & lato excludendo, tribus primis diebus lac purum præbent sine pane, vel alio obsonio, postea alia ex aceto. Cornelius Celsus quoque ægrum jubet, antequam decoctum senutium radicalium mali punici bibat jejunus, pridie multum allium comedere, & inde vomere. Sic & alias antidotos, & medicamenta præscripta, allii & aliorum acrium, si febris absit, maximeque eorum, quæ deinceps enumerabo, usus præcedere commode potest. Nuces juglandes quoque plurimæ cum pane, & sale comedantur: quod si fal fuerit theriacum, adhuc magis conducet: item raphanus cum sale, & quo acrior fuerit, eo melior judicatur: talis est, qui nigrum habet corticem, & in nonnullis Germaniæ locis Hispanus cognominatur: & qui ibidem marinus dicitur, herbarius vulgo rusticanus, frequens condimentum in julsulis carniis apud septentrionales incolas. Conducit & sinapi in aceto maceratum, deinde tritum, Gallis & Belgis frequens in cibis, mostardam vocant: brassica semicocta cum multo oleo, sale & pipere. Vidi, qui senecione feliciter cocta cum oleo fixo & sale, ut solent coqui spinachia folia, usi sunt. Porrigatur etiam acetarium ex melissæ, pimpinellæ, pulegii, menthæ, portulacæ, erucæ foliis. Pisces encrasycholi, vel alterius generis muria conditi; & ova taricha cum oleo, & aceto, & pipere: loco aceti mali arantii acidi, vel limonis succo uti licebit. Nicolaus Myreplus principem quandam mirabiliter laudasse, ait, *olivus albus ex arboribus decerpas vigintiquinque, vel triginta costas*.

O 2

* Verba ejus adscribo: Ad incedendum, & occidendum, per triduum allium plurimum edat, & veteratum caseum mollem: secundum hoc filicem Macedonicæ, costis arida, & crassata pondere denariorum assu cum melle quantum ipse voluerit, consumas. Post horum quatuor detor ex aloes, & camomene singulorum videriatis pondus ex aqua misce. ex his quatuor, quoniam capitis despergere, aqua calida supponatur. Licet & sine oleo (legendum procul dubio sine alio) pridie incanato dare utroque medicamentis.

Argentum vivum.

Oleum potens.

Petroleum.

Diata.

Allium.

Raphanus Hispanus.

Mostarda.

Pisces.

*Alimenta
medicamen-
ta.*

*Oleum Can-
nabinum.*

*Et Insu-
rium.*

Cannalis.

Melomela.

His enim comestis à jejunio, quatuor aut quinque diebus continuis, brevi feram, hoc est, lumbricum latum ejici. Atque hæc omnia non minus alimenta sunt, quam medicamenta; quod non modo corpus nostrum nutrant, sed etiam ipsum alterando lumbricum quoque interimant. Hoc præstant, quod vel amara sint, vel acria, vel salia, vel acetosa manifestis qualitatibus. At occulta, cannabis semen, melimela, & melones; quæ alioquin cum potius dulcia sint, lumbrico lato nutriendo aptissima videntur. Nisi quis dicere voluerit, horum succo utque adeo lumbricum latum delectari, ut præ alimenti copia debilis redditus, aut enecatus, excludatur. Itaque puerulis, quibus acria, amara, & falsa non placent, lac ex cannabis semine præbeatur jejunis. Adultis ejus oleo condiri possunt ciborum varia genera. Nam qui ex Illyrico tractu in Pannoniæ, Moraviæ, ac Poloniæ confinia sese transtulerunt, Turcarum tyrannidem fugientes, in penuria olei olivarum, hoc utuntur frequentissime, & præsertim jejuniis sacris diebus, nullo incommodo; pro eo nonnulli Galliæ incolæ ex nucibus juglandibus oleum expressum usurpant, quod etiam in hoc morbo commendatur. Porro ne quis iis, quæ jam de oleo cannabino dixi, fidem derogat, Nicolaus Myrepsus semine cannabis, tanquam experto & probato utitur ad lumbricos. Ipsum enim aridum, tustum & cribratum aquæ sufficienti immiscet, ut glutinis crassitudinem nanciscatur, perque pannum purum expressum præbet adultis cyathi mensura. * Dioscorides inquit, melimela saporis mellei *ἡμεῖς ἐκλυδάμεν*, animalia expellere, quod Plinius in eorum viribus recensendus præterit. Sunt, qui hæc poma S. Iohannis esse putent, quæ æstatis initio, aut ante solstitium æstivum in Italia maturescere consueverunt. Melopeponi quoque, quod dulcis sit fructus, nequam hanc vim ascripsissem; nisi ab eorum esu frustra hujus vermis dejecta fuisse non semel animadvertissem, & postea apud Avicennam Fen. xvi 1,

* Nonnullos aurigas, cum per Pannoniam inferiorem iter facerem æstivis temporibus, ut à muscarum, tabanorum, & asilorum injuriis, equos suos roareretur, vidi, cannabis herba manipulum sumpta, equos suos per dorsum, & alias partes externas fricasse, idque ipsis mirabiliter profuisse. Idem equites & viatores abyssio lumbricis occidentis idoneo præstare conantur, sub clutellis etiam hac herba posita, cum minori tamen fructu.

cap. vi, legissem, melones inter remedia pro ascaradibus interficiendis, & educendis propria. Debent autem hi fructus arte, nempe nive & glacie refrigerari, vel in profundo putei, ut mos est in Italia, detineri. Quæ enim maxime frigida sunt, ea lumbrico lato multum inimica existunt. Cæterum à frumentaceis pulvis æger abstineat, utatur pane autopyro, aut domestico cum multis tenuibus fursibus subactò, & bene fermentato. Potus esse potest vinum absynthites, aut hyssopites, aut aliud, quod sit oligophorum maturum, nec dulce: quod si generosum id fuerit, decocto radicum graminis diluatur. Magis autem hisce convenire potest, præsertim febricitantibus, oxymeli vel oxyfacccharum dilutus, vel decoctum coriandri & cornu cervini; aut pomacium vinum factum ex melimelis, defecatum, quo plurimum hypochondriaci solent recreari, & commodius ab obstructionibus liberari. Aërem nonnulli alterari volunt alii suffumigio, alii vero sulfuris, quod ægris nimium grave esse consuevit. Exercitia quoque moderata conducunt. Siquidem autor libri quarti de morbis tradit lumbricum quibusdam iter facientibus, & laborantibus, & ventriculo calefcente, deorsum demigrare. Tam medicamentis, & alimentis occiso verme, aut plurimum sic infirmato, ut intestinis nequeat amplius adherere, & si plenius sponte deturbetur, ac decidat, unaque exeat cum excrementis, præstat tamen dare operam, ut quam citissime, dato aliquo leni, aut purgante medicamento, expellatur. Pueris & infantibus satis est, mel, aut syrupus florum mali persicæ, vel rosarum solutivus, & manna; vel cassia cum rabarbaro, & infusione agarici: adultis electuarium Diasebesten cum Diagrydio, vel electuarium ex hiera, vel pilulæ Ruffi. Ad quid enim illa valida purgantia, quæ colocynthidem, euphorbium, elaterium, helleborum nigrum, & scammonium recipiunt, nisi quis forte parum adhuc spirantem lumbricum occidere velit, & simul ejicere. Celsus & Scribonius Largus post medicamenta aut potiones purgatorias, ubi desurgere cupit æger, ad exonerandum alvum, pelvium aqua calida plenam supponere jubent, ut in ea desideat.

*Frigida ini-
mica Lumbrico.*

*Aër.
Suffumigia.*

F I N I S.



ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS

ISAGOGES

IN REM HERBARIAM

LIBRI DVO.

INDEX CAPITVM

Quæ in duobus

I S A G O G E S

Libris continentur.

LIBRI PRIMI,

In quo agitur de forma Plantarum,

CAP. I. Quæ in Planta potissimum inquirenda, discenda- que,	Pag. 113
II. Vnde forma cognoscatur,	ibid.
III. Partium divisio, Similes quæ,	ibid.
IV. Dissimiles partes communes quot & quæ,	114
V. Partes dissimiles communes non omnibus plantis inest,	ibid.
VI. Dissimilium partium communium in alias partes diffusio,	115
VII. De propriis stirpium partibus,	116
VIII. Partium differentia ex Theophrasto,	117
IX. Radicum differentia,	ibid.
X. Caulum differentia,	118
XI. Differentia foliorum,	ibid.
XII. Florum differentia,	119
XIII. Fructuum ac seminum differentia,	120
XIV. De quatuor summis Plantarum generibus. Quid Arbor, Frutex, Phœyx, Herba,	ibid.
XV. De aliis quibusdam generibus, quæ summis sub- sunt,	121
XVI. De Orchide, Satyrio, Palma Christi,	ibid.
XVII. De Trifolio,	122
XVIII. De Pentaphyllo sive quinque folio,	ibid.
XIX. De Herbis inzybaceis, Chondrilla, Hieracio,	ibid.
XX. De Brassica,	123
XXI. De Iunco,	ibid.
XXII. De Equisetis,	ibid.
XXIII. De Lino & Linaria,	ibid.
XXIV. De Fritica,	ibid.
XXV. De Verbascis,	124
XXVI. De Gramine, Frumento, Milio, Panico,	ibid.
XXVII. De Tithymalo,	ibid.
XXVIII. De Viola,	125
XXIX. De Caryophyllis,	ibid.
XXX. De Lilio,	ibid.
XXXI. De Narcisso,	ibid.
XXXII. De Iride,	126
XXXIII. De Ranunculo,	ibid.
XXXIV. De Anemone,	127
XXXV. De Hyacintho,	ibid.
XXXVI. De Scabiosa,	ibid.
XXXVII. De Iacea,	128
XXXVIII. De Hyperico,	ibid.
XXXIX. De Malva,	ibid.
XL. De Papavere,	ibid.
XLI. De Geranio,	ibid.
XLII. De Luthosphermo,	129
XLIII. De Thlaspi,	ibid.
XLIV. De Anthirrino,	ibid.
XLV. De Cucumere,	ibid.

XLVI. De Legumine,	ibid.
XLVII. Arborum divisio. De Quercu seu Glandsferis. Quid Nux, Malum, Acinus, Bacca,	ibid.
XLVIII. De Nuciferis & Coniferis,	130
XLIX. De Pomiferis & Bacciferis,	ibid.
L. De Acanaceis & Carduiis,	131
LI. De Sempervivo,	ibid.
LII. De Heliotropio,	ibid.
LIII. De Aconito,	ibid.
LIV. De Cistis,	132
LV. Plantas imperfectas post perfectas esse discendas; & perfectarum primum florentes,	ibid.
LVI. Frequentem inspectionem ad formam specierum memorie tradendam esse necessariam,	ibid.
LVII. Plantas depingendi, delineandique ratio,	133
LVIII. Hortis hyemalis consociandi ratio,	ibid.

LIBRI SECUNDI,

In quo agitur de usu & facultatibus Plantarum; de-
que earum perfecta cognitione.

I. Vfus herbarum multiplex. Facultas in humano corpore duplex. Quid Alimentum. Quid Medicamentum,	Pag. 134
II. Primæ plantarum facultates quot & quæ, ac de earum gradibus,	ibid.
III. De secundis facultatibus,	135
IV. De tertiis facultatibus,	ibid.
V. De occultis plantarum qualitate seu proprietate,	137
VI. De modo facultates Plantarum indagandi,	138
VII. De saporum differentiis,	ibid.
VIII. Odorum differentia,	ibid.
IX. Quomodo saporis manifestas qualitates indicent,	139
X. Secundarum tertiisque facultatum investiga- tio,	140
XI. Ex odoribus facultates obscurius cognosci,	ibid.
XII. Odorum virtutes,	142
XIII. Occultarum facultatum dignotionem fieri per ex- perimentum, & quomodo hæc fiat,	ibid.
XIV. De Alimentis. Nullam plantam non esse medica- mentum,	143
XV. Alimentarum differentia,	ibid.
XVI. Alimentorum inventrices, ratio & experientia,	144
XVII. Exacta hujus Philosophiæ notitia qui acquirenda. Auctores veteres & recentiores qui de ea scri- pserunt,	145
XVIII. Florilegium quid; ejus consociandi modus & ordo,	147
XIX. Tituli quales; quo ordine in locis florilegii scri- bendi,	148

ILLVSTRISSIMÆ
NATIONI GERMANICÆ

Iuris Medicinæque studiosissimæ

ADRIANVS SPIGELIVS S.



LLVSTRES, NOBILISSIMI, DOCTISSIMIQUE VIRI,

Sæpe multumque apud me cogitavi, quid esset, cur in tanta rei Herbariæ operam dantium multitudine, tam pauci, quantum proficere, aut deberent, aut vellent, tantum proficerent. Magno enim hujus scientiæ desiderio multos, non modo Sapientiæ, artisque Medicæ studiosos, quibus est ea perquam necessaria; sed etiam Iurisprudentiæ, & aliarum artium atque scientiarum cultores, quibus utilis & jucunda, teneri, & vos & ego per amplum testimonium præbere possumus. Nam vos quidem magnum numerum optimorum doctissimorumque juvenum publicos celeberrimæ hujus Academiæ hortos, cum Vere patent, quotannis frequentare vidistis: ego vero non minorem ad Pisanos ac Bononienses, in quibus Herbarum cognoscendarum gratia superioribus annis sum versatus, accedere animadverti. Tandem comperi non unam esse hujus rei causam. Sunt enim qui hortos ingressi studium discendi tantæ Stirpium varietatis, & tam multiplicis intuitu deponant, nescientes undenam initium studii petere debeant. Reperiuntur qui Stirpem fortuito obviam eruant, ejusve ramum decerpant, inspectam mox abjiciant, tantum memoriæ fidentes suæ, ut unica inspectione inhæsuram firmiter animo Plantæ formam existiment; cum tamen nulla in re magis illa labatur, plusque iteratus aspectus valeat. Alios videmus, aut folia Plantarum tantum, aut apices ramorum ac furculos, aut flores, aut aliam denique partem decerpere, mox libris imponere renovandæ memoriæ causa, ignorantes cunctas cujusque speciei Plantarum partes considerandas, cognoscendasque. Quinetiam non desunt, qui Herbarum nomina & formas tantummodo discant, prorsus vero negligant earum vires, quæ ad Stirpium cognitionem maxime spectant. His causis ut obviam irem, in gratiam eorum qui rem Plantariam facili via & modo, breviorique tempore, & minori quam hæcenus labore discere cupiunt, scripseram superioribus annis Institutionum duos libros, & veterum more amico legendos tradideram, ut majore fiducia in posteritatis commodum publicarentur. Cæterum cum hi una cum amico in alias migrassent terras, frequens me cum illis, qui Herbas discere studebant, consuetudo; frequens amicorum hortatus; frequens de modo, ac facili via eas cognoscendi interrogatio, disputatioque inter familiares meos, atque etiam vestros Medicinæ studiosissimos excitavit, ac impulit ad earum Institutionum compendium scribendum, quod summa & præcipua rerum in illis traditarum capita clare breviterque solummodo complecteretur. Nam in Institutionum libris multas quæstiones antiquas novasque solvebam, animadvertiones notabam tum circa Plantarum formas, & vires, cæteraque accidentia, tum circa autores qui de iis quippiam scripsere, quas consulto hic omitto. Onerat enim discentes quæstionum, & multarum rerum discendarum turba, non instruit. Quo fit, ut admirari non satis possim doctissimos quosdam viros, & in re Herbaria exercitissimos, libros suos, quibus introducerent juvenes ad hanc scientiam, plenos contraversis, sæpe parum utilibus edidisse. Porro quidquid utilitatis ac fructus ex hoc libro studiosus lector percipiet, id vobis viri Illustres atque Doctissimi debebit, in quorum gratiam hæc meas lucubrationes incæpi, ad finem perduxì, atque in lucem edidi. Et enim hoc & amplius jamdiu debere me vobis existimavi, cum ut pro vestra summa in me benevolentia, promptissimoque me promovendi, ac cæptis meis laboribus favendi studio, quod satis annis præteritis declarastis, cum me valetudinis vestræ curam gerere voluistis, vobis gratiam aliquam referrem; tum, ut non modo eos, qui inter vos Medi-

cina

cinae studiosissimi sunt, sed etiam ceteros, qui generis nobilitate, virtutum omnium splendore, linguarum, Iurisprudentiae, artiumque omnium ac disciplinarum notitia, plusquam ulla alia Natio (absit invidia dicto) vere Illustres sunt, ad hoc studium utilissimum jucundissimumque invitarem. Sed quid ego? an sponte currentibus addam calcaria? quasi vero nesciam vos ad peregrinas hasce terras, & a patrio solo longe distitas eo animo accessisse, ut aliquid dignum maioribus vestris faceretur, & Nobilissimorum parentum vestrorum vestigia sequeremini; quorum nullus non sapientissime prudentissimaeque dominium suum aut rempub. cum summa rei militaris (ut fortissimos equites decet) & aliarum bonarum artium atque scientiarum peritia, ita regit, ita gubernat, ut cunctis aliis aliarum Nationum magnatibus exemplo in imperio suo pacis bellicae tempore esse possit. Hortatur veritas me plura de his dicere, dissuadent pudor & verecundia ulterius in vestras laudes prorumpere; ne ubi vestra celeberrima praefectura, partem mihi eorum attribuire (qui & ipse Germanus sum) aut turpe adulantis studium confectari, aut invidiam multorum accendere videar. Illud tamen non praetereundum putavi, patres ac majores vestros, sive Principes fuerint, sive alterius cujuscunque conditionis eminentioris, tam rei Plantariae fuisse, atque etiamnum esse studiosos, quam olim veteres reges atque heroes, Gentius, Lyfimachus, Teucer, Attalus, Achilles, Salomon, Euax, Mithridates, Cyrus, Diocletianus Imperator, & alii quos narrant imperiis dominiisque sese abdicasse, ut majorem diligentiam hortis excolendis adhiberent propriisque manibus semina jacerent gauderetque terra vomere laureato, & triumphali aratore. Vixit paucis abhinc annis Fridericus invictissimus Romanorum Imperator, qui quo tempore Germanis praefuit, ita se rei Plantariae tradidit, ut tam bene formas, quam quispiam alius ex optimorum Medicorum numero, cum quibus saepe de viribus disputare consueverat, cognosceret. Hunc Maximilianus secundus ejus abnepos hoc in studio superasset, nisi mors immatura praevenisset, non sine summo reipubl. literariae detrimento. Horum quoque exemplo patres vestri nobilissimi heroes, & variarum scientiarum cultores eximii, non modo in urbibus, sed etiam ruri amoenissimos, & variis peregrinisque floribus, fructibus, coloribus, odoribusque perornatos colunt hortos, ut ad eos negotiis domini, reipub. studiorumque expeditis se conferant, animumque laboribus & curis fractum restituant, & si quando contigerit, maerorem consolentur. Nam in his verum solatium, praesentaneum doloris remedium, ut alias omittam utilitates omnibus notissimas. Quamobrem cum non minorem esse in vobis animi propensionem, & amorem in rei Herbariae studium, quam in maioribus vestris, a quibus id dimanavit, certo mihi persuadeam, non potui non grati mei erga vos animi hoc symbolum vobis offerre, quamquam exiguum, cum majus hoc tempore per vires non liceret. Id vestra benevolentia & humanitate fretus, vos aequi bonique consulturos fat scio. Deus Opt. Max. coepta studia & peregrinationes vestras bene fortunet, faxitque ut sani & incolumes in terram patriam redeatis. Valete.

P R A E F A T I O.



Scientiarum omnium atque artium studia, nemo est qui nesciat, esse difficilissima. Præ enim prægrandes nitidissimique uniones non nisi in mari imo inveniuntur: sic latent praesertim in natura sine pulcherrime artes, & magno labore, contentioneque ingenii eruenda sunt. Ceterum, qui in primo alicujus earum tradende vestibulo, multis rationibus illam imprimis arduam & difficilem persuadent, ut ipsi sapere plus ceteris videantur; tyrones profecto deterrent, & quasi aditu prohibent. In quo mihi imitari videntur inepti piscatores, qui ut artem, quam profectur laboris periculisque plenam esse indicent, quos ejus discenda studio incensos vident, eos deducunt in altum cum maximis mare tempestatibus jactantur, atque ita imprudentes ardorem illum relinquunt. Imitanda potius Phocæarum solertia est, qui factus in sicco editos sensim deducunt ad mare, ut saltem degustent; mox eos reducunt, atque id sapius faciendo vite in mari degenda paulatim assuefaciunt. Ad eundem modum, qui artium studia qualibet difficilia sciantur, iis primo tenera, ut ita dicam, proponenda sunt elementa, quibus imbuti tantum roboris ac duramenti acquirant, quantum ad omnes, quæ sese illis obiciuntur sunt, difficultates superandas est satis. Hæc mihi frequenter animo versant, Isagogen hanc in rem Herbariam duobus libris comprehensam scribendis consilium incidit. Cum enim Philosophiae partium nulla sit difficilior, quam ea quæ Plantarum naturam complectitur, ob incredibilem formarum, virium & aliorum accidentium varietatem, operæ pretium me facturum putavi, si coactis in unum facilibus magisque necessariis universilibus præceptis, ex quotidianis meis observationibus depromptis, compendiarium rrambus ad hanc scientiam rram pateficerem. Quod quam recte præstiterim, alii judicabunt, & rei ipsa planum faciet, quam statim aggredior.

A D R I A-

113

ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS
ISAGOGES
IN REM HERBARIAM
LIBER PRIMVS.

De forma Plantarum.

CAP. I.

Que in Planta potissimum inquirenda discendaque.

SCIRE inprimis convenit, luo in Plantis potissimum inquirenda discendaque; formam nimirum, & virtutem seu usum. Nam noscere, ubi, quando, quomodo nascantur; quamdiu vigeant, floreat, germinet, & cetera quæ ad generationem pertinent, ad exactam tantum huius scientiæ cognitionem confert. Sed enim ad eos, qui prima fundamenta cupiunt, hic meus sermo est, quorum mentes confundit potius earum rerum tractatio. Adde quod multæ quotidie facileque addiscuntur, ubi quæ formam Plantarum usumque noverit; multæ quoque diligentissimis naturæ indagatoribus relinquendæ, qui omnem ætatem in hac scientia consumere cupiunt; idcirco quæ forma atque usus cognosci possit, hic solummodo indagandum docendumque censui.

CAP. II.

Vnde forma cognoscatur.

CVM formam Plantæ dico, non eam intelligo, quæ omnibus Plantis inest mente contemplabilis, quam animam vegetativam appellant Philosophi; sed figuram seu faciem tam internam quam externam corporis, cui hæc anima vegetativa inhaeret. Eam esse cuiusque Plantarum speciei propriam, oculis cernimus. Ideo tot sunt earum differentiæ, quot formæ diversitates, quæ è partium varietatibus innumeris dimanant. Partes igitur Plantarum nobis primum enumerandæ, earumque differentiæ considerandæ sunt.

CAP. III.

Partium divisio. Similares quæ.

PARTIUM aliæ similes sunt, aliæ dissimiles. Vtræque rursus tum communes, tum propriæ. Voco similes, quæ in alias partes simpliciores se dividi nequeunt: Dissimiles, quæ ex similibus constant. Partes similes communes sunt, quæ fere semper omnium Plantarum partibus dissimilibus insunt. Propriæ vero quæ quarundam tantum. Inter communes censentur caro, nervus, vena, membrana sive cutis, adde etiam his humorem. Nam sanguinem Aristoteles inter animalis

partes recensuit. Caro est solida pars, quæ in omnem dimensionem dividi potest, ut terra. Talis in pluribus fructibus sub regimine seu cute conspicitur, ut Pyris, Pomis, Frunis. Nervus est protensum illud continuumque, ac cæteris partibus magis solidum, quod à carne & vena facile diffociatur, ac finditur secundum longitudinem. Dicitur autem nervus, non quod ad movendum sit à natura datus, ut animantibus; sed potius ad quietem ac consistentiam, roburque. Hic in quibusdam partibus intus conspicitur, ut in caudice Palmæ atque Abietis; in nonnullis extat, ut in Plantaginis foliis, in quibus costa à nonnullis vocatur. Theophrastus nervum *ὡς* nuncupavit, id est, fibram; in cuius definitione quid sibi velint hæc verba, *ἀπὲρ ἐκ τῆς ὀστέων ἢ καὶ ἀπὸ τῆς ἐξ ὅσων φλέβας* me nescire ingenue fateor. Vena autem dicitur, quod oblongum est & cavum, humorem in se continens, qui Plantis alimento est. Ejus vero cavitas aut meatus, etiam non facile conspici potest propter exiguitatem, tamen ratione comprehenditur certissima. Siquidem multæ Plantæ si incidantur, humorem emittunt aut lacti similem, ut Tithymallorum genera; aut aquei coloris, ut Vitis; aut lutei, ut Chelidonium majus: aut alterius, ut multa alia. Fibris venas assimilavit Theophrastus, sed grandiores crassioresque ait esse, & in se ramos spargentes, quos in foliis plurimum Stirpium apertissime videre est. Humor autem, qui in Venis atque tota Planta continetur, proprio nomine caret, quales in animalibus sanguineis sanguis existit. Meneffor in cunctis stirpibus simplicibus simpliciter *ὁπὲρ* appellavit, id est, succum: alii in quibusdam succum; in aliis vero, lachrymam: quæ tamen puto discreta esse extrahendi tantum modo, non materiæ differentia. Liquor, qui ex contusa herba exprimitur aut elicitur, succus vocatur; qui vero incisione dimanat, lachryma. In quibusdam Plantis propria sunt his indita nomina. Nam in Papavere, qui è capitibus incisus emanat humor, opium nuncupatur: qui ex reliquis partibus, præcipue caule & foliis tuis exprimitur, meconium. In Laserpitio, laser Latinis dicitur, Græcis κατ' ἐξοχὴν *ὁπὲρ*, quod tam contundendo, quam incidendo liquor eximeretur. Cutem inter communes partes similes recensere non est à ratione alienum: ea enim vestiuntur caules, rami, folia, fructus; interdum etiam radices. Voco autem cutem tegumentum harum partium membranosum ac tenue. Propriæ partes similes duæ sunt; os & cartilago. Proprias autem eas appello, quæ nonnullis tantum Plantarum partibus dissimilibus insunt:

P

os vero

Caro quid.

Nervus.

Vena.

Humor plantarum.

Succus & lachryma quod differant.

Cutis.

Partes similes, res propria.

Ci. os vero dorum illud ac solidum, in fructibus quibuldam carne tectum, & in se semen continens: tale in Cerasis, Amygdalis, Prunis (quo nomine Mala Persica, & Præcocia etiam comprehendimus) cernitur. In Pomis, Pyris, Cucumeribus, ac cæteris ejusmodi cartilago est: tegumentum scilicet osse mollius, membrana & cure durius; sed æque pellucidum & tenue.

C A P. I V.

Disimilares partes communes quot, & quæ.

Radix quad. Caulis. *Crudez.* *Ramus.* *Semen.* *Flor & Folium quid.* *J. Casar. Scitiger.*
Disimilares partes communes sunt sex: radix, caulis, ramus, folia, flos, semen. Radix non à forma, sed ab usu describitur, definiturque: quod usus illi singularis sit, forma vero summopere variet. Ideo Theophrastus lib. 1 Hist. cap. 1, radicem ait esse id, quo alimentum attrahitur; caulem vero, id quod supra terram simplex assurgens alimentum à radice attractum defert; caudex hic in Arborum genere dici consuevit ramum, in quem caulis dividitur; qui ramus postea in furculos spargitur multiplices. Semen vero est foetus, & quasi totius Plantæ compendium. Sed quid Flos, atque Folium? Hoc diu multumque quæsi, nec quidquam inveni, quo mihi vobisque satisfaciam. Nonnulli inter recentiores doctissimi Viri existimant frondes Arboribus à natura datas esse, ut calorem defendant ac fructum ne arefcat, conservent: folia vero ad decorem potius & ornamentum, quam ad tutelam stipitum, florum, fructuum, & ramorum; nam & hi stipitem defendunt, qua de causa brachia à Columella in Arboribus appellantur. Addunt hujus opinionis causas, dum inquirunt. Stipitis tegumentum esse corticem: quasdam etiam Plantas neque florem, neque fructum edere, cum tamen habeant folia, nonnullas prius flores quam folia emittere, ut Amygdalos; qui frigidissima tempestate florere solent, qua tegumentis magis ad fructibus, & ramis arcendum ipsis esset opus: denique in quam plurimis flores extra folia prominere, qui alioqui ad tutelam externorum deberent esse intra folia reconditi. Cæterum veteres illi sapientissimi Viri contra censuerunt, scilicet folia esse tegumenta stipitis, floris, fructus, atque ramorum. Ut igitur antiquatam hanc opinionem defendam, meamque subnectam, novis his rationibus prius respondendum duxi. Dico igitur, tamen stipitis tegumentum cortex est, hic tamen cortex alio egebat tegumento. Sic cutis capitis & multarum aliarum partium pilis tegitur. Itaque ut quadrupedes animantes, pilos; aves, pennas; cervi, cornua amittunt; ita pleraque Plantarum genera foliis singulis annis spoliantur. Omnium enim quæ in Plantarum genere spectantur, dicebat Theophrastus Hist. lib. 1, similitudo petenda est ab iis, quæ animantibus insunt quoad fieri potest. Foliatis autem Stirpibus, quibus denegati sunt à natura flores fructusque, folia insunt ad ramorum & stipitis tutelam. Quod si vero aliquæ sint, quæ prius florem, quam folia producant; earum flores foliati sunt ad fructus defensionem, atque etiam tam brevi pediculo, ut eo carere videantur; quo fit ut flores in hisce Stirpibus non fiat externis injuriis multum obnoxii. nam qua parte è ramis emergunt, ramo

suo defenduntur: altera vero parte qua vento sunt patuli, fructus defendunt primordium quantum fieri potest. Illud autem perpetuo in memoria tenendum est, fructiferas Stirpes cunctas partes communes producere fructus gratia. Idcirco flores in quamplurimis necessarii fuisse, non in omnibus quidem Plantis ad omnes has partes; sed in quibusdam ad stipites & ramos tantum; in nonnullis ad fructus, & in quibusdam ad flores; in plurimis ad omnes. Flores Stirpibus dati sunt non ob fructum vel semen. Nam Ficui fructus est sine flore; & Iridi atque Iesmino flos sine fructu, nonnullis quoque Narcissi generibus. Ideo censendum in fructiferis, florem si ferant, fructum aliqua defendere parte. Sterilibus vero quæ admodum paucæ sunt, florem idem forte esse cum fructu; ut Thymo, cujus flore fato, ut nonnullis placet, nascitur Thymus; quamquam minutissimum ei semen adscripserit Theophrastus lib. 14 de causis lib. cap. v. In Iesmino quid flos faciat adhuc me latet.

C A P. V.

Partes disimilares communes non omnibus plantis inesse.

Planta perfecta. *Imperfecta.* *Nulla aliquæ radices.*
Hæ quas enumeravi partes, cunctis Stirpibus communes sunt: non tamen omnes omnibus. Sed quibus omnes insunt, eæ perfectæ à nobis Plantæ appellantur, ut Pyrus, Prunus, Malus, Foeniculum, & alia his quæ plurima, quæ sex primas atque præcipuas habent partes. Quibus vero defunt aliquæ, imperfectæ dicuntur; quæ quidem Plantarum perfectio & imperfectio, late admodum patet. Nam quanto quæpiam Planta pauciores partes habet, tanto imperfectior censeri debet: quantoque plures, eo perfectior. Etenim quibusdam unam tantum naturam ademit, ut Ficui florem, Iesmino fructum, Scorpio & Iunipero folium (nisi quis horum aculeos, pro foliis accipiat aculeatis) Tritico, Allio, Narcissi aliisque quamplurimis bulbosis ramum: aliis, quæ à radice statim ramos producant, caulem, qui una cum ramis etiam Chamaeleonis cuidam generi denegatus est, quod inde acaulon nominatur. Quæ vero radice destituantur, cæterasque partes aut omnes aut aliquas habeant, exceptis iis, quæ aliis Plantis innascuntur, ut Visco, Epithymo & Cassutha & aliis id generis, quæ alterius radice fruuntur, nullam novimus: nec reperiri posse opinamur propterea, quod nequeant hæ partes nutrirī sine ea quæ è terra attrahat alimentum, atque id ipsum concoquat. Aristoteles lib. 11 de part. animal. accipere Plantas à tellure præparatum nutrimentum (*καὶ ἐκ τῆς γῆς τὸ τροφικόν*) scribit: in radice vero excoqui, ut in ventre animalium. Idcirco præceptorem secutus Theophrastus lib. 1 de caus. Plant. cap. xvi 1, ventri

ventri radicem assimilavit; & supra in radicis definitione, oris ei officium videtur assignasse. Externæ namque radicis partes attrahunt; internæ & cauli magis vicinæ, concoquunt. Cæterum cuncta animalia five sanguine prædita sint, five eodem careant, os ventremque habere dicitur par ratio, confirmat maximus Philosophorum magister. Dioscoridi, qui lib. 1, cap. xi, tradit Malabathrum folium esse sui generis, quod Indicæ gignunt paludes, innatans aquis, sine radice, nullam adhibeo fidem. Plantæ enim omnes à terra priusquam aquis innatare possint, originem capiunt. Sic Lens palustris etiam oritur, in cujus averfa parte, qua fundum spectat, dum aquis innatat, radices apertissime cernuntur. Eas mirum est hæcenus à nullis fuisse animadversas. Porro quedam stirpes duabus aut pluribus partibus destituuntur; ut Filix, quæ floræ & semine caret. Phyllitis & Scolopendrium nil præter folia & radicem obtinent. Sunt & quæ unicam tantum partem habent, ut Tuberæ terræ, quæ nil aliud sunt quam radices. Quidquid enim sub terra latitat radix proculdubio est. Quare commodissime hæc scripsit Theophrastus lib. 1 Hist. plant. cap. xi, *In totum, inquit, Plantas varia est, atque multiplex, inque universum de ea referre difficile. Indicum vero, quod nihil penitus est, quod commune accipi possit cunctis Plantis conveniens, ut animalibus os, ventris, & alia proportionem eadem, alia quodam alio modo. Neque enim radicem, neque caulem, neque ramum, neque germen, neque folium, neque florem, neque fructum omnes Plantæ habere videntur. Quæ autem radice carent apud Theophrastum, præter eas quæ aliis Plantis innascuntur, nullæ sunt.*

C A P. VI.

Diffimilium partium communium in aliis partes dissectio.

Communes has diffimilares voco partes, non quod omnibus communes omnes; sed quod harum aliquam saltem, si non omnes, cunctis Plantis inesse oporteat. Hæc rursus aliis constant particulis similibus, aut diffimilibus, propriis aut magis communibus, externis aut internis. Radix exterius corticem habet, qui etiam aliis partibus diffimilibus, & communibus, nempe cauli, ramo, femini, aut fructui adhæret. Constat cortex ex carne & nervo; ut in Cichorio, Petroselino, & omnibus Plantis, quarum cortex à radicis interiori parte separatur. Inter externas partes diffimilares etiam fibræ recensendæ. Sic enim appellantur exigui ramuli & capillares, quibus tanquam manibus terram amplectitur radix, eique adhæret, & idoneum alimentum trahit. Hæc in Narcisso, capra, cunctisque quas novi bulbis subtus conspiciuntur; in cæteris vero, à latere. Oblongæ vero radices & *ραφανίδες* paucioribus fibris, & interterdu nullis præditæ sunt. Firmatur namque radix longitudine sua, terræque fati firmiter adnæctitur, nec opus est tot adiumentis, quot iis quæ breviores aut rotundiores undique existunt. Bulbi autem non facile telluri inhaerere poterant, nec aptum succum sugere, nisi subtus iis natura fibris providisset, quibus terræ illos alligavit, ut recto caule Stirps enascatur. Interna vero radicis

pars communior, medulla est; quæ interdum sola est caro; interdum carne præditi nervi; ut in iis in quibus durior cortice, lignosiorque medulla evadit. Vocarunt nonnulli medullam, quod medium occuparet locum, cor; *ἐγκέφαλον, σπλάγχνον, ψυχρά*, hoc est, cerebrum, vilcus (quo cor intelligere eos putandum est) animam; quasi vero animæ, hoc est, augendi, nutriendi, gignendique principium in hac parte crederent consistere; quod in plerisque verum esse comprehendimus, non tamen in omnibus. Caulis autem & ramus, cortice etiam & medulla constat. Hæc in caudice matrix & lignum nuncupatur. Folia ex tribus similibus constant partibus, vena, nervo, carne. His quemadmodum floribus quoque ac fructibus seu feminibus, pediculus adnascitur, qui etiam stylus dicitur, & à Columella petiolus; hoc flos, fructus, folium Plantis adnæctuntur. Multis foliis petioli sunt quoque denegati, ut omnibus Graminibus, Orchidibus, Narcissis, atque iis, quibus folia sunt Gladioli, ut Canacoro, Iridi, multisque aliis. Haud ita in floribus fructibusque contingit. His enim non desunt petioli, quamquam in multis deesse videantur ob brevitatem, ubi aut fructus aut flos arctè adnascuntur aliis partibus. In plurimis quoque Plantis longitudo tanta est pediculorum, ut magno fati interstitio fructus & flos à ramis distent pendeantque: quibus ideo aptius nomen pendiculi, quam pediculi. In iis vero quæ unicam tantum producant florem, pediculus incipit ubi caulis desinit, cujus finis foliorum privatione cognoscitur, ut in Hemerocallide monantho, Lilionarcisso, quem Tulipanum vocant. Sed quid de Colchico dicemus atque Narcissis, de Dente leonis, aliisque id genus, quibus unicis flos, aut plures in summo statim à radice emergentis caulis nudi à foliis. Necessè est floris pediculum in his esse, quem caulem nominant; aut naturam una uti caule pro pediculo. Magis fortassis in dubium vocari res potest de Chamæleone albo. Nam huic nullum caulem adscripsit Dioscorides lib. 1 i, cap. x, ergo neque pediculus aderit, cum tamen sine horum altero nutriri flos ejus non possit. Sane conspiciuntur caulibus modicum aut pediculi, aut horum quippiam *ἀνάλωρον*; utro enim modo appellare lubeat non multum contendam. Idcirco mihi persuasit Dioscoridem non voluisse id caulem appellare, quod non supra terram emergeret, ut caulis consuevit. Sic Aristoteles aves quasdam apodas vocavit; non quod prorsus pedibus careant; sed quod eos tam longos non habeant, ut possint more cæterarum avium ingredi altioribus à terra cruribus, & (ut uno verbo dicam) *καρπυμίδες* sint, hoc est, male pedatæ. De florum partibus, & primum de communioribus nunc dicamus, quarum investigatio difficilis est. Etenim major in iis varietas, quam in ulla alia parte præcipua. Sine fructu tamen aliquo non estis hinc dimittendi. Florum partes aliæ sunt externæ, aliæ internæ. Externæ duæ: pediculus, de quo jam egimus; & calix, è pediculo statim emergens, & ut plurimum in foliola se dividens, florem aut folium; aut florum foliorum principia excipiens, ut in Rosa, in Tragopogo, in quo magnus est, conspiciere potestis. Hic calix multis floribus contingit. Si fuerit cavus nec in tot foliola divisus, theca appellari

Medulla radicis.

Matrix.

Lignum. Foliorum partem.

Stylus, & petiolus.

Chamæleone alio caule.

Aves apodas.

Florum partes communes externæ.

Calix florum.

Theca.

Uniflorus
fructuarius.

Parte inter-
na.

Folia florum.

Stamina.
Fructus flori-
ferus.

Fructus partes
internae.

Stigma,
spica,
filicula.

Pimpinella
granula.

Alina centia.

congrue potest, ut in *Viola mariana*. In iis fructibus, qui post flores prodeunt, calix umbilicum constituit, qui est contra regionem pediculi, ut in *Malis*, *Pyris*, *Rosis*. *Narcissus* vero denegatus calix, aliique non paucis. Internae vero partes, quae ipsum florem proprie dictum constituunt, tres sunt praecipuae; folia, stamina, stylus; quae etsi non omnibus floribus insunt, magnae tamen eorum parti. Paucis floribus denegata sunt à natura folia, ut *Cypresso humili*, quam *Abrotonon* foeminam vocant (appello autem folia partem latam & planam ac renuem instar communium foliorum) pluribus stamina, plurimis stylus. Sunt autem stamina in floribus medio, quod umbilicus appellatur, partes oblongae, tenues, veluti capillamenta, interdum paulo crassiores, paululum prominentes in summitate, apicibus frequenter praeditae, quae stylum, partem similiter oblongam, sed paulo crassiorem atque è centro umbilici emergentem ambiunt; ut in *Lilio*. In *Rosae* floribus staminula, flosculos aurei coloris appellavit *Palladius*; *Plinius* luteos apices. Fructus autem atque seminis partes externas recensuimus, pediculum nimirum & corticem, qui interdum nihil aliud est, quam membrana. Nolim nesciatis, femina ea parte, qua Plantis adhaerent, cuncta sua principia habere, indeque nasci primum radicem. Hoc in *Faba* est eo loco quo *δύσος*, id est, bivalva apparet: ideo *Aristoteles* *ὀμύα*, id est, oculum appellavit hanc partem; quidam quoque umbilicum; quod sane nomen in cunctis feminibus huic parti accommodari recte potest. In umbilico namque animalium sanguineorum vitae ac generationis principium quodammodo consistere videtur. Fructus partes internae, praeter semina quae continent, quaeque fructus etiam appellantur, variae quoque sunt. Quippe cortice interdum vestitur ac tegitur caro, mox semen; ut in *Nucibus*, quarum operimentum lignosum pulpam continet, quae propria tunica à duricie corticis defenditur. Nucem enim non fructum amplius, sed semen voco; quod cum suo cortice seminari debeat. Fructum qui quatuor tegumentis semen includat nullum adhuc novimus. Tribus tegitur *Pomum*, binis *gigarta* in acinis *uvae*, item *Prunum*, *Malum Persicum*, & alia id generis plurima. Vno cuncta quorum semina veticulis continentur, ut *Colytræ*, *Cythisi*, & aliorum; aut vasculis, ut *Aquilegiae*, *Nicotianæ*. Omnia quae semen ambiunt, *ωλεξάρμα*. Graecis dicuntur, sive tres sint diversae partes sive una; ea in Leguminibus, siliquae; in Frumentis, spicae; in Castaneis, echini dicuntur.

C A P. VII.

De propriis Stirpium partibus.

Habent Stirpes etiam proprias quasdam partes in partibus dissimilibus praecipuis. In radice *Pimpinella* quaedam in *Polonia* granula rubra gerit, quibus sanæ purpureo colore inficiuntur. Radix *Lilii*, teste *Plinio*, quinquagenos saepe remittit bulbos, sed hi *μαρμαρίδες* dicuntur, adnascencia & appendices. haec in *Alstragalo* duræ sunt, nigrae, cornu soliditate, sibi invicem adhaerent, ut tradit *Dioscorides*. Pilos in radice habet *Polygonatum*, *Chrysoleome*, *Polypodium* eo-

dem teste; capitula *Oenanthe*. Constat quamplurimum bulbosarum Plantarum radix ex variis tunicis, ac multis tanquam membranis circumdantibus carnem, quae cortices apparent. Oblonga radix & *παρωνόνης*, ut *Pastinaca*, *Raphani*, & aliorum similium in tres dividuntur partes, caput scilicet, corpus, & caudam. Caput est, è quo caulis assurgit; corpus radicis medium, quod & venter appellari potest: cauda vero posterior radicis pars in quam paulatim attenuatur. In caule vero & ramis ea parte, qua folia è caule emergunt; (ala appellatur) nodi quidam emergunt, in *Dentariae* quodam genere, & *Lilio rubente*, quod ideo bulbosum vocant. Fungus quem *Agaricum* nominant; *Abietis* caudici adnascitur. È ramis, extremisque Plantarum, scandentium praesertim partibus capreoli oriuntur; qui sunt cauliculi intorti, quibus *Vitis*, *Pisum*, *Bryonia*, & alia legumina involvunt sese, aliique Plantis, aut propinquis stipitibus se implicant. Hos *Cicero* & *Columella* claviculas vocant; *Plinius* viticulas & crines, *Græci* *ἐλικας* à tortuositate. In vite *Caelius Aurelianus* annulos *Vitis* nuncupavit. Fert *Cynorrhodon* seu *Rosâ sylvestris*, in ramis spongas quasdam, hyeme ubi folia deciderunt maxime conspicuas, exterius pilis obductas, interius duro ligno carver-nulis pleno, in quibus hyeme latitant vermiculi, qui aestatis tempore in cantharides mutantur. Nec desunt foliis suae, quae interdum in quibusdam Stirpibus nascuntur. Invenit in quercuum foliis *Galla*, quam *Iul. Cæsar Scaliger* in salvia quoque se observasse scribit; quod potius vitio mihi evenisse videtur. Producit *Ledum Alpinum* alterum à *Clusio* descriptum, quippiam in foliis, quod præ se fert gallarum vicem. In quibusdam arboribus pro flore nucamentum est, velati in *Picea*, *Pino*, *Corylo*. *Cachrys* pilula est, quae Latino caret nomine, urendi vim habens in medicina. Hanc Arbores aliquot, ut *Quercus*, *Abies*, *Larix*, *Pinus*, *Tilia*, *Nux*, *Iuglans*, *Platanus*que præter proprium fructum pariunt hyeme durantem, postquam folia cecidere. Sed in *Pino Iuglandae* saepius, quam in aliis Arboribus conspicitur. Continet hæc pilula, ut auctor est *Plinius* lib. xvi, cap. vii, nucleum Pineis similem. Is crescit hyeme, deciditque vere cum pilula aperitur. *Quercus* rursus præter *Gallam*, *cachrym* & glandem, alia quædam producit; ut nonnulla Mororum fructibus similia, aridiora tamen & duriora, plerumque tauri caput imitantia, quibus fructus inest nucleis *Olivæ* similis. Nascuntur in eo & pilulae nucibus haud absimiles, intus habentes floccos molles, lucernarum luminibus aptos. Fert & aliam inutilem pilulam *Quercus* cum capillo, verno tamen tempore melligini succi, ut *Plinii* verbis utar. Gignunt & alae ramorum ejus pilulas, corpori non pediculo adhaerentes, candicantes umbilicis: cætera nigra varietate dispersas: media cocci colorem habent: apertis amara inanitas est. Aliquando & punices gignit, nec non è foliis convolutas pilulas: & in folio rubente aquosos nucleos candicantes & translu-cidos, quamdiu molles sunt, in quibus & culices nascuntur. Maturescunt in modum gallæ. Hæc omnia *Plinius* lib. xvi, cap. vii, Robori adscribit *Quercus* speciei, quam perperam *δρύς* à *Græcis* appellatam putavit, cum *Græci* hæc voce omnia

Radix oblonga
se partes.

Caput.

Corpus.

Cauda.

Ala.

Nodi.

Dentaria non
dusa.

Agaricum.

Capreoli.

Cynorrhodon
spongia.

Cantharides
emide.

Cachrys.

omnia Quercuum genera complexi sint. Sed multa eorum, quæ in Quercubus nascuntur, morbum potius quam naturam harum Arborum generare puto; quod raro appareant in singulis Quercus specierum individuis. Nam partes propriæ omnibus specierum individuis aut plurimis eorum adefse debent, si nihil externorum prohibeat, ut terra, locus, aer, aut quippiam ejusmodi. Sic Ilex coccigera præter glandem granum quoddam leve & puniceum producit, quod *κεκρυς* Græci simpliciter vocant, nostri hoc tempore granum tinctorum; quia ut nonnullis placet in hoc grano vermiculus nascitur, cujus insignis copia colligitur, vino irroratur, mox contunditur ad sericas tingendas vestes preciosissima & incomparabili purpura, quam chermesinam vocant. Ea tamen arbos in frigidis regionibus granum haud producit, quamquam in Hispania semper, ubi paululum adulta esse coepit. Porro Lanis copiosis abundat fructus Rosæ, Rhododendri, & aliorum quorundam. In Plantis aliquot villositas seu lanugo conspicitur postquam flores deciderunt, sub qua femina continentur; ut in Cicerbita, Chondrilla, Erigero, Carduique plurimis: hæc *μύημα* communiter Græcis dicitur à canicie: item *γέρων* Arato & Nicandro, *γέρων* Athenæo, *χαίτη* Theocrito, id est, coma. Sunt & quædam in omnibus partibus præcipuis, una radice excepta; aut aliqua tantum reliquarum partium præcipuarum, ut pili & spina, quæ & aculeus dicitur. Cæterum pili ubi densi sunt & incani, hirsutiem aut lanuginem efficiunt, ut in Æthiopide. Pilosella rariores in foliis pilos habet, in caule Papaver erraticum. De spinis plura mox, ubi Spinosarum Plantarum differentias prosequemur.

C A P. VIII.

Partium differentia ex Theophrasto.

SEquitur ut partium omnium differentias breviter perstringamus: ex iis enim tota in generibus ac speciebus Plantarum differentia elucet. Ad has indagandas quænam principia primum proponat Theophrastus lib. Histor. I. cap. I. audiamus: Partium vero differentie, inquit, ut formula rem complectar, tribus fere in rebus consistunt. Aut enim in eo, quod quædam habent, quædam non habent, ut folia, fructus: aut quod non similia, neque paria habent: aut tertio, quod non similitudinem habent. Ego supra monstravi partes omnes communes non omnibus Plantis inesse, excepta radice. Quid vero magnus Philosophus per similes partes intelligat, statim declarat; dum ait, partium dissimilitudinem, figuram, colore, densitate, raritate, asperitate, levitate, reliquisque passionibus innouescere; præterea differentis omnibus saporum. Pares autem partes vocavit, quæ nullam habent disparitatem aut in excessu, aut in defectu multitudinis magnitudinisque. Porro non similitudinem habere dicit, quæ positione ac serie dissident, datque exempla: fructus, inquit, interprete Theodoro Gaza, quædam sub foliis, quædam supra folia gerunt: ipsarumque arborum, aliæ in cacumine ferunt, aliæ à latere, aliæ in caudice, ut Morus Aegyptia quæ Sycomorus appellatur: quædam fructum parvum subter terram, ut Arachidna, & quod Vinguum Aegyptii vocant: quædam (*μυζογον*) pediculum ha-

bent, quædam eo carent. Hoc idem de floribus dicendum: quippe cum aliis circa ipsum nascantur, aliis secus. In summa positionis ratio in his & foliis & germinibus accipi debet. Ordine præterea nonnulla differre videntur. Quibusdam enim rami inordinati, ut Quercui; aliis certo ordine ab utroque latere dispositi, ut Abieti: quibusdam grandiores rami pares numero, aliis impares, ut quæ tres à caudice grandiores ramos producant. Ex his itaque partium differentis singularum Stirpium forma innouescit.

C A P. IX.

Radicum Differentie.

VERum quia hæc fortassis Tyroni non satis fuerint perspecta, non erit abs re diffusius de iisdem differere, & mentem Theophrasti latius aperire, monstratis præcipuarum partium differentis in singulis. Ordiamur à radice tanquam à principio. Figura igitur radicum est oblonga, rotunda, & vel omni ex parte instar pilæ, vel aliqua: recta, curva, obliqua, ut Ficus; intorta, compressa aliqua parte, ut Cyclaminis. Sunt quædam radices externarum rerum formis assimilatae; ut fructui Pyri, Apii; unde ipsi nomen. Dioscorides Asphodeli radicem Glandis effigiem imitari scribit; Cyperi vero & Anemones in incultis nascentis, Olivam æmulari: Polypodii, cirrhos seu brachia polyporum: Orchidum, testiculos. Colore autem discrepant, quod aliæ unum habent, puta album, nigrum, luteum, purpureum, aut alium; aliæ plures, vel in una, vel in pluribus partibus. Nam quædam cortice aut rubræ sunt, aut nigræ, cum earum medulla alba sit, ut Caryotæ. Denstæ vero radices appellantur, aut quæ multas radices habent, sibi invicem coherentes, ut Gramen vulgare; sicut contra raræ, quæ pauciores & valde disjunctas: aut quarum substantia rara est, aut densa; hoc est facile aut difficulter divisibilis. Sunt & quædam molles, ut Smyrni: duræ & solidæ, ut Centaurii majoris: cavæ, ut Pistolochiæ; friabiles, lentæ; asperæ, læves; æquales, inæquales, & tuberosæ, ut Tuberum. Geniculatæ dicuntur, quæ nodis protuberantibus modico intervallo distinguuntur, ut Iridis, Acori. Intervallo conclusam partem vertebra appellat, quarum altera alterius cavitatem sæpe lubet. Sed differentie quæ à tactili qualitate desumuntur, magna ex parte exteriori radicum parti accommodantur, nequaquam totis radicibus. Differunt odore & sapore: omnes enim horum in iis reperire est differentias, excepto falso ut voluit Theophrastus. Dulcis tamen & amarus sapor in plerisque dominantur. Aliquando cortex alium habet odorem aut saporem, alium medulla; quod tam in caule & ramo, quam in radice animadvertitur. Quin & disparis numero radices sunt. Nam aliæ plures, aliæ pauciores habent: numerosas Alarum, Hemionitis, Veratrum album, Gramen vulgare: unam, Aloe, duas, Testiculorum multa genera, Gladiolus; duas aut tres, Mandragora fœmina; tres aut quatuor, Circeæ teste Dioscoride: quinque aut sex, Gramen Parnassi, Alcea: unam in superiori parte, plures in inferiore, ut Chelidonium majus. Quoad magnitudinem, grandem Capparis, Mandragora. Cucumis sylvestris, Bryonia possident: exiguum, Centau-

Ordo positionis.

Radicum differentia, figura.

A colore.

A qualitate tactili.

Geniculata.

Vertebra.

Ab odore & sapore.

A numero.

A magnitudine.

A pſimum.

Centaurium minus: tenuem & gracilem, Afarum, Gramen, Aristolochia clematidis. Positiones fortassis non omnibus radicibus eadem, si terram spectes. Etenim quædam totæ terra occultantur; quædam ex parte qua caulis emergit extra terram eminent, ut Raphani quoddam genus. Quæ vero totæ terra teguntur; aut alte se in terram deſigunt, aut tantum terræ superficiem occupant. Omnibus tamen radicibus proprium est terræ inhaerere, aut alteri rei, quæ proportionem telluri responderet. Idcirco dicebat Theophrastus, positionis rationem in floribus, fructibus, germinibus, foliisque tantum accipi, non in radice, uti nec in caule ramisque; quod caulis semper radici inhaerere debeat, rami autem cauli.

C A P. X.

Caulium differentie.

A figura.

Caulium quoque à figura deſumuntur differentie. Nam alii recti, obliqui, & per terram sparsi, aut ad cælum se attolentes; alii intorti, & quodammodo in spiram convoluti: alii rotundi, quibus maxima pars Plantarum donata est, omnes Frutices, Arboreſque, multaque Herbarum genera: alii plani, hoc est, anguloſi; qui aut sunt duorum angulorum, ut Narcissi; aut trium, ut Cypri; aut quatuor, ut Marrubii, cunctarumque Herbarum quæ in caule non geniculato bina è regione promunt folia ſibi invicem oppoſita; mox poſt modicum intervallum alia duo paulo ſuperius, aut inferius ex illis orientia lateribus, quæ à prædictis duobus nuda relinquebantur. Quo fit ut non ſine eleganti ſpectaculo, ſi quis caulem ramumve foliatum decerperit, & ab uno ſine recta oculis collimantibus alium reſpiciat, in crucis modum diviſa folia cernat; ut in Cruciatâ Dodonæi & aliorum. Sunt & aliis caules pentagoni, aliis hexagoni; ut Lyſimachia purpurea trifolia, quæ in agro Patavino naſcitur. A colore, alii unius, rubri, viridis, albi, nigri, aut alterius; quidam duobus tribuſve coloribus maculati: nonnulli incani, & molli lanugine obſiti, ut Lychnidis coronaria. Cæterum qui proſuſ eſſet atro colore, nondum mihi in Herbarum genere conſpectus eſt. Caulis autem color proprie cortici debetur: quoniam quo corticem aut tegumentum exterius donatum colore videmus, eum toti cauli fallaci loquendi brevitate tribuimus. Alium pars caulis interna, alium externa colorem habet. Sub viridi cortice nigra aut alba ſæpe latitat medulla. Sic aſperos, læves, ſtriatoſque caules Herbarii dixere, quorum cortices & tegumenta viſu aut tactu talia apparent exterius. Dicuntur & alii nodofi, ut Arundinis; geniculati, ut Caryophylli, Saponaria quam Cruciatam vocant: molles, teneri, pingues, quorum ſubſtantia lenta eſt, facile frangitur, digitiſque tenitur: ſolidi, denſi, rari, ut Arborum; cavi ut Sambuci, Arundinis, quorum interna caulis parti ineſt cavitatis. Sapor autem & odor alius ineſt externa cauli parti, alius interna. Cinamomi cortex acri ac ſuavi guſtu ſuaſſimum odorem ſpirat; matrix vero odore ſaporeque proſuſ carere videtur. Numerofos caules producit Solanum ſuriſum, quippe quod decem aut duodecim emit tit teſte Dioſcoride: ſenos, ſeptenſque ex una

Lyſimachia trifolia purpurea. A colore.

A taſſitu quaſiata.

A ſapore & odore.

A numero.

radice, Secale, tres aut quatuor, Alica; ſingularem Arboreſ. Oroſelinum, & alia infinita. Sunt & caules aliis grandes, aut parvi; aliis craſſi, aut tenues; aliis longi aut breves. Quæ omnes differentia & ramis adſcribuntur. Triangulos tamen ramos non memini me obſervaviſſe. Illud his addendum, unico quæ ſit ramo nullam reperiri Stirpem: duobus ad minimum prædita eſſe debet, in quos caulis ſe dividit. Quocirca miror nonnullos Græcos Artemiſiam ramoſam *μυρικήρανον* appellaviſſe, atque recentiores quosdam, hos fortassis imitatoſ, idem epitheton quibuſdam Herbis appoſuiſſe. Sed Græci illi rami appellationem in caulem tranſuſiſſe mihi videntur.

C A P. X I.

Foliorum differentie.

Folia teretia ſunt Sempervivo vermiculari; aliis plana: aliis triangula, ut Scammonio teſte Dioſcoride; aliis quadrangula: aliis rotunda, ut Cappari, Cytho, Coryledoni; aliis ſubrotunda, ut Anagallidi: in extremis oris anguloſa, ut Hedera novellæ antequam fructum ferat, item Tuſſilagini; mucronata, Gramini, Iridi, Gladiolo: recta, incurva, gibboſa, ut Hyacintho, Auriculæ muris alteri Dioſcoridis, concava, Umbilico Veneris, Diſplaco, quæ ſinu ſuo aquam imbrefque ſuſcipiunt, ac etiam continent. Inciſorum foliorum alia profundas inciſuras habent, ut Papaver erraticum, Raphanus, Staphiſagria, Verbenaca, Coronopus; alia tantum in ſuperficie ſeu per ambitum, & horum alia ferrata ſunt, ut Vrtica; alia crenata, quorum inciſuræ nequaquam ferræ modo denticulatæ ſunt, ſed obtuſiori mucrone præditæ. Ineſt etiam diviſuris multitudo & paucitas, nonnullique certus earum numerus, ut Panaci Herculeo, cujus folia quinque diviſiones habent. Color aliis unus, ruber, albus, niger, luteus, viridis; aut duplex triplexque, ut generi Bliti, quod tricolor appellant, à triplici colorum varietate, quæ in foliis annotatur (nonnulli hoc Plinii Sophonium volunt) color item aliis unus idemque eſt prona ſupinaque parte, aliis diverſus. Voco foliorum planorum pronam eam partem, qua cælum ſpectant, ſupinam vero, qua terram alpicunt. Rubi folia ſupina parte incana ſunt, prona vero viridia. Lamium verum Plinii, quod ruſtici Bononiſes Milzatellam vocant, prona parte in medio foliorum maculam habet longam per longitudinem. Candida incanaque folia plerumque ob lanuginem denſam, qua pubent, candida ſunt, ut Marrubii, Lychnidis, & Verbaſci: cæteræ partes quæ lanugini ſubſunt, virides. Appellantur etiam folia rara, ſolida, denſa, quæ denſam, raram, ſolidam aut ſpongioſam habent ſubſtantiam: ſiſtuloſa, quibus ineſt cavitatis, ut Capæ. Cribri modo multis foraminibus perforata ſunt Hyperici folia, item Othonnæ, ut author eſt Dioſcorides. Nec deſunt tenera, ut Chelidonio; pingua; ut Acantho; dura, ut Oxylapatho, Graminibus nonnullis; aſpera, ut Cucumeri ſylveſtri, Symphyto majori: inferiori tantum parte ſeu ſupina aſpera, ut Aſpleno; lævia & glabra, ut Acantho, Mandragoræ; criſpa, ut Braſſicis nonnullis, atque Ocymis. His adde varios ſapores odoreſque, quorum nonnulli tantum in ſuperficie habitant,

Amagnitudi-
ne.

A figura.

Ab inciſura.

A colore.

Sophonia.

Pars prona &
ſupina qua.Lamium verum
Plinii.A raritate &
denſitate.A ſapore &
odore.

C A P. XII.

Florum differentia.

habitantes, ut ex iis foliis, quæ trita odore spoliatur, conicere licet; quidam in parte interna tantum sunt, ut quæ non nisi fricta manibus odorem spirant, aperte satis commoustrant; quidam per omnes foliorum partes sparguntur, ut ex iis foliis constat, quæ trita odorem haud amittunt, & antequam terantur eundem exhalant. Numero perfectio plurimum variant. Quibusdam certus constitutus est foliorum numerus, aliis incertus. Vnum in folio; duo Ophridi; tria nonnullis Tulipan; & aliis quibusdam Herbarum generibus; quatuor Herbæ Paridi, & Tetraphyllo; plura aliis multis. Incerto foliorum numero præditarum aliarum rara habent, hoc est, pauca; aliarum modum foliosa, ut Thymus, Asparagus. Cernuntur & grandia in Brassica, Petasitide; parva vero in multis aliis: crassa in Telephio, Sempervivo, Aloë; tenuia, longa, lata, angusta in compluribus. Nec vero satis est in his differentiis conquirere; quin & ordo diligenter observandus venit, ac series qua singula enascantur. Magna namque Plantarum pars alia à principio profert folia; alia dum augetur; alia dum viget, quæ cunctis præscriptis differentiis variare solent. Exemplum sit in Aniso. Primo, folium post duo illa, quæ omnibus è semine primum oriuntur, rotundum fere profert ex uno peciolo, quod est per ambitum in summo serratum: appello autem summum seu extremum in folio, quod à peciolo aut alia parte cui adhæret, longissime abest. Secundo, tria ex uno peciolo, quorum folium extremum simile primo est; alia autem duo, quæ à lateribus pecioli dependunt sibi invicem opposita paulo angustiora, & conifera figura, aut triangula, in extremo itidem serrata. Tercio, tria alia prædictis similia; sed alterutro foliorum sibi è regione in pecioli extremitate oppositorum, paululum in extremo ab uno latere depresso quadranguli fere figura: quarto tria rursus in extremo serrata ex uno peciolo dependentia: quorum ultimum quatuor divisiones habet, in summo duas, duas rursus alias superioribus altiores ab utroque latere: reliqua duo sibi invicem opposita leves in summo fissuras habent. Ita paulatim reliqua inciduntur, ut tandem ultima umbellæ vicina in totum forma à prioribus fiat diversa. Quare, ut verum dicam, in nulla alia parte major, quam in foliis varietas. In iis positiones quoque diligenter consideranda. Quædam tantum è radice, ut Narcisso; alia ex caule & ramis, alia ex omnibus partibus oriuntur. In caule quadrato bina semper folia sibi invicem ex adverso opposita (ideoque alata dicuntur) modico intervallo distantia ab aliis binis, alia duo latera quam priora occupantibus videre licet: item quatuor ex quatuor lateribus orientia, ut in Cruciata Dodonæi, & Erythrodano, quod Rubiam tinctorum vocant. Tria vero aut quinque aut plura reperietis nunquam. Quibus tria semper ex uno peciolo sunt folia, iis unum in extremo hæret, reliqua duo à latere sibi mutuo adversa sunt, ut in Trifoliis videre licet. Sunt quæ & quinque & septem ex uno peciolo dependentia habent, ut Pentaphyllum, & Heptaphyllum.

Floris nomine supra, tam externas quam internas partes intelleximus, quemadmodum & alii Authores. Quare hic in eodem significato accipiemus. Quoniam autem interna pars floris præcipua, folia sunt, eorum differentia hic tradenda veniunt, omittis aliis aliarum partium. Foliorum alia cava sunt, expansa, recta; alia repanda & inflexa, ut Iridis: quædam fere rotunda, ut Periclymeni teste Dioscoride; in orbem circumacta, ut Smilacis lavis. Cavorum figura cum animatis & inanimatis comparatur. Campanas imitatur folium floris Smilacis lavis, & Convolvuli cœrulei, quem Nil Avicennæ esse perhibent: unde ei & nomen Campanæ ceruleæ impositum. Digitalis inde appellationem habet, quod floris folium digitalis (hoc est munimenti digiti, quo mulieres quæ acui victum quærunt, digitum inter suendum munire solent, ut sine læsione impellere acum queant) speciem exhibeat. Faciem mustelæ & ritum quadantenus exprimiunt Galioflidis floris folia, unde Herbæ nomen. Antirrhini quoddam genus Os leonis nuncupatum fuit, quod ori leonis hianti simile esset. Legomium & aliorum quorundam flores Papilionacei nominantur, quod papilionem volentem quodammodo æmulentur. Nam duplici horum flores folio constant; quorum alterum inferiorem siliquæ tegit carinam, alterum supra ejus dorsum protenditur, ab utroque latere paululum se reflectens, alarum modo. Inciduntur pari modo & floris folia, ut ramorum & caulium in extremo; nonnunquam autem à latere. Colorum maxima in his differentia; nec tot species colorum, quot in his spectantur, pictoribus cognita. Cum enim omnes species colligere ex floribus vellem, pictoresque optimos adirem, qui cunctas exprimerent, nullum unquam qui id præstaret, invenire potui. Ita natura in hisce superavit humanum ingenium. Observantur & in foliis densitas, raritas, asprities, mollicies, levitas, stræ, saporis odoresque omnes, par & impar numerus, certusque & incertus. Vnum folium Smilaci datum est; duo, floribus papilionaceis: tria, quatuor, quinque, sex, septem, octo, & plura cæteris multis. Magna item aliis floribus folia, aliis parva, angusta, lata, longa, brevia, tenuia, crassa. In flore autem animadvertenda præcipue numerus, & positio, atque ordo. Multis enim tantum unicus; aliis duo; nonnullis tres, aut quatuor, aut quinque, aut sex solummodo; quæ plures his edunt, nunquam certum tenent numerum. Nascuntur alii ex radice, alii è caulis, aut ramorum latere, aut cacumine; semperque fere ex aliis foliorum si è latere (sic enim appello partem eam, qua folia cum caule & ramis articulantur conjungunturque) nisi in caulis ramive fastigio, plures simul flores congesti sunt sine foliis. Prodeunt multi flores in cacumine congesti, aut spica in modum, ut Lavedulæ, quæ à spicatis floribus Spica dicitur; aut conifera figura, aut thyrsi, aut verticilli, aut racemi, aut umbellæ, unde Plantæ umbelliferae appellantur, veluti Foeniculum; aut pilæ in modum rotundi, unde Globulariæ; aut alterius forma, qua etiam fructus

Floris quid.

A figura.

Campana.

Digitalis.

Ori leonis.

Papilionum.

A colore.

A tali qualitate & aliis.

A magnitudine.

A positione.

Plantæ umbelliferae.

Globulariæ.

fructus spectantur. Marrubii flores, & aliarum quarundam similia, in rotæ speciem caules ambiunt.

C A P. XIII.

Fructuum, ac seminum differentie.

Fructuum quid. Ræcorum nonnulli, præsertim Dioscorides & Galenus καρπὸς, id est, fructus appellatione semen etiam complexi sunt: alioqui fructus nomine dicitur id, quod semen continet pericarpio contextum: Seminis autem appellatione proprie, quod satum stirpem producit; quod interdum natura pericarpio caret, ut in Milio folis. Si autem quidam fructus pericarpium habeant, pericarpio spoliari debent ut seminentur, alioqui nil producent. Theophrastus ubi carne & semine fructum constare dixit, videtur innuere pericarpium ex carne constitutum, ut in Pomis, Pyris, Nucibus. Nos autem pericarpium nomine omne seminis involucrum significamus, sive membranosum id sit, ut in vesicis Vlmis, Staphylodendri; sive carneum, ut in aliis multis. Seminum & fructuum eadem fere quæ superiorum differentie. A figura fructus alii plani, depressi aliqua ex parte, aut undique: rotundi, recti, incurvati, trianguli, quadranguli, pentagoni, & plurimum angulorum. A colore, candidi, pallidi, lutei, virides, nigri, purpurei, & ejusmodi; sed colores ad exterioris regimenti partem referri debent, à quo colore sæpe discrepant intus contentæ partes, puta caro, aut pulpa. A tactili qualitate, molles, duri, solidi, rari, læves, asperi, tenacique contactu vestibus inhærentes, ut Lappæ, striati, cavi, ut Arbuti. Odores saporesque omnes in fructibus deprehenduntur, imo etiam falsus. Nam quanquam Plantis falsum saporem denegavit admirandus Theophrastus lib. vi de causis Plant. c. xiv, genus tamen Pyrorum Carix memorat, lanugine tam falsa obductum, ut nisi aqua ablueretur, edi nequeat. Potest in putamine fructus esse falsedo, ut Ciceris; nequaquam in feminis pulpa: destrueret namque facultatem generandi. Est & Stirpibus certus incertusque fructuum numerus, ubi pauci sunt. Vnicus flos unicum producit fructum: interdum unum, interdum plura semina. A magnitudine, alii prægrandes dici debent, ut Nux Indica; alii parvi, longi, ut siliquæ in Leguminibus, spica in Frumento; breves, crassi, tenues in aliis. Fructus aut femina, similiter ut flores sita sunt sub foliis, & super folia, ut in Hypoglossis. Addit præterea Theophrastus sub terra nonnulla fructus facere, ut Arachidnam. Aliud sane hic, quam in definitione καρπὸς, per fructum intelligit, scilicet radices, quæ in nonnullis telluri mandantur seminum modo, & Plantam suam producant, ut Pappas Indorum, cujus radix ab Indis in cibo usurpatur. Radices ergo has fructus appellavit Philosophus, quod instar feminis vim habeant generandi, quodque efusi aptæ sint. Græci ἀκαρπες Arborea vocarunt, non quæ prorsus fructum ferrent nullum, sed quæ efusi ineptum, quasi id tantum fructus appellatione dignum sit, quod frui in mensis. Restaret, ut quam πλόκον (utar verbo Theophrasti) partium partes formam haberent, declararem ex exactiorem doctrinam, nisi multa ad hanc necessaria

C A P. XIV.

De quatuor summis Plantarum generibus. Quid Arbor, Frutex, Φρύγανον, Herba.

Igitur ex tot partium innumeris differentiis, innumera emanant Plantarum formæ, quæ singulas species constituunt. Quemadmodum autem polemarchi magnum agmen & confusum exercitum in certas classes distribuunt, singulisque classibus suos ductores præficiunt: & has rursus in centurionatus, quibus centuriones præfunt, qui singulis imperant militibus: ita etiam in tanta specierum multitudine faciendum est, ut ad quædam genera reducatur, ne in iis examinandis confundatur errorque intellectus, plurimumque memoria labatur. Idcirco prisci illi sapientes Plantarum omnium quatuor summa maximaque genera constituit, Arborem scilicet, Fruticem, Φρύγανον, Herbam. Arbor est id, quod singulari à radice stipite affurgit, qui caudex vocatur, & in multos postea ramos majores, quos ἀκροίμοιαι & ὕψος Græci vocant finditur: deinde in ramusculos multiplices, quos iidem κλάδεις, Latini furculos appellant; quodque non facile dissolvi potest. Sic enim mihi interpretanda hæc Theophrasti verba videntur, μονοτέλεχος, πλόκον, ὕψος, & οὐκ εὐαπλόκον, quæ Gaza non satis bene sic vertit: caudice simplici, ramosum, nodosum, furculosum, haut facile dissolubile. Frutex à doctis viris nominatur, quod à radice plures emittit stipites, qui postea singuli in multos ramos sparguntur, ut Paliurus, Rubus. Φρύγανον Theodorus Gaza, novo non tamen contemnendo vocabulo, Suffruticem vertit apud Theophrastum, interdum Φρυγανώδη virgulta. Libro de causis Plantarum Φρυγανώδη transtulit ignaria. Usurpantur enim ad construendum focum; unde existimo Latinos Cremia vocasse, à cremando scilicet, πύρρον τὸ Φρύγανον. Φρύγανον nobis videtur descripsisse Theophrastus Hist. lib. i, cap. v, Φρύγανον ἢ τὸ δένδρον ἢ ἕως πλὴν τελεχὲς, καὶ πλόκον, εἰς βάλαν, πλὴν τελεχὲς: quæ sic Theodorus, Frutex quod ab radice caudice multiplici, ramosumque se attollit, ut Rubus, Paliurus. Quare aut locus Philosophi mendosus, aut interpretis ἡμῶν legit pro Φρύγανον, aut Φρύγανον interpretatus est Fruticem, cum videret in Theophrasto ἡμῶν definitionem desiderari: quod miror à tam doctis & oculatis viris ita oscitanter fuisse omisum. Effecit vero hæc Gaza versio, ut magis recentiores de Φρυγανῶν definitione, quam de Fruticis altereantur, qui putant hanc esse apud Theophrastum Fruticis definitionem. Ruellius haud bene Φρύγανον ait esse Herbam fruticantem, quæ ramulis compluribus furculisque lignosis scatet, sed minutis constat foliis, ut sunt veluti Fruticum rudimenta. Doctissimus Iulius Cæsar Scaliger exerc. cxxxix, Cremium vult esse, quod unicum stipitem illico à radice emittit post bina illa folia, quæ in cunctis Plantis illico è feminis pulpa producant: ab Arbore differre magnitudine, si quidem multo minus Cremium Arbore est; aliquod etiam

Arbor quid.

Rami.

Ramusculi.

Socioli.

Frutex.

Φρύγανον.

Suffrutex.

Cremium.

annuo interito, ut Agrimonia, & multa alia unicaulia quæ intereunt. Item differre à Frutice stipitis unitate: ab Herba, quod hæc post duo illa folia illico è femine enata, alia insuper producat, & procedente tempore etiam stipes in quibusdam aut singularis, aut multiplex, in quibusdam vero nullus. Andreas Cæsalpinus Suffruticem ab Herba vivendi tempore distinguit. Plures enim annos Suffruticem vivere putat, aut radice tantum ut Ferulacea & Acanacea, quorum caules singulis annis pereunt: aut etiam caule, ut Ruta, Sampluchus. Herbas autem proprie appellari scribit, quæ postquam semen perfecterunt moriuntur ex toto, quas nos Plantas annuas appellare solemus, ut Fruges & Olera plurima. Nescio igitur in quod genus bulbosas multas retulerit, nempe Hyacinthum, Narcissum, & alias, quarum radix perennat, & tamen sub Herbis à Theophrasto recensentur; ex quo & illud discimus, Cremium lignosum esse, ut Fruticem atque Arborem, quam idcirco ægrè dissolubilem esse scribit. Cæterum Scaligeri definitio ingeniosa sane est, & distincta satis dignaque tanto viro, quam etiam nos tenebimus. Eam tamen nego esse ex Theophrasti sententia ut ipse opinatur. Nam Philosophus paulo post Herbæ definitionem, subiungit hæc verba; τὰς ἐν τῷ φερόμενόν τε λαχναδὸν ἐν αὐτῇ μονοτέλῃ, ἢ οἷον δένδρον φῦτον ἔχοντα γένει, καθάπερ ραφανίς (non ραφανίς ut legitur in vulgatis codicibus) πύρον, ὅθεν καὶ καλεῖται πύρε παρὰ τοὺς δένδρα λαχνα. Quæ sic Gazæ vertenda erant. *Cremionum* (non virgultorum) atque *Olerum* quædam unicaulia sunt, & quasi Arboris naturam habent: ut *Brassica* (non radix) *Ruta*. Quamobrem nonnulli hæc δένδρα λαχνα appellarunt, quasi Oleriarbores dicerent. Ex quibus verbis patet non esse perpetuo in Cremio unicum caulem, sed tantum in quibusdam, ut & Herbis. Definitioni quoque quam Herbæ statuit, non plane Philosophus assentiri videtur. Hic namque Herbam definit, quod à radice folia fert antequam caulem edat; ille vero Herbam & caule carere, & caulem habere dixit. Omitto alias rationes, quas ex multis locis Philosophi, contra Cremii Herbæque ejus definitionem adducere possem. Quæ etiam ad contentiosos magis, quam ad veritatis amatores pertinere videri possint; illud tamen adferunt commodi, quod intelligimus in re accipiti & valde confusa aliquid certi statuendum esse ei, qui aliquam scientiam tradere vult posteris, ne doctrina patiatur. Approbemus itaque has Scaligeri definitiones; non quod cum Philosopho & aliis antiquis conveniant: sed quia quam plurimas sub se continant species natura distinctissimas, quæ non possunt sub suo genere collocatæ inter se confundi, & quasi in alienas classes commigrare. Nam omnes comprehendere sub quatuor his generibus non possumus: quod natura agat per multa media, de quibus dubitare aliquis potest, ad quæ genera referri recte queant. Hæc de causa commodissime annotavit Theophrastus, definitiones suas accipendas esse non pro exquisitis, quemadmodum etiam divisiones. Quid? Sub quo genere ponam Fungos fateor me ignorare. Arborem, an Cremium? Neotrum esse potest; caret enim ramis, facileque dissolvitur. Nec Fruticem, quia unicum edit caulem. Nec Herba, quia

foliis caret. Denique nullum horum, quia radix ipsi denegata ab ipso Theophrasto. Et Tubera quid aliud sunt, quam radices? Idcirco ἄγχα Græci vocarunt, quod nullam umbram faciant aut foliis, aut stipite. Quare videmur recte quintum genus statuere posse, quod Tubera Fungosque sub se comprehendat.

C A P. XV.

De aliis quibusdam generibus, quæ summis subijunt.

Sub his continetur magna aliorum generum turba, quorum multa una aut altera nota significantur vobis. De his cum non sit satis exacte à recentioribus quidquam tractatum, operæ pretium est plura verba facere. Quoniam horum notitia multum vos juvabit, ad faciliorem multarum specierum cognitionem, si quando Herbarum cognoscendarum causa, hortos aliave loca accesseritis. Horum notæ designantur monstranturque primo in odore, saporeque aliquo peculiari & proprio. Sic Nasturtium, Sinapi, Piper, Eruca, Mentha, Myrrhis, Libanotis, Abinthium, Ambrosia, aliæque Herbæ & Cremia, ex odore à nobis cognoscuntur. Nam cunctas Herbas, quæ exempli gratia vulgaris Nasturtii odorem saporemque habent, iuter Nasturtii genera recte collocari possunt, etiam si partium forma à vulgari Nasturtio multum variant. Quod Herbarii nostri Nasturtium Indicum appellant, nil cum Nasturtio vulgari simile habet præter odorem & saporem. Secundo à virtute singulari; ut Confolida, Saxifraga & ejusmodi. Inter Herbas, quæcumque vulnera glutinant, Confolidæ dici possunt; quæ calculos minuunt, Saxifragæ, etiam si non parum forma inter se discrepent species, sufficit ut in virtute conveniant ad horum generum nomen acquirendum. Hæc ratio est cur tot species Saxifragæ & Confolidæ à recentioribus sint recensitæ. Percipiuntur & tertio quædam genera ex aliis accidentibus variis. Sed quæ quarto à partis alicujus nempe radicis, foliorum, floris, ac fructus forma spinisque, ut Acanacea, desumuntur, deinceps enumeranda examinandaque veniunt; quod hæc & multa sunt & difficiliora, magisque in formis Plantarum nos instruant. Ex radice igitur Orchides, Palma Christi, etiam alia perquam pauca cognoscuntur: ex foliis Unifolium, Bifolium, Trifolium, Quinquefolium, Chondrilla, Linaria, & alia: ex flore, Iacea, Scabiosa, Ranunculus, Anemone, Iris, Narcissus, Hyacinthus, Lilium, & alia multa: ex fructu ut Arborum magna pars præcipue mitium ac domesticarum, Geranium, Papaver & cætera, quorum deinceps notæ exactius commonstrabuntur.

C A P. XVI.

De Orchide, Satyrio, Palma Christi.

Cunctæ Herbæ quæ bulbosas binas, aut ternas habent radices instar testiculorum, semen humanum quodammodo redolentes, Orchides censentur, vulgo Satyria: quamquam proprie Satyrium sit, quod ternas habet radices Orchidum radicibus similes; nam quæ sursum erigitur virilis

Tubera

Odore & sapore.

A virtute singulari.

A partis alicujus forma.

membri forma, duas alias inferius ex eodem initio more testiculorum dependentes. Cum his eadem esset Palma Christi, nisi radices latiores essent ac depressæ magis, & in tres, quatuor, aut quinque partes in extremitatibus divisæ instar digitorum manus. Ideo Palmam Christi nominarunt.

C A P. XVII.

De Trifolio.

Trifolia. Villa vox pluribus Plantis communior quam Trifolii, qua non modo Herbarum varia genera, sed etiam Arborum ac Fruticum completimur; quod cuncta ea Trifolia sint, quæ semper terna folia tantum proferunt in unius pediculi extremitate; duo à latere sibi invicem opposita, atque tertium in extremo, quemadmodum in vulgari Herba, quæ Trifolium appellatur, conspicimus. Inter Arbores est Laburnum & Anagyris, quæ à Laburno foedo odore præcipue differt. Inter Frutices Cytisus, sub quo & Acaciam alteram Matthioli comprehendo. Genistæ quædam species flexibilibus ramis à Cytiso differt: hujus enim rami caulesque lignosi sunt. Adeo vero tria hæc folia Cytiso propria sunt, ut cunctos Frutices, etiam si ad Arboris naturam quodammodo accedant, tribus foliis uno pediculo inhaerentibus præditos, Cytisos appellent Herbarii, à quibus multæ eorum species describuntur. Inter Cremia & Herbas multo plura comperietis genera; quæ fere cuncta hic recensere, non omisissis cujusque magis propriis partibus. Trifolium vulgare, quod pratense vocant, floris edit aut albos, aut purpureos, aut luteos, aut alterius coloris, in summo caule in brevem veluti spicam coagmentatos: deinde semen rotundum in parvis siliquis. Quod autem in agro Salamantico Clusius observavit, petiolos ex alarum sinibus prodeuntes habebat, quibus flores coagmentati sustinebantur purpurei, & his succedebant membranei folliculi semen exiguum continentes. A dictis Trifoliis præcipue odore differt, quod Bituminosum vocant & Asphaltites, quia bituminis odorem spiraret, alii Menianthes. Loti duo recensentur genera apud Dioscoridem, hortense & sylvestre. Hortensis nullam nobis notam significavit; imo ne Trifolium quidem esse scribit: unde multi Lotos etiam plurium foliorum quam trium nobis monstrant. Constat tamen Lotos hortensem inter Trifolia poni debere ex eo, quod Loto sylvestri folia Trifolii pratensis appin-
Cytisi quæ.
Loti.

tiolus trium foliorum enascitur; Loti censeantur.

Medica, ut author est Dioscorides, Trifolio pratensi omni in parte similis est, præterquam in fructu, quem lentis magnitudine promit, sed contortum, ut Siliqua (*κεράτιον*). Ex qua descriptione nonnulli, qui *κεράτιον* apud Dioscoridem corniculum interpretari cupiunt, nobis pro Medica proponunt varias Trifolii species, quarum fructus aut lunæ in modum incurvati sunt, aut instar testæ cochleæ corniculorumve intorti. Fœnugræcum filiquis suis oblongis se prodit, corniculis similibus, in extremitate acuminatis, sed maxime odore gravi, quo & tota Herba prædita est. Ononis quoque inter odorata Trifolia numeranda, similis Fœnugræco, sed lignosior fruticosiorque. Ejus enim folia odorata sunt, tum illius, cujus rami aculeos gerunt, tum alterius quæ prorsus spinis caret. Flos utriusque papilionaceus, semenque in filiquis Vicie similibus. Reperitur & hujus generis in montibus Senensis, quod capreolos, ut Vicia, gerit sine spinis, odore jucundissimo, qui diu in Planta exsiccata servatur. Lagopus Græcis atque Latinis aliquibus Trifolium humile appellatur. Huic caulibus rectis, ac in cacuminibus ramulorum spicæ lanuginosa hirsutave, pedem leporis imitans, unde Lagopi nomen: in ea semen continetur. Reliqua vero Trifoliorum genera ad alia quædam referri possunt, quorum notitia aut à flore, aut à fructu petenda est, ut Anemones species, Fragaria, Tribulus quidam, ac inter legumina Cicer quoddam sylvestre, tum Phaeolus, & si quæ sunt alia.

C A P. XVIII.

De Pentaphyllo, sive Quinqüefolio.

Inter Arbores Staphylo dendron, inter Frutices paucissima ab uno pediculo quinque folia semper dependentia habent. In Herbarum genere nonnulla quæ Pentaphylla & Quinqüe folia dicuntur. Horum flores quinque foliis diversi coloris, raro pluribus constituuntur. Tormentillam nonnulli cum Quinqüefoliis confundunt. Distat tamen numero foliorum florum, & foliorum Herbæ. Flos enim ex quatuor foliis constat luteis: folia in uno pediculo ut plurimum septem.

C A P. XIX.

De Herbis Intybaceis, Chondrilla, Hieracio.

Intybaceæ Herbæ omnes inter Olera recenseri debent. *κικυραίων* appellat Theophrastus Hist. lib. vii, cap. vii, propter similitudinem foliorum quam habent cum Intybo. Eorum multa sunt genera: Seris quam nunc Cichorium dicunt, Chondrilla, Sonchus, Lactuca, Hieracium, & alia quædam nomine tantum cognita apud Theophrastum, & Plinium. Priora autem non satis exacte à veteribus descripta, quod antiquis illis temporibus plusquam satis essent nota. In errore versantur recentiores Herbarii, qui nobis multas Chondrillas ob oculos proponunt flore luteo, cum tamen similem Cichorio, hoc est, cœruleum Chondrilla adscripserit Dioscorides, quemadmodum etiam & caulem & folia. Vnde nonnulli Sylvestris Cichorii speciem arbitrabantur. Distat tantum ab Intybo, quod folia, flos & caulis, semenque

que graciliora tenuioraque sint; & in ramis gummi masticis simillimum edat, cujus granum concretum *χονδρον* Græci dicunt; hincque Chondrillæ vox. Nec minor eorum est error, qui nobis multas Cichorii species luteis præditas floribus enumerant, si vulgare Cichorium verum sit veterum, ut hæcenus omnes arbitramur. Harum pleraque ad Hieracia & Lactucas referendas censeo, & ad alia quædam Iutybaceorum genera, quorum nomina extant apud Theophrastum & Plinium. Hieracia duo descripsit Dioscorides lib. xxi, cap. lxx, magnum & parvum. Vtrique folia Sonchi, flores lutei: magno, flores tales in oblongis capitulis; parvo, flores in orbem circinati. Constant Iutybaceorum flores ex multis foliis, sæpe in extremitatibus serratis, luteis aut lacteis, raro rubris. Vnam enim Hieracii speciem purpureo flore novi.

C A P. XXI.

De Brassica.

Brafficæ multas species faciunt veteres atque recentiores. Omnes folio sunt carnosio, pingui, crispo, aut lævi, aut laciniato & inciso, aut sine divisionibus, nigro aut albo, aut rubro, aut viridi, multum succi in se continente. Flos iis luteus aut albus, quatuor foliis constans: semen in filiquis. Brassicæ marinæ speciei Penæ Monospermos dictæ, quod singulæ filiquæ unicum tantum semen contineant, flos ex sex foliis constituitur. Quæ autem vulgo Soldanella dicitur, nequaquam ad Brassicas referenda. Flore & folio herbæ atque floris, Convolvulus, virtute vero, Scammonium est.

C A P. XXI.

De Iunco.

Notissima herba est Iuncus, prope paludes frequens, quamquam arenosa aridaque etiam loca non careant Iunco. Proprie Iuncos appellamus, quorum folia & caules scirpi nunc vocantur à multis, qui à radice oriuntur teretes, glabri & sine nodis; interdum etiam angulosi, intus cavi, medulla molli & alba pleni, aut spongiosi, denique flexiles. Cæsalpinus vocat Iuncos caules enodes flexilesque, negatque folia à caulibus differre. Nos folia censuimus, ubi fructum aut florem in caule nondum gerunt; ubi gerunt, caules. Cæterum angulosos interdum hos caules aut folia dixi. Nam hujus generis triangularis in fossis Pataviois mihi comparuit. Sunt inter veteres, qui Cyperum etiam Iuncum appellaverunt, quod caulem edat Iunco vulgari similem, intus cavum, medullotum, foris sine nodis ac foliis. Teres hic est in Cypero, quem Iuncum floridum appellat Matthioli; angulosus in Cyperis, quos Dioscorides & Plinius describere. Reperitur enim frequenter triangulari caule, raro quadrangulo, qui Iuncus quadratus à Celso nominatur. Folia Cypero angusta, plana, glabra, & Porro similia, quibus maxime à vulgari Iunco distinguitur. Squinanthum autem officinarum, Græci quoque *χρίνον* & *χρίνον ἀρωματικόν* nominant: Latini Iuncum odoratum, Celsus Iuncum rotundum, ut à Iunco vulgari & Cypero

qui triangularis ut plurimum est, distingueretur. Raro ad nos hæc Herba adfertur integra cum caule ex Arabia. Vidi caulem ejus rotundum, foliis alternatim obtusum, in quorum alis flores continebantur, folia Gramini similia, cujus potius est species. Et sane adhuc me latet, cur Iuncum peregrinam hanc Herbam dixerint, cum neque caulem, neque folia Iunci habeat. Parum à Cypero differret Typha (folia enim similia, enodis caulibus rotundisque, & in summo flos, aut fructus) ni durus caulis & lignosus esset instar Arundinis, & flos seu fructus tornatæ clavæ similis.

C A P. XXI.

De Equisetis.

Inco subjungatur Equisetum forma parum dissimili: *ἰσώριον* Græci vocant, Latini Equisetum, & Caudam equinam, quam Herba hæc altius accrescens dependentibus comis refert. Caule & folio est Iunco, id est, rotundo, geniculato, & in se infarctis. Ut breviter dicam, ni folia aut ramos (utroque modo dici possunt partes in quas caulis Equiseti se dividit) proferret, Iuncus geniculatus merito appellari posset.

C A P. XXII.

De Lino, & Linaria.

Lini & Linariæ genera folia & flores produnt; cunctis enim oblonga, angusta, acuminata in caule. Linaria à foliorum similitudine quam cum Lino habet, nomen accepit. Distinguuntur flore & fructu. In Lino five sylvestre sit, five sativum, flos ex quinque foliis constat cœrulei coloris aut albi, aut rubescentis, aut lutei: Linariæ vero flores figura varii. Vulgaris, quam Osirim nuncupat Dioscorides, flores edit luteos à fronte latiusculos, clausosque, os ranæ imitantes: cauda angusta est, inflexa, ut Consolidæ regalis; foliis Lini, qualia etiam in Esula minori conspiciuntur. Herbarii primum nascentem Esulam à Linaria vulgari distinguunt, quod ex Esulæ caule aut foliis lac emanet; è Linaria minime. Hoc ait tritus verficulus:

Esula lactescit, sine lacte Linaria crescit.

Cæterum quædam proposuerunt nostri Neoterici Linarias, quarum folia non sunt Lino similia, sed flores vulgari Linariæ tantum, ut Linaria odorata, & Linaria Valentina Clusii.

C A P. XXIV.

De Vrticæ.

Menthæ similia sunt Vrticæ folia, hoc est lata, in acutum desinentia, undique serrata. Natura urendi se prodit, distinguiturque à Mentha, Mentha quod hæc non urat, & odorata sit. Plinius à foliorum forma Vrticam Herculanæam nominavit, quæ odorata est. Ego hanc inter Calamentha ponendam puto, si non tactu simul cum odore mordeat. Vrticæ valde similis Herba est, quam mortuam Vrticam nominant, quia tactui innoxia est. Ejus duo genera, unum Lamium vocant; quod hujus flores cucullo larvatam faciem quadantenus repræsentent: alterum foetidum, quod Vrticam

Galeosm.

feretida dicunt, & Galeosm, quia galei, id est, mustelæ faciem & rictum quodammodo flores referant.

C A P. XXV.

De Verbasco.

Thapsum
barbatum.

Blattaria.

Phlomis.

Pa Par.

EX folio & flore maxime inter ceteras Herbas cognoscitur Verbascum, quod Græci φλόμιν vocant. Vulgare Verbascum, hoc est, Thapsum barbatum (à cuius foliorum aut florum similitudine multa Herbarum genera Verbasci nomen adcepta sunt) folia habet lanuginosa, candida, aut virentia, aut subrubra lataque: florem fert patulum, unico folio constantem in quinque partes dissecto, qui levi motu decidit, album, aut luteum, aut etiam rubrum. Flores tales producit etiam Blattaria, quæ ideo sæpe fallit pro Verbasco, id est, Thapso barbato, accepta; quocirca & hæc inter Verbasca venit collocanda. Cætera vero genera quæ hoc flore carent, à foliorum similitudine, quam cum Verbasco vulgari gerunt, à recentioribus Herbariis Verbasci appellationem fortiuntur; ut quod Silvestre vocat Matthiolus, Salviæ folio, sed incano, densa lanugine obsito, veluti Verbascum, inter Cremia reponendum potius quam inter Frutices: Scaliger inter Herbas collocavit. Florem fert in verticillis crassum in caule per intervalla dispositis, ut Marrubium. Hic luteus est aut aureus, fistulæ modo concavus, cuius pars postrema in duo velut labia dehiscit, ligulamque è rictu promit. Phlomidis recensentur tres à Dioscoride, admodum mutila descriptione, Verbascula interpretantur. Scio φλομίδα non esse diminutivum ἢ φλόμιν, sed φλομίδιον. Credo à foliorum hirsutis Phlomidis appellari. Florum formam non adscripsit Dioscorides; ideoque plura proponuntur Phlomidum genera à Neotericis, quam deberent. Sunt qui prima duo Phlomidum genera haud esse foliis hirsutis tradant, sed tantum tertium, quod Lychnitum cognominant, propterea quod hoc aptum solummodo esse scribat ad ellychnia. Idcirco primum Phlomidum genera censent eam Herbam, quæ Paralytica, & Arthetica vulgo dicitur, cuius multæ sunt species. Omnes fere in caulis nudi vertice flores in umbellæ modum ferme congestos luteos, aut albos, aut rubros in quinque folia dissectos, aut ex uno folio quinque incisuris prædito constantes, è caliculis denticulatis producant. Verum non vident Dioscoridem his folia tribuisse hirsuta, quæ in nostra Paralyti desiderantur. Sunt enim aut lævia, aut crispata Lactucæ modo; hinc Lactuca sylvestris in hac regione vocatur.

C A P. XXVI.

De Gramine, Frumento, Milio, Panico.

Gramen Parnassium.

INter Herbas quæ radicem fibratam habent bulbosæ carent, longoque & angusto sunt folio, duo præcipua genera memorantur; Gramen scilicet, & Frumentum. Quæcunque autem calamum, caulemve duriorum lignosiorumve producant, Cremia rectius appellari possent quam Herbæ, quod cremari queant. Gramen unum, quod Parnassium vocant, quoniam in Parnasso monte

oriatur, sola forma & foliis imprimis, quæ Hederaeae sunt, differt à cæteris omnibus Graminum speciebus, quorum multiplex est in spica aliisque partibus differentia. Aliquando centum Graminum species numeravi, nec pauciores alii, qui ante me scribere; quanquam inter has quædam existant, quæ neququam inter Gramina constitui debent. Dicitur Gramen à germinando, quod cito multumque germinet; à Græcis νία, qua voce etiam quamcunque herbam intelligunt. Frumenti autem tria sunt genera; Triticum, Milium, Panicum. Triticum rursus quatuor complectitur genera; Triticum proprie dictum, quod πυρόν & σίτον Græci vocant, Hordeum, Secale, quod multi Siliginem volunt, Avena, quibus & quintum addere possumus, nempe Oryzam. Hæc σπάρδη & σπυγὴ vocat Theophrastus, quod semina horum Tritici vulgaris semini similia quodammodo sint, hoc est, oblonga & per medium secundum longitudinem leviter divisa: Gaza Frumentacea, sed haud scio an rectius Triticea? Nam et si Frumentum sæpe pro Tritico sumatur apud Latinos scriptores; communiter tamen per Frumentum intelligunt una cum Triticeis, alia quædam Frugum genera, ut Milium, Panicum, & si quæ sunt cætera ex quibus panes confici solent σπυγὴ dicta Dioscoridi, lib. II, cap. CVIII. Columella, atque etiam Plinius inter Frumenta, Panicum Miliumque reposuerunt. E gluma facile excutitur Triticum, cuius granum lævi est cortice; Hordeum vero asperius, utpote qui ipsa gluma tegatur, in cuius fastigio arista eminet. Idem cum Hordeo videri posset Oryza, ni rotundius illi esset semen acovi veluti figura, asperiorque & striata gluma prædita. Secale granum est oblongum prædictis nigris atque strigosius, nec glumis tectum. Oblongum pari modo quin etiam Avenæ est; sed glumis opertum, & superiori parte exiguis pilis hirsutum. Semen rotundum, parvum, tenui tunica lutea vestitum promit Milium. Nec Panicum valde dissimile, nisi quod granum hirsutum est, splendentibusque luteis folliculis opertum. Qui vero quantum spica aliisque partibus hæc genera differant, scire cupiunt, scriptores adeant. Mihi nunc satis est summam ac generatim generum eorundem differentias assignasse, ut sciant eis tantum præcipue à Graminum generibus distinguere.

C A P. XXVII.

De Thymalo.

Thymalus Lactaria auctore Plinio, & Lactuca caprina nominatur, quod capræ ea innoxie vescantur. Lactaria & Lactuca dicitur, quod lacteo succo tergeat, qui profluere aut emanare conspicitur detractis foliis, aut caulis parte. Huius multa sunt genera, Characias, id est, Vallaris, sic dictus quia vallis septisqve muniendis aptus sit, aut quod plerumque his in locis proveniat: Myrsinites, quia folia Myrti habet: Paralysus, id est, Marinus; Helioscopius, Cyparissias, Dendroides, Platyphyllos, Efula quam Pythyusam vocant, Lathyrus, quæ Cataputia minor dicitur, Replus, Apios. Ad hæc variæ Thymalorum species reducuntur. Cunctis diversæ radices, item caules, folia, flores, fructusque.

νία.

Frumenti genera.

Tritici genera.

Tritici vulgaris semen: Hordei.

Oryza.

Secalis.

Avena.

Mili: Panicum.

fructusque. In eo conveniunt, quod caules in summo spargantur in ramulos junceos ad minus ternos, quibus alia quam in caule folia adnascuntur, rotundiora scilicet, & ab utroque latere bina, quæ in nonnullis generibus à se invicem separata sunt; in plurimis sibi usque adeo adnata, ut labrum, aut pelvim aut calicem oblongum, vel oblongum acetabulum imitari videantur, per quod juncei rami transeunt (veluti in Perfoliata) qui flores continent summo fructui insidentes. Hanc ramorum feriem Dioscorides lib. IV, cap. CLXVIII, comam appellavit. Rizotomi hodie umbellam, quod umbellæ in modum hi ramuli dividantur.

C A P. XXVIII.

De Violis.

Mltis Herbis ac Cremiis, iisque nihil inter se similibus, Violæ nomen inditum à veteribus; qui fortassis hoc nomine pulchros flores, prius cæteris vere apparentes significarunt. Nam *ἰὼν* (sic Græci Violam vocant) *ἰὼν ἡ ἰώνυ* dictum volunt; quoniam prius cæteris floribus veris tempore proveniat. *ἰὼν μέλαινα* & *ἰὼν λευκή*, Latinis Viola nigra & Martia, quod Martio mense floreat, vulgo cognita herba est, non modo frequens in Pharmacopœorum officinis, qui ejus flore quinque foliis constante, utuntur ad conficiendos syropos violaceos; sed etiam in olitorum hortis. Flori huic peculiaris color, quem Virgilius & Theophrastus admodum licenter nigrum, Dioscorides purpureum dixere; à cuius similitudine color Ianthinus, hoc est, violaceus nomen accepit. Quod vero Græci Leucoium appellant, hoc est, Violam albam (à foliorum ut quidam putant canitie, non à florum colore, qui aut albus est, aut purpureus, aut luteus (& ut nonnullis placet, etiam cæruleus, qualis tamen nondum mihi conspectus) Cremium est; caule scilicet lignoso, recto, rotundo, ramoso; foliis oblongis, ut plurimum candidis & incanis Verbasci modo; floribus odoratis ex quatuor foliis constantibus, candidis, purpureis aut luteis; hinc siliquis oblongis, angustis, in quibus semen depressum continetur. Vulgus Violam vocat, quæ flore est luteo; Plinio & Gallis, Viola lutea; Arabibus & officinis, Keyri. Radicem habet lignosam, fibratam. Aliud ab his Leucoium Theophrasti, quod bulbosum cognominant, quia huic radix bulbosa sit, è qua bina aut terna folia oblonga & angusta prodeunt; deinde caulis, atque in ejus summitate flos unus aut alter, è vaginula suo pediculo propendens, albus, sex constans foliis, tribus externis & duobus internis, in cuius medio stamina cum luteis apicibus, Campanellæ vulgus vocat. Apud Longobardos ultimis Februarii diebus florere incipit. Hæc Herba est, uti & illa quoque quam Violam matronalem, Damascenam, & marinam appellant: alii Hesperida, quod noctu aut circa vespem flos magis oleat; Fuchsius Leucoium. Nam flos illi fere Leucoii, quod Cremium est, nec non & fructus: folia per ambitum subnigra, leviter crenata Drabæ modo. Huic affinis est ea quam Violam latifoliam, alio nomine Bulbonacam, & Lunariam raphanitim vocant: item quam Lunariam odoratam & regiam, & Græcam. Vtriq; folia lata sunt; sed Bulbonacæ aspe-

riora Raphani modo & crenata; Græcæ vero molliora, & per ambitum ferrata. Vtriq; flos quoque Leucoii quadrifolius, purpureus, aut subcæruleus: sed fructus latus, foliaceus, fereque rotundus. Adscribunt & Violæ nomen recentiores Medio Dioscoridis, quam Marianam Violam vocant aliqui; & Calathianæ seu Campanulæ, quam autumnalem Galli, nec non quibusdam Caryophyllis, quos Violas barbatas Dalechampius.

C A P. XXXIX.

De Caryophyllis.

Caryophyllorum appellatio à florum forma est; siquidem flos apertus una cum calyce, caryophylli fructum, qui ex India deferitur, plane refert. Calices ejus sunt longi, teretes, glabri, fere semper orbiculo superiore denticulati, ex quibus flores pulcherrimi Caryophyllorum fructuum sæpe odore, quiaque aut sex foliolis constantes ubi simplices sunt, colore perquam variis, per extremas oras fimbriatis. Ab hujus floris quadam similitudine Flos Africanus Caryophylli nomen accepit. Luteus hic est, & injucundo odore caputque gravante, foliis communi Caryophyllo diffimillimis, ad Tanacetii folia accedentibus potius; unde Tanacetum Africanum appellavi.

C A P. XXXX.

De Lilio.

Lilium, quod Græci *κρίνον* & *λίον*, flos vulgaris est; ideo neque hunc, uti neque herbam descripsit Dioscorides. Ejus nomine multa herbarum genera designantur, quibus flores pulchri atque odore suaves; ut Lilium convallium, Narcissus, & ejusmodi. Proprie tamen Lilium est Herbarius, cui radix bulbosa, caulis rectus & foliatus, in cuius summo flores varii nunc hujus nunc illius coloris, ex sex foliis constantes, quorum labia magna ex parte reflexa sunt; stamina iis sex plerumque in medio, atque in umbilico stilus. Liliorum genera (præter rubrum & album, quæ vulgariora,) sunt Hemerocalles, Martagon, Lilium Perficum, Corona Imperialis & Tulepanum. Quorum omnium differentias apud Herbarios studiosi perquirant. Lili quoque florem fert ea Herba, quam Lobelius, & alii non contemnendo vocabulo novo Liliaphodelum dixerunt. Radice enim Aphodeli est & foliis; caule sine foliis, aut si fiat, exiguis sane, qua in re differt à Lilio.

C A P. XXXXI.

De Narcisso.

Narcisso nomen est à vi stupefaciendi, quam Græci *ναρκισσος* vocant, ut testatur Plutarchus lib. XII, Sympos. his verbis: Narcissum nominarunt, quia nervos hebetet, & torpidas gravitates efficiat. Idcirco Sophocles ipsum vetus magnorum Deorum, hoc est subterraneorum coronamentum appellavit. Theophrastus, nec non Dioscorides autores sunt Narcissum etiam Lilium dici. Plinius quoque dum lib. XXI, cap. XII de Narcisso & Liliis simul agit, sub Liliis comprehendisse visus est. Narcissorum unum genus purpureum

Flos Africanus.

Liliaphodelum.

Narcissus latini dicitur.

pureum statuit; alterum flore candido, & calice purpureo. Virgilius Ecloga v purpureum Narcissum (ut puto) nominat, non quod undique sit purpureus: sed quia medium floris (quod calicem video Plinium appellasse) purpureum cernatur. Idem Plinius paulo post unum genus purpureo flore recenser, alterum herbaceo; quod tamen si de colore floris intelligat, falsum est. Non enim flori color herbaceus, sed albus; in medio vero aut croceus, aut purpureus, aut albus totus. Herbaceum caulem adscripsit Narcisso Theophrastus lib. Hist. VI, cap. VI, his verbis: ἡ δὲ καυλὸν ἀφύλλον ῥιζὸν, πᾶσι δὲ καὶ ἐξ ἀκρῶν τὸ ἀνθ' ὅσον: id est, caulem quidem sine foliis habet, sed herbaceum, florem in cacumine. Videtur autem Plinius legisse πᾶσι δὲ καὶ ἐξ ἀκρῶν τὸ ἀνθ' ὅσον, & sic ad florem non ad caulem herbaceum retulisse. Narcissum autem Dioscorides folia Porro similia habere, sed tenuia, multoque minora & angustiora: caulem vacuum, sine foliis, palmo majorem, in quo flos albus, intus croceus, in quibusdam purpureus: radicem intus albam, rotundam, bulbosam; semen veluti in tunica nigra, oblongum. Recentiores multos nobis Narcissos depinxere, veros scilicet, & falsos. Veros voco, qui descriptionem Dioscoridis in flore admittunt: falsos vero, qui ab ea diffident. Verorum foliati sunt flores omnes sex foliis constantes, aut pluribus; albis omnibus, excepto quodam genere quod nuper ex Oriente ad nos delatum est; in medio autem floris calix seu acetabulum, quod aut luteum aut croceum; aut luteum in fundo, croceum aut purpureum in oris; aut totum aureum, albumve. Id Ovidius eleganter, dum mutationem Narcissi adolescentis in hunc florem describit, expressit his versibus:

Nusquam corpus erat, croceum pro corpore florem
Inveniunt, foliis medium cingentibus albis.

Quibusdam in medio protuberantia flava, quæ rotunda est, & vel integra (calicem plenum vocat Clusius lib. II Hist. cap. XXXI, in Narcisso pleno flore) vel in plures partes divisa à foliis in medio ex ea pullulantibus, ut in Narcisso Polyantho conspicitur. Infunt & quibusdam, qui calicem in medio habent, staminula in medio calicis: quibusdam folia, & alia quædam, quæ diligens communis Narcissi inspector observare poterit, & quantum aliis quoque in partibus differant, unde peculiariter sibi cognomina sumunt. Cæterum falsorum Narcissorum plurimæ sunt species, quæ inter se variis partibus differunt. Dodonæus Narcissum montanum appellat, cui radix & folia, caulisque Narcissi, atque etiam floris folia vulgaris Narcissi quæ calicem ambiunt, ni flava essent; calix vero tam grandis, ut ex eo floris dimidium constitutum esse videatur, atque in nonnullis ejus speciebus flos universus ex hoc calice constaret. Sunt qui levi conjectura Narcissum Montanum Theophrastus putent: Clusius recte Pseudonarcissum: quamquam dubio non caret an non Pseudonarcissus ejus vulgaris verus quoque Narcissus dici debeat. Ajunt enim hujus generis unum esse, quod floris sex illa folia alba obtrineat, calicem vero luteum. Nos proprium his Pseudonarcissum nomen dedimus Campanæ peregrinæ; vulgus in Italia Trombam Sorianam, hoc est, Tubam Syriacam, dicit à calicis figura. Quod autem nonnulli docti viri Leucioium bulbosum Theophrasti

appellavere, ad Narcissos quidam retulerunt, cum etiam & hanc nollent sui generis Plantam constitutere. Narcissus certe non est; quoniam in medio floris nullum acetabulum aut caliculus; sed staminula seu ligulæ ut plurimum crocæ, una cum filo in medio, quæ sex alba folia ambiunt. Miror inter Narcissos relatum cum florem, quem vulgus peregrino vocabulo Tulipanum & Dulipanum vocat, cum præter bulbum nil cum Narcisso commune habeat. Inter Lili genera supra rectius videor collocasse.

Tulipanum
Lili genus.

C A P. XXXII.

De Iride.

Iridis flos sex folia habet: tria deorsum reflexa arcus modo, tria vero sursum contra se mutuo reflexa, quæ magnitudine, colore, odoreque variant. In vulgari ut plurimum color cœruleus seu arcus cœlestis, unde Iridis nomen accepit. Ab hujus similitudine varia Plantæ Iridis nomen mutuatæ sunt, quas in latifolias & angustifolias dividit Clusius lib. II Hist. cap. XLV. Omnibus autem à radice sunt folia gladii similitudine. Flos Iridis Tripolitana folia magna versus caulem inflexa habet, & alia tria minora alata, ligulam flavam tegentia, bifida, ut novem foliis flos constare videatur. Chamæiridis flores odorati sunt, ex cœruleo, aliquando ex purpureo violaceis, ex novem foliis conflati. Lobelius Iridem raram nominat flore tribus tantum foliis repandis constante peregrina elegantia striatis, obscure violaceis. Xyris, quam Dioscorides Irin sylvestrem vocavit, vulgus spatulam foetidam, facile à reliquis Iridis speciebus dignoscitur ex flore & foliis, quæ à radice nascuntur. Floris enim surrecta folia, atque in ejus umbilico puniceum fide: folia vero herbæ recoctam olent, unde & Recoctaria in quibusdam Italici locis dicta est.

Iris Tripolitana.

Chamæiris.

Xyris.

Recoctaria.

C A P. XXXIII.

De Ranunculo.

Cognoscuntur & ex flore Ranunculi genera. Hujus color aut niveus est, aut aureus teste Dioscoride, qui, uti neque ex aliis Plinius, quidquam de forma floris præterea annotavit. Nostri Herbarii diligentiores in imponendis nominibus, omnes Herbas, quibus communium Ranunculorum floribus similes in caule micant flores, Ranunculos nominant. Constant quinque foliis aureis ut plurimum, interdum lacteis, expansis (quæ cultura & mangonio, tum etiam sponte multiplicari affirmant) in medio multis luteis aut albis staminulis, brevibus, iisque sæpe cum apicibus. Reliqua vero genera, quæ proponunt alii, nequam Ranunculorum sunt, sed aut Anemones, aut alterius. Ranunculum Græci βατερύχων appellant, quod vulgares illæ species prope fossas, & in locis humidis nascantur, ubi ranæ degere solent, ac se sub hac herba occultare. Plinius ait lib. XXV, cap. XXXI, Strumeam à suis Herbariis vocari, quoniam strumis & panis medeatur; vel etiam, quod strumosa radice interdum conspicitur. Ego in monte quodam Bononiensi Ranunculum

Plinii locus
dissimulatus
fuit.

Narcissi veri
qui nascuntur.

Pseudonarcissus.

Narcissus
montanus
Theophrasti.

Campana
peregrina.

culum passim nascentem vidiradice Scrophulariæ, & folio floreque communis Ranunculi.

C A P. XXXIV.

De Anemone.

Q Voniā autem Ranunculo tam valde affinis est Anemone, ut multi hanc cum eo confundant, non erit inutile discrimina utriusque ostendere. Flos Anemones nisi radiis solaribus illustretur, aut vento perfletur, non aperitur; unde ipsi nomen. Nam ventus Græcis ἀνέμος. Est præterea & in floribus colore differentia, & foliorum numero. Quoad colorem, Anemonæ color aut est puniceus, aut purpureus, raro albus aut lacteus: Ranunculo autem luteus fere semper, aliquando albus. Nam licet Ranunculum primum flore purpureo interdum esse scripserit Dioscorides: is tamen hæcenus à nullis rizonomis conspectus est. Plantam quidem Syriacam nobis depictam ostendit Leonardus Rauwolfius, quam ad Anemonem retulit. Flos ei ex quinque foliis, modo luteis, modo purpureis, alias rubris. Sakaick appellant Arabes. Forte hoc primum Ranunculi genus Dioscoridis; quod foliis coriandri constat, sed latio-ribus, subalbidis, pinguibus, flore luteo, interdum purpureo. Verum quia non addit descriptionem hic Auctor, difficulter quid certi conjectura assequi possum: icon satis descriptioni Dioscoridis respondet. Lacteo autem flore quartum genus Ranunculi donat Dioscorides. Quod ad foliorum numerum, ut dixi, Ranunculis omnibus in flore quinque folia, exceptis iis qui multiplici foliorum serie constant: Anemones autem flos raro quinque habet folia; & si quinque, ea semper vel punicea, vel purpurea, nunquam alba: qui vero sex, septem, octo aut plura, omnibus coloribus etiam albo variat. Nam quem Ranunculum nemorensem appellarunt nonnulli flore albo, Anemones est species, cum ejus flos nunquam à me quinque; sed sæpius sex, interdum pluribus foliis conspectus sit. Sunt, inquit Dioscorides lib. II, cap. CXCV, qui ab Anemone sylvestri Argemonem, & Papaver quod Rhæjam dicunt, propter colorum cognationem in floribus, distinguere non possunt. Verum Papaveris & Argemonis color minus puniceus spectatur, & utrumque tardius floret. Quin & Argemone croceum succum, gustu admodum acrem reddit: Rhæjas vero candidiorem, & acrem. Præterea Argemone & Rhæjæ capitula sylvestris Papaveris similia sunt: sed Argemone superne crassiusculum; Rhæjæ angustius. Anemones genera neque succum emittunt, neque capite donata sunt, sed veluti Asparagi cacumine. Hæc ille. Plinius lib. XXI, cap. XXII, Anemonem Phænon dici tradit, forte à splendore. Sed apud eum potius legerem Phœnicium: quoniam inter notha Dioscoridis legitur Anemonem Phœnicium dici, scilicet à colore, Qualem quæ lento celant sub cortice grana Panica ferre solent.

Vt canit Ovidius lib. x Metamorphoson.

C A P. XXXV.

De Hyacintho.

Dioscorides Hyacinthum suum sic describit. Radicem & folia habet Bulbi, caulē dodrantalem,

lavem, minimo digito seniore, viridem; comam incurvātem florum colore ad purpuram accedente (sic me^{us} Dioscoridis interpretor) plenam, incurvam. Quæ profecto descriptio non videtur convenire cum Hyacinthis, qui nobis ab Herbariis junioribus pro Hyacinthis Dioscoridis obtruduntur: siquidem color omnibus inest cœruleus: nisi forte idem sint me^{us} Dioscoridis & cœruleum, quemadmodum multis visum fuit, neutiquam, ut credo, Dioscoridi. Hic enim in primo statim libro cap. I, de Iridis agens coloribus, purpureum à cœruleo distinxit. Verum cum variare coloribus hosce juniorum Hyacinthos videamus, nonnullique tradant purpureos quoque reperiri, laudanda potius erit eorum sententia, qui nobis pro vero Dioscoridis monstrant eam Hyacinthi speciem, quæ purpurascens etiam flores habet præter cœruleos: oppugnanda vero eorum, qui quasvis Plantas quibus bulbosa radix est, folia oblonga, caulis nudus floribus cœruleis plurimis onustus, figura comæ, pro Hyacintho Dioscoridis commonstrant. Cum autem bulbosis Plantis omnibus folia oblonga sint, & radice statim producta, caulis ut plurimum nudus; sequitur Juniorum Hyacinthum flore tantum à cæteris bulbaceis differre. Ideo nomen Hyacinthi quidam etiam indidere peregrinæ plantæ, cui pro bulbo tuber & caulis foliatus, Hyacinthum Indicum appellant. In flore autem respiciunt multitudinem florum cauli supremo instar comæ adhaerentem, & colorem in iis cœruleum, etsi florum forma variet. Quibusdam enim unico folio constantes concavosque adseribunt, oblongos, rotundos, in latus se expandentes, per oras incisos in sex lacinias, quæ reflectuntur extremis oris: quibusdam vero ex quinque aut sex foliolis congestos, quos stellatos vocant ubi sese explicant. Omnes hi diversi partibus, figura, colore. Lobelius quandam speciem Hyacinthum comosum album vocavit, cum tamen ejus flos nunquam cœruleus aut purpureus visus sit. Nam quem comosum cœruleum ostendit, alia est Hyacinthi species, cujus flos in aliis multis, quam colore à prædicta variat. Sed illi forte id nominis dedit à florum in caule congerie, quæ comam Hyacinthi quodammodo imitari videtur. Quare cum recentiores tot nobis depinxerint Hyacinthos, Dioscorides tantum unum descripserit, Theophrastus nullam de eo mentionem fecerit, nisi quod inter vernos flores connumerarit, in Sativumque & Sylvestrem distinxerit, opus fuit nostram sententiam de Hyacintho haud vobis supprimere.

C A P. XXXVI.

De Scabiosa.

Scabiosa proprium est in capitulo florem habere expansum, ex multis floribus parvis constantem, qui singuli caliculis membranaceis continentur. Caliculi hi decidentibus floribus optime conspiciuntur, auctique femine sustentantur hirsuto; quod postquam aucti sunt una cum caliculis decidit. Capitulum in vulgari Scabiosa, nonnullique aliis, ex floribus quinque foliolis constitutis congestum est. Degenerat à Scabiosis paululum ea Planta quam Clusius Scabiosam Pannonicam majorem

Hyacinthina Indicum.

Hyacinthum stellatum.

Scabiosa Pannonica Clusius.

Ranunculi radice Scrophularia.

Ranunculi primum genus Diosc.

Ranunculus nemorense albus.

Argemone. Papaver Rhæjam.

Dioscoridis error.

majorem sive septimam nominat. Huic non flores (ut scribit) extremis ramulis infident in caput compacti, quibus deciduis capitula illa subrotunda fiunt, ac veluti squamosa, continentque longiuscula femina, angulosa, colorem fuscum maturitate acquirentia. In Scabiosæ quoque, quam æstivalem vocat, summis ramis nascuntur squamosa capitula, subcæruleis flosculis plena, ut & aliis quibusdam generibus, de quibus dubitari potest an Scabiosæ censeari debeant.

C A P. XXXVII.

De lacea.

Video recentiores Herbarios laceas cum Scabiosis confudisse: ideo explicandum est quid intersit. Ex laceæ vulgaris flore, atque capite antequam florem edat, cognoscetis omnia lacearum genera. laceæ vulgari flos in unico capite unicus est multorum foliorum è puniceo purpurascens, non multi conglobati, ut in Scabiosa. Caput præterea laceæ ex multis squamulis compactum, exterius maxime, antequam florem edat; quod nequitiam in Scabiosa contingit. Quare cuncta ea Herbarum genera, quibus capitulum exiguis laminulis est compactum laceæ nigræ modo, & unicus flos in vertice capituli, laceæ sunt. Excipio ea genera quæ aliqua in parte spinosa sunt, aut in ipso capitulo, veluti Carduus stellatus, quem Calcitrapam vocant. Centaurium majus, Cyanus, Serratula, & quam Stœben Salamanticam Clusius vocavit laceæ sunt: tum etiam quam Dalechampsius Scabiosam montanam nominavit. Hujus Authoris lacea montana, lacea non est; sed alterius aut sui generis Planta. Cyani flores quinque foliis, aut pluribus, per ambitum divisim laciniatisque constant. In nomine est Cyani color, inquit Plinius lib. XXI, cap. VIII, ut qui honorem nomenque dederit cœruleo: & sane colore à cæteris laceis distare videtur magis, quam alia florum differentia. Inter laceas Serratula ex foliis innoscitur. Nam huic serrata sunt folia, ut & Centaurio. Quare aut eam Centaurium minus: aut majus Centaurium Serratulam majorem jure appellare poterimus. Stœbe autem, quam Salamanticam Clusius nuncupavit, flores è caliculis, aut capitibus squamosis edit villosos, atque purpureos. Quid sit Stœbe veterum, adhuc me latet: Theophrastus fruticem facit. Omnibus laceis semen oblongum, molli lanugine oblitum.

C A P. XXXVIII.

De Hyperico.

Hyperici quatuor sunt genera, vulgare quod Perforata dicitur, quia folia multis foraminulis pertusa habet, quæ in sole obversis foliis facile conspiciuntur; Ascyron, Androsæmon, & Coris. Omnibus flos ex plurimis foliis constans, colore aureo, qui ubi digitis conteritur, succum sanguineum reddit, aut rubicundum. Fructus hirsutus, in acutum desinens, fulvi coloris, præterquam in Androsæmo, quod Sicilianam nunc vocant. Nam huic capitula rotunda, crassiora, quam Hyperici, lævia & rubentia, quæ siccata ingrescunt. Omnibus insunt fructibus femina mi-

nuta, nigra, quæ trita odorem reddunt resinaceum.

C A P. XXXIX.

De Malva.

Malvarum tria genera: Malva communiter propriè dicta, quæ Græcis *μαλὰχη*; Althæa, quæ & Ibisus vocatur, & quam ex sylvestri Malvarum genere statuunt Dioscorides & Theophrastus; & Alcea, quam Itali Malvam sylvestrem, Hispani Malvam Hungaricam dixerunt. Malvæ vulgari flos ut plurimum purpureus, aut puniceus, aut pallidus, aut albus, ex quinque constans foliis Rosæ sylvestris modo; fructus cui femina includuntur orbicularis, depressusque caesi in formam, hinc caseolos ejus fructus appellant Belgæ. Tales flores fructulique Alcea atque Althæa habent, unde ipsi Malvæ etiam nomen: cæterum foliis fere inter se differunt. In Althæa molliora sunt, quam in Malva & Alcea, nec laciniata, in Alcea admodum fissâ atque alte incisâ Verbenacæ similia: Malvæ quædam divisa, quædam non: sed cuncta fere rotunda.

C A P. XL.

De Papavere.

Papaver magis ex fructu, quam ex flore cognoscitur. A fructus discrimine duo genera: unum rotundo, quem caput vocant; alterum longo & angusto, quem cornu, seu corniculum; quia instar cornu nonnihil incurvatur. Inde huic generi nomen Papaveris cornuti, seu corniculati. Proprium horum fructibus omnibus asteriscum, seu stellam in vertice, aut apice habere, quæ in Corniculati Papaveris fructu obscurior est, quam in Capitato. In omnibus semen parvum minutumque. Capitati autem flos antequam dehiscat rotundo capite continetur: foliatus est quatuor, aut pluribus foliis, modo albis, modo dilute rubentibus, aliquando purpureis, aut valde rubris. Papaveris capitati unum genus depingunt nobis Pena & Lobelius, unico folio constantem florem gerens, ut Malva quædam hortensis. Corniculati Papaveris flos quatuor constat foliis, luteis aut rubris. Ficus Infernalis, quæ nonnullis Papaver spinosum dicitur, à spinis quibus caulis, folia, & fructus horrent, ad neutrum prædictorum generum exacte referri potest. Est enim ipsi fructus oblongus, pentagonus, non tamen angustus & inflexus, ut cornu speciem præ se ferat, nec ita rotundus ut caput æmuletur. sed quia in vertice illi asteriscus more aliorum Papaverum, recte Papaveris spinosi nomen ei inditum. Flos senis rubris constat foliis.

C A P. XLI.

De Geranio.

Geranium Græci, & hos secuti Latini, dicunt omnem illam Herbam, cujus fructus capitulus gruum una cum rostellis similes sunt. Vnde ei appellatio. *Γέρανιον* namque Græci vocant gruem, avem nempe longo rostro. Dioscorides duorum tantum generum meminit. Recentiores Herbarii plurima

Carduus stellatus.
Calcitrapa.
Centaurium majus.
Cyanus.
Serratula.
Stœbe.
Salamantica.

Ficus infernalis.
Papaver spinosum.

Androsæmon.

plurima describere, quæ variis partibus differunt inter se; sed folio præcipue.

C A P. XLII.

De Lithospermo.

Lithospermum à lapidei feminis duritie nomen habet; dicitur à Latinis hodie Milium solis. Semina omnium generum candore rotunditateque Margaritas referunt, suntque durissima.

C A P. XLIII.

De Thlaspi.

Thlaspius quoque genera fructus forma monstrat. Hic planus est, compressusque ac foliaceus, latus, per medium quodammodo divisus, & quasi diffractus; indeque Thlaspi dicitur. *ἑλάνθω* enim contundere, & infringere significat. Variat hic fructus in diversis speciebus. Quibusdam namque unicus est, sed linea quadam & interstitio divisus, ut utroque latere semen contineat: & hic, vel suprema parte, qua petiolo adhæret, atque opposita ejusdem extrema rotundus fere, ut in multis contingit: vel extrema parte depressus triangulum efficiens, aut cordis figuram, ut in Bursa Pastoria. Nonnullis bini fructus instar clypei rotundissimi, in quibus singulis unicum semen, tam arcu ab utroque latere petiolo adherentes, ut unus quasi videantur. Ideo Herbarii Thlaspi fecerunt cognomento Clypeatum.

C A P. XLIV.

De Antirrhino.

Antirrhinum sive Cynocephalis Apoleji simile narius vituli semen, teste Dioscoride lib. iv, cap. cxxxiv, profert. Verum quoniam aliquot Herbaria femina obtinent, quæ prout sunt caliculis aut fructui inclusa, faciem vituli quodammodo expriment; idcirco recentiores rei Herbarie scriptores aliquot Antirrhini species notarunt, fereque omnes folio Lini, quale eis Plinius videtur attribuisse.

C A P. XLV.

De Cucumere.

Cucumberum quatuor genera; Cucurbita, Pepo, Cucumis simpliciter dictus, & Anguria ignota antiquis, quam Romæ Mauritana voce Baccam vocant. Qua forma omnes hi fructus differant difficile est judicare, etiam si quotidie iis vescamur. Imponit nobis naturæ eorum tanta varietas, qua luxuriant. Idcirco & Græcos nobis sapientiores nomina omnium, propter summam formæ cognitionem confusionemque, confudisse video. Euthydemus, ut est apud Athenæum, lib. i Deipnosoph. Cucurbitam Indicam Cucumerem appellavit. Menodorus duplicem proposuit Cucurbitam; unam Indicam, quæ *σικύα*, id est, *Cucumis* dicitur; alteram quæ *καλοκυσία*, id est, *Cucurbita*. In Helleponto longas vocant *σικύας*, id est, *Cucumeres*; rotundas, *Cucurbitas*. Cucumerem tortum dixit Virgilius lib. iv Georgicorum, & alibi in ventrem excrescere, quod competit Cucu-

bitis Herbariorum recentium. Instrumentum illud, quo Chirurghi corpori affixo, cum scarificatu sanguinem exsugunt, cucurbitulam Latini voce diminutiva appellant; Græci tamen *σικύα*, qua Cucumerem indicare solent. Pepones quoque è genere Cucumerum esse ex Plinii verbis lib. xix discere licet, qui ait Cucumeres cum magnitudine excessere, Pepones vocari. A Græcis id, à quibus pleraque accepisse videtur. Hi enim non simpliciter Peponem, sed *σικυοπέπων*, id est, *Cucumerpeponem*. Fructus omnium cartilagineo operitur tegmine, colore, asperitate, levore, tuberculis, aliisque accidentibus multum differens. Post tegumentum sequitur caro aut mollior, aut durior, colore flavo scilicet, albo, pallido, aut rubro, sapore vario: mox femina cartilagine obvoluta, quæ in pluribus in fungosa quadam mollique substantia, aut facile prædicta carne separeabili continentur; in quibusdam etiam tam arcu carni innata sunt, ut non nisi cultello evelli possint, ut in Anguria. Omnium herba aut scandit, ubi vicina adminicula nacta fuerit, aut serpit humi, capreolis suis obvia quæque amplexans, & numerosis propaginis. Folia omnium rotunda, sæpe aspera, interdum sinuata, Flos in postremo fructus.

C A P. XLVI.

De Legumine.

Legumen & Legumentum dicitur à legendo; teste Varrone: quoniam id non secatur, sed legitur vellendo. Græci *καρῆρον* vocant; Theophrastus *χρῆδον*. Leguminum non pauca sunt genera, Pisum nempe, Faba, Cicer, Lupinus, Orobus, Lathyrus, Phaeolus, Lens, Vicia, & Orobanche: quorum omnium discrimina non sufficit hic in fructu annotare, ut inde cuiusque generis differentia statim innotescat: sed & in foliis, ramis, cauleque, & aliis partibus hæc quoque observanda veniunt. Fructus omnium, siliqua: longa & teres, ut Piso, Fabæque; compressa, ut Lupino, Lathyro, Phaeolo; angusta, ut Vicia; lata, ut Lenti; rotunda fere, ut Ciceri. Animadvertere tamen oportet esse nonnullas Leguminum species, quarum siliquæ à communioribus eorum generibus variant. Flos omnium Papilionaceus.

C A P. XLVII.

Arborum divisio. De Quercu seu Glandiferis:

Quid Nux, Malum, Acinus, Bacca.

Faciunt in Arboribus fructuum differentia summa quædam genera, ut Glandifera, Nucifera, Conifera, Pomifera, Baccifera. De quarum Arborum notis breviter jam differemus, sumpto principio à Glandiferis. Has Plinius una voce negat posse comprehendere in Latino sermone. Recentiores Quercus omnes vocant, Græcos imitati, qui *δρύς*: quanquam prisca illi Græci hoc nomine cunctas alias Arbores fructiferas intelligebant, ut etiam quoscunque fructus edules in ramorum fastigiis hærentes. Dicuntur etiam *βάλανες*, quia Glandem ferunt, quam Græci *βάλανος* indigunt. Eorum genera sunt, Quercus simpliciter dicta; Robur, Cerrus, Suber, Ilex: ad quæ neque Fagus, neque Castanea proprie spectant. Non enim

R

eorum

Bursa Pastoria.

Thlaspi Clypeatum.

σικυοπέπων.

Quercus.

Robur.
Cerrus.
Suber.
Ilex.
Fagus.
Castanea.

eorum fructus glans appellari proprie potest, quod crustaceo undique valculo tegatur aut hispido, ut Fagi; aut echinato, ut Castaneæ, quod tria aut quatuor semina continet. glans autem cortice constat crustoso unicum tantum semen continente: cujus pars posterior quæ Arbori adhæret proxime, calice cooperitur, parte superiore nuda. Multæ hujus fructus differentiæ in magnitudine, figura, colore, sapore medullæ, calicis asperitate, lævitate, crassitie, densitate, amplitudine, aliisque accidentibus, quæ non satis est ad proposita genera distinguenda agnovisse, nisi aliarum parvium, sed præcipue foliorum, nota sint discrimina. Alia solum monstrant sinuatum, ut Robur, Quercus, sed maxime omnium Cerrus; alia non sinuatum, præsertim si adultæ sint Arbores (nam juvenulæ illæ interdum sinuata producunt folia, ut Suber & Ilex) Ilicis unum genus spinosum, alterum sine spinis. Illud Aquifolium vocant, in cujus peculiari specie granum tinctorium nascitur: hoc simpliciter Ilicem. Negat Plinius glandes inter Poma numerari posse, quorum genera sunt Nux, Malum, Bacca, Acini. Nonnulli veterum Geoponicorum Pomum cum Malo haud idem esse existimant; sed Pomi nomen Nuces atque Mala concludere. Nucleum namque dicunt omne Pomum, quod foris duro tegitur cortice, intus vero continet, quod est esui; id nucleus vocatur quasi Nuci inclusum. Malum vero id esse putant Pomi genus, quod foris habet esui aptum, intus vero durum: ab his Acinos, & Baccas parvitate differre; Baccas appellari qui sparsim Arboribus Fruticibusque atque etiam Herbis adnascuntur rotundiores fructus: Acinos vero racematim dependentes baccas. Sed quia hæc præcepta non sunt perpetua; (Malum namque Punicum exterius non est edendo, verum interius ejus acini) multaque in nostris agris quotidie inveniuntur, quæ neutiquam ab antiquis cognita & observata fuere; multa quoque ex peregrinis advecta terris has leges destruant: idcirco exactiori opus est horum fructuum divisione, quæ etiam novos complectatur. Non enim tam pertinaciter veterum nominibus addicti esse debemus, ut studiosos ab utiliori rerum materia distrahamus, ad inutiles de nominibus contentiones. Ego facilioris doctrinæ gratia, Pomi vocabulo omnes fructus rotundiores comprehendo tum majores, tum minores. Horum alii durum quid atque ossilem habent, alii eo carent. Qui autem habent, aut id habent exterius tanquam pro cortice, & tegumento, quo semina, & nuclei conteguntur & esui apti, & non apti, ut Nuces Pineæ, quas Poma Cybeles Martialis xlii Epigramm. appellavit; aut habent interius; & id vel carne molli atque eduli exterius vestitum, ut Pruna; vel dura circumdatum, & esui inepta, ut Nuces Iuglandes. Quicunque ossilem id unicum continent, aut ossile aut lignoso cortice teguntur, Nuces à nobis appellantur. Quatenus enim ipsi os in medio est nucleum amplectens, Nuces sunt. Qui vero ossile proferunt carent, Mala & Poma dicimus generis scilicet privo nomine. Horum quædam tegumento sunt haud esui apto; ut Malum Punicum: quædam tota mandi possunt, ut Mala simpliciter dicta, Pira, Ficus. Baccas inter Poma Plinius numeravit, quæ ab acinis distant sicuti diximus. Inter has

multæ quæ exterius Nuces sunt, ut Avellana; aliæ interius, ut Oliva, Cerasa; aliæ nullo modo. Nam ossile loco semina dura seu *γίγας* continent, ut Juniperi, cum cæteræ partes sint molles caro, & ut plurimum edendo. Acinos grana etiam vocant, ut in Malo punice; propterea Granatum dicunt.

C A P. XLVIII.

De Nuciferis, & Coniferis.

Necum autem proprie dictarum cortex, alius ^{Nuces.} Nex compactili lignosarum squamarum strue componitur: hæ Nuces Coni vocantur, & Coni ^{Coni.} naria à recentioribus Græcis: alius bivalvis, & in basi calice donatus; ut Avellana; quæ glans esset ni duro & ossile cortice concluderetur. Cæterum Conum vocare priores fructus veteres voluere, quod coni figuram æmulentur, hoc est, à lata & circulari basi in mucronem desinunt. Talem fructum ferentes Arbores Coniferæ appellantur, ut Pinus, Picea, Abies, Larix. Mirum & Cedrum inter eas recenseri, cum nequaquam præscriptam figuræ legem observet. Nam Cedri fructui figura ovalis est. Sed quia & hi fructus squamis duris exterius compingi cernebantur more cæterorum Conorum, merito inter Conos relati sunt. Omnibus his longa, & angustissima sunt folia; quorum quædam in extremitate pungentia sunt, ut Pini; quædam obtusa, ut aliarum: quædam teretia, ut Cypressi; quædam plana, ut Abietis. Quæ vero Nuces intra tegumentum continent, aliis tenuè id tegumentum est, & sine carne; ut Pistachiis: aliis carnosum, quod aut durum est, ut Iuglandi & Amygdalæ; aut molle suaveque gustui, ut quæ Mali nomine apud Scriptores veniunt: quorum quædam, & fissuram per medium secundum longitudinem habent exterius, Pruna vocantur. Prunorum tria genera: Mala Persica & Armeniaca, & Pruna simpliciter dicta. Scholiastes Nicandri in Alexipharmacis, os in Nuce Persica *καρπός* appellari scribit.

C A P. XLIX.

De Pomiferis, & Bacciferis.

Pomorum scilicet ossile carentium sunt hæc fere genera; Ficus, Mala, Pira, Citrifi, Cydonia, Punica; quæ omnia quantum inter se differant, quia unicuique satis sunt cognita, diligentius examinem hic haud requirunt. Baccarum autem differentia fere sunt eadem quæ Pomorum; præterquam quod parvæ Nuces, quæ exterius ossile tegumento constant, nequaquam dicuntur Baccæ, sed Nuces semper: quæ vero os intus continent Baccæ appellari possunt, ut Cerasa. Multa sunt Bacciferarum Arborum Fruticumque genera, ut Juniperus, Sabina, Zizyphus, Myrtus, Oliva, Laurus, Cerasus, & alia. Singulorum horum generum propriores notæ ex aliis quoque, quam ex fructu, partibus sunt petendæ. Illud non oscitanter supprimendum, domesticas misceque Arbores ex fructu; agrestes ex fructu & ex aliis partibus cognosci.

C A P. L.

De Acanaceis, & Carduis.

C A P. L I.

De Sempervivo.

DE spinosis aculeatisve Herbis Cremulisque sequitur ut agamus. Ajunt Iuniores Acanacea vocare Theophrastum, quorum conceptus, & id cui flos infidet, aut etiam fructus, spina vel spinaceum quippiam est; sive eorundem folia, & caulis spinosa sint, sive spinis careant. Id an verum sit videamus. Theophrastus lib. vi Histor. Acanum inter φυλάκων τε commemorat, id est, ea quæ folio sunt aculeato, aut spinoso. Ergo Acanacea folium necessario aculeatum habere debent. Cinara, & Acanthus vulgaris (quem Brancam urfinam vocant, quia hujus folia anteriores urforum pedes referunt) & alia quædam quæ non habent folia spinosa, nequaquam inter Acanacea referenda, sed Acanthode, id est, spinosa. Ideo sic apud Theophrastum legendum moneo, ut etiam legisse videtur doctissimus interpres Theodorus Gaza: τὸ φυλάκων τὸ παλαιὸν ἦν αἰς εἰπεῖν ἀκανθῶδες (non ἀκανθῶδες ut in vulgatis legitur codicibus) πρὸς τὸ λέγειν ἡ ἀκανθῶδες, ὅτι τὸ κίημα, ἡ ἐν αὐτῷ ἔστι καρπὸς, ἀκανθῶς ἡ ἀκανθῶδες (non ἀκανθῶς ἡ ἀκανθῶδες) πρὸς τὸ εἶναι. quæ fideliter sic transtulit Theodorus: Illorum vero quæ folia constant aculeato genus, ut sic loquar, magna ex parte Acanaceum est: Acanaceum, inquam, quoniam conceptus, & id cui flos inhaeret, aut etiam fructus, spina vel spinaceum quidquam sit. Hoc in loco dat Philosophus rationem, cur ea quæ spinoso sunt folio Acanacea sint magna ex parte; scilicet, quia aut id in quo fructus aut flos consistit spinosum est; aut quia etiam fructus spinosus, præsupponens Acanum præter spinosa folia habere, aut fructum, aut caput in quo flos est, spinosa. Distant ab Acanaceis Cardui. Horum enim folia, & aculeata sunt, & non aculeata, ut Cinara vulgaris, & Cardui stellati, & Cardui foliitiales. Conveniunt in eo, quod aut fructus, aut id cui flos infidet sine aculeis nunquam sit. Cinara vulgaris species, quæ nullos aculeos habet, Carduus dicitur à similitudine quam gerit cum aliis Carduis aculeatis. Aculeo namque tantummodo distat. Cardui cuncta genera caput gerunt concavum, quod ex squamis exterius apparet quasi compositum, spinosum, cujus in summitate flos ex plurimis foliolis longis, & angustis congestus oritur, qui postea in pappos evolat. Qui Labrum veneris Carduum fullonium nominarunt, Gallorum & Hetruscorum vulgaria nomina secuti sunt. Non autem est Carduus, cui caput echinatum & aculeis veluti respinatum, è cuius ambitu flos femineque. Carduorum genera sunt, Scolymus seu Cactos quem Cinaram aculeatam vocant, etiamque Carduum simpliciter, Acanthium, Leucographis, Leucacantha, Onopryx, Carduus Aræophyllos Dalechampi, Onopordum, Polyacantha, multaque alia spinosa, quorum nomina, quoniam cum obscuris delineationibus extant apud veteres, recentiores Herbarii diversis Carduis, aliisque spinosis Herbis, haud secure accommodaverunt.

Svat & quæ à perenni vita nomen acceperunt; ut Sempervivum quod Græcis *Αἰχμαῖος*. Duplex differentia in folio. Aliud enim plano est, aliud oblongo ac instar vermiculi teretis: unde Vermiculare Sempervivum hoc appellantur. Vtrisque alia infunt differentia tum in foliis, tum in floribus ac fructibus, quæ peculiare species inter hæc duo genera constituunt; plurimæ fragiles, omnesque succo plenæ.

C A P. L I I.

De Heliotropio.

HELIOTROPII nomen multis Plantis adscribere possumus, quarum aut folium, aut flos cum sole circumagitur. Sed proprie Heliotropium nominari debet illa Herba, quæ aliquando obvia fit iis in via, qua Patavio ad Montes Euganeos proficiscuntur. Folis est Ocymi, sed hirsutis candidisque, ramulis à radice ternis, quaternisve cum multis alis, cacuminibus plenis flore albo incurvo, veluti scorpionis cauda.

C A P. L I I I.

De Aconito.

ACONITI venenorum omnium celerissimi duo summa genera: unum Pardalianches, sic dictum, quia pardalos pantherasque illico occidat; alterum Lycoctonum & Cynoctonum, quod Lupos canelque, & alia quadrupedia necet. Hujus postremi tria alia genera: unum, quo utuntur venatores, & duo reliqua, quibus utuntur medici. Pardalianchen tradit Dioscorides lib. iv, cap. xxxiv, folia tria aut quatuor Cyclamino aut Cucumeri similia, sed minora habere, subasperaque, caulem dodrantalem, radicem scorpionis caudæ similem. Theophrastus scorpionis, non scorpionis caudæ similem facit; neuter autem de flore, aut fructu quidquam, quasi non adessent. Recentiores multas Lycoctoni species nobis proponunt, radice, foliis, floribusque paululum variantes (Doronica vocant), quorum radix caudæ scorpionis faciem, aut id generis crustatorum animalium, quod Græci cammarum, nos squillam, & gambarium. Hanc scio à quodam Tyrolensi venatore usurpatam ad colicos dolores, quibus frequentissime cruciatur, sed nonnisi inventam in rupicaprae ventriculo. Ejus enim, ajebat, magnas partes deglutire hoc animal, nec radicem in parvas partes dentibus molere, quod ruminantium hoc fit genus; itaque facile in ventre reperiri quasi semicodam. Quam vero Thoram Valdenses Alpium incolæ dicunt, nequaquam est Aconitum Pardalianches. Neque enim radix *σκαρπαιδης*. Aconiti Lycoctoni duo prima genera non descripsit Dioscorides, sed tertium quod Ponticum vocat, nisi suspectus sit locus. Folia Platani dat Pontico, magis incisa, longiora, nigriora; caulem Filicis, cubiti altitudine; pediculum glabrum; semen in filiquis; radices cirrorum squillarum similes, nigras. In quibusdam codicibus hæc descriptio invenitur,

R 2

& nulla

Pardalianches.

Doronicum.

Thora.

Acanus.

Theophrastus emendatus.

Carduus fullonium non est Carduus.

& nulla sit mentio trium generum Aconiti commemoratorum, sed Aconito Lycoctono simpliciter adscribitur. Hæc causa cur recentiores Herbarii in vero inveniendō Lycoctono negligentiores multas Herbas, quibus folia sunt Platani, sed altius incisa, aut rotundiuscula, plures divisa in partes, pro Aconitis Lycoctonis nobis obtrudant, quarum nulla radicem habet cammaro similem. Sic nomine interdum nos deterrent à multarum Herbarum salutaribus usibus, imponuntque exitium, in quibus nulla noxa, imo magnum humano generi auxilium in adversa valetudine. Aconiti Lycoctoni speciem autumant Napellum, sic appellatum à Napi figura, quam radix ejus refert. Nam folia aliarum Lycoctoni specierum habet, quæ sane valde perniciofa sunt. A doctissimo Cæsare Scaligero in Commentariis librorum Aristoteli attributorum de Plantis, satis probatum est non esse Aconitum.

Napellus.

C A P. L I V.

De Cistho.

Cisthus Frutex est. Ejus duo sunt summa genera. Ladaniferum, & quod non fert ladanum. Illud Cisthus Ledum, hoc simpliciter Cisthus vocatur. Folia utrique oblonga, aut rotunda; flos Rosæ sylvestris ex quinque foliolis constans, varii coloris, cum suis staminibus in medio; fructus vero trigonus aut pentagonus, in quo semen minutum Papaveris aut Hyoscyami. Sed de cæteris generibus quæ plunibus, quam una, aut altera nota cognoscuntur authores consulendi, atque ii qui in hac scientia versati satis sunt. Nam omnia examinare atque describere hic non est animus, sed his tantum vobis additum facere ad magnam Stirpium multitudinem brevi temporis spacio cognoscendam.

C A P. L V.

Plantas imperfectas post perfectas esse discendas; & perfectarum primum florentes.

His præstitatis cum aliquo in re Herbaria mediocriter versato, montes, valles, pascua, horti, aliaque loca, in quibus Plantarum variarum copia suppetit, adeunda. Nec vero protinus Planta quæque obvia eruenda est aut decerpenda; sed ea quæ flores semenque fert, prius intuenda, diligenterque ejus singulæ partium formæ contemplandæ quoad fieri potest. Perfectæ enim Plantæ prius quam imperfectæ, quarum minor multo est numerus, discendæ sunt. Dum autem florent Plantæ perfectæ, sunt pulcherrimæ, & in sua perfectione: ideoque tum innotescunt, magisque earum forma à cæteris distinguitur: tum sub quo genere quæque quam videris recenseri possit perspicitur. Maxima enim (ut è supradictis colligere potestis) genera fructu, & florè nobis designantur. Præterea sæpe occurrit, ut quæpiam species peculiare quid in parte aliqua obtineat, quo vobis à plurimis aliis distinguatur, quodque facile in memoria reservetur. Omnium namque partium formas in memoria habere non possumus. Memoria nimis labili & inconstanti à natura donati fu-

mus. A comite & hujus rei perito præceptore duo postulo, ut, quantum fieri potest, mediam speciem summuorum quorundam generum vobis ostendat, doceatque maxime ex qua parte cognoscatur. Appello autem speciem mediam, ex cujus similitudine genus quoddam constituitur, & sub cujus nomine multæ aliæ constituuntur similes. Verbi gratia: vulgare Gramen medium est inter cuncta Graminum genera, quæ à foliorum præcipue similitudine cum hoc Gramine, Graminis nomen adepta sunt. Hæc ratio est cur magnoam Plantarum partem, quæ una aut altera nota genus peculiare constituunt, ea qua licuit brevitate profecti simus. Vbi autem Plantas inspexeritis, interrogandus præceptor de nomine; qui quod magis est in quotidiano sermone, aut generis ejus cum specifica differentia indicabit, tum quæ nota in eo genere sit præcipua. Haud etiam erit abs re alias ejusdem generis species inquirere si ad manus sunt, quemadmodum in publicis hortis esse solent. Sic generis idea firmius menti inhaerebit. Alterum etiam à præceptore præstandum est, ut eum quem non magno rem Herbariam addiscendi studio teneri vider, in iis cognoscendis tantum detineat, quarum communis est usus ad vitam conservandam morbosque depellendos: ne quidquid ab eo susceptum erat laboris, sine fructu sit: ei vero qui ardentius huic studio incumbere videtur, & has, & alias quarum nondum cognitus est usus, commontret. Quoniam autem omnibus Stirpibus sua sunt tempora, in quibus maxima earum pars formam mutare consueverunt; aliaque ipsis sit dum primum è terra erumpunt, alia dum augentur, alia dum vigent, danda est diligenter opera, ut quas florentes vigentesque inspexistis, etiam cum augentur, primumque è terra erumpunt contemplerimini. Cum his ubi perfectarum magnam partem noveritis per summa quædam genera, ad imperfectas, quarum pauca sunt genera, discendas vos accingite.

Nomina Plantarum.

C A P. L V I.

Frequentem inspectionem ad formam specierum memoria tradendam esse necessariam.

Cæterum scire oportet tot specierum formas facilius sensibus externis percipi atque apprehendi, quam memoria conservari. Sedula igitur frequentique ad hoc (ut ad aliarum rerum sensibilem cognitionem) opus est inspectione. Sæpe etiam contingit, ut in Plantis partium multiplicationem omnes particulæ uno intuitu non possint à nobis observari ad totius speciei formam apprehendendam, nisi repetita inspectio eas nobis monstraverit, quæ aliarum, quæ priori intuitu percipiuntur, memoriam renovet, confirmetque. In hunc itaque finem invensida sæpius adeundaque loca, in quibus nascuntur Plantæ, quas semel aut bis vidistis. Quoniam autem contingit ut veris, æstatis, autumnique tempore propter multa incommoda; hyemis vero, quia omnes Stirpes fere periere, id præstare non possitis, ideo Hortos hyemales, (sic voco libros, in quibus Plantæ siccaæ agglutinatae chartis conservantur) inspicere debetis. Adeundi quin etiam eorum libri, qui nobis hæc Stirpes breviter, ac diligenter descripserunt, depinxerunt.

pinxeruntque, quos postea recensabo ubi de rei Herbariæ authoribus egero.

C A P. LVII.

Plantas depingendi, delineandique ratio.

Quod si vero Auctores procul sint, modum quo Plantarum effigiem chartis imprimatis, aut in charta depingatis, etiam si artem pingendi non noveritis, vobis communicabo. Affertur politum, & glabrum lævemque atramento Typographorum leviter, & superficietenus illinit, pilulis manubriatis, quas mazzas vocant Typographi. Affertur huic Plantam, aut viridem, aut siccam, quam vultis integram, si parva sit; aut ramum ejusdem, si tota major sit quam charta cui imprimenda est capere possit, superferre: mox chartam superponite, ac desuper satis fortiter fricate, donec atramento Planta imbuta sit. Ablata ab affere, chartæ cui effigies imprimenda, imponatur, aliaque superimposita manibus linteisque fricetur, donec videatur satis ad effigiem chartæ imprimendam.

C A P. LVIII.

Hortos Hyemales conficiendi ratio.

Verum laudandus magis is est labor, qui ad Hortos Hyemales conficiendos suscipitur. Minor enim atque utilior. Quippe plura, quam in picturis monstrantur quæ ad formam spectant, nempe color, aliaque nonnulla, quæ tam exacte non possunt priori modo depingi. Præterea prior labor in Plantis grandibus, asperis, & spinosis ac valde duris sæpe frustra fit. Modus autem chartis Stirpes agglutinandi talis est. Planta quam vultis, aut ejus ramus viridis cum flore, foliis, atque semine, si haberi potest, perfectæque sit Planta, inter chartæ candidæ duo folia ponantur. Nam ignobilior charta, & quæ perfluit, quanquam ab omnibus hæcenus recipitur ad hunc usum, nequaquam apta censetur, quod experientia à me probatum est, inter hanc positas Stirpes difficulter ficcari, sæpeque situ & squallore obfitas marcescere. Ponenda autem ea quæ dixi folia in crasso & plurium paginarum libro, qui respondeat magnitudini foliorum imponendorum. Libro huic superponatur pondus, quo tanquam torculari paulatim Planta comprimatur. Cavendum autem

est ab ingenti pondere, prius quam Plantæ magna aquosioris humoris pars consumpta sit. Ideo paulatim aggravandum pondus; primumque levius sit, donec flaccescant Plantæ (quod æstatis tempore trium aut quatuor horarum spatio evenire solet) & postea gravius; tandem gravissimum ubi parum humoris adhuc in se habuerint, ac jam fere siccæ fuerint. Illud etiam curæ esse debet, ut singulis diebus eas inspiciatis ac revolvatis, & plicas, si quas videritis explicetis, floresque & folia ita accommodetis, ut ab utroque latere aspici possint, chartamque mutetis donec prorsus sicca evaserit. Sicca erit loco sicco conservanda inter chartam, donec plurima sic exsiccata sint, operaque pretium fuerit agglutinandi laborem suscipere. Tum sic agitate. Penicilla variae magnitudinis (Plantæ enim magnis foliis præditæ majora desiderant; parvis, minora) imbuetis hoc glutine infra scripto, quo oblinetis eam Plantæ faciem quæ chartæ adhaerere debet. Componitur hoc gluten ex taurocollæ pellucidæ, quam collam Tedscham, hoc est gluten Germanicum vulgus Patavii vocat, uncia una quæ in aceti acerrimi uncis sex maceratur per noctem; deinde igni apponitur lento, ut liquefiat. Amoto ab igne ubi paululum refrigit, adduntur aloes hepaticæ drachma semis, pulveris caryophyllorum scrupulus unus, misceturque. Plantam igitur agglutinandam chartæ ignobiliori superferre, ac glutine oblinite, deinde auferte, chartæque candidæ imponite, & alio superposito folio, sudario aut linteo fortiter fricate & æqualiter, ut undique chartæ adhæreat: tum ipsam inter duo folia, alio libro concludite superincumbente bono pondere, donec ficcetur gluten (quod post unam aut alteram sit horam) mox auferte. Sciendum autem & illud hic est, non cum omnibus Stirpibus sic agendum esse. Nam quædam sunt, quæ facile ficcari nequeunt, propter succi aquosi ubertatem, ut Sempervivi, Telephii, & aliorum quorundam genera. Etenim marcescunt, putrescunt, perduntque folia, aut ea alterius coloris, quam naturalis erat, valdeque corrugata servant. Has igitur virides agglutinare satius est; prius tamen inter duo folia strata in librum ponere, comprimereque leviter levi pondere, donec flaccescant, plicam, formamque sumpserint, ut recte agglutinari possint. Hoc modo & alias quæque virides in montibus agglutinavi, folique, aut alio loco calido expoli, ut sic exsiccarentur, feliciterque successit hic labor.

Agglutinandi ratio.

Gluten ad hoc.

F I N I S P R I M I L I B R I

A D R I A N I S P I G E L I I
B R V X E L L E N S I S
I S A G O G E S
I N R E M H E R B A R I A M
L I B E R S E C V N D V S :

De usu, & facultatibus Plantarum.

C A P. I.

Vsus Herbarum multiplex. Facultas in humano corpore duplex. Quid alimentum. Quid medicamentum.



Facultas Stirpium, cujus gratia earum forma præcipue inquiritur, varia est atque multiplex, tum in animatis, tum in animæ carentibus. Hinc evenit, quod variae artes, imo fere omnes, earum vires ad suos usus quotidie experiantur.

Præcipue tamen atque maxime in nostri gratiam à natura comparatæ videntur, ut cuncta alia, quæ sublunari hoc globo comprehenduntur, stellæque etiam ipsæ, quanquam à nobis sint remotissimæ. Ipse namque Philosophorum magister lib. 11 Physic. hominem quodammodo omnium quæ existunt, finem statuit, atque omnia propter eum condita. Humanum autem corpus Plantæ nutrire debent, ut vitam sustineant; aut alterare, ut morbos depellant. Inde alimentum, hinc medicamentum. Alimentum enim dicere convenit, quod assimilatum & appositum nutriti substantiam auget & conservat: medicamentum vero, quidquid corpus nostrum sua qualitate alterat. Ex quibus patet duas facultates pro humano corpore in Stirpibus reperiri, scilicet nutriendi & alterandi. Eæ insunt toti Stirpi, vel parti ejus; aut simplices, aut mixtæ. Faciunt autem simplices ut Planta simpliciter alimentum dicatur, vel medicamentum. Mixtæ vero alimentum medicamentosum constituunt; tale est Lactuca, Portulaca, quæ refrigerant & nutriunt; vinum, quod calefacit & nutrit. Vtræque sane multum excessu defectuque differunt. Quædam enim plus nutriunt, quam alterant, ut Triticum, quæ proprie alimenta medicamentosa appellantur; quædam vero plus alterant, quam nutriunt, & ideo medicamenta alimentosa dici deberent. Nullum autem alimentum novimus, quod non aliquam vim alterandi aut per se, aut per relationem obtineat. Quæcunque temperata sunt, in homine eucrato nihil alterabunt; sed in eo, qui intemperie aliqua affectus est in toto corpore, aut aliqua ejus parte. Per se autem cunctæ Plantæ alterare debent, quod nulla reperitur, quæ omnibus elementorum qualitatibus æqualiter mixtis constet. Medicamentum autem

omne non prorsus alimento contrarium est: sed quoddam contrarium prorsus, quod venenum est, omnibus qualitatibus totaque ut vocant, substantia, & occulta proprietate nobis infestum: aliquod tantum diversum à medicamento, id scilicet, quod manifesta alterat qualitate.

C A P. II.

Prima Plantarum Facultas quot & quæ, ac de earum gradibus.

Quippe medicamenta, vel manifesta alterant qualitate, vel occulta quam vocant totam substantiam. Qualitas manifesta triplex est, prima, secunda, & tertia. Prima rursus duplex; simplex una, altera vero composita. Unde duplex resultat prima facultas in medicamento, scilicet calefaciendi simpliciter (nulla alia comitante) aut refrigerandi, aut siccandi, aut humectandi: vel calefaciendi & siccandi, vel refrigerandi humectandique, vel calefaciendi & humectandi, vel refrigerandi & siccandi. Hæc facultas prima ut etiam secunda, de qua mox dicemus, intentione remissioneque rursus differunt. Idcirco quatuor classes seu ordines finxere præci, quibus exacte intentionem remissionemque facultatum distinguere. Quod enim parum, hoc est non eviderenter, sed aliqua demonstratione per rationem inventa calefacit, aut refrigerat, aut humectat, aut siccatur, id primo gradu calidum, frigidum, humidum, siccumve dicunt: quod vero mediocriter id præstat, tale esse dicunt in secundo gradu: quod autem valenter his qualitatibus agit, id intemperatum censent tertio gradu: quod denique valentissime, id quarti ordinis statuunt. Exempli gratia; calida in primo gradu sunt, Lini semen, Brassica, Amygdala dulcis, Althæa: in secundo, Artemisia, Caparis, Chamæpytis, Crocus, Melissophyllum: in tertio, Abrotonum, Cinnamonum, quod est Cassia lignea electa, Dictamnus, Calamentha, Caryophyllum; in quarto, quæ tam insigni caliditate sunt ut crustam urendo partibus inducant, escharotica vocantur; qualia sunt, Flammula, Euphorbium, Costus, Cœpa, Lepidium, quod Piperitum vocant. Refrigerant primo gradu Hordeum, Atriplex, Gramen, Rosa, Viola maritima. Secundo Acacia, Cucumis, Lens palustris, Rhus obsoniorum, Plantago: tertio Portulaca, Alter cum flore albo, Cicuta, & succus Citri Mali acidus: quarto quæ extinguunt calorem nativum, quorum nulla exempla succurrunt. Cicuta enim, opium, Hyoscyamus,

*Facultatum
Primarum ac
secundarum
gradus.*

Calida quæ.

Escharotica.

Frigida quæ.

*Alimentum,
Medicamentum.*

mus, & si quæ sunt alia quæ stupefaciendi vi pol-
lent, nequaquam manifesta qualitate stupefaciunt,
sed occulta, uti alibi comprobabimus. Hume-
cant in prima classe Buglossum, Glycyrrhiza,
Malva, Saccharom, Helixine: in secunda Atri-
plex, Cucumis, Viola maritima: tertia Lactuca &
Cucumerum succi. Humidum autem & ficcum
in quarto nullum censetur, quod fiat passibiles
qualitates, quæ summa vi operari nequeunt sine
insigni calore aut frigore. Caterum siccant primo
ordine Brassica, Chamæmelum, Foeniculum: se-
cundo Balauſtium, Bursa pastoria, Plantago: Ter-
tio Asarum, Absinthium, Calamentia, Ruta hor-
tensis, Aloë. Singulæ autem hæc classes in princi-
pium, medium, finemque dividuntur: Exempli
gratia, in principio primi gradus calidum dicitur,
quod temperato est maxime vicinum in activis
duabus qualitatibus, nempe calore & frigore, sed
calore tamen paululum superante: quod vero in
medio primi gradus calidum est, id simpliciter tale
dicitur: In fine autem calidum, quod vicinius est
principio secundi gradus.

C A P. III.

De secundis Facultatibus.

SECUNDÆ autem facultates sunt quæ ex primis
demanant; unde secundæ nuncupantur. Nam
prout varia est principum, hoc est primarum qua-
litarum inter se mistio, pro eo & variæ qualitates
secundæ suboriuntur, quæ sunt mollicies, duri-
ties; raritas, densitas; asperitas, lævitas; crassities,
tenuitas; tensio, laxitas. Ab his denominantur fa-
cultates secundæ, puta rarefaciendi, densandi,
aperiendi, attenuandi, attrahendi, discutiendi, repel-
lendi, adveniendi, extergendi, obfarcendi, & vis
emplastica. A primis autem sic oriuntur. Nam
moderatus calor in aërea seu mediocri materia
cum humiditate & siccitate copulatus, si non ex-
cedat secundum ordinem, dura emollit, fundit,
colliquat, hoc est frigoris vi concreta. Caliditas
autem vehemens cum siccitate insigni indurat
mollia, tensasque ab humore & flatibus partes re-
laxat. Exhaust enim omnem humorem, relicta
parte terrena, veluti sol, qui lutum indurat. Quod
si vero siccitati calor modicus in tenui substantia
conjungatur, crassam materiam attenuabit, inci-
det atque dissolvit, corporisque cutem rarefaciet,
porosque aptiores reddit; ut per eos com-
mode diffari vapores possint: quemadmodum è
contrario moderata frigiditas cum crassa terrena-
que substantia, tenues humores incrassat, indurat
ac densat cutem contipatque poros, nihil evapo-
rare sinit. Vbi vero frigidum quippiam est, quod
pariter tunc habet essentiam, attenuabit quidem,
sed minus valide quam calidum. Quodcun-
que autem inæqualem partium superficiem & ex-
asperatam, planam lævemque facit (ut Traga-
canthæ gummi, Glycyrrhizæ radix, nuclei Pinei,
semen Malvæ, & cætera quæ exasperatas fau-
ces, tracheamque arteriam leniunt) humidum
esse debet, ac in calido frigidoque moderatum
cum mediocri materia coherere. Exasperant, hoc
est partes summæ facie inæquales reddunt, quæ-
cunque insigni siccitate ac modico calore in ma-
teria mediocri, partium substantiam detergendo

nimum corradunt ac divellunt; ut Colocynthis;
Centaurium minus, Aristolochia; & si quæ sunt
alia valde amara fallasque. Siccitas insignis, si etiam
cum frigore conjungatur, exasperat partem, non
auferendo quippiam de substantia, sed conſtriti-
gendo, ut in aulteris, & acerbis, quæ fauces lin-
guamque valde exasperant. Sic etiam levigans,
Ἀλίσκος Græci vocant, lævem reddit partium su-
perficiem, tum quod corrasam substantiam æqua-
biliter restantur ac implet: tum etiam quod frigo-
ris ac siccitatis vi contractam eam & exasperatam
laxat, lubricat, & quasi distendit.

C A P. IV.

De Tertiis Facultatibus.

TERTIÆ vero medicamentorum facultates ori-
untur ex primis atque secundis vario modo
junctis. Tales sunt pus movendi; urinam ciendi;
menſes provocandi; lac & semen generandi, vel
minuendi, vel augendi, vel extinguendi, dolorem
sedandi; carnem generandi; glutinandi; cicatri-
cem inducendi, quibus adde quæ ad ornatum par-
tium videntur. Dicuntur autem tertiæ, quod non
modo ex primis secundisque oriuntur, sed pecu-
liares partes morboque respiciant. Quippe quæ
pus movent, ad abscessus pertinent, aut ad san-
guinem corruptum putridumque in aliquam par-
tem decumbentem, qui in pus verti debet. Hanc
facultatem Ἐμμενιολογία Græci dixerunt, ajuntque
vel à moderato blandoque calore, & ei qui nobis
insitus est, simili oriri, qui hunc corruptum humo-
rem, in substantiam minus naturæ moleſtam com-
mutat; vel à vi emplastica, quæ humiditate mo-
deratoque calore poros cutis obſtipando, spiritum
atque calorem parti insitum prohibet ne disſi-
petur disſeteturque: unde calor magis auctus, hujus-
modi humorem blandiorem reddit, atque con-
coquit; vel etiam à vi emolliendi cum moderato
calore, ut in Ladano, Bdellio & similibus. Quæ
urinam ciunt, diuretica vocant, attenuando cras-
sos humores atque incidendo, serofos ac tenuio-
res separant & ad renes deducunt. Ea si una in-
signiter incidunt, simulque abstergeant, arenulas
deturbant secumque ducent, calculosque dis-
solvunt; sin vero neque calefaciant, siccant tamen
valde, calculos in lapidis ac silicis duritiem con-
cretos comminunt; ut Limonum succus acidus,
radix Oxalidis, Bardanæ, Graminis. Non est hic
inutilis illa consideratio, utrum tam frigida diure-
tica, quam calida? Videntur non esse æque diure-
tica. Nam caloris est fundere, liquare, partesque
heterogeneas segregare, homogeneas congrega-
re: unde Galenus negat sanguinem absque calido
fundi & segregari. Nihil fecius multa contra re-
censentur urinam moventia frigida; ut quatuor
semina frigida majora, fructus Halicacabi, & alia.
Quare uto, ut responderi possit, vel recurren-
dum hic esse ad eas substantiæ diversas partes,
quas sæpe inculcavit Galenus, plurimumque medi-
camentorum exemplo declaravit: vel dicendum
frigida non quidem fundere sanguinem & serofos
humores separare à crassis, sed tantum attenuan-
do præparare, ut facilius per venas ad renes deveni-
ant, qui postea sua proprietate tenues humores
allicere solent. Menſes autem movent cuncta, quæ

Tertia cur di-
cuntur.Pus movendi
facilitas oritur.Urinam mo-
ventia.Urinam tam
frigida diure-
tica quam ca-
lida.Menſes mo-
ventia.

quæ in secundo ac tertio recessu calefaciunt, incidunt, attenuant. Ea nisi ora venarum aperirent, atque parum siccarent, haud differrent à diureticis. Magnam enim habent cum iis affinitatem, quæ calida sunt, & urinam cient. Horum valentiora conceptus secundasque pellunt atque evocant. Lac gignere ajunt quæ sanguinem procreant copiosum & probum, cumque moderata incidendi facultate ad mammas deducunt. Idcirco calida esse statuunt ac tenuium partium: differre tamen ab iis, quæ menstrua ducunt, ac urinam cient, quod hæc multum calefaciant, illa vero moderate: utrisque multum siccantia sint adversa. Profecto si ex sanguine lac fiat, dubio procul sanguinem quæ producunt lac generabunt, & quæ bonum sanguinem, bonum etiam lac, quæ vero prævum hoc est biliosum, pituitosum aut melancholicum sanguinem, tale quoque lac gignent, nisi tanta inest pravitas (quæ multiplex esse potest) ut præpediat lactis generationem. Ergo non est necesse, ut semper probum sanguinem producant, quæ lac generant, neque cuncta esse calida oportet, cum plurima sint frigida, quæ sanguinem faciunt. Sunt & nonnullæ Herbæ tum calidæ, tum frigidæ, quæ parum sanguinis ac nutrimenti suppeditant, & tamen lactis copiam subministrant, ut Lactuca, Brassica, & Vincapervinca, quæ in aqua aut jure carnis cocta lac in mammis extindum revocat, etsi nil aut parum nutriat. Querimus ergo, quæ vi hæc medicamenta operentur? An partium tenuitate ac virtute incidendi? Nullo modo. Quæ enim incidendi vis Lactucæ & Brassicæ? Quare aliam inveniamus viam, quæ nos in hanc ducat cognitionem, necesse est: nulla vero occurrit melior quam ea, per quam sanguis ad mammas pervadit. Quod duplici modo contingere potest: impulsu scilicet, & attractione. Impulsu, ut in mensibus suppressis contingit. Dicebat enim Hippocrates Sect. v, aph. xxxix, *Si mulier, quæ gravida non est, neque peperit, lac habet, hinc menstrua defecerunt*. Propellitur enim à natura sanguis, qui per loca uteri expurgari consueverat, ad mammas. Attractione, ut cum peculiari vi mammae attrahunt sanguinem. Hæc vero attractrix mammarum vis interdum sola operatur, ut quando in juvene muliere non admodum sanguine plena lac fit copiosum; interdum cum impulsu, vel validiore, vel debili; ut quando in muliere sanguine abundante, cui menses fluunt, aut non fluunt, lac tamen gignitur. Simili certe modo & Herbarum vis operatur. Quædam Menses supprimunt, ac proinde aliorum protrudunt, ad mammas nempe si mulier peperit, & attractrix mammarum facultas non prorsus langueat: quædam vero excitant & augent attractricem atque concoctricem mammarum facultatem, quam ob causam copiosus sanguis ad mammas perfertur, & in lac convertitur; ut Lactuca, Brassica, & Vincapervinca, quæ proprietate substantiæ hæc præstare potius dixerim, quam manifesta qualitate. Neque enim omnes tertiæ facultates, ut hæcenus multi opinati sunt, ducere possimus ad primas atque secundas, tanquam ad causas. Quædam enim Herbæ attractricem renum testiumque facultatem augent, per quam urina copiosa prolucitur è venis, semenque copiosum generatur, quæ peculiari quadam, ut

sic dixerim id faciunt proprietate; unde eam ad quartas potius, quam ad tertiæ facultates reducendam censeo. Quare, ut concludamus; quæ lac gignunt, alia suppeditant materiam, hoc est, sanguinem; alia excitant attractricem concoctricemque facultatem mammarum, ut quæ recensimus; & hæc proprie lac gignentia dicuntur. Eadem lactis extinguendi, aut imminuendi est ratio. Evenit enim ut lac extinguatur (præter alias manifestas causas) etiam propter Plantarum virtutem aliquam, quæ attractricem mammarum facultatem confopit. Imminuitur lac à paucis sanguine: huc faciunt, quæ valide siccant, aut pauci sunt nutrimenti, item quæ menses provocant largius quam deberent. Nec alio etiam modo semen augetur, aut extinguitur. Copiosum enim semen ex copioso sanguine gignitur, adjuvante attractrice & concoctrice testium facultate. Semen enim auget, tum quæ boni fucci sunt, multumque nutriunt (sive calida sint mediocriter, sive parum frigida) & magis pingui substantia, quam quæ lac generant; tum quæ excitant aut augent testium facultates peculiari natura. Non est necesse; quod hæcenus magna pars Literatorum putarunt, flatulenta esse quæ semen auget, propterea quod seminis substantia sit spiritibus plena. Etenim gignuntur spiritus, qui insunt semini, non à flatibus, sed à sanguine repleto vitalibus naturalibusque spiritibus, qui per vasa, venas scilicet & arterias præparantes (*πρὸς φλοιδας* appellat Aristoteles, hoc est, *duos venales*) ad testes deducitur, & à testium innato calore atque spiritu elaboratur. Fortassis status conferent ad penis erectionem, præsertim si calorem secum habeant insignem. Expultricem testium & vasorum assitentium penisque facultatem proritant acria & falsa, semenque reddunt foecundius, quod superflus hujus humiditates exsiccent. Ideo salem pecoribus obijciunt pastores. Ad coitum namque promiora & magis etiam foecunda redduntur teste Plutarcho Quæst. nat. i. x, symp. iv, quæst. x, qui & canes falsamento eso celerius concipere ait: & naves, quibus sal vehitur, plures alere mures, quod frequentius coeant. Dolor cum variis de causis oriatur varia habet præsidia. Proprie tamen dolorem sedare dicuntur, quæ permanente causa dolorem levant, quæ idcirco paregorica & anodyna Græcis dicuntur. Talia sunt quæ in tenui essentia consistente blando calore nostrum foveant, eique quadam familiaritate adblandiuntur, causamque doloris imitigant vel molliendo, laxandoque ac digerendo; ut Althæa, Malva, oleumque maturum: vel discutiendo mediocri calore, ut Foenugracum. Sedant etiam dolorem, quæ sua frigiditate Narcotica stuporem inducunt, *ναρκωτικά*. Græci hæc vocant, quibus inesse proprietatem peculiarem præter frigiditatem exilimo. *Σαρκοπλάκω*, hoc est, carnem generandi facultatem habent, quæ mediocriter si neque mordacitate detergent ulcerum sordes, siccantque ichores atque serosos humores, qui carnis generationem præpedire solent. Hoc enim modo adjuvatur natura, ad quam vere spectat carnem producere. Carnem generantes Plantæ substantiam obtinent mediocrem, nec secundum siccitatis caliditatisque ordinem attingunt, alioqui carnem consumerent, suntque admodum paucae, quæ

*Semen augmen-
tia & exim-
guentia.*

*An quæ si
m-n auvent
debeant
tuleria esse.*

Anodyna.

Narcotica.

*Carnem gene-
rantia.*

quæ hac virtute donantur, Multæ vero recentia vulnera glutinare possunt: imo ausim credere ex tribus plantis unam semper hac vi pollere. Quippe cum montes Pisanos quæ Bononienses peragrare habitu rustico, ne agricolæ me cognoscerent, ac latrones deprædarentur, multa de Plantarum viribus colonos sedulo percunctatus (quorum quæ nova erant incognitaque hæcenus Herbariis, & à pluribus confirmata, in librum observationum redegeram, quem in posteritatis commodum publicare decreveram, nisi quidam mihi eum noctu in itinere abstulisset) deprehendi tertiam & amplius Plantarum partem, quarum vires adhuc incognitas scripseram ex rusticorum relato (erant autem plures quadringentis) ad recentia vulnera valere. Nec deest ratio: siquidem ex Plantæ, quæ in montibus nascuntur, magna ex parte ficcant & adstringunt. Ea autem quæ glutinant crassiorum partium esse debent simulque ficare, & adstringere in secundo gradu, siue calida sint, siue frigida. Glutinantia eadem essent cum cicatricem inducentibus; ni major in his ficitas & adstrictio requireretur. Voco autem cicatricem inducentia, quæ carnis genitæ superficiem indurant, ac in callum vertunt, cutique quam simillimam reddunt. Hæc fere sunt tertiæ facultates medicamentorum, inter quæ & aliæ recenferi possunt, quemadmodum quæ ad ornatum spectare videntur, quarum pleræque à secundis dependent, ut quæ detergendo, pilos, faciem, cicatricem, dentefque dealbant, & quæ erodendo pilos extirpant. Aliæ vero quæ occulta proprietate operantur ad quartas reducenda: sunt.

C A P. V.

De occulta Plantarum qualitate, seu proprietate.

DE occultis nunc dicamus qualitatibus, quæ à tota substantia dimanant. Occultæ dicuntur, quod earum effectuum ratio à manifestis elementorum qualitatibus deduci non potest. Has admiramur, ac pro secretis occultisque proprietatibus habemus, cum neutiquam harum causæ nobis summo etiam studio & diligentia perquisitæ innotescant. Quæ per has agunt Plantæ, earum aliæ evacuant, aliæ alterant. Evacuant rursus aliæ per se, aliæ per accidens è toto corpore aut aliqua ejus parte peculiare quiddam, siue id humor sit biliosus, melancholicus, pituitosus, serosusve: siue res quædam præter naturam, veluti spiculum, aut telum corpori infixum, ut radix Arundinis & Aristolochiæ rotundæ. Quæ è toto fere corpore evacuant humores, purgare dicuntur. Purgant aliæ per vomitum, ut Helleborus albus & Asarum: aliæ per alvi dejectionem, ut Helleborus niger, Scammonium, Rhabarbarum. Evacuant per se ex peculiari aliqua parte, veluti ex cerebro, per os, ut quæ ad apoplethmaticos; aut per nares ut quæ ad errhina medicamenta præscribuntur. Epithimum Atticum atrabilem humorem è ventriculo purgare Galenus lib. de Theriaca ad Pisonem tradidit. Aristolochiæ atque Cyclaminis radix ex utero per cervicem supervacuum humorem educit. Quæ vero per accidens evacuant, id præstant quia attractricem partium quarundam facultatem augent, ut nonnulla diuretica, renum;

& quædam quæ lac generant, mammarum; & semen augmentia, testium. Alterant occulta proprietate, quæ nos repente interimunt, aut parti alicui tota substantia noxam aliquam gravem cito adferunt: quæ vi pollent venena cuncta proprie dicta: quibus contrariantur alexipharmaca & antidota. Venenorum nullum toti nocet corpori, sed tantum partibus, aut uni, aut pluribus; quippe humanum corpus ex contrariis diversisque tum temperamento, tum tota substantia constat partibus. Quod autem præsentaneam adfert mortem, principem aliquam partem illico invadit, ac opprimit, aut lædit, veluti ex signis mox assumpto veneno apparentibus diligens observator animadvertet. Cerebrum & nervos petunt Opium, Mandragora, Stramonium, Solanum manicum, Papaver corniculatum, & pleraque alia, quæ convulsione strangulant. Thapsia partibus spiritalibus, ac naturalibus, tam si extra applicetur, quam si intus fumatur vim infert. Nam Thapsia si Plinio credimus fœdientibus nocet. Si minima aspirat aura, intumescunt corpora, faciemque invadunt ignes facri, ob id cerato prius illinunt. Fungorum genera strangulatu interitum inducunt, quod spiritus vitales cordis opprimant. Argumento est cordis palpitatione, atque etiam animi deliquium quod sequitur, quando quis diu putridos, & venenatos quosdam Fungos odoratus fuerit. Contraria venenis sunt antidota, eadem latente proprietate venenis resistentia, quam ob causam alexipharmaca dicuntur. Pharmaci namque nomen sæpe à Latinis Græcisque scriptoribus pro veneno accipiunt. Ex his quædam intus sumpta venena (quæ non modo Plantæ sed metalla, animaliaque esse possunt) rotius substantiæ diffidio obtundunt, & immutant; ut semen Citri mali, Melissa, Ruta capraria, quæ etiam pestilentes morbos depellunt, & alta quædam putredine oppressos spiritus vitales recreant; quædam vero externis venenis resistent, aut gladio infictis, aut ab aliquo venenato animali illatis, ut Malva crabronum vespargumque, nec non Phalangii ictus sanat; Alysson & Pimpinella rabidi canis morfus. Inter Alexipharmaca & venena media quodammodo sunt, quæ eadem substantiæ proprietate, aut occulta virtute certis tantum partibus humani corporis, nocumentum aut damnum afferunt, aut commodum & utilitatem; verbi gratia, Salvia & Betonica cerebro sunt magis dicata, quam aliis partibus; Buglossum & Mellissophyllum cordi; Agrimonia jecori; Asplenium lien; Absinthium stomacho. Vnde & Plantæ, sicuti & alia quævis medicamenta, quæ aut ab animalibus, aut à fossilibus sumuntur, à jecore quod juvant hepaticæ dicuntur; à cerebro, aut capite, cephalicæ; à splene, splenetica; à corde, cardiacæ; ab oculis, ophthalmicæ; à dentibus, odonticæ; ab articulis, arthriticæ, & sic deinceps à cæteris partibus. Cæterum de hac vi Plantarum certis membris destinata, aliqua ratio à partium quas petit constitutionibus & temperamento dari potest: ideoque nonnulli ad tertias manifestas facultates has referre voluerunt. Verum obscura proflus & imbecillis est hæc ratio, qua non omnino potest curiosus animus quiescere.

S C A P.

Alterantia.

Venena.

Thapsia.

Fungi.

Alexipharmaca.

Glutinantia vulnera.

Recentia proprietate occulta.

Purgantia.

C A P. VI.

De modo facultates Plantarum indagandi.

DVo sunt quæ nos in harum virtutum dignationem deducunt; scilicet usus seu experientia, & ratio. Sed ratio difficilis est; experientia periculosa. Sæpe multa persuadet ratio, quæ usus redarguit; multaque usus adinvenit, quæ neuti- quam ratio investigare potuit. Ad exactam tamen facultatum indagacionem utroque opus est. Oc- cularum autem facultatum, & quæ tota substan- tia agere dicuntur, experientia inventrix est ac ju- dicatrix: reliquarum autem, quæ à tribus mani- festis qualitatibus dependent, ratio ipsa, quæ desu- mitur à saporibus & odoribus, qui cuique Stirpi insunt. His juniores addidere figuras, ex quibus cujusque Plantæ facultatem, non modo mani- festam, sed etiam occultam cognosci asserebant; qua de causa libros Phytognomonicos scripsit insi- gnes præ aliis Ioh. Bapt. Porta Neapolitanus, qui- bus docentur facultates Stirpium, à formæ exter- næ contemplatione; verbi gratia, Scrophulariam mederi scrophulis, quia radices producat quibus adherent radicula rotundæ quasi pilulæ, quæ scrophulas in collo nascentes imitari videntur; sic Heliotropium minus ad morsus scorpionis valere, quia in summo Herbæ flos nascitur, in modum scorpionis se incurvante. Verum quam frivola at- que futilis sit horum doctrina, facile iis patet, qui rationes considerare ac investigare cupiunt. Qua- litatum autem manifestarum nullus certior index est, quam sapor; quod per contactum linguæ fiat. Tacito autem Galenus in lib. de temperamentis certissime temperamenta indicari demonstravit.

C A P. VII.

De Saporum Differentiis.

CUm tot sint saporum differentiæ, quot ele- mentorum mixtiones; singulis Plantis pro- prios suos inesse sapores dicendum est. Hos pro- pter infinitum Stirpium numerum recensere non possumus propriis nominibus, nec aliter explicare, quam si summam saporum differentias cunctis Plantis communes declaremus. Sapores alii sim- plices sunt, alii compositi seu misti. Simples sunt septem; austerus, qui adstringens ab effectu dicitur, quemadmodum & acerbus, acidus, acer, fal- sus, amarus, dulcis: qui quidem omnes intentione atque remissione adhuc differunt, veluti exemplis declarabitur. Est autem austerus sapor, qui lin- guam & os mediocriter constringit, inde levem inducens asperitatem. Hic in immaturis fructibus facile percipitur, nempe Piri, Prunisi, Mespilis, & reliquis, quæ quo magis ad maturitatem vergunt, eo minus austeritatis obtinent, sed plus dulcedi- nis. Huic affinis est acerbus; verum magis priori linguam & palatum coarctans, atque exasperans. Talis est in Malicorio, Sumacho, Galla & Cyprif- si nucibus, atque aliis, quæ magis minusque acer- ba conspiciuntur. Acidus autem sapor gustum pe- netrat, & sua tenuitate ferit sine caloris sensu. Tali acetum est præditum atque etiam succus Mali Ci- trii, item Oxalidis & Oxylapathi. Acris vero, qui Græcis ἀκρὺς dicitur, palatum & linguam acri-

monia & mordacitate compungit ac ferit cum ca- lore, qui interdum tam est insignis, ut partes oris adurat. Hic in Pipere, Pyrethro, Allio arque Na- sturtio, item Clematide altera Dioscoridis, aliis- que observatur. Salsus vero linguam cum modico calore valenter siccando contrahit atque cor- radit. Hic notatur in sale & nitro; sed moderate in Cithmi illo genere, quod Feniculum mari- num vulgo appellant. Porro amarus sapor insua- vis est ac tristis, linguam corradens divellensque, qualis est in Aloë, Abfynthio, Centauro minori, Colocynthide, & aliis. Dulcis vero sapor duplex est: unus enim proprie dulcis dicitur amaro op- positus, qui gustum voluptate afficit, in melle, sac- charo, Polypodio, Glycyrrhiza conspicuus; alter vero qui nulla qualitate ex prædictis omnibus qua- litatibus saporum, linguam afficit, ideoque Græ- cis ἀμύγμω dicitur, insipidus nostris, hoc est præ- dictis saporibus privatus. Nonnulli ex celeberrimis viris, duos hos sapores tantum intentione & remissione differre arbitrantur: intendi enim dol- cedinem in melle & aliis dulcibus proprie dictis; remitti vero in insipidis. Cæterum insipidus sapor alius lentore linguam oblinat, qui unctuosus, oleo- sus & pinguis à Theophrasto lib. vi de causis plant. appellatur. Hunc considerabis in Pssyllii muco, Althæa, oleo simplici, & Amygdalarum dulcium: alius nullo lentore palatum imbuit, quali prædita sunt Cucumis, Blitum, & Olerum pleraque, sed aqua imprimis; unde nonnulli hunc aquosum sa- porem nuncuparunt. Cæterum ex prædictis sim- plicibus sapores misti componuntur, qui omnibus fere Plantis insunt. Raro simplex sapor solus percipitur sine alio sapore comite; & si prædominans nomen sibi adsciscit; verbi gratia: mel quidem dulce dicitur quamquam etiam acre sit, quod plus dulcedinis quam acridinis obtineat. Quia autem variis sapores simplices miscetur modis, peculia- res cujusque Stirpis sapores fiunt. Austerus cum acerbis nunquam miscetur, quod tantum inten- sione remissioneque differant. Notandum pro- pterea hos sapores apud scriptores sæpe confundi, modoque austero pro acerbis, modo acerbis pro austero capi: nonnullosque etiam utrumque sub una saporis differentia constituisse, quem ad- stringentem ab effectu appellarunt. Austerus cum dulci conjungitur in Chrysocomes & Polypodii radice: dulcis cum acerbis in Glycyrrhizæ radice & Dryopteris teste Dioscoride: acerbis cum ama- ro in Rusci radice, & Scordii foliis. Autor est Dioscorides radicem Centauri majoris acris esse sapore cum quadam adstringente atque dulcedi- ne: acris dulcique Myrrhis est, Feniculum & se- men Anisi; acris & amarus Brassica, & radix Pan- cratii: acris & glutinosus seu pingui Cyclaminis al- terius Dioscoridis fructus; amarus & viscosus Sideritidis tertie Dioscoridis folium. His vinosum sa- porem adjiciendum puto, qui inter dulcem & aci- dum medius est, & ex ambobus constat.

C A P. VIII.

Odorum differentiæ.

Similiter à varietate mixtionum dependent odo- rum differentiæ, hoc est tum simplices, tum compositi, qui cuique Stirpi peculiare sunt. Nam

Salsus.

Amarus.

Dulcis.

Insipidus.

Aquosus.

Misti saporis.

Sapores sim-
plices.

Austerus.

Acerbus.

Acidus.

Acris.

sine miftione non potest fieri, aut fapor, aut odor. His namque privantur, quæ nullam miftionem recipiunt, ut aër, ignis, aqua. Simples tot ftatuiffe videtur Aristoteles lib. 11 de Anima, quot fapores. *Est autem, inquit, ut fapor hic quidem dulcis, ille vero amarus; fic & odores sunt. Sed alia quidem habent proportionaliter odorem & faporem. Dico autem dulcem odorem, & dulcem faporem: alia vero contra. Similiter autem & acer, & austerus, & acutus, & pinguis est odor. Sed sicut diximus propterea, quod non multum manifesti sunt odores, sicut fapores, ab his sumpta sunt nomina secundum similitudinem rerum. Dulcis enim à Croco, & melle; acer autem à Thyro, & ejusmodi. Eodem autem modo, & in aliis. Idipsum quoque credidit Theophrastus, qui septem odores, colores, faporeque ftatuit: verum non omnes odores appellationibus, quibus fapores reddi, quamquam non prohibeat quo minus hæc invicem conjungantur: ut utrumque alterum quodammodo consequatur. Cæterum communiora odorum genera, quorum apud autores frequens fit mentio, hæc fere sunt: suavis seu jucundus odor, gravis vel graveolens, acer, acutus, asper, dilutus, virosus, tener, putridus, & inodorus: quæ ad tria summa genera reduci possunt, ad suavem & gravem odorem, & ad inodorum ab odoris privatione sic dictum. Etenim odoratus percipit privationem, ut visus tenebras. Est autem suavis odor, qui odoratum nostrum oblectat ac juvat, ut dulcis fapor gustum. Cuncta hoc odore prædita Græci εὐώδεια & εὐώδη nuncupant, hoc est bene olentia, ut Myrrhin, Acorum, Cinnamomum, Nucem myristicam, & mali citri corticem atque folium. Quæ gravem spirant κακώδεια & δυσώδη, hoc est male olentia, quibus odoratus noster læditur ac triftatur, ut gustus amaro. Tali donatur assa foetida, & Spatula foetida, quam nonnulli Recoctariam nominant, quod folia ejus contrita recoctam oleore videantur, cum tamen gravius spirent.*

C A P. IX.

Quomodo fapores manifestas qualitates indicent.

VT recte Plantarum vires cognoscantur ex faporibus, non modo faporum qualitates, quæ gustui se offerunt considerandæ veniunt: sed etiam materia quibus inhaerent singula. Quia ut qualitates gustabiles, id est, fapores, qualitatum primarum, ita materia indices sunt secundarum. Simples fapores simplices etiam facultates primas manifestant: tum passivas tum activas: quatuor caliditatem, acris nimirum, amarus, salus, dulcis proprie dictus; quatuor frigiditatem, acidus, acerbus, austerus, insipidus; pinguis temperiem temperatam. At vero mifti, miltas etiam facultates denotant, quæ aut sunt contrariarum qualitatum nunciæ, ut in Glycyrrhizæ & Polypodii radicibus, dulcis denotat caliditatem, austerus autem & acerbus fapor frigiditatem (idem in aceto est quod acre fit, atque acidum:) aut ejusdem fere naturæ, ut dulcis & amarus; vel acer & amarus; vel salus cum aliquo prædictorum calidorum, indicant caliditatem: sic austerus cum acido aut acerbo si mifceatur, frigiditatem. Gradus ex iisdem faporibus cognoscetis, prout intensiores hi aut remissiores fuerint. Prout enim quid intensus est, aut ama-

rum, aut acre, aut alterius faporis, pro eo etiam erit aut calidius, aut frigidius. Verum scire ad hoc imprimis confert, non omnes fapores calidos eundem gradum denotare, si aut intensius aut remissius lingua ab iis afficiatur, nec etiam frigidis eodem pacto. Nam fapor dulcis proprie dictus nunquam indicat excessum caloris primi gradus, idcirco nonnulli ftatuunt hunc temperatum. Quidquid vero acre est si linguam vehementer mordicet, ut etiam urat veficulaque excitet, quartum caliditatis ordinem attingit, ut Piper, Euphorbium, Sinapi, Lepidium; item quæ colligunt, & putrefaciunt, ut Thapfica, Chamælæa, quas ne gustare quidem propter summam acrimoniam possumus. Quod autem linguam modico fervore imbuit, id secundo gradu calidum esse dicimus, quod vero vehementius id præstat tertio, quemadmodum etiam quod parum linguam urit, paucaque acrimonia stimulat, primo ordine calidum esse censendum est. Amaritudo autem atque faldedo secundum caliditatis gradum ad summum arguit, amaraque & faldia omnia quæ nulli alteri fapori conjunguntur, sine vehementi calore operantur. Nam fal quem Chymici nostri ex quacunque re eliciunt, præterquam quod arte paretur etiam acrimonie particeps est, ut cinis: unde fit, ut hic impense calefaciat, & pro cauteriis ulfupetur. Acida autem cuncta secundum frigiditatis gradum haud superant, quanquam sint summe acida. Nam aciditas sine modico calore, aut mutante ex calido in frigidum, aut mutato ex frigido in calidum fieri non potest. Vinum enim si calore suo depauperetur acetum fit, fructusque maturi plurimi austeri aut acerbi prius, mox à calore semicocti acidi redduntur, deinde dulces sunt ubi plus caloris acquisiverint. Probatum idem ex acidis rusticibus, qui non sunt à ventriculo bene cibos concoquente, aut nihil profus alterante, sed tantum ab imbecilliori concoctione alimentorum. A calore ergo fit acida qualitas; sed superatur à frigore, hincque est quod acida summos frigiditatis gradus attingere non possint. Acerba & austera similiter frigida sunt ad summum in secundo gradu: nec ad tertium quartumve pervenire possunt nisi socium sibi habeant aliquem alium faporem frigidum; ut in Sempervivo majori. Insipida autem tertium gradum attingunt in Portulaca, & quibusdam aliis valde paucis, plerumque vero infra subsistunt. Quartum vero frigiditatis ordinem qui indicet, faporem nullum novi, atque (si verum fateri licet) quod quarto fit ordine frigidum nondum observavi, quamquam dari non negem. Nam quæ soporem inducunt, atque stuporem, Græcis νάρκητις dicta, frigida quidem ftatui debent, nequaquam tamen in quarto ordine. Opium autem, Mandragora, Solanum somniferum, & alia quæ somnum conciliant, non solum frigiditate hoc efficiunt, sed peculiari quadam virtute cerebro destituta, quæ à tota substantia dependet, uti aptiori loco probabimus. Soporifera enim cuncta suavi quadam evaporatione ad cerebrum ascendente sive per nares, sive per os, sive per carotidas venas & arterias, sive per gulam, quam stomachum vocant, somnum movent. De opio tanta est inter recentiores diffensio, ut inter peritissimos medicos non desint, qui id calidum asseverent. Sane quas-

Acidum non fit sine modico calore.

Insipida potest fieri esse frigida in tertio gradu.

Narcotica frigida non sunt in quarto gradu.

Opis rda.

Sapores calidi frigidi.

Gradum temperatioris caliditatis in co- gnoscitur.

tum nulla ratione attingere frigiditatis gradum potest, cum mediocriter amarum sit; quantum namque habet amaroris, tantum caliditatis. Cæterum (ut ad rem redeamus) pinguis cuncta calore ac frigore temperata sunt: raroque pinguis sapor simplex subsistit, sed plerumque mistus cum aliis, qui postea & qualitates activas, atque eorundem gradus denotant. Passivæ autem qualitates, ut humiditas, siccitas, saporum ope etiam cognoscuntur. Exsiccant enim acris, amarus, salus, austerus, acerbis, atque acidus sapor: humectant dulcis, insipidus, ac pinguis. Ad summum siccitatis ordinem perveniunt acria, si valde acria existant: ut Ruta sylvestris Dioscoridis, quæ copiose in Montibus Pisanis nascitur; Allium; Sinapi, Nasturtium, & alia, quæ nonnulli quarto ordine siccare tradunt, quod siccandi vis adaugeatur ab insigni calore. Nam adstringentia, hoc est austeria, & acerbiora; ut Sumach, galla, balauustum, quæ potenter siccant, tertium siccitatis gradum nunquam superant. Refringitur enim eorum siccandi vis à frigore: frigidum autem nullum quod quarto gradu sit siccum novimus: nihilque existimamus summe siccare posse, quod non habeat sibi fociam aliquam ex activis qualitatibus. Amara omnia ad summum secundo gradu siccant, item falsa, nisi sibi admistum habeant aliquem adstringentem saporem. Acida vero minus omnium siccant, videnturque temperata in passivis. Humectant dulcia tantum primo ordine propter calorem. Insipida vero & aquea, secundo atque etiam tertio.

C A P. X.

Secundarum, tertiarumque facultatum investigatio.

Dixi qualitatum gustabilium materias indices esse secundarum qualitatum, non quidem per se, sed quatenus cum primis elementorum qualitibus conjunguntur. Ex utriusque enim sapores emanant. Materia quibus gustabiles qualitates inhaerent triplex est, tenuis, mediocris, crassa. E tenui prodeunt sapores, acer, acidus, pinguis; è mediocri, falsus, austerus, dulcis; è crassa, amarus, acerbis, insipidus. Si igitur cum tenui materia calor ac siccitas conjungantur, acer sapor excitatur. Calor hic aut vehemens est, aut mediocris, hoc est, infra tertium ordinem. Quod si vehemens fuerit ac tertium caliditatis gradum excedat, aut uret, papulasque faciet, ut in Sinapi, Pyrethro; aut vesiculas, ut in Flammula Iovis, Lepidio; aut colligabit & putrefaciet, ut in Thapsia. Vbi vero calor est moderatus, crassos humores attenuat, meatus aperit ac penetrat si per os sumatur: sin vero exterius corpori applicetur, rarefacit cutem, humoresque ex alto evocat & resolvit. Tenui autem materia, si siccitas frigiditasque copuletur, acidus fiet sapor. Idcirco acida similiter atque acria crassos humores attenuant, incidunt, penetrantque in altum, si intus sumantur; at foris imposita non dissolvunt, sed cohibent fluxiones; vehementiusque multo, quam quæ adstringunt. Temperies caloris atque frigoris cum modica humiditate in tenui aut aërea materia consistens pinguem saporem producit. Idcirco cuncta pinguis vim habent laxandi, molliendi, atque

humectandi. Calor & siccitas in mediocri materia consistentes falsum saporem proferunt. Voco autem mediocrem materiam, quæ ex terrena cum aquea permixta conflatur. Nam cum calor externus partes aqueas cum terrenis permittas exsiccet, falsus sapor inducitur. Ita fit ut vi polleat mediocriter penetrandi, incidendi, atque sua abrafione expurgandi, siccandique valde tennes humores; & à putredine conservandi. Frigiditas in mediocri materia, austrium saporem efficit; ideo adstringit quoque, & fluxiones moderate repellit, cohibet, ac contrahit, quæ non tam refrigerando, quam materia mediocritate præstat. Dulcia vero cuncta è mediocri materia emanant, in qua calor obscurus consistit. Idcirco differunt à pingui sapore præditis, quod in pingui sapore non exuperat calor, aut frigus; sed utriusque temperies existit, materiaque magis tenuis, quam in dulcibus. Quamobrem dulcia minus, quam pinguis relaxant, sed magis exasperata leniunt: anodyna præterea sunt sua mediocritate materia temperamentique, maturant, concoquunt, & pus movent. Calor præaffans, atque exsiccans materiam terream amarum saporem gignit: cui idcirco facultas detergendi, meatus expurgandi non sine calore mediocri. Nam calor ubi pervadit, ac penetrat, crassam materiam terrenamque secum abducit; quæ cuncta sibi obvia abradit, deterget, atque expurgat: & quo amarius medicamentum est, eo valentius hæc efficit ac præstat: Abinthium moderate; vehementius Aloë, Aristolochia Centauriumque: vehementissime Colocynthis, utpote ceu ramenta deducit ac dysenteriam efficit. Omnibus vero intus sumptis vis infarctus exolvendi: at ulceribus admoti fordes eorum expurgandi magna vis inest. Quia etiam siccitate insigni superfluos humores auferunt ac veluti absorbent & mirabiliter putredini resistunt. Terrena autem materia, cui frigidum & siccum inhaerent, acerbis saporis parens est: quæ de causa fluentium humorum impetum cohibet. Frigiditate enim & siccitate adstringit, densat, & coarctat. Hinc vulnera etiam cicatrice obducit, & humores in crassat propter terream substantiam. Humiditas autem exuperante modico frigore in crassa materia, insipidum facit: inde ei vis inest emplastica, meatus omnes intus & foris infarciendi, obstruendi, exasperata leniendi, ac soluta glutinandi. Distat insipidum à dulci, materia & temperamento. Crassior & crudior materia insipido est, quam dulci, & obscura frigiditas: calor vero obscurus, dulci.

C A P. XI.

Ex odoribus facultates obscurius cognosci.

Minus certo ab odoribus nobis virtutes Plantarum monstrantur. Sunt enim odores non ita manifesti sicut sapores teste Arist. lib. 11 de Anima, magisque nos fallere sensus odoratus potest, quam gustus. Nam gustus fit per linguæ contactum sine ullo medio; odoratus vero mediante aëre, qui sæpe facile nobis haud animadvertentibus alteratur ab aliis rebus, quam ab iis quæ odorari cupimus. Præterea inodora nullam nobis manifestam indicant qualitatem calidam vel frigidam, quemad-

Sapores passivorum qualitatum indicant.

Salsus sapor unde.

Austrius sapor unde.

Dulcis sapor unde.

A pingui quid differt.

Amarus sapor unde.

Acerbis sapor unde.

Insipidus sapor unde.

Frigiditas & siccitas in tenui materia. Acidus sapor.

Pinguis sapor unde.

Inodora nullam indicant qualitatem manifestam.

quemadmodum insipida frigidam, sed tantum crassam essentiam. Plantæ magna ex parte sapore suo peculiari præditæ sunt, quo gustum nostrum afficiunt: at pauciores multo sunt quæ odorem aliquem habent. Carent odore quæcunque insipidæ sunt. Auferat item, acerbæ, atque etiam falsæ, & amaræ. Crassa enim atque terrea eorum essentia est, ac propterea exhalare non potest. Kleeque non est à ratione alienum quod scripsit Galenus lib. iv de Simpt. med. facult. amarum nunquam odoratum esse. Nam quod dixit Theophrastus lib. vi de Caus. plant. amarum grati odoris primordium quodammodo existere, de exquisito amaro intelligi non potest ob dictam causam; ideo non omisit adverbium prope; sed de milto cum alio sapore, qui in tenuiori essentia consistat. Acris enim sapor plerumque cum amaro coniungitur. Exemplo nobis sunt cortex Mali Citrii, Myrrha, & alia innumera: sed in aliis magis in aliis minus acrimonia ab amaritudine vincitur. Multa præterea sunt odorata quæ non sunt amara, ut omnia fere aromata: quædam autem summe amara, quæ aut nullum, aut admodum exiguum odorem edunt; ut Colocynthis, Centaurium, Aloë. Est & alia causa eaque maxima cur non tam certo de temperamentis, atque facultatibus Plantarum ex odoribus uti ex saporibus, judicare queamus; inæqualitas scilicet substantiæ, quæ ex pluribus partibus diversis constat: exemplum Galenus, lib. iv de Simpt. ad eam declarandam in Rosa proposuit: Quæ, inquit, non ea modo ratione dissimilans est, quæ pars quidem ejus continet, pars vero continetur: continens quidem durum & terreneum, quod continetur succus est humidus: imo & succi ipsius tria sunt excrementa; quemadmodum supra necessarium esse demonstratum est; unum terreneum, quale est in urinis fæx; alterum æereum; quod ipsum quoque vini flori proportionem respondet: tertium æqueum, quod in omnibus bullitionem efficere corruptionemque diximus, ubi nimirum nequæ devictum neque plane alteratum ebullitionis tempore fuerit. Sane hujus excrementi gratia quidam succus non nisi coctus reponant, alii in sole servant præscitos: nam terrei æreæque gratia non admodum corrumpendos metuant, cum ea & separari videant, æqueque corruptibilem sortita substantiam: quandoquidem temperamentum natæ sunt siccum. Caterum in Rosa natura aliud gustantibus acerbum est; quod terreneum ut sit, & crassum, frigidumque necesse est: aliud vero amarum, quod tenue est & calidum, & tertium in his æqueum, necessario quidem frigidum, sed in tenuitatis crassitudinisque oppositione quadamtenus summorum medium; cujus mixtura neque ipsum illud adstringens, neque ipsum amarum summe est tale, quale dicitur. qualitates enim omnes exolvit aquei admixtio. Ipsum itaque hoc æqueum elaboratum extenuatumque, atque excalescens quodammodo videtur, ac proinde facile in vaporem solvi, & hac ratione rosam tum odoratam esse, tum celerissime resicari. Atque hæc omnia de ea ex gustu conicias; at per odorem haud æque. Quippe cum non æque omnes ejus partes evaporent, nec perinde sensum moveant. In gustu autem omnes similiter gustabuntur corporum particule in linguam incident, sensumque movent pro sua natura singule. Quare certum tutumque non est de tota medicamentorum facultate ex odore conicere. Hæc Galenus, qui citatis verbis partium diversitates per artificium, nempe coctionem, destillationem, & similia demonstravit: nos vero etiam

per naturæ opus, scilicet per partes diversas communes & proprias, & communium particulas tum similes, tum dissimiles, quæ singulæ peculiæres, ut plurimum, vires sortiuntur. Si enim aliquis totius Plantæ facultates consideremus, interdum per omnes Plantæ partes communes eadem est, sed minoris majorive ratione differens in singulis; ut in Foeniculo, Petroselinio, & aliis quibusdam vis calefaciendi, incidendi, attenuandi in omnibus partibus communibus quidem inest, sed magis in semine: interdum uni parti alia facultas, alia alteri, eaque aut contraria, aut diversa, ut flori Iesimini cor suo odore recreandi; Rosæ vis purgandi, cum nulla harum facultatum in folio aut alia parte appareat, imo potius contraria cernatur, scilicet alvum fistendi. Hederæ flos trium digitorum carptu aquam inter cotem emendat, teste Dioscoride, cum tamen frondibus inest vis adstrictoria. Illud præcipue notandum est, Plantarum partes quæ temperamentis conveniunt similibus, nempe calidis, aut frigidis, humidis aut siccis, non tamen in gradibus, singulas peculiaribus præditas esse dotibus. Exempla nobis sunt plurima in Pharmacopœorum officinis, in quibus propterea non omnes Plantæ, quæ usurpantur quotidie, totæ servantur, sed ut plurimum partes aliæ quæ, nempe radix, semine, folia, flos, quod iis inest privata & occulta quædam qualitas, aut insignis facultas manifesta, quæ à temperamentis dependet. Iam vero partium communium partes five similes sint, five dissimiles, virtutibus variant, ut exempli gratia in fructibus, mali Citrii cortex calefacit, pulpa refrigerat, semen mediam quandam temperiem sortitur. Verum quærat aliquis: quo cuncta quæ odorem habent temperamento prædita sint? Respondeo odorem à nobis distinguere in bonum, hoc est jucundum, & injucundum seu malum: ille odor nati *ἰσχυρὸς*, hoc est per excellentiam, hic fætor dicitur; cunctaque illo odore fragrantia odorata; hoc vero fœtida & grævolentia. Cuncta odorata calida esse & sicca, five suaviter oleant, five acrem grævemque spirant odorem, antiqui sapientes, atque neoterici probaverunt. Theophrastus lib. vi de causis plant. cap. xxxiv, ait odorem per coctionem acquiri, quod odorata evaporent, evaporatio autem omnis à calore fiat. Cum ergo coctio sine calore fieri non possit, accidit ut in fervidis locis plures odoratæ Plantæ nascantur quam in frigidis: aromata in Arabia, Syria, Indiaque plurima: in septentrionali plaga præter Iridem, & Acorum, nullum: Acorum in Lithuanix paludibus copiosissimum: Iris ubique fere in locis montosis, sed in Illyrio optima, quæ temperata est regio. Constat & coctio in siccitate. Siccitas, inquit idem Philosophus lib. vi de caus. plant. cap. xxxi, odori convenientior est, & omnia odorata eo potius vergunt. Argumento est, quod odoratiora locis siccis magis proveniant, exhausto scilicet humore aqueo excoctoque reliquo melius: item quod quædam tantum siccata olent, quæ viridia nil aut valde parum: ut calamus Aromaticus, Cinamonum; quædam plus olent siccata, ut Iris. Quod si aliqua viridia plus olent, quam siccata, id fit propter summam essentia tenuitatem, in qua odor consistit, quæ cito & facile exhalat. Præterea quod dixit Theophrastus,

Odorata quæ
temperamentum
suo prædita.

amarum grati odoris esse quodammodo primordium omniaque fere odorata amara esse: at amarum calidum siccumque esse probatum est. Quamobrem cuncta odorata calida siccaque esse oportet. Sed quid de Rosis, violis ac cæteris dicemus, quorum flores suavem jucundumque cum exhalent odorem nihilominus frigida censentur? Respondeo partes esse in florum etiam foliis diversas, calidas scilicet ac frigidas; plures vero frigidas, atque hac ratione flores hos frigidos censeri: calidas vero partes exhalare propter earum tenuitatem, quæ sunt in superficie foliorum, hoc est proximæ aëri. Hujus rei argumentum est, quod isti flores triti nullum odorem spirant. Permiscetur enim plurimæ partes crassæ ac frigidae cum calidis ac tenuibus in contritione; & has partes calidas ac tenues paucas esse docet nos suavis atque exilis florum odor. Verum pleraque odorata in Stirpium genere partes calidas & siccas aut intus tantum obtinent, ut ea quæ non nisi trita odoratum feriunt: nam exterius terrena crassa ac frigida vestiuntur essentia, quæ exhalationem odoris partium internarum prohibet. aut per totam Plantam, aut aliquam ejus partem, hoc est tam intus quam foris, ut omnia quæ trita, & non trita odorem reddunt. Atque hæc de odororum temperamentis dicta sint. Quam autem qualitatem foetida monstrant stirpes, non satis ab antiquis ac recentioribus declaratum est. Videtur autem foetor non à calore & siccitate generari, ut odor proprie dictus. Nam multa foetida frigida sunt, ut Cicuta, Hyoscyamus, quanquam plura calida: invento præterea apud Aristotelem in problematis Sect. XIII, multa odore malo prædita veluti excrementa animalium à cruditate provenire, quæ sit à caloris naturalis inopia: existimo tamen foetorem cum sit odoris species, à calido similiter & sicco dependere. Foetida namque nobis sunt, quæ cæteris animalibus multis odorata, & contra odorata quæ multis foetida. Etenim Scarabæos pilularios, quos Græci καὶ σκαβέρος vocant, odore Rosæ exanimari apud veterum plurimos scriptores satis constat. Foetor vero in Plantis frigidis, in alia parte præterquam frigida consistit. Foetida autem concocta esse falsum est. Nam Spatala foetida, Cicuta, Hyoscyamus non minus cocta sunt à suo naturali calore, quam Cinnamomum & Nux myristica. Verum quia ex illis non spirat odor nostræ naturæ familiaris & amica, ex his vero jucunda, idcirco illa nobis foetere, hæc vero olere videntur. Sed cussam erunt temperamenti, quæ putridum odorem edunt, qui species esse foetidi videtur? Hunc à nimio humore & caloris sui extinctione generari, indicio sunt fructus & Herbæ putrefactæ, quæ multum humoris in se continent, quare frigida humidaque putrida censeri debent. Respondeo nos hic de naturali cussique Plantæ odore & temperamento agere, non de eo, qui est præter naturam. Nunc ex odoribus vires prosequamur.

C A P. XII.

Odorum virtutes.

Alimenti ac sanitatis gratia nobis jucundos ac bonos odores natura suppeditavit. Quæcun-

que enim nobis bene olere videntur, ea aut cedunt in nutrimentum, aut medicamentum; male vero olentia tantum in medicamentum. nullum namque foetidum gustare audemus. Conjunxit rerum opifex bonos saporos cum bonis odoribus in iis Plantis, quæ in cibum cedunt, quæque aliquem odorem spirant, non tamen cum bonis odoribus bonos saporos. Multa enim odorata amara sunt. Quæ in medicamentum cedunt, tantum spiritus cordis ac cerebri recreant atque reficiunt: quæ vero in alimentum, & solidas partes & spiritus. Recte Sophocles in fabula Cretenses dicta, Venerem Deam, quæ voluptas significatur, unguento perfusam fingit, & in speculo se aspicientem: Paladem vero, quæ mens est, prudentia, virtusque, oleo perungi & exerceri: inuens sensus in capite positos odoribus demulceri. Quod etiam Alexis dixit apud Athenæum lib. xv Deipnosoph. τὸ γαῖον καὶ μετρίον ὀσμὴς ἐν κεφαλῇ χρηστὸς μέν, maxima, inquit, sanitatis pars est, odores cerebro bonos facere. Apud veteres quoque in usu fuit pectus suaviter olento unguento inungi, quod in pectore cor lateret, ejusque spiritus suavitate odoris resocillarentur. Sane in odore res plane divina, si priscorum credamus ceremoniis. Deos enim odoribus placare studebant, atque eosdem à celo evocare, & nostris temporibus prisca consuetudine in sacris domibus suffitus sunt. Consopitam enim & languidam mentem excitant. Foetor vero omnis ut cerebro nocet mentemque perturbat, ita cordis spiritus lædit, animamque prostermit. Peculiaris vis foetidis ad uteri suffocationes si naribus adhibeantur; odoratis, si infernis partibus applicentur.

C A P. XIII.

Occularum facultatum dignotionem fieri per experientiam, & quomodo hæc fiat.

Nillus sapor aut odor nobis manifestat occultas proprietates, sed solus usus & experientia quæ facta est in pluribus ob unum aut alterum effectum fortuito semel aut bis observatum. Nuper cum rusticus acetarium suæ pararet familie, flores Thlaspios umbelliteri, quod Creticum vocant, plures miscuit cum Lactuca & aliis Herbis ex quibus acetarium parabat. Noctu omnes qui comederant, morfu circa ventriculi orificium correpti sunt, plures vomebant; omnes noctem insomnem traduxerunt, putabantque se venenum hausisse. Hinc suspicor, aut vomitum hoc Thlaspios genus excitare, aut deleteriam aliquam habere facultatem, quæ facta semel atque iterum in aliis experimento innotescet. Multæ enim ejusdem rei memoriæ, unus experientie vim efficiunt dicebat Aristoteles lib. i Metaph. Ita investigatur proprietates occultæ: manifesta autem qualitas tum ratione, tum etiam experientia, quæ tamen aliqua indiget methodo, ut recte fiat, alioqui maxime fallit rationem. Observandus morbus, causa morbi, & symptoma, tum ægri natura tam communis, quæ temperamenta respicit, quam propria, quæ idiopathias latentes. Etiam anni constitutio animadvertenda, regio, & aliæ indicationes quas Galenus recensuit. Per morbum intelligi non θάλασσιον seu essentiam, sed morbi tempora, hoc est principium, augmentum, statum, & declinationem.

Nuper

Rosa cum trita
mixtum odor-
em ferit.

Foetida quo
temperamenti
to donata.

Odores ju-
vant cere-
brum.

Pectus un-
guento cur
persunderent
veteres.

Thlaspi creti-
ci flores quæ
efficant.

Manifestata
sunt & ex-
perientia in-
notescit.

Nuper quidam quartanarius cum veris tempore, una aut altera hora antequam quartana corripere solitus erat, Lactucam comederat ac Brassicam, nec febris unquam postea rediret, putavit se à Lactuca & Brassica sanatum. Verum hæc febris concocta paulatim materia veris tempore tanquam critico sponte solvitur. Itaque imprudenter aliis duobus quartana laborantibus consuluit, ut eandem cœnam fumerent, quibus multo gravior ab hoc assumpto cibo facta est accessio, alterique duplex quartana supervenit. Sic alius inflammatione circa talum laborans, quæ jam erat in declinatione, Sempervivum adhibuit, solvebatur morbus. Ideoque putavit cunctis inflammationibus recte adhiberi posse. Quare cum alteri in brachio inflammatione laboranti cataplasma ex Sempervivo applicuisset, gangrænam induxit. Inest etiam singulis hominibus peculiaris natura; cujus manifestæ causæ latent, quæ diligenter etiam venit observanda. Rosæ odorem, quo plerique mortalium recreari solent, non potuit sufferre Oliverius Caraffa Cardinalis. Patri meo Fabius laxabatur alvus, quæ tamen cæteris eam duram reddunt. Vidi quendam Aloës magna frustra devorasse sine noxa, sine purgatione ulla, aut minima alvi lubricatione. Debet igitur unus ejusdemque rei observatio fieri in pluribus quæ experta censetur. Hæc non potest ab idiotis atque plebeis hominibus (qui multa se interdum expertes fuisse jactant) recte cognosci, utpote qui simile atque diversum sæpe idem statuunt; sed tantum à Medicæ artis peritissimis, qui hæc quæ proposui, cuncta animadvertunt acri judicio ac summa diligentia, ut idem à diverso distinguant.

C A P. XIV.

De alimentis. Nullam Plantam non esse medicamentum.

T RANSCAMUS ad alimentorum potentiam: de qua nobis primum dicendum fuisset, quod magis alimenta nobis, quam medicamenta sint necessaria (nam alimentis, neque in secunda, neque in adversa valetudine carere possumus, medicamentis vero dum valemus;) nisi medicamentorum multa essent, quæ nil nutriunt; alimentorum vero nulla, quæ non alterent. Quod multis rationibus monstrari potest, sed ea potissimum, quod nulla reperitur Planta, nulliusque Plantæ pars, quæ ex omnibus qualitatibus elementorum æqualiter mixtis constituitur. Nullum enim mixtum in rerum natura tam exacte medio temperamento quod confectur reperiri ajunt Philosophi, sed id tantum esse mente contemplabile, quemadmodum etiam quod proprie alimentum vocamus. Etenim quæ mediis sunt temperamenti, ut à Galeo lib. 1 de Alim. cap. 1, docemur, nullaque vincendi qualitate sunt prædita, ea solum sunt alimenta, non etiam medicamenta. Hæc ratio est, quod qui bene valentes, uno eodemque cibo semper utuntur, tandem in morbos incidunt, citius alii, alii tardius, prout minor aut major est cibus imperies. Itaque inventi sunt varii, diversique cibos condiendi ac præparandi modi, ut scilicet imperies corrigi possit. Nec deest causa cur nullum alimentum sine aliqua exuperante elemen-

torum qualitate natura nobis comparaverit. Humanum enim corpus nullum est, quod plane medii sit temperamenti; sed semper aut calidius est, aut frigidius, aut humidius, aut ficius; idque vel ab ortu, vel ab ætate, locorum æriferæ commutatione. Quare necesse erat tot temperamentorum commutationibus obnoxium genus humanum, intemperatis nutriri alimentis, si quam fieri potest diutissime permanere in hac vita deberet. Intemperatæ enim naturæ modico contrariorum gaudent usu.

C A P. XV.

Alimentorum differentia.

I N sunt igitur duæ Plantis nos alentibus facultates; una nutriendi propriæ & simpliciter dictæ; alia alterans, de qua jam egimus satis copiose. Quibus inest facultas nutriendi, alimenta appellantur, quorum differentia facile patebunt, ubi prius qua ratione ac serie cuncta, quæ à nobis assumuntur pro nutrimento, alterentur commutenturque, ut tandem assimilentur, breviter declaravero. Alimenta aut liquida sunt cum assumuntur per os, aut solida: illa levi in ore egent præparatione aut nulla, ideoque statim nulla facta in ore mora per stomachum labuntur: hæc vero præparari masticatione debent. Ea fit præcipue per proprium oris calorem & salivam quæ ex stomacho, aliusque ori vicinis partibus suppeditatur, seseque cum cibo permiscet, ut liquidior evadat, facilius deglutiat, temperiem quandam cum ventriculo ineat familiarem atque amicam, substantiamque chylo ventriculi similem fere efficiat, quæ à ventriculo facillime in chylum convertatur. Ventriculi liquidum officium est, cibum per os ingestum in chylum commutare. Hic postea chylus, hoc est tenuior alimentorum succus, cremori hordei similis factus, per venas meseraicas, relictis crassis excrementis in intestinis quæ per alvum deturbantur, in jecur delatus, in sanguinem convertitur, deinde per venam cavam in universum corpus distribuitur, singulis particulis idoneum suppeditans alimentum propriè dictum, ubi ab his assimilatur atque agglutinatur. Cæterum qui de alimentorum scribere facultatibus, aliter sumentes nomen alimenti, non id tantum alimentum vocant, quod jam nutrit; sed quod nutrire nos potest, hoc est quod cunctas quas diximus mutationes subire debet, antequam substantiam naturæ nostræ familiarem, deperditæque similem præbeat. Hac ratione, & Plantæ aut totæ, aut aliquæ earum partes alimenta censentur. Horum multæ sunt differentia, sumptæ partim à nutriendi, partim ab ea, quæ cum hac conjungitur, alterandi facultate. Nutriunt alia cito, alia tarde, alia multum, alia parum, alia bene, alia male. Sunt & quæ mediocriter hæc cuncta præstent, quorum natura ac vis media est inter hæc duo extrema. Quæ vero ori ingrata aut grata, facile aut difficulter corrumpuntur, & excernuntur, aut aliud quid simile præstant, propter alterantem & medicamentosam, quam continent facultatem, hæc operantur: si quidem ori grata sunt propter saporem, quem nos suavem, Græci ἡδυσ nuncupare consueverunt, si vis sit dulcis, ut in Amygdalis, si cum eo permixta aciditas,

Alimenta assumpta quomodo in corpore alterantur.

Alimenti nomen quid denotet.

Alimentorum differentia.

aciditas, ut in malis quibusdam atque aliis fructibus. Similiter ori ingrata sunt, quæ haud suavem habent saporem, sive sit falsus, sive amarus, sive austerus, qui prædominatur cæteris saporibus. Omnes autem alterare ex multis rationibus colligere quisque potest, quas cum de medicamentorum per rationem investigandi facultate ageremus, sæpe recensuimus. Ventriculo quæ jucunda sunt aut noxia, privato quoque id præstant temperamento, quod aut amicitiam conciliat, aut odium. Alimenta autem facile, aut difficulter in putredinem verti, ac per alvum excerni, ab intemperie proveniunt. Quæ enim facile putrescunt ac corruptuntur, humida sunt cuncta, ut Cucurbitæ, Persica, & bona pars fugacium fructuum; sicca vero difficulter. Sic quoque facile aut difficulter per alvum transiunt ob nimiam humiditatem, aut siccitatem. Quæ enim adstringunt, tarde: quæ laxant aut abstergent, cito permeant, ut Ficus. Porro illud curiosius, non tamen sine fructu indagandum: an quæ male nos nutriunt, hoc est, prævum suppeditant succum, *κακὸν γὰρ* Græci vocant: alimenta dici debeant? Si enim quod bonum est nobis, nostræque naturæ familiarem & gratum succum suppeditat, alimentum appellandum est, ut videtur; erit quod prævum & malum suggerit humorem, neutiquam appellandum alimentum, sed potius medicamentum, quod pravitās hæc dependet ab intemperie. Respondeo alimentum dupliciter à scriptoribus accipi: simpliciter pro eo quod nobis bonum succum præbere potest: vel cum additione vocis prævum, non pro eo quod nil nos nutrire potest; sed quod præter exiguum bonum succum multum pravi in se continet humoris, qui una cum bono per venas in universum corpus distribuitur; præsertim quando partes corporis ex aliqua inedia exinanitæ nutrimentum tam valida vi & tam celeriter attrahunt, ut nequeat natura partes nutrimenti noxias secernere ab innoxiiis, ac per loca consueva à corpore deturbare. Pravi succi appellari solent melancholici, biliosi, putridi: crudi vero & frigidi, pituitosi. Sequitur, ut quæ prædictæ alimentorum differentiarum in Plantis atque aliis nos nutrientibus conjungantur commisceanturque, nunc indicemus. Quæ cito nutriunt, ea parum præbent alimenti: non tamen quæ tarde ea multum, sed quæ multum ea tarde. Haud enim verum est, cuncta ea quæ tarde nutriunt, multum nos nutrire; nec quæ parum, cito; sed quædam. Triticum multum nutrit, & tarde: nam tarde à ventriculo concoquitur. Quæ autem boni pravi que sunt succi, quædam cito, quædam tarde alunt. Sed boni succi cuncta & multum & parum alere possunt; pravi vero neutiquam, sed parum tantum ea alere necesse est; atque aut cito, ut Persica; aut tarde, ut Lentesc. Eorum autem quæ mediocriter, hæc cuncta præstant, quædam mediocriter & nutriunt, & in corpore antequam nutrant, mediocri temporis spacio commorantur, sive mediocriter pravi succi sint participes, sive prorsus eo careant. Sunt quæ mediocriter alunt, & aut tarde, aut cito: quæ vero mediocrem in corpore moram trahunt, antequam assimilentur partibus, alia cito, alia tarde nutriunt, venasque corporis pervadunt. Vario etiam modo conjunguntur cum his facultates, quæ

dependent ab intemperie, & præsertim eæ quarum mentionem fecimus, quæ cunctis alimentis ineffe solent. Eorum quæ ori grata sunt, quædam facile, nonnulla difficulter concoquuntur, aut corumpuntur aut descendunt, & cito aut tarde, parum aut multum alunt. Quæ cito & facile concoquuntur, cito & facile etiam alunt, & contra quæ tarde ac difficulter. Sic & quæ cito in ventriculo concoquuntur, cito etiam descendunt, & per intestina dilabuntur. Id quod etiam videtur affirmasse Hippocrates dum inquit lib. 11, Aph. XVIII. *Eorum quæ confestim, & velociter nutriunt celeres sunt excretiones.* Nam loquitur non tantum de secunda & tertia concoctione, sed etiam de prima.

C A P. XVI.

Alimentorum inventrices, ratio & experientia.

Sunt sicuti medicamentorum, ita & alimentorum inventrices, ratio & experientia. Fallax tamen & multo minus certa in his est ratio, quæ à sapore, & odore desumitur, quam in medicamentis, si solam spectetis nutrientem facultatem. Extant apud Galenum lib. 1 de alim. Dioclis verba, sola experientia alimentorum facultates nobis cognitas esse arbitrantis, non ex indicationibus, quæ a temperamento & à saporibus sumuntur. Cæterum si Diocles nutrientem potentiam in alimentis tantum considerasset, haud prorsus à veritate aberrasset. Nam à multis Sapientibus probatum est, animantium generi cibum esse familiarem substantiæ proprietate, quæ sola experientia indicatur. Ajunt tamen dulcia cuncta nos nutrire. Id si ita est, indicabit etiam sapor vim nutriendi, non tantum alterandi. Per dulcia autem nonnulli intelligunt cuncta, quæ gustui placent, indeque putant ductum proverbium, *Quod bene sapit, bene nutrit*: ego præter illa etiam dulcia proprie dicta. Sine his enim nil palato aridet. Salsa, acria, acida, amara, & si quæ sunt alio sapore prædita, qui alimentis ineffe potest, si modum excedant, ori insuavia redduntur, & quod in ipsis dulce est, destruunt, aut præpediunt ne nutriat. Quare censendum est, non modo dulcia esse omnia, quæ nos nutriunt, sed & alimenta cuncta dulcia. Existimaverit autem aliquis falsam hanc esse universalem propositionem, propterea quod inter medicamenta nonnulla sunt, quæ nil nutriunt, dulcia. Hic sane condocesaciendus est, id non ob aliam causam contingere, quam ob partium diversitates. Insunt enim, & illis partes, quæ nos nutriunt, & alia quæ medicamentorum continent potentiam; quæ quia in his insignis est, impedit in illis nutrientem facultatem, ut nil operetur in nobis. Hujus rei manifesta sumatur demonstratio ab exemplis. Ari radix cruda, neque mandi potest, neque nutrire, propter ejus summam acrimoniam, cocta vero præbet alimentum. Huic necesse est adjungam memorabilem naturam ejus Plantæ, quam Hiuccam vocant Indi occidentales, quamque fide digni ac multi scriptores, qui eas terras peragraverunt, & viderunt & scripserunt. Folium huic Herbæ Cannabis, vel ut aliis placet Sambuci, radix humani femoris crassitudine. Hanc tradunt redigi in pulvem cotium attritu, deinde ex ea per colum

*Alimenta
expensiva
an nutriant.*

*Alimenta
duplex
acceptio.*

*Pravi ac
crudi
succus.*

*Dulcia nos
nutrire.*

*Alimenta
cuncta dulcia.*

*Ari radix
nutrit.*

*Hiucca
venosum
alimentum.*

lum extrahi succum valde lethalem, nulloque invento ad eum adhuc remedio: reliquum vero radicis exponi soli, ut exsicceetur; mox siccatum in farinam moli, quæ aqua subacta in panes formetur, Cassavi ab ipsis appellatos: servari hos per duos annos ad usum familiarem sine noxa. Ex quibus patet non mirum esse quod refert Theophrastus, nonnullas radices dulces venenosas esse; tum etiam quod narrant alii scriptores, nonnullos veneno educatos ac nutritos. Nutriebantur enim non veneno, sed venenato, cujus partes nutritivæ alimentum corpori subministrant, ubi proprietate naturæ venena nil operantur in quibusdam, aut ubi antequam assumantur ab omni venenosa qualitate purgantur. Nec defunt in rerum natura Herbar, quibus totis innoxie vescimur, cum tamen earum succus cum vitæ periculo assumatur. Alii succus potus hominem non modo turbat, sed etiam interficit, & Capræ si largius potetur, ob insignem caliditatem, & acrimoniam mentem turbat, & stomacho mirum in modum nocet. Igitur nutriendi vis in Stirpibus innotescit ex sapore dulci, quem supra ponebamus modici caloris esse indicem. At quantum quodque alimentum nutriat, & an cunctanter, an velociter, ex substantiæ consistentia clarum evadet. Tenuis namque haud tam multum quam crassa & viscida nutrit, neque tam tarde, quoniam permeat facilius ac velocius per venas ad ultimas corporis partes. Quod vero pertinet ad alterandi facultatem, quæ alimentis inest, eam ex iis iudiciis explorabimus, quæ supra recensuimus. Prava & difficilis concoctionis alimenta ab effectu deprehenduntur. Qui enim prava capiunt alimenta, his nidorulentus aut alius gravis ructus accidit, aliis mordicatio: nonnullis utrumque: quibusdam flatibus distenditur venter, & status per os excluditur, aut instar plumbi aut lapidis, aut luti ipsorum ventri incumbere videtur, qui & durus etiam est, ac tensus, & quasi inflatus. Cæterum hi effectus multas ob causas accidere possunt: ob intemperiem alimenti, & partis in qua fit concoctio, nempe ventriculi: & ob lentorem atque crassitiam substantiæ, ob naturalem quandam proprietatem *ιδιωματικότητα* Græcis appellatam. Quippe quæ valde frigida sunt, lenta & crassa, calorem stomachi immittunt, extinguuntque, hinc ægre descendunt, difficillimeque concoquuntur. Nimis calida nimium etiam calorem augent, quo fit, ut prave concoquantur. Proprietates cujusque ventriculi spectanda: quin etiam, an à communi desciscat. Inventi enim sunt, qui facilius ac celerius Fabam Lentescque, quam ova concoquerent. Quidam propter praves humores, quos in ventriculo coacervarunt, aut alium ob affectum præter naturam, quæ facilis sunt concoctionis aut digestionis, prave & difficulter concoxerunt. Idcirco qui notitiam facultatum omnium, quæ alimentis infunt, tum consistentia, quæ aut lenta, aut friabilis, aut crassa, aut tenuis, laxa, ut levis, gravissime esse solet. Hæc enim omnia, aut docet Galenus lib. 1 de alim. ad ipsarum inventionem adeo conferunt, ut cum in peregrinam re-

gionem perveneritis, si quid esculenti nunquam vobis conspecti occurrerit, per multas fisis occasiones atque adjumenta ad ejus facultatem cognoscendam habituri.

C A P. XVII.

Exacta hujus Philosophiæ notitia qui acquirenda. Autores veteres, & recentiores, qui de ea scripserunt.

His præcognitis, qui totum se huic Philosophiæ tradere cupit, & ad exactam ejus quantum fieri potest, cognitionem devenire, cum veterum & recentiorum lectioni, qui ex professio quippiam ad rem Herbariam spectans edidit, aut ea de re obiter quippiam in suis commentariis retulere, diligenter incumbere oportet. Adeat in primis veteres Græcos atque Latinos, Theophrastum, Dioscoridem, Plinium, Galenum, Apuleium, Eginetam, Oribasium, Æmiliū Macrum, atque etiam Arabes, Avicennam, Serapionem, Mesuem, Rhafem. Libri Theophrasti (qui discipulus fuit Aristotelis) de Historia Plantarum novem, cum decimi principio; & sex alii de causis earundem, Græce admodum leguntur mutili ac depravati injuria temporum. Idcirco lectore indefesso indigent, & in Græca lingua non mediocriter exercitato. Hos Latio donavit Theodorus Gaza Theffalonicensis, eo tempore, quo jam Græci auctores negligebantur. Is homo multis præditus literis, reique Medicæ, atque utriusque linguæ peritissimus fuit. Quia autem in multa depravata incidit loca, dum hos libros Latinos faceret, quædam omittere in versione, nonnulla ea, quæ sibi videbantur optima, conjectura restituit, & coactus fuit. Et quoniam non de verbo ad verbum transferre, sed mentem Philosophi exprimere summa eloquentia studuit, sæpe aliud quam autor, tradidit: aliquoties usque adeo Latine linguæ studiosus & amator fuit, ut matrem linguam ei postposuerit. Etenim Latinam novis vocibus, & ut plurimum non necessariis, ad Græcarum vocum imitationem augere semper studuit: verbi gratia, *ελατήριο* Agitatorium vertit, cum Plinius & alii Græco utantur nomine. Interdum quoque variat in vocum versione: *Λ'ὄψιλον* Albus reddit atque etiam *Λ'ὀφίδιον*, cum diversæ sint Herbar. Sic *ελαττω* plerumque Abietem, aliquando Pinum interpretatur: & *πίνων* Abietem, Laricem, sæpe Picem. Solani quodcumque sit genus appellat Vescicarias, cum maxime inter se differant. *καταφρον* perperam cum Plinio interpretatur Gladiolum. Et plura alia diligens lector notare poterit, qui propterea parum huic interpreti fidat sine Græco codice. Sensus ejus quoque interdum cum Theophrasto non convenit, quod hanc scientiam haud satis intelligeret, quæ ante eum per multa secula, ejusque tempore jacuit. In Historiam Theophrasti aliquid in posteritatis commoda molimur. In libros de causis Julius Cæsar Scaliger inter doctissimos doctissimus nostro seculo commentatus est iis, qui Græcæ linguæ atque Latine peritiores sunt. Mentem Philosophi optime explanavit, loca quamplurima mutila feliciter restituit, nec pauciora melius quam Gaza interpretatur, quem sæpe at-

Autores veteres de re herbaria.

Theophrastus.

Theophrasti interpretes Theod. Gaza.

Int. Cæp. Scaliger.

Veneno quomodo aliqui nutriunt.

Prava & difficilia quomodo deprehenduntur.

*Arifl. lib. duo
de Plantis.*

Diofcorides.

*Hermolaus
Barbarus.*

*Marcellus
Virgilius.*

Ioannes Ruellius.

*Petr. Andr.
Matthiolus.*

*Melchior
Guilandinus.*

C. Plinius.

*Stephanus
Aquauius.*

*Iacobus Dale-
champius.*

Galenus.

Paulus Aegineta.

*Oribafius.
L. Apuleius.*

Æm. Macer.

Arabis.

Averroës.

que optima ratione castigavit. Aristoteli adscripti libri duo de Plantis ab eodem Iul. Cæsare Scaligero explicati sunt. In iis multa non contemnenda, quædam quoque improbanda, quæ ut diligenti studio semper, ita sæpe nimis curiosè atque subtiliter à Scaligero animadvertuntur. Pedacii Dioscoridis Anazarbei, qui miles atque Medicus sub Antonio & Cleopatra vixit, de Medica materia novem extant libri, quorum quinque prioribus Stirpium, quæ suo tempore magis in usu erant, facultates præcipue absolvit breviter ac summo studio, non omittis earum descriptionibus, quæ non ita ubique occurrebant. Quæ autem erant vulgaris notitiæ non descripsit, unde factum est, ut eas quarum vires nobis commonstravit, adhuc ignoremus. Dioscoridem primum Latine reddidit doctissimus Hermolaus Barbarus addito etiam corollario, quo autorem hunc multum illustravit. Post eum Marcellus Virgilius pari industria & eruditione, adjectis etiam commentariis elegantissimis: tandem Ioannes Ruellius, cujus verho nunc omnium fere manibus tenetur. Scribere in eisdem libros commentaria plures alii, sed copiosissima Petrus Andreas Matthiolus Senensis, appositis quam plurimarum Stirpium iconibus, tam veteribus descriptarum, quam à recentioribus & scipso usurpatarum ad varios affectus humani corporis. Hic castigandis aliorum erroribus ita se totum tradidit, ut proprios, quos plures commisit, quorum magna pars à Melchior Guilandino viro eruditissimo, nec parum in hac Philosophia versato, quatuor epistolis animadvertuntur, propemodum neglexerit. Cælius Plinius secundus in Historia mundi fidecim libris, à duodecimo scilicet usque ad vigesimum septimum, descriptiones, locos, usus, virtutes, & reliqua accidentia Plantarum, quarum apud autores, qui ante eum floruerunt, ac suo quoque tempore existerent, facta est mentio, tam breviter perstrinxit, ut sæpe propter sententiæ ac phrasim breviter non intelligeretur, nisi autores præsertim Theophrastus & Dioscorides, ex quibus pleraque transcripsit, consulerentur. Correxerunt hunc atque elucidarunt Hermolaus Barbarus in Castigationibus, Stephanus Aquauius in Commentariis, & alii celeberrimi viri: sed in primis nostro tempore Iacobus Dalechampius auxilio veterum codicum manuscriptorum, atque collatione autorum antiquorum, quibus Plinius usus est. Galenus undecim compoluit libros de simplicibus medicamentis, in quibus pleraque de Stirpium facultatibus primis, secundis, & tertiis generaliter agit, ex secundis primas investigando. In his nil fere quod non apud Dioscoridem inveniat, imo quædam omittuntur necessaria. Hos Galeni libros Paulus Aegineta in compendium redegit. Secundum ordinem Alphabeti Plantarum facultates atque descriptiones è Dioscoride in sua Collecta transtulit Oribasius. Lucius Apuleius Madaurensis librum edidit de virtutibus Herbarum; item Æmilii Macer Veronenfis versibus hexametris. Plurimum quoque Arabes hanc scientiam locupletarunt, Rhafes, Serapion, Mesues, Avicenna, & alii ignobiliores, qui præterquam, quod Græcis cognitæ Herbas in suos libros retulere, novas etiam quam plurimas describere, ac earundem vires tradidere. Averroës in quinto colligit

infigniorum Stirpium facultates secundum Galenum ordine Alphabetico prosequitur. Inter recentiores summo studio ac diligentia de natura Stirpium tres libros amplissimos publicavit Ioannes Ruellius, in quibus accurate cuncta ex variis scriptoribus, Latinis præsertim ac Græcis, qui ante ipsum fuere, collegit. Nam præmissis communibus quibusdam præceptis & animadversionibus ad formam, vitam, generationem, culturam, & alia accidentia pertinentibus, mox ad particularem cujusque speciei tractationem devenit. Hac tempestate etiam floruit Hieronymus Tragus, atque ejus æmulus Leonardus Fuchsius, excellentes ambo viri, qui libros posteris de eadem materia reliquere adjectis iconibus. Sed Fuchsius magna ex parte descriptiones viresque suarum Stirpium ex veteribus mutuatus est in tomo primo; nam alterum figuris depictis, ac nomenclaturis tantum illustrat: Tragus autem magnum Plantarum numerum in Germania fere nascentium paulo ante Fuchsum edidit, quarum formam, ac loca, generationem, vires cum veteribus cognitæ, tum propria, & aliorum nempe rusticorum, & mulierum experientia inventas, examinavit atque indicavit. Hoc mortalibus utilissimum studium in hoc doctissimo viro nunquam satis laudare possum. Vtinam hoc omnes qui post & ante ipsum, amplexi fuissent. Etenim si nostro tempore tantum studii collocarent Herbarii in examinandis Plantarum novarum, quarum picturas nobis offerunt, viribus, quantum in describendis earum formis ac generationibus ponunt, profecto melius valetudini humanæ consulere. Ideo montes aliaque loca visenda sunt habitu rustico, quo facilius cum colonis inearum gratia ac societas, obvii quique consulendi, montium incolæ adeundi, ut usus & facultates aliquæ earum Herbarum, quarum descriptiones nuper à doctis viris traditæ sunt, cognoscantur, etsi quæ ab uno prius indicata sunt atque à pluribus postea confirmata, in observationum libro sunt annotanda. Sed ad rem redeamus. Fuchsiæ atque Tragum secutus est Matthiolus, qui Dioscoridem commentariis illustravit; icones etiam non modo elegantiores, sed & plures, quam priores novarum Plantarum apposuit, quarum non præterit antea incognitas quasdam vires. Scripsit Rembertus Dodonæus post hunc Historiam Plantarum elegantissimam triginta libris conclusam una cum imaginibus, in quibus novas nonnullas quoque videre licet. His alias adjecit Matthias Lobelius in suo Herbario, quod etiam cum imaginibus edidit: item Petrus Pena, qui una cum Lobelio adversaria cum iconibus divulgavit. Carolus Clusius Atrebas hoc tempore plusquam ullus alius huic studio deditus novas Stirpes plurimas, quas in Pannonia, Austria, Hispania summa diligentia & cura observavit, pictas aliquot libris divulgavit, quos annis ab hinc pauculis in magnum volumen congessit, quod pluribus novarum Plantarum descriptionibus & picturis locupletavit. In eodem volumine de Fungis curiosissimum tractatum videre licet; itemque Plantarum omnium in monte Veronenfi celeberrimo, quem Baldum vocant, nascentium catalogum, quem Ioannes Pona Pharmacopæus Veronenfis in Stirpium cognitione veratissimus composuit. Idem Clusius hoc

*Io. Ruellius de
natura stir-
pium libri.*

*Hieronymus
Tragus.*

Dodonæus.

Lobelius.

P. Pena.

*Carolus Clu-
sius.*

anno libros decem exoticorum in lucem protulit, in quibus de Plantis peregrinis, atque Indicis plurima. Hic etiam aliquot autores aliena lingua præterquam Latina conscriptos ad hoc studium utilissimos in Latinam linguam vertit; Christophorus Acoftam, Nicolaum Monardum, & Garciam ab Horto, qui Proregis Indiæ Medicus fuit, duos libros de simplicibus apud Indos nascentibus, quos in Epitomen contraxit, ex Hispanico idiomate.

Petri etiam Bellonii, qui de Arboribus Coniferis librum conscripfit, pulcherrimas observationes à Gallicis Latinas fecit. Libros fedecim de Plantis Andreas Cæsalpinus Aretinus, Medicus & Philosophus in Italia suo tempore celeberrimus, nuper luci dedit. Nomina Plantis, quas descripsit, ut plurimum indidit Hetrusca, usque libenter pro Latinis usus est. Idcirco difficilis paululum iis est, qui Stirpium vestigandarum causa non videre Hetruscos agros; nec alios, qui Herbarios cum iconibus multique nomenclaturis ediderunt, prius inspexerunt. Descripsit hic propriis verbis singulas species diligentissime: mox an eæ veteribus cognitæ sint ostendit: demum si quippiam iis sit vitium, haud ita prioribus scriptoribus cognitum, subnectit. Voiversalis Plantarum Historia, quam certo scio Iacobum Dalechampium inchoasse, ac imperfectam nobis reliquisse, cæteris, qui ante hanc editi sunt, Herbariis anteferenda sanè est, etiam si imperfecta sit. Nam duo magna ejus volumina, plurimis scatent erroribus, quos Typographi, atque ii, qui hanc transcribendam & imprimendam dederunt, commiserunt. Notantur hi singulari libello, quem de erroribus Historiæ Plantarum generalis inscripsit Calparus Baubinus. Imagines magna ex parte huic Historiæ inferuntur earum Stirpium, quæ describuntur, in quibus multæ antea incognitæ, tum nostratæ, tum peregrinæ ex India utraque delatæ. Consert hic doctissimus autor diligentissime antiquos scriptores inter se, ac multa eorum loca depravata majori quam alii judicio, ac multo felicius restituit. Tandem Iacobus Tabernæmontanus, qui Tragi discipulus fuit, in hac scientia pari qua priores indutus, in quo præternomenclaturas Latinas ac Germanicas, & picturas, nil aliud continetur. Ostenduntur hoc libro plures Plantæ depictæ, quam in ullo alio prædictorum autorum: desiderantur descriptiones, & vires; quas audio cum lingua Germanica conscripsisse. Hi sunt præcipui scriptores tam veteres quam recentiores, qui de re Herbaria volumina reliquere, quos præ cæteris legendos judicavi.

Tractavit de universali Stirpium natura Ioannes Costæus Laudensis. Aloysius Anguillara, qui ante Guilandinum horti Patavini præfectus fuit, placita sua compendiose, & magno cum judicio conscripta, in lucem protulit, sed Italici tantum. Extant de hac Philosophia aliorum quorundam eruditissimorum scripta, ut Ioannis Thalii, Ioachimi Camerarii, Fabii Columnæ, Prosperi Alpini, qui de Ægyptiacis Plantis librum edidit, sed omnes nominare supervacaneum arbitror, cum qui omnes scire desiderant, Philosophos ac Medicos, qui Bibliothecam Medicam ac Philosophicam typis mandarunt, consulere queant. His adjungantur scriptores varii, Poëtæ, Historici, Oratores,

tam veteres, quam juniores, qui obiter mentionem Plantarum sæpe facientes, quippiam de viribus aut natura earundem addere solent; sed maxime, qui de compositione medicamentorum scribere, inspiciendi sunt, item qui curationes affectuum corporis humani, qui de re culinaria, & cibaria, inter quos Apicium & Athenæum inprimis commendando: item qui de Agricultura, quam tractarunt Varro, Cato, Lucius Moderatus, Columella, Palladius, & alii, qui de Hippia tria, & similibus; denique qui miscellanea, adeundi. Quare si quis hos omnes autores diligenter attenteque legerit, ac singula annotanda in suo Florilegio propriis locis seu capitibus posuerit, quo facilius memoria inhæreant, aut promptius, si quando lubet, cunctæ autorum sententiæ reperiantur, is vere excellens in hoc studio evadet. Ad exquisitam Plantarum cognitionem nullum perveniet, quantumvis laboriosum, humanum ingenium. Infinita nimis earum varietas, in forma, usu, & cæteris accidentibus: semper novi aliquid afferre videmus fluvios, paludes, mare, montes, campos, valles, arenam, parietes, saxa, prata, vineas, sylvas, inculatæ, & ut breviter, Europam, Asiam, Africam, Indiæque. Itaque si ulla medicinæ in parte magis Hippocratis sententiæ veritas elucescit, Vita brevis, ars longa; sane in hac maxime, quæ ad Medicinam inprimis pertinet. Nolim tamen in scientia Herbaria, quemquam deterreat rerum discendarum multitudo. Quisquis in ea tantum proficiat, quantum ad suam scientiam excolendam & exornandam necessarium est, nisi quis se totum huic studio tradere velit. Medicis hæc Galenus: *Medicus ut omnium Stirpium, si fieri potest, peritiam habeat consulo, sin minus, plurimum saltem, quibus frequenter utimur, sunt autem ipsarum genera, vel si sic ea nominare velis, differentia hæc, Arborea, Frutices, Herba, Spina, &c.*

C A P. XVIII.

Florilegium quid; ejus consiciendi modus, & ordo.

Q Voniam autem Florilegii facta est mentio (sic enim soleo libros appellare, quos alii collectanea, nonnulli locos communes, quibus inscribuntur cuncta notatu digna, quæ ad rem hanc spectant, sive ab autoribus, sive ex aliorum observatione, ea didiceritis; ut facilius tantarum rerum multitudo & varietas observata in memoria habeantur, si quando de re quapiam disputandum est) operæ precium existimavi modum atque ordinem locos communes componendi vobis præscribere, qui jam paululum hanc scientiam degustastis, atque eadem inescati estis. Nam prosus rudibus hæc erunt inutilia, quæ nunc dicam de Florilegio. Libros chartaceos sex, aut septem, aut octo pluresve capite (prout vultis titulos extendere, ac diffusius observanda adnotare) ex viginti quinque foliis constantes; quinterniones vulgus chartariorum vocat. Ex iis fiat volumen, cujus foliorum paginæ facies, tam dextra, quam sinistra, duabus per longitudinem interfecetur lineis, quibus medium faciæ intercludatur, & tria loca diversa ejusdem magnitudinis constituantur in utraque paginæ facie. Inscribentur supra in fronte singulis locis sui tituli, qui tres erunt, relicto tergo paginæ omnis inscriptionis vacuo, donec frons

Christophorus
à Costa.
Nicolaus Mo-
nardus.
Garcia ab
Horto.

Pet. Bellonius.

Andr. Cæsal-
pinus.

Dalechampii
historia Plan-
tarum.

Calpar. Bau-
binus.

Jac. Taber-
næmontanus.

Ioannes Co-
stæus.
Aloysius An-
guillara.

scriptis observationibus repleta sit. Tunc enim, & tergo eadem inscriptiones inscribenda suis locis, & nova charta, si opus, addenda. Volumen hoc in tres partes dividatur: prima contineat, quæ de Plantis in genere dicuntur; altera singulas Plantarum species complectatur: tertia quaestiones, quas tamen etiam poterimus, si lubet, prædictarum duarum partium locis inferere, ad quos pertinere magis videbuntur. In his tribus prius agendum historice, mox Philosophice, ut causæ omnium quæ in historia enarrantur, doceantur: sic differentissimus Theophrastus historiam à causis separat. Hunc autem ordinem in primis laudare debeo, eo quod si aliquis Commentarios de hac materia exactissimos scribendi desiderio teneatur, statim paucis mutatis, eadem serie cuncta, quæ annotavit, describere ac in libros congerere facillime possit. Hinc quoque perdifficiles quaestiones, quæ multorum autorum indigent testimoniis, quæque diligens examen requirunt, eodem ordine sunt tractandæ: ne dicendorum serie in prioribus libris (in quibus breviter opinio de similibus controversiis animadvertenda) interrupta, lectoris mentem à propofita re avertant, ac in morosissimam lectionem deducant. A forma Plantarum in tribus partibus semper incipiendum est; deinde ad accidentia deveniendum, quo nomine generationes, affectiones, loca, vitæ, ususque comprehenduntur. Forma enim accidente nobis notior, à notioribus nobis in hac Philosophia procedere oportet.

C A P. XIX.

Tituli quales; quo ordine in locis Florilegii scribendi.

Tituli vero primæ partis Florilegii tales fere sint, eoque, quo hic leguntur, ordine disponantur. Quid sit res, aut Philosophia Plantaria: ejus antiquitas, dignitas, præstantia, utilitas. Inventores, & in quot partes hæc Philosophia dividatur. Scriptores rei Plantariæ, Græci, Latini, Arabes, & alterius idiomatis. Subiectum ejus, & quid sit Planta. Ejus differentia unde sumantur: quantum ab animali differat. De partibus Plantæ propriis, communibus, earum definitione. Partium familiarium differentia formales, & accidentales. Partium dissimilium communium differentia, & earum partes aliæ. Partium propriarum communium dissimilium differentia. Plantarum divisio in summa quædam genera. Quid Arbos, Frutex, Herba, Oler, Frumentum, Legumen, & ejusmodi. De Plantæ actione, & ejus facultatibus. Plantarum generatio quot fiat modis; quæ sponte, quæ è femine. Terra, locus, tempus anni, sydera quid conferant ad generationem. Terrarum locorumque differentia. Semen quomodo terræ mandandum, & quando. Quamdiu semen duret ut terræ mandari possit. Quo die è femine quæque Planta erumpat. Quæ partes primum è femine prodeant, & qua serie omnes nascantur. De Plantarum augmento, & perfectione. De fructuum maturitate. De alimento, & excremento. De succo, lachryma, gummi, eorumque differentiis. Plantæ, quæ aliis innascuntur Plantis. De Vita, & quæ longioris, ac brevioris. Terra, locus, tempus, anni sydera ad vitam quid conducant. De annuis Plan-

tis, & perpetuis. Partes quæ diutius in vita perdurent. De radice perpetuis. De caule, & ramis perpetuis. Quæ nunquam perdunt folia, flores, fructus. Abortus; Monstra. Plantarum mutatio in alias species. Partium mutatio, foliorum, florum, & aliarum partium. Contractio, apertio & similia. Odores Plantarum quot: & quæ odorata, quæ inodora. De saporibus, & eorum differentiis. Quæ saporem habeant, quæ non, & qualem: Item paucis Plantis eundem saporem per omnes partes diffundi, ut & odorem. Sympathia, & antipathia. Morbi intrinseci, & extrinseci, communes, proprii. Animalia quæ in Plantis generentur. Quæ aliunde genita noxam Plantis afferant. De interitu totius Plantæ, & partis alicujus. De cultura. Quæ sine cultura vivere nequeant: Item quid sint agrestes, & mites Plantæ. Arandi tempora. De fossione. De Rigatione. De Stercoratione. De Transilatione, & reliquis similibus culturæ operibus. Infusio, inoculatio. Instrumenta ad culturam. Remedia ad morbos. Usus Plantarum in homine, & primum de alimentis, de medicamentis. Facultates earumque dignotio. Plantæ quæ totæ, quo tempore ad usum colligendæ, & quomodo servandæ: tempus, & modus colligendi ac servandi earum partes: ad quæ, & alia pharmacopæcorum & unguentariarum opera pertinent, quæ quisque in plura capita dividere poterit, uti etiam usum in brutis, atque inanimatis. Materies quæ fabris, quæque igni conficiendo idonea: ubi etiam de cædenda materie. Tam enim varius est Stirpium usus, atque multiplex, tam varia usus consideratio, ut paucis verbis, ac summatim percurri nequeat. Quod si vero quispiam in reipub. literariæ commodum libros de re Herbaria exactissime conscribere velit, atque ideo quoque de causis agere eorum, quæ in historiis dicta sunt, eum oportet sub iisdem titulis causas annotare, easque postea eodem fere ordine singulari libro recensere, quod parvo cum labore facere poterit. Secunda autem pars particulares cujusque stirpis tractabit historias, ac causas: hoc est formam; tempus, quo seminetur, nascatur, augeatur, floreat; locum, quo gignatur; culturam, ulum, & si quæ sunt alia, quæ non cunctis Plantis communia sunt, ea animadvertet, & eorum dem rationes, si pervestigari possunt, subnectet. Ideo singuli locorum tituli singulas Plantarum species continent, quarum multa extat apud veteres & recentiores memoria. Tres, quatuor aut quinque species, quarum natura non admodum adhuc celebrata est, sub uno titulo comprehendat: aut uno generico nomine, omnes species quæ sub eo continentur. Verbi gratia, non opus est singulares, ac proprios facere titulos de Fago, de Robore, de Subere, de Illice, sed uno nomine, nimirum Quercus, omnes intelligere, ac significare, alioqui cum sit immensa, & incredibilis stirpium multitudo, secunda hæc pars Florilegii in magnam nimis molem excreceret. Pauca admodum sunt Plantæ, quæ non ad aliquod genus reducuntur, seu nomen habeant, five eodem careant. Cæterum cum ordo, & ad doctrinam exactius tradendam, & ad memoriam plurimum conducatur; qualis ille in hac secunda parte, quæ tam innumerabilem Stirpium copiam amplectitur constituendus sit, ut facile tituli

tituli reperiantur, docendum est. Video multos qui libros de Plantis particularibus in publicum protulere (talís namque tenendus est ordo, qualis in libris componendis observatur) elementorum, hoc est literarum ordinem, quem alphabeticum appellant, dilexisse, Plantis, quarum nominum elementum primum A est, prius positís. Alii à totius stirpis formæ differentiis ordinem sumentes in quatuor summa genera eas dividunt, Arborem, Fruticem, Subfruticem, Herbam; progrediunturque à perfectioribus, & notioribus ad imperfecta, & minus nota. Sunt autem perfectiores, notiores nobilioresque Arbores Fruticibus, Frutices Cremiis, Cremia Herbis. Nam hæc omnium imperfectissimæ, utpote, quarum magna pars, aut floribus, aut fructibus, aut foliis, aut caule destituatur. Verum quam sit confusus, qui à literarum serie sumitur ordo, norunt ii, qui multa sæpe privatis quibusdam speciebus indita nomina non ignorant: qui Plantas admodum natura dissimiles conjungi hac ratione vident: qui nil fere penitus, præter nomen communium elementa sic memoriæ tradi non nesciunt: qui denique à Philosophiæ præceptis abhorreere hunc ordinem omnino conspiciunt. Laudandi sane sunt, qui à summis generibus ordinem sumunt; quod nullus ordo pulchrior, ac pro memoria fructuosior sit, quam qui à forma desumitur. Summa hæc genera in plures species communiores distinguuntur, donec ad infimas, atque individua perveniatur. Theophrastus quoque hunc ordinem servavit: si quidem prius de Arboribus, mox de Fruticibus, deinde de Cremiis, tandem de Herbis in Historia tractat: singulaque hæc genera in *ἕμια*, i. mitia, & *ἀγρία*, i. agrestia paritús est: semperque de mitibus, vel si mavis, horrensisbus primum veluti magis notis, mox de agrestibus, tanquam minus notis. Vocat mitia, quæ à nobis coluntur, ac nostra opera mansuefiunt ciculanturque: agrestia vero, quæ sponte sine ulla cultura proveniunt, nec facile aut unquam cicurari possunt. Falsum enim est in aliquot Stirpibus, quod

putant Hippocrates & Plato, Plantas omnes natura agrestes cultu *ἐμμερῶδες*, id est, mansuescere, ut ex Piraistro, Olea sylvestri, & reliquis discere licet. In animalibus idem accidere autor est Aristoteles, qui in historia animalium, & libro Problematum scribit, esse nonnullas feras, quæ nulla ratione mansuescere possunt; ut leonem, pantheram. Porro cum Aristoteles divisionem animalium in mansuetas & fera improbarit, quoniam *ἐμμερῶδες* formalem differentiam non designat, similis Plantarum divisio haud multum laudanda. Magis autem placeat Andrææ Cæsalpini partitio, qui à fructuum varietate horum generum divisionem secundam sumpsit. Est enim fructus pars omnium reliquarum nobilissima, notissima, ipsa denique Plantæ perfectio, & ob quam magna ex parte quasi à natura conditæ Stirpes videntur. Pulcherrimus sane hic ordo, multumque cum Philosophiæ legibus consentiens. Sed & à radicum differentiis non minus utilis ordo colligi potest, quam à fructuum. Etenim docebit Plantæ partem, cujus contemplatio sæpe ab hujus studii amatoribus prætermittitur, quam quia non ita ut reliquæ partes sub conspectum cadat, sed terra occultetur, ea ratione fructu ignobiliorem censent, minusque notam nobis. Prius tamen nota nobis radix esse debet, quam cæteræ partes, quod sit omnium Stirpium principium, nec ulla pars communior omnibus. Verum quia de fructuum & radicum differentiis satis superque dictum est, non erit opus ea repetere, ut titulos hujus secundæ partis Florilegii recenscamus, cum ex iis quivis in hoc studio paululum versatus hos accipere poterit. Quod si vero cupiam novos titulos condere, difficultatem pariat, is libros Cæsalpini, quorum nunc facilis est occasio, perlegat, atque ex ejus ordine titulos tot quot velit deducat. Peregrinæ autem plantæ quarum pars aliqua, qua magis utimur, tantum cognita est, singulari sunt titulo complectendæ, ne, qui prædictum ordinem rumpere nolit, has negligenter omitat.

FINIS SECVNDI LIBRI.



A D R I A N I S P I G E L I I
B R V X E L L E N S I S
E P I S T O L Æ
Q V Æ D A M.

E P I S T O L A I,
An Animal sine corde vivere possit?

Ad Perillustrem Virum,
D. GVILELMVM SOHIERVM,
Amicum suum.



N coena nudiusquartus nobiscum ita locutus es mihi Sohiera: Quæ ista est tam diligens eruditorum viro-
rum commemoratio? quæ digna vel Ciceronis commentariis historia, ut bovem sine corde vixisse narrent? Subjungi ego quod inferre volebas, potestne bos excors vivere? Proh hominum fidem! Potestne, inquam, bos excors vivere? Adferat quisque quod velit, immolante Cajo Casare in tauri opimi extis cor non fuisse; adjungat etiam in iis animalibus, quæ exanguia sunt, cor non inveniri: nunquam tamen mihi persuadebit cor ulli animalium quod sanguinem habet, unquam defuisse. Magna, inquires, Caji Cæsaris auctoritas, magnumque testimonium. Dic igitur fodes, inquis, quo avolavit? quis id, dum bos macretur, abstulit? quis, dum immolaretur, eripuit aut arte furatus est? an larium aut deorum aliquis, quos ipse Imperator tunc temporis coluit, id ipsum eripuit? aut cor aliquo morbo consumptum ante macrationem opinari licebit? Nullo modo, inquam; sed copiosa pinguedine sua in tauri visceribus ita fuisse occultatum, ut omnino exta immolanti Cæsari, non autem diligenter velut Anatomico perscrutanti, non comparuerit: præsertim cum animalia sanguinea quo pinguiora sunt, eo quoque minus hoc viscus habeant. Neque id tibi mirum videri debet, cor in pinguibus animalibus latere posse: Annis enim superioribus, plurimis in Theatro Anatomico monstravi, cor struthiocameli tanta pinguedine oblitum, ut facile Anatomæ minus perito Imperatori fidem facere potuisset etiam huic avi cor defuisse. Tanta enim est ad vitam animalium sanguineorum cordis necessitas, ut Peripateticorum Princeps etiam iis quæ sanguine carent, cordi proportionem respondentem partem assignarit. Cor esse in omnibus, quæ id habent, quod ultimo moriatur, experientia quotidiana monstrat, & in omni animali corde vulnerato profunde vel ablato mortem illico consequi. Quapropter ut mundum sine sole constituere naturæ non licet: sic animal, quod sanguineum est, sine corde formari non potest. Quod clarius cognoscas, si mecum actionem pro-

priam cordis, quam aliquando in publica anatome auditoribus proposui, tecum repetes. Vale, Patavii, XVI I Junii C I T I O C X X I I.

E P I S T O L A I I,
An cor Germanici Cæsaris cremari non potuerit, & cur Morbo cardiaco & veneno interempti signa.

A D E V M D E M.



Noties Vitas Cæsarum perlegis, quas Cajus Suetonius edidit, toties scribis te admirari ea, quæ scripsit de Cæsaris Germanici morte, scilicet ejus cor (cum corpus de more Veterum post obitum cremaretur) comburi non potuisse. Ego profecto, ut verum farear, sapius de veritate hujus historiae dubitavi, cum viderem cor non ex aliis constare partibus, quam iis, quæ cremari possunt; carnibus nempe, venis, arteriis, membranis, & pinguedine. Sed cum ego quoque in alios gravissimos auctores incidissem, Cajum Plinium, qui lib. XI, cap. XXXVII Naturalis historiae, cor Germanici Cæsaris cremari non potuisse testatus est: & in Iacobum Thuanum nostri temporis nobilem historicum referentem in bello, quod Helvetii inter sese gesserunt pro religionis mutatione, Tiguriis victis, Zuinglium quandam fortiter pugnans in primis ordinibus occubuisse: religioni, ut ipse ait, tributum à Tigurinis & qui cum illis stabant, quod cadavere flammis ab hostibus tradito cor exuri non potuerit: ad causam aliquam, quam petis, potius confugere fui coactus, præsertim cum veterum nonnulli & recentiorum expostulasse eam, & invenisse viderentur. Etenim Plinius ad duas causas videtur retulisse, quod cor Germanici Cæsaris cremari non potuerit. Nempe vel ad morbum, vel ad venenum. Negatur, inquit, cremari posse iis qui cardiaco morbo obierint. Negatur & veneno interemptis. Certe extat Oratio Vitellii, qua reum Pisonem ejus sceleris coarguit, hoc usus argumento: palamque testatus non potuisse ob venenum cor Germanici Cæsaris cremari. Contra genere morbi defensus est Piso. Recentiores nonnulli id cordium proprietati adscripserunt, cum constet, in quibusdam corporibus humanis partem esse quandam, in quam nil ignis possit: sicuti de majore dextri pedis articulo Pyrrhi Epirotarum regis memoria est proditum, qui corpore rogo de more absumpto una cremari non potuit. Ego vero hic operæpretium duco istas Plinii

Plinii causas curiosius explicare, & indagare an morbus cardiacus aut venenum ignis vim in corde tollere possit, aut ejus substantiam mutare. Sane prius est explicanda oratio, ut ea debeat intelligi. Equidem existimo temporis tractu horum virorum corda cremari potuisse, sed longe diutius quam alias solet igni resistisse, ac sic superstitione id fuisse animadversum, aut hyperbolice à nostris majoribus enarratum. Ita quoque de Salamandra creditum fuit, canente Q. Sereno Sammonico,

Sæu Salamandra potens nullisque obnoxia flammis.

At Aristoteles Salamandram per ignem ingredi non ex visu, sed ex auditu prodidit; ut & Dioscorides: proculdubio quod cæteris animalibus magis igni resisteret. Imo si tantum ignis apponas, aut carbonum accensorum, quantum satis est ad comburendam & enecandam lacertam communem, vel grandiorē serpentem, videbimus ei vix quidquam noxæ accidere, sed ignem potius extingui: sed si plures carbones accensi addantur, fiatque magna flamma, etiam Salamandram comburi. Hoc quotidie observare unicuique est commodum. Idcirco Galenus lib. iv de compos. medicam. secundum loca, cicerem Salamandræ præscribit in medicamentis: & lib. de simp. medicam. facult. Salamandram combustam. Sunt itaque de corde incombustibili, ut de Salamandra hyperbolice scripta. Quapropter inquirendum, quomodo cardiaco morbo & veneno potuerit cor Cæsaris Germanici diutius quam alia corda igni resistere. Ego existimo copiam sanguinis, præcipue viscida, lenti, mucosique & crudi id posse efficere quotiescunque nimio opplentur sinus cordis tam dexter quam sinister. Nam si inspicias modum quo cadavera cremantur, id plane reddetur probabilius. Etenim quando primum omnes partes uruntur, externæ prius cremantur, inde internæ. Itaque si plenum id sanguine sit præsertim viscido, mirum esse non debet quod diu igni resistat. Inde pater causa, cur à morbo cardiaco mortuorum cor non tam cito, quam aliorum comburatur; in eo enim morbo sanguis externas partes relinquens ad interiora repit, & maxime ad cor. Quod facile eo probatur, quia exteriores partes in eo frigeant, interiores caleant; pulsus quoque iis sint parvi & vermiculantes, & priusquam adveniat passio etiam intercepti. Præ copia enim sanguinis in sinibus cordis contenti cum non possit cor commodè systoles & diastoles motu cieri, contingit suffocari agros, repenteque mori, nisi ipsis sanguinis missione succurratur. Notæ sunt historiæ ab hoc affectu mortuorum, quem cardiacam syncopen nonnulli appellaverunt, in quibus venæ cavæ & arteriæ magnæ truncus sanguine concreto plenus fuit, qui alias in mortuis concrefcere non solet. Ex iis enim incisis oblonga sanguinis coagulati pars unita extrahebatur. Porro fluit hic sanguis ad cor & cordi vicinas partes, vel quia impellitur aut à frigidis assumptis, aquæ videlicet frigidæ potu (à quo non pauci post valida exercitia vel aliunde calefacto corpore de repente sunt extincti) aut ab exterius admotis, ut quando menstruata mulier balneum aquæ frigidæ æstatis tempore ingreditur. Congelatur vero in vasis, vel quia crassus est, viscidus, lentus,

melancholicus; vel quia sit supra modum refrigeratus ab internis & externis. Venena quoque id faciunt; ut ob hanc causam non fuerit à ratione alienum, quod de Pisone suspicabantur, eum Cæsarem Germanicum veneno sustulisse, contingit enim id quoties spiritus & sanguis in arteriis & venis refrigerantur, & ingens ejus copia vas utrumque implet. His igitur de causis fieri potuit, quod cor nonnullorum difficulter potuerit cremari. Iis etiam adjungam signa, per quæ medicus cognoscere poterit an qui mortuus est à sanguine concreto in venis, propter venenum sit mortuus, an propter morbum. Venenum quod cito hominem de medio tollit, profundum somnum inducit; hoc ingravescente excitatur quidem ager, non relevatur: sed tarde ad mortem properat. Quod si venenum ad tempus fuerit datum, paulatim conglobabitur & coalescet sanguis, & cum omnia vasa non obstruat, quædam propter acquisitam acrimoniam aperiet, ut propterea concretus sanguis è naribus prodeat, aliquando etiam ab ano extrahatur. Hi tamen, ut bene animadvertit Petr. Salus Diverfus lib. de Affect. partic. cap. xv, liquato hoc sanguine & proprio calore resolutio moriuntur. At quæ à cardiaca syncope communiter mors supervenit, longe alio modo accidit. Vale.

EPISTOLA III;

De

Incerto tempore Partus

Ad Inclytos Germanos in Gymnasio Patavino LL. Studiosos.



Nter eos sermones, qui in convivii Nobilium, & Iuris Medicinæque peritorum hominum adferri solent, animadverti sæpius quæsitum dubitatumque, an Mulier præter septimum, octavum, nonum, ac decimum menses, alios habeat, quibus legitime foetus humanus in lucem prodire possit? Vtilisque omnibus, ac gravis, imo & perdifficilis visa hæc quæstio semper fuit. Nam si præter nominatos menses non sint alii, recte erit legibus imperatoris sancitum, septimo mense natos post patris obitum, vel octavo, nono, atque decimo, legitimos tantum censeri debere bonorum paternorum hæredes; cæteros vero spurios & exheredes: sin etiam spatio duodecim, tredecim, quatuordecim, quindecim mensium uterum ferre mulierem posse dicamus, reprehendendus tum Vlpianus, qui post decimum mensem editum nullum ad hæreditatem admisit; tum alii qui, si forte contingat à primo nuptiarum die, sexto mense nasci infantem, oppugnant pudicitiam honestarum virginum & viduarum; renunciant iis repudium, quas firmiter credunt ante primum mariti congressum ex alio concepisse. Sed & perobscura cunctis apparet hæc quæstio, tum propter summam philosophorum & medicorum contradicentium sibi auctoritatem, tum propter mulierum & obstetricum Historias haud satis approbatæ fidei; causarumque

Quærit nulli.
tam.

vari

varii temporis partus incomprehensibilem naturam. Ego autem cum longe aliter de pariendi tempore sentiam, atqui illi, qui hæcæus quippiam de eo publicis scriptis sensisse videntur, ita tui, unica hac Epistola meam opinionem, vestrum quorundam iussui parens, perscribere.

Imprimis autem scire convenit partus tempus, aliud esse naturale, aliud præter naturam, antequam utriusque temporis causa proponatur. Partus tempus naturale illud appello, quod solet à mulieribus ut plurimum observari, quale est, quod terminum habet à septimo mense usque ad decimum, forte etiam undecimum. Nam Arist. Hist. de animal. lib. vii, cap. xv, ait, nonnullas mulieres undecimum mensem attingere. Per menses intelligendi sunt ii, quibus lunæ cursus complentur. Sed non est necesse, ut exacti hi omnes cursus compleantur, veluti Paulus vester lib. xv sent. tit. ix putabat, quando dicit *natum septimo mense pleno ad ius trium liberorum acquirendum prodesse matri*. Sufficit enim interdum, ut hocce mensium partus attingant, vel ingrediantur. Ita Hippocrates in lib. de septimestri partu inquit: *Septimestres autem nascuntur diebus centum, & octoginta duobus & dimidio & insuper accedente diei particula. Si enim primi mensis dies quindecim suppositi fuerint, deinde quinque mensium dies centum quadraginta septem ac dimidium. In undecaginta enim diebus quam proxime duo menses perficiuntur. His igitur sic habentibus, ad septimum, mensem superant dies plures viginti, & est tota summa dimidius anni una cum aliquantula diei parte ad partem accedente*. Neque computare oportet primum mensem conceptionis integrum, sed mutilum, aut dimidium pro integro quandoque. Statuatur enim mulier, quæ (exempli gratia) uno die, vel altero, ante plenilunium conceperit, hujus quindecim, vel sexdecim dies mensis lunaris, qui sequuntur usque ad novilunium, pro integro mense sunt reputandi; ita ut primus mensis sit quindecim, vel sexdecim dierum; reliqui vero quinque, qui sequuntur in septimestri partu, pleni esse debent viginti novem dierum cum dimidio. Septimus rursus ut sit integer atque plenus non est necesse: dummodo excedat quindecim vel sexdecim dies; aut, ut loquar secundum Hippocratem, viginti dies habeat, qui computati cum diebus quindecim, vel sexdecim primi mensis, quo facta est conceptio, efficiunt integrum mensem qui sextus est pauculis diebus superabundantibus, septimi mensis initium constituentibus, quibus septimestris fit partus. Quod erat nobis clarius explicandum, ne incidereamus in eorum opinionem, qui putabant sufficere pro septimestri partu; ut primus mensis conceptionis esset trium vel quatuor dierum; & septimus rursus unus, alterius aut plurium dierum, quibus fit partus. Exempli gratia: Conceptus sit aliquis penultimo Martii, qui in lucem edatur primis diebus Septembris, hunc illi septimo mense natum arbitrabantur, & sic quinquemestrem natum, prout loquuntur nostræ fœminæ exactis quinque mensibus secundum usum nostri Calendarii cum pauculis diebus reliquis; vel, ut clarius adhuc loquar, cix die natum septimestrem esse concludebant: quoniam ab eo attinguntur primus mensis pauculis diebus ultimis, & postremus, qui ipsis appellatur septimus suo initio, quinque

mensibus intermediis solaribus, aut lunaribus integris.

Tempus autem præter naturam illud statuo, quod ante septimum, vel post undecimum mensem solet nonnunquam, etiam raro, contingere. In hoc præcoces partus, qui ante septimum sunt, ab abortu distinguendi sunt; quoniam & hi isdem temporibus evenire putantur. Abortus est immaturo fœtus exclusio, partus vero maturi. Maturitatem fœtus non illam intelligo, quæ angustis circumscripta terminis, fœtus humani summam illam perfectionem continet, quam in fœtu maxime sano, & naturali tempore excluso videmus; sed quæ latioribus terminis contenta id habet perfectionis, quod sufficit, ut fœtus in lucem editus supervivere per plures dies, vel menses, vel annos queat; etiam si prodierit in lucem non integre conformatus, siue unguibus, siue pilis, siue palpebris, aut labris, aut auribus nondum disjunctis; siue firmatis, vel in quibusdam partibus vix inchoatis offibus; quali imperfectione solent laborare illi, qui ante septimum mensem, & in septimo pariuntur. Sic rursus abortus non modo secundo, tertio, quarto, quinto & sexto mensibus accidit; sed etiam septimo, octavo, nono, atque decimo contingere queat; ita tamen, ut illi abortus sint secundum naturam, hi vero præter naturam. Nam qui fœtus naturali tempore erat excludendus, hic quoque naturali tempore poterat esse abortus ante septimum mensem: qui vero non naturali tempore partum expectabat ultra undecimum mensem, hunc etiam existimo abortum posse appellari in septimo, vel octavo, vel nono, vel decimo mense si excludatur. Porro quod quinto, vel sexto mense à conceptu partus eveniant vitales, docent historiae non ignobiles clarorum virorum, qui paulo ante nostra tempora floruerunt. Hieronymus Montanus Henrici xi, Galliarum Regis Pincernam novit, qui cum quinto mense natus esset, nihilominus ad floridam ætatem pervenit. Cardanus uxorem Petri Sormani, qui Mediolani vinum Creticum vendebat, ostendisse sibi scribit filiam Claram nomine, quæ centum & sexaginta octo diebus post abortum masculi quadrimestris Venetiis prodierat in lucem. Ferdinandus Mena scribit haud absurdum videri debere, si quinquemestris partus vitalis editus sit apud Valentinos. Apud Madriti incolas nonnullos observatum sensit ex pudica matre, honestissimamque vivendi rationem observante natum esse quinquemestrem. Franciscus Vallesius quinquemestrem puellam refert suo tempore duodecimum ætatis annum ingressam fuisse. Sed existimo hocce quinquemestres natos fuisse omnibus mensibus quinque plenius, ita ut in sextum mensem ex perfecta nostra supputatione incidere poterint. Sic Avicennas refert libro nono de Nat. Animal. capite ultimo, sexto mense natum bene vixisse. Verum præter similes historias, quas ex aliis autoribus, & viris atque mulieribus approbata fidei adferre possum, succurrit mihi, cum essem adolescens, me novisse tabellarium quandam, qui erat dimidius pumilio, quadraginta annorum, magno capite, literasque ferebat ex Zelandia in Bataviam. Hic urbis Mediburgensis testimonio publico omnibus com monstrabat se sexti mensis initio editum, corpore exiguum,

Partus tempus duplex: Naturale.

Lacus Hipp.

Præter naturam.

Præcoci partus ab abortu quando distinguendi.

Maturitas fœtus quæ.

Abortus naturalis & præter naturam.

Quinquemestris exco-

Seximestris exco-

exiguum, & viribus ita debilem, atque ossibus infirmum, ut mater coacta fuerit gossypio circumductum ad frigora fovere, donec robur acquisiverit, quo posset fasciis circumligari. Neque haec omnes historiae contradicunt auctoritati Aristotelis, qui lib. vii. Histor. de Animal. cap. iv, scriptum relinquit, foetum qui maturus quam septimo mense prodit, nullo pacto vitalem esse. Cum enim id rarisime contingat in tanta hominum multitudine, nasci nempe hominem sexto mense, nunquam contingere Philosophus dixit, aut sane non naturaliter, sed ex accidenti. Similiter post undecimum mensem natos vitales fuisse multorum quoque & veterum, & recentiorum narrationibus comprobatur. Auctor ejus libri, qui Historia philosophica inscribitur, & inter Galeni libros spurios circumfertur: *Timaeus*, inquit, *duodecim mensibus partum gestari credit: novem tamen eos interdum existimari, interdum & septem, quia non semper statim à conceptione mensura supprimantur*. Nec videtur ab hac sententia Homerus abhorruisse in *Odyssae*, undecimi hinc carminibus, quibus *Nepheus* Nympham alloquitur à se compressam.

*Χαίρε γύναι Φιλότις, περκαομένης δ' ἐν αὐτῇ
Τέλει ἀγλαά τινα,
Latere mulier concubitu, circumactio enim anno
Pares palchros filios.*

Vbi Eustathius *περκαομένης δ' ἐν αὐτῇ* interpretatur *συμπαραπαιρούμενης*, id est, anno exacto, aut completo. Sed Phavorinus Philosophus apud Agellium vult significari affecto anno, non confecto: vel annum Homeri temporibus non fuisse duodecim mensem, ut nunc; sed decem, ut olim apud Romanos Romuli tempore: & apud Aëolas quoque constat priscis temporibus annum fuisse decem mensem, Homerumque Poëtam in Aëolide natum. Verum duodecimo mense naturaliter hominem nasci, quemadmodum opinatur Timaeus, id solus partus frequentissimus, qui observatur in multis regionibus à primis nuptiarum diebus, satis redarguit. Nam semper fore cadit in nonum ac decimum mensem, & præcipue in Belgio, ubi mulieres videntur multis aliis plurimarum regionum fecunditate antecellere. Sed quod præter naturam accidere quoque possit, ut foetus prodeat maturus in lucem mense duodecimo, etsi nullum adhuc habeam exemplum, non negabo. Quia ultra duodecimum mensem decimotertio, decimoquarto, decimoquinto, prorogari aliquando partum, tum veteres, tum recentiores nobis narant. Lex apud Britannos adhuc viget (quæ eorum monstrat cautam bonitatem non incautam, veluti nuper quidam spectatæ eruditionis existimavit) ut maritus jubeatur prolem agnoscere, hæredemque habere anno post aut amplius natam, quam ipse ultimo ab uxore discesserit. Plinius lib. vii, cap. v, *Massurius*, inquit, *auctor est L. Papirium Prætorum secundo hærede lege agente bonorum possessionem contra eum dedisse, cum mater partum se xiii mensibus diceret tulisse, quoniam nullum certum tempus pariendi statutam videretur*. Cardanus quoque patrem suum decimotertio mense natum scripsit. Avicenna, ut videre est lib. ix de Animal. narrat, fide dignam mulierem decimoquarto mense peperisse foetum cum dentibus, & bene supervivisse. Ego quoque in manuscripto codice, qui

apud me extat, legi Bellocatum hic Patavii excellentissimum medicum aliquoties in publicis lectionibus narrasse discipulis suis, sororem eruditissimi Viri Buccellæ Patavini per sexdecim menses uterum tulisse, & cum omnes eam molam concepissem existimarent, peperisse filium optime formatum. Omitto monstruosiores partus viginti trium mensium, & duorum, imo etiam quatuor annorum, quorum mentionem fecit Hieronymus Mercurialis in consiliis. Neque etiam hæc reclamant Aristoteli, quando dicit, *qui diuturniore tempore quam undecimo mense nasci videntur, latere putantur: quæ enim mulieres horum conceptus initium, si cum ante inflatus fuerit uterus, ut saepe accidit, post coierint, atque conceperint. Hoc enim principium esse sui conceptus existimant, quod simile indicium attulit. Quæ quidem Philosophum non ex sua sententia, sed ex aliorum potius experimentis dixisse in verbis citatis manifeste apparet. Desumptus enim est hic locus Arist. ex libro de septimestri partu, quem alii ad Hippocratem, alii ad Polybum autorem referunt. In eo enim hæc leguntur: *Ceterum quæ longius, quam decem mensium tempus uterum gestare sibi visa sunt (nam hoc saepe jam audivi) ille ipse hoc modo, quem dicturus sum, decepte sunt. Quum uteri spiritum acceperint in seipsos, à ventre statim exhibente elevantur ac intumescent, contingit enim hoc, videntur sane mulieres tunc concepisse: præterea si menses non procedentes congregati fuerint in utero, & diutius manserint, semper profuunt in uteros, aliquando una cum statu à ventre, aliquando etiam calefcentes, & sane tunc quoque in utero habere mulieres sibi videntur, nimirum mensibus non prodeuntibus, & uteri elevati. Deinde aliquando menses sua sponte erumpunt, aut aliis supervenientibus à corpore ad uteros, & priores protrudentibus, & statim egreditur: & multis jam statim post mensium purgationem uteri hiant, & ad pudendum revertuntur, & tunc variis permixta ad se genituram concipiunt eadem die, aut omnino in paucis. Existimant autem inexperte harum rerum ac rationum etiam illo tempore se in utero habuisse, quando menses non prodibant ipsis, & uteri erant elevati ac tumentes. Verum profecto decipere uterum inflatus potuit mulieres ignaras signorum verorum conceptionis, at gnaras non facile. Nam præter mensium suppressionem & ventris tumorem, adfunt adhuc alia signa conceptionis in utero, rigor à coitu, pudendorumque siccitas, & coarctatio, nausea, ciborumque fastidium. Quod si contingat, ut conceptionem aliquando præcedat tumor uteri à flatibus, & mensibus purgationibus suppressis, hic tamen tumor solet evanescere rursus, antequam concipiatur mulier. Cautiones enim foeminae animadvertunt ventrem detumescere, & menses corruptos, qui in utero conclusi detinebantur, expurgari, & flatus prodire: Deinde vel quinquagesimo, vel sexagesimo, vel septuagesimo, vel octuagesimo die saltim foetus, qui primus est ejus motus, quando vitam accipit. Et differt hic motus à motu uteri flatu aliove humore corrupto distenti, quod ille motus est instar cancri incipientis moveri, ut referunt foeminae suis pedibus veluti se distendentis, non tamen moventis se de loco ad locum; at hic uteri motus est veluti sublatio atque depresso, si in loco permaneat, vel de sinistro in dextrum, vel in contrarium transitus. Quamobrem prudenter Parisienses, ut**

Quomodo etiam hæc non repugnant Arist.

Motus foetus, qui differt à motu flatus.

*Menstruorum
naturalis de-
fectus quan-
do.*

testatur Gotofredus, viduæ approbarunt partum decimiquarti mensis, propterea quod hæc apud mariti qui obierat propinquos, & hæredes vixisset, diligenter ab horum uxoribus custodita, quæ idcirco de intacta ejus pudicitia post partum testimonium præbere erant coactæ. Nec debet ejusmodi res nobis admodum nova & incredibilis videri, cum in aliis quibusdam rebus simile quid contingere videamus. Desinunt enim plurimis foeminis menstrua circa quadragesimum annum; nonnullis, si hoc tempus excefferiat, circa quadragesimum quintum usque ad quinquagesimum. Ultra hoc tempus nullam foeminam posse protrahere menstruas purgationes, præter omnes medicos testatur quoque Aristoteles. Nihilominus tamen Nicolaus Massa animadvertit mulierem Venetam circiter sexaginta annos natam ex septuagenario sene concepisse puellam manibus & pedibus destitutam. Tacebo Saram, & Elisabetham, quæ anno ætatis septuagesimoquinto conceperunt, ut sacra literæ attestantur. Sic juvenula quædam in Belgio ex octuagenario concepit, cum tamen mares post sexagesimum, vel ad summum septuagesimum annum non extendere generandi vim credantur. Iam & in feminis generatione, & annis pubertatis quanta varietas? Fuerunt virgines, quæ decimo, atque adeo nono concipere potuerint. Nonnullis (quod in Germaniæ quibusdam regionibus frequens est ob otiosam & sedentariam vitam, præsertim apud Nobiles) anno decimoseptimo, decimooctavo, decimonono, aliquando vigesimo fluere prius menses ceperunt. Nascitur homo sine dentibus, cum eos sexto, vel septimo mense edere soleat ab ortu; tamen cum dentibus natos fuisse, & apud Romanos Dentarum cognomen adeptos, in veterum monumentis legimus. Sexcenta sunt ejusmodi in rerum natura, si quis omnia enumerare vellet, in quibus reperiemus tempora amplius terminis circumscripta. Sed jam ad incerti temporis partus causam veniamus, seu naturale illud sit, seu præter naturam.

*Incerti partus
temporis cau-
sa ex inter-
stitia aliorum.*

Antoni.

Nonnulli ioter eruditos existimarunt, quod homo ad coitum non haberet certum tempus, multiplici victus ratione uteretur, phantasiæ, & variis animi perturbationibus obnoxius esset omni hora atque tempore, propterea incerto tempore parere. Verum hæc causæ nimis mihi videntur remotæ; quæro ego aliquam propiorem. Hæc nulla alia meo iudicio esse potest, quam maturatio & perfectio foetus, quæ fit in incerto tempore, & variis mensibus ob facultates corpus foetus gubernantes, vel debiliores, vel robustiores. Facultas autem debilis, vel robusta sit, aut ex semine, cui inhaeret tanquam in suo principio; aut ex accidenti, apti scilicet alimenti penuria, ob quam nequeunt ossa firmari, corroborarique adeo spiritales, naturalesque partes, ut debito tempore, cum in lucem prodire debet foetus, neque flexere movereque se in utero, neque lac sugere, ore ac naribus spiritum ducere queat, & sic nutririque augeri. Quod autem in semine insit facultas citius, aut tardius maturandi foetum, si uterus bene se habuerit, ex eo manifestum est, quod illi foetus, seu masculus fuit seu foemineus, qui maturius solent se movere in utero, maturius quoque in lucem proferri

confueverint. Motus enim primus nonnullis trigesimoquinto die evenit, aliis ut plurimum quadragesimo, quinquagesimo, & longe tardius. Et quid est, quod vetat aliquem primum motum noucitius, quam quarto, vel quinto mense edere, quando ea vis erat in semine, & propterea quoque nasci secundum communem circuitum duodecimo, vel decimoquinto mense. Nam Hippocrates lib. 1. Epidem. dicebat: *quidquid in septuaginta movetur, in triplicitate perficitur.* Hanc periodum annuens lib. de alimento hunc in modum loquitur. *Ad figuracionem, soles tringintaque; ad motum, septuaginta; ad perfectionem, ducenti & decem. Alii tradunt; ad formam, quadraginta quinque; ad motum septuaginta sex; ad exitum, ducenti & decem. Alii sic; ad formam, quinquaginta; ad primum saltum, centum; ad perfectionem, trecenti. Alii sic; ad discriminationem, quadraginta; ad transitum, octuaginta; ad elapsum, centum & quadraginta.* Sed recte subiungit: *Non est, & est.* quasi vellet dicere hæc periodos sæpe variare pro seminis natura & aliorum accidentium viribus. Quadragesimo die conceptum masculi foetus multarum mulierum experimentis diffimus primum se movere, foeminei vero septuagesimo; nihilo tamen secius & foemineum aliquando quadragesimo die moveri cepisse in mulieribus animadverti. Cæterum penuria alimenti, quæ corporis foetus debilitat facultates, contingit vel matris vitio, nempe morbo aliave causa externa; vel foetus ægritudine, quam sibi ex pravo matris alimento, vel copioso nimium acquisivit. Nam plurimis quoque morbis foetus in utero matris corripitur, & veterum auctoritate didicimus, & foetuum dissectione scimus. Memini me ante triennium Olmutii (quod Moraviæ provincie est Metropolis) accersitum ad mulierem hydropicam, & quotidianis vertiginibus oppressam, gravidam tamen, quæ, cum prius ex certis signis, & obstetricum censura se gravidam esse crederet, nono mense præterito, nec alioquin subsequente partu, imo nullo saltu foetus, aut motu in utero percepto, & aqua ex matrice quotidie effluente, dubitare coepit non modo de vita foetus, sed etiam de conceptione. Ego post quadam conceptionis signa, quæ supra recensui, eam mihi narrantem se exactis circiter sex septimanis altaci fluvialis (quem gambarum vulgus hic vocat) motum in dextro latere in utero animadvertisse, parituram dixi masculum, uti conjiciebam, sed debilem: ac nunc propter debilitatem aut non moveri foetum in utero, aut debilitate moveri: motum ejus debilem jam non commode ab ea posse sentiri, propter aquam in abdomine circa matricem circumfluentem, quæ motum foetus, utri ad partes sensibiles circumstantes non fineret pertingere; suspicarique me tardiorē hunc fore partum, quod foetus & debilis esset, & pravo alimento nutrire-

*Foras in ute-
ro multum
morbus obno-
xius.*

tur, atque idcirco serius matureceret. Nec fuit inanis hæc mea conjectura. Nam quadragesima tertia septimana, postquam per quadraginta dies continuos magna aquæ copia per uterum exiisset, masculus foetus in lucem prodit. Quod si in nobis jam natis conspicimus ægrum corpusculum parum, interdum vero nil nutririque, nisi vires recolligat: nonne similiter idem quoque nobis licebit opinari, foetus ob morbum posse differri maturationis

tionis suae tempus, & exitus ex utero, usquequo debitam, confirmatis facultatibus particulas quasque corporis gubernantibus, perfectionem acquirat? Videmus eos, quibus corporis potentiae robustiores sunt, citius quoque perfici ac nasci. Septimo mense natos foetus plerumque mares esse, foeminas raro minusque vitales. In pomiferis aut alterius generis arboribus cernimus non omnes eos fructus, quorum uno eodemque tempore flores veris initio arbor proferebat, simul maturefcere ac decidere: sed aliquos vel folis calore privatos, vel ventis aquilonaribus expositos, vel grandine, aut nebula laesos, vel facultate attrahendi, & concoquendi sibi alimentum languidos, diu adhuc arboribus, postquam alii deciderunt, inherere, donec maturentur. Quocirca existimandum est, maturitatis foetus celeritatem vel tarditatem partum accelerare, vel tardare: causamque, quod foetus in lucem prodeat, non esse ejus magnitudinem aut inopiam alimenti, ut veteres nonnulli somniarunt, sed ipsam foetus maturitatem, seu talem perfectionem, qualis requiritur, ut editus in lucem ore alimentum, naribus spiritum capere queat. Nam videmus multas matres minimos foetus parere, & tamen hosce magnum incrementum corporis crescente aetate acquirere: aliquando rursus maximos foetus in lucem proferre, atque etiam gemellos: deinde post partum & gemellos, parvos magnosque foetus solo lacte, quod in uberibus generatur, nutrire, non dicam per mensem unum vel alterum, sed per annum plusquam dimidium, quod alioquin fieri nequitquam posset, si mulier pareret, vel foetus ex utero exiret ob magnitudinem suam, vel alimenti inopiam. Etenim qui sanguis fluit post partum tanta copia ad ubera, nonne ad uterum quoque fluere poterat pro nutriendo diutius foetu? Porro qui superius causam incerti temporis partus retulerunt in coitus incerta tempora, varias victus rationes, phantasias, & diversos animi affectus, hac sua opinione decepti sunt, quod existimant cetera animalia statuto tempore parere, equam uno anno, elephantem secundo, & sic unum omnibus esse praefinitum pariendi tempus, quod falsum esse & ratio & auctoritates ostendunt. Etenim alia animalia pleraque observatum est haec habere eandem causam

incerti temporis pariendi, cum homine communem. Ideoque Absyrtus Veterinarius praestantissimus, etsi equam undecim mensium curriculo, decemque dierum uterum gerere scribat; Varro tamen libris de Re Rustica inquit: *quae post id tempus nascuntur, fere inutilia & vitiosa existere*. Sic Aristoteles elephantem biennio uterum gerere tradidit; at Strabo, Diodorus Siculus, Arrianus in Indicis, menses ut minimum sedecim, ut plurimum octodecim. Eadem varietas & in canibus observatur. Nam constat ex Aristotele, canum alias quarta, alias quinta, alias sexta anni parte uterum gestare, eosque qui maturius in lucem prodierant, catellos pluribus diebus caecos permanisse; qui vero diutius in utero commorabantur, oculos post partum aperuisse: id etiam nunc à venatoribus, qui diversas canum species gubernant, in ejusdem speciei canibus notatum est. Sed & nostrae foeminae, quae custodiunt gallinas, quandoque ova animadverterunt, post omnes alios pullos exclusos, quae pullum ab incubatu continebant ita immaturum, ut adhuc quinque, sex & plurium dierum incubatu indigerent. Nec est, quod quispiam hoc evenire ex inaequali ovorum incubitu suspicetur. Nam Iacobitae, quae prope Caicum & Alexandriam habitant, hypocausta habent, in quorum fornacibus multa ovorum millia uno eodemque tempore tepido calore, & aequali fuscitamento, cum hominum stercorebus fideis accensis, & lini stipitibus mensibus Martii, Aprilis, & Maji excluduntur, hique notant priores pullos prodire vigesimo primo die; sed deinceps alios secundo post hos dies nasci; alios rursus tertio, quarto, nonnullos etiam quinto, & tardius posse, si curiosius indagarent. Hic quoque in Italia, & ubique locorum observare licet ea femina, quae erucas producant, filum sericum nentes, etiam si omnia duorum vel trium dierum spatium fuerint ex alvo papilionum exclusa, proferre nonnunquam suos vermiculos quam tardissime, scilicet post mensem à primis natis. Quamobrem si cetera animalia bonorum possessionem, imo etiam regnorum hereditatem haecenus, ut homines adiissent, incerti quoque partus eorum tempora in hunc usque diem haud nos latuissent. Haec habui, quae de muliebri partus tempore scriberem.

Qua in fornacibus excujat.

In animalibus parienti tempore incertum.

F I N I S.



INDEX TOMI SECVNDI,

In reliqua SPIGELII opera.

<p>A.</p> <p>A Bies, 116. ejus candici fungus adnascitur, <i>ibid.</i> Abortus duplex; naturalis & præter naturâ, 152 Abûnthio depelli mûcas & tabanos equis noxios, 108 Abûnthitis vinum, <i>ibid.</i> Acacia altera Matthioli Cythisi species, 122 de Acanaceis, 131 Acanthium est carduus, 131 Acanus, 131 Acerba inodora, 141 Acerbus sapor, 138. unde, 140. cum amaro miscetur, 138. frigiditatem indicat, 140 Acer sapor, 138. unde, 140. plerumque cum amaro jungitur, 141. caliditatem arguit, 140. Acetarium ad occidendum lumbricum latum, 107 Acetum contrarias habet facultates, 139 Acidulas in Germania usurpandi modus, 56 Acidus sapor quis, 138. unde fiat, 139. frigiditatem indicat, 140 Acinus quid, 130. Pomi genus, <i>ibid.</i> Aconiti genera, 131 Aconitum lycoctonum, <i>ibid.</i> Acorus ubi nascatur, 141. ejus radix geniculata, 117 Acria & salsa excitant expultricem testium & valorum assistentium facultatem, 136 Acris sapor, 138 Acris & dulcis sapor in Myrrhîde, 138 Actuarum unicum lumbricum latum nasci ait, 99 Adamantis vires contra insomnia turbulenta, 41 Adeps leoninus, 41 Ægyptii habent lumbricum latum, 104 Ælianus notatus, 83 Æmilius Macer, 146 Ætas quæ requiritur in generatione lumbrici lati, 98 Ætates quatuor ejusdem lumbrici, 104 Actii opinio de materia lumbrici lati, 94. de loco generationis ejusdem, 97 Actio quid <i>ἀδυναμία</i> <i>μὴ βεβαιότης</i>, 101 Agaricum non esse in substantia venenum, 37 Ἀγρια <i>φύλη</i> quæ Theophrasto, 149 Agitatorium, ἰλατὶ <i>ἐκ</i> Gazæ, 145 Ἀγρίμων quid, 120 Ala in plantis quid, 116 Albugum, ἀντίμελον & ἀντιδιδύμ <i>ἐκ</i> Gazæ, 145 Alcea, 128 Alexipharmaca, 137 Alimenta omnia dulcia, 144. κατὰ φύσιν an nutriant, 144. medicamentosa omnia, 143. quomodo in corpore nostro mutantur, 143</p>	<p>Alimenti nomen quid denotet, 143. duplex acceptio, 144 Alimento pauco nutriuntur insecta, 102 Alimensorum differentia, 143. inventricis ratio & experientia, 144 Alimentum cur & quomodo à lumbrico lato devoretur & absumatur, 102. 103 Alimentum materia lumbrici lati quibusdam statuitur, 94 Alimentum plantarum ubi coquatur, 114 Alimentum quid, 134. de eo multa, 143 Allii elus per triduum contra lumbricum latum, 107. suffumigio aer alterandus, 108. succus, venenum, 145 Aloe inodora fere, 141 Aloisus Anguillara, 147 Alterantia occulta proprietate, 137 Althæa, 128 Alvi profluvio ejusdem lumbricus latus, 101 Amara calida & sicca, 140. inodora, 140. 141 Amarum sapor quis, 138. quomodo gignatur, 140. caliditatem indicat, 141. odoris grati primordium, 142. ejus potestas, 140 Amygdala, 130 Amygdali quando floreat, 114 Anagyris differt à Laburno, 122 Andreas Cæsalpinus, 121. ejus ordo in libris de stirpibus, 147 Androsæmon Hyperici species, 128 Aemone à ranunculo qui differat, 127. ejus radix, 127 Anguria, 129 Animal sine corde an possit vivere, 150 Animalia ex sanguine brevioris vitæ, 99. magna ex parva mole nascuntur, 96. magna pauca numero proferunt, parva plura, 97. magnis an lumbricus latus annumerandus, 93. quamnam lumbricum latum habeant, 89 Animalibus plantæ comparandæ, 114. eorum ventri radix plantarum similis, 115. in iis tempus pariendi minime certum, 155 Anisi folia, 119 Anni constitutionis vis, 63 Annorum trium vel quatuor ætatem excedere lumbricum latum non posse qui probetur, 99 Annus veterum quantus, 153 Anodyna quæ, 136. in sanguinea arthritide, 77 Anthrinnum, 129 Antidota Tralliani ad arthritidem, 181 Antidotus Auctoris ad podagram, 76. Auctoris ad semitertianam, 42. lumbricaria, 107 Antimonium præparatum, 104. calcinatum vires, 38 Apes robustiores ad duodecimum annum perveniunt, 99. ex verme proveniunt, 87. vita earum inter exanguia longissima, 99 Apicius de re cibaria scripsit, 147 Apii radix, 117 Apios species Tithymali, 124 Apoplexiæ non valde accidunt lato lumbrico laboranti, 100</p>	<p>Appendices stirpium, 116 Apulejus, 146 Aqua ad aperiendos meatus cutis & abstergendas fordes, 41. ad pestem, & hemitritæam pestilentem, 43. plurima in intestinis reperta una cum tænia, 102 Aquæ Carolinæ, 106. Eggeranæ, <i>ibid.</i> Grægnanæ, <i>ibid.</i> Sualbacenes, <i>ibid.</i> Tetitianæ, 56. 106 Aquæ porui indulgent qui lumbricum latum habent, 101 Aquarum thermalium vis in lumbrico lato expellendo & occidendo, 106. salis item ad eundem usum, <i>ibid.</i> Aquifolium, 130 Aquosus sapor, 138 Aranea <i>Ἰνέρι</i> Eliano, 88 Arborea <i>ἀνέμοι</i>, 120. cachrin productus, 116. frondes cur habeant, 114. fruticibus perfectiores, 149. magnæ ex parvo semine, 96. magnos fructus ferentes, 97. mites ex fructu cognoscuntur, 130 Arborum divisio, 129. earum brachia, 127 Argemone, 114 Argentum vivum, 107. additur unguentis ad lumbricos occidendos, <i>ibid.</i> Ari radix cocta alimentum est, 144 Aristolochiæ radix uterum purgat, 127 Aristoteles apodas quas aves vocaverit, 115. insecta, quæ pariunt, vermem à coitu facere alerit, 87. latum lumbricum animal dixit, 93 Aristoteli <i>ἀνέμων</i> quid, 102. contraria sententia in lib. 19 de Morbis, 99. excrementum duplex, 94 Aristotelis libri duo de Plantis, 146. locus explicatus, 96. opinio de saporum differentitiis, 139. sententiæ de septimæstribus & quinqueæstribus & undecimæstribus exempla opposita, 152. Armenii populi lumbricum latum habent, 104 Artemisia cur <i>μονέκλον</i> dicta, 118 Artes pulcherrimæ unionibus similes, 112. omnium studia difficilima, <i>ibid.</i> Arthriticis quæ noxia, 83. ab Arthritide qui sint immunes, 72 in Arthritide qui morbi terminentur, 72 Arthriticis quid, 67. ejus synonymia, & definitio, <i>ibid.</i> improprie dicta, <i>ibid.</i> à siccitate quomodo fiat, 71. à simplici humore raro oritur, 70 Articuli innumeris constat lumbricus latus, 100 Articulus quid, 67. an ab internis causis efficari possit, 72. imbecillitas à quibus causis proveniat, 67 Ascarides cito generantur, 95. nascuntur in intestini crassi parte inferiore, 97. in intestino cæco equorum geniti, 88. plures gignuntur, 97. tertium genus lumbricorum, 88. a Celso omissum, <i>ibid.</i> Ascyron hyperici genus, 128 Asinus sætus singulos parit, 97 Asphodeli</p>
--	---	--

I N D E X.

Aphodeli radix,	117	& tabanus aquis infestus,	ibid.	ad Chyli quandam formam reducitur	
Astringens sapor quis,	138	Cantharides ex cynorrhodi spongia,	116	pituita à capite destillans in fetu,	97
Athenæus,	146	Capparis radix grandis,	117	ex Chylo consistare lumbricum latum,	95
Athenienles lumbrico lato carent,	104	Capreoli in plantis quid,	116	Cibi quando in excrementa celeriter	
Aristoteles quid Aristoteli,	102	Caput & jecur fontes arthritidis,	69	mutentur,	103
Avenæ semen quale,	124	Caput lumbrici lati ultimo mori,	100.	Cicer legumen,	129
Averrhoes,	146	caudam primo consumi,	ibid.	Cichorei & chondrillæ discrimen,	122
Aves apodes quæ,	114	Caput papaveris, 128. radices,	116	Cicuta non est quarto gradu frigida,	134
Avicennæ prognosticum de lumbricis,	103	Cardamomum ad tæniam occidendam,	106	Clices habent lumbricum latum,	104
Aurium tinnitus mulieri lumbrico lato		Cardiaci morbi efficacia in alterandis		Cingulum pro tænia accipitur,	93
laboranti,	102	cordibus ad resistendum igni,	151	Cinamomum siccum tantum olet,	141.
Austera inodora,	141	Carduorum genera,	131	ejus cortex & matrix,	118
Austus sapor quis, 138. qui genere-		Carduus aræophyllus,	131	Cinara est carduus,	131
tur, 140. cum acerbo numquam mis-		Carduus fullonius, 131. stellatus, 128		Claviculæ,	116
setetur,	138	Carnem generantia,	136	Clysteres quales in lumbrici lati curatio-	
Autores veteres de re herbaria,	145	Carnes & oblonia absque pane mulier		ne damnentur,	107
Autumno ad justam magnitudinem per-		lato lumbrico laborans comedeat &		Colici doloris in semiterianis febribus	
venit lumbricus latus in leuciciis,	199	quando,	110	causæ, 51. signa, 52. curatio,	53
		Carnis abstinentia quando imperanda,		Colicos dolores facit lumbricus latus,	
		107. jus longum,	144	103. teres etiam, 100. curatio eorum,	
B.		Carolus Clusius,	146		107
Bacca,	130	Caro pars plantæ similis,	114	Colicus dolor unde spurii nomen ha-	
Baccifera plantæ,	ibid.	Cartilago,	117	beat, 56. ejus causa, ibid. materia &	
Bayeri cataplasma ad arthritidem,	78	Caryocostini electuarii descriptio,	74	quomodo illa transeat in vesicam,	57.
Balaenæ,	129	Caryophyllorum genera,	125	ejus curatio, ibid. species hieæ cur in	
Balnea artificialia, & naturalia pro ar-		Caleus veteratus mollis,	107	is vitandæ, 55. itemque cætera pur-	
thritide, 80. quomodo administrari		Cassavi, panes indici,	145	gantia,	ibid.
debeant,	81	Castanea non est quercus,	129	Colo intestino innasci lumbricum la-	
Balneum alvi profluvium quomodo		Cataplasma anodynum Paschasi,	77.	tum qui medici fenserint,	97
causare possit, 81. aquæ dulcis pro		contra lumbricum latum, 107. Galeni		Colocynthis, 140. 141. pellit lumbricum	
calida arthritide, 81. Auctoris pro		ex calco, 82. pro tophis articulo-		latum,	104
arthriticiis, 79. in usu ejus Germano-		rum,	ibid.	Color radicum, 117. 118. foliorum, 118.	
rum error,	80	Cataputia minor,	124	foliorum florum, 119. seminum & fru-	
Bateca,	129	Cato,	147	ctuum, 120. violaceus,	125
Bilis ubi generetur, 63. ex ea teretes		Cauda radices,	116	Colostrati infantes qui,	98
lumbrici,	95	Caudex arborum caulis,	114	Colostrum purgat infantes nuper natos,	98
Bitumen brevissimo tempore lumbricos		Cauli quadrato qualis ordo foliorum,	119	Columella,	146
interficat,	107	Caulis quid, 114. interdum floris pedi-		Concoctio omnis à calore,	
Blattaria, verbasum est,	124	culus,	115	Concoctus difficilia quomodo deprehen-	
Blitum tricolor,	118	Caulium differentia,	118	dantur,	145
Boeotia innasci lumbricum,	104	Causa conjuncta arthritidis,	67	Coni & conaria quid,	130
Bombycum erucæ, 87. papilionæ, ibid.		Causæ antecedentes ejusdem, 69. exter-		Conifera arbores,	ibid.
Bos singulos parit focus, 97. interdum		nae,	ibid.	Consolidæ quæ herbæ,	121
latum lumbricum habet,	ibid.	Cauteria in arthritide,	73	Constantinus Cæsar notatus,	87
Brafica acris & amara, 138. lac gi-		Cedria occidit lumbricum latum,	106	Convulvuli seu smilacis flos,	119
gnit, 136. ejus filia, 119. μονοπερι-		Celi prognosticum de lumbricis latis,	103	Convulsioni quomodo providendum,	107
Penæ,	ibid.	Celsus duo tantum lumbricorum genera		Corallina juniorum, 106. unde sic dicta,	
Bulbi cur fibras subitus habeant,	115	enumerat,	88	Cor dicitur plantarum medulla,	115
Bulbonaca,	125	Centaurii majoris radix dura, 117. mi-		Cor Germanici Cæsar. an cremari non po-	
Bursa pastoria,	129	noris exigua,	118	tuerit, 150. minus semper est in pin-	
		Centaurium jacea est,	128	guibus,	ibid.
C.		Ceratum excellentissimum ad topicos,	82	Coris hyperici genus,	128
Achrys pilula,	116	Cerebrum dicitur plantarum medulla		Cornu cervinum cum melle linctum tæ-	
Caecos,	131	nonnullis, 115. juvatur odoribus,		nias pellit,	106
Cæpæ succus potus venenum est,		Cerevisia quænam vitanda,	45	Cornu papaveris,	128
Cæsalpinilibri de Plantis, 147. opinio de		Certhus,	129	Corona imperialis Lillii genus,	125
herbæ & cremii significatione,	121	Chalcanthum, ejusque oleum, 104. pe-		Corporis pigrities signum lumbrici lati,	
Calamus aromaticus siccatus tantum		riculosum si propellendo lumbrico la-			101
olet,	141	to exhibeatur,	ibid.	Corpus gracile fit lumbrico lato labo-	
Calida in primo gradu, 134. in secun-		Chamæiris,	126	rantibus,	101
do, ibid. tertio, ibi. quarto, ibid. urinam		Chamæleon albus an habeat pediculum		Corpus radices,	116
an magis ciant, quam frigida, 135		caulemve, 115. ejus radix,	106	Corroborantia articulos,	75, 79
Caliditatem indicantes sapores,	139	Chamæmeli florum præparatio,	40	Cortice quænam partes vestiantur,	115
Calidos sapores non omnes denotare		Chelidoni majoris luccus, 113. radix,		Costa plantaginis,	113
eundem caliditatis gradum,	ibid.	Xipholus,	117	Costus ex aqua calida ad occidendum	
Calidum indiget alimento,	102	Xipholus,	129	lumbricum latum,	106
Calyx florum,	115	Chermesina purpura,	117	Cremium quid, 120. herba perfectius,	
Calor cum tenui materia,	140	Chinæ decoctum in arthritide, 76. in		119. significatio ex mente Cæsalpini,	
Calore fit concoctio,	141	femiteriana,	40		121
Calor innatus & spiritus format ex pi-		Chondrillæ etymon, 122. & Cichorei		Crines,	116
uita animal,	95	discrimen,	122	Crudi succi qui,	144
Campana peregrina, 126. cæruleæ flos,		Xipholus,	123	Cucumeri-pepo,	129
Canes paucis annis lumbrico lato labo-		Christophorus à Costa,	147	Cucumeris semini familia parit lumbric-	
rant,	100	in Chrysalida mutari bombycum erucas,		cus latus,	99
Cannabis semen, 108. herba ad muscas			87	Cucumerum genera,	129
				X	Cucur.

I N D E X.

Cacurbita, 129
Cacurbitinus vermis Arabum, 89, 91. dicitur lati articulus esse, 90, pro lato quibus sumtus, 88
Cacurbitula in arthritide, 73
Culis principum vermis, 87
Curatio arthritidis, 73. lumbrici lati difficilis, 103. necessaria, 103. ejus duo genera, 104
Culis live membrana plantarum, 113
Cyanus jacez species est, 128
Cyclaminis radix, 117. utrum purgat, 137
Cyperii genera, 123. radix, 117
Cylthi genera, 132
Cylthius inter frutices, 122

D.

Δελιρσιον quid, 121
Deliria quibus non valde accidunt, 101
Dentaria nodosa, 116
Diafcardium Francafortii, 42
Differentia arthritidis, 67. inter signa latumbrici & teretis, 100
Digitalis flos, 119
Dioclis verba citata, 144
Dioscorides cur chamaeleonem album αλεων vocarit, 115. ejus libri, 146. ejus Malabathrum sine radice esse falsum putat auctor, 115
Discutientia in arthritide, 79
Diuretica, 135
Dolores sedandi potestatem qui tollant, 102. sedantia, 102
Donoicum, 131
Dracunculus Aeginetæ est animal, 93. in carduelis coxa inventus, 96
Dryopteris dulciberba, 138
Dulces quasdam radices venenosas esse, 116, 129
Dulcia nutriunt nos, 144. caliditatem in dicant, 139
Dulcis sapor, 138. unde, 140. cum acerbomilicetur, 138. non indicat excessum caloris primi gradus, 139. ejus cum pingui discrimen, 140

E.

Elephas singulos parit fetus, 97
Ελεφανς in solis intestinis nasci, 87
Ελεφαντος quid, 106
Ελεψ quid, 87
Emolliendi vis unde, 135
Emplastrum Fallopi anodynum, 78
Εντομα quid Græcis, 87
Epilepsia non valde accidunt lato lumbrico laboranti, 100
Epithymi Attici vis, 137
Επιθελην medicamenta, 107
Equis singulos fetus parit, 97
Equi laborant lumbrico lato, 89. eorum vermes cucurbitini, 93. quomodo illos defendant Pannones à muscis & tabanis, 108
Equisetum, 126
Error in topicis arthritidi applicandis, 71
Eruca vermis est, 87. ejus fetus in semine positio qualis, 96
Elichoratica, 134
Equis species Tithymali, 124. à Linaria quomodo distinguatur, 123. radix ejus ad lumbricum latum valet, 104

Evacuante occulta proprietate, 137
Evacuatio aliqua suppreffa podagram causat, 63
Ευδαι & ευδαιμον non sunt synonyma, 88
Ευδαι & ευδαιμον, 139
Euphorbium ad lumbricum latum, 104
Exanguia brevis vitæ, 59
Exasperatus quæ, 135
Excrementum Aristoteli duplex, 94. materia lumbrici lati, 104
Exercitia moderata, 108
Experientia facienda in sano corpore, monstrat alterantes facultates, 142. & nutrientes, 144. & occultas qualitates, 143. quomodo fiat, 142. Audoris in radice hileis, 106
Ex speciebus semitertianæ prædictio, 27
Externa remedia pro lumbrico lato occidendo, 107

F.

Faba legumen, 129. laxavit patris alvum, 143. facilius aliqui quam ora concoquant, 145
Fabius Columna, 17
Facultas expultrix cur ad intestina potius, quam alio humores propellat, 51
Facultas plantis duplex est, 134. 135. prima quæ, 134. secunda, 135. tertia, 134.
Facultatis alterantis primæ secundæque gradus, 134
Facultatis plantarum indagandæ ratio, 137
Fagus, 129
Fames canina signum vermis lati, 101. cur hoc laborantibus illa superveniat, 102
Febre semitertiana laborantibus cur & quibus conveniat vinum, 44. tertiana laborantes quando cibandi, & quoties in die, 45. & quibus horis, 46. oporiet vitare debent, 46. & species hæræ, 55
Febrem nullam, five sit benigna, five maligna, requirere venæsectionem, 31. omnem non esse cum pulsu inæquali, 61. quarantam nonnumquam fieri ex b. l. 64. semitertianam omnem requirere venæsectionem, 31
Febres insignes non valde accidunt ægrotanti ex lumbrico lato, 100. intermittentes quando periculo, 103
Febres semitertianæ exquisitæ & non exquisitæ, 4. intermittentes quoque esse, 3. propriæ & improprie, 2. spurriæ, 2. ubi putredinem suam omnes habeant, 8
Febres semitertianas anno c1310c11 in Italia fuisse frequentes, 15
Febres φθινδεις, 23
Febribus semitertianis aer qualis conveniat, 44. destillatum longum cur non conveniat, 44
Febriticantibus & lato lumbrico laborantibus qualia medicamenta conveniant, 105
Febribus materiæ motus unde fiat, 63
Febri semitertianæ quinam populi magis minisque obnoxii, & quo tempore, 22. & quenam ætates & sexus, 23
Febribus continua periodica exquisita an dari possit, 4
Febribus longæ signa, 27
Febribus qualis mulierilumbrico lato laboranti, 101
Febribus quotidiana quomodo à duplici

tertiana distinguatur, 21
Febris semitertiana an bonum corporis habitum invadere possit, 14. an sit symptomatice vel primaria, 12. cur à paucis medicis animadvertatur, 22. cur detur sine jecoris affe. & one, 63. vera primi ordinis, 2. secundi ordinis, 2. unde habeat nomen, 1. unde horrida dicatur, 1
Febris semitertiana quomodo distinguatur, à tertiana continua, 17. à tertiana simplici, 18. à tertiana duplici, 18
Febris semitertiana clysteres quales possit, 39. Purgationes quando petat, 36. quanam requiratur venæsectionem, 32. & seqq. quantum sanguinis extrahendum, 34. sanguifugas an, & quando concedat, 34. scarificationes an ubi, & quando adhiberi permittat, 34
Febris semitertianæ quatuor species, 2
Febris semitertianæ causa antecedens posterior, 14. causæ externæ quæ & quot, 15. crises & judicationis modi, 25. curatio cur nec à Galieno nec alio quopiam è veteribus fuerit tradita, 31. materia ubi generetur, 14. ejus motus unde fiat, 63. minoris typus, 19. paroxysmus quamdiu duret, 1. prædictio ex regionibus, ætatibus & anni temporibus, 27. secundi ordinis Gal. & magni hemitritæ barbarorum typus, & quæ in eo notanda, 18. signa ex quibus fontibus lumentur, 22
Februm quarantarum locus, 10. semitertiarum longe durantium signa, 27
Fernelius notatus, 68, 69
Fibra quid Theophrasto, 113. illa venæ assimilata in plantis, 113
Ficus fructus sine flore, 114
Ficus infernalis, 128
Ficus fructus cito per alvum transit, 144. radix, 117
Figura caulium, 118. foliorum, 118. foliorum florum, 119. radicum, 117. seminum & fructuum, 120
Figura vires plantarum non cognosci, 138
Filicis laus & virtus, 105. an sit suspecta mulieribus, 106. radicem dulcem habet cum adstrictione, 106. in ejus assumptione quæ diæta sit servanda, 107
Filiæ flore & semine caret, 115
Flutulentia non augent semen, 136
Florentes plantæ inspiciendæ prius, 132. ex flore quæ herbæ cognoscantur, 121
Flores non ob fructum dari stirpibus, 114
Florilegium quid, ejusque conscribendi modus, 147. tituli, 148
Floris flamina, filius, folia, umbilicus, 116. ejus nomine quid denotetur, 119
Florum differentia, 119. papilionaceæ, 119. partes, 115. partes diversæ in foliis, 142. pediculi interdum caules, 115. usus in plantis, 132
Flos Aphricanus, 125
Fluxio à capite & jecore quomodo fiat, 68
Fluxionis imminens signa, 69
Foeniculum totum calefacit, 141
Foenamgræcum trifolium est, 122
Fœtus motus quomodo differat à flatu, 153. multis in utero morbis obnoxius, 154
Fœtis unguentum pro arthritide, 79
Fœtida ad uteri suffocationem, 142
Fœtida

I N D E X.

Fœtida cujus temperamenti, 142
Fœtus maturitas quæ, 152. in utero lac fugit & quomodo, 94. an ei innascatur lumbricus latus, 98
Folia ad quid plantis data, 114. ex quibus partibus consent, 115. eorum differentia, 118. partes propriæ, 116
Folia florum quæ, 116. eorum differentia, 119
ex Foliis quæ plantarum genera cognoscantur, 121
Forma plantæ quid Auctori, 113. cuique plantarum speciei propria, *ibid.* ea primum discenda, *ibid.* lapsus inspicenda, 132. ejus diversitas à partium varietatibus, 113
Frigida in primo, secundo, tertio gradu, 134. valde inimica lumbricis, 104
Frigiditas & siccitas in tenui materia, 140
Frigiditatem indicantes sapores, 139
Frigidi aquosum facile congelatur, 99. nullam in quarto gradu cognitum auctori, 134
Frigis à calida materia quomodo oritur, 68
Fructum quæ ferant sine flore, 114
Fructus nomen quid significet, 120. differentia, 120. partes, 116. umbilicus, 116
ex Fructu quæ stirpes cognoscantur, 121
Frumetacea, 124
Frumenti genera, *ibid.*
Frutex quid, 120
Fructes trifolii, 122
de Fungis Clusii liber, 127
Fungorum venenum, 137
Fungus abietis, 116. quintum plantarum genus, 121

G.

Galeni liber introduætorius citatus, 89. explicatus, 87. de simplicibus, 146
Galenus cum Theophrasto conciliatus lumbricum pro animali agnovit, 93
Galeopfidis flores, 124. florû folia, 119
Galla in foliis quercus & sâlvæ, 116. in Lædo alpino Clusii, 116
Garcias ab Horio, 147
Gaspar Bauhinus, *ibid.*
Generatio lumbrici lati qualis, 94
Geranii genera, 128
Germanorum Plâstici, 88
Tis *image*, 87
Tis *quid*, 130
Tis *quid*, 98
Glandifera arbores, 129
Glans qualis fructus, 130
Gluten ad glutinandas plantas in florilegio, 133
Glutinantia, 137
Glycyrrhizæ contrariæ facultates, 139
Gradus temperamentorum in plantis ut cognoscantur, *ibid.*
Gramen unde dicatur, 124. ejus species, *ibid.*
Graminis vulgaris radix, 117
Grammaticis quid *σκῆληκες* & *σκῆλημα*, 87
Granum tinctorum, 117
Gratiolæ herbæ vis, 105
Gravidæ falsa signa, 101, 102
Gravidis an noccat filix, 106

II.

Hederæ floris vires, 141
Heliotropium, 131
Helleborus pro lumbrico lato, 104
Hemitritæus, unde Febris semitertiana, 125
Hemerocallis, 125
ad Hepar ascendit lumbricus latus, 101
Herba paralytici, 124
Herba, quid, 120, 121
Herbarum usus multiplex, 134
Hermodyctylatæ descriptio, 74
Hermodyctyli quando usurpandi in arthritidis, *ibid.*
Hermolaus Barbarus, 146
Hesperis, 125
Hieracii genera, 123
Hieracium flore purpureo, *ibid.*
Hieronymus Tragus, 146
Hippocrates citatus, 87, 152. explicatus, 98. duo lumbricorum genera novit, 88. quid intelligat per ramentum intestini, 89. latum lumbricum animal dixit, 93
Hippocratis opinio falsa, 149
Historiæ memorabiles, 80, 91, 101
Hirudo aculeatum os habet, 90. vermis est, 87
Hiucæ indicæ plantæ vis memorabilis, 144
in Homine nasci lumbricum latum & quando, 98. diutissime is vivit, 100
ad Hominis ætatem an perveniat lumbricus latus, 99
Homo omnium finis, 134
Hordei semen, 124
Horti hyemales quomodo parandi, 133
Humeæntes sapores.
Humeæntia in quibus febribus & quomodo sint usurpanda, 39
Humida, quæ, 135. facile putrescunt, 144
Humidum aquosum facile corrumpitur, 99
Humor plantarum, 113
Humore dulci & pingui ali lumbricum latum, 100
Humorum mixtionis duæ species, 6. putrescentium in febribus loci plures an unus, 67
Hyacinthi genera, 127
Hyacinthus comosus albus, 127. indicus, *ibid.*
Hydratica facta mulier à lumbrico lato, 103
Hydropici ventres cur fiant à lumbrico lato, *ibid.*
Hyeme consumitur lumbricus latus in leucisco, 99
Hyoſcyamus non est frigidus quarto gradu, 134
Hyperici genera, 128
Hylopitæ vinum, 108

I.

Iacææ genera, 128
Iacæa montana Dalechampii non est jacea, *ibid.*
Iacobus Dalechampius, 146
Iacobus Tabernæmontanus, 147
Ibicus, 123
Idon *γρηγορία*, 145
Iesimni flos, 114
Illum intestinum est locus generationis lumbrici lati, 101. in eo etiam plerumque degit, 98

Ilex coccigera, 117
Ilex quercus genus, 129
Inappetentia lumbricis teretibus laboranti accidit, 101
Indicationes curativæ & præservativæ arthritidis, 73
Indurantia medicamenta, 135
Inodora nullam qualitatem manifestam indicant, 140
Insecta brevem vitam habent, 99. paucos alimento indigent, 102. ex animalibus sui generis procreata vermem faciunt, 87. sanguine carent, *ibid.* vermes dicuntur, & cur, *ibid.* quædam pariunt sui simile animal, 99
Infectorum obscura nomina veteres vermem exposuerunt, 87
Insipida possunt esse frigida in tertio gradu, 139
Insipidus sapor, 138. unde, 140
Intemperies causa proxima arthritidis, 67
Intestina divellantur à lumbrico lato, 100
in Intestinis tenuibus generari lumbricum latum, 97
Intestinorum genera duo, 97. interior tunica an in lumbricum converti queat, 94. lupinorum præparatio ad semiterianam, 53. ramentum quid Hippocrati, 89
Iutybææ herbæ, 122
Iobannus Camerarius, 147
Iobannes Costæus, 147. Ruellius, 146.
Thalius, 147
Iridis genera, 126. radix geniculata, 117. radix siccata plus olet quam viridis, 141. tripolitanæ flos, 126
Iridi fructus sine flore, 114
Iris ubi nascatur, 110
Iuglans cæchin fert, 116
Julius Cæsar Scaliger, 145
Juncus, 123. floridus Matthioli est cyperus rotundus auctori, 123. odoratus, *ibid.* triangularis, *ibid.*
Ius carnis longum, 44

K.

Kακοδρῆμα, 139
Κακοδρῆμα, 114
Καὶ γὰρ, quid, 142
Καίριον, 130
Κίελα Arabum, 125
Κίελα & Κερίο, 89
Κκῆδῶ quid, 120
Κοκκῶ, 117
Κοκκῶν, 129

L.

Lacertæ in intestinis genitæ, 83
Lac gignentes herbæ, Polybo quid, 94. ex mammillis subtrahit lumbricus latus, & cur, 102. filicis usu redditur mammillis quod erat subtrahendum, 106. in utero matris fugitur à foetu, 94. purum quibus præberi debet, 107. purgans infantes nuper natos, 98
Lactariæ herbæ, 124
ex Lactæ clyster, 107
Lactis boni indicia, 98. ejus esu affici laborantes lumbrico lato, 101
Lactuca cum oleo & aceto utilis, *ibid.*
lac in mammis profert, sylvestris, 124
Lavigandi vis unde, 135
Lagopus trifolium dicitur, 122
Lanum, 123. verum Plinii, 118
Lanionum

I N D E X.

Canionum observatio de lumbrico lato,	97	Malabaricus, 123	Nicolaus Monardes,	147
Lapidi Lazuli vires contra febres sem-	41	Mali punici decoctum, 106. radicle,	Nitri vires in febribus,	38
tertianas,	113	ibid.	Nodi in dentariæ quodam genere,	116
Laser,	102	Malvarum genera,	Nomina plantarum quæ & quando di-	132
Lassitudo corporis continua cui,	129	Malum granatum, 130. pomi genus, ibid.	scenda,	132
Lasiurus,	116	punicum,	Nuces juglandes,	107
Ledum alpinum Clusii gallam fert,	129	Mandragora,	Nuciferæ arbores,	130
Leguminum genera,	75	Marcellus Virgilius,	Nux pomi genus,	ibid.
Leantia in arthritide biliosa, 74. in me-	129	Marrubii flores,		
lancholica,	129	Meragon lilii genus,		
Lens legumen,	115	Materia lumbricorum duplex, 94. pro-		
Lentis palustris radices,	146	pria lumbrici lati, 95. saporum, 139.		
Leonardus Tucchiuss,	131	140.		
Leucacantha, est carduus,	125	Matrix ligni,		
Leucicif quam diu lato lubrico laborent,	131	Matthias Obelius,		
100. quando hic in illis generetur, 99	125	Maturitas factus quæ,		
Leucographis, est carduus,	125	Meconium,		
Leucoji descriptio,	125	98. 113		
Leucorum bulbosum Theophrasti, 125.	125	Medicamenta suspecta in lumbrici lati		
126. Fuchsi,	125	curatione,		
Lien unde accipiat colloquationem,	64	Medicamentum quid,		
Lignum est medulla caudicis,	115	Medici qui requirunt pituitæ copiam in		
Liliaphodolus,	125	generatione lumbrici lati,		
Lilii genera, 125. radix bulbifera,	116	96		
Lilium Pericum, ibid. rubens bulbo-	116	Medicorum communis error in cibatio-		
sum,	123	ne ægrorum,		
Lini & linariæ genera,	129	Medium Dioscoridis viola dicta,		
Lithopermon,	106	145		
Lixivium cum oleo datur contra lumbric-	7	Medulla in candice lignum & matrix di-		
cos,	122	citur, 115. radices pars interna, ibid.		
Locus intra venas quis,	88	Mel acre est ac dulce,		
Locus putredinis extra vasa quotuplex, 8	28	138		
Loti genera,	122	ex Melancholia ascarides gigni secun-		
Lucetii fava vermina,	87	dum Oribasium,		
Lumborum dolores in febribus unde	87	95		
fiunt,	87	Melchior Guilandinus,		
Lumbrici lati articuli, 90. caput, ibid.	87	146		
corpus, ibid. descriptio, 89. longi-	87	Melilotus,		
tudo, ibid.	87	122		
Lumbrici teretis figura cum ex puita	87	Melmela,		
in animal transit, 95. generatio, 95	87	108		
Lumbrici teretes quatuor in trunco veng	87	Melones,		
portæ inventi, 90. una cum primo	87	ibid.		
stercore excernuntur à pueris, 98.	87	Meloepones cruciatus excitant,		
terreni, 87. aculeatum os habent, 90	87	102		
vox late sumta,	87	Memoria nostra labilis, 132. in ea fer-		
Lumbricorum tria genera,	87	vandæ Plantarum formæ,		
Lumbricos occidentia medicamenta, 105	87	133		
Lumbricum latum una cum primo ster-	87	Menses quomodo moveantur, 135. quan-		
core excernunt pueri,	87	do naturaliter subsistant, 154. lubra-		
98	87	hit lumbricus latus,		
Lumbricus animalium ex æguum maxi-	87	102		
me dearticulatum, 100. in animalium	87	Mentha,		
intestinis nascitur, 87. vermes terrenos	87	123		
significat, 87. vermis est, ibid.	87	Mercatus notatus,		
Lumbricus latus an fit animal, 93. cur	87	80		
difficuler congeletur, 100. aut mo-	87	Mercurius præcipitatus,		
veatur, 101. cur non facile curetur,	87	104		
105. pilulis ex diatribith cum rha-	87	Metatides populi ignoti,		
barbaro, itemque ex hiera Ruffi eje-	87	ibid.		
ctus, 105. rotundus vel planus, 88.	87	Mili fermen quale,		
sponte provenit, 93. unicus nascitur,	87	129		
97	87	Milzattilla,		
Lumbricus teres dicitur aliquando in-	87	118		
mus, 87. in tenuibus intestinis gene-	87	Monstruosi vermes,		
tatur, 97. intestina perforat,	87	91		
100. in animalium	87	Moravix lacus Coblicensis,		
intestinis nascitur, 87. vermes terrenos	87	104		
significat, 87. vermis est, ibid.	87	Morbi mites & securi quando periculo-		
Lumbricus latus an fit animal, 93. cur	87	evadunt, 103. qui in arthritidem ter-		
difficuler congeletur, 100. aut mo-	87	minentur,		
veatur, 101. cur non facile curetur,	87	72		
105. pilulis ex diatribith cum rha-	87	Mori arboris radix, 106. cortex radices		
barbaro, itemque ex hiera Ruffi eje-	87	ejus purgat,		
ctus, 105. rotundus vel planus, 88.	87	ibid.		
sponte provenit, 93. unicus nascitur,	87	Mostarda Gallorum & Belgarum,		
97	87	107		
Lumbricus teres dicitur aliquando in-	87	Motus lumbrici lati emaciat corpus, 103		
mus, 87. in tenuibus intestinis gene-	87	Muci in ore pulli equini jamjam nati utri-		
tatur, 97. intestina perforat,	87	litas ad febres semitertianas,		
100. in animalium	87	ad Mulcæ principium, vermis,		
intestinis nascitur, 87. vermes terrenos	87	87		
significat, 87. vermis est, ibid.	87	Mulcæ equorum abigendas quæ va-		
Lumbricus latus an fit animal, 93. cur	87	leant,		
difficuler congeletur, 100. aut mo-	87	108		
veatur, 101. cur non facile curetur,	87	Musci marini species corallina est,		
105. pilulis ex diatribith cum rha-	87	106		
barbaro, itemque ex hiera Ruffi eje-	87	Myrrhis acris & dulci sapore,		
ctus, 105. rotundus vel planus, 88.	87	138		
sponte provenit, 93. unicus nascitur,	87			
97	87			
Lumbricus teres dicitur aliquando in-	87			
mus, 87. in tenuibus intestinis gene-	87			
tatur, 97. intestina perforat,	87			
100. in animalium	87			
intestinis nascitur, 87. vermes terrenos	87			
significat, 87. vermis est, ibid.	87			
Lumbricus latus an fit animal, 93. cur	87			
difficuler congeletur, 100. aut mo-	87			
veatur, 101. cur non facile curetur,	87			
105. pilulis ex diatribith cum rha-	87			
barbaro, itemque ex hiera Ruffi eje-	87			
ctus, 105. rotundus vel planus, 88.	87			
sponte provenit, 93. unicus nascitur,	87			
97	87			
Lumbricus teres dicitur aliquando in-	87			
mus, 87. in tenuibus intestinis gene-	87			
tatur, 97. intestina perforat,	87			
100. in animalium	87			
intestinis nascitur, 87. vermes terrenos	87			
significat, 87. vermis est, ibid.	87			
Lumbricus latus an fit animal, 93. cur	87			
difficuler congeletur, 100. aut mo-	87			
veatur, 101. cur non facile curetur,	87			
105. pilulis ex diatribith cum rha-	87			
barbaro, itemque ex hiera Ruffi eje-	87			
ctus, 105. rotundus vel planus, 88.	87			
sponte provenit, 93. unicus nascitur,	87			
97	87			

I N D E X.

Papilionis genus parit femini enici quid simile,	87	ex Pituitosa materia omnes lumbricos nasci, 95. latos præcipue,	94. 95
Pappas. indorum,	120	Plantaginis nervus costa dicitur,	113
Παπας, 87,	117	Plantæ aliis plantis innascentes,	114
Paralyti causæ in febris semiteriana, 52		Perfectæ quæ auctori, <i>ibid.</i> perfectæ ante imperfectas descendæ, quomodo succandæ, 133. umbelliteræ,	119
Παρεγκεναι, 116		Plantæ res varia est ac multiplex,	115
Pardalianæ, 131		Plantam nullam non esse medicamentum,	143
Partes dissimilares communes, 114. 115. similes,	113	Plantarum agglutinandarum ratio, 133	
Partibus humani corporis certis destinatae plantæ,		depingendarum ratio, 133. different quæ tor, quor formæ diveritates, 113. exactæ cognitioni quæ conferant, <i>ibid.</i>	
Partium differentia, 117. dissimilium enumeratio, 114. enumeratio, <i>ibid.</i> propriarum enumeratio, 116. varietas diversarum plantarum formas constituit,	113	naturæ cognita difficiles,	112
Partus tempus duplex, 152. incertum, 151. ejus causæ,	154	in Plantis quæ primum descendenda,	113
Partus præcoces ab abortu quomodo distinguendi,	152	Platonis opinio quæ falsa,	149
Partus vermis lati,	99	Πλατὼ quid,	88
Paulus Ægineta,		Plinii Valeriani emplastrum pro arthritide, 77. potio ad arthritidem,	40
Pectus unguento veteres cur perungerent,	142	Plinii libri de Stirpibus,	146
Pediculus floris & fructus principium,	114	Plinius animadversus, 126. correctus, 127. lapsus,	116
Pentaphyllum,	122	Πίσς quid proprie,	124
Peplus,	124	Podagra cur Bacchi & Veneris filia fingatur, 69. periculo non vacat,	68.
Pepo,	129	Podagrici cur generant podagricos, 69. multi sanati,	72
Perfectæ plantæ quæ, 114. quando descendæ,	132	Polycantha est carduus,	131
Perfoliata,	128	Polypodium inesse contrarias facultates,	139
Περφολιττα, 116. 120		Pomacium vinum,	108
Pericula ex neglecta curatione lumbriculi,	103	Poma Cybeles, 130. S. Iohannis,	108
Petiolus foliorum,	115	Pomiferae arbores,	130
Petroelinum,	141	Pomum cum melle hausto purgatur infans,	98
Petrus Andreas Matthiolus,	146	Pomorum genera,	130
Petrus Bellonius,	147	Pomum quid Autori,	
Petrus Pena,	146	Posio florum, 119. foliorum, <i>ibid.</i> fructuum, 120. radicum,	118
Phaeocola,	129	Potio Plinii Valeriani ad arthritidem, 40	
Pheretima Cyrenes regina,	88	Præparantia in biliosa arthritide, 74. in melancholica,	75
Philosophia herbaria difficilis,	112	Præparatio ante curationem lumbriculi latitanti necessaria est, 104. objectiones contra eam, 105. qualis esse debeat,	104
Phlomisides,	124	Prava & concocta difficilia quomodo deprehendantur,	145
Phocorum solertia,	112	Pravi succi qui,	144
Φρύγανον quid,	120	Primæ facultates,	134
Phryges carent lumbrico,	104	Prosper Alpinus,	147
Phyllitis,	115	Προσπετιν Δυκε Aristoteli quid,	96
Pile figura exit lumbricus latus,	99	Prunorum genera tria,	130
Pilosas radices quæ habeant,	116	in Pueris raro lumbricus latus,	98
Pilosellæ pili in foliis,	117	Pulsus in lato lumbrico laborantibus qualis,	100
Pilus diatubith cum rhabarbaro expulsi lumbricus latus, 105. ex hiera Ruffidem eieci,	<i>ibid.</i>	Pulsus Comitæ de Harwick & ejus doctus, 37. quando maxime sit usurpandus, 38. peculiaris Autoris ad arthritidem,	53
Pimpinellæ Polonicæ granula,	116	Pumices gignit quercus,	116
Pinguis sapor unde,	140	à Purgante medicamento non exit totus lumbricus latus,	105
Pinus, 130. cachrin producit,	116	Purgantia in biliosa arthritide, 74. in forma solida an conveniant biliosæ arthritidis, 74. in melancholica arthritide, 75. in languinea, 75. quæ sint, 137	
Piscatores inepti qui imitentur,	112	Purgatio in accessione arthritidis periculosa,	74
Piscatorum observatio circa leuciscos, 99		Purgat mori radices cortex,	106
Pisces encrasicholi, 107. plani <i>medicis</i>		Puri similis materia in intestinis fetus,	94
Græcis cur non potius lati dicti, 88. tæniostibi,	104	Pus movendi facultas,	135
Pisces aquam cauda quatients sonitum excitat in ventre lumbricus latus, 102		Putredinis locus extra vasa quod duplex, 8	
Pistachia,	130	Putrescentia facile, humida sunt,	144
Pistoclochæ radix cava,	117	ex Puri nata animalia non generant sibi simile,	99
Pisum,	129		
Pituita magna copia non requiritur ad generationem lumbriculi lati, 97. qualis declinatio ad lumbricos producendos,	95		
Pituita à capite destillans ad quamdam chyli formam in foetu reducitur, 97. quomodo transeat in lumbricum latum,	95		
Pituitosæ arthritidis externa & interna medicamenta,	78		

Q.

Quæ arthriticis noxia,	83
Qualis aer ad semiterianæ generationem requiritur,	16
Qualitates manifestas indicantes sapores, 139. ratio & experientia notificant, 142. occulæ, quæ, 137. earum investigatio quomodo fiat,	142
Quartana à lactuca & brassica sanari visâ, 143. quo tempore plerumque solvatur, <i>ibid.</i> in lumbricum latum habentibus periculosa,	103
Quercus cachrin producit, 116. folia gallam ferunt, <i>ibid.</i> genera, 129. multa generat ob morbum,	117
Qui morbi in arthritidem terminantur,	72
Qui sint ab arthritide immunes,	72
Quinquemesium puerorum exempla,	152

R.

Radices bulbosæ, 116. dulces quædam venenosæ, geniculatæ, 117. pilosæ,	116
Radices omnibus plantis inesse, 114	
ex Radicibus quæ herbæ cognoscantur,	121
Radicibus quibusdam fructus nomen dant,	120
Radicum differentia, 117. fibræ, 115. partes externæ attrahunt, internæ concoquant,	115
Radix quid, 114. corticem exterius habet, 115. prius nota esse debet quam alia partes, 149. ventri & ori animalium similis,	115
Ramorum differentia,	118
Ramus quid,	114
Ranarum viridum vires,	41
Ranunculi primum genus Dioscoridis, 127. ab Anemone differunt,	127
Ranunculum genera,	126
Ranunculus nemorosus albus, 127. radice scrofulariæ,	<i>ibid.</i>
Raphani radix,	118
Ραφανιδες radices,	116
Raphanus marinus, 107. hispanicus, <i>ibid.</i>	
Ratio inventrix alimentorum, & medicamentorum.	
Recidivæ unde fiant, 57. quomodo carentur,	<i>ibid.</i>
Recoctaria,	126. 139
Refrigerantia & humectantia quomodo & in quibus febribus sint usurpanda,	39
Rembertus Dodonæus,	146
Repellentia in arthritide quomodo applicanda,	77
Ricini grana pro lumbrico lato,	104
Robur,	
Rondeletii pulvis pro arthriticis,	78
Rosæ floris temperamentum, flosculi aurei, 116. odorem quis non sustineat, 143. odore moriuntur scarabæi, 142. sylvestris spongia, 116. tritæ cur odorem non sprent,	142
Ruellii opinio Cremio,	120
in Rupicapræ ventre inveniri radicem Doronicæ,	131
Ruscæ radices sapor,	138
Rustici raro laborant podagra,	72
Ruta capraria, 137. sylvestris Dioscoridis,	140

INDEX.

S.

SAL Chymicorum, 139. omni infesto inimicum, 107
Salem cur pecoribus obijciunt pastores, 141
Sassa inodora, 141
Sallus sapor, 140. caliditatem indicat, 139. quibus plantis inuit, 120. unde fiat, 140
ex Sanguine & lacte quomodo fieri possit lumbricus latus, 94
Sanguis Aristoteli pars animalis, 113
in Sano corpore facienda experientia, 145
ex Sapore & odore quæ stirpium genera cognoscantur, 121
Sapores boni cum bonis odoribus, 142. calidi frigidi que, 139. mixti, 138. qualitatum ætharum certissimi indices, 139. etiam passivarum, 140. suaves qui, 143
Saporum differentia, 140. materia, quibus singuli inbærent, 140
Sartæ parillæ decoctum in semitertiana, 404
Saxifraga, 121
Saxifragiæ, 140
Scabiosa genera, 127
Scabiosa montana Dalechampi jacea non est, 128. Pannonica Clusii, 127
Scalgeri opinio de Cremio, 120. de usu florum ac foliorum, 114
Scammoni vires, 38
Scammonium pellit lumbricum latum, 104
Scarabæi in intestinis geniti, 88. odore rosæ moriuntur, 142
Scorbuti generis corallina est, 106
Scientiæ, & artes quomodo tironibus tradendæ, 112
Scientiarum plantarum quæ exacte cognoscenda, 113
Scientiarum omnium studia difficilima, 112
Scirpuncorum, 123
Scolymus, 131
Scordium, 138. ex aceto, 106
Scorpionis oleum ex descriptione Matthioli, 107. Moribus quæ conducant, 138
Scrophularia, 114
Secale, 124
Secundæ facultates medicamentorum, & earum investigatio, 140
Sedes humoris in arthritide, 68
Semen augmentia, & extinguentia, 136. augmentia an flatulenta, 140. plantarum quid, 114
in Semine principium ex quo radix ubi, 116
Seminis generatio, 69
Seminum differentia, 120. umbilicus, 116
Semitertiana, vide, Febris semitertiana.
Sempervivi genera, 131. majoris sapor, 139. usus ad inflammationes, 143
Senecionis facultas, 107
Senectus lumbrici lati, 100. quomodo ea cognoscatur, 104
Senæ foliis in aceto maceratis expulsi lumbricus latus, 105
Serpentis fœtus in ovo positio, 96
Serratula jacea est, 128
Sextimestrii puerorum exempla, 132
Sexu non distinguitur lumbricus latus, 99
Siccæ plantæ quæ magis oleant viridibus, 141

Sicca in primo, secundo & tertio gradu,

Siccitas cum tenui materia, 135
Siccitatem indicantes sapes, 140
Siciliana, 123
Sideritis tertia Dioscoridis, 138
Signa accessionem in arthritide venturam indicantia, 72. arthritidis atrabilaris, biliosæ, pituitosæ, sanguinæ, 70. arthritidis quomodo tallant, 70. arthritidis Gallicæ, 71. causæ conjunctæ arthritidis, 70. diagnostica arthritidis, 70. lumbrici lati communia, 100. prognostica arthritidis, 72. propria lumbrici lati, 100. recidivæ in alium morbum, 27
Similes, 129
Similes & dissimiles partes, 113
Sitis qualis in muliere habente lumbricum latum, 102
Smaragdi vires contra febres semitertianas, 41
Smyrni radix mollis, 117
Solanum manicum cerebrum petiit, 123
Soldanella non est brassica, 118
Sophonia Plinii, 118
Soranus dracunculum animal esse negavit, 93
Spatula fetida, 139
Spiræ lumbrici lati, 90
Spoel-worm Germanorum, 89
Spongia rosæ sylvestris, 116
Spontaneus lati lumbrici exitus à corpore, 104
Stamina floris, 116
Stephanus Aqueus, 146
Stecbe Salamantica Clusii non est jacea, 108
Stechas citrina herbariorum, 126
Stramonium, 137
Struthium quid, 88
Strumea Plinii, 126
Stylus floris, 116. foliorum, 115
Suber quercus genus, 129
Succi pravi qui, 144
Suffrutex quid, 120
Suffumigium contra tenebrum, 50
Sulphuris suffumigio aër alterandus pro lumbrico lato laborantibus, 108
Suppositoria ad educendum lumbricum latum, 107
Surculus ramorum, 114
Syncopas facit lumbricus teres, 100
Syri habent lumbricum latum, 104
Syrupus è floribus persicorum, 108. rosarum laxativus purgat infantes, 140.

T.

TAbanos equis infestos quæ conducant, 108
Tanacetum Aphricanum auctoris, 125
Taëtili qualitate differentia radicum, 117. caulium, 118
Taëtus temperamenti certissimus index, 138
Tænia lumbrici lati nomen proprium, 88
degener auctoris, 91
Tænia, 88
Tarma Italis veterinariis, 140
Temperamentorum gradus ut cognoscantur, 139
Tænia Abfyrti, 88
Terræ intestina valent ad omne genus lumbricorum, 106
Terra Cimolia & Melitenfis, 140

Tertiæ plantarum facultates alterantes,

Tertiæ facultatum investigatio, 140
Tertia in lumbricolato laborante non valde tuta, 103
Thapsiæ vis, 137
Thebanis non est lumbricus, 104
Theca florum, 115
Theodorus Gaza Theophrasti interpretes, 145
Theophrasti historia plantarum, 145. de saporibus opinio, locus emendatus, 121, 128, 131. obscurus animadvertus, 113. locus de populis lumbricum habentibus, 104
Theophrastus animadvertus, 106. cum Galeno conciliatus, 141. filicem gravidæ mulieri negavit, 106. quas differentias attribuat partibus plantarum, 117
Theba cur dicantur ventris lumbrici, 88
Theriacæ laus ad occidendos lumbricos, 107
Thlaspi clypeatum, 129. Cretici flores quid efficiant, 142. genera, 129
Thora non est Aconitum, 131
Thracæ caret lumbrico, 104
Thymum minutum semen ferre, 114
Tignamica Hetruscorum, 106
Tinearia Marcelli & Scribonii Largi, 88
Tineis similis Afcaris, 88
Tithymalorum genera, 113, 124
Topica quæ in arthritide sint administranda, 76
Tormen in ventriculo lumbricum latum habentis, 101. quomodo huic providetur, 107
Tormentilla, 122
Tralliani antidota ad arthritidem, 81. cataplasma, 78. externa medicamentata, 81
Trifolii folia, 119. pratensis flores & fructus, 122
Trifoliorum genera, 140
Trifolium bituminosum, 140. Salamanticum Clusii, 140
Tritici genera, 124. vulgaris semen quale, 124
Triticum multum nutrit, 144
Trochisci chamæmelini, 41. Plinii Valeriani, 47
Tubera terræ nil aliud quam radices, 115
Tulipan lili genus, 125, 126
Typha, 123

V.

Valeriolæ de generatione lati lumbrici sententia, 96
Varro, 147
Vasorum differentia secundum magnitudinem, 7. secundum loca & connectionem, 8
Vena plantarum pars similis, 113. fibris affimilata, 113
Vena in arthritide secanda, 73
Venarum melsaicarum orificia obstruit lumbricus latus, 102
Venenis aliquos educatos esse, 145
Venenorum vis, 137. in alterandis cordibus, ut igni resistent, 151. nullum toti corpori, omnia partibus tantum, uni aut pluribus nocent, 145
Veneno sa nonnulla dulcia, 145
in Ventre quid perpesa mulier à lumbrico lato, 101
Ventre

I N D E X.

Ventri animalium similis radix plantarum,	115	Vinum quale præscribendum qui lumbrico lato laborant,	108	lumbrici lati, 107, iis argentum vivum non admiscendum,	<i>ibid.</i>
Ventriculi officium,	143	Viola autumnalis Gallorum, 125. barbara Dalechampi, 125. latifolia, <i>ibid.</i>		Vnguento cur pectus perfunderent antequi,	142
Verbasci genera,	124	lutea, <i>ibid.</i> mariana, <i>ibid.</i> martiæ flores frigidi, matronalis, <i>ibid.</i>		Vnionibus similes scientiæ,	112
Verbenæ vis,	105	Violæ,	<i>ibid.</i>	Vocis interceptio à lumbrico lato,	101
Veris initio leuciscorum venter non tumet,	99	Vires an ad venæ sectionem sufficientes sint quomodo cognoscendum,	33	Vomitioria in pituitosa arthritide,	75.
Vermes brevioris sunt vitæ, & cur 99. in animalium ventre nascentes lumbrici dicuntur,	87	Virgilius cur Narcissum purpureum dixerit,	126	quibus sumenda, 39. quibus vitanda, <i>ibid.</i>	
Vermina sæva Lucretii,	88	Viridia quædam cur magis oleant quam ficcata,	141	Vomitu aliquando rejicitur lumbricus latus,	104
Vermiculus grani tinctorii,	117	Violarum vires in sedandis doloribus articularum,	77	Vomitur in quibus febris utiliter instituitur,	39
Vermis cucurbitinus Arabum quis,	91	Vitæ brevioris sunt animalia minus dearticulata,	100	Vrinam ciendi facultas unde,	135
Vermis Autori quid, 87. Grammaticis quid, <i>ibid.</i> omne insectum quodammodo complectitur, <i>ibid.</i>		Vitam longam habet lumbricus latus, 99. & cur,	100.	Vritica mortua,	123
Vesicantia an administranda in arthritide,	73	Viticulae,	116	Vilus herbarum multiplex,	134
Vicia legumen,	129	Vitis annuli,	<i>ibid.</i>	Vterus lumbrico lato deest,	99
Victus ratio extra accessionem in arthritide servanda, 83. in arthritide biliosa, 76. in arthritide pituitosa, 84. in curatione lumbrici lati,	107	Vmbilici regionis quæ medicamenta imponenda contra lumbr. latum,	107	Wafferkaib Germanis quid,	89
Vigiliæ non valde accidunt ægrotanti ex lumbrico lato,	100	Vmbilici veneris folia concava,	118		
Vincæ pervincæ vis,	136	Vmbilicus floris, 116. fructus, <i>ibid.</i> feminis, <i>ibid.</i>			
Vini fastidium à lumbrico lato,	101	Vndecimestrium exempla,	153		
Vinosus sapor,	138	Vnguenta quæ conveniant, in curatione			

X.


<i>Ευχαλὺν γλαυκὴν</i> quid Hippocrati,	100
Xyridis flos,	126
<i>Ευραλὺς</i> Hippocrati quid,	89

Z.

Zingibii cujusdam cor cremari non potuit,	150
---	-----

F I N I S.





84-B2833

SPECIAL 84-B
OVERSIZE 2833

